Digitized by Google

Digitized by Google

HANDBUCH

der

PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN

für Vorlesungen.

Von

Dr. Johannes Müller,

ordentl. öffentl. Professor der Anatomie und Physiologie an der Königl. Friedrich Wilhelms-Universität und an der Königl. medicin.-chirurg. Militär-Academie in Berlin, Director des Königl. anatom. Museums und anatom. Theaters; Ritter des Rothen Adlerordens 4. Classe; Mitglied der Königl. Academieen der Wissenschaften zu Berlin und zu Stockholm, Correspondent der Kaiserl. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu Turin, Mitglied der Königl. Soc. d. Wissensch. zu Göttingen und Upsala.

Erster Band.

Dritte verbesserte Auflage.

Mit Königlich Würtembergischen Privilegien.

Coblenz,

Verlag von J. Hölscher.

1838.

Digitized by Google

Digitized by Google

Inhalt.

Prolegomena.

Seite

I. Von der organischen Materie 1
II. Vom Organismus und vom Leben 19
III. Von dem thierischen Organismus und von dem thierischen Leben 40
IV. Ueber die den unorganischen und organischen Körpern gemeinsamen Wirkungen. Electricität, Wärme, Licht 64

Der speciellen Physiologie Erstes Buch.

Von den allgemein verbreiteten organischen Säften, von der Säftebewegung und von dem Gefässsystem.

I. Abschnitt. Vom Blut. 101
I. Microscopisch-mechanische Analyse des Blutes 104
II. Chemische Analyse des Blutes 125
III. Analyse des Blutes durch die galvanische Säule 139
IV. Von den organischen Eigenschaften und Verhältnissen des Blutes 146
II. Abschnitt. Von dem Kreislauf des Blutes und dem Blutgefässsystem. 163
I. Von den Formen des Gefässsystems in der Thierwelt ..... ib.
II. Von den allgemeinen Erscheinungen des Kreislaufs 173
III. Vom Herzen als Ursache des Kreislaufs 187
IV. Von den einzelnen Theilen des Gefässsystems 198
V. Vom Verhalten der Blutgefässe bei der Aufnahme und Ausscheidung der Stoffe 237
III. Abschnitt. Von der Lymphe und dem Lymphgefässsystem 255
I. Von der Lymphe ..... ib.
II. Von dem Ursprung und Bau der Lymphgefäße 260
III. Von den Actionen der lymphatischen Gefässe 271

Der speciellen Physiologie Zweites Buch.

Von den organisch-chemischen Veränderungen in den Säften und den organisirten Theilen.

I. Abschnitt. Vom Athmen. 289
I. Vom Athmen im Allgemeinen 289
II. Organologie der Athemwerkzeuge 293
III. Vom Athmen des Menschen und der Thiere 302
IV. Von den Veränderungen des Blutes durch das Athmen 317
V. Von dem chemischen Processe des Athmens 324
VI. Von den Athembewegungen und Athemnerven 336
II. Abschnitt. Von der Ernährung, vom Wachsthum und von der Wiedererzeugung. 350
I. Von der Ernährung ..... ib.
II. Vom Wachsthum 371
III. Von der Wiedererzeugung 394
III. Abschnitt. Von der Absonderung. 423
I. Von den Absonderungen im Allgemeinen 423
II. Von dem innern Bau der Drüsen 433

Digitized by Google

Seite
III. Ueber den Secretionsprocess 459
IV. Abschnitt. Von der Verdauung, Chylification und Ausscheidung der zersetzten Stoffe. 474
I. Von der Verdauung im Allgemeinen ..... ib.
II. Von den Verdauungsorganen 483
III. Von den Bewegungen des Darmkanals 493
IV. Von den Verdauungssäften 507
V. Von den Veränderungen der Speisen im Darmkanal 526
VI. Von der Chylification 557
VII. Von der Function der Milz, der Nebennieren, der Schilddrüse und der Thymusdrüse 567
VIII. Von der Ausscheidung der zersetzten Stoffe 577

Der speciellen Physiologie Drittes Buch.

Physik der Nerven.

I. Abschnitt. Von den Eigenschaften der Nerven im Allgemeinen. 597
I. Vom Bau der Nerven ..... ib.
II. Von der Reizbarkeit der Nerven 617
III. Von dem wirksamen Principe der Nerven 641
II. Abschnitt. Von den Empfindungsnerven, Bewegungsnerven und organischen Nerven. 649
I. Von den sensitiven und motorischen Wurzeln der Rückenmarksnerven 649
II. Von den sensitiven und motorischen Eigenschaften der Gehirnnerven 657
III. Von den sensitiven und motorischen Eigenschaften des Ganglionnerven 670
IV. Vom grauen oder organischen Fasersystem 675
V. Vom Nervensystem der Wirbellosen 683
III. Abschnitt. Von der Mechanik des Nervenprincips. 685
I. Mechanik der motorischen Nerven 688
II. Mechanik der Empfindungsnerven 695
III. Von der Reflexion in den Bewegungen nach Empfindungen .. 717
IV. Von der verschiedenen Action der sensibeln und motorischen Nerven 731
V. Von den Gesetzen der Wirkung und Leitung in dem Nervus sympathicus 737
VI. Von den Sympathien 760
IV. Abschnitt. Von den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Nerven 779
I. Von den Sinnesnerven ..... ib.
II. Von den Eigenthümlichkeiten anderer Nerven 784
V. Abschnitt. Von den Centraltheilen des Nervensystems. ... 803
I. Von den Centraltheilen des Nervensystems im Allgemeinen .. 803
II. Vom Rückenmark 810
III. Vom Gehirn 824
Berichtigungen und Nachträge. 867

Digitized by Google

Berichtigungen und Nachträge.

Seite 132 Zeile 2 v. u. statt GEIGERT lies GUGERT.
— 233 — 9, 14, 28 st. PARRY l. BARRY.
— 234 — 14 st. PARRY l. BARRY.
— 386 — 18 v. u. ist zuzusetzen: RETZIUS in MUELL. *Archiv.* 1837. 486.
— 463 — 4 v. u. ist das Fragezeichen zu streichen.
— 547 — 14 v. u. ist zuzusetzen: Nach einer mündlichen Mittheilung von PURKINJE wird das Verdauungsprincip von Alcohol nicht zerstört und nicht aufgelöst. SCHWANN hat diess durch folgende Versuche bestätigt. Wurde die Magenschleimhaut eines Schweines wiederholt mit Alcohol behandelt und dann getrocknet, so liess sich nachher aus derselben noch sehr gutes Verdauungsprincip durch verdünnte Salzsäure ausziehen. Wurde mit Wasser und möglichst wenig Säure dargestellte Verdauungsflüssigkeit neutralisirt, bei 30° R. bis zur Consistenz eines sehr dünnen Syrups abgedampft (nicht bis zur Trockenheit, weil dabei die Salzlösung zu concentrirt und dadurch die Verdauungskraft sehr verringert wird), dann mit vielem Alcohol versetzt, hierauf filtrirt und der Rückstand mit Alcohol wiederholt ausgewaschen, so liess sich aus diesem Rückstand durch Ausziehn mit verdünnter Salzsäure das Verdauungsprincip reiner und mit hinlänglicher verdauender Kraft darstellen.
— 549 — 22 v. u. ist zuzusetzen: PURKINJE und PAPPENHEIM in MUELL. *Archiv.* 1838. 1.
— 576 Ueber die vergleichende Anatomie der bloss bei Säugethieren vorkommenden Thymus siehe HAUGSTED, *Thymi in homine ac per seriem animalium descriptio anatomica physiologica et pathologica. Hafn.* 1832. ausgezogen in HECKER's *Annalen* 25 54.
— 602 Zeile 15 v. u. ist zuzusetzen: REMAK *Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura. Berol.* 1838.
— 610 ist zuzusetzen: Ueber die Structur der Retina vergl. VALENTIN *Repert.* 1837. 2.
— 730 Ueber Reflexbewegungen in Beziehung auf die Structur des Rükenmarks ist ferner zu vergleichen: CRAINGER *observations on the structure and functions of the spinal cord. London* 1837.
— 783 Ueber für und Wider in Hinsicht der Theorie von PANIZZA über den Glossopharyngeus sind zu vergleichen R. WAGNER, FRORIEP's *Notizen* 1837. *N.* 75., VALENTIN *Repertorium.* 1837, 2. 219., ROMBERG, MUELL. *Archiv.* 1838. 3.
— 789 Zeile 24 v. u. lies: der Vidische Nerve der Schlangen zwischen dem zweiten Ast des Trigeminus und Facialis giebt einen Muskelast zum Rückzieher des Oberkiefers. Indess giebt die motorische Portion des Trigeminus nach vorn einen Zweig zum Vidischen Nerven, wovon jener Muskelast kommen mag.

Digitized by Google

Digitized by Google

HANDBUCH

der

PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN

für Vorlesungen.

Von

Dr. Johannes Müller,

ordentl. öffentl. Professor der Anatomie und Physiologie an der Königl. Friedrich Wilhelms-Universität und an der königl. medicin.-chirurg. Militär-Academie in Berlin, Director des königl. anatom. Museums und anatom. Theaters; Mitglied der Königl. Academieen der Wissenschaften zu Berlin und zu Stockholm, Correspondent der Kaiserl. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu Turin, der Königl. Soc. d. Wissensch. zu Upsala, u. a. gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Ersten Bandes erste Abtheilung.

Dritte verbesserte Auflage.

Mit Königlich Würtembergischen Privilegien.

Coblenz,

Verlag von J. Hölscher.

1837.

Digitized by Google

Prolegomena.

Die Physiologie ist die Wissenschaft von den Eigenschaften und Erscheinungen der organischen Körper, der Thiere und Pflanzen, und von den Gesetzen, nach welchen ihre Wirkungen erfolgen. Die erste Frage, welche man sich beim Eintritt in diese Wissenschaft zu beantworten hat, ist die nach dem Unterschied der organischen und unorganischen Körper. Sind die Körper, welche die Erscheinungen des Lebens darbieten, in ihrer materiellen Zusammensetzung von den unorganischen Körpern verschieden, deren Eigenschaften die Physik und Chemie untersuchen? und da die Erscheinungen in beiden Reichen so verschieden sind, sind auch die Grundkräfte, welche sie bewirken, verschieden, oder sind die Grundkräfte des organischen Lebens nur Modificationen der physischen und chemischen Kräfte?

I. Von der organischen Materie.

Empfindung, Ernährung, Zeugung haben kein Analogon in den übrigen physischen Erscheinungen, und dennoch sind die Elemente der organischen Körper solche, welche in die Zusammensetzung der unorganischen Körper eingehen. Die organischen Körper enthalten zwar als nächste Bestandtheile Materien, welche nur ihnen eigenthümlich sind, und welche durch keinen chemischen Process künstlich erzeugt werden können, wie Eiweiss, Faserstoff etc. Allein bei der chemischen Analyse zerfallen alle diese Körper in Elemente der unorganischen Körper. Die wesentlichsten Bestandtheile der Pflanzen sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, seltener Stickstoff; ausserdem finden sich bald seltener, bald häufiger Phosphor und Schwefel (beide vorzüglich im Pflanzeneiweiss und Kleber, dann besonders in den Tetradynamisten mit Stickstoff), Kalium (fast allgemein), Natrium (vorzüglich in den Pflanzen des Meeres), Calcium (fast allgemein), Aluminium (selten), Silicium, Magnium (sparsam), Eisen und Manganium häufig, Chlor, Jod und Brom (beide in Seepflanzen). In der Thierwelt finden sich diese Stoffe ausser Aluminium wieder; Natrium ist häufiger, Kalium seltener als in Pflanzen, Jod und Brom in einigen Seethieren. Die Bestandtheile des menschlichen Körpers und der höheren Thiere sind: Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel (vorzüglich in den Haaren, im Eiweiss und Gehirne), Phosphor (vorzüglich in den Knochen, Zähnen und im Gehirne), Chlor, Fluor (vorzüglich in den Zähnen und Knochen), Kalium, Natrium, Calcium (vorzüglich in den Knochen und Zähnen), Magnium (vorzüglich in den Knochen und Zähnen), Manganium (in den Haaren), Silicium (in den Haaren), Eisen (vorzüglich im Blute, im schwarzen Pigmente, in der Krystalllinse). Der erste

Digitized by Google

Unterschied der organischen und unorganischen Körper betrifft also die Zahl der in sie eingehenden Elemente. Nicht alle Elemente gehen in die Zusammensetzung der organischen Körper ein, mehrere sind für das Leben derselben schädlich. Der zweite Unterschied betrifft die Art der Combination. Die Verschiedenheit der unorganischen und organischen Materie beruht höchst wahrscheinlich in folgender zuerst von Fourcroy und Berzelius dargestellten Eigenthümlichkeit:

1) In der unorganischen Natur giebt es nur *binäre* Verbindungen, indem zwei einfache Stoffe sich unter sich verbinden, oder diese binäre Verbindung wieder mit einem andern Stoffe oder einer andern binären Verbindung sich vereinigt. Die Kohlensäure ist eine binäre Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff, das Ammonium eine binäre Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff; Kohlensäure und Ammonium verbinden sich zu kohlensaurem Ammonium.

Sauerstoff, Kohlenstoff } Kohlensäure
Wasserstoff, Stickstoff } Ammonium
} kohlensaures Ammonium.

Eine unmittelbare Verbindung von 3, 4, oder mehreren Stoffen unter einander, wo alle Bestandtheile gleich mit einander verbunden sind, scheint nur unter dem Einflusse des thierischen oder pflanzlichen Lebens oder der organischen Kräfte möglich. So entsteht aus denselben Elementen Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, welche durch binäre Verbindung kohlensaures Ammonium bilden, unter dem Einflusse des organischen Lebens organische Materie. Diese Verbindungen nennt man nach der Zahl der zugleich gebundenen Elemente *ternäre* und *quaternäre*. So sind Pflanzenschleim, Zucker, Stärkmehl, Fett, ternäre Verbindungen von Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff. Quaternäre Verbindungen sind der Kleber, der Eiweissstoff, der Faserstoff, der thierische Schleim, der Käsestoff, sie enthalten als vierten Bestandtheil noch Stickstoff. Alle chemischen Verbindungen der unbelebten Natur sind binäre, in erster 2. 3. 4. Ordnung, nämlich entweder einfach binäre Verbindungen aus zwei Elementen, oder Verbindungen eines Elementes mit einer binären Verbindung, oder binäre Verbindungen von binären Verbindungen der Elemente. Diese Theorie der Zusammensetzung der organischen Körper aus ternären und quaternären Zusammensetzungen ist zwar von Einigen in Zweifel gezogen, hat aber immer noch, namentlich in Beziehung auf die höheren organischen Verbindungen, wie sie in den Pflanzen und Thieren selbst vorkommen, als Eiweiss, Faserstoff u. a. eine grössere Wahrscheinlichkeit. Dagegen giebt es allerdings Producte aus organischen Stoffen, welche erwiesen binär zusammengesetzt sind, wie der Weingeist (aus Aether und Wasser) u. a. Die Art der Verbindung der Elemente ist jedenfalls in den organischen Körpern so eigenthümlich und durch so eigenthümliche Kräfte bewirkt, dass die Chemie zwar organische Verbindungen aufzulösen, aber keine zu bilden vermag. Berard, Proust, Doebereiner, Hatchett glauben zwar organische

Digitized by Google

Verbindungen künstlich erzeugt zu haben; allein diese haben sich nicht hinlänglich bestätigt, und es können nur Woehler's Entdeckungen hierher gerechnet werden. Bei Sättigung von wässerigem Ammonium durch Cyangas, enthält die Flüssigkeit viel Kleesäure, wie Woehler entdeckt hat. Auch bei der Darstellung des Kaliums aus Kohle und kohlensaurem Kali, geht mit dem Kalium eine schwarze Masse über, die mit Wasser behandelt viel oxalsaures Kali giebt. Die Kleesäure wird jedoch jetzt als eine binäre Verbindung von Kohlenstoff und Sauerstoff betrachtet; sie zersetzt sich zwar, wenn man ihr alles Wasser entzieht; hierin verhält sie sich indess wie Salpetersäure, die beim Entziehen des letzten Antheils von Wasser sich zersetzt. Mitscherlich *Chemie* 416. Nach Woehler's Entdeckungen erhält man Harnstoff statt cyanichtsauren Ammoniaks, wenn man frisch gefälltes cyanichtsaures Silberoxyd mit einer Auflösung von Chlorammonium übergiesst, wobei sich das Silbersalz in Chlorsilber verwandelt. Harnstoff bildet sich auch bei der Zersetzung des cyanichtsauren Bleioxyds durch wässeriges Ammoniak. Die Auflösung enthält anfangs cyanichtsaures Ammoniak, aber nach dem Verdunsten der Auflösung verwandelt sich das Salz in Harnstoff. So fand auch Woehler, dass sich Ammoniakgas und cyanichtsaurer Dampf zu cyanichtsaurem Ammoniak condensiren, das sich aber beim Schmelzen, Kochen oder freiwilligen Verdunsten seiner Auflösung in Harnstoff verwandelt. So bildet sich auch zuerst cyanichtsaures Ammoniak und daraus Harnstoff, wenn man cyanichte Säure mit Wasser, oder mit flüssigem Ammoniak zusammenbringt. Gmelin's *Chemie* 3. 6. Berzelius *Thierchemie.* 356. Der Harnstoff steht indess an der äussersten Grenze der organischen Stoffe, und ist mehr Excretum, als Bestandtheil des thierischen Körpers. Der Harnstoff ist vielleicht nicht einmal eine solche Verbindung, welche die charakteristischen Eigenschaften der organischen Producte hat.

2) Berzelius führt auch einen andern wesentlichen Unterschied an. In den organischen Verbindungen zeigen die Mischungsgewichte kein so einfaches Zahlenverhältniss, als in den unorganischen. So giebt es z. B. eine grosse Menge von Fettarten, die Chevreul untersucht hat, und die nach ihm zum Theil nur durch Bruchtheile in dem Zahlenverhältnisse der Molecule von einander unterschieden sind.

3) Die organischen Körper bestehen ferner grösstentheils aus verbrennlicher Substanz, und zwar enthalten die verbrennlichen Theile der Thiere und Pflanzen (mit Ausnahme der Säuren) den Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff in einem solchen Verhältnisse, dass der Sauerstoff nicht hinreichen würde, den sämmtlichen Wasserstoff in Wasser und den Kohlenstoff in Kohlensäure zu verwandeln.

Eine ausführliche Entwickelung dieser Unterschiede findet man in den classischen Lehrbüchern über Chemie von Berzelius und von Gmelin, und über Anatomie von E. H. Weber. Hildebrandt's *Handb. d. Anat. d. Menschen.* 4. *Ausgabe* von E. H. Weber. *I. Band.*

Die in den organischen Körpern vorhandene organische Ma-

Digitized by Google

terie erhält sich nur während des Lebens der organischen Körper vollständig. Schon während des Lebens können Elemente oder binär verbundene Stoffe, von aussen auf die organischen Körper wirkend, das Gleichgewicht der Stoffe in den organischen Verbindungen stören, und die organische Combination zersetzen, wie z. B. in der Verbrennung einzelner Theile des lebenden Körpers. Zuletzt tritt diese Störung des Gleichgewichtes in jedem lebenden Körper von selbst ein, der Zustand, oder die Kraft, welche die organischen Combinationen erhielten und umwandelten, werden immer schwächer, bis sie nicht mehr im Stande sind, dem Streben der in der organischen Materie befindlichen Elemente zu binären Verbindungen unter sich und mit anderen Elementen das Gleichgewicht zu halten, und der organische Körper mit der organischen Materie zerfällt. Dann ist die organische Combination nicht allein ohne die organischen Erscheinungen, die sie vorhin zeigte, sondern auch mehrentheils nicht fähig, sich zu erhalten, sondern den chemischen Gesetzen der binären Combination unterworfen, und zerfällt in binäre Verbindungen mit den Erscheinungen der Gährung und Fäulniss, stinkender Fäulniss besonders dann, wenn die organischen Materien viel Stickstoff enthalten. Die Erfahrung zeigt also, dass bei den unorganischen Körpern die Verbindung von der Wahlverwandtschaft und den Kräften der verbundenen Stoffe abhängt, dass in den organischen Körpern dagegen die bindende und erhaltende Gewalt nicht bloss die Eigenschaften der Stoffe selbst sind, sondern noch etwas Anderes, welches der chemischen Wahlverwandtschaft nicht allein das Gleichgewicht hält, sondern auch nach den Gesetzen eigener Wirksamkeit organische Combinationen verursacht. Von den imponderabeln Materien haben Licht, Wärme, Electricität, auf die Verbindungen und Trennungen der Stoffe in den organischen Körpern eben so Einfluss, wie auf die Verbindungen und Trennungen in den unorganischen Körpern; aber nichts berechtigt uns, eines dieser Agentien ohne Weiteres als letzte Ursache der Wirksamkeit in der belebten organischen Materie anzusehen.

Die organischen Substanzen zerfallen nach dem Aufhören des Lebens immer, wenn die Bedingungen zur Aeusserung der chemischen Wahlverwandtschaft vorhanden sind. Die hierbei stattfindenden Zersetzungen sind nach Gmelin folgende: Es werden theils Bestandtheile der organischen Verbindungen abgeschieden, als Stickgas, Wasserstoffgas; theils vereinigen sie sich untereinander zu unorganischen Verbindungen, wie Wasser, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffgas, ölerzeugendes Gas, Ammoniak, Cyan, Blausäure, Phosphorwasserstoffgas, Hydrothionsäure, theils vereinigen sie sich nach anderen Verhältnissen zu einer neuen organischen Verbindung oder zu mehreren, Zucker aus Stärkemehl. Bisweilen zerfällt aber eine organische Verbindung einerseits in unorganische Verbindungen, anderseits in organische, wie der Zucker bei der Gährung in Kohlensäure und Weingeist. Im vollkommen trockenen Zustande zersetzen sich die organischen Verbindungen bei gewöhnlicher Temperatur nicht; zu dieser freiwilligen Zersetzung ist wenigstens Wasser, oft auch die Luft

Digitized by Google

nöthig. Gmelin erklärt den Umstand, dass die Zersetzung bei manchen organischen Substanzen nicht immer sogleich nach dem Tode des Thieres oder der Pflanze beginnt, aus dem Mangel der nöthigen Bedingungen für das Eintreten der Wahlverwandtschaft. Diess hat denselben Grund, warum z. B. gewisse unorganische Verbindungen erst bei einer bestimmten Temperatur sich zersetzen. Gmelin's *Chem.* 3. 9. Nasse thierische Theile zerfallen von selbst, auch ohne atmosphärische Luft, unter Quecksilber, wiewohl die atmosphärische Luft die Fäulniss am meisten, selbst mehr als reines Sauerstoffgas, befördert, so wie anderseits ein gewisser Grad von Wärme nöthig ist. Die Producte der Fäulniss thierischer und besonders menschlicher Substanzen sind kohlensaures Gas, zuweilen auch Stickgas, Wasserstoffgas, Schwefelwasserstoffgas, Phosphorwasserstoffgas und Ammoniak. Auch bildet sich Essigsäure und zuweilen Salpetersäure, und es bleiben ausser dem langsamer sich zersetzenden Moder zuletzt die fixen Bestandtheile, Erden, Oxyde, Salze, und bilden mit dem Moder Humus. S. Weber 4. *Ausg. von* Hildebrandt's *Anatomie. I.* p. 70. Im Wasser und in manchen Gräbern, selbst ohne Zutritt des Wassers, erleiden thierische und menschliche Leichen eine Umwandlung vieler Theile in eine fettige Substanz, Adipocire, Fettwachs. Gay-lussac und Chevreul halten diess für das schon im frischen Zustande in den organischen Theilen enthaltene Fett, was übrig bleibt, wenn die übrigen Substanzen zerstört werden. Denn nach diesen beiden Chemikern soll die Menge des in frischen Thiertheilen chemisch darstellbaren Fettes nicht geringer seyn, als sich durch Fäulniss derselben Theile in Wasser ergiebt. Berzelius dagegen glaubt, dass eine wirkliche Umwandlung von Faserstoff, Eiweiss und Färbstoff des Blutes in Fettwachs stattfinde. S. Weber a. a. O.

Die Hauptverschiedenheiten in der Zusammensetzung der organischen Materie scheinen von dem Verhältnisse der Mischungsgewichte der Elemente Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff abzuhängen. Von diesen gilt es hauptsächlich, dass die organischen Verbindungen ternäre und quaternäre, aber keine binären Verbindungen sind. In welchem Zustande aber die sparsam vorkommenden mineralischen Elemente in den organischen Verbindungen sind, ob ebenfalls zu quaternären und mehrfachen Verbindungen verwandt, oder als beigemengte binäre Verbindungen, ist eine andere sehr wichtige und jetzt unauflösbare Frage. Von der wässerigen Auflösung von Färbestoff des Blutes und anderen thierischen aufgelösten Substanzen kann man nach Engelhart die mineralischen Bestandtheile trennen, indem man Chlorgas durch die Auflösung leitet, worauf die thierische Materie frei von erdigen und metallischen Bestandtheilen zu Boden sinkt, ohne dass die Combination von Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff in der organischen Materie aufgehoben wird. Berzelius lässt es unsicher, in welcher Form Schwefel und Phosphor in den Thieren enthalten sind, ob im elementaren Zustande zu quaternären und mehrfachen Verbindungen verwandt, oder mit ternären und quaternären Verbindungen binär verbunden, oder ob jeder dieser

Digitized by Google

Stoffe in einer binären Verbindung wieder mit andern verbunden ist. Bei Verbrennung des Hirnfettes erhielt Vauquelin eine nicht einäscherbare Kohle, die so viel Phosphorsäure enthielt, dass diese den zur Verbrennung nöthigen Zutritt der Luft verhinderte. Nach Ausziehung der Phosphorsäure mit Wasser brannte die Kohle wieder bis zu einem gewissen Grade, und hörte dann wieder auf, worauf sie sauer geworden. Aus diesem Umstande, sagt Berzelius, sieht man, dass die Kohle den Phosphor in einer nicht flüchtigen Verbindung, und auf eine in der unorganischen Natur bis jetzt noch unbekannte Weise enthalte. *Thierchemie.* 16. Auch ist es nach Berzelius einigermassen wahrscheinlich, dass das Eisen im Blute regulinisch und nicht als Oxyd enthalten ist. Denn nach Engelhart's Entdeckung wird dem aufgelösten Blutroth und anderen thierischen aufgelösten Substanzen durch Chlorgas oder Chlorwasser alles Eisen, Calcium, Magnium und Phosphor entzogen, und diese Substanzen bleiben in dem durch Chlor bewirkten Zustande aufgelöst, während die von allen erdigen und metallischen Theilen befreite thierische Substanz mit Salzsäure verbunden zu Boden fällt. Nun hat aber Chlor keine Verwandtschaft zu Oxyden, wohl aber eine sehr grosse zu regulinischen Metallen; ferner wird Eisen von mineralischen Säuren nicht aus dem Blute ausgezogen, da sie doch eine grosse Verwandtschaft zu Metalloxyden, aber keine zu regulinischen Metallen haben. Hiernach hielt es Berzelius für wahrscheinlicher, dass das Eisen im Blute im regulinischen Zustande und nicht als Oxyd enthalten ist. Indessen haben Versuche von Heinr. Rose die Sache wieder zweifelhaft gemacht. Derselbe hat nämlich entdeckt, dass ein grosser Theil nicht flüchtiger organischer Stoffe, wie Zucker, Stärke, Gummi, Milchzucker, Leim, die Eigenschaft haben, dass bei Vermischung ihrer wässerigen Auflösung mit einer kleinen Menge eines Eisenoxydsalzes, das Eisenoxyd bei Zusatz eines Alkalis nicht niedergeschlagen wird, dass auch Blutwasser und verdünntes Eiweiss mit einem Eisenoxydsalze und kaustischem Ammoniak versetzt, kein Eisenoxyd niederschlagen. Diese Versuche liessen wiederum vermuthen, dass das Eisen in dem Färbestoffe des Blutes in einer analogen Verbindung von Eisenoxyd mit dem eigentlichen Thierstoff enthalten sey. Gleichwohl glaubt Berzelius das Letztere nicht. Seine Versuche machen es nämlich wahrscheinlich, dass die Art Verbindung, welche bei Rose's Versuchen das Eisenoxyd im Färbestoffe oder Eiweiss aufgelöst erhält, nicht die sey, durch welche der Färbestoff des Blutes eisenhaltig ist, weil diese sonst durch Einwirkung von Säuren, wie in Berzelius vergleichenden Versuchen, ihren Eisengehalt verlieren müsste. Berzelius *Thierchemie.* p. 61. Dass es anderseits im thierischen Körper nicht blosse Verbindungen von thierischen Materien mit mineralischen Elementen, sondern auch entweder beigemengte, oder gebundene binäre Verbindungen giebt, wie die Oxyde, Salze, wird aus vielen Thatsachen wahrscheinlich. Hierher gehört 1. die Erscheinung mikroskopischer kleiner Salzkrystalle in bloss ausgetrockneten thierischen Säften. 2. Die Leichtigkeit, womit der Gehalt der Pflanzen an mineralischen Stoffen nach ihrem Standorte wechselt, was,

Digitized by Google

wenn die mineralischen Elemente nur als Elemente in die Bildung der thierischen Materie eingingen, nicht der Fall seyn könnte. 3. Die Leichtigkeit, womit die dem Blute zufällig beigemischten Salze im Harne wieder sich absetzen. 4. Kochsalz lässt sich, wie Autenrieth bemerkt, aus dem festen thierischen Stoffe auswaschen. *Physiol.* 1. 29. 5. Der Zustand der phosphorsauren Kalkerde in den Knochen. Denn es ist, wie E. H. Weber zeigt, gewiss, dass der phosphorsaure Kalk nicht als Phosphor, Sauerstoff und Calcium in den Knochen enthalten ist, sondern dass der phosphorsaure Kalk als binäre Verbindung wieder mit dem Knorpel der Knochen verbunden, oder vielleicht nur beigemengt ist. Diess beweist die Färberröthe, Rubia tinctorum, die eine grosse Verwandtschaft zum phosphorsauren Kalk, aber nicht zur Kalkerde oder zum Calcium hat, und die von den Knochen eines lebenden Thieres, das man mit Färberröthe füttert, aus dem Blute bei der Ernährung angezogen wird. Anderseits zersetzen mehrere Säuren die in den Knochen enthaltenen Kalksalze und ziehen sie aus, ohne die Form des Knorpels zu verwandeln und ihn zu zersetzen. Weber l. c. p. 318. 340.

Sieht man auf die Reste der thierischen Theile, und sieht man ab von dem, was in einzelnen Fällen Educt oder Product der chemischen Analyse seyn kann, so kann man mit E. H. Weber zwei Reihen binärer Verbindungen im thierischen und besonders im menschlichen Körper annehmen, nämlich:

1) binär zusammengesetzte Materien aus mineralischen Bestandtheilen, wie phosphorsaures Natron, phosphorsaurer Kalk, phosphorsaure Magnesia, kohlensaures Natron, kohlensaurer Kalk, salzsaures Kali, salzsaures Natron, Fluorcalcium, Kieselerde, Manganoxyd, Eisenoxyd, Natron;

2) binär zusammengesetzte Materien aus zum Theil organischen, zum Theil unorganischen Bestandtheilen. Hierher wäre das Eiweiss im Blute zu rechnen, wo es eine Verbindung mit Natron bilden soll, Albuminat von Natron. Auch die milchsauren Salze, milchsaures Kali, Natron wären hierher zu rechnen.

Wir gehen nun zur Betrachtung der einfachsten Formen über, in welchen die organische Materie erscheint. Sie sind folgende:

1) die organische Materie ist in vielen Säften in einem vollkommen aufgelösten Zustande; sie zeigt bei mikroskopischen Untersuchungen keine sichtbaren Molecule. So enthält das Blutwasser Thierstoff im aufgelösten Zustande, der sich erst durch die Wirkung der galvanischen Säule, oder durch Erhitzung und andere chemische Einflüsse zu Kügelchen bildet. In demselben Zustande befindet sich ein Theil der thierischen Materie in der Lymphe der Lymphgefässe.

2) Die lebenden festen Theile befinden sich in einem nur den organischen Wesen eigenen Zustande der Aufweichung. Das Wasser theilt ihnen die Eigenschaft der Ausdehnbarkeit, Biegsamkeit mit, ohne dass man sie nass nennen kann und ohne dass sie andere durch Mittheilung dieses Wassers benetzen können. Diess Wasser beträgt nach Berzelius bis $\frac{4}{5}$ ihres Gewichtes. Es scheint ihnen, wie Berzelius bemerkt, nicht durch chemische Verwandt-

Digitized by Google

schaft anzugehören, da es allmählig wegtrocknet und man es in einer starken Presse zwischen Fliesspapier augenblicklich aus ihnen herausdrücken kann. Durch den Verlust des Wassers wird in der thierischen Materie mit Ausnahme einiger der niedersten Thiere und Pflanzen, die beim Erweichen wieder aufleben, die Lebensfähigkeit ganz zerstört. Berzelius *Thierchemie* p. 7. Nach Chevreul kann nur reines Wasser das Phänomen der vollen Aufweichung hervorbringen, obgleich gesalzenes Wasser auch von trockenen thierischen Theilen, so wie Alcohol, Aether, Oel eingesogen werden.

Nasse thierische Theile lassen aber durch ihre unsichtbaren Poren, welche von dem Wasser erfüllt werden, zu, dass Stoffe, die mit ihnen in Berührung kommen, wofern sie im Wasser auflöslich sind, sich in dem Wasser, was die thierischen Theile nass macht, auflöst, oder wofern sie schon aufgelöst waren, weiter vertheilen. Diess gilt auch für gasförmige Flüssigkeiten. Eben so leicht giebt das Wasser der nassen thierischen Theile Aufgelöstes an andere Theile ab, welche davon auflösen können. Die Gesetze der Anziehung der Stoffe bei der Auflösung und Mischung, die Gesetze des Gleichgewichtes der Vertheilung mischbarer Flüssigkeiten haben daher auch in den nassen thierischen Theilen ihre Anwendung. Da eine poröse organische Membran, wenn sie auf beiden Seiten mit Wasser in Berührung steht, durch ihre Poren ein Continuum von Wasser von dem einen zu dem andern Wasser bildet, so können Stoffe, in dem beiderseitigen Wasser aufgelöst, jene Membran bis zum Gleichgewichte der Mischung und Vertheilung allmählig durchdringen. Diess gilt auch für Gase, die mit nassen thierischen Theilen in Berührung stehen. Wir werden in der Folge sehen, dass hierbei, gleichwie bei porösen unorganischen Körpern, ein merkwürdiges Gesetz obwaltet, dass nämlich die dichtere Lösung durch die porösen Körper hindurch mehr von der dünnern Lösung, als diese von jener aufnimmt.

Die organischen Stoffe sind während des Lebens niemals krystallisirt, und die Excretionsstoffe der Thiere, Harnstoff und Harnsäure und einige Fettarten, die fähig zu krystallisiren sind, kommen in den lebenden Theilen nicht krystallisirt vor, obgleich in den Pflanzenzellen zuweilen krystallisirte mineralische Stoffe beobachtet werden. Häufig erscheint der organische Stoff zu rundlichen mikroskopischen Moleculen gebildet. Diese organischen Molecule erscheinen nun theils in den Säften; zu diesen gehören die Blutkörperchen beim Menschen von einem Durchmesser von $\frac{1}{4000}$ — $\frac{1}{3000}$ eines P. Z., die Körnchen des Chylus $\frac{1}{7715}$ P. Z. nach Prevost und Dumas, des Speichels $\frac{1}{3000}$ P. Zoll nach Weber. Die Körnchen des Chylus, der Milch, der Galle sind rund, die des Blutes sind platt, plattrund bei den Säugethieren, plattoval bei den Vögeln, Amphibien, Fischen; die Blutkörnchen enthalten immer einen Kern in einer äussern Schale. Undeutlicher sind die Kügelchen des geronnenen Eiweisses und Faserstoffes. Die Gewebe der organischen und insbesondere thierischen Körper scheinen aber selbst Vielen nur aus einer Aggregation von Moleculen zu Fasern, Blättchen und Häuten zu bestehen. Am deutlichsten

Digitized by Google

erscheinen diese Molecule im Gehirne und in der Substanz des Embryo, z. B. in der Keimhaut des Eies, undeutlicher in den übrigen Geweben, wo es immer zweifelhaft ist, ob die Unebenheiten der Oberfläche durch mikroskopische Täuschung nicht etwa als Kügelchen erscheinen. Der undurchsichtige Theil der Keimhaut des Vogelembryo zeigt z. B. ein Aggregat von ziemlich grossen Kügelchen, die man schon mit einer einfachen Lupe sieht, und diese Kügelchen gleichen ganz den Kügelchen des Dotters selbst. Allein schon die in der Keimhaut sich verbreitenden Gefässe sind nach meinen Beobachtungen aus einer ganz unvergleichlich feinern Materie gebildet, so wie der durchsichtige mittlere Theil der Keimhaut, area pellucida, und der Embryo selbst. Es scheint hier wirklich, dass die Keimhaut durch Anziehung und Aggregation der Dotterkügelchen wächst; allein alle Formationen in der Keimhaut selbst geschehen durch Auflösung und Umwandlung dieser aggregirten Theile in eine so zarte Materie, dass die Elementartheilchen derselben nicht deutlich erkannt werden können, und dass sie jedenfalls unvergleichlich viel kleiner seyn müssen, als die Aggregattheile der Keimhautsubstanz. Nach meinen Beobachtungen beim Frosche sind die Primitivfasern der Muskeln 5—8mal dünner als seine Blutkörperchen, und dünner als die Kerne der Blutkörperchen; die Muskelfasern der Frösche und höheren Thiere unterscheiden sich wenig an Dicke, wohl aber sehr ihre Blutkörperchen. Die Primitivfasern der Nerven sind nach meinen Beobachtungen bei Säugethieren $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}$ so dünn als die Blutkörperchen derselben, und dicker als die Kerne der letztern. Beim Frosch fand ich die Primitivfasern der Nerven $=\frac{1}{5}$ des Durchmessers seiner Blutkörperchen, was hier wieder viel weniger ist, als der Durchmesser der Kerne seiner Blutkörperchen. Ich habe mich nicht überzeugen können, dass die Nervenfasern aus aneinander gereihten Kügelchen bestehen. Sie zeigen allerdings aufeinander folgende geringe Unebenheiten, aber ziemlich unregelmässig. Endlich macht die Entdeckung von Ehrenberg, dass Monaden von $\frac{1}{2000}$ Linie noch zusammengesetzte Organe haben, diese Theorie der Aggregation aus Kügelchen, die selbst grösser seyn sollen als $\frac{1}{2000}$ Linie, im höchsten Grade unwahrscheinlich. Die Zusammensetzung der Gewebe aus Moleculen ist wegen der Unsicherheit, Unebenheiten von Kügelchen mikroskopisch zu unterscheiden, jetzt noch immer eine gewagte Hypothese. Jedenfalls sind aber die organischen Molecule nur die kleinsten Formen, in welchen die zusammengesetzte organische Materie erscheint, nicht aber die Atome der organischen Combination.

Wir kennen die Kraft, welche die organischen Körper beseelt, nur an den organischen Körpern. Sie äussert sich nur an den organischen Verbindungen, welche diese erzeugen, und nie entsteht aus freien Stücken aus den Grundelementen, wo sie zufällig zusammenkommen, organische Materie. Fray behauptet zwar, beobachtet zu haben, dass sich mikroskopische oder Infusionsthiere aus reinem Wasser gebildet hätten, und Gruithuisen will in Aufgüssen von Granit, Kreide und Marmor eine gallertartige Haut entstehen gesehen haben, worin sich später Infusorien

Digitized by Google

bildeten. Auch auffallend ist, was Retzius (Froriep's *Notizen* 5. p. 56.) beobachtete, dass nämlich in einer Auflösung von salzsaurem Baryt in destillirtem Wasser, die ein halbes Jahr in einer mit einem gläsernen Stöpsel verschlossenen Flasche gestanden hatte, eine eigene Art Conferven sich bildete. Allein es ist bei jenen merkwürdigen Erfahrungen wohl gewiss, dass jene Substanzen oder die Gefässe, oder das Wasser eine auch noch so geringe Menge organischer Materie enthielten, wie denn nach den Beobachtungen von Schultze Staubmolecule von organischen Substanzen hinreichen, um unter günstigen Umständen die Phänomene zu erzeugen, welche man zur generatio aequivoca der Infusorien rechnet. Selbst die Thiere sind nicht einmal im Stande aus blossen Elementen oder aus blossen binären Verbindungen organische Materien zusammenzusetzen. Die Thiere wachsen durch Aufnahme von schon vorher gebildeten organischen Materien von anderen Thieren oder von Pflanzen; sie können nur die Zusammensetzung der organischen Materie erhalten und umändern; die Pflanzen scheinen dagegen nicht allein organische Materie von Thieren und Pflanzen umzuwandeln, sondern auch zugleich aus Elementen und binären Verbindungen der Elemente, wie Kohlensäure und Wasser zu erzeugen, obgleich sie ohne alle organische Materie des Bodens nicht gedeihen. Die Erzeugung der organischen Materien aus binären Verbindungen in den Pflanzen scheint deswegen anzunehmen nöthig, weil ohne diese neue Bildung das Nutriment auf der Erde immer abnehmen würde, da unaufhörlich Pflanzen und Thierkörper durch Verbrennen, Faulen etc. in binäre Verbindungen zersetzt werden.

Die einmal von Pflanzen gebildete oder in Pflanzen und Thieren enthaltene und umgewandelte organische Materie ist wieder lebensfähig, wenn sie von einem lebenden Körper angeeignet und der organischen Kraft desselben unterworfen wird. Auf diese Art kömmt alle organische Substanz, welche auf der Erde verbreitet ist, nur von lebenden organischen Körpern; der Tod oder das Erlöschen der Kraft, welche organische Verbindungen erzeugt und erhält, trifft das Einzelwesen, während die organische Materie, so lange sie nicht in binäre Verbindungen zerfallen ist, Lebensfähigkeit behält.

Die Lebensfähigkeit der organischen Materie besteht darin, dass sie wieder einen lebenden organischen Körper ernähren kann. Gewöhnlich entstehen organische Körper gewisser Art nur cyklisch von organischen Körpern derselben Art, d. h. durch Eier oder Sprossen. Es fragt sich aber, ob die organische Materie bei der Zersetzung eines organischen Körpers nicht auch Organismen anderer Art unter gewissen Einflüssen erzeugt, ob sie nicht allein lebensfähig ist, sondern in modificirter Art fortlebt, ob sie unter gewissen Bedingungen, nämlich unter Einwirkung von atmosphärischer Luft, Wasser, Licht in kleinen mikroskopischen thierischen Wesen, lebenden Infusorien zerfällt, oder unter anderen Bedingungen, in niedersten Pflanzen, Schimmel wieder auflebt. In einem ausgedehnteren Sinne hatten schon die Alten, namentlich Aristoteles die generatio aequivoca, die freiwillige Erzeugung

Digitized by Google

der Thiere angenommen. Es war nämlich eine alte Tradition, dass aus der Fäulniss niedere Thiere, Insecten, Würmer erzeugt werden sollten. Diese Meinung hatte sich in dem naturwissenschaftlichen und medicinischen Aberglauben bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Da schrieb Redi seine *experimenta circa generationem insectorum* und bewies, dass alle Beispiele, welche die Alten von generatio aequivoca aufgeführt hatten, falsch seyen, dass alle diese Würmer, Insecten aus Eiern entstehen, die vorher von Thieren an die Orte gelegt worden. Diese Beweise waren überzeugend, und kein unterrichteter Naturforscher glaubte fortan mehr an die Fabel von der Erzeugung durch Fäulniss, so dass der Satz: *omne vivum ex ovo* unangetastet blieb. Später aber trat Needham auf und zeigte, dass zwar durch Fäulniss keine Insecten, aber doch kleine mikroskopische, bisher ungekannte Thierchen, Infusorien, entstehen. Uebergiesst man thierische oder pflanzliche Substanzen mit Wasser und setzt sie der atmosphärischen Luft und dem Lichte aus, so zeigen sich bei gewöhnlicher Temperatur der mildern Jahreszeit nach einigen Tagen, während sich die organische Materie allmählig zum Theil zersetzt, zum Theil umwandelt, zum Theil in Kügelchen, zum Theil ganz auflöst, entweder Schimmel oder jene mikroskopischen Thierchen, bei welchen Ehrenberg jetzt die glänzende Entdeckung gemacht hat, dass sie eine viel zusammengesetztere Organisation haben, als Jemand vorher geahnet hatte.

Die ersten Beobachtungen über die Entstehung der Infusorien sind von Needham (*nouv. observ. microscop.*) mitgetheilt, später haben Wrisberg, O. Fr. Mueller, Ingenhouss, G. R. Treviranus, Gruithuisen, Schultze um die Kenntniss dieses Gegenstandes sich Verdienste erworben. Nach Wrisberg's (*observ. de animalc. infus.*) Beobachtungen erzeugen sich ohne den Einfluss der Luft aus infundirten organischen Substanzen keine Infusorien, wie z. B. wenn die Infusion mit Olivenöl bedeckt wurde. Dagegen sind alle dem Wasser beigemischten vegetabilischen oder animalischen Substanzen zur Erzeugung der Infusorien geeignet, wenn sie nur keine saure oder scharfe Eigenschaft haben und nichts enthalten, was die Fäulniss hindert. Die Entwickelung der Infusorien erfolgt, nachdem die organische Materie einen gewissen Grad von Zersetzung unter Entwickelung von Luftblasen erlitten hat. Gleichzeitig mit dieser Entwickelung und später zeigt die Infusion eine grosse Menge mikroskopischer Molecule, die bald zerstreut liegen, bald eine Art von Membran an der Oberfläche der Infusion bilden und aus der Zertheilung der organischen Materien entstehen. Nach Fray und Burdach sollten sich Infusionsthiere auch in Wasserstoffgas und Stickgas in der Infusion erzeugen. Die *generatio aequivoca* der Infusionsthiere wurde von mehreren Naturforschern, besonders aber von Spallanzani (*physical. und mathem. Abhandl.*) angegriffen, welcher die Entstehung der Infusionsthiere als eine durch Wärme, Wasser, atmosphärische Luft und Licht bedingte Entwickelung von zufällig beigemischten Eiern jener Thierchen erklärt. Indessen lehren Spallanzani's eigene Versuche, dass gekochte organische Substanzen eben so tauglich als

Digitized by Google

ungekochte zur Erzeugung der Infusorien sind, so wie denn auch destillirtes Wasser gleich dienlich zur Infusion ist. Sonst beweisen Spallanzani's Versuche nur, dass die atmosphärische Luft zur Entwickelung der Infusorien nöthig ist, und dass sich in hermetisch verschlossenen, mit Infusionen gefüllten Flaschen, die eine Stunde lang in einem Gefässe mit Wasser der Siedhitze ausgesetzt worden, keine Infusorien zur Zeit der spätern Untersuchung der Flaschen gebildet hatten. Spallanzani fand auch die Structur der Infusionsthiere verschieden nach der Verschiedenheit der Infusion. Versuche mit Samen von Wassermelonen, Kürbissen, Hanf und Hirse zeigten, dass die Zahl der Infusorien grösser ist von dem wachsenden Keime, als von dem erst keimenden Samen und mit dem Verderben des Samens abnimmt. Auf kleine Gattungen sollten grössere folgen, bis die Entwickelungsfähigkeit nach einer gewissen Zeit verloren schien. Die Infusionsthiere von unbeschädigtem Samen sollten grösser gewesen seyn, als die von zerriebenem Samen. Aus Kornmehl erzeugten sich eben sowohl Infusorien als aus bloss zerdrücktem Samen. Wurde aber die Stärke des Mehls (amylum) von dem Kleber (gluten) abgesondert und die Substanzen besonders infundirt, so erschienen in der Infusion von Stärke weniger oder gar keine Thiere, dagegen in der andern Infusion ein Heer von belebten Wesen. Dagegen zeigten sich in Infusionen von Gerste, türkischem Weizen, Bohnen, Wolfsbohnen, Reis und Leinsamen gar keine Thierchen. Treviranus *Biologie II.* p. 279—280. Da indess die Gattungen und Arten der Infusorien eben so bestimmt sind, wie in den höheren Thierklassen, und Spallanzani die Unterschiede der Form seiner Infusorien nicht bestimmt hat, da wir ferner die Entwickelungsstufen einer und derselben Species von Infusorien noch nicht kennen, so verlieren Spallanzani's Versuche viel von ihrem Gewichte, wenn er in Infusionen von Kürbissamen, Chamillensamen, Sauerampfersamen, Korn, Spelz ganz verschiedene Thierchen entdeckt haben will. Treviranus hat durch seine zahlreichen, mit mehr Critik angestellten Beobachtungen der Hypothese von der *generatio aequivoca* ein viel grösseres Gewicht gegeben. Seine Gründe stützen sich auf folgende Umstände:

1) Verschiedene organische Substanzen mit einerlei Wasser infundirt, erzeugen verschiedene Infusionsthiere, wie z. B. Kressensamen und Roggensamen.

2) Der Einfluss des Lichtes hat auf die Beschaffenheit der *generatio aequivoca* den grössten Einfluss. So erzeugt sich die nach Priestley genannte grüne Materie, welche sich durch ihre Eigenschaft, Sauerstoffgas auszuhauchen, auszeichnet, nur unter dem Einflusse des Lichtes, wenn Wasser, besonders Brunnenwasser, offen oder in verschlossenen, aber durchsichtigen Gefässen der Sonne ausgesetzt wird, und zwar als eine aus runden oder elliptischen Körnchen bestehende grünliche Kruste, worin man anfänglich feine Bewegungen einzelner Molecule, und später sich unregelmässig bewegende durchsichtige Fäden entdeckt. Diese Veränderungen hat Ingenhouss (*Vermischte Schriften phys. medic. Inhalts*) am längsten beobachtet. (Nach R. Wagner besteht die

Digitized by Google

Priestleysche grüne Materie aus abgestorbenen Leibern grüner Thierchen *Euglena viridis* und anderer Infusorien. Dann wären jene beweglichen Fäden wohl eigene von der übrigen grünen Materie verschiedene Wesen, und Ingenhouss hätte unrichtiger Weise verschiedene Arten einfacher Wesen als Umwandlungen derselben Molecule angesehen.)

3) Auch die Eingeweidewürmer und die in dem Samen der Thiere, selbst der wirbellosen, beobachteten mikroskopischen Thierchen, die Samenthierchen, geschwänzte Körperchen mit thierischen Bewegungen, scheinen für die freiwillige Entstehung lebender Wesen in organischer Materie zu sprechen.

4) In Treviranus Versuchen zeigten sich unter sonst gleichen Umständen in verschiedenen Infusionen verschiedene Wesen, nämlich Infusionsthiere oder Schimmel, und die Ursache dieser Verschiedenheit lag nicht in dem Wasser, sondern an den infundirten Substanzen.

5) Treviranus beobachtete, dass in verschiedenen Hälften einer und derselben Infusion sich unter verschiedenen zufälligen Bedingungen verschiedene Infusionsthiere erzeugten, nämlich aus dem Aufgusse von Irisblättern mit frischem Brunnenwasser entwickelten sich in einem längern, mit Leinwand bedeckten, der Sonne ausgesetzten Gefässe Infusionsthiere, in einem zweiten Gefässe bei einem andern Standorte grüne Materie. So zeigten sich in derselben Infusion von Roggenkörnern mit Brunnenwasser die Producte verschieden, wenn Treviranus in eine der Infusionen eine Eisenstange gelegt hatte. Hiermit scheint übereinzustimmen, dass Gleditsch auf verschiedenen, mit Mousselin bedeckten Melonenstücken bei einem verschieden hohen Standorte ein ungleiches Verhältniss der erzeugten Gebilde, Schimmel, Byssus, Tremellen fand. Man könnte hierzu noch hinzusetzen, dass Gruithuisen in Infusionen von Eiter und Schleim ganz verschiedene Infusionsthierchen gefunden haben will. Aus allen diesen Gründen hat G. R. Treviranus die Schlussfolgen gezogen: dass in der ganzen Natur eine stets wirksame, absolut indecomponible und unzerstörbare (?) Materie vorhanden ist, wodurch alles Lebende von dem Byssus bis zur Palme, und von dem punktähnlichen Infusionsthiere bis zu den Meerungeheuern Leben besitzt, und welche, unveränderlich ihrem Wesen, doch veränderlich ihrer Gestalt nach, unaufhörlich ihre Formen wechselt, dass diese Materie an sich formlos und jeder Form des Lebens fähig ist, dass sie nur durch den Einfluss äusserer Ursachen eine bestimmte Gestalt erhält, nur bei der fortdauernden Einwirkung jener Ursachen in dieser verharrt, und eine andere Form annimmt, sobald andere Kräfte auf sie wirken. Nach Wrisberg und Andern erzeugen sich die Infusorien aus den sich ablösenden Partikeln der infundirten Substanz selbst, welche sich allmählig zu bewegen anfangen; nach Gruithuisen erscheinen sie dagegen erst, wenn der Extractivstoff des infundirten Körpers von Wasser extrahirt worden, in diesem. Schultze sagt: Nie habe ich in einem Aufgusse von Blut, Milch oder Hirnsubstanz, ein Blutkügelchen, Milchkügelchen oder Markkügelchen sich als Monade fortbewegen oder in eine

Digitized by Google

solche verwandeln gesehen. Jedes einzelne dieser Kügelchen giebt durch sein Zerfliessen zum Entstehen von mehreren hundert Monaden den Stoff. Diess Letztere widerspricht indess der Micrometrie; denn nach Ehrenberg hat die kleinste sichtbare Monade $\frac{1}{2000}$ P. Linie im Durchmesser, diess ist $\frac{1}{24000}$ Zoll. Die Blutkügelchen des Menschen betragen aber $\frac{1}{4000} - \frac{1}{5000}$ Zoll im Durchmesser, die Milchkügelchen noch weniger. Schultze will die Entstehung von Infusorien aus organischen Staubtheilchen beobachtet haben, die sich in Wasser in einigen Stunden mit einem trüben Ringe umgeben, der sich bis zum Zerfliessen des Staubtheilchens ausbreitet. Dieser Ring löse sich in Monaden auf. Treviranus *Biologie II. p.* 264—406. Gruithuisen *Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie. München* 1812. 8. Burdach *Physiologie. T.* 1. C. A. S. Schultze *mikroskopische Untersuchungen über* R. Browns *Entdeckung lebender Theilchen in allen Körpern, und über Erzeugung der Monaden. Carlsruhe* 1824.

Wir gehen nun zur Critik der vorhergehenden Beobachtungen über. Die Art, wie Versuche über *generatio aequivoca* angestellt werden können, lässt keine Gewissheit über nicht statt gefundene Täuschung zu.

1) Diejenigen, welche mit ausgekochter organischer Substanz an der atmosphärischen Luft experimentirt haben, können nicht beweisen, dass die erzeugten Infusorien oder Schimmel nicht von dem mit der atmosphärischen Luft zugeführten Staube vertrockneter Infusorien oder ihrer Keime herrühren. Vielleicht dass, wie Alexander von Humboldt in seinen Ansichten der Natur deutet, die Winde die Keime der einfachsten organischen Wesen aus den trocknenden Gewässern emporheben und diese im Staube von dem belebenden Wasser aufgenommen, wieder aufleben, wie das Wiederaufleben von dem Räderthierchen, nach Spallanzani's bestätigten Versuchen, thatsächlich bekannt ist. Dass der überall in der Luft umherfliegende Staub kleine organische, im Wasser aufquellende Theilchen enthält, hat neuerlichst Schultze zur Erklärung der Infusorien benutzt; er hält diese gerade für eingetrocknet gewesene Infusorien (Monaden), die durch Benetzung von Neuem belebt werden. Indessen hält Schultze diese sehr häufige Quelle der Infusorienbildung nicht für die einzige und giebt die Umwandlung der organischen Substanzen in Protozoen zu.

2) Diejenigen, welche mit ausgekochtem organischen Stoff experimentirt und gemeines Wasser zur Infusion benutzt haben, können eben so wenig die neue Bildung der Infusorien beweisen, denn das Wasser kann diese als Eier oder wirkliche Infusorien selbst enthalten haben, die sich schnell auf Kosten der infundirten organischen Substanz vermehren. Die Anwendung eines ganz reinen destillirten Wassers ist fast in keinem Fall vorauszusetzen, da selbst fünfmal destillirtes Wasser noch organische Theilchen enthalten kann.

3) Diejenigen, welche mit frischen organischen Substanzen und destillirtem Wasser oder gar künstlich bereiteten Luftarten experimentirt haben, können nicht beweisen, dass nicht etwa die Eier der Infusorien oder diese selbst in der organischen Substanz

Digitized by Google

enthalten waren; mikroskopische Thierchen kennt man in lebenden Theilen zwar wenige, und die gewöhnlichen Kügelchen organischer Flüssigkeiten, wie des Blutes, sind jedenfalls nicht individuell belebt; allein der Schleim enthält bereits mikroskopische Thierchen, der Darmschleim des Frosches wie der Same enthalten mikroskopische Thierchen; in den Muscheln hat von Baer an verschiedenen Stellen mikroskopische sich bewegende Theilchen gesehen. Siehe *Nov. act. nat. cur.* 13. 2. p. 594. Die Samen des Weizens und einiger *Agrostis* enthalten oft *Vibrionen*, die selbst getrocknet bei der Befeuchtung aufleben. Einige Thierchen, die in anderen Thieren vorkommen, leben auch im Wasser fort, besonders aber solche, die auf anderen Thieren leben, Epizoen.

4) Endlich, wenn auch einige Beobachter mit ausgekochten organischen Substanzen, mit destillirtem Wasser, mit künstlich bereiteter Luft zugleich experimentirt haben sollten, so ist doch die zu einem entscheidenden Resultate nöthige Genauigkeit hier weder wahrscheinlich vorauszusetzen, noch überhaupt möglich, da jedes zum Wechseln von Wasser benutzte Instrument in einer absoluten Reinheit von allem Anflug organischer Theilchen hätte seyn müssen, und jede Reinigung wieder eine Gelegenheit zu Irrthümern giebt.

Diese Bemerkungen widerlegen die *generatio aequivoca* nicht, sondern zeigen bloss, dass ein entschiedener Beweis derselben durch directe Beobachtung nicht wohl möglich ist. Nun hat aber Ehrenberg durch genaue Untersuchungen der Organisation der Thiere und Pflanzen, welche durch *generatio aequivoca* entstehen sollen, diese letztere wirklich ziemlich unwahrscheinlich gemacht. Ehrenberg hat erstens das wirkliche Keimen der Pilz- und Schimmelsamen entdeckt. *Nova act. nat. cur. T. X.* Vergl. Nees v. Esenbeck *Flora.* 1826. *p.* 531. Schilling. in Kastner's *Archiv. X. p.* 429. Hierdurch wurde die Fortpflanzung der Schimmel und Pilze festgestellt, es wurde gezeigt, wie man durch Schimmelsamen neue Schimmel bewirken kann, und es wurde wahrscheinlich, dass in den Fällen unerwarteter Entstehung von Schimmel auch durch Wasser oder Atmosphäre verbreiteter Schimmelsame nur den zur Entwickelung nöthigen Boden gefunden hat. Was nun die Infusions-Thiere betrifft, so hat Ehrenberg für's Erste den zusammengesetzten Bau dieser Thiere entdeckt, so dass selbst die kleinsten *Monas* von $\frac{1}{2000}$ Linie Durchmesser noch einen zusammengesetzten Magen haben, dass sie Bewegungsorgane in Wimpern besitzen. Bei anderen beobachtete Ehrenberg die Eier, die Fortpflanzung durch Eier. Diess erregte den grössten Zweifel gegen die Richtigkeit früherer Beobachtungen, wo man ohne den zusammengesetzten Bau dieser Thiere zu kennen, das unmittelbare Entstehen derselben aus Theilchen der infundirten Substanz gesehen haben wollte. Ehrenberg hat es nie in der Gewalt gehabt, bestimmte Formen von Infusorien durch bestimmte Infusionen zu erlangen; auch zeigen sich bald diese, bald jene Infusorienformen bei der gleichartigsten Behandlung. Vielmehr giebt es nach Ehrenberg gewisse, aber doch nur eine bestimmte Anzahl am meisten verbreiteter Formen, deren Eier oder Individuen in allen Gewässern

Digitized by Google

selbst in einigen, vielleicht aber nur schadhaften Pflanzentheilen vorhanden seyn mögen, und von denen sich dann bald die einen, bald die anderen, je nachdem Eier oder Individuen davon im Wasser waren oder hineingebracht wurden, stark vermehren. Die Vermehrung dieser Thiere scheint ausserordentlich schnell. Ein Räderthierchen, *Hydatina senta*, das über 18 Tage beobachtet wurde und länger lebt, ist in 24—30 Stunden einer vierfachen Vermehrung fähig. Diese Vermehrung giebt in 10 Tagen schon 1 Million Individuen, woraus sich die ausserordentliche Häufigkeit der Infusorien in einem Tropfen einer Infusion einigermassen erklären liesse. Im Thau und Regen hat Ehrenberg nie Infusorien bemerkt; sonst fand Ehrenberg einige Infusorien in Afrika und Asien, gleichwie in Europa, im Meerwasser wie im Flusswasser, in den Tiefen der Erde wie auf der Oberfläche. Aber die Entwickelung dieser Thiere scheint formenreich, und man kann leicht verschiedene Arten dieser Thiere zu sehen glauben, während man nur die Entwickelungszustände beobachtet. Aus allen diesen Beobachtungen schliesst Ehrenberg, dass alle Infusorien, gleich den übrigen Thieren, von Eiern entstehen, *omne vivum ex ovo*, und lässt es ungewiss, ob die Eier zum Theil wirklich das Product der *generatio primitiva* sind. Siehe Ehrenberg in Poggendorf's *Annalen* 1832. 1. Vergl. R. Wagner *Isis* 1832. 383. Den von mehreren Männern beschriebenen Uebergang von Infusorien in Priestleysche Materie hält Wagner für ausgemacht; diese Materie ist aber nichts anders als der Rest von abgestorbenen Infusorien, *Euglena viridis*. Dagegen bezweifelt Wagner wohl mit Recht die von Mehreren beschriebenen Uebergänge der Priestleyschen Materie in Conferven, Ulven, Tremellen oder gar Laubmoose. Die primitive Umbildung von noch unorganisirtem Thierstoff zu gewissen Thieren lässt sich jetzt noch am meisten bei den Eingeweidewürmern vertheidigen. Eine ganze Reihe von Gründen für die *generatio aequivoca* beruht auf der Unmöglichkeit, die erste Entstehung der Eingeweidewürmer ohne freiwillige Zeugung zu erklären. 1. Die ungeheure Mehrzahl der Eingeweidewürmer sind in der Organisation ganz von allen Geschöpfen verschieden, die ausser dem thierischen Körper vorkommen. Die Aehnlichkeit einiger *Distoma* mit den Planarien des süssen und salzigen Wassers ist nur scheinbar. 2. Die wenigsten Eingeweidewürmer kommen in verschiedenen Gattungen von Thieren vor. So sind die Bandwürmer des Menschen nur diesem eigen, dagegen die Leberegel, *Distoma hepaticum*, dem Menschen, Hasen, Rindvieh, Cameel, Hirsch, Pferd, Schwein; der Spuhlwurm, *Ascaris lumbricoides*, dem Menschen, Schweine, Ochsen, Pferd gemein scheinen. Die mehrsten Thiere haben ihre eigenthümlichen specifisch verschiedenen Eingeweidewürmer. 3. Viele Eingeweidewürmer sind in ihrem Vorkommen auf gewisse Organe beschränkt. 4. Die Eingeweidewürmer sterben in der Regel ausser dem lebenden thierischen Körper. 5. Man hat diese Würmer schon in Embryonen beobachtet. 6. Dass eine Uebertragung von Eingeweidewürmern oder ihren Keimen durch die Nahrung nicht stattfinde, beweisen die bloss von Pflanzen lebenden Thiere, die gleichwohl

Digitized by Google

ihre eigenen Eingeweidewürmer haben. Nur in sehr wenigen Fällen kann dieser Uebergang bei fleischfressenden Thieren angenommen werden, wie denn der *Echinorhynchus* der Feldmaus zuweilen beim Falken, Würmer der Frösche zuweilen bei Schlangen, die *Ligula* der Fische, der *Bothriocephalus solidus* des Stichlings auch im Darmkanal der Sumpf- und Schwimmvögel gefunden worden sind. Allein viele andere Würmer kommen ausser dem Darmkanale und den Wegen der Uebertragung vor. Siehe Bremer *über lebende Würmer im lebenden Menschen. Wien* 1819.

Ehrenberg sucht die *generatio aequivoca* der Eingeweidewürmer zu entkräften, indem er sich zu der alten Meinung hinneigt, wonach die Eier der Eingeweidewürmer durch die Saftcirculation der Thiere in alle Theile des Körpers getrieben würden. Er nimmt an, dass, weil die Genitalien der Eingeweidewürmer eine grosse Menge Eier enthalten, diese auch durch die Circulation im ganzen Körper eines Thieres verführt werden, und nur unter glücklichen Umständen an den zu ihrer Entwickelung nöthigen Boden abgesetzt werden und auskommen, so dass alle Säfte eines Thieres gleichsam von Eiern solcher Eingeweidewürmer inficirt sind, die das Thier in einzelnen Organen hat. Die Milch, wovon sich andere Individuen derselben Art nähren, kann die Eier dieser Würmer schon enthalten. Der Embryo der Säugethiere, in dem man schon Eingeweidewürmer fand, kann die Eier von den Säften der Mutter haben. Man hat Eingeweidewürmer in gelegten Eiern gefunden. Eschholz fand welche in Hühnereiern. Burdach *Physiol. I. p.* 22. Sie können anfänglich von den Säften der Mutter dahin gelangt seyn; allein in der That, die Widerlegung der *generatio aequivoca* begiebt sich hier in eben so grosse Unwahrscheinlichkeiten als die Annahme derselben. Die Eier der Eingeweidewürmer sind offenbar zu gross, um aus den Organen, wo die Würmer leben, in die Lymphgefässe zu gelangen, sie sind viel zu gross, um in Capillargefässen des Blutes von 0,00025 Zoll Durchmesser zu circuliren und endlich gar in die Absonderungsproducte, z. B. die Milch, den Dotter, zu gelangen; also die Erklärung des Vorkommens der Eingeweidewürmer durch Uebergang von Mutter auf Kind, z. B. bei pflanzenfressenden Säugethieren, widerspricht gar sehr den erfahrungsmässigen Daten der Mikrometrie, wenn man nicht annehmen will, auch die kleinsten Theile von Keimstoff der Eingeweidewürmer, wie er von vorhandenen Würmern gebildet worden, seyen eben so fähig zur Fortpflanzung als ein ganzes Ei. Von den Samenthierchen nimmt Ehrenberg an, dass sie jedem animalischen Wesen bei der Zeugung eingeimpft werden.

Directe Versuche über *generatio aequivoca* sind bei dem jetzigen Zustande der Wissenschaft ungemein schwer. Diejenigen, welche in neuester Zeit angestellt sind, sind der Lehre von der freiwilligen Erzeugung nicht eben günstig. Fr. Ferd. Schultze beobachtete, dass atmosphärische Luft, die durch Schwefelsäure durchgeleitet ist, keine Entwickelung von Infusorien in ausgekochten Flüssigkeiten zulässt. Schwann machte die Erfahrung, dass in gekochten Flüssigkeiten, die nur mit ausgeglühter, aber an

Digitized by Google

Sauerstoff noch reicher und häufig erneuerter Luft in Berührung sind, keine Infusorien- oder Schimmelbildung und keine Fäulniss vor sich geht.

v. Baer's Beobachtungen (*Nov. act. nat. cur. XIII.* 2.) enthalten übrigens noch manches Räthsel über die Zeugung von Eingeweidewürmern. Die Thierchen, die er *Bucephalus* nennt, erzeugen sich in fadenförmigen Keimstöcken, welche in den Muscheln vorkommen, und Bojanus und Baer haben in *Limnaeus stagnalis* einen Wurm beschrieben, der wieder lauter Thiere einer ganz andern Form, Cerkarien, enthält. Vergl. Siebold über *Monostomum mutabile*, Wiegm. *Archiv.* 1. 45. Carus über *Leurochloridium paradoxum* (*Nov. act. nat. cur. XVII. p.* 1.). v. Nordmann (*mikrogr. Beiträge, Berlin* 1832.) hat Monaden im Körper lebender Eingeweidewürmer, *Diplostomen*, beobachtet, und im Innern von faulenden Eiern von Lernaeen Infusorien entstehen gesehen. Anderseits verdienen wieder die Veränderungen gewisser Eingeweidewürmer Beachtung, z. B. der *Ligula* und des *Bothriocephalus solidus* der Fische, die erst in den Wasservögeln deutliche Genitalien erhalten; die anfängliche Gestalt einiger jungen Distomen, z. B. *Dist. nodulosum* des Barsches, das nach v. Nordmann anfänglich ohne Saugnapf, mit einer Spur von Auge, und mit Wimpern wie zum Schwimmen im Wasser besetzt ist. Die Infusorien und Binnenwürmer der lebenden Pflanzen sind noch zu untersuchen. Wichtig genug, dass die kranken Samen von Agrostis-, Phalaris- und Triticum-Arten nach Steinbuch (*Analecten* 1802.) und Bauer (*Philos. Trans.* 1823.) Vibrionen enthalten, dass Bauer im Stengel der jungen Weizenpflanze die Vibrionen wiederfand, die er dem Samen eingeimpft hatte, und dass nach Steinbuch und Bauer die Würmer der getrockneten Samen mehrere Jahre fähig blieben, im Wasser wieder aufzuleben.

Die Bildung von Infusorien ist keine primitive Zeugung organischer Materie; sie setzt schon die Existenz von organischen Wesen voraus, da nie organischer Stoff von selbst entsteht, sondern nur die lebenden Pflanzen fähig scheinen, aus binären Verbindungen, wie Wasser und Kohlensäure, ternäre organische Verbindungen, organische Materie zu erzeugen, während die Thiere nur von schon gebildeten organischen Materien leben, selbst aber keine aus Elementen, oder binären Verbindungen zu erzeugen vermögen und also die Existenz der Pflanzenwelt zu ihrer Existenz voraussetzen. Wie nun zuerst die organischen Wesen entstanden sind, auf welche Art eine Kraft, die zur Bildung und Erhaltung der organischen Materie durchaus nothwendig ist, aber anderseits sich auch nur an organischen Materien äussert, zur Materie gekommen ist, liegt ausser aller Erfahrung und Wissen. Es lässt sich auch nicht der Knoten zerhauen, indem man behauptet, die organische Kraft wohne von Ewigkeit der Materie bei, als wenn organische Kraft und organische Materie nur verschiedene Betrachtungsweisen desselben Gegenstandes wären; denn in der That sind die organischen Erscheinungen nur einer gewissen Combination der Elemente eigen, und selbst die lebensfähige organische Materie zerfällt in unorganische Verbindungen, sobald die Ur-

Digitized by Google

sache der organischen Erscheinungen, die Lebenskraft, aufhört. Indess die Lösung jenes Problems wäre überhaupt nicht die Aufgabe der empirischen Physiologie, sondern der Philosophie. Da die Ueberzeugung in der Philosophie und in den Naturwissenschaften eine ganz verschiedene Basis hat, so sind wir hier zunächst darauf angewiesen, das Feld einer denkenden Erfahrung nicht zu verlassen. Wir müsten uns also bescheiden, zu wissen, dass die Kräfte, welche die organischen Körper lebend machen, eigenthümlich sind, und dann die Eigenschaften derselben näher untersuchen.

II. Vom Organismus und vom Leben.

Die organischen Körper unterscheiden sich nicht bloss von den unorganischen durch die Art ihrer Zusammensetzung aus Elementen, sondern die beständige Thätigkeit, welche in der lebenden organischen Materie wirkt, schafft auch in den Gesetzen eines vernünftigen Plans mit Zweckmässigkeit, indem die Theile zum Zwecke eines Ganzen angeordnet werden, und diess ist gerade, was den Organismus auszeichnet. Kant sagt: die Ursache der Art der Existenz bei jedem Theile eines lebenden Körpers ist im Ganzen enthalten, während bei todten Massen jeder Theil sie in sich selbst trägt.. Durch diesen Charakter begreift man, warum ein blosser Theil des organischen Ganzen meist nicht fortlebt, warum der organische Körper ein Individuum, ein Untheilbares scheint. Insofern nun die Theile ungleichartige Glieder eines Ganzen sind, kann auch der Stamm nach dem Verlust eines das Ganze integrirenden Theiles nicht fortleben. Nur dann, wenn sehr einfache Thiere oder Pflanzen eine gewisse Summe gleichartiger Theile besitzen, oder wenn die zum Ganzen gehörigen ungleichartigen Glieder in jedem Abschnitt des Ganzen sich fortsetzen, kann das Ganze sich theilen, und die getrennten Stücke, welche nun auch noch die ungleichartigen Glieder des Ganzen, aber von geringerer Anzahl enthalten, leben fort. Abgeschnittene Zweige von Pflanzen werden eingepflanzt wieder zu neuen Individuen. Die verschiedenen Theile von Pflanzen sind einander noch so ähnlich, dass sie sich in einander umwandeln können, wie die Zweige in Wurzeln, die Staubfäden in Blumenblätter. Goethe *Metamorphose der Pflanzen.* Hieher gehören auch einige einfache Thiere, wie die Polypen. Stücke eines durchschnittenen Polypen hat man wieder fortwachsen gesehen, wie die Versuche von Trembley, Roesel und Anderen beweisen. Eben so mit einigen Würmern, z. B. Naiden, bei welchen man in verschiedenen Abschnitten des Körpers ungefähr dieselben ungleichartigen, qualitativ verschiedenen Theile, wie des Darmes, der Nerven, der Blutgefässe, sich fortsetzen sieht. Diese Thiere hat man durch Theilung sich fortpflanzen gesehen. Bonnet will sogar ein Wiederfortwachsen und Ergänzen bei den Stücken eines getheilten Regenwurms beobachtet haben. Allein eine solche Trennung dieser Thiere, wobei die getrennten Stücke nicht mehr die qualita-

Digitized by Google

tiven Glieder des Ganzen enthalten, könnte auch keine Fortsetzung des Lebens zulassen. Bei den höheren Thieren und beim Menschen giebt es gewisse Organe, d. h. qualitativ verschiedene Glieder des Ganzen, die ohne Verlust des Lebens, ohne Aufhebung des Begriffs vom Ganzen, nicht entfernt werden können und auch nur einfach vorkommen, wie Gehirn und Rückenmark, Herz, Lungen, Darmkanal etc. Andere Theile dagegen, welche keine unbedingt nothwendigen Glieder im Begriff des Ganzen, oder welche mehrfach vorhanden sind, können entfernt werden, dagegen kann auch kein Theil der höheren Thiere getrennt fortleben, weil keiner die integrirenden qualitativen Glieder des Ganzen enthält. Nur das Ei, der Keim selbst, ist in diesem Zustande, weil die organische Kraft die integrirenden Theile des Ganzen noch nicht gebildet hat, und entwickelt sich getrennt von dem Ganzen zum neuen Ganzen. Im Organismus ist also eine die Zusammensetzung aus ungleichen Gliedern beherrschende Einheit des Ganzen. Aus den eben mitgetheilten Thatsachen sieht man, dass die organischen Körper nicht absolut untheilbar sind, sie sind vielmehr dann immer mit Erhaltung ihrer Kräfte theilbar, wenn die getrennten Stücke noch die qualitativ verschiedenen Glieder des Ganzen in einer gewissen Ausdehnung enthalten, und selbst bei der Zeugung der höchsten Thiere und Pflanzen findet ja eine Theilung statt. Die unorganischen Körper kann man dagegen in einem weit ausgedehntern Sinne theilen, ohne dass die Theile die chemischen Eigenschaften des Ganzen verlieren, man kann sie nach einem gewöhnlichen Ausdruck ins Unendliche theilen, d. h. nach der atomistischen Lehre bis auf die Uratome, welche ihrer Kleinheit wegen den Sinnen entgehen und in chemisch zusammengesetzten Körpern bis auf die aus verschiedenen constituirenden Atomen zusammengesetzten Molecule, welche ebenfalls den Sinnen entgehen. Doch giebt es auch unter den unorganischen Körpern solche, welche nicht bis auf die Urtheilchen theilbar sind, ohne von ihren Eigenschaften zu verlieren; ich meine die Krystalle. Diese sind nur in gewissen Richtungen leicht theilbar, und die Theile, die dadurch gewonnen werden, sind doch schon oft von der Form des Ganzen verschieden, daher Einige auch die Krystalle als Individuen betrachten, welche durch die fortgesetzte Thätigkeit der Kraft bestehen, die sie bildete, und vergehen, wenn die äusseren chemischen (Verwittern) oder mechanischen Einflüsse über ihre Krystallisationskraft, Härte, das Uebergewicht erlangen. Vergl. Mons *Grundriss der Mineralogie. I. Vorrede p.* 6. Allein wenn man auch die Krystalle in diesem Sinne als Individuen betrachten wollte, so ist doch der grosse Unterschied, dass die Molecule der Crystalle gleichartig im ganzen Krystall sind, und dass der Krystall wenigstens in gleichartige Aggregate der Molecule theilbar ist, während die organischen Körper aus ganz verschiedenen Gliedern eines Ganzen, z. B. Geweben mit besonderen Eigenschaften zusammengesetzt sind. Organische Combinationen sind übrigens in den organischen Körpern zur Zeit ihres Lebens in der Regel nicht krystallisirt. Ist ein unorganischer Körper ein Aggregat von verschiedenartigen gemengten

Digitized by Google

Substanzen, so fehlt der Bezug dieser Theile für das Bestehen des Ganzen.

Die Zusammensetzung der organischen Körper aus ungleichartigen Gliedern eines Ganzen nach dem Gesetze der Zweckmässigkeit lässt sogleich auch die Nothwendigkeit eines durchgreifenden Unterschiedes der äussern und innern Gestaltung der organischen Körper und Organe von den unorganischen Körpern einsehen. Wir bewundern in dem ganzen Thiere nicht allein den Ausdruck der waltenden Kräfte, wie die Krystallisation der Erfolg einer gewissen Kraft in einer binären Combination ist, sondern die Gestalt der Thiere und Organe zeigt auch wieder die vernünftig zweckmässige Anordnung für die Ausübung der Kräfte, eine prästabilirte Harmonie der Organisation mit den Fähigkeiten für den Zweck der Ausübung dieser Fähigkeiten des Ganzen, wie jeder Theil, z. B. das Auge, Gehörorgan, zeigt. Die Krystalle dagegen zeigen durchaus keine Zweckmässigkeit der Gestaltung für die Thätigkeit des Ganzen, weil der ganze Krystall nicht ein aus ungleichartigen Geweben zusammengesetztes zweckmässiges Ganze ist, sondern durch Aggregation gleichartiger Elemente oder Bildungstheile entsteht, welche denselben Gesetzen der krystallinischen Aggregation unterworfen sind. Daher wachsen auch die Krystalle durch äussere Aggregation an die zuerst gebildeten Theile, dagegen die verschiedene Organisation neben einander verbundener Theile in dem organischen Körper meist gleichzeitig ist, so dass das Wachsthum der organischen Körper von allen Partikeln der Substanz aus gleichzeitig geschieht, während die Vermehrung der Masse in unorganischen Körpern durch äussere Apposition geschieht. Sehr schöne weitere Vergleichungen zwischen der Organisation und Krystallisation hat E. H. Weber in seiner allgemeinen Anatomie gegeben.

Das Gesetz der organischen Gestaltung, Zweckmässigkeit, beherrscht nicht allein die Bildung ganzer Organe, sondern auch der einfachsten Elementargewebe, wie es sich denn in der Folge zeigen wird, dass die mannigfachen Formen absondernder Drüsengebilde nur auf der verschiedenen Art beruhen, wie eine grosse absondernde Fläche im kleinen Raume realisirt werden kann. Die Faserbildung der Muskeln ist nothwendig, wenn ein Organ in einer gewissen Richtung durch winkelförmige Kräuselung der Fasern kürzer werden soll, und so wird sich auch in der Physik der Nerven zeigen, dass ohne die Zertheilung der Nerven in eine gewisse Summe einfacher, nicht communicirender Primitivfasern örtliche Nervenwirkung, örtliche Empfindung unmöglich wäre. Dieselbe Zweckmässigkeit zeigt sich eben so nothwendig in der Organisation der Pflanzen. Da die Organe der Pflanzen weniger ungleichartig und zahlreich und weniger im Innern verborgen sind, sondern an der Oberfläche sich ausbreiten, und weil die Wechselwirkung mit der Aussenwelt weniger von einzelnen Punkten aus, als von der ganzen Oberfläche geschieht, so zeigt das Allgemeine der Pflanzenbildung eine mit vollkommner Zweckmässigkeit sich vermehrende Oberfläche in den mannigfaltigen Blattbildungen, und die einzelnen Formen der Oberflächenvermehrung

Digitized by Google

sind so reichlich, als sie die lebendigste Phantasie nicht erdenken kann, wie denn ein grosser Theil der Terminologie nur ein Versuch ist, logisch mit der Natur ein gleichlaufendes Schema der möglichen Flächenvermehrung durch Abänderung der Blätter und des Verhältnisses zu Stiel, Zweig, Ast, Stamm zu entwerfen. Das Einzige, was man in den organischen und unorganischen Körpern passend vergleichen kann, ist die Art, wie die Symmetrie in beiden verwirklicht ist. Die Krystalle haben symmetrische und asymmetrische Flächen, Winkel, Ecken. Auch die Thiere haben symmetrische und asymmetrische Theile, und die Gesetze der symmetrischen und asymmetrischen organischen Gestaltung zeigen ähnliche, mannigfaltige Abänderungen. Die Urform des thierischen Keimes ist z. B. eine rundliche platte Scheibe, der Hahnentritt im Vogelei, besser die Keimscheibe, *Blastoderma*, welche im Ei des Eierstocks nach den Untersuchungen von Purkinje und Baer ein Bläschen zu seyn scheint. Scheibenförmig zeigt sich der Keim auch bei Wirbellosen, wie ich bei *Planaria* gesehen. Die Form des Eies und Dotters darf man mit der Form des Keimes nicht verwechseln. Anders sind die ausgebildeten Formen. Wir unterscheiden z. B. einen strahlenförmig symmetrischen Typus in den Radiarien, mit gleichartigen Theilen um einen gemeinsamen Mittelpunkt, wobei das Asymmetrische bloss die Vorder- und Hinterseite der sternförmigen Organisation ist. Wir unterscheiden 2. die Symmetrie gleichartiger Theile auf einem ästigen Typus, wie in den Pflanzen die Blätter und Blüthen das sich wiederholende Symmetrische, die Polypen das Symmetrische auf dem verzweigten Polypenstamm sind. Wir unterscheiden 3. die reihenförmige Symmetrie in der Succession gleichartiger Theile von vorne nach hinten bei den Würmern, wo die asymmetrischen Theile nur Bauch und Rücken sind. 4. Endlich unterscheiden wir die doppelseitige Symmetrie in der bloss seitlichen Wiederholung gleicher Theile bei den höheren Thieren und beim Menschen, wo das Asymmetrische die hinter einander liegenden Organe, und die Asymmetrie von Bauch- und Rückenfläche sind. Bei vielen Thieren ist die seitliche Symmetrie zum Theil mit der successiven Symmetrie von vorne nach hinten verbunden, wie bei den höheren Thieren in den Wirbeln. Abgesehen davon, dass die Symmetrie und Asymmetrie der krystallisirten unorganischen Körper immer in ebenen Flächen und geraden Linien stattfindet, wovon sich das Gegentheil bei den organischen Körpern zeigt, so bleibt immer noch der grosse Unterschied, dass symmetrische und asymmetrische Theile der Krystalle eine einfache Zusammensetzung haben, dass dagegen die Theile, welche sich bei organischen Körpern symmetrisch wiederholen, selbst erst aus ungleichartigen Geweben zusammengesetzt sind. Welche Ursachen übrigens die angeführten verschiedenen Typen der organischen Symmetrie bedingen, und welche Gründe in dem Keime zuerst die Lage der Achsen z. B. für die doppelseitige Symmetrie, das Vorn und Hinten, und die Bauch- und Rückenseite in den höheren Thieren bestimmen, können wir eben so wenig ahnen, als die Ursachen der symmetrischen Krystallbildung. Die Organtheile des Orga-

Digitized by Google

nismus sind übrigens nie krystallinisch, und wenn auch einige Fettarten im reinen Zustande krystallisiren, so gilt diess nur, wenn sie den äusseren Einflüssen unterworfen und der Lebenskraft entzogen sind; eben so mit dem Zucker, dem Harnstoff, der Harnsäure. Die meisten Säfte und organischen Stoffe krystallisiren nicht einmal ausser dem lebenden Organismus. Der Rückgratskanal und die Schädelhöhle der Frösche enthalten um die Centraltheile des Nervensystems eine Lage von breiartiger weisser Materie, die nach Ehrenberg's und Huschke's Entdeckung aus mikroskopischen Krystallen von kohlensaurem Kalke besteht. An der Bauchhaut der Fische und im Silberglanze der Chorioidea der Fische hat Ehrenberg auch mikroskopische Krystalle aus einer organischen Materie entdeckt. Muellen's *Archiv für Anat. und Physiol. p.* 158.

Ich habe bis jetzt bloss die Eigenthümlichkeit der organischen Körper untersucht, dass sie organische Ganze sind, aus ungleichartigen Organen zusammengesetzt, welche den Grund ihrer Existenz in dem Ganzen haben, wie Kant sich ausdrückte. Die organische Kraft des Ganzen, welche die Existenz des Einzelnen bedingt, hat aber auch die Eigenschaft, dass sie die zum Ganzen nothwendigen Organe aus organischer Materie erzeugt. Einige haben geglaubt, das Leben oder die Thätigkeit der organischen Körper sey nur die Folge der Harmonie, des Ineinandergreifens gleichsam der Räder der Maschine, und der Tod sey durch eine Störung dieser Harmonie bedingt. Die Harmonie, dieses Ineinandergreifen findet offenbar statt; denn das Athmen in den Lungen ist die Ursache der Thätigkeit des Herzens, und die Bewegung des Herzens bringt in jedem Augenblick dem Gehirn das durch das Athmen veränderte Blut, wodurch das Gehirn alle übrigen Organe belebt, und wieder die Athembewegungen bedingt. Der äussere Impuls zu diesem Getriebe ist aber die atmosphärische Luft beim Athmen. Jede Verletzung einer dieser Haupttriebfedern in dem Mechanismus des organischen Körpers, jede grössere Verletzung der Lungen, des Herzens, des Gehirnes kann die Ursache des Todes werden, daher man sie die *Atria mortis* genannt hat. Allein diese Harmonie der zum Ganzen nothwendigen Glieder besteht doch nicht ohne den Einfluss einer Kraft, die auch durch das Ganze hindurch wirkt, und nicht von einzelnen Theilen abhangt, und diese Kraft besteht früher, als die harmonischen Glieder des Ganzen vorhanden sind; sie werden bei der Entwikelung des Embryo's von der Kraft des Keimes erst geschaffen. Bei einem zweckmässig zusammengesetzten Mechanismus, z. B. einer Uhr, kann das zweckmässige Ganze eine aus der Zusammenwirkung der einzelnen Theile hervorgehende Thätigkeit zeigen, die von einer Ursache aus in Bewegung gesetzt wird; allein die organischen Wesen bestehen nicht bloss durch eine zufällige Verbindung ihrer Elemente, sondern erzeugen auch die zum Ganzen nothwendigen Organe durch ihre Kräfte aus der organischen Materie. Diese vernünftige Schöpfungskraft äussert sich in jedem Thiere nach strengem Gesetz, wie es die Natur jedes Thieres erfordert; sie ist in dem Keime schon vorhanden, ehe selbst die

Digitized by Google

späteren Theile des Ganzen gesondert vorhanden sind, und sie ist es, welche die Glieder, die zum Begriff des Ganzen gehören, wirklich erzeugt. Der Keim ist das Ganze, *Potentia*, bei der Entwikkelung des Keimes entstehen die integrirenden Theile des Ganzen *actu*. Wir sehen diess Werden des Einzelnen aus dem potentiellen Ganzen vor unseren Augen bei der Beobachtung des bebrüteten Eies. Alle Theile des Eies sind bis auf die Keimscheibe, *Blastoderma*, nur zur Nahrung des Keimes bestimmt; die ganze Kraft des Eies ruht nur in der Keimscheibe, und da äussere Einwirkungen für die Keime der verschiedensten organischen Wesen gleich sind, so muss man die einfache, aus körnigem formlosem Stoffe bestehende Keimscheibe als das *potentielle* Ganze des spätern Thieres betrachten, begabt mit der wesentlichen und specifischen Kraft des spätern Thieres, fähig, das Minimum dieser specifischen Kraft und Materie durch Assimilation der Materie zu vergrössern. Dieser Keim breitet sich zur Keimhaut aus, welche den Dotter umwächst, und die Organe des Thieres entstehen durch Umwandlung des Keimes, indem zuerst die Elemente des Nervensystems, des Darmschlauchs, des Gefässsystems entstehen, und selbst wieder aus den Elementen der organischen Systeme die Details der Organisation sich immer weiter ausbilden, so dass man die erste Spur der Centraltheile des Nervensystems weder für Gehirn, noch für Rückenmark, sondern für das noch potentielle Ganze der Centraltheile des Nervensystems halten muss. Auf gleiche Art entstehen die Theile des Herzens sichtbar aus einem gleichartigen Schlauche, und die erste Spur des Darmschlauches ohne Speicheldrüsen, Leber, ist mehr als Darmschlauch, sondern das potentielle Ganze des Digestionsapparates, weil Leber, Speicheldrüsen, wie Pancreas, wie von Baer zuerst entdeckt hat, aus dem, was man für Rudiment des Darmschlauches hält, wirklich sich durch weitere Vegetation sichtbar entwickeln. Es kann jetzt nicht mehr bezweifelt werden, dass der Keim nicht die blosse Miniatur der späteren Organe ist, wie Bonnet und Haller glaubten, sondern dass der Keim das von der specifischen organischen Kraft beseelte und bloss *potentielle* Ganze ist, welches *actu* sich entwikkelt und die Glieder zur Thätigkeit des Ganzen neben einander erzeugt. Denn der Keim selbst ist nur formlose Materie und die ersten Rudimente der Organe werden nicht durch Vergrösserung erst sichtbar, sondern ihr erstes Erscheinen ist deutlich, und die Rudimente sind sogleich schon ziemlich gross, aber einfach, so dass wir aus der Umgestaltung des einfachen Organes die spätere Zusammensetzung desselben entstehen sehen. Diese Bemerkungen sind heut zu Tage keine Meinungen mehr, sondern *Facta*, und nichts ist deutlicher als die Entstehung der Drüsen aus dem Darmschlauch, die Entstehung des Darms aus dem sich absondernden Theile der Keimhaut. Hätte Ernst Stahl diese Thatsachen gekannt, so würde er noch mehr in seiner berufenen Ansicht gestärkt worden seyn, dass die vernünftige Seele selbst das *primum movens* der Organisation, dass sie selbst der letzte und einzige Grund der organischen Thätigkeit sey, dass die Seele ihren Körper nach den Gesetzen ihrer Wirksamkeit zweckmässig baue und

Digitized by Google

erhalte, und dass durch ihre organische Thätigkeit die Heilung der Krankheiten geschehe. Stahl's Zeitgenossen und Nachfolger haben diesen grossen Mann zum Theil nicht verstanden, wenn sie glaubten, nach seiner Ansicht sollte die Seele, welche vorstellt, mit Bewusstseyn und Absicht, auch die Organisation betreiben. Stahl's Seele ist die nach vernünftigem Gesetz sich äussernde Kraft der Organisation selbst. Allein Stahl ist darin zu weit gegangen, wenn er die mit Bewusstseyn verbundenen Seelenäusserungen in gleichen Rang mit der zweckmässig, aber nach blinder Nothwendigkeit sich äussernden Organisationskraft stellte. Die organisirende Kraft, die nach ewigem Gesetz die zum Bestehen des Ganzen nöthigen Glieder erzeugt und belebt, residirt wohl nicht in einem Organ; sie äussert sich in der Ernährung noch bei der hirnlosen Missgeburt bis zur Geburt; sie verändert das schon vorhandene Nervensystem wie alle übrigen Organe bei der sich verwandelnden Insectenlarve, so dass dann mehrere Knoten des Nervenstranges verschwinden und andere sich vereinigen, sie bewirkt, dass bei der Umwandlung des Frosches das Rückenmark sich verkürzt, in dem Maasse, als der Schwanz seine Organisation verliert und die Nerven der Extremitäten entstehen. Die bewusstlos wirkende zweckmässige Thätigkeit wirkt auch in den Erscheinungen des Instinctes. Cuvier sagt davon sehr schön und verständlich, dass die Thiere beim Instinct gleichsam von einer angebornen Idee, von einem Traum verfolgt werden. Allein dasjenige, was diesen Traum erregt, kann nur die nach vernünftigen Gesetzen wirkende organisirende Kraft, die Endursache eines Geschöpfes selbst seyn. Diese ist vor allen Organen im Keim vorhanden, und scheint daher auch im Erwachsenen an kein Organ gebunden; das Bewusstseyn dagegen, welches keine organischen Producte erzeugt, sondern nur Vorstellungen bildet, ist ein spätes Erzeugniss der Entwickelung selbst und an ein Organ gebunden, von dessen Integrität das Bewusstseyn abhängt, wenn das *primum movens* zweckmässiger Organisation selbst in der hirnlosen Missgeburt noch fortwirkt. In den Pflanzen fehlt das Bewusstseyn mit dem Nervensystem, während die nach dem Urbilde der Pflanzenspecies wirkende Kraft der Organisation vorhanden ist. Man darf daher die organisirende Kraft nicht mit etwas dem Geistesbewusstseyn Analogen, man darf ihre blinde nothwendige Thätigkeit mit keinem Begriffbilden vergleichen. Unsere Begriffe vom organischen Ganzen sind blosse bewusste Vorstellungen. Die organische Kraft dagegen, die Endursache des organischen Wesens, ist eine die Materie zweckmässig verändernde Schöpfungskraft. Organisches Wesen, Organismus, ist die factische Einheit von organischer Schöpfungskraft und organischer Materie. Ob beide jemals getrennt gewesen seyen, ob die schaffenden Urbilder, die ewigen Ideen Platon's, wie er im *Timaeus* deutete, zu irgend einer Zeit zur Materie gelangt sind, und sich von da an in jedem Thiere und jeder Pflanze fortan verjüngen, ist kein Gegenstand des Wissens, sondern der unerweislichen Mythen, Traditionen, die uns die Grenze unseres blossen Bewusstseyns deutlich genug anzeigen. Das Thatsächliche ist, dass jede Thierform, jede Pflan-

Digitized by Google

zenform sich unabänderlich durch ihre Producte erhält, und dass es bei einer ungefähr berechneten Anzahl von so vielen tausend Pflanzen und Thierarten keine wahren Uebergänge von einer Art zur andern, von einer Gattung zur andern giebt; jede Familie der Pflanzen, der Thiere, jede Gattung, jede Art ist an gewisse physische Bedingungen ihrer Existenz auf der Erde, an eine gewisse Temperatur und bestimmte physisch-geographische Verhältnisse gebunden, für welche sie gleichsam erschaffen. In dieser unendlichen Mannigfaltigkeit der Geschöpfe, in dieser Gesetzmässigkeit der natürlichen Klassen, Familien, Gattungen und Arten, äussert sich eine das Leben auf der ganzen Erde bedingende gemeinsame Schöpfungskraft. Aber alle diese Arten des Organismus, alle diese Thiere, die gleichsam eben so viele Arten, die umgebende Welt mit Empfindung und Reaction zu geniessen, sind, sind von dem Zeitpunkte ihrer Schöpfung selbstständig; die Art vergeht mit der Ausrottung der productiven Individuen, die Gattung ist nicht mehr fähig, die Art zu erzeugen, die Familie nicht fähig, die Gattung herzustellen. Thierarten sind im Verlaufe der Erdgeschichte durch Revolutionen der Erdrinde untergegangen und in den Trümmern vergraben; sie gehören theils ausgestorbenen, theils noch lebenden Gattungen an.

Das Studium der aufeinander liegenden Erdschichten, worin die Reste organischer Geschöpfe vorkommen, scheint zu beweisen, dass nicht alle Wesen, welche ihre Reste auf der Erde zurückgelassen, zugleich auf der Erde gelebt haben, dass die einfachen Geschöpfe auch zuerst die Erde bewohnt haben, und die Reste der höheren Thiere und besonders des Menschen kommen nicht in den tieferen Lagern solcher Niederschläge vor, welche organische Reste enthalten. Aber keine Thatsache berechtigt uns zu Vermuthungen über den erstern oder spätern Ursprung der Geschöpfe, keine zeigt uns die Möglichkeit, alle diese Verschiedenheiten durch Umwandlung zu erklären, da alle Geschöpfe die ihnen gegebene Form unabänderlich erhalten.

Die factische Einheit der organisirenden Kraft und der organisirten Materie liesse sich besser begreifen, wenn es sich beweisen liesse, dass die organisirende Kraft und alle Lebenserscheinungen erst die Folge, der Ausdruck, die Eigenschaft einer gewissen Combination der Elemente, die Folge der Mischung seyen. Der Unterschied der belebten und unbelebten organischen Materie bestände dann darin, dass in der letztern der Mischungszustand der Elemente verändert worden. In der That hat Joh. C. Reil den kühnen Versuch einer solchen Darstellung in seiner berühmten Abhandlung über die Lebenskraft, Reil's *Archiv für die Physiologie, I. Bd.*, gemacht, welche Einige, wie Rudolphi, als ein Meisterstück betrachten, wie allein die Anfangsgründe der Physiologie gelegt werden müssen. Reil leitet den Grund der organischen Erscheinungen von der ursprünglichen Verschiedenheit der der Mischung und Form organischen Körper ab. Verschiedenheit der Mischung und Form sind nach ihm die Ursachen aller Verschiedenheit der organischen Körper und ihrer Kräfte. Werden zwei Principien, Mischung und Form, anerkannt,

Digitized by Google

so bleibt die Aufgabe ungelöst, und es frägt sich jetzt wieder, wie die Mischung zur Form, die Form zur Mischung kam. Dass aber die Form der organischen Materie die Art ihrer Wirkungen nicht ursprünglich bestimmt, zeigt sich darin unwiderleglich, dass die organische Materie, aus welcher alle Formen entstehen, anfangs fast formlos ist. Der Keim ist bei allen Wirbelthieren und wahrscheinlich auch bei den Wirbellosen, wie wir es von einigen wissen und ich es von *Planaria* beobachtet habe, eine runde Scheibe einfacher Materie; wo ist hier die Verschiedenheit der Form bei der Verschiedenheit der Thiere? Anderseits wird die Form der unorganischen Körper immer erst durch ihre Elemente oder die Combination der Elemente bestimmt. Auch giebt diess Reil selbst wieder zu; denn er sagt p. 17: „Form der Materie ist schon eine Erscheinung, die in einer andern, nämlich in der Wahlanziehung der Grundstoffe und ihrer Producte, gegründet ist.“ Hieraus würde folgen, dass, wenn die Mischung allein die Ursache der organischen Kräfte wäre, die Mischung selbst zugleich das formende Princip wäre. Da nun die Mischung in den der organischen Kräfte beraubten organischen Körpern unmittelbar nach dem Tode nicht von der Mischung der Elemente während des Lebens verschieden scheint, so musste Reil annehmen, dass es noch feinere, von der chemischen Analyse nicht erkennbare Materien gebe, welche in dem belebten organischen Körper noch vorhanden seyen, in dem todten aber fehlen. Es muss allerdings in die Zusammensetzung der Stoffe im lebenden Körper noch ein unbekanntes, im Reil'schen Sinne feineres, materielles Princip eingehen, oder die organische Materie muss durch die Wirkung unbekannter Kräfte die damit verbundenen Eigenthümlichkeiten erhalten. Ob man sich diess Princip als imponderable Materie, oder als Kraft zu denken habe, ist eben so ungewiss, wie dieselbe Frage bei mehreren wichtigen Erscheinungen in der Physik, und die Physiologie ist hier nicht hinter den übrigen Naturwissenschaften zurück; denn die Eigenschaften dieses Princips sind in den Wirkungen der Nerven bald eben so gut bekannt, als die des Lichtes, der Wärme, der Electricität in der Physik. Auf jeden Fall ist die Beweglichkeit dieses Princips gewiss. Wir erkennen die räumliche Ausbreitung dieses Princips in unendlich vielen Lebenserscheinungen. Wir sehen, dass steif gefrorne, der Empfindung und Bewegung beraubte Theile von der Grenze der belebten Theile allmählig belebt werden, wir sehen diese Mittheilung noch deutlicher nach dem aufgehobenen Druck eines Nerven, der das sogenannte Einschlafen der Glieder bewirkt hatte. Wir sehen den in der Entzündung von der Oberfläche des Organes ausgeschwitzten Faserstoff belebt und organisirt werden. Die organische Kraft wirkt über die Grenze der Organe hinaus bei der Umwandlung der thierischen Materie in den Gefässen, bei der Umwandlung des Chymus und Chylus, der in den Lymphgefässen bei seinem Weiterrücken neue Eigenschaften erhält; sie wirkt von den Wänden der Blutgefässe aus auf das Blut und bedingt dessen Flüssigkeit, während das Blut ausser den Gefässen fast unter allen Bedingungen gerinnt, wenn es nicht zersetzt wird.

Digitized by Google

Endlich erwähne ich mit Autenrieth die Fähigkeit der thierischen Theile, wodurch ihnen bald Lebenskraft entzogen, bald mitgetheilt wird, und wodurch sich die Lebenskraft oft schnell in einem Organe anhäuft. Ich glaube nicht, dass die Wirkung der Lebenskraft in dem nicht bebrüteten Ei den Dotter und das Eiweiss vor Fäulniss schützt, wie Hunter bemerkt, aber sogar eine ausgetretene oder eingeschlossene oder krankhaft angesammelte Flüssigkeit, selbst zersetzter Thierstoff, Eiter, wird länger im lebenden Körper, als ausser ihm vor Fäulniss bewahrt, was nicht bloss das Abschliessen von der Luft verursacht, da sonst bei gesunkenen Kräften oft schnell Blut und Eiter im Körper sich zersetzen. Autenrieth *Physiol.* 1. So gewiss nun mit allen diesen Thatsachen die Existenz einer oft schnell wirkenden und räumlich sich ausbreitenden Kraft oder eines imponderablen Stoffes ist, so wenig ist man berechtigt, denselben mit den bekannten imponderablen Materien oder allgemeinen Naturkräften, Wärme, Licht, Electricität, für identisch zu halten, eine Vergleichung, die vielmehr durch jede nähere Untersuchung widerlegt wird. Die Untersuchungen über den sogenannten thierischen Magnetismus schienen Anfangs einiges Licht über diese räthselhafte Kraft oder imponderable Materie zu verbreiten. Man glaubte, dass Bestreichen eines Menschen durch einen andern, Händeauflegen und dergleichen, merkwürdige Wirkungen hervorbringe, die von einem Ueberströmen des sogenannten thierischen magnetischen Fluidums herrühren; ja Einige haben dieses hypothetische Fluidum sogar durch gewisse Vorrichtungen anzuhäufen geglaubt. Diese Geschichten sind indess ein bedauernswerthes Irrsal von Lug und Trug und Aberglauben geworden, und es hat sich nur gezeigt, wie unfähig die meisten Aerzte zu einer empirischen Untersuchung sind, und wie wenig sie eine Vorstellung von einer Prüfung haben, die in den übrigen Naturwissenschaften zur allgemeinen Methode geworden ist. Kein einziges Factum existirt über diesen Gegenstand unzweifelhaft, als die Gewissheit unendlicher Täuschungen; in der Empirie der Arzneikunde zeigt sich auch keine Thatsache, welche sich mit diesen wunderbaren Dingen in Verbindung bringen liesse, als jene oft wiederholten, aber auch der Bestätigung bedürfenden Berichte von der Heilung gelähmter Menschen, deren Glieder man in frisch geschlachtete Thiere gehüllt, und die gerne geglaubten Mährchen von Verjüngung der Alten und Kränklichen in dem Umgang und in der Ausdünstung gesunder Kinder, und umgekehrt.

So viel wir jetzt gesehen haben, bestehen die organischen Körper aus Materien, welche eine eigene, in der unorganischen Natur nicht vorkommende, nämlich ternäre, quaternäre oder noch mehrfache Combination der Elemente zeigen; diese Combinationen erzeugen sich nur in den organischen Körpern, so lange sie thätig sind oder leben. Die organischen Körper bestehen ferner aus Organen, d. i. qualitativ verschiedenen Gliedern des Ganzen, die den Grund ihrer Erhaltung in dem Ganzen haben; sie bestehen nicht allein daraus, sondern sie erzeugen aus eigener Kraft diese Glieder des Ganzen; das Leben ist daher keine blosse Folge

Digitized by Google

der Harmonie und Wechselwirkung dieser Glieder, sondern beginnt sich zu äussern mit einer in der Materie des Keimes wirkenden Kraft, oder imponderabeln Materie, welche in die Zusammensetzung derselben eingeht und der organischen Combination Eigenschaften mittheilt, die mit dem Tode aufhören.

Das Wirken der organischen Kraft ist aber nicht unbedingt. Die zum Leben nothwendige Mischung und Kraft kann vorhanden seyn und sich doch nicht durch Lebenserscheinungen äussern, und dieser ruhige Zustand der organischen Kraft, wie er in dem unbebrüteten befruchteten Keime des Eies, im Pflanzenei, so lange es nicht keimt, stattfindet, muss wohl von dem Tode unterschieden werden. Est ist auch nicht Leben, sondern specifische Lebensfähigkeit. Das Leben selbst, die Aeusserung der organischen Kraft, beginnt mit der Einwirkung gewisser Bedingungen des Lebens, wie der Wärme, der atmosphärischen Luft, bei den Eiern, die im Wasser ausgebrütet werden, der im Wasser aufgelösten Luft, und der Zufuhr befeuchteter Nahrungsstoffe, also des Nahrungsstoffes und Wassers, und diese Bedingungen bleiben für das Leben nothwendig, so lange es sich äussern soll.

Das Thier- und Pflanzenei bleibt nur so lange Keim, als es vollkommen ruhig in keiner Wechselwirkung mit der Aussenwelt erhalten wird; es bleibt dann entwicklungsfähig, und die schaffende Kraft des Keimes erhält sich, aber sie bleibt ruhig, ohne sich zu äussern. So können Eier der Thiere ihre Entwickelungsfähigkeit lange behalten, wenn sie nur der Einwirkung der Luft und Wärme entzogen werden. So erhält sich die Keimkraft vieler Insecteneier im Winter, und Eier von Insecten der überseeischen Länder kommen in botanischen Gärten Europa's aus, wie ich davon selbst ein Beispiel kenne. So soll sich die Keimkraft der Samen vieler phanerogamischen Pflanzen unter Wasser bis 20 Jahre, unter der Erde ausser aller Einwirkung der atmosphärischen Luft bis 100 Jahre erhalten. *Ann. d. Sc. nat. T. V.* 380. Treviranus führt Beobachtungen von van Swieten an, dass Mimosenkörner nach 80, und Bohnen nach 200 Jahren noch gekeimt hatten, und citirt eine andere Beobachtung, dass man sogar eine vielleicht 2000 Jahre alte Zwiebel aus der Hand einer Aegyptischen Mumie noch zum Treiben gebracht habe. Treviranus *Erscheinungen u. Gesetze des organischen Lebens. p.* 47. Sobald aber jene Einflüsse der äussern Natur einwirken, entwickelt sich entweder der Keim, wenn er zur Entwicklung geeignet ist, oder der Keim fault, wie dann auch der schon entwickelte Organismus, wenn die zur weitern Entwickelung nöthigen äusseren Bedingungen fehlen, entweder scheintodt wird, wie im Winterschlaf, oder ganz abstirbt. Die ruhende Lebenskraft des Keimes bedarf also zwar keiner äusseren Reize zu ihrem ruhigen Fortbestehen, wohl aber das entwickelte und sich äussernde Leben.

Die zum Leben nothwendigen äusseren Bedingungen, Wärme, Wasser, atmosphärische Luft und Nahrungsstoff, bringen, indem sie das Leben unterhalten, beständig Stoffveränderungen in den organischen Körpern zu Stande, so dass sie sich mit den organischen Körpern verbinden, während Bestandtheile der organischen

Digitized by Google

Körper wieder zersetzt und ausgeschieden werden. Man hat diese Einwirkungen *Reize* oder *Lebensreize* genannt; man muss sie indessen von vielen anderen zufälligen Reizen wohl unterscheiden, welche zum Leben nicht nothwendig sind, und man muss sich nur immer vorstellen, dass diese Lebensreize die Erscheinungen des Lebens durch materielle Veränderungen, Austausch ponderabeler und imponderabeler Materien bewirken, indem sie beständig die zum Leben nothwendige Mischung der Säfte, z. B. des Blutes, unterhalten, und das durch die Lebensreize veränderte Blut wieder alle Organe reizt, d. h. organische, zur Aeusserung des Lebens nothwendige, materielle Veränderungen, Austausch ponderabeler und imponderabeler Materien in ihnen hervorbringt, die zugleich mit einer Zersetzung schon vorhandener Bestandtheile der Organe und mit Ausscheidung derselben verbunden sind. Auch die Nerven der Thiere bewirken wichtige materielle Veränderungen in den Organen, und das in denselben wirkende, wahrscheinlich imponderable Agens ist ein wichtiger innerer Lebensreiz. Man hat diese Eigenschaft aller organischen Körper, durch die genannten Lebensreize gewisse zur Aeusserung des Lebens nothwendige beständige materielle Umwandlungen zu erleiden, *incitabilitas*, Reizbarkeit, genannt. Diese Reize sind gleichsam der äussere Impuls für den Gang des Räderwerks der ganzen Maschine; so unpassend der Vergleich mit einem Mechanismus auch seyn mag, die organische Kraft, welche in den organischen Körpern den zum Leben nothwendigen Mechanismus erschafft, ist doch keiner Acte ohne diesen äussern Impuls und ohne beständige materielle Umwandlungen mit Hülfe der äusseren sogenannten Lebensreize fähig. Richerand hat daher die Aeusserungen des Lebens nicht uneben mit den Erscheinungen der Verbrennung und der Flamme verglichen. Die Erscheinung des Feuers dauert nur so lange, als die zur Verbrennung nöthigen Combinationen und Trennungen stattfinden; der Sauerstoff verbindet sich mit dem brennenden Körper, Wärme wird entwickelt, und so lange Sauerstoff und brennbare Materien zugeführt werden, dauern die Phänomene des Feuers. Ich bin weit entfernt, das Leben als von einer Verbrennung abhängig zu machen, ich will nur sagen, dass hier, wie dort, gewisse beständige Combinationen und Zersetzungen der Materie die Erscheinungen dort der Verbrennung und Lichterscheinung, hier die Erscheinungen der organischen Kraft hervorbringen, dass die Lebensreize für die organischen Körper dasselbe sind, was der Sauerstoff der Atmosphäre und das brennbare Material für die Erscheinung des Feuers, wo man den Sauerstoff doch nicht den Reiz der Flamme nennt, und dass der Name Reiz, Lebensreiz, ohne sich die dadurch veranlassten materiellen Veränderungen dabei zu denken, ohne beständige neue Bindung und Ausscheidung ponderabeler und imponderabeler Materien ein leerer, und sogar falscher Begriff ist. Man muss nur immer bedenken, dass die durch die Lebensreize bewirkten materiellen Veränderungen, obgleich Stoffe der unorganischen Natur dabei wirken, nicht wieder binäre Verbindungen im Organismus erzeugen, sondern nur binäre Verbindungen als zersetztes, wie Kohlensäure,

Digitized by Google

ausscheiden, während der beim Athmen zum Theil an das Blut tretende Sauerstoff das Blut verändert, und das veränderte Blut in den mit der organischen Kraft begabten Organen ganz andere materielle Veränderungen hervorbringen muss, als man sie sich in einem todten Körper zu denken hat.

Diese allgemeinen Bedingungen des Lebens, die Lebensreize, oder *integrirenden* Reize, sind für Pflanzen und Thiere gemein; für die Pflanzen insbesondere ist auch das Licht unentbehrlicher belebender Reiz, für die thierischen Körper ist es (obgleich Entziehung des Lichteinflusses scrophulös und rhachitisch macht), weniger unmittelbar nothwendig, wie viele Thiere, namentlich die Eingeweidewürmer, beweisen, und dessen Mangel wirkt auf die thierischen Organismen nur mehr in sofern schädlich ein, als es die anderen Lebensbedingungen modificirt. Für die Thiere ist als unentbehrliche Lebensbedingung, nicht bloss Aufnahme neuer Materien, sondern auch vorzugsweise schon organisirter Materien zu nennen, während die Pflanzen organisirte Materien theils in binäre Verbindungen zerlegt als Nahrung aufnehmen, und binäre in ternäre Verbindungen verwandeln. Sonst ist die Nothwendigkeit von neuer Materie, Wärme, Wasser und atmosphärischer Luft für die Entwickelung der organischen Wesen, ihr Fortbestehen und ihr Wachsthum eine ganz unbedingte. Man hat sehr geirrt, indem man diese *belebenden Reize* mit anderen Reizen zusammengestellt hat, welche in die Zusammensetzung der organischen Körper nicht wesentlich eingehen, und ihre Kräfte nicht vermehren. Ein mechanischer Reiz, welcher den Zustand einer empfindlichen Haut modificirt, z. B. Druck, bewirkt zwar eine Lebenserscheinung, Empfindung, aber belebt nicht und verstärkt nicht die organischen Kräfte; dagegen tragen die zum Leben unbedingt nothwendigen Reize zu der Bildung der organischen Materie selbst wesentlich bei. Die Nahrungsmittel für's Erste sind nicht allein Reize der organischen Körper, sondern selbst lebensfähig, sie sind Reize, welche beleben und selbst belebt werden können. Der Mensch entbehrt sie ohne tödtliche Folgen im gesunden Zustande kaum länger als eine Woche, die höheren Thiere entbehren sie ohne tödtliche Folgen nicht mehrere Wochen lang, die Amphibien hat man dagegen Monate lang fasten gesehen, wie von Schlangen und Schildkröten vorzüglich bekannt ist. Das Wasser, mag es in die organischen Verbindungen als solches eingehen, oder seine Elemente zu den organischen Verbindungen beitragen, ist auch in seinem ungebundenen Zustande zur Aeusserung des Lebens durchaus nothwendig, weil die thierischen Theile ohne im Zustande der Aufweichung von Wasser zu seyn, keines Lebens fähig sind. Die atmosphärische Luft endlich ist eine für die Lebenserscheinungen so nothwendige Bedingung, dass das Leben der höheren Thiere keinen Augenblick besteht ohne Athmen, ohne die mit dem Athmen verbundenen Veränderungen des Blutes und ohne den Einfluss dieses Blutes auf die Organe. Die Zufuhr der Nahrungsmittel kann eine geraume Zeit lang fehlen, z. B. bei den Amphibien, die Aufnahme von neuen Nahrungsstoffen aus dem Blute in die Organe fehlen, aber jene andere Veränderung, welche das Blut in

Digitized by Google

den Organen durch das Athmen hervorbringt, kann bei den Amphibien nur eine kurze Zeit, und bei den Menschen nur einige Secunden fehlen. Die Wärme endlich, vorzüglich dann wichtig, wenn das thierische Wesen Anfangs selbst noch keine Wärme zu bilden vermag, überhaupt aber für alle organische Wesen, Pflanzen und Thiere unentbehrlich, scheint auch in die Zusammensetzung der organischen Wesen einzugehen. Denn die organischen Processe erfordern bei jedem Thiere und bei jeder Pflanze eine bestimmte Temperatur; wir wissen auch, dass chemische Processe binärer Verbindungen, indem sie eine gewisse Temperatur erfordern, ein bestimmtes Quantum Wärme für die Bildung neuer Verbindungen absorbiren. Unter dem Einflusse jener Bedingungen, Nahrungsstoff, Wasser, atmosphärische Luft und Wärme, entwikkelt sich das organische Wesen aus dem Keim von selbst, indem beständig vorhandene organische Materie zersetzt wird und die Lebenserscheinungen selbst die Erscheinungen der beständigen Bindung neuer Stoffe und Zersetzung vorhandener, so wie der Veränderungen in der organisirten Materie sind. Ob auch Electricität zur Entwickelung des Lebens nothwendig ist, ist uns noch ganz unklar.

Nun zeigt sich aber sogleich eine verschiedene Abhängigkeit der lebenden Wesen gegen verschiedene Lebensreize. Edwards hat beobachtet, dass neugeborne warmblütige Thiere am meisten äussere Wärme nöthig haben, und ohne dieselbe nicht leben können, während diese Thiere viel länger ohne zu athmen lebend unter Wasser zubringen, als erwachsene. Ihre Fähigkeit im Wasser auszudauern, nimmt mit der Temperatur des Wassers von 0 —20° zu, bleibt von 20—30° und vermindert sich von 30—40° des Wassers. Edwards *de l'influence des agens physiques sur la vie.* Paris 1824. Froriep's *Not.* 150, 151. Vergl. Legallois *exp. sur le principe de la vie.* Das erwachsene Thier ist durch die Lebensverhältnisse seiner Art und Gattung auf eine gewisse äussere Temperatur und daher auf eine gewisse geographische Verbreitung zu seinem Gedeihen angewiesen. Die Dauer der Reizbarkeit ohne Lebensreiz steht im Allgemeinen im umgekehrten Verhältniss mit der Organisation. Die einfachsten Thiere entbehren diese Reize am längsten. Mollusken, Insecten hat man Monate lang ohne Nahrung gesehen. Man sehe das ähnliche Beispiel vom Scorpion in meiner Abhandlung, Meckel's *Archiv* 1828. Schlangen und Schildkröten leben Monate lang ohne Nahrung, während der Mensch im gesunden Zustande kaum über eine Woche hungernd ausdauert. Mehrere Insecten leben Tage lang in mephitischen Gasarten, die *Oestrus*larve z. B. lange Zeit in irrespirabler Luft nach den Versuchen von Schroeder van der Kolk. Mollusken hat man 24 Stunden unter der Luftpumpe erhalten. Die Amphibien leben sehr lange ohne zu athmen, in luftlosem Wasser, nach Spallanzani und Edwards z. B. einige Stunden, in lufthaltigem Wasser 10—20 Stunden, und Frösche, denen ich die Lungen exstirpirt, lebten noch 30 Stunden. Indessen gehören die vielen Erzählungen von lebend gefundenen Kröten u. s. w. in Marmorblöcken, in Bäumen, wohl zu den Täuschungen und zum physikalischen Aberglauben, wenn gleich

Digitized by Google

Herissant und Edwards Amphibien in Gyps eingeschlossen, einige Zeit lebend erhielten. Edwards hat sich überzeugt, dass Gyps für atmosphärische Luft durchdringlich ist, daher Amphibien in Gyps und Quecksilber eingeschlossen so schnell wie bei der Submersion in Wasser starben. Edwards in Meckel's *Archiv.* 3. 617. Vergl. Buckland Froriep's *Notizen.* 33. Bd. Die Complication der Organbildung erhöht das abhängige Verhältniss der Organe von einander, daher einfache Thiere nach Verletzungen länger leben als höhere Thiere. Der Scheintod lässt bei niederen Thieren viel leichter Wiederaufleben zu. Spallanzani und Fontana sahen vertrocknete Räderthierchen selbst nach langer Zeit durch Wasser wieder aufleben, was Ehrenberg läugnet. Dasselbe haben Steinbuch und Bauer von den Vibrionen der kranken Samen des Weizens und einer *Agrostis* gesehen, als die Samen nach Jahren wieder befeuchtet wurden. Die grössten Verletzungen lassen bei Amphibien noch lange Zeit Zeichen des Lebens zurück, und bekannt ist die lange dauernde Reizbarkeit in Muskeln und Nerven dieser Thiere. Auch bei jungen Thieren sind wahrscheinlich wegen der grössern Einfachheit die Lebenszeichen ausdauernder. Ich habe die Muskelreizbarkeit in getödteten Embryonen von Kaninchen länger dauern gesehen, als in erwachsenen Kaninchen; ich sah lebende Kaninchen-*Foetus*, aus dem *Uterus* genommen, 15 Minuten in der Luftpumpe ausdauern. Legallois hat hierüber schöne Versuche angestellt. Es geht daraus hervor, dass, wenn man Thiere nach der Geburt am 1. 5. 10. und so fort bis 30. Tage durch Untertauchen in Wasser, Ausschneiden des Herzens, Eröffnung der Brust zu tödten sucht, die Dauer der Sensibilität alle 5 Tage kürzer wird, so dass sie z. B. nach der Geburt 15 Min., am 30. Tage $2\frac{1}{2}$ Min. beträgt. Dasselbe beobachtete Legallois in Hinsicht der Dauer des Kreislaufs nach Zerschneidung der Medulla spinalis, Amputation des Kopfes. Alle diese Erscheinungen erklären sich völlig aus dem Satze, dass, je entwickelter die Theile eines Ganzen sind, desto abhängiger sie von einander seyn müssen.

Nun bleibt uns noch die *Vergänglichkeit* der organischen Körper und der organischen Materie zu untersuchen übrig.

Die organischen Korper sind vergänglich, indem sich das Leben mit einem Schein von Unsterblichkeit von einem zum andern Individuum erhält, vergehen die Individuen selbst, aber mit der Vertilgung aller Individuen stirbt auch eine Pflanzen- oder Thierspecies aus, wie die Geschichte der Erde beweist. Die organische Kraft ergiesst sich gleichsam in einem Strom von den producirenden Theilen aus in immer neue producirte, während die alten absterben. Diess hat Autenrieth schön geschildert. Autenrieth sagt: „Nur diejenigen organischen Körper, welche durch Ausläufer, wie die kriechenden Pflanzen, oder wie manche Bäume durch abwärts gesenkte Zweige immer wieder neue Wurzeln schlagen, sterben nicht. Bei diesen ist in einer gewissen Zeit der neue Sprosse jedesmal zugleich ein Theil des alten organischen Körpers und ein neuer für sich bestehender. Immer aber stirbt auch bei diesen Pflanzen der alte Stamm nach und nach ab, und

Digitized by Google

die Lebenskraft wirkt nur in dem neuen Sprossen fort, der auf der einen Seite ebenfalls sich wieder verlängert, um auf der andern Seite immer wieder abzusterben. Was hier in einem Zusammenhange geschieht, nämlich das Absterben auf einer Seite und die Bildung eines neuen fortlebenden Körpers auf der andern, das geschieht abgebrochen beim Menschen und den vollkommenen Thieren. Das Kind löst sich als neuer fortdauernder Körper von der Mutter früher ab, als diese stirbt, und diese stirbt auf einmal, während die *Species* unsterblich scheint." Autenrieth *Physiol.* 1. 112. Die Frage, warum die organischen Körper vergehen, und warum die organische Kraft aus den producirenden Theilen in die jungen lebenden Produkte der organischen Körper übergeht und die alten producirenden Theile vergehen, ist eine der schwierigsten der ganzen allgemeinen Physiologie, und wir sind nicht im Stande, das letzte Räthsel zu lösen, sondern nur den Zusammenhang der Erscheinungen darzustellen. Es würde ungenügend sein, hierauf zu antworten, dass die unorganischen Einwirkungen das Leben allmählig aufreiben; denn dann müsste die organische Kraft vom Anfang eines Wesens schon abzunehmen anfangen. Es ist aber bekannt, dass die organische Kraft zur Zeit der Mannbarkeit noch in solcher Vollkommenheit besteht, dass sie sich in der Keimbildung multiplicirt. Es muss also eine ganz andere und tiefer liegende Ursache seyn, welche den Tod der Individuen bedingt, während sie die Fortpflanzung der organischen Kraft von einem Individuum zum andern und auf diesem Wege ihre Unvergänglichkeit sichert. Man könnte auch behaupten, dass die zunehmende Gebrechlichkeit der organischen Körper im Alter durch die zunehmende Anhäufung gewisser zersetzter Stoffe in ihnen entstehe, deren Wahlverwandtschaft sich mit der Lebenskraft in Gleichgewicht setzte; allein auch dann müsste die organische Kraft von Anfang an abnehmen. So erklärt Dutrochet das Alter aus der zunehmenden Anhäufung von Sauerstoff im thierischen Körper. Allein dieser Anhäufung fehlt der Beweis. Wir sind hier bloss im Stande, den Zusammenhang der Erscheinungen mit der Entwickelung darzustellen. Vergleicht man den Keim eines organischen Wesens mit seinem Zustand im höchsten Alter, so besteht das Ganze, welches nach Kant die Existenz der einzelnen Theile bedingt, im höchsten Alter fast bloss in der Wechselwirkung der einzelnen Theile und ihrer Kräfte, ähnlich einem Mechanismus, der bloss durch die Wechselwirkung seiner Theile erhalten wird. In dem Keim dagegen ist die Kraft, welche den Grund zur Production aller Theile enthält, noch unvertheilt vorhanden. Das organische Princip ist im Keim gleichsam im Zustande der grössten Concentration. Die Entwickelungsfähigkeit ist jetzt am grössten, die Entwickelung am geringsten. Hat nun jene Kraft eine Zeitlang gewirkt, ist der Organismus bis über die Jugend entwickelt, so haben wir nicht mehr ein Einfaches mit der unvertheilten Kraft des Ganzen vor Augen, sondern ein Mannigfaltiges mit vertheilten Kräften. Je mehr aber die Kraft des Ganzen vertheilt ist, je weniger noch unverwandte organische Kraft vorhanden, um

Digitized by Google

so mehr scheint der Organismus die Fähigkeit zu verlieren, durch den Einfluss allgemeiner Lebensreize belebt zu werden, um so geringer wird gleichsam die Affinität zwischen der organischen Materie und den allgemeinen Lebensreizen, welche das Leben gleich der Flamme anfachen, daher nach vollendeter Entwickelung, wenn das unsterbliche Leben gesichert sein soll, die Erzeugung eines Keimes nöthig ist, der wegen der noch unvertheilten Kraft, auch gleichsam noch die grösste Affinität zu den Lebensreizen besitzt, die in dem Maasse abnimmt, als der Organismus sich entwickelt. Dies sieht einer Erklärung gleich, im Grunde ist es aber nur eine Darstellung des Zusammenhangs der Erscheinungen, von welcher nicht bestimmt behauptet werden kann, dass sie richtig ist.

Wir wenden uns nun zur zweiten Frage, warum auch die Materie beständig während des Lebens eines organischen Körpers vergänglich ist und durch neue organische Materie ersetzt werden muss? Diess ist weniger bei den Pflanzen der Fall und zeigt sich wenigstens vorzugsweise nur in dem allmähligen Absterben älterer Blätter, dahingegen das einmal gebildete, wie Tiedemann bemerkt, lange keinem Stoffwechsel unterworfen ist, sondern eine Zeitlang in seiner Mischung beharrt. In den Thieren zeigt sich dagegen ein beständiger Wechsel der Stoffe. Tiedemann leitet indess diesen Unterschied davon ab, dass in den Thieren Kraftäusserungen vorkommen, welche Veränderungen in dem materiellen Substrate der Organe hervorbringen, wie es mit der Wirkung der Nerven der Fall zu seyn scheine. *Physiol.* 1. 376.

Sniadecki hat sich mit der Auflösung dieser Frage in seinem ausgezeichneten Werke, *Theorie der organischen Wesen, aus dem Polnischen, Nürnberg* 1821, besonders beschäftigt.

Sniadecki nennt die Materien, welche zur Nahrung der organischen Körper dienen können, die belebungsfähigen Materien. Die Belebungsfähigkeit dieser Materien ist aber eine ganz allgemeine; sie ist aller Formen gleich fähig, so lange nicht bestimmte Einflüsse auf sie wirken, und eben darum ohne bestimmte Form. Die organische Materie strebt also, wie Sniadecki sich ausdrückt, im Allgemeinen zum Leben und zur Organisirung. Sobald aber ein gewisser Theil derselben unter die Gewalt irgend eines Individuums geräth, ertheilt die individuelle Kraft diesem allgemeinen Streben eine gewisse Richtung; daher kommt die individuelle und örtliche Gestalt und die Gattung und Art des Lebens. Jede besondere Organisation ist also nach Sniadecki der Erfolg zweier Bestrebungen, einer allgemeinen, welche in der Materie selbst stattfindet, vermöge welcher gewisse Stoffe zum Leben und zur Organisirung im Allgemeinen streben, und einer zweiten besondern, welche in den Individuen stattfindet, welche die Art eines solchen Lebens und die Form der Organisation bestimmt. Dieses Theilchen der belebbaren Materie also, welches die Wirkung einer gewissen individuellen Kraft zum Theil oder ganz erfahren hat, und welches in dem Maasse belebt ist, muss, weil es deshalb nicht aufgehört hat, belebbar zu seyn, vermöge dieser Eigenschaft zum weitern Leben streben und zur Annahme aller anderen or-

Digitized by Google

ganischen Formen, nur diejenige ausgenommen, welche es schon besitzt. Vergleicht man es also mit ganz unorganisirter belebbarer Materie, welche nach allen Formen gleich strebt, so muss es offenbar weniger belebbar seyn als diese. Jene Verminderung seiner Belebbarkeit muss gleich seyn dem Streben, welches es zur Annahme dieser besondern Form hatte, in welcher es sich befindet, weil dieses besondere Streben schon gesättigt und gestillt ist.

Sniadecki schliesst hieraus: dass die Belebungsfähigkeit der Materie in den Individuen für diese im umgekehrten Verhältniss der organischen Kraft ist, deren Einwirkung die Materie schon erfahren hat, oder die Materie, welche in die organischen Wesen gelangt, und theils von ihnen im Zustande der organischen Verbindung aufgenommen, wie von Thieren, theils darin verwandelt wird, wie von Pflanzen, verliert eigentlich so viel an Belebungsfähigkeit, als sie an individueller Kraft gewinnt, folglich in dem nämlichen Verhältniss, in welchem sie eine gegebene Gestalt annimmt, verliert sie die Fähigkeit zu derselben. Sobald sie also vollkommen organisirt wird und die ganze individuelle Kraft erleidet, wird sie auch aller Lebensfähigkeit in Hinsicht dieses Individuums beraubt. Sobald dieses erfolgt, verliert die organische Kraft ihre ganze Gewalt über dieselbe, und diese Materie wird mitten in dem lebenden Körper nicht belebbar und unthätig, und folglich nur tauglich seyn, um aus dem Körper geworfen zu werden. Auf diese Art erklärt Sniadecki den ewigen Wechsel der organisirbaren Materien in den organischen Körpern. Nimmt man diese Erklärung an, so lassen sich ohne Zweifel die allgemeinen Vorgänge in den organischen Körpern weiter erklären, wie Sniadecki mit wunderbarer Einfachheit und Consequenz gethan hat. Indessen lassen sich gegen die Triftigkeit dieser Sätze gegründete Einwürfe machen. Nach Sniadecki ist das einzig Wesenhafte in den organischen Körpern nicht die organisirte Materie, sondern die organische Kraft. Diese äussert sich so lange, als sie organisirt, d. h. als nicht organisirte Materie vorhanden ist; das Organisirte selbst besitzt keine organische Kraft, und ist als Excrement untauglich. Allein nach dieser Ansicht müssen die excrementiellen Stoffe den Charakter der vollkommenen Organisation an sich tragen, und für andere organische Wesen und ihre individuelle Kraft sogleich wieder organisationsfähig seyn. Diess ist nicht der Fall. Die allgemeinsten Excremente sind der Harn und die Kohlensäure, welche beim Athmen ausgeschieden wird. Allein diese Materien sind für thierische Wesen gar nicht mehr organisirbar, sie sind zersetzte Thierstoffe. Es lässt sich viel angemessener annehmen, dass das von einem organischen Körper Organisirte in dem Maasse zugleich theilhaftig der organisirenden Kraft wird, als es organisirt wird. Die organisirende Kraft ist in vielen einfachen organischen Wesen theilbar, indem die organisirte Materie getheilt wird. Diess führt ganz zum entgegengesetzten Grundsatz von Sniadecki. Letzterer behauptet, die Materie verliert an Fähigkeit zu leben, in dem Maasse, als sie belebt wird. Wir sagen, die Materie ist in dem Maasse belebt, als sie die belebende Kraft erfahren hat, sie ist belebend in dem Maasse, als sie schon

Digitized by Google

belebt ist, sie äussert die belebende Kraft auf andere Materien, sie äussert sie aber nur unter Einwirkung gewisser Lebensreize, welche, indem sie sich auch mit den organisirten Theilen verbinden, andere Stoffe ausscheiden. Indem gewisse Lebensreize, z. B. beim Athmen, an das Blut übergehen, dann auf die organischen Theile einwirken, wird die Affinität zwischen gewissen Theilen der organisirten Materie und dem Lebensreiz des Blutes grösser, als zwischen den Theilen der organisirten Materie unter sich. Die Belebung der organisirten Materie durch eine Art, die mit Ausscheidung verbunden ist, macht sie wieder zur Aufnahme von Nahrungsstoffen fähig; aber in dem Maasse, als eine Materie belebt wird, erhält sie die Fähigkeit, selbst andere Materien zu beleben und zu organisiren, sie wird nicht Excrement, sondern der organisirenden Kraft der vorhandenen Materie theilhaftig.

Die Ursache, warum beständig organische Materien in den organischen Körpern zersetzt und ausgeworfen werden, könnte man auch auf den ersten Blick in folgendem Umstande suchen. Die Verwandlung der Nahrungsmittel in Nahrungsstoff kann die Ausscheidung gewisser Stoffe bedingen, welche ein Uebergewicht unbrauchbarer Elemente enthalten. So sondern die Pflanzen, indem sie Kohlensäure und Wasser in eine ternäre Verbindung zu Pflanzenstoff umwandeln, überflüssigen Sauerstoff aus. Bei den Thieren sind die Hauptexcretionsstoffe, welche vollends unbrauchbar sind, nur Kohlensäure und Harn. Die Thiere scheiden zwar fast eben so viel Materie aus, als sie aufnehmen, allein ein Theil davon sind reine unbrauchbare Excreta, viele sind zu besonderen Zwecken bestimmt, oder werden zufälliger Weise mit ausgeführt, wie der Darmschleim, vielleicht auch die Galle. Die Darmexcremente bestehen selbst wieder zum Theil aus den aufgenommenen Nahrungsmitteln. Dagegen werden Kohlensäure und Harn nicht allein aus den organisirten Theilen ausgeschieden, sondern sind auch rein unbrauchbar. Nun ändert sich zwar die Beschaffenheit des Harns nach den Nahrungsmitteln, und der Harn scheidet also offenbar auch noch unbrauchbare Theile der genommenen Nahrung ab, ehe sie ganz organisirt wird. Allein die Bestandtheile des Harns werden doch bei Thieren, die gar keine Nahrung zu sich nehmen, und wie manche Amphibien, Schlangen und Schildkröten, Monate lang hungern, nicht verändert. Es ist also gewiss, dass durch den Harn aus den schon organisirten Stoffen der Thiere unbrauchbare Theile ausgeschieden werden, und dass das Leben Materie unbrauchbar macht. So bilden ja auch die Puppen der Insekten zur Zeit ihrer Verwandlung, wo sie gar nichts zu sich nehmen, doch Excretionsstoffe durch die Malpighischen Gefässe, und wir wissen durch Wurzer, Brugnatelli und Chevreul, dass diese Gefässe Harnsäure ausscheiden. So scheidet auch der Embryo der höheren Thiere ein besonderes Excretum durch die Wolff'schen Körper ab, noch ehe die Nieren in Function treten. Merkwürdig ist auch, dass die Excretion von Harnstoff oder Harnsäure nicht allein bei den Wirbelthieren, sondern auch bei vielen Wirbellosen stattfindet; wie denn die Insekten durch die Malpighischen Gefässe Harnsäure absondern, und Ja-

Digitized by Google

CUVIER die Harnsäure in einem besondern Ausscheidungsorgane bei Mollusken entdeckt hat. Was aber die Wechselwirkung der thierischen Körper mit der atmosphärischen Luft betrifft, so haben wir zwar noch keine entfernt begründete Vorstellung über die Ursachen dieser für das Leben so nothwendigen Verknüpfung; aber die Hypothese, dass durch das Athmen die noch fehlenden Elemente zur Bildung von Thierstoff hinzutreten, oder die überflüssigen zu dieser Bildung abgeschieden werden, widerlegt sich sogleich aus dem Factum, dass die meisten Thiere den Thierstoff schon gebildet aufnehmen, und dass die Amphibien doch athmen, Sauerstoff der Atmosphäre verzehren, und Kohlensäure ausathmen, wenn sie auch keine Nahrung Monate lang zu sich nehmen. Die beständigen Ausscheidungen, welche der Lebensprocess auch ohne die Zufuhr von Nahrungsstoffen bewirkt, Kohlensäure und Harnstoff (und Harnsäure), sind unfähig andere thierische Wesen zu ernähren; die Kohlensäure ist bereits eine durch Zersetzung von Thierstoff entstandene binäre Verbindung der Harnstoff steht einer binären Verbindung sehr nahe, oder ist selbst vielleicht schon binäre Verbindung, wenigstens ist seine Entstehung aus cyanichtsaurem Ammonium, wie WOEHLER zeigt, überaus leicht. Da diese Excretionen fort und fort auch ohne alle Zufuhr von Nahrungsmitteln stattfinden, so folgt nothwendig, dass das Leben an und für sich mit einer beständigen Zersetzung schon organisirter Stoffe verbunden ist. Diess ist auch nicht anders möglich, wenn es wahr ist, was vorher bewiesen worden, dass die organische Kraft in einem thierischen Wesen sich nur so lange äussert, als gewisse Lebensreize beständig materielle Umwandlungen in den lebenden Theilen bewirken, wovon die Lebenserscheinungen nur die Erscheinungen sind, wie das Feuer die Erscheinung der materiellen Umwandlung bei der Verbrennung. Der Antrieb zu diesen materiellen Umwandlungen geschieht durch das Athmen; das durch das Athmen beständig veränderte Blut bewirkt wieder beständig materielle Umwandlungen in den Organen; aus schon gewesenen Bestandtheilen der Organe kommen die allgemeinen Zersetzungsproducte, Kohlensäure und die an Stickstoff überaus reichen Bestandtheile des Harns, Harnstoff und Harnsäure, und diese den Lebensprocess begleitende Zersetzung der organischen Materie macht wieder die Zufuhr neuer Nahrungsstoffe nöthig, welche die organisirende Kraft erfahren. Ein organisirter Theil zeigt nur so lange Lebenserscheinungen, und organisirt so lange nur andere Materien, als er beständig in seiner Ruhe durch neue Aeusserungen organischer Affinität zwischen dem Blute und den Bestandtheilen der Organe angeregt wird, wovon die Zersetzung gewisser Theile der Organe bedingt ist, die wieder ersetzt werden durch die Wirkung der organischen Kraft auf die neuen Nahrungsstoffe.

Die Nahrungsstoffe der Thiere sind schon organisch zusammengesetzte Materien der Thiere und Pflanzen; die Nahrungsstoffe der Pflanzen sind theils Stoffe von Pflanzen und Thieren, im nicht ganz zersetzten Zustande, theils selbst binäre Combinationen, nämlich Kohlensäure und Wasser. Man hat geglaubt, dass die Pflanzen aus reiner Kohlensäure und Wasser sich ernähren können,

Digitized by Google

indessen haben die Erfahrungen von Hassenfratz, Th. de Saussure, Giobert, Link gezeigt, dass Pflanzen unter diesen Umständen nur sehr kümmerlich oder gar nicht gedeihen, selten blühen und fructificiren. S. Tiedemann *Physiologie I.* 218. Es scheint daher, dass die Pflanzen organische Materie aus binären Combinationen (Kohlensäure und Wasser) nur dann bilden, wenn sie zugleich von aufgelösten, nicht vollkommen zersetzten, organischen Combinationen sich nähren. Den Pflanzen kann man aber das Vermögen, organische Materie aus binären Combinationen zu bilden, deswegen nicht ganz absprechen, weil ohne diess Vermögen die Pflanzenwelt und Thierwelt bald zu Grunde gehen würden. Durch die Thiere wird beständig eine grosse Menge organischer Materien zersetzt, die wenigstens für die Thiere unbrauchbar und von den Pflanzen erst in brauchbare organische Combinationen umgewandelt werden. Da nun beständig durch Verbrennen und andere Zersetzung eine ungeheure Menge gebildeter Pflanzenmaterien in binäre Combinationen und in die Elemente zerlegt wird, so würde das Nutriment der belebenden Thiere und Pflanzen immer kleiner werden, wenn die Pflanzen nicht wirklich das Vermögen besässen, wieder neue organische Materie aus Elementen und binären Combinationen zu bilden. Man kann also nicht annehmen, dass bloss die einmal vorhandene organische Materie in der Pflanzen- und Thierwelt circulirt, indem sie aus einem Wesen in das andere übergeht. Die unaufhörliche Zerlegung organischer Körper setzt die Bildung von neuer organischer Materie aus binären Combinationen und Elementen durch die Pflanzen voraus.

Nun wird die organische Kraft bei dem Wachsthum und der Fortpflanzung der organischen Körper multiplicirt, denn aus einem Wesen entstehen viele andere, und aus diesen wieder viele andere, während auf der andern Seite die organische Kraft der sterbenden organischen Körper zu Grunde zu gehen scheint. Da aber die organische Kraft nicht etwa bloss aus einem Individuum in das andere übergeht, da vielmehr eine Pflanze, nachdem sie jährlich die Keime von sehr vielen neuen Producenten gleicher Art erzeugt, immer noch fähig zu derselben Production, Producent bleiben kann, so scheint die Quelle der Vermehrung der organischen Kraft auch in der Organisation neuer Materien zu liegen, und diess zugegeben, müsste man den Pflanzen das Vermögen zuschreiben, indem sie neue organische Materien aus unorganischen Stoffen unter dem Einflusse des Lichts und der Wärme bilden, auch die organische Kraft aus unbekannten Ursachen der Aussenwelt zu vermehren, während auch die Thiere die organische Kraft aus den Nahrungsmitteln unter dem Einfluss der Lebensreize wieder erzeugen, und auch bei der Fortpflanzung vereinzeln können. Ob bei der Ausübung des Lebens ausser der beständigen Zersetzung von Stoffen auch organische Kraft beständig und wie sie verloren geht, ist gänzlich unbekannt. So viel scheint aber gewiss, dass beim Sterben der organischen Körper die organische Kraft wieder in ihre allgemeinen natürlichen Ursachen aufgelöst wird, aus denen sie von der Pflanze regenerirt zu werden scheint. Wollte man die Vermehrung der organischen Kraft aus unbekann-

Digitized by Google

ten Quellen der Aussenwelt in den einmal vorhandenen organischen Körpern nicht zugeben, so müsste man annehmen, dass die scheinbare unendliche Multiplication der organischen Kraft bei dem Wachsthum und der Fortpflanzung bloss eine Evolution in einander eingeschachtelter Keime sey, oder man müsste das Unbegreifliche annehmen, dass die beim Fortpflanzen stattfindende Theilung der organischen Kraft die Intensität derselben nicht schwäche. Immer aber würde die Thatsache übrig bleiben, dass beständig bei dem Sterben der organischen Körper organische Kraft unwirksam oder in ihre allgemeinen physischen Ursachen aufgelöst wird.

III. Von dem thierischen Organismus und von dem thierischen Leben.

Entwickelung, Wachsthum, Reizbarkeit, Fortpflanzung, Vergänglichkeit sind allgemeine Erscheinungen und Eigenschaften aller organischen Körper und Folgen der Organisation; allein nur die thierischen Körper zeichnen sich durch den Besitz anderer Eigenschaften aus, die man darum vorzugsweise *animalische* Eigenschaften im Gegensatz der allgemeinen *organischen* nennen kann. Hierunter sind das Vermögen zu empfinden und sich willkührlich zu bewegen die vorzüglichsten. Man kann zwar den Pflanzen die Bewegung nicht ganz absprechen, denn ihre Organisation ist mit unmerklichen Bewegungen begleitet, es findet Saftbewegung in ihnen statt; sie wenden sich nach dem Lichte, die Wurzeln wachsen nach dem bessern Boden hin, Pflanzen ranken entlang den Körpern, die ihnen eine Befestigung darbieten können, ihre Staubfäden neigen sich zum Griffel zur Zeit der Befruchtung hin; ja viele Pflanzen, besonders Mimosen, zeigen in den Blattstielen eine durch Reize bedingbare Bewegung, wobei sich das allgemeine Gesetz wiederholt, dass organische Theile von gewissen reizbaren Eigenschaften diese auf sehr verschiedene Reize auf gleiche Art äussern. Denn mechanische, galvanische, chemische Einflüsse, wie Weingeist, mineralische Säuren, Aether, Ammoniak, Wechsel der Temperatur, der Erleuchtung, bringen denselben Erfolg hervor, Treviranus *Biologie* 5, 201—229. Endlich zeigt sich bei *Hedysarum gyrans* ausser dem allgemeinen Einflusse des Lichtes auf die Bewegung des mittlern Blattes ein unaufhörliches Erheben und Senken der kleineren Nebenblätter, selbst ohne dass äussere Reize die Phänomene bedingen; auch einige der niedersten Pflanzen, wie die Oscillatorien, bewegen sich beständig pendelartig. Wenn nun aber auch das Schlingen der Pflanzen nach Palm (*über das Winden der Pflanzen p.* 48.) aus dem Umstande sich erklären lässt, dass Schlingpflanzen mit den Spitzen der Zweige Kreise beschreiben und also vermöge dieser Art des Wachsthums nahe Gegenstände erreichen, so scheint das Winden der *Cuscuta* um bloss lebende Pflanzen nicht ohne alle organische Anziehung zu seyn; es bieten sogar

Digitized by Google

die Bewegungen der Staubfäden und Blattstiele zu viele Aehnlichkeit mit der Reizbarkeit der Muskeln dar, um sie nicht damit zu vergleichen. Dutrochet (*recherches anat. et physiol. sur la structure intime des animaux et des vegetaux*) hat den Sitz der Reizbarkeit bei den Mimosen in der Rindensubstanz eines Wulstes an den Gelenken der Blattstiele entdeckt, ein Wulst, der nur den reizbaren Mimosen eigen ist. Alle Bewegung hörte auf nach dem Abtragen dieses Organes, nach dem Abschneiden der obern Hälfte des Wulstes erfolgte noch Aufrichten, aber nicht mehr Senken. Hiernach glaubt Dutrochet, dass Heben und Senken durch entgegengesetzte Krümmungen in der Rinde des Wulstes entstehen, wie man denn in Scheiben der Rinde beider Hälften unter Wasser Krümmungen erfolgen sieht. Auf diese Art soll sich ein Blatt erheben, wenn die Rinde der untern Hälfte des Wulstes convexer als die der obern Fläche wird, und sich senken, wenn die Krümmung der Rinde in der obern Hälfte zunimmt. Andere Beobachter haben bei der Bewegung der Wulste Farbenveränderung wahrgenommen, wie Lindsay, Ritter, Mayo, so dass man das Phänomen auch vom Zuströmen der Säfte ableiten könnte. Tiedemann *Physiol.* 1. 623. G. R. Treviranus *Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. I.* 171—177. Es giebt also in den Pflanzen ähnliche Organe, entweder wie die Muskeln, oder wie die durch Saftströmung erectilen Theile bei den Thieren; allein die thierischen Bewegungen erfolgen nicht bloss durch Wirkungen des Reizes auf reizbare Theile, sondern aus innern Bestimmungen von nicht beweglichen Theilen, den Nerven, auf bewegliche. Dutrochet hat zwar gesehen, dass, wenn er bei Mimosen den Focus eines Brennglases auf ein einzelnes Blatt richtete, der Eindruck sich nach und nach auf die übrigen Zweige und Blätter fortpflanzte, und er betrachtet die falschen Tracheen als die Organe der Leitung. Allein G. R. Treviranus bemerkt hierbei mit Recht, dass diess nur Hypothese bleibe; denn Andere haben von der Einwirkung des concentrirten Lichtes auf die Mimosen nur örtliche Wirkung beobachtet, und dann kann von einer örtlichen Bewegung die ganze Pflanze zugleich erschüttert, zur Mitbewegung gereizt werden. Das Bewegungsvermögen der Thiere hat aber auch das Ausgezeichnete, dass die Bewegungen zum Theil nicht bloss durch die zweckmässige Organisation des Ganzen, sondern durch Zwecke, welche ein einzelnes Organ, nämlich das Organ der Seelenäusserungen, bestimmt, veranlasst werden, d. h. dass sie willkührlich sind. Anderseits muss man Reizbarkeit nicht mit Empfindlichkeit verwechseln. Die Pflanzen sind reizbar, aber nicht empfindlich; so sind die Muskeln auch vom Körper getrennt noch reizbar, aber nicht empfindlich. Dass aber Empfindung in den Pflanzen stattfinde, kann ohne Aeusserungen des Bewusstseyns nicht statuirt werden. Aeusserungen von Empfindung und willkührliche Bewegung sind das einzige charakteristische Merkmal der einfachsten Thiere. Zusammengesetzte Thiere haben oft eine ästige und vegetabilische Form und sitzen mit dem Stamme im Boden; die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Polypen, die willkührlichen Bewegungen jedes Polypen des gemeinsamen Stam-

Digitized by Google

mes zeigen aber nur eine *organisatio animalis multiplicata* und nichts Pflanzliches. Die Bewegungen der Infusorien sind frei und willkührlich. Wenn daher immer gewisse einfache organische Wesen, die Spongien und mehrere sogenannte Alcyonien, in Hinsicht ihrer vegetabilischen oder animalischen Natur zweifelhaft scheinen, so muss der Mangel aller willkührlichen Bewegung des Ganzen oder der einzelnen Theile entscheiden, und diese müssen besser zu den vegetabilischen Seegebilden gezählt werden. Hiergegen lässt sich zwar erinnern, dass der Embryo der *Spongien* nach Grant (*Edinb. philos. Journal. Vol. XIII. p.* 382.), gleich dem Embryo der Polypen und Corallen, durch Wimpern Bewegungen äussert, allein wir haben keine hinreichenden Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Embryo der Spongien und Infusorien des Meeres, dann aber hat man schon vielfach an dem Embryo wahrer Vegetabilien, wie der *Algen*, solche Bewegungen beobachtet. Solche Beobachtungen hat Trentepohl an *Conferva dilatata β. Roth* (*Ectosperma clavata Vauch.*) und G. R. Treviranus an *Conferva limosa Dillw.* gemacht. *Biologie T. 4. p.* 634. Neuerdings hat Unger (*Nov. act. acad. nat. cur. T. XIII. p. 2. p.* 789.) dieselben Beobachtungen mit Beachtung aller Uebergänge an *Conferva dilatata* wiederholt, und es scheinen, wie auch G. R. Treviranus gegen die von Vaucher gemachte Vermuthung einer Täuschung durch Infusorien behauptet, jene anfangs beweglichen Keimkörner wieder in *Algen*, von denen sie gekommen, überzugehen. Siehe Treviranus *Biol. T. 4. Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens. p.* 51. *und* 183. Hieher gehören auch die *Zoocarpées* von Bory St. Vincent, die als gegliederte Fäden infusorienartig sich bewegende Keimkörner ergiessen, welche dann wieder vegetabilisch werden und die er mit der ganzen Zunft *Arthrodiées* zwischen Thierwelt und Pflanzen stellt. Die Bewegungen der Eier von Zoophyten durch Wimpern sind nicht für willkührlich zu halten. Die Schwingungen der Wimpern an den athmenden Kiemen einiger niederen Thiere sind dasselbe Phänomen. Nach den Untersuchungen von Nitzsch (*Beiträge zur Infusorienkunde, Halle* 1817) wären einige vegetabilische und animalische Infusorien sich sehr verwandt. So sollen sich *Bacillaria pectinalis* und andere Arten ganz wie Pflanzen, andere Arten der Gattung wie Thiere verhalten. Ehrenberg dagegen scheint eine solche Verwandtschaft beider Reiche nicht anzuerkennen; er bemerkt auch, dass die activen Bewegungen bei Algen nicht die Idee von Thierheit erwecken sollen. Nie hat er einen beweglichen Algensamen die geringste feste Nahrung zu sich nehmen gesehen, und so unterscheidet sich nach Ehrenberg die fruchtstreuende Alge von der sie umschwärmenden Monade, wie der Baum vom Vogel. Poggendorf's *Ann.* 1832. 1. Derselben Meinung ist nach eigenen Beobachtungen R. Wagner, indem er bemerkt, dass die Bewegung jener Keimkörner nicht für thierische gehalten werden könne, wenn sie gleich wunderbarer scheint als die tactmässige Bewegung einiger niederen Vegetabilien, der Oscillatorien.

Die Organe, durch welche die Empfindungen und die Be-

Digitized by Google

stimmungen zur willkührlichen Bewegung, also die thierischen Verrichtungen der Thiere geschehen, sind das Nervensystem. Von den Nerven zeigen sich die Organe der Thiere in eben so grosser Abhängigkeit, wie die Pflanzen vom Lichte. Man hat bisher Nerven ausser den Wirbelthieren nur bei einem Theile der Wirbellosen verfolgt, und man war sehr einstimmig der Meinung, dass bei den niederen Thieren gar keine Nerven vorhanden seyen, indem die noch einfache Substanz in denselben Partikeln empfindlich, beweglich und verdauend sey. In der That schien die grosse Theilbarkeit der einfachen Wesen hiezu einigermaassen zu berechtigen. Man kannte also die Nerven der Infusorien, der Corallenthiere und Polypen, der Acalephen, der meisten Eingeweidewürmer nicht. Aber von *Strongylus Gigas*, einem Wurm der Nieren, hatte Otto das Nervensystem beschrieben. Beim Spuhlwurm ist ein nervenartiger Strang zwischen den zwei Gefässstämmen nicht zu verkennen. Das Nervensystem von *Distoma hepaticum* hat Mehlis, von *Pentastoma* und *Diplozoon* hat v. Nordmann beschrieben. Kein Zweifel, dass es allen Eingeweidewürmern zukömmt. Ferner hatte Tiedemann das Nervensystem der *Echinodermen*, wenigstens der Seesterne entdeckt. Endlich hat Ehrenberg die grosse Entdeckung von der zusammengesetzten Bildung der niedersten Thiere, der Infusorien, gemacht. Ehrenberg *Organisation der Infusionsthierchen. Berlin* 1830. Bei den einfachsten Infusorien hat Ehrenberg den Mund und einen zusammengesetzten Magen, bei andern Mund, Darm und After entdeckt. Bei den vollkommneren Räderthierchen und einigen Infusorien hat Ehrenberg selbst eine Art Zähne am Munde, männliche und weibliche Geschlechtsorgane, Muskeln, Bänder, eine Spur von Gefässen und Nerven und Augenpunkte sehr deutlich beschrieben und abgebildet. Diese Augenpunkte, welche Ehrenberg auch bei den Seesternen und Medusen gefunden, sind für die Controverse von dem Nervensystem der einfachsten Thiere von ganz besonderer Wichtigkeit. Da nun bei den schon viel zusammengesetzteren Planarien, eben solche dunkle Augenpunkte am Kopfe, wie bei vielen Ringelwürmern, deren Nervensystem man kennt, vorkommen, und da nach meinen Beobachtungen die schwarzen Augenpunkte einiger Nereiden wirklich eine vom schwarzem Pigmente becherförmig bekleidete Anschwellung der Sehnerven darstellen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Planarien und überhaupt alle niederen Thiere, die solche Augenpunkte besitzen, Sehnerven und also ein Nervensystem besitzen. Wenn Gruithuisen glaubt, dass jede dunkle Stelle der Haut gewissermaasen mit dem Sehen in Beziehung stehe, weil sie Licht absorbire, so ist diess ganz unexact. Denn die erste Bedingung zum Sehen ist, dass der *Nervus opticus* specifische Sensibilität für das Licht besitze und nicht blosser Gefühlnerve sey. Niedere Thiere, welche gegen das Lichtagens ohne Auge empfindlich sind, können das Licht durch die Haut als Wärme empfinden, aber zur Lichtempfindung selbst gehört specifische Reizbarkeit. Daher besitzen die Würmer, wie einige Nereiden, ohne dass sie optische durchsichtige Apparate zur Unterscheidung der

Digitized by Google

Gegenstände besitzen, doch Nerven zur blossen allgemeinen Unterscheidung von Licht und Dunkel, und gerade die Existenz der Sehnerven zur allgemeinen Lichtempfindung bei einem Thiere, das wegen Mangel optischer Apparate nichts Bestimmtes unterscheiden kann, beweist sehr, dass die Lichtempfindung doch immer noch an bestimmte Nerven gebunden ist. Siehe meine Beobachtungen über den Bau der Augen bei den Nereiden, *Annales des sciences nat. T. XXII. p.* 19.

Ich komme darauf zurück, dass nach den Beobachtungen von Ehrenberg über den Bau der Infusorien und nach meinen Erfahrungen über den Bau der einfachsten Augen, immer wahrscheinlicher wird, dass alle Thiere ohne Unterschied Nerven besitzen. Wie schwierig sind doch schon die Nerven der Seesterne, ja mehrerer Mollusken, wie der Muscheln, zu untersuchen; wir dürfen also nicht zu viel Werth darauf legen, dass selbst grössere, einfache Thiere, wie die Actinien, die Medusen, uns keine deutliche Spur dieser Zusammensetzung darbieten.

Die Thiere unterscheiden sich aber nicht allein von den Pflanzen durch das Empfinden und willkührliche Bewegungsvermögen. Diese Attribute modificiren auch nothwendig die übrigen Eigenschaften, welche die Thiere mit den Pflanzen gemein haben. Diess hat Cuvier in der Einleitung zur vergleichenden Anatomie sehr schön ausgeführt. Die Gewächse, an den Boden geheftet, absorbiren unmittelbar durch ihre Wurzeln die ernährenden Theile der in sie eindringenden Flüssigkeiten, die Thiere hingegen, die meist nicht an ihren Aufenthaltsort gebunden, ihn vielmehr ganz verändern oder wenigstens als Polypen eines festen Stammes ihre Beute ergreifen, mussten den ihnen zur Ernährung nöthigen Vorrath von Säften mit sich fortnehmen können. Die allermeisten haben eine innere Höhle erhalten, in welche sie die zu Nahrungsmitteln bestimmten Stoffe bringen, und in deren Wänden die einsaugenden Gefässe bei den höheren Thieren wurzeln, welche nach einem sehr passenden Ausdruck Boerhave's wahrhafte innere Wurzeln sind. Cuvier vergl. *Anat. T. I. p.* 11. Bei einigen Thieren fehlt der After, bei anderen ist selbst der Darm zweifelhaft. Doch sollen die Bandwürmer nach Mehlis, gegen die gewöhnliche Annahme, einen gefässartigen, von der engen Mundöffnung beginnenden, bald gabelig getheilten Darm haben. Bei den Echinorynchen soll ein bekannter enger, zweischenkelig gespaltener Canal der Darm seyn. Eine besondere, zur ersten Assimilation bestimmte Höhle ist noch aus einem andern Grunde nothwendig: der Nahrungsstoff der Thiere muss erst aufgelöst werden. Der Nahrungsstoff der Pflanze findet sich aufgelöst vor, und besteht theils aus kohlensäurehaltigem Wasser, theils aus aufgelösten organischen Materien des *humus*. Die Thiere müssen ihren Nahrungsstoff, der aus schon vorhandenen organischen Verbindungen besteht, vorbereiten, zerkleinern, auflösen, daher ist die Verdauung eine bloss den Thieren eigene vorbereitende Assimilation der Speisen.

Die Saftbewegung der Pflanzen ist viel einfacher als bei den Thieren, und immer ohne besondere bewegende Organe für die Verbreitung, ohne Herz. In einigen einfachen Pflanzen giebt es

Digitized by Google

eine rotatorische Bewegung des Saftes im Innern von Gliedern oder in Zellen. Corti hat diese Bewegung in der *Chara* entdeckt, Fontana, die beiden Treviranus, Amici, C. H. Schultz, Agardh, Raspail, haben sie in den Charen wieder gesehen; Meyen hat eine ähnliche Bewegung in den Zellen der *Vallisneria spiralis* und in den Haaren der Wurzelfasern von *Hydrocharis morsus ranae* entdeckt. In den von Saftgefässen durchzogenen höheren Pflanzen hat C. H. Schultz eine fortschreitende Bewegung des Saftes entdeckt. *Ueber den Kreislauf des Saftes im Schöllkraut. Berlin* 1822. C. H. Schultz, *die Natur der lebendigen Pflanzen. Berlin* 1823. *Annales des sc. nat. T. XXII. p.* 75, 79. Nach Schultz ist diese letztere Bewegung ein vollkommener Kreislauf, in den einen Gefässen aufsteigend, in den anderen absteigend, in Quergefässen aber communiciren beiderlei Ströme der verschiedenen Gefässe. In den feinen Durchschnitten der Blattstiele vieler Pflanzen sieht man auch deutlich, dass der Saft in verschiedenen Gefässen verschiedene Richtung hat, und diess habe ich selbst an feinen Durchschnitten der Blattstiele von Feigenblättern sehr deutlich gesehen. Ob nicht die Zerschneidung der Gefässe an der Richtung der Ströme Antheil habe, kann bloss durch Beobachtungen verschiedener Ströme in unverletzten Blättern ausgemittelt werden. In den Blättern des Chelidonium, die mit dem lebenden Stamme noch verbunden waren, habe ich selbst allerdings entgegengesetzte Ströme gesehen. Der Umstand, dass nach Dutrochet's Beobachtungen in einem aufrecht stehenden dünnen Glascylinder mit Wasser, durch ungleiche Erwärmung an verschiedener Seite, sich eine aufsteigende und absteigende rotatorische Bewegung einstellt, kann ohnehin nicht die Saftbewegung in den Pflanzen erklären. Es scheint daher, dass Anziehung und Abstossung von Seite der Blätter und Wurzeln auf eine noch ungekannte Art die Saftbewegung in den Pflanzen vermitteln. Dass aber das Licht die Säfte anzieht, ist wohl gewiss, da es offenbar das Wachsen der ganzen Pflanzen bestimmt. Bei den Thieren sind dagegen die Triebfedern des Kreislaufes weniger äussere Einflüsse, sondern die Zusammenziehung eines Centralorganes, des Herzens. Diess aber wird belebt von dem durch den Einfluss der atmosphärischen Luft beim Athmen veränderten Blute. Ob vollkommene Circulation ein absolutes Prädicat der Thiere ist, ist noch unklar; wir kennen wenigstens in vielen einfachen Thieren bis jetzt weder Herz noch Gefässe.

Das in dem Pflanzen am meisten verbreitete Gewebe, das Zeligewebe, welches zugleich zur Fortleitung der Säfte dient, unterscheidet sich wesentlich vom Zellgewebe der Thiere, es hat geschlossene Zellen, die sich mit geraden Wänden begrenzen. Die Höhlungen des interstitialen Zellgewebes der Thiere liegen dagegen unter einander zusammen. Doch war es fehlerhaft den Thieren das Zellgewebe mit geschlossenen Zellen ganz abzusprechen, solches pflanzenartige Zellgewebe kömmt in mehreren Theilen vor, dahin gehört das Fettzellgewebe, welches bei den Wiederkäuern selbst polyedrisch ist, ferner das Zellgewebe des Glaskörpers und der *chorda dorsalis* der Embryonen und Knorpelfische.

Digitized by Google

Einen sehr wichtigen Unterschied bietet die Respiration der Pflanzen und Thiere dar. Bei den Pflanzen und einfachsten Thieren findet die Respiration auf ihrer ganzen Oberfläche statt. Bei den zusammengesetzten Thieren dagegen ist die Oberfläche nicht hinreichend zur Wechselwirkung mit der Atmosphäre, und es bedarf eines Organes, welches im kleinen Raume eine ungeheure athmende Fläche der Atmosphäre darbietet. Allein auch die Producte der Respiration sind im Thier- und Pflanzenreich verschieden. Bei den Pflanzen besteht die Assimilation zum Theil darin, dass die binären Verbindungen, Kohlensäure (also Kohlenstoff und Sauerstoff) und Wasser (Wasserstoff und Sauerstoff), in ternäre Verbindungen von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff zu Pflanzenmaterie umgewandelt werden. Da nun aber bei dieser Verwandlung ein Ueberschuss von Sauerstoff übrig bleibt, so wird dieser durch die Blätter ausgehaucht. Die Blätter nehmen auch Kohlensäure aus der Atmosphäre auf, wie die Untersuchungen von Priestley, Scheele, Ingenhouss, Spallanzani, Senebier, v. Humboldt, Th. de Saussure beweisen. Nämlich die Blätter zersetzen die in der Luft enthaltene Kohlensäure so, dass der Kohlenstoff mit einem Antheile des Sauerstoffes sich mit den Pflanzen verbindet, während der grösste Theil des Sauerstoffes an die Luft zurückgegeben wird. In der Nacht aber und im Schatten, im krankhaften und welkenden Zustande nehmen sie einen Theil des Sauerstoffes der Luft auf und dünsten Kohlensäure aus, aber weniger als sie am Tage aufnehmen. Tiedemann's *Physiologie T. I. p.* 273. Gilby *Edinb. phil. J.*1821. 7. Das Athmen scheint daher bei den Pflanzen eine blosse Correction der Assimilation; durch das Athmen der Pflanzen verliert die Luft beständig einen Theil der von den Thieren ausgehauchten Kohlensäure, und erhält einen Reichthum von Sauerstoff. Die Thiere leben nur von schon gebildeter organischer Materie, und ihre Substanz enthält, ausser Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, auch Stickstoff, der vielen Pflanzen ganz fehlt und in anderen nur in sehr geringer Quantität vorhanden ist. Da nun beständig eine grosse Menge Thierstoff fault und in chemische Verbindungen sich zersetzt, die Thiere aber keinen neuen organischen Stoff aus einfachen Elementen oder binären Verbindungen bilden können, so sind die Pflanzen, welche dieses Vermögen besitzen, den Thieren durchaus nöthig; so wie die Thiere wiederum den Pflanzen nöthig werden. Denn die Thiere athmen gerade dasjenige aus, was die Pflanzen einathmen, Kohlensäure, und athmen wieder ein, was die Pflanzen ausathmen, Sauerstoff. Auf diese Art würde ohne die Pflanzenwelt die Luft für die Thiere irrespirabel werden; durch die Wechselwirkung von Pflanzen und Thieren erhält sich aber die fast absolute Gleichheit der atmosphärischen Luft als eine Zusammensetzung von 79 Theilen Stickstoff und 21 Sauerstoff.

Da nun endlich die Pflanzen nur eine einfache Kraftäusserung, nämlich die Vegetation besitzen, so bedürfen sie, ausser Wurzel, Stengel, Blättern, nicht mannigfaltiger Organe, sondern sie bieten, mit Ausnahme der Fructificationswerkzeuge, durchgän-

Digitized by Google

gig ähnliche Theile dar, indem sich das einfache Verhältniss von Stengel zu Blättern immer weiter vom Stamme und Theilen des Stammes aus multiplicirt, ja sogar die Fructificationswerkzeuge zeigen sich den Blättern verwandt und bilden sich zuweilen in Blätter um. Da ferner die Pflanzen vor der Fructification nur eine Wiederholung ähnlicher Theile zeigen, deren Anfänge im Stamme zu einem *ensemble* verbunden sind, so sind auch diese Theile selbst wieder fähig, abgetrennt selbstständig zu werden; denn es giebt ohnehin hier eine beständige Zeugung durch Sprossen. Auch der Same ist ein selbstständiger Theil, der sich von den Sprossen nur darin wesentlich unterscheidet, dass seine Vegetationskraft gross, aber seine Vegetation selbst gering ist oder noch gar nicht existirt. In den Thieren zeigt sich dagegen die Wechselwirkung von Blutkreislauf, Athmen und Nerven zum Leben durchaus nothwendig. Die Nerven bedingen die Athembewegungen, die Nerven wirken aber nicht ohne Blut, welches geathmet hat, und das Blut fliesst allen Theilen und so den Nerven nicht zu, ohne die Zusammenziehung des Herzens, das wieder von dem hellrothen Blute und der Nervenwirkung abhängig ist. Gehirn, Herz und Lungen sind daher gleichsam die in einander greifenden Hauptträder in der thierischen Maschine, welche durch den Stoffwechsel beim Athmen in Bewegung gesetzt werden. Bei dem Wachsthume zeigt sich auch nicht ein äusseres Hervortreiben neuer Theile, ähnlich den alten, sondern meist eine Vergrösserung des Ganzen durch Vergrösserung aller zuerst gebildeten Theile des Innern und Aeussern. Die Thiere wachsen in der Regel nicht auf Pflanzenart, nur die zusammengesetzten Polypen wachsen durch Sprossenbildung. Die mehresten Thiere sind, je vollkommener sie sind, nicht ein Aggregat ähnlicher Theile, durch einen Stamm verbunden, sondern sie enthalten Theile von ganz verschiedenen Eigenschaften, mannigfaltige Organe, die eine Zeugung durch Theilung wachsender Theile unmöglich machen, wenn nicht die sich abtrennenden Theile die wesentlichen Organe des Ganzen noch mit enthalten, wie bei Polypen und einigen Würmern, Naiden u. A., bei denen O. Fr. Mueller, Gruilhuisen eine Fortpflanzung durch künstliche oder von selbst erfolgende Theilung gesehen haben. Diese ganze Vergleichung hatte nur den Zweck, zu zeigen, wie die Existenz neuer Eigenschaften bei den Thieren auch diejenigen Functionen modificirt, welche die Thiere mit den Pflanzen gemein haben.

Die Vergleichung der Thiere mit den Pflanzen führte die Alten zur Methode, wie sie die Functionen der Thiere abzuhandeln hatten.

Die Functionen, welche die Pflanzen und Thiere mit einander gemein zu haben scheinen, hat man organische oder vitale Verrichtungen genannt; sie haben die Erzeugung und Erhaltung aller Theile aus dem selbstständigen Ganzen zum Zweck. Sie sind Aeusserungen der organischen Affinität unter den Wirkungen der wesentlichen Ursache des Lebens. Die Functionen, welche vorzüglich die thierischen Wesen auszeichnen, Empfindungen, Bewe-

Digitized by Google

gungen, Vorstellungen u. s. w., scheinen der Zweck des thierischen Daseyns zu seyn, es sind die, welche das Thier characterisiren würden, wenn es auch nur einen Augenblick ausdauern sollte. Die Alten haben sie im Gegensatz der ersteren animalische Verrichtungen genannt.

Eine dritte Reihe der Erscheinungen umfasst die Vorgänge, welche zur Bildung neuer Keime in einem Individuum und zur Absonderung und Entwickelung derselben führen, und also die Erhaltung der Gattung während der Vergänglichkeit der Individuen bezwecken. Diese Eintheilung hat ihre Vortheile, kann aber auch Missverständnisse erzeugen. Die Kraft, welche die Entwickelung des Keimes bedingt, ist dieselbe, welche die beständige Erhaltung des Ganzen und die Wiedererzeugung desselben verursacht, und darnach würden also Vegetationskraft, Bewegungskraft und Empfindungskraft gleichsam die Grundkräfte seyn; allein es fragt sich wieder, ob diese Trennung nicht künstlich ist.

Man kann sich vorstellen, dass die wesentliche Kraft des Pflanzenlebens, die Vegetationskraft, in den Thieren noch mit anderen Kräften verbunden sey, z. B. mit der Empfindungskraft und Bewegungskraft, oder mit der Nervenkraft, wenn man die Fähigkeit der Muskeln, sich durch den Einfluss der Nerven zusammenzuziehen, nicht als ursprüngliche Kraft, sondern als Folge ansehen will. Man kann sich vorstellen, dass die Vereinigung dieser Kräfte im Keime existirt und dass sie sich von der Entwickelung an in den verschiedenen Organsystemen, die in einander greifen, äussern, so dass die Vegetationskraft, von der Nervenkraft bestimmt, auch die Organe des Nervenlebens wiedererzeugt und beständig erhält, die Nerven aber wieder die Ursache sind, dass organisirte Theile empfindlich sind. Wenn man diess aber weiter durchdenkt, so gelangt man auf Widersprüche.

Vielmehr scheinen diese Hauptformen nur verschiedene Wirkungen einer und derselben *vis essentialis* der Thiere, bedingt durch die verschiedene Zusammensetzung der verschiedenen Organe. Es liegt etwas Absurdes in der Vorstellung, dass die Reproductionskraft die Nervensubstanz erzeuge, während die Wirkungen der gebildeten Nerven Folgen einer Kraft seyn sollen, die verschieden ist von der Kraft, welche die Nervensubstanz bildet. Die letzte Ursache des Lebens, welche in den Thieren wirkt, erschafft alle zum Begriff eines thierischen Wesens gehörigen Theile, und erzeugt diejenige Mischung in denselben, deren Erfolg Bewegungsvermögen und Empfindungsvermögen oder Leitungsvermögen für Eindrücke sind, die auf einen Centraltheil der Einwirkungen und der Rückwirkungen verpflanzt werden. Nur die verschiedenen Producte dieser ersten und einen Kraft der Thiere, dieses alle Theile erzeugenden und wiedererzeugenden *primum movens*, sind theils zur Umwandlung von Materien fähig, die weiter geführt für den Nutzen des Ganzen bestimmt sind, theils Bewegungsorgane, theils Organe, durch welche die Einwirkungen aller Organe auf ein Centralorgan und die Rückwirkungen erfolgen. Die ersteren sind die Reproductionsorgane, die zweiten die Muskeln, die dritten die Nerven. Dann giebt es auch noch solche Theile,

Digitized by Google

die durch die schaffende und wiedererzeugende Thätigkeit oder die Grundursache aller Organe keine anderen wesentlichen Eigenschaften als physikalische Qualitäten der Festigkeit, Elasticität, Zähigkeit u. s. w. erlangen, wie die Knochen, Knorpel, Bänder, Sehnen.

Die Drüsen erlangen z. B. durch die Ernährung und Wiedererzeugung aus dem Blute die Fähigkeit, gewisse Theile des Blutes in ihrer Nähe anzuziehen, neu zu combiniren und auszuscheiden; durch denselben Act der Ernährung und Wiedererzeugung aus dem Blut erhalten die Muskeln die zur Attraction ihrer Theilchen oder zur Bewegung durch gewisse Ursachen nöthige Fähigkeit, und diese Fähigkeit ist das Product jener Erzeugung, nicht aber eine besondere Grundkraft, die von der Generationskraft verschieden wäre. So erhalten die Nerven durch eben diese Urkraft der Bildung und Wiedererzeugung aus dem Blute die Fähigkeit zu ihren Lebenserscheinungen, und ihre Fähigkeiten sind nur die Erfolge dieser Erzeugung. Ganz verkehrt scheint es aber nun gar, die Wiedererzeugung zur Indifferenz der bewegenden und sensitiven Kraft zu machen. Sieht man von den Theilen ab, welche durch den organischen Process ihrer beständigen Wiedererzeugung nur physikalische Eigenschaften der Elasticität, Festigkeit u. s. w. erlangen, so kann man die Eigenschaften der übrigen Hauptsysteme in den Thieren folgendermassen bezeichnen.

I. Organe, welche die Mischung der Flüssigkeiten für den Zweck des Ganzen verändern, wie die Absonderungsorgane, die Blutgefässe und Lymphgefässe, die Lungen. Das eigenthümliche Phänomen, welches diese Organe darbieten, ist nicht etwa die Ernährung, denn diese kömmt allen Organen zu, sondern die Veränderung der organischen Combination in den Flüssigkeiten, die mit ihnen in Berührung stehen, durch Aeusserungen organischer Affinität.

II. Muskulöse Organe, welche auf gewisse Einflüsse sich zusammenziehen, und deren Fasern sich kräuselnd gegen die Stelle, wo eine Veränderung der Muskelsubstanz geschieht, verkürzen. Haller hat die Fähigkeit der Muskeln auf mechanische, chemische und elektrische Einwirkungen sich zusammenzuziehen, Irritabilität genannt, und die Haller'sche Irritabilität kann keinen anderen Theilen als den muskulösen Theilen zugeschrieben werden, während andere sich durch Erscheinungen anderer Art von Reizbarkeit auszeichnen. Einige verwirrte Schriftsteller haben diesen Begriff von Irritabilität zu einer Formel für willkührliche Fictionen gemacht, so dass man sogar von einer Irritabilität in den Nerven gesprochen, als wenn bald die Irritabilität, bald die Sensibilität derselben verändert seyn könnte. Im lebenden Körper geschehen die Wirkungen der Muskeln immer unter dem Einfluss der Muskelnerven, und Alles, was die Zusammensetzung der Nerven nur leise verändert, bewirkt gleichsam eine Entladung der Nervenkraft, welche die Zusammenziehung der Muskeln bedingt. Daher das Studium der Bewegungen, der Krämpfe und Lähmungen grossentheils zur Untersuchung der Gesetze der Wirkungen in den Nerven zurückführt. Die Bewegung findet bei allen materiellen Veränderungen, bei der Generation, Ernährung, Absonde-

Digitized by Google

rung, statt, organische Affinität zwischen Säften und Organen bewirkt Turgescenz-Bewegungen; man muss sich wohl hüten, die Muskeln für die einzigen der Bewegung fähigen Theile zu halten; die muskulösen Theile sind nur die einzigen Organe, welche durch Zusammenziehung und Kräuseln von Fasern sich bewegen, und alle Theile, welche sich so zusammenziehen können, und nicht wesentlich Muskeln sind, sind meist durch eingestreute Muskelsubstanz, besonders Muskelfasern, beweglich, wie die Ausführungsgänge der Drüsen, welche sich, wie ich zeigen werde, contrahiren.

III. Die Nerven haben theils die Fähigkeit, bei geringen Veränderungen ihres Zustandes Bewegungen in den Muskeln zu bewirken, während die Veränderungen der Nerven selbst den Sinnen des Beobachters entgehen, theils besitzen sie ein Leitungsvermögen für jede Veränderung ihres Zustandes nach dem Gehirn, dem Centralorgane, wovon Wirkungen auf alle übrigen Organe ausgehen, und diess nennt man empfinden. Empfindungen finden nur so lange statt, als die Nerven noch mit dem Gehirne in Verbindung stehen. Viele vom Gehirn und Rückenmarke ausgehende Nerven sind durch das Gehirn und Rückenmark willkührliche Excitatoren der Bewegung in den Muskeln, so lange die Nerven noch mit Gehirn oder Rückenmark in Verbindung stehen, während sie in dieser Verbindung und ohne diese Verbindung auch unwillkührliche Zusammenziehungen der Muskeln bei einer Veränderung ihres Zustandes bewirken. Dagegen sind die vom *Nervus sympathicus* abhängigen beweglichen Theile dem Willen entzogen und nur in einer bedingten Abhängigkeit von dem Gehirn und Rückenmarke, mit welchen der *Nervus sympathicus* mittelbar, nämlich durch Vermittelung wirklicher Cerebral- und Spinalnerven zusammenhängt. In den Nerven zeigt sich die grösste Beweglichkeit der organischen Kräfte, ohne Bewegung der ponderabeln Masse, und ihre Wirkung ist zur Ausübung aller Functionen nöthig, indem alle Theile durch Veränderungen der Nerven auf Gehirn und Rückenmark zurückwirken, und von diesen aus gewisse zu ihrer Action nothwendige Einflüsse erfahren.

Diese organischen Systeme greifen verschiedenartig in einander. Alle Organe sind nur durch den Antheil von Nerven, die in ihre Gewebe treten, empfindlich, die Organe, die der chemischen Verwandlung der Flüssigkeiten dienen, sind, wenn sie sich zusammenziehen, nur durch eingestreute Muskelfasern zusammenziehbar, und alle Organe oder einzelnen Theile, in welchen ausser besonderen Lebenseigenschaften auch noch Absonderungen tropfbarer Flüssigkeiten für den Zweck des Ganzen stattfinden, haben für diesen Zweck auch eigenthümliche Gewebe, wie in den Organen der Sinnesempfindung auch tropfbare Absonderungen durch besondere Gewebe stattfinden.

Sowohl die Wechselwirkung dieser Systeme unter sich, als ihre Wiedererzeugung aus dem Blute, kann ohne Affinitätsäusserung der ponderabeln und imponderabeln Materien mit organischer Anziehung nicht vor sich gehen. Die Kenntniss dieser

Digitized by Google

Gesetze wäre von der grössten Wichtigkeit, allein wir kennen kaum einige merkwürdige Facta, wie die Anziehung des Blutes in Theilen, welche der Erection fähig sind, und wo eine grössere Thätigkeit stattfindet, und jene merkwürdige Verwachsung zweier Keime, woraus ein Theil der Doppelmissgeburten zu erklären ist, was ohne Anziehung gleichartig gebildeter Theile nicht geschehen kann, da fast in der Regel gleichnamige Theile verwachsen, Gesicht mit Gesicht, Schnauze mit Schnauze von vorn oder von der Seite, oder Hinterkopf mit Hinterkopf, von der Mitte oder von der Seite, Hals mit Hals oder Brust mit Brust, oder bloss Bauch mit Bauch, oder Seite mit Seite, oder bloss Steiss mit Steiss. Eine Verbindung, wobei immer die verwachsenden Theile beider Embryonen gemeinsam und einfach werden, und sich nach den Doppelhöhlungen hin theilen. Eine einzige Beobachtung organischer Anziehung und Abziehung an kleinsten Theilen wäre hier von unendlicher Wichtigkeit. Allein alle meine Bemühungen um ein Experiment in diesem Punkte sind fruchtlos gewesen, mochte ich einen blossgelegten und heraus präparirten Nerven eines Frosches unter das Mikroskop legen und das Ende mit Blutkügelchen umspült beschauen, oder Samen des Frosches mit Theilen des unbefruchteten Eies vom Frosche unter dem Mikroskop beobachten.

Die Gesetze der Reizbarkeit der organischen Wesen sind im Allgemeinen schon im vorigen Abschnitt untersucht worden; dort ist das Verhältniss der Lebensreize zur Aeusserung der Thätigkeit bestimmt. Hier werden nun zunächst die Gesetze der Reizbarkeit in den Thieren näher bestimmt werden, obgleich es bei dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft kaum möglich ist, Licht über diese schwierigen Probleme zu verbreiten, und doch wäre diese Kenntniss so wünschenswerth, da die Arzneikunde hier die grössten Anforderungen an die Physiologie zu machen hat.

Mag die organische Kraft das Resultat der Mischung ponderabler und imponderabler Materien seyn, oder selbst die Mischung der organischen Materie bedingen und erhalten, wir sehen, dass sie sich unter gewissen Umständen in einzelnen Organen verstärken kann; die Actionen sind in diesem Falle grösser und dauernder, wie man in den Genitalien in der Schwangerschaft und in der Brunst beobachtet. So nimmt die organische Kraft auch in dem früher organisirten Geweih der Hirsche ab, wenn es abstirbt, und verstärkt sich wieder, wenn es im organisirten Zustande von Neuem erzeugt wird. Zu einem mehr belebten Theile strömt mehr Blut, und es wird mehr Blut als sonst in organisirte Materie umgewandelt. Tiedemann sagt, dass ein gereiztes Organ schnellere Veränderungen in seiner materiellen Zusammensetzung erfahre, und eben daher auch das Blut, welches allein im Stande ist, zu gesteigerten Kraftäusserungen zu befähigen, rascher und in grösserer Menge anziehe. *Physiologie* 1. 326. Wenn dagegen ein organischer Theil einen Schaden durch materielle Umwandlung erleidet, so entsteht in einem solchen Theile dann auch eine grössere Thätigkeit zur Wiederherstellung dieses Schadens, wenn die Zersetzung des organischen Theiles nicht zu

Digitized by Google

gross gewesen. Die organischen Körper besitzen beständig das Vermögen, die zum Leben des Ganzen nöthige Zusammensetzung der Theile zu erhalten. So oft diese Zusammensetzung verletzt wird, äussert sich jenes Streben heilkräftig. Diess folgt schon aus dem Satz, dass die organischen Körper beständig der chemischen Einwirkung das Gleichgewicht zu halten suchen. Deswegen strömt einem verletzten Theile noch mehr Blut zu, weil die organische Thätigkeit sich in demselben vergrössert. Die Wechselwirkung der vermehrten organischen Thätigkeit, welche dem Anfange der Zersetzung das Gleichgewicht zu halten strebt, und des schon eingetretenen Strebens zur Zersetzung erkennt man in der Entzündung. Deswegen lässt sich aber doch nicht behaupten, dass die Entzündung wesentlich eine vermehrte Thätigkeit ist, sondern sie ist zusammengesetzt aus den Erscheinungen einer örtlichen Verletzung, einer örtlichen Neigung zur Zersetzung und einer dagegenwirkenden verstärkten organischen Thätigkeit, welche dem Zersetzungsstreben das Gleichgewicht zu halten strebt. Bei einem höhern Grade von Zersetzung in den thierischen Theilen kömmt es gar nicht zu dieser Rückwirkung, und die Entzündung entsteht nicht, wie bei den narkotischen Vergiftungen. Wenn sie aber entsteht, so kann die durch eine Verletzung bedingte Zersetzung bald so gross werden, dass die organische Rückwirkung das Gleichgewicht nicht zu halten vermag, und dass örtlicher Tod eintritt.

Diese und viele andere Fälle, ja schon die Ermüdung und Erschöpfung nach grossen Anstrengungen zeigen uns, dass die organische Kraft durch die Ausübung der Functionen gleichsam consumirt wird. Diess zeigt sich noch nach dem Tode. Denn wenn man von zwei gleichen Muskelstücken eines frisch geschlachteten Thieres den einen Theil mit dem Messer zu kleinen Zukkungen reizt, während man den andern sich selbst überlässt, so wird der erste in dem Maasse früher seine Reizbarkeit verlieren, als er sich mehr bewegt. Autenrieth's *Physiol. I.* 63. Jeder Lichteindruck stumpft das Auge einigermaasen ab, und der gleiche Reiz bringt kurz darauf keine gleiche Reaction hervor, bis sich das Auge erholt hat. Man könnte dies daraus erklären, dass ein Theil der Kraft zur Ausgleichung der durch den Reiz bewirkten materiellen Veränderungen wirkt. Allein diese Ermüdung erfolgt auch in dem Falle, wo die Thätigkeit ohne äussern Reiz vermehrt wird, sobald nur nicht die Kraft zugleich vermehrt ist. Es scheint also, dass diese Thätigkeit selbst eine materielle Veränderung in den Organen hervorbringt. Vielleicht indem jene beständige Veränderung der organischen Substanz durch die beim Athmen veränderten Bestandtheile des Blutes welche zum Leben, gleich wie die Zersetzung zu den Erscheinungen der Verbrennung nothwendig ist, beschleunigt oder vermehrt wird, da doch zur Zeit dieser Beschleunigung nicht auch die Wiedererzeugung aus den Nahrungsstoffen vermehrt ist, sondern in der Weise der Erholung erst allmählig geschehen kann. Ueberhaupt aber, je thätiger ein Mensch ist, um so grösser scheint die Zersetzung der Stoffe, und um so mehr hat Jemand Bedürf-

Digitized by Google

niss nach Nahrungsmitteln. Menschen und Thiere, die nach sehr heftigen Kraftäusserungen gestorben sind, wie z. B. ein zu Tode gejagter Hirsch, sollen selbst schneller faulen als ein zu Tode gebluteter Körper. – Autenrieth, welcher diess bemerkt, führt auch an, dass ein Muskel aus einem noch reizbaren Thiere geschnitten, ungleich schneller faule, wenn er zu häufigen Zusammenziehungen vor seinem Absterben gereizt wurde, als ein anderes gleiches Stück, das ruhig gelassen wurde. *Physiologie I.* 115, Vergl. A. v. Humboldt *über die gereizte Muskel- und Nervenfaser.* In den Verrichtungen des Nervensystems ist die Erholung besonders so nothwendig, dass selbst das gleichmässigste Leben des Schlafes bedarf, der von selbst eintritt, auch wenn die das Nervensystem in Thätigkeit setzenden Ursachen, die äusseren Reize, fortdauern, weil die durch die Thätigkeit verursachte Veränderung im Nervensysteme letzteres unempfindlich für diese Eindrücke macht.

Die beständige Wiederbelebung der organisirten Theile aus den allgemeinen integrirenden Lebensreizen ist sonst meistentheils mit der Fähigkeit zu einer gleichmässigen Thätigkeit verbunden. Wird aber die Action verstärkt und beschleunigt, so muss Ruhe erfolgen, wenn so viel Fähigkeit sich zu neuen Actionen bilden soll, als durch die Action verloren ist.

Obschon im gesunden Leben im Allgemeinen eben so viel Kraft in einer gewissen Zeit wiedererzeugt wird, als durch die Thätigkeit unwirksam geworden ist, so giebt es doch Fälle, in welchen die Wiedererzeugung allmählig immer stärker wird, bei gleichmässiger geregelter Thätigkeit oder bei abwechselnder Thätigkeit und Ruhe. Diess ist namentlich in der Jugend der Fall, weil aus früher entwickelten Gründen die Affinität der organischen Theile zu den allgemeinen Lebensreizen um so grösser scheint, je weniger die Entwickelung vorgeschritten ist; aber überhaupt wird durch eine nicht zu angestrengte Thätigkeit mit Ruhe abwechselnd die Kraft eines Organes vermehrt, wie in der Uebung, während blosse Ruhe die Organe oft erschlafft. Abwechselung von Thätigkeit oder Uebung und Ruhe, darin liegt das Geheimniss, die Kraft unserer Actionen allmählig zu verstärken. Vielleicht wird durch die Action ein Theil der Stoffe eines Organes zersetzt, wie das Leben überhaupt mit Zersetzung verbunden ist, vielleicht wird ein Theil der Stoffe durch die Action eines Organes zersetzt, während durch die vermehrte Action ein anderer Theil inniger gemischt wird, so dass ein Organ durch die Thätigkeit zwar verliert, aber durch die Action fähiger wird, neue Stoffe anzuziehen und sich zu verstärken. Wenn aber die Thätigkeit zu häufig und zu stark wiederholt worden ist, so ist die Wiedererzeugung selbst geringer, und es tritt Erschöpfung ein. Diess ist dann der Fall, wenn die Consumtion organischer Kraft oder das Unwirksam-werden derselben durch verstärkte Action schneller erfolgt, als die Wiedererzeugung in gleichen Zeiten ist. Diese Erschöpfung ist um so grösser, je mehr und je edlere Theile häufig und heftig in Thätigkeit versetzt werden, wie z. B. beim Coitus fast das ganze Nervensystem in eine mit Consumtion von

Digitized by Google

Kraft verbundene Thätigkeit versetzt wird, und je mehr ein Theil bei den Actionen anderen Organen etwas mittheilt, was er selbst verliert, wie es eben bei den Nervenactionen scheint und je mehr endlich ein Theil durch seine Action einen wesentlichen materiellen Verlust für das Ganze erzeugt, wie bei den verstärkten Absonderungen, z. B. der Milch. Die augenblickliche Unwirksamkeit der organischen Kraft nach der Thätigkeit, und ihre allmählige Wiederherstellung bemerkt man selbst noch an abgeschnittenen Theilen der Frösche, indem wahrscheinlich durch Wechselwirkung des noch in ihnen enthaltenen Blutes und der Luft mit den Organen sich die Reizbarkeit herstellt. So macht der galvanische Reiz, auf abgeschnittene Froschschenkel wiederholt applicirt, diese unwirksam, und die Reizbarkeit stellt sich erst allmählig in der Zeit der Ruhe wieder her.

Wird ein Organ seltener in Thätigkeit gesetzt, so nimmt die Fähigkeit für fernere Actionen in der Ruhe nicht so zu, wie bei einem gewissen Grade von Thätigkeit. Das Auge sieht, je mehr es in Thätigkeit gesetzt wird, bei demselben Reize augenblicklich schwächer; war es aber einige Zeit vollkommener Ruhe überlassen, z. B. im Dunkeln, so werden nun zwar die Eindrücke viel lebhafter empfunden. Stärkt man das Auge nach dem früher erörterten Gesetz durch abwechselnde Anstrengung und Ruhe allmählig, so wird es auch fähig zu grösseren Anstrengungen, ohne so bald als früher erschöpft zu werden; lässt man das Auge aber lange Zeit in vollkommener Ruhe, so hat sich zwar wieder eine grosse Empfindlichkeit, wie überhaupt nach der Ruhe, angesammelt, aber die Lebenskraft ist in diesem Theile nun um so schwächer geworden, je weniger er geübt worden, und ein plötzlicher starker Lichteindruck vermag ein lange von dem Lichte entwöhntes Auge selbst zu erblinden. Die Muskeln verlieren in langer Ruhe viel von ihrer Bewegkraft, wie sich z. B. die Fähigkeit mancher Muskeln, als der Ohrmuskeln, verliert. Autenrieth *Physiol.* 1. 104.

Bisher ist die Veränderung der organischen Thätigkeit der Thiere bloss im Allgemeinen betrachtet worden. Jetzt soll untersucht werden, wie die äusseren Einflüsse auf Veränderung derselben wirken. Nicht allein die äusseren Lebensreize, welche das Leben unterhalten, veranlassen zu organischen Wirkungen. Alles, was die materielle Zusammensetzung und das Gleichgewicht der Vertheilung imponderabler Materien in den organischen Theilen stört, kann auch die Action der Organismen und Organe verändern. Diese Veränderung nennt man *Reaction*, wenn sie lebhaft ist; die Einwirkung, welche die Reaction von Seiten des Organismus hervorbringt, nennt man *Reizung*, Irritation, und die verändernde Ursache *Reiz*, Irritamentum. Die Reaction gegen einen Reiz ist immer eine Lebenserscheinung, eine Aeusserung einer organischen Eigenschaft des Organismus. Die Fähigkeit, durch äussere Einwirkungen zu Kraftäusserungen bestimmt zu werden, ist nicht den organischen und insbesondere thierischen Körpern allein eigen. Viele unorganische Körper entwickeln z. B. Licht unter gewissen Bedingungen, z. B. beim Stoss, oder ent-

Digitized by Google

wickeln Wärme. Die Physiker machen es hierbei wahrscheinlich, dass das Licht oder die Wärme vorher in den Körpern gebunden waren, und durch den äussern Einfluss frei werden. Noch mehr könnte man die elastischen Körper hieher rechnen, deren kleinste Theilchen so sehr einander anziehen, dass ein Versuch zur Verschiebung mehrerer Theilchen oft auf alle zurückwirkt, und dass durch die Anziehungskräfte der Theilchen zu einander eine restitutio in integrum erfolgt, die sich unter dem Phänomen der Elasticität und der Schallschwingungen äussert. Allein kein unorganischer Körper zeigt sich so gleichförmig in diesen Aeusserungen als die Organismen, die unter den verschiedenartigsten Einwirkungen, welche die Zusammensetzung der Theilchen stören, immer das nämliche Phänomen, zu dem ein Organ durch sein Leben befähigt wird, äussern. Diess rührt wahrscheinlich von jener Grundeigenschaft der organischen Körper her, den Störungen ihrer Zusammensetzung das Gleichgewicht zu halten, eine Kraft, die im gesunden Falle viel grösser ist als die Ursache, welche die Zusammensetzung des organischen Körpers stört. Jene Kraft, welche das Gleichgewicht in den organischen Theilen nach einer Störung derselben wiederherstellt, ist dieselbe, welche einen Theil eigenthümlich durch die beständige Ernährung und Wiedererzeugung erhält. Das Phänomen, welches bei der Herstellung des Gleichgewichtes erfolgt, ist zusammengesetzt von der Veränderung des organischen Theiles durch eine äussere Ursache und von dem Streben des organischen Theiles zur restitutio in integrum, zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes. Dutrochet behauptet, dass alle erregenden Ursachen auf den Organismus die gleiche Veränderung hervorbringen, dass sie die Oxydation des ihnen ausgesetzten organischen Stoffes modificiren; nach ihm sollen die erregenden Ursachen gleichzeitig auf den Sauerstoff und auf den organischen Stoff wirken, um sie zu einer Verbindung zu bewegen. So ingeniös diese Ansicht ist, so ist sie doch eine bis jetzt ganz unbegründete Vermuthung, eben so wie Dutrochet's Folgerung, dass die Excitabilität eine wirkliche Verbrennbarkeit sey. Diese soll in der Jugend sehr gross seyn, weil in dieser Lebensperiode der Organismus in hohem Grade oxydirbar sey und nur wenig gebundenen Sauerstoff besitze, im Alter dagegen sollen die Erregungsmittel wenig Wirkung haben, weil die Tendenz zur Oxydation geringer ist, und zwar im Verhältnisse der Menge des schon gebundenen Sauerstoffes. Alles diess ist hypothetisch. Froriep's *Notizen* 724.

Zu einer jeden Reizung eines organischen Theiles gehört irgend eine materielle Veränderung in demselben, die wir selbst bei dem Reize des Lichtes auf das Auge voraussetzen müssen; nämlich Licht scheint in die Zusammensetzung vieler Körper einzugehen, und bewirkt chemische Veränderungen, wie sich an vielen chemischen Präparaten und selbst an den Pflanzen zeigt, aus denen es Sauerstoff entwickelt. Die nächste Veränderung, welche ein Reiz hervorbringt, ist durch die Natur des Reizes und des organischen Körpers, welcher gereizt wird, bedingt, z. B. eine Zusammendrückung, eine chemische Veranderung; allein die dar-

Digitized by Google

auf folgende Gegenwirkung widerstrebt dieser Veränderung und ist von der Natur des Reizes ganz verschieden, nicht mechanisch, nicht chemisch, sondern eine Aeusserung der Lebenseigenschaft eines Organes, wie Empfindung als Schmerzen, oder Entzündung, oder Zuckung. Wärme, Electricität, Licht theilen sich den organischen Körpern wie anderen nach allgemeinen physicalischen Gesetzen mit, aber es entsteht bei der restitutio in integrum immer zugleich eine Lebensäusserung, verschieden nach dem Theile, welcher verändert wird, und die Phänomene bis zur Herstellung des Gleichgewichtes sind zusammengesetzt aus der Wirkung des Reizes und der Reaction gegen den Reiz. Die chemisch wirkenden Stoffe verändern auch die organischen Körper und suchen binäre Verbindungen auf Kosten der organischen Körper zu erzeugen. Wenn diess gelingt und die Affinität der organischen Theile nicht hinreicht, die organische Combination zu erhalten, und der chemischen Einwirkung das Gleichgewicht zu halten, so entsteht ein chemisches Product mit dem Tode des afficirten Theiles, z. B. bei der Verbrennung, bei der Einwirkung einer Mineralsäure, eines caustischen Alkali's. Allein so lange der organische Theil, welcher einem chemisch wirkenden Körper ausgesetzt wird, noch lebt, so lange agirt er auch in den ihm eigenen Wirkungen, z. B. Empfindungen, Bewegungen, Entzündung. Chemische Einflüsse, wie Säuren, Alkalien, können zwar an dem Ort ihrer Einwirkung auf organische Körper binäre Verbindungen hervorbringen und auf diese Art Brand oder Tod bewirken; allein so weit an einem so afficirten Theile noch Leben besteht, und an der Grenze des Todes äussert es sich auch in den organischen Eigenschaften, wie Entzündung u. s. w.

Aber nicht allein ist die Wirkung der thierischen Körper gegen äussere Reize Reaction in organischen Eigenschaften, sondern die Art dieser Reaction, die Eigenschaften, welche reagiren, sind häufig verschieden nach der Natur eines Theiles und seiner Zusammensetzung. Daher bewirken z. B. mechanische, chemische, electrische Reize, auf einen Muskel angewandt, dieselbe Reaction des Muskels, nämlich Bewegung. Alle diese verschiedenen Reize bewirken dagegen in einem Empfindungsnerven nur Empfindungen, und die Art der Empfindung ist selbst bei verschiedenen Nerven verschieden, wenn gleiche, und bei denselben Nerven gleich, wenn verschiedene Reize darauf wirken. So z. B. bewirken mechanische und electrische Reize in den Sehnerven nur Lichtempfindungen als Eigenschaften dieser Nerven, und scheinen keinen Schmerz zu bewirken, während die Empfindungen des Schmerzes und nicht des Lichtes in den Gefühlsnerven möglich sind. So erregen mechanische und electrische Reize, auf den Gehörnerven wirkend, Tonempfindungen, der electrische Reiz in dem Geruchsnerven Geruchsempfindungen. So erregen die vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven im gereizten Zustande von mechanischem oder galvanischem Reize keine Empfindungen, sondern Zuckungen in den Muskeln, aber die hinteren Wurzeln dieser Nerven erregen unter denselben Umständen nur Empfindungen, keine Zuckungen. Die Physiologie gewinnt eine eben

Digitized by Google

so sichere Empirie, wie die übrigen Naturwissenschaften, wenn sie die eigenthümliche Reactionsart aller Theile des thierischen Körpers kennt.

Es ist nun nicht auffallend, dass die Symptome desselben Organes in ganz verschiedenen Zuständen sich oft sehr ähnlich sind, weil es z. B. im Zustande von gereizter Kraftäusserung so gut wie im Zustande der Reizung bei abnehmender Kraft die ihm eigenen Lebenseigenschaften mit mehr oder weniger Energie kund giebt. Es giebt eine gewisse Gruppe von Hirnsymptomen, Herzsymptomen, die in verschiedenen Krankheiten dieser Theile vorkommen. Hierbei lässt sich ein Blick auf die Thorheit der Homöopathen werfen, welche mit Mitteln, die eine der Krankheit ähnliche Wirkung hervorbringen, zu heilen glauben, während sie doch entweder gar nichts thun, oder während die Natur die ihr dargebotenen Mittel anders verwendet als der Arzt glaubt. Wenn zwei Mittel einige ähnliche Symptome in einem Organe hervorrufen, so beweist diess noch nicht, dass sie ganz ähnliche Wirkungen hervorbringen, sondern dass sie auf dasselbe Organ wirken, wobei ihre qualitativen Wirkungen ganz verschieden seyn können. Syphilis und Mercurialkrankheit können wesentlich verschieden seyn, und doch sich darin gleichen, dass gewisse Organe in beiden Krankheiten zerstört sind. So zerstören Mineralsäuren und Alkalien die organischen Theile gleich stark, und Niemand wird behaupten, dass sie Similia seyen. So kann also Mercur durch gelinde Umwandlung der organischen Materie sie für die Fortsetzung der syphilitischen Zerstörung unfähig machen, worauf der natürliche Lebensprocess (nicht der Mercur) die weitere Heilung bewirkt.

Da die Reize die Organe in Thätigkeit setzen, und jede ohne gleichzeitige Vermehrung der organischen Kraft vermehrte Thätigkeit die Kraft für eine Zeit unwirksam macht, und gleichsam consumirt, so consumiren auch die Reize und bewirken insofern, wenn sie nicht integriren, wie die allgemeinen Lebensreize, jedesmal einen Nachlass der hervorgerufenen Thätigkeit, auch wenn sie fortfahren einzuwirken. Hierdurch entsteht das Periodische mancher Lebenserscheinungen. Ein contractiles Organ, welches eine mechanisch oder chemisch reizende Materie enthält, zieht sich zusammen. Durch diesen Act wird der contractile Theil unfähig, sich in dem nächsten Momente gleich stark zusammenzuziehen; aber die Erregbarkeit entsteht allmählig wieder, und der fortdauernde Reiz wird wieder wirksam. So können sich die Zusammenziehungen von Zeit zu Zeit wiederholen. Wir sehen dieses Schwanken in den Undulationen der Iris bei gleichbleibendem Lichteinflusse, in den periodischen Zusammenziehungen des Mastdarmes, der Gedärme, des Magens, des Herzens, des Uterus, der Harnblase, der Muskeln, welche die Contenta der Harnröhre bei dem Coitus austreiben. Der Reiz der Zusammenziehung ist hier oft äusserlich, ein Contentum, wie der Harn, die Excremente u. s. w. Er scheint aber auch oft innerlich, z. B. durch die Nerven zuzuströmen, während die Contraction doch periodisch ist, wie z. B. beim Herzen. Denn wenn auch das

Digitized by Google

Herz durch seine Zusammenziehung abwechselnd Blut austreibt, und zugleich von der andern Seite Blut empfangen muss, und dieser Reiz des Blutes das Herz zu periodischen Contractionen veranlassen muss, so ist doch das Contentum des Herzens nicht die einzige und erste Ursache der rhythmischen Contraction des Herzens; denn das Herz zieht sich auch ausgeschnitten noch lange, besonders bei Amphibien, im blutleeren Zustande rhythmisch zusammen, und es scheint nicht, dass bloss die Luft hier den Reiz ersetze, sondern dass ein innerer, von der Wechselwirkung der Muskelfasern und der Nerven bedingter Reiz stattfinde, der periodisch wirkt, oder auf den das Organ nur periodisch rückwirken kann.

Reize, welche zu häufig fortgesetzt werden, stumpfen die Organe ab und machen sie für lange unfähig für diese Reize. Hieraus ist ein Theil der Erscheinungen erklärlich, welche die Gewöhnung an einen Gegenstand darbietet, obgleich viele Dinge, an welche man sich gewöhnt, nicht bloss Anfangs Reizerscheinungen, sondern auch qualitative dauernde Veränderungen durch Aenderung der Zusammensetzung bewirken, woraus allein schon das Unwirksamwerden dieser Reize erklärlich ist.

Da die grosse Menge auf den Organismus einwirkender Agentien und Stoffe je nach ihrer Natur und Zusammensetzung die Zusammensetzung der organischen Theile auf die mannichfaltigste und im Einzelnen nicht zu bestimmende Art abändern können, so ist es nicht möglich, die Arzneimittel nach der Art ihrer Wirkungen unter allgemeine passende Gesichtspunkte zu bringen; diess ist die schadhafte Seite der Medicin. Die besten Schriftsteller über diese Materie haben noch viel zu viel mit nicht existirenden und bloss gedachten Factoren und Polaritäten, unfruchtbaren Formeln in unserer Wissenschaft zu thun. Doch kann es im Allgemeinen nur vorzüglich drei Arten dieser Einwirkung geben.

1) *Reizmittel.* Die wahren und wichtigsten Reizmittel sind die Lebensbedingungen selbst, die Lebensreize, durch deren beständige Einwirkung auf die von der organischen Kraft beseelten Theile das Leben allein sich äussert, und die organische Kraft sich vermehrt, ein gewisser Grad Wärme, atmosphärische Luft, Wasser, Nahrungsstoffe, die schon organisirt waren, von Pflanzen oder Thieren. Diese Einflüsse verändern nicht bloss die Zusammensetzung der organischen Theile, und reizen nicht bloss durch Veränderung des Gleichgewichtes, sondern gehen auf eine für das Leben unentbehrliche Weise integrirend in die Zusammensetzung der Organe ein. Nach einer Krankheit sind diese beständigen Einflüsse, welche, indem sie reizen, keine Erschöpfung zulassen, auch die wahren und allein hinreichenden Mittel zur Erholung der Kräfte. Ausser diesen Einflüssen giebt es noch viele andere, welche nach dem vorher aufgestellten Begriffe von Reiz auch Reactionen hervorbringen, aber nicht unbedingt und überhaupt nicht alle integriren, sondern welche grossentheils, ausser dass sie Symptome, Erscheinungen hervorbringen, gar keinen belebenden Einfluss auf die organischen Körper, vielmehr im Maasse der materiellen Veränderung, die sie bedingen, sogar sehr

Digitized by Google

nachtheilige Folgen haben. Die Verwechselung aller Einflüsse, nach welchen nur das Gleichgewicht in dem Organismus sich herstellt, und welche dadurch Erscheinungen bewirken, mit solchen Einflüssen, welche zur Erhaltung des Lebens unbedingt nöthig sind und integriren, hat in der Medicin unendlichen Nachtheil gehabt und vielen Menschen das Leben gekostet, indem man hierdurch zu dem falschen Begriffe gelangt ist, dass, weil gewisse Reize das Leben gleich der Flamme anfachen, Reizen überhaupt zum Leben nothwendig sey. Unter der Menge der Einflüsse ausser den allgemeinen Lebensreizen giebt es nun wieder solche, welche bedingt unter gewissen Umständen auch einen den allgemeinen Lebensreizen ähnlichen localen, belebenden und stärkenden Einfluss haben, indem sie nämlich durch ihren ponderabel und imponderabel materiellen Einfluss die Zusammensetzung eines Organes integriren oder so verändern, dass die Wiedererzeugung aus den allgemeinen Lebensreizen leichter wird. Alles dieses ist aber durch den Zustand des kranken Organes bedingt, und die Fälle, in welchen solche im Rufe der Belebung und Stärkung stehende Arzneien diess wirklich thun, sind ungemein selten. Dagegen schon Mancher mit einem Quark von Mitteln, welche unter den vorhandenen Umständen oder überhaupt wohl reizen, aber nur einen Aufruhr erregen, nicht stärken, zu Tode gereizt worden ist. Die zu den bedingt belebenden Stoffen gehörigen Arzneien wirken durch ihre Zusammensetzung auch vorzugsweise auf Organe von verschiedener organischer Zusammensetzung belebend ein, und bilden natürliche Gruppen je nach ihrer vorzugsweisen Wirkung auf das Nervensystem oder auf die Organe, welche der Umwandlung des Blutes bestimmt sind, u. s. w. Mehrere Einflüsse dieser Art sind imponderable Materien, wie die Elektricität. Die Elektricität hat man mit Erfolg in Lähmungen angewandt. Die Wärme, derjenige Einfluss, der bei der Entwickelung des Embryo schon nothwendig ist, hat aber auch noch einen eminenten Einfluss auf Belebung, wenn andere Mittel fruchtlos sind, z. B. in den Krankheiten der Nerven und des Rückenmarkes, Lähmungen, Neuralgia dorsalis, und anfangender Tabes dorsalis, wenn die Application der Wärme z. B. in Form von Moxen geschieht und oft wiederholt wird (auch wohl eine neue Moxa auf das wuchernde Fleisch der alten Stelle), wobei freilich das Setzen nur einer Moxa Spielerei ist. Einen viel nachhaltigern Eindruck belebender Wärme, besser als Moxa und Glüheisen, bewirkt das anhaltende schmerzhafte Erhitzen eines kranken Theiles durch eine nahe gehaltene brennende Kerze, wobei man die wohlthätige Wirkung einer schmerzhaften Erhitzung ohne Brandbildung und spätere Eiterung hat, die hierbei oft von keinem Nutzen ist, und wobei man zugleich die Wirkung lange unterhalten kann, während sie bei der Moxa und dem Glüheisen kurz und vorübergehend ist. Wie die Wärme in diesen Fällen wirkt, ist unklar; die Moxen wirken in Krankheiten des Rückenmarkes nur in der Nähe dieses Organes selbst, während doch allenthalben Schmerz erregt werden kann.

Der mechanische Einfluss ist in den Frictionen bedingt be-

Digitized by Google

lebender Reiz, wahrscheinlich, indem dadurch gelinde chemische Umwandlungen in der Zusammensetzung der Theile bewirkt werden, wodurch die Affinität der Theile zu den allgemeinen Lebensreizen, die im Organismus selbst sind, zunimmt.

Auf der andern Seite können alle Mittel dieser Art, sowohl Arzneien als die höheren Wärmegrade, wie in der Verbrennung, die Elektricität, der mechanische Einfluss, als Druck, Quetschung, in einem hohen Grade ihrer Einwirkung gerade das Gegentheil der Belebung hervorbringen, indem sie dann die Materie so gewaltsam verändern, dass die zum Leben nöthigen Zusammensetzungen nicht erhalten werden; deswegen sind die hier berührten Einflüsse specielle, bedingt belebende Einflüsse. Sie beleben unter gewissen Umständen, indem ihre Wirkung in der organischen Materie die natürliche Zusammensetzung der Theile befördert. Daher kann man sie homogene Reize nennen, wenn man alle übrigen Reize, welche die natürliche Zusammensetzung und so den Zustand der Kräfte nur stören, heterogene Reize nennen kann, die von keinem belebenden, sondern nachtheiligen Einfluss für das Leben sind. Man bedenke aber nur, dass jedes homogene Reizmittel durch Anwendung unter unpassenden Umständen zum heterogenen Reizmittel wird, d. h. zu einem solchen, welches bloss den Zustand der Kräfte und die natürliche Zusammensetzung stört. Nach diesen Erklärungen zerfallen die reizenden Einflüsse also 1. in allgemeine Lebensreize, 2. specielle Reize, a. homogene, b. heterogene. Ich erwähnte schon, dass nach Dutrochet die wahren Erregungsmittel so wirken sollen, dass sie die Bindung des Sauerstoffes mit der organischen Materie befördern und beschleunigen. Vielleicht beruht die reizende chemische und dynamische Wirkung mancher Reizmittel wenigstens darauf, dass sie die Affinität zwischen dem durch das Athmen zum Reizmittel gewordenen Blute und der organischen Substanz befördern, und die materiellen Umwandlungen in der organischen Materie durch dieses Princip im Blute verstärken und beschleunigen.

In Fällen, wo die Lebenskraft schnell abnimmt, verlässt uns übrigens der ganze Apparat unserer reizenden Arzneien, wovon ein grosser Theil ohnehin nur einen Aufruhr macht, ohne zu stärken.

2. *Alterantien.* Eine grosse Menge von Stoffen werden in der Arzneikunde darum von grosser Wichtigkeit, weil sie eine solche chemische Umwandlung in der organischen Materie erzeugen, wodurch die Materie nicht etwa unmittelbar integrirt wird und an Kraft gewinnt, sondern ein in der Zusammensetzung der Materie befindliches materielles Hinderniss zu gesunden Actionen oder ein Reiz zu kranken Actionen entfernt wird, oder die Organe so chemisch verändert werden, dass sie von einem krankhaften Reiz nicht mehr afficirt werden; oder, weil die Materie so verändert wird, dass gewisse zu fürchtende materielle Veränderungen und Zersetzungen nicht mehr möglich werden (wie bei dem entzündungswidrigen Verfahren); oder endlich, weil sie die Beschaffenheit der Nahrungssäfte verändern. Eine grosse Menge wichtiger Mittel gehören unter die *Alterantien.* Der Arzt kann damit keine krankhaft zusammengesetzten Organe chemisch zu gesunden ma-

Digitized by Google

chen, sondern nur durch eine gelinde chemische Umwandlung den Antrieb geben, dass die Natur selbst durch die unerschöpfte Quelle der beständigen Wiedererzeugung die natürliche Zusammensetzung wiederherstellt. Diese Mittel bieten wieder den Hauptunterschied dar, ob sie in dieser Art mehr auf das Nervensystem, oder auf die übrigen vom Nervensystem abhängigen Organe wirken. In der ersten Hinsicht sind die wichtigsten Alterantien die sogenannten Narkotica, in letzterer die grosse Menge der Arzneimittel, die auf die Veränderungen der Materie in den übrigen Organen wirken. Auch diese Mittel werden mittelbar, indem sie die Hindernisse zur Heilung entfernen, zu belebenden Reizen, so wie ihre Anwendung selbst auch durch Veränderungen des Gleichgewichtes Reizungssymptome bewirken kann. Werden diese Mittel unangemessen angewandt, so wirken sie entweder als heterogene Reize nachtheilig, oder indem sie schnell zersetzen, mit der Zersetzung die organische Kraft aufheben, wie die Narkotica. Da nun aber alterirende Mittel ganz verschieden nach ihrer Zusammensetzung in die Zusammensetzung der Organe eingreifen, so kann ein Stoff seine Wirkung durch Sättigung verlieren und keine Veränderungen mehr hervorbringen, während sie ein anderer noch hervorbringt. Eine grosse Menge der Fälle, welche zu den Erscheinungen der Angewöhnung gehören, sind hieher zu rechnen. Auch die Anwendung der Arzneien zeigt unzähligemal die Bestätigung davon. Die Organe haben durch ein chemisch die Zusammensetzung veränderndes, alterirendes Mittel eine solche Veränderung erlitten, dass dieser Stoff nicht mehr dieselbe Affinität von Seite des Organismus gegen sich vorfindet, während sie ein anderer Stoff noch haben kann. Auch imponderable Materien wirken auf diese Art alterirend: das Auge wird für die grüne Farbe, die es lange ansieht, immer unempfindlicher, das Grüne wird immer schmutziger und grauer. Zu dieser Zeit ist aber die Empfindlichkeit des Auges für Roth am grössten, dagegen langes Ansehen von Roth für Grün empfänglich macht. So mindert langes Betrachten eines gelben Feldes die Empfindlichkeit für Gelb, und steigert die für Violett und umgekehrt; langes Ansehen von Blau steigert die für Orange, und umgekehrt während die lange fixirte Farbe selbst immer schmutziger gesehen wird.

III. *Zersetzende Mittel.* Hieher sind diejenigen Einflüsse zu rechnen, welche, ohne erst zu reizen oder eine unschädliche Alteration zu bewirken, sogleich die organisirten Theile zersetzen. Es gehören hieher theils Einflüsse, welche im gelinden Grade der Einwirkung reizend, aber durch stärkere Einwirkung den Zustand der Kräfte zu wesentlich stören, wie Wärme, Elektricität u. s. w., theils *Alterantia*, die im höhern Grade von Einwirkung die Zusammensetzung heftig verändern, indem sie mit einer Gewalt der Wirkung, Combinationen mit organischen Stoffen erzeugen, welcher die organische Kraft das Gleichgewicht nicht zu halten vermag, wie die *Alterantia narcotica* auf diese Art zu zersetzenden Stoffen werden, und die *Alterantia*, welche in die Bildung und Umwandlung der organischen Säfte eingreifen, z. B.

Digitized by Google

Antimonialia, Mercurialia, Mineralsäuren, Alkalien bei dem heftigsten Grade ihrer Einwirkung im concentrirten Zustande eben so zersetzend werden. Die Reize können auf doppelte Art desorganisiren. Erstens können sie nur in einem gewissen Grade Reize seyn, bei höherem Grade der Einwirkung, statt selbst zu integriren, oder die Integration durch Erregung neuer Affinitäten zu befördern, sogleich die Zusammensetzung wesentlich verändern. Dann geht dem örtlichen oder allgemeinen Tode gar keine Reizung mehr voraus, sondern die Zersetzung erfolgt unmittelbar, wie bei dem Tode durch Elektricität, Blitz u. s. w. Oder ein an sich bedingter Weise integrirender Reiz setzt ein Organ zu lange in Thätigkeit, so dass nach den Gesetzen der Erregung in einer gewissen Zeit mehr Kraft unwirksam wird, als in eben so viel Zeit Ruhe wieder wirksam werden kann. Dieses nennt man Ueberreizen. Ein Organ wird dabei fortdauernd schwächer, wie bei der Ueberreizung des Auges durch das Licht. Die Arzneikunde macht von zersetzender Wirkung der Stoffe nur Gebrauch, wenn sie wirklich zerstören will.

John Brown, als er in den *Elementa medicinae* durch Entdekkung einiger Gesetze der Reizbarkeit den ersten Schimmer eines wissenschaftlichen Systems der Medicin in einer noch rohen, für die Anwendung gefährlichen Gestalt gab, kannte so wenig als seine Nachfolger in der Erregungstheorie die durch die *Alterantien* verursachte Wirkung. Nach der Brown'schen Theorie giebt es keine Veränderung der erregbaren Kräfte ohne vorausgegangene Erregung, und die Erregbarkeit sollte mit dem Leben nur durch Ueberreizung erschöpft werden können. Die Brownianer mussten behaupten, überall, wo eine Einwirkung erschöpft, ging eine absolute Ueberreizung voraus. Sie führten als Beweise für diese Behauptung an, dass gewisse Stoffe, die in geringem Maasse angewandt einigermaassen reizen, in grösserem Maasse eine ganz andere Wirkung, und im grössten Maasse Erschöpfung hervorbringen, wie z. B. Opium. Im letztern Falle, sagten sie, ist die Zeit der Reizung ausserordentlich klein und unmerklich. So erklärten sie auch die Wirkungen aller schnell schwächenden Einflüsse. Allein es giebt viele Stoffe, welche in kleinen Gaben schon schwächer diese zersetzenden Wirkungen hervorbringen, wie irrespirable Gasarten, das Viperngift u. s. w. Die Contrastimulisten Rasori, Borda, Brera, Tommasini haben diesen Fehlgriff von Brown und seinen Nachfolgern aufgegriffen, und die Stoffe, welche statt zu reizen, gleichsam das Gegentheil davon thun, nämlich die Fähigkeit gereizt zu werden vermindern, *Contrastimulantien* genannt, so dass sie ihre Arzneien in *Stimulantien* und *Contrastimulantien* eingetheilt haben; allein obgleich sie einen grossen Missgriff von Brown eingesehen, so haben sie doch die alterirende Wirkung so vieler Arzneimittel, die oben festgestellt worden ist, nicht erkannt.

Die Unterscheidungen von Brown beruhen auf einer ganz einseitigen Anwendung einiger wohlgegründeten *Facta* von der Reizbarkeit, und auf einer Vermengung der integrirenden Lebensbedingungen oder der Lebensreize, Wasser, atmosphärischer

Digitized by Google

Luft, Nahrungsstoff, bestimmter Wärmegrade mit denjenigen Stoffen, welche nur die Reaction der organischen Kräfte und die gesunde Zusammensetzung verändern, und insofern reizen, ohne zu integriren. Ein narkotisches Mittel, d. h. ein *Alterans der Nerven*, kann von Anfang bis zuletzt Symptome hervorbringen: indem es die Zusammensetzung verändert, insofern wirkt es auf jene Grundeigenschaft der organischen Körper, von aussen, nach inneren Gesetzen bestimmt, oder wenn man will, gereizt zu werden; aber dieser Reiz ist kein Reizmittel im therapeutischen Sinne, wo man darunter einen die Organe belebenden und ihre Zusammensetzung integrirenden Reiz versteht.

John Brown hat die Krankheiten in sthenische und asthenische eingetheilt. In den ersteren sollte die Lebenskraft vermehrt, in den letzteren vermindert seyn. Indessen ist die Krankheit, worin die Lebenskraft vermehrt ist, ein Widerspruch, und es giebt nur unendlich viele locale oder allgemeine Fehler in der Zusammensetzung der organisirten Theile, wobei die allgemeinen Kräfte bald gleich von Anfang darniederliegen, oder im Anfange vorhanden, später abnehmen; daher ist die naturhistorische Eintheilung der Krankheiten nach den afficirten Organsystemen und nach den naturhistorischen Krankheitsbildern die zweckmässigste. Man hat immer gern die Entzündung als eine Krankheit mit vermehrter Lebenskraft angesehen; die Entzündung ist eine Krankheit, wobei gewisse Erscheinungen verstärkt sind, wie die Wärme; die Menge des Blutes in den kleinsten Gefässen ist grösser; andere Erscheinungen verändert sie, während die Function eines Organes darniederliegt und die Empfindungen eine heftige Verletzung anzeigen. Durch eine Entzündungsursache entsteht eine chemische Veränderung in der Zusammensetzung eines Organes, wir bringen sie auf diese Art durch chemische Agentien hervor. Hiedurch kann eine chemische Affinität, eine Anziehung zwischen dem Blut und der chemisch veränderten Substanz eines Organes entstehen. Diese Affinität kann grösser als im gesunden Zustande zwischen dem belebten Theile und dem Blute seyn. Ob nun aber diese verstärkte Affinität zwischen Substanz und Blut in der Entzündung bloss eine Verstärkung der natürlichen organischen Anziehung ist, wie sie sich in gewissen gesunden Phänomenen wirklich verstärkt, wie in allen Phänomenen der Turgescenz, oder ob diese Affinität wirklich verschieden ist von der lebendigen Anziehung, und mehr eine neu entstandene chemische Affinität zwischen der zersetzten Substanz und dem Blute ist, ist nicht mit Sicherheit auszumachen, Wenn aber auch diese vermehrte Affinität zwischen Blut und Substanz wirklich eine Verstärkung der beständigen Wechselwirkung zwischen Blut und Substanz wäre, so ist die Entzündung doch noch keine Krankheit mit vermehrter Lebenskraft, denn die Erscheinungen der Entzündung entstehen eben sowohl von dem vorhandenen Streben zur Zersetzung, verursacht durch chemische Veränderung, als von der Reaction der organischen Theile gegen diese Zersetzung.

Die innige Wechselwirkung aller Theile des Organismus, besonders durch Vermittelung des Nervensystems, bewirkt in dem

Digitized by Google

thierischen Körper eine Art Statik der Kräfte, wo eines alle übrigen bestimmt; auch eine auf einen Theil wirkende Krankheitsursache, indem sie Veränderungen ponderabler und imponderabler Materien bewirkt, wirkt durch eine Kette von Veränderungen oft bis in entfernte Theile, welche für diesen Krankheitseinfluss gerade am empfänglichsten sind. Nicht allein, dass die Entziehung von Stoffen an einem Orte die Anhäufung von ähnlichen oder unähnlichen Stoffen an einem andern Ort verhindert, worauf die Anwendung der Ausleerungen in anderen Orten als dem leidenden beruhet. Die Vermehrung der organischen Thätigkeit in einem Organ erregt viele andere Theile; so steht die Vermehrung der organischen Thätigkeit in den Genitalien im Zusammenhang mit der Wiedererzeugung des Geweihes bei den Hirschen, mit der Veränderung vieler Organe bei dem Menschen, Veränderungen, welche dort wie hier die Castration aufhebt. Auch die integrirende Reizung eines Theiles wirkt belebend auf das Ganze zurück, namentlich von der Haut auf die Centralorgane des Nervensystems durch die Nerven, wie man denn mit Erfolg Frictionen und andere Hautreize zur Wiederbelebung anwendet.

IV. Ueber die den unorganischen und organischen Körpern gemeinsamen Wirkungen.

Die organischen Körper theilen die allgemeinen Eigenschaften der ponderablen Materie. Die Mechanik, Statik, Hydraulik finden auch hier ihre Anwendung. Mehrere Eigenschaften, welche organische Materien mit unorganischen gemein haben können, wie Cohärenz, Elasticität, u. s. w. entstehen aber nur unter dem fortwährenden Wirken der organischen Kraft zur Erzeugung einer gewissen Mischung, wie die elastische Arterienhaut ihre Elasticität einige Zeit nach dem Tode verliert. Dann ist die Anwendung der Mechanik, Statik, Hydraulik auf die organische Physik deswegen beschränkt, weil die organischen Ursachen der Bewegung hier am meisten interessiren. Auch die imponderablen Materien, Elektricität, Wärme, Licht, kommen in den organischen Körpern zur Erscheinung. Mit diesen Wirkungen werden wir uns jetzt besonders beschäftigen.

I. Entwickelung von Elektricität.

Frictionselektricität kann bekanntlich vorzüglich an vielen Körpern organischen Ursprungs entwickelt werden; die galvanische oder Berührungs-Elektricität entsteht nicht bloss durch Contact von heterogenen Metallen; viele andere Materien (besonders Kohle, auch Graphit) können nach den Untersuchungen von A. v. Humboldt und Pfaff die elektromotorischen Metalle ersetzen, und selbst verschiedene thierische Theile wirken in leitender Verbindung in schwächerm Grade ähnlich verschiedenen Metallen. Es würde daher eine ganz falsche Vorstellung seyn, wenn man in den Eigenschaften der verschiedenen Metalle allein die Ursachen

Digitized by Google

der galvanischen Elektricität suchen wollte. Seebeck hat entdeckt, dass sogar homogene Metallstangen von verschiedener Temperatur an einander gelegt, galvanisch werden, dass eine einfache Metallstange an beiden Enden verschieden erwärmt, galvanische Elektricität erzeugt; so dass Heterogeneität der Theile beim Contacte durch Spannung der in allen Körpern vorhandenen elektrischen Materie in + E und — E, oder Veränderung des Gleichgewichtes in der elektrischen Materie und leitende Verbindung die allgemeinsten Bedingungen zur Erzeugung des Galvanismus zu seyn scheinen. Unter diesen Umständen werden auch galvanische Erscheinungen an thierischen Theilen beobachtet. A. v. Humboldt entdeckte, was ich öfter bestätigt gefunden habe, dass schwache Zuckungen in einem Froschschenkel erfolgen, wenn man einen Nerven und Muskel mit einem frischen Stück Muskelfleisch zugleich berührt. Diese Erscheinung gehört zwar zu den seltneren der galvanischen Versuche, ich kann jedoch ihre Richtigkeit bestätigen. Buntzen baute sogar eine schwache galvanische Säule von abwechselnden Lagen von Muskelfleisch und Nerven. Nach Prevost und Dumas wirkt schon eine Kette von homogenem Metall, frischem Muskelfleisch und Salzwasser oder Blut auf das Galvanometer. Wenn man an die Conductoren des Galvanometers Platten von Platina befestigt und an die eine ein Stück Muskelfleisch von einigen Unzen bringt und die Conductoren in Blut oder eine Salzlösung taucht, entsteht eine Deviation der Magnetnadel des Instrumentes. Eben so, wenn man an einen Conductor ein mit salzsaurem Antimon oder Salpetersäure befeuchtetes Stück Platina, an den andern Conductor ein Fragment von Nerve, Muskel oder Gehirn bringt und beide berührt. Magendie *Journal de Physiol. T. 3.* Kaemtz (Schweigg. *Journ.* 56. 1.) hat ferner gezeigt, dass sich wirksame trockne Säulen auch aus organischen Körpern ohne alle Mitwirkung metallischer Körper errichten lassen. Concentrirte Lösungen von organischen Körpern wurden auf dünnes Papier aufgetragen und aus Scheiben dieses Papiers Säulen aufgebaut, so dass zwei ungleichartige Schichten durch zwei Papierdicken getrennt waren; die Elektricität dieser Säulen ward an einem Bohnenbergerschen Elektrometer geprüft. So zeigten sich

positiv		negativ
Natron	gegen	Hammeltalg.
Hefen	—	Rohrzucker.
Hefen	—	Kochsalz.
Hefen	—	Milchzucker.
Leinöl	—	Zucker.
Leinöl	—	weisses Wachs.
Stärkemehl	—	Gummi.
Gummi	—	Salep.
Gummi	—	Traganthschleim.
Gummi	—	Bärlappsamen.
Eiweiss	—	Gummi.
Eiweiss	—	Ochsenblut.
Ochsenblut	—	Belladonnenextract.
Ochsenblut	—	Stärkemehl.

Digitized by Google

Die elektrischen Fische sind nach diesen Prämissen weniger wunderbar, obgleich ihre Entladungskraft nur während des Lebens und bei ungestörtem Nervencinfluss stattfindet. Die bekanntesten elektrischen Fische sind der Zitterrochen, Torpedo, wovon T. marmorata und T. ocellata in den südlichen europäischen Meeren vorkommen, der Zitteraal, Gymnotus electricus, in mehreren Flüssen von Südamerika, der Zitterwels, Silurus electricus seu Malapterurus electricus, im Nil und im Senegal. Weniger bekannt sind Rhinobatus electricus, Trichiurus electricus und Tetrodon electricus. Zur Kenntniss der elektrischen Fische haben am meisten Walsh, Fahlenberg, Gay-Lussac und v. Humboldt beigetragen. Die elektrischen Organe der Zitterrochen liegen zu beiden Seiten des Kopfes und der Kiemen, und bestehen aus neben einander stehenden 5—6seitigen Prismen, welche die ganze Dicke des Fisches an jenen Stellen einnehmen. Jedes Prisma bildet eine mit Nerven und Gefässen umgebene Röhre mit dünnhäutigen Wänden, in der eine grosse Menge (150) überaus dünner, parallel auf einander geschichteter Querplatten mit einer zwischen allen verbreiteten gallertartigen Flüssigkeit liegen. Zu diesen Organen gehen jederseits drei starke Nerven, vom N. vagus, welche vorher Zweige den Kiemen abgeben. Auch ein Ast vom N. quintus verbreitet sich in den vordern Theil des Organes. Hunter *Philos. transact.* 1773. *p.* 2. *tab.* 20. Die Organe des Zitteraals und Zitterwelses liegen nach Rudolphi's genauen Untersuchungen zu beiden Seiten vom Kopf bis zum Schwanz und sind jederseits doppelt, ein oberflächliches und ein tieferes; beide sind durch eine Scheidewand, bei *Gymnotus* seitlich auch von Muskeln getrennt. Bei *Gymnotus electricus* bestehen die Organe aus horizontalen, in der Länge des Fisches ausgespannten Häuten von $\frac{1}{3}$ Lin. Distanz, zwischen denen von innen nach aussen gerichtete, senkrechte Scheidewände sich befinden, in deren Zwischenräumen Flüssigkeit ist. Das kleinere tiefere Organ ist noch feiner getheilt. Die Nerven des Organes sind 224 Intercostalnerven, die an der innern Seite des Organes hinabgehen und sich in alle Lagen zertheilen, während feinere Enden der Intercostalnerven unter dem kleinen Organ an die Haut des Fisches gehen. Ein Nerve, der durch Zweige vom *N. quintus* und *N. vagus* zusammengesetzt wird, geht oberflächlich, ohne sich in dem Organe zu vertheilen, in die Rückenmuskeln. Rudolphi *in den Abhandlungen der Academie von Berlin* 1820—1821. *p.* 229. *tab. I. II.*

Bei dem Zitterwels giebt es, wie Rudolphi gezeigt hat, auch jederseits zwei elektrische Organe, die ich nach Rudolphi und nach eigener Anschauung dieser Theile beschreibe. Beide sind durch eine aponeurotische Haut getrennt, das äussere liegt oberflächlich unter dem *corium*, das innere über der Muskelschicht; die Nerven des äusseren kommen vom *N. vagus*, der unter der *aponeurosis intermedia* hergeht, aber diese mit seinen Zweigen durchbohrt, um in das äussere Organ zu gehen; die Nerven des innern Organes kommen von den Intercostalnerven und sind äusserst fein. Das äussere Organ besteht aus sehr kleinen rautenförmigen Zellen, die man mit der Loupe betrachten muss, das

Digitized by Google

innere scheint auch aus Zellen zu bestehen. Rudolphi nennt die Substanz des innern Organes flockig. Rudolphi *in Abhandlungen der Academie zu Berlin* 1824.

Die Wirkungen der elektrischen Fische auf thierische Wesen gleichen ganz den elektrischen Entladungen. Die Erschütterung des Zitterrochens reicht bei der Berührung mit der Hand bis zum Oberarme, die Zitteraale vermögen dagegen selbst Pferde zu bekämpfen und zu schwächen, was A. v. Humboldt so schön in seinen *Ansichten der Natur* beschrieben hat. Es steht fest, dass sowohl beim Zitterrochen als beim Zitteraal, welche bisher allein in Hinsicht der Wirkungen näher untersucht sind, die Isolatoren der Elektricität die elektrische Kraft der Organe aufhalten, und die Conductoren, wie Metall, Wasser, sie leiten, dass sich die Entladung durch eine Kette von Personen fortpflanzt, wenn die äussersten Glieder den Fisch berühren. Walsh hat sogar beim Zitteraal elektrische Funken entlockt, indem er den Schlag durch einen auf eine Glasscheibe geklebten und in der Mitte durchschnittenen Staniolstreifen leitete; er sah mit Pringle, Magellan und Ingenhouss den Funken von der einen Hälfte des Streifens zur andern überspringen. *Journ. de phys.* 1776. *Oct.* 331. Fahlenberg hat diesen Versuch mit gleichem Erfolge wiederholt, indem der Fisch sich in der Luft befand. *Vetensk. Acad. nya handling.* 1801. 2. *p.* 122. Linari und Matteuci ist es neulich selbst beim Zitterrochen gelungen, einen Funken zu erhalten. *L. institut.* 167. Sie wandten bei ihren Versuchen Spiralen von 300—577 Meter Länge des Kupferdraths an. Im Innern einer oder zweier der Spiralen befand sich eine Stange von weichem Eisen. Die Enden der Windungen waren in Linari's Versuchen an zwei Silberschienen befestigt, welche mit dem Bauch und Rücken des Fisches in Verbindung gebracht wurden. Der Drath, welcher die letzte Windung der Spirale mit einer der Silberschienen verband, war unterbrochen und die Drathenden in Quecksilber getaucht. Beim Herausheben und Wiedereinsenken des Draths im Quecksilber sprang der Funke über, wenn das Thier zugleich mit den Silberschienen gerieben wurde.

Es ist früher niemals gelungen eine Reaction auf das Elektrometer zu erlangen. J. Davy war der Erste, der bei Anwendung des Galvanometers auf den Zitterrochen einen entschiedenen Erfolg beobachtete. *Philos. Transact.* 1834. *p.* 2. Er hat auch die Versuche über die Wasserzersetzung mit Erfolg angestellt. Einer der feinsten Reagentien für die Elektricität ist hier wie auch sonst eine gelatinöse Masse, die man durch Zusatz von Stärke in Pulver zu einer gesättigten oder fast gesättigten Solution von Jodkalium erhält. Eine einfache Combination von Kupfer- und Zinkdrath und sehr verdünnter Säure bewirkt in dieser Zusammensetzung eine Präcipitation von Jodstärkmehl.

Die Kraft der Entladung ist ganz willkührlich und an die Integrität der Nerven jener Organe geknüpft. Man kann den elektrischen Fischen das Herz ausschneiden, und sie können noch lange Schläge austheilen, aber mit der Zerstörung des Gehirns oder Durchschneidung jener Nerven hört das Vermögen der Ent-

Digitized by Google

ladung auf; die Zerstörung des elektrischen Organes einer Seite hebt die Wirkung des andern nicht auf. Auch ist es von allen Beobachtern anerkannt, dass die Entladung nicht bei jeder Berührung erfolgt, sondern von der Willkühr des Fisches abhängt, so dass man ihn oft erst reizen muss, oder dass, wenn v. Humboldt und Bonpland den Fisch an Kopf und Schwanz anfassten, nicht immer sogleich der Schlag erfolgte und auch nicht immer beide den Schlag erhielten. Hieraus scheint hervorzugehen, dass die elektrischen Fische selbst die Richtung der Entladung bestimmen können. Zuweilen sträubt sich das Thier bei Quälereien, ohne Schläge zu ertheilen. Die Schläge scheint es selbst kaum zu empfinden. Beim Zitteraal bemerkt man bei der Erschütterung gar keine Bewegung, beim Zitterrochen nur eine geringe Bewegung der Brustflossen; dagegen sind die elektrischen Fische in Wunden für den künstlichen galvanischen Reiz vollkommen sensibel. Anderseits erleiden Zitteraale, indem sie den Schlag eines andern leiten, keine krampfhaften Bewegungen, wie v. Humboldt gesehen.

Der elektrische Schlag wird fühlbar, wenn das Thier zu dessen Ertheilung geneigt ist, sey es nun, dass man mit einem einzelnen Finger nur eine einzige Oberfläche der Organe berühre, oder dass man mit beiden Händen seine beiden Oberflächen oben und unten anfasse. In beiden Fällen ist es gleichgültig, ob die Person, welche den Fisch berührt, isolirt sey oder nicht. v. Humboldt. In vielen Punkten stimmen nun Zitterrochen und Zitteraal überein, in einigen weichen sie ab. Gay-Lussac und v. Humboldt haben darüber sehr schöne Aufschlüsse gegeben. Wenn eine Person den Zitterrochen mit einem einzigen Finger berührt, so erfolgt die Entladung, die Person mag isolirt seyn oder nicht. Wenn sie aber isolirt ist, so muss die Berührung unmittelbar seyn. Man berührt den Zitterrochen mit Metall ohne Erfolg, während der Zitteraal seine Stösse durch das Mittel eines mehrere Fuss langen Eisenstabes ertheilt. Wird ein Zitterrochen auf eine ganz dünne Metallscheibe gelegt, so fühlt die Hand, welche die Scheibe hält, niemals eine Erschütterung, wenn gleich eine zweite isolirte Person das Thier reizt, und obschon die krampfhaften Bewegungen der Brustflossen sehr starke Entladungen darthun. Wird hingegen der auf der Metallscheibe liegende Zitterrochen, wie vorher, von Jemand mit der einen Hand gehalten, mit der andern Hand an der obern Fläche berührt, so wird alsdann eine kräftige Erschütterung in beiden Armen verspürt. Die Empfindung ist die nämliche, wofern der Fisch sich zwischen zwei Metallscheiben befindet, deren Ränder sich einander nicht berühren, und wenn alsdann beide Hände gleichzeitig an diese Scheiben gelegt werden. Wenn aber die Ränder beider Metallscheiben sich berühren, so hört jede Erschütterung auf, die Kette zwischen beiden Oberflächen des elektrischen Organes wird alsdann durch die Scheiben gebildet, und die neue Verbindung, welche durch Berührung beider Hände mit den Scheiben zu Stande kommt, bleibt ohne Wirkung.

Ungeschwächte elektrische Fische wirken gleich stark unter

Digitized by Google

dem Wasser und in der Luft. Bilden mehrere Personen die Kette zwischen der obern und untern Fläche des Fisches, so wird die Erschütterung nur dann fühlbar, wenn jene Personen sich die Hände benetzt haben. Die Wirkung wird dagegen nicht unterbrochen, wenn zwei Personen, die mit ihren rechten Händen den Zitterrochen halten, statt sich mit der linken zu fassen, jede ein metallenes Stäbchen in einem auf einem isolirten Körper befindlichen Wassertropfen einsenken. Gay-Lussac et Humboldt, *ann. de chemie* 65. 15. A. v. Humboldt's *Reise in die Aequinoctialgegenden des neuen Continents.* 3. *Theil. p.* 295—324. Treviranus *Biol.* 5. 144—180.

Schon J. Davy beobachtete ein elektrisch verschiedenes Verhalten der Oberflächen der elektrischen Organe des Zitterrochen. Dasselbe fanden Linari und Matteuci. Die Richtung der Strömung ist durchgehends vom Rücken nach der untern Bauchgegend, und der Rücken lässt sich als der positive, der Untertheil des Bauches als der negative Pol des Organes betrachten. Berühren die Dräthe des Galvanometers Rücken und Bauch zugleich, so tritt keine Abweichung der Nadel ein.

Spallanzani wollte bemerkt haben, dass der Zitterrochen seine elektrische Kraft durch Abziehen der Haut verliere. Nach Matteuci wird die Fähigkeit zu Entladungen nur dadurch geschwächt. Die Entladungen erfolgen sogar noch, wenn Scheiben von dem Organ weggeschnitten worden.

Eigentliche physiologische Versuche an den Nerven der elektrischen Fische sind noch wenig angestellt worden. Als das Gehirn eines Zitterrochens der Länge nach getheilt wurde, beobachtete Davy noch fortdauernde Schläge, diese hörten aber auf, als das Gehirn herausgenommen war, auch wurde kein Schlag erhalten, als Davy mit einem scharfen Instrument die elektrischen Nerven reizte. Einmal, als ein kleines Stück Gehirn zufällig übrig gelassen war, das mit den elektrischen Nerven an der einen Seite zusammenhing, gab der Fisch bei der Reizung einen Schlag. Nach Matteuci nimmt die Intensität des Schlags ab, wenn man die Zahl der zu dem Organ gehenden Nervenfäden vermindert; nach der Durchschneidung sämmtlicher Nerven des Organes hört die Entladung auf. Der Tod des Fisches von Morphium ist von starken Schlägen und Convulsionen begleitet. Hat der Zitterrochen aufgehört auf Reizung Schläge zu ertheilen und berührt man dann die Stelle des Gehirns, wovon die Nerven der elektrischen Organe abgehen, so erhält man stärkere Schläge als gewöhnlich. Matteuci schliesst aus diesen Thatsachen, dass die Elektricität des Zitterrochens sich nicht in den Organen erzeugt, dass die Strömung ihre Richtung von dem Gehirn erhält und dass die Elektricität in dem Apparate nur verstärkt wird, wie in einer Leidner Flasche oder secundären Säule. Dies erscheint mir indess keineswegs aus den Beobachtungen zu folgen. Denn dann müssten sich nach Entfernung der elektrischen Organe noch vom Gehirn aus elektrische Ströme erregen und nachweisen lassen. Das Gehirn kann durch Erregung eines heterogenen chemischen Zustandes in den Organen diese laden, oder wenn

Digitized by Google

sie an und für sich durch sich selbst geladen werden, die Entladung bewirken.

Die elektrischen Erscheinungen der elektromotorischen Fische sind durch besondere Apparate bewerkstelligt. Ob aber sonst im Thierreich und beim Menschen durch die gewöhnlichen organischen Thätigkeiten sich Elektricität entwickele, ist eine andere Frage. Elektrische Materie ist im Zustande des Gleichgewichtes von +E —E in allen Körpern und lässt sich durch Contact auch in den lebenden Fröschen in +E und —E trennen, d. h. zur Erscheinung bringen. Im Frühjahre vor der Begattung besitzen die Frösche eine ausserordentliche Reizbarkeit für das galvanische Fluidum und dann erhält man am Leichtesten folgende von mir beobachtete Phänomene. Man nehme einen auf die gewöhnliche Weise präparirten Froschschenkel, lege ihn auf eine Glasplatte. Wenn man in die eine Hand eine Zinkplatte nimmt und mit dieser Platte den Nerven berührt, während ein Finger der andern Hand den Froschschenkel berührt, so entsteht jedesmal eine starke Zukkung; mit einer Kupferplatte geht es auch, aber schwächer. Legte ich den Nerven des Schenkels auf eine Zinkplatte und verband Nerven und Schenkelmuskeln durch ein Stück von einem Frosch, so entstand jedesmal auch eine Zuckung. Diess geschah sogar, wenn die Zinkplatte, worauf der Nerve der Schenkelmuskeln lag, der Oberfläche des Schenkels genähert wurde. Endlich bewirkte ich an einem blossen Unterschenkel mit heraushängendem Stamm des Schenkelnerven selbst Zuckung, wenn ich den Nerven mit einem isolirenden Stäbchen dem Unterschenkel näherte und mit dem Nerven die nasse Oberhaut des Unterschenkels berührte. Auch erfolgte eine Zuckung, wenn ich den Nerven vom Unterschenkel wieder abzog. Dieser Versuch, der auch v. Humboldt schon einmal in anderer Art gelang, ist äusserst merkwürdig, und der einfachste galvanische Versuch, den man an einem Frosche machen kann. Es ist gar kein Metall dazu nothwendig; der Unterschenkel mit heraushängendem Schenkelnerven muss aber auf einer Glasplatte liegen. Man hebt den Nerven auf einem Federkiel sanft auf und berührt mit dem Nerven nur den Unterschenkel, den Nerven zurückbeugend, so erfolgt zuweilen eine Zukkung. Complicirter ist der von mir angestellte Versuch, dass man zwischen dem Nerven des präparirten Froschschenkels und dem Unterschenkel die Kette schliesst durch zwei lebende Frösche oder zwei Froschbeine; ja selbst Stücke von einem todten faulenden Frosche sind zur Schliessung der Kette hinreichend. Legt man den Schenkelnerven, der am Unterschenkel heraushängt, in ein Schälchen mit Blut oder mit Wasser (gleichviel) und verbindet das Wasser und die Oberschenkelmuskeln mit einem Kupferdrath, so entsteht auch wieder eine Zuckung, eben so gut, wie wenn man den Nerven selbst und den Oberschenkel durch einen Kupferdrath oder durch ein Stück frisches oder faules Muskelfleisch verbindet. Als ich zuerst die Zuckung gesehen hatte, wenn ich mit meinem eigenen Körper die Kette zwischen dem auf einer Zinkplatte liegenden Nerven und dem Unterschenkel schloss, glaubte ich, dass die Elektricität meines eigenen Körpers

Digitized by Google

dieses Phänomen bewirke; davon kam ich aber sogleich zurück, als ich sah, dass ein todter Frosch, ein Stück faules Muskelfleisch dasselbe that, und als ich mit Kupferdrath und Wasser die Kette zwischen *Nerv. ischiadicus* und Oberschenkelmuskeln schliessend, schon eine Zuckung bewirkte. Endlich beweist der Versuch, wo ich (fast wie v. Humboldt) durch blosses Umbeugen des Nerven gegen den noch mit der Oberhaut versehenen Unterschenkel Zuckung bewirkte, ohne Zwischenstück von Metall oder Muskelfleisch, dass zum einfachsten elektrischen Phänomen an Fröschen und Theilen eines Frosches bloss gegenseitige Berührung des anderseits organisch zusammenhängenden Nerven und Muskels nöthig ist, und dass das Phänomen durch Zwischenglieder von Metall, Muskelstücken (faul oder frisch), nur verstärkt wird. Entweder entsteht nun in den lebenden Körpern freie Elektricität durch den Lebensprocess, die nach ihrer Vertheilung beim Contact gewisser Theile überströmt und Zuckungen hervorruft, oder es entsteht bloss durch die chemische Heterogenität von Nerven und Muskeln eine elektrische Spannung, welche bei der kettenartigen Verbindung ins Gleichgewicht gesetzt wird und die Zuckung bewirkt. Alle die beschriebenen Phänomene gelingen nur vor der Begattungszeit, entweder wegen grösserer Reizbarkeit, oder wegen wirklich stärkerer Elektricitätsanhäufung.

Aus allen vorher angeführten Beobachtungen geht nun hervor, dass die in den thierischen Körpern im Tode wie im Leben der Thiere, gleichwie in allen andern Körpern, befindliche elektrische Materie unter gewissen Umständen in Spannung tritt oder in + E und — E zerlegt wird. Die Entladung entsteht am Froschschenkel sogleich bei der Schliessung der Kette zwischen den verschieden geladenen Muskeln und Nerven. Der Froschschenkel ist aber in diesem Falle selbst das feinste Elektrometer, indem die in ihm selbst entwickelte Elektricität auch die Zukkung desselben bewirkt. Ob die verschiedene elektrische Ladung von einerseits organisch verbundenen, anderseits äusserlich getrennten Muskeln und Nerven des Froschschenkels, eine Folge des Lebensprocesses ist, oder bloss eine hier wie überall durch die chemische Heterogenität der Stoffe bewirkte elektrische Spannung der vorher ruhend vorhandenen elektrischen Materie ist, und ob daher selbst ein todter Nerve und Muskel noch sich in diese elektrische Spannung versetzen, lässt sich nicht ausmachen; denn der todte Froschschenkel zeigt wegen des Verlustes der Zusammenziehungskraft der Muskeln nicht mehr die elektrische Spannung an, wenn sie auch in ihnen vorhanden wäre. Es ist über eine den Lebensprocess begleitende Elektricitätserregung viel Fabelhaftes vorgebracht worden. Die Wahrheit ist; dass elektrische Erscheinungen ohne Friction in thierischen Körpern nur sehr schwach sich äussern, obgleich die mannigfaltigen Stoffumwandlungen nicht ohne einige Elektricitätsentwickelung vorgehen zu können scheinen. Das einzige, was man vom Menschen hierüber Thatsächliches hat, sind die Untersuchungen von Pfaff und Abrens, Meckel's *Archiv* 3. 161. Die Versuche wurden mit einem Goldblattelektrometer angestellt, nachdem die Personen

Digitized by Google

sich auf ein *Isolatorium* begeben. Die Collectorplatte des auf das Elektrometer aufgeschraubten Condensators wurde von der Person berührt, die obere Platte desselben war mit dem Erdboden in leitender Verbindung. Die Resultate sind:

1. In der Regel ist die eigenthümliche Elektricität des Menschen im gesunden Zustande positiv.

2. Selten übersteigt sie an Intensität die Elektricität, welche das mit dem Erdboden in leitender Verbindung stehende Kupfer mit dem Zink hervorbringt.

3. Reizbare Menschen von sanguinischem Temperament haben mehr freie Electricität als träge von phlegmatischem Temperament.

4. Des Abends ist die Menge der Elektricität grösser als zu den anderen Tageszeiten.

5. Geistige Getränke vermehren die Menge der Elektricität.

6. Die Weiber sind öfter als die Männer negativ elektrisch, doch ohne bestimmte Regel. Gardini hatte zur Zeit der Menstruation wie auch während der Schwangerschaft negative Elektricität gefunden.

7. Im Winter sehr durchkältete Körper zeigen erst keine Elektricität, die aber allmählig mit der Erwärmung zum Vorschein kommt.

8. Auch der ganz nackte Körper, so wie jeder Theil des Körpers, zeigt dieselben Phänomene.

9. Während der Dauer rheumatischer Krankheiten scheint die Elektricität auf 0 zu sinken und so wie die Krankheit weicht, wieder zum Vorschein zu kommen. v. Humboldt (*über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. I. p.* 159) hatte bemerkt, dass Rheumatische für den schwachen Strom der einfachen galvanischen Kette isolirend seyen.

Dass manche Lebensactionen durch Elektricität erzeugt werden sollen, besonders die Nervenaction, und dass elektrische Ströme im thierischen Körper circuliren, davon hat man viel gedichtet. Nichts dieser Art ist erwiesen. Person (Magendie *Journ. de Physiol.* 10. 246.) so wenig als ich haben je mit dem empfindlichsten Elektrometer Strömungen in den Nerven wahrgenommen. Darüber werde ich ausführlicher bei den Nerven handeln. Pouillet glaubte bei der *Acupunctur* elektrische Strömungen an den eingestochenen Nadeln zu erkennen, hat aber selbst seine Täuschung anerkannt. (Magendie *J. d. Ph.* 5. *p.* 5.) Hatte er in einen gesunden oder kranken Theil eine Stahlnadel eingestochen und eine andere Nadel in den Mund genommen, und brachte er nun die Conductoren des Galvanometers mit beiden Nadeln in Verbindung, so bemerkte er mehrmals kurze Zeit nachher Schwankungen der Magnetnadel des Instrumentes, was ich bei Wiederholung des Versuchs nicht fand. Pouillet kam aber auf den Gedanken, dass die Elektricität von der Oxydation der eingestochenen Nadeln herrühre, wie denn ein sehr empfindliches Galvanometer schon die Oxydation von Metall anzeigt. In der That trat keine Spur von Schwankung ein, als statt der Stahlnadeln Nadeln von Metall genommen wurden, das sich nicht leicht oxy-

Digitized by Google

dirt, Gold, Platin, Silber. In jenem Falle kann auch die Schwankung der Nadel durch Thermoelektricität veranlasst seyn, insofern das eine Ende der Nadeln durch thierische Theile erwärmt war, weil nach Seebeck's Entdeckung schon eine einfache Metallstange durch verschiedene Erwärmung an beiden Enden galvanisch wird. Neulich hat Donné mittelst eines sehr empfindlichen Galvanometers wirklich eine elektrische Reaction zwischen der äussern und innern Hautoberfläche entdeckt, welche er von dem alkalischen und sauren Verhalten der Secreta ableitet. *Ann. des sciences nat.* 1834. *Févr.* Matteuci hat bei einem Kaninchen, dessen Magen und Leber mit den Platinenden eines empfindlichen Galvanometers verbunden wurden, eine Abweichung von 15—20 gesehen. Dass diese Reaction nicht von der chemisch verschiedenen Natur der Secreta abhänge, schliesst er daraus, dass die Reaction nach dem Tode der Thiere sehr schwach war oder ganz aufhörte. An den Nerven selbst beobachtete Matteuci kein elektrisches Verhalten; er fand aber auch, dass die Nerven, selbst wenn sie den Strom einer galvanischen Säule leiten, auf das Galvanometer nicht wirken. Hieraus sieht man ein, dass, wenn wirklich elektrische Ströme in den Nerven vorhanden wären, sie durch das Galvanometer nicht leicht entdeckt werden können. Matteuci *L'institut Nr.* 75. Ueber die Elektricität des aus der Ader gelassenen Blutes, der Galle, des Urins, hat Bellingeri (*experimenta in electricitatem sanguinis, urinae et bilis. Mem. d. A. d. Tor. V.* 81. Froriep's *Not.* 19. 177.) Versuche angestellt. Im entzündlichen Blut sey die Elektricität vermindert. Längst abgelassenes Blute soll seine Elektricität behalten. O wäre doch erst die freie Elektricität des Bluts überhaupt erwiesen!

Prevost und Dumas sehen die mikroskopischen platten Blutkörperchen mit Kern und Schale für galvanische Plattenpaare an, und Dutrochet sucht sogar zu beweisen, dass der Kern elektronegativ, die Schale elektropositiv sey. Eine Hypothese, welche im Abschnitt vom Blut aus empirischen Untersuchungen entkräftet werden wird. Dutrochet glaubte Muskelfasern zu bilden, als er einen Tropfen von einer wässerigen Auflösung von Eiweiss mit den Drähten der Säule in Verbindung brachte. Es entstanden an den Polen Wellen, an dem Kupferpol eine durchsichtige, an dem Zinkpol eine trübe Welle, die gegen einander wuchsen und in der Berührungslinie eine gekräuselte Faser bildeten. Allein diese Faser ist nichts als geronnenes Eiweiss und die von ihm beobachtete Contraction dieser Faser ist nur die mit Bewegungen der sich berührenden Wellen verbundene Absetzung des Gerinnsels. Das gebildete Gerinnsel ist vollkommen ruhig.

Mehrere Gelehrten erklären mit der Elektricität ohne alle Beweise im thierischen Körper zu viel. Hunter, Abernethy, unter uns Prochaska sind diesen Hypothesen gefolgt. Es reicht nicht hin, statt die Wirkungsart der Nerven gründlich zu untersuchen, ein Gebäude von entfernten Möglichkeiten aufzustellen. Im Buche von der Physik der Nerven werde ich zeigen, dass, obgleich sich Wirkungen elektrischer Materie in thierischen Theilen schon nach meinen eigenen Untersuchungen erzeugen lassen,

Digitized by Google

doch die Wirkungsart der Nerven sich ganz und gar von der der elektrischen Materie verschieden zeigt.

Unter den Neueren hat Meissner die Hypothese von der Elektricität als Ursache der Lebenserscheinungen im weitesten Umfange angewandt. *System der Heilkunde aus den allgemeinsten Naturgesetzen. Wien* 1832. Ohne allen Beweis, ohne welchen heut zu Tage selbst mehr wahrscheinliche Hypothesen als diese in der Physiologie nicht mehr gelitten werden können, ohne allen Beweis lässt er in den Lungen durch den chemischen Process des Athmens, bei dem Austausch des Sauerstoffes der atmosphärischen Luft und der Kohlensäure aus den Lungen das Blut sich mit elektrischem Fluidum laden, während dieses Fluidum zugleich durch die Lungennerven und das Gangliensystem sich verbreiten und die Centralorgane des Nervensystems von hier aus geladen werden sollen; er lässt das geladene Gehirn, worin der Wille wirkt, durch Abgabe eines elektrischen Funkens an den bestimmten Nerven irgend ein bestimmtes Organ zur Thätigkeit reizen. Das in die Muskeln strömende elektrische Fluidum bilde um alle einzelnen, der Länge nach fadenartig an einander haftenden Atome des Muskels elektrische Atmosphären, treibe dadurch die Muskelfasern, welche an beiden Enden des Muskels fest verbunden sind, in der Mitte auseinander und bewirke eben darum die Verkürzung; wie wenn man Hollundermarkkügelchen auf einen Bindfaden reiht, mehrere solcher Fäden an beiden Enden verbindet und das Ganze an den elektrischen Conductor hängend elektrisirt, worauf das Ganze sich verkürzt, indem die Fäden aus einander fahren. Es ist nicht allein dagegen zu erinnern, dass die Muskelfasern bei der Zusammenziehung nicht aus einander fahren, sondern sich kräuseln und im Zickzack parallel bleiben, sondern es fehlt für den ganzen Traum an aller Erfahrung. Meissner erklärt auf diese Art die sogenannten thierisch magnetischen Curen. Ein gesunder Mensch, wenn er eine kleinere elektrische Atmosphäre besitzt, als ein Kranker mit gesteigerter Elektricität, wird durch Auflegen der flachen Hände auf den leidenden Theil des Kranken, durch Herabführen und plötzliches Entfernen der Hände diesem einen Theil seiner elektrischen Atmosphäre entreissen, im zweiten Fall, wenn die Elektricität des Kranken vermindert ist, wird der Eperimentator durch denselben Hergang eine Mittheilung seiner eigenen elektrischen Atmosphäre verursachen. Dann soll es auch Kranke geben, die eine überaus grosse Capacität für das elektrische Fluidum besitzen und anderen Individuen elektrisches Fluidum, selbst wenn sie wenig haben, entreissen. Kranke mit zu geringer Capacität für das elektrische Fluidum sollen dagegen durch das Bestreichen selbst ihre Elektricität an den Experimentator, wenn er stärkere Capacität für die Elektricität besitzt, abgeben, wodurch bald der Kranke, bald der Experimentator gefährdet werden soll. Meissner a. a. O. p. 135. Man untersuche doch lieber erst, ob beim Bebrüten, Athmen u. s. w. sich Elektricität erzeugt. Pouillet hat zu beweisen gesucht, dass bei der Vegetation der Pflanzen sich sehr viel Elektricität erzeugt. Pouillet untersuchte zuerst

Digitized by Google

die Elektricität bei der Kohlensäurebildung. Er brachte einen Cylinder von Kohle auf die Platte eines Condensators, zündete die obere Basis des Cylinders an, und unterhielt das Verbrennen durch einen mässigen Luftstrom. In wenigen Augenblicken war der Condensator mit — E. geladen, dagegen die gebildete Kohlensäure, die in der Höhe von einigen Zollen mit einer zweiten, mit dem Condensator in Verbindung stehenden Messingplatte aufgefangen wurde, + E. zeigte. Zur Untersuchung der bei der Vegetation sich entwickelnden E. nahm Pouillet 12 Glasgefässe von 8—10 Zoll Durchmesser, die er äusserlich und nur gegen den Rand hin in einer Ausdehnung von 1—2 Zoll mit einem Firniss von Gummilack überzog. Diese stellte er in zwei Reihen auf ein sehr trocknes Holz. Er füllte sie mit Gartenerde und setzte sie in Communication durch Metalldräthe, die vom Innern des einen Gefässes in das Innere des andern reichten, so dass das Innere aller Gefässe einen einzigen Conductor bildete. Wenn sich in diesen Gefässen Elektricität entwickelt, so kann sie sich in alle Kapseln vertheilen, und wegen des Firnisses am Rande nicht entweichen. Man bringt nun die obere Platte des Condensators mit einem der Gefässe durch einen Messingdrath in Verbindung, und die untere Platte in Verbindung mit dem Boden. Nach dieser Vorbereitung säete er Samenkörner in die Erde. Nach einigen Tagen entwickelte sich Elektricität, und zwar Harzelektricität in den Gefässen, und also Glaselektricität in den entwickelten Gasen. Diess geschah so lange, bis die Luft des Zimmers feucht wurde. *Annal. de chim. et de phys.* 35. 420. Diese Versuche muss man mit der nöthigen Modification an bebrüteten Eiern und an Thieren in Beziehung auf die Kohlensäurebildung beim Athmen wiederholen.

Die Untersuchungen von Ed. Weber (*quaestiones physiologicae de phaenomenis galvano-magneticis in corpore humano observatis. Lips.* 1836.) legen eine sichere Grundlage für die Beobachtung galvanischer Erscheinungen am thierischen Körper. Es kam zunächst darauf an, die Leitungsfähigkeit des thierischen Körpers im Vergleich mit Metall und Wasser für einen gleichen galvanischen Strom zu kennen. Zu diesen Versuchen bediente sich Weber des Gauss'schen Magnetometers. Die Elektricität wird hierbei von einem magnetisch-elektrischen Elektromotor erregt und durch die Conductoren dem Multiplicator zugeleitet, dessen Nadel aber hier durch einen Magnetstab von 25 Pfund ersetzt wird. Bewegungen dieses an einem Faden aufgehängten Balkens, welche dem unbewaffneten Auge entgehen, können hier noch von einem entfernten Beobachter gemessen werden, wozu ein dem Balken angefügter Spiegel und ein Teleskop in 5 Meter Entfernung aufgestellt dienen. Die in Hinsicht ihrer Leitungskraft zu untersuchenden Materien werden in einer Unterbrechung eines der Conductoren angebracht. Die Leitungskraft des Wassers für die galvanische Elektricität verhält sich nach Weber zu der des Kupfers bei gleicher Länge und Dicke der leitenden Materien wie 6865 Millionen zu 1. Nämlich ein Kupferdrath von 6865 Millionen Millimeter Länge leitete noch so stark als eine gleich

Digitized by Google

dicke Wassersäule von 1 Millimeter Länge. Die Leitungskraft des Wassers wird durch erhöhte Temperatur vermehrt, die des Metalls vermindert. Aus den Beobachtungen von Weber geht hervor, dass keine Substanz im menschlichen Körper den Galvanismus so gut wie Metalle leitet. Denn die verschiedenen Theile des menschlichen Körpers leiten nicht besser als es sich von einem von Blut und salzigen warmen Flüssigkeiten durchdrungenen Körper erwarten lässt, nämlich 10—20 mal besser als gleich warmes destillirtes Wasser, was mit der Leitungskraft warmen salzigen Wassers übereinstimmt. Hierdurch wird die Annahme derjenigen widerlegt, welche die Nerven für sehr gute Leiter gleich den Metallen halten. Die Epidermis isolirt besonders, wenn sie trocken ist, in diesem Fall leitet sie 50 mal schlechter als der übrige Körper. So wie verschiedene Metalle am todten Körper Hydrogalvanismus erzeugen, ebenso auch am lebenden Körper. Weber beobachtete es nicht bloss bei der Berührung von Kupfer und Zink, die metallisch verbunden waren, sondern auch bei der Berührung des Körpers mit Kupfer und Kupfer, wenn sie kettenartig verbunden waren. Hieraus ergiebt sich, dass die Versuche von Donné, Matteuci und Anderen über mit dem Galvanometer beobachtete galvanische Strömungen im thierischen Körper ohne alle Beweiskraft für die Existenz wirklicher elektrischer Strömungen im lebenden Körper sind. Weber hat auch die Erzeugung des Thermogalvanismus am thierischen Körper beobachtet, wenn nämlich die Enden eines Bogens von Kupfer mit den Händen angefasst werden, wovon die eine in kaltes, die andere in warmes Wasser getaucht wird. Das verhält sich also wie bei den Metallen.

Um Quellen des Galvanismus im lebenden Körper zu entdecken, ist es nöthig, eine Methode anzuwenden, wobei der Contact der Metalle und des Körpers so wie die Unterbrechung des galvanischen Stromes nicht nothwendig sind. Weber suchte daher die etwa vorhandenen Ströme auf einen eisernen dem Körper genäherten Stab zu leiten. Denn es ist gewiss, dass ein galvanischer Strom, der an einem Stab von weichem Eisen vorbeigeht, diesen magnetisch macht, wodurch eine in der Nähe befindliche Magnetnadel angezogen wird. Diese Methode wurde von Weber nicht vergebens angewandt; er sah nämlich, dass als die Muskeln eines Menschen in der Nähe des Eisenstabes sich zusammenzogen, den Magneten sich bewegen. In wie weit diese Bewegung von galvanischen Strömen im thierischen Körper und nicht von einer anderweitigen Störung des magnetischen Zustandes des eisernen Balkens entstehe, behält sich Weber vor weiter zu untersuchen.

2. Wärmeerzeugung.

Die Wärme des Menschen beträgt in den inneren Theilen, welche zunächst zugänglich sind, wie Mund, Mastdarm u. s. w. 29,20°—29,60° R. oder 36,50°—37° C. oder 97,7°—98,6° Fahr. Die Wärme des Blutes $30\frac{1}{2}°$—31° R. (nach Magendie 31°, nach Thomson $30\frac{5}{9}°$), in Krankheiten bis $32\frac{5}{9}$—$33\frac{3}{9}°$. In

Digitized by Google

der Blausucht mit gestörter Ausbildung des arteriösen Blutes in den Lungen von Herzfehlern ist die Eigenwärme oft einige Grade schwächer, z. B. 21° R. in der Hand; in der Cholera asiat. fällt die Wärme des Mundes auf 21° und 20° R. Im Schlafe ist die Wärme des gesunden Menschen nach Autenrieth $1\frac{1}{2}$ Grad Fahr. geringer als bei Tage, Abends soll die Wärme etwas grösser als des Morgens seyn. Bei höherer Temperatur der Atmosphäre in wärmeren Climaten soll nach J. Davy die innere Körperwärme um $1\frac{1}{2}$—2 Grad Cent. steigen, und diess soll bei Menschen von ungleichem Alter und bei Eingebornen eben so, wie bei eingewanderten Fremden aus gemässigten Climaten seyn. Mit dem letztern Satze stehen indess die Versuche von Douville (Froriep's *Notizen. N.* 686.) im Widerspruch. Auf hohen Bergen und in niederen Ebenen ist die Temperatur der Menschen nach Becquerel's und Breschet's Versuchen gleich.

Ueber die Temperatur der Thiere haben Tiedemann und Rudolphi sehr ausführliche und vollständige Zusammenstellungen der vorhandenen Beobachtungen geliefert, wo man auch die Litteratur findet. Hiernach variirt die Temperatur der Säugethiere in den verschiedenen Gattungen. Als Beispiele können dienen der Ochse mit 37,2° bis 40° Cent., das Schaf mit 38 bis 40; das Pferd mit 36,8 bis 36,11, der Elephant mit 37,5, das Meerschweinchen mit 35,76 bis 38, der Hase mit 37,8 (das Kaninchen mit 37,48 bis 40), das Eichhörnchen mit 40,56, Phoca vitulina mit 38,89, der Hund mit 37,39 bis 38,50, die Katze mit 37 bis 39,78, Vespertilio noctula mit 38,89, Vespertilio pipistrellus mit 40,56 bis 41,11, Simia aigula mit 39,7. Die Cetaceen unterscheiden sich kaum durch ihre Temperatur von den übrigen Säugethieren. Delphinus phocaena mit 35,50 bis 37,5, Monodon monocerus 35,56, Balaena mysticetus 38,89. Siehe Tiedemann's *Physiologie I. p.* 454. Die Temperatur der Vögel scheint fast durchgängig grösser als beim Menschen und bei den Säugethieren. Als Beispiele aus Tiedemann's Zusammenstellung führe ich an: Larus mit 37,8, Tetrao albus 38,9, Hahn 39,44 bis 39,88 (Henne 39,44 bis 43,3), Taube 41,5 bis 43,1, verschiedene Arten Enten 41,11 bis 43,9, Vultur barbatus 41,94, verschiedene Falkenarten 40,28 bis 43,18, Rabe 41,1 bis 42,91, verschiedene Arten Fringilla 41,67 bis 44,03, Parus major 44,03, Hirundo lagopus 44,03.

Die Fähigkeit, Wärme zu erzeugen, kommt den warmblütigen Thieren nicht unter allen Bedingungen zu. Edwards fand dieses Vermögen bei alten Leuten geringer. Der Embryo der Säugethiere hat nur die Temperatur der Mutter, und verliert sie aus der Mutter entfernt nach den Versuchen von Autenrieth und Schuetz (*experimenta circa calorem foetus et sanguinem. Tub.* 1799.). Dasselbe schnelle Erkalten bemerkt man nach Edwards selbst bei den Neugebornen der meisten Raubthiere und Nagethiere, sobald sie bei 10—12° Cent. von der Mutter entfernt werden, dagegen sie an der Mutter liegend nur 1—2° Cent. kälter als die Mutter selbst sind. Diess gilt auch von ganz jungen Vögeln, so dass junge Sperlinge acht Tage nach dem Auskriechen, während

Digitized by Google

sie im Neste 35—36° Cent. Wärme hatten, ausser dem Neste bei 17° Cent. in einer Stunde auf 19° sanken; andere Versuche zeigten, dass hieran nicht die Nacktheit schuld ist. Frorief's *Notizen* 151. Nach Edwards Untersuchungen kommen mehrere Säugethiere in einem viel weniger entwickelten Zustande zur Welt als andere, so wie Hunde, Katzen, Kaninchen, diese haben viel weniger innere Wärme als viele andere Säugethiere, welche nicht blind geboren werden. Nach 14 Tagen gleicht sich diess aus, und jene erreichen dann das Stadium, welches diese bei der Geburt schon haben. Vergl. Legallois, Meckel's *Archiv* 3. 454. Beim Menschen ist bekanntlich das Bedürfniss äusserer Wärme zur Erhaltung der eigenen Temperatur im Zustande des Neugebornen auch sehr gross, wohl nicht minder als bei den Raubthieren und Nagethieren. Auch haben die statistischen Untersuchungen von Edwards gezeigt, dass der Mangel an Temperatur in einem bisher nicht gewürdigten Verhältniss Ursache der Sterblichkeit bei den neugebornen Menschen ist. Edwards *de l'influence des agens physiques sur la vie. Paris* 1824. Unter den erwachsenen warmblütigen Thieren zeigt sich eine gewisse Unabhängigkeit der Wärmeerzeugung von der äussern Temperatur, die indess bei der verschiedenen geographischen Verbreitung der Thiere und nach ihren inneren Lebensverhältnissen verschieden ist, und deren Grenzen die Wanderungen vieler Thiere nach Maassgabe des durch Jahreszeiten bedingten Temperaturwechsels veranlassen. Indessen dauern die Thiere der Polarländer, z. B. Säugethiere, nach Parry's Beobachtungen, selbst bei der Temperatur des Gefrierpunktes vom Quecksilber (40° Cent.), ja bis 46° unter Null aus. S. das Nähere bei Tiedemann a. a. O. p. 461. 466. Einige Säugethiere dagegen, die Winterschläfer (Murmelthiere, Siebenschläfer, Haselmaus, Hamster, Igel, Fledermäuse, Dachs, Bär, beide letztere unvollkommen), erhalten ihre Wärme nur bei einer gemässigten äusseren Temperatur, und verlieren an Temperatur mit der äusseren Kälte, so dass sie in Asphyxie, Scheintod verfallen, und mehrere bei 10—12° Cent. unter Null sogar erfrieren. Im Allgemeinen ist die Temperatur der wachenden Winterschläfer nicht von der anderer Säugethiere verschieden, doch hat Myoxus avellanarius nach Berthold im wachenden Zustande nur $23\frac{3}{4}$° R. Mit den Erscheinungen des Winterschlafes haben uns Pallas, Spallanzani, Mangili, Prunelle, Saissy, Czermak, Berthold bekannt gemacht. Winterschläfer verfallen nicht in diesen Zustand, so lange sie in einer Temperatur von 8—9° R. erhalten werden, die Haselmaus erhält sogar bis auf 5° R. über Null ihre ganze Lebendigkeit, wie Saissy gegen Spallanzani anführt. *Mém. de Turin.* 1810—12. Meckel *Archiv für Physiol.* 3. *p.* 133. Saissy widerlegt Mangili's Angabe, dass der Winterschlaf von der Temperatur unabhängig sey, und bei späterem Herbst und früherem Frühling darum weder später einträte, noch früher aufhöre. Pallas brachte Murmelthiere in einen Eiskeller im Sommer, Saissy Igel und Siebenschläfer auf dieselbe Art zum Schlafen. Dagegen erwachen die Thiere im strengsten Winter, wenn sie in eine Temperatur von + 9 —10°

Digitized by Google

gebracht werden. Czermak's Beobachtungen am Siebenschläfer Myoxus glis und Berthold's Beobachtungen an der Haselmaus Myoxus avellanarius sprechen hinwieder für einen gewissen Grad von Unabhängigkeit des Winterschlafs von der äussern Temperatur. Siehe Mueller's *Archiv* 1835. 150. 1837. 63. Die letztern verfallen in den Schlaf, sie mögen sich im Freien oder im geheizten Zimmer befinden. Die Individuen von Myoxus avellanarius, welche Berthold besass, schliefen selbst bei einer Temperatur von 8—14° R., obgleich der Schlaf allerdings tiefer und anhaltender ist bei einer niedern äussern Temperatur. Die Siebenschläfer fangen bei + 12° R. zu schlafen an und erwachen bei + 9° im Frühjahre. Einige, die bei + 34° R. mehrere Stunden lethargisch blieben, verfielen im Sommer bei künstlicher Kälte bis über —20° R. keineswegs in den Winterschlaf. Die Ursache des Winterschlafs scheint daher ein allgemeiner, mit dem Jahreswechsel im Zusammenhang stehender Mangel an Lebensenergie zu seyn, und schliesst sich den Phänomenen der Mauser, des Härens, des Wanderns und den periodischen Veränderungen vieler Pflanzen an.

Berthold's Beobachtungen zeigen, dass wenn die aussere Temperatur im Zunehmen begriffen ist, dieselbe in dem Thiere nicht so schnell steigt, als im Medium. Die Thiere sind im Stande ihre Temperatur einige Grade über 0 zu erhalten, wenn die äussere Temperatur unter 0 gesunken ist. Vermindert man allmählig die Temperatur des Mediums, so nehmen die Thiere nur allmählig eine niederere Temperatur an.

Das Athmen der Winterschläfer geschieht zwar fort, aber langsam und fast unmerklich, so dass das Murmelthier 7—8 mal, der Igel 4—5 mal, die grosse Haselmaus 9—10 mal in der Minute athmet. Im tiefsten Erstarrungsschlafe ruht indessen das Athmen gänzlich, und man kann die Thiere nach Spallanzani's Beobachtungen dann in eine irrespirable Gasart bringen, ohne dass es ihnen schadet. Ehe dieser Zustand eintritt, verbrauchen die Winterschläfer nach Saissy's Beobachtungen auch den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre. Dieser Verbrauch nimmt mit ihrer Wärme ab, die Absorption von Sauerstoffgas und das Aushauchen von Kohlensäure dauert aber bis zum Verbrauche der letzten Atome des Sauerstoffgases in der Atmosphäre, während die nicht winterschlafenden Thiere, Kaninchen, Ratte, Sperling, bereits starben, nachdem sie wenig Sauerstoffgas unter Glocken verbraucht hatten. Nach Prunelle ist das Arterienblut der Fledermäuse im Winterschlafe weniger hellroth. Was den Blutlauf der Winterschläfer im Erstarrungszustande betrifft, so fand Saissy, dass sich das Blut schon zu Anfange und gegen das Ende des Erstarrungszustandes äusserst langsam bewegt, dass bei völliger Erstarrung jener Thiere die Haargefässe der äusseren Theile fast leer, die grösseren Gefässe nur halb ausgedehnt sind. Nur in den Hauptstämmen der Gefässe der Brust und des Bauches zeigt sich noch eine undulatorische Bewegung des Blutes. Die Zahl der Herzschläge bei den Fledermäusen ist gegen 200 in der Minute, im Winterschlafe 50—55 nach Prunelle. Die Empfin-

Digitized by Google

dungskraft und die Reizbarkeit der Muskeln gegen mechanische und galvanische Reize sich zu contrahiren, nehmen im Winterschlafe ab, indessen fehlen doch nur im tiefen Erstarrungsschlafe alle Spuren von Reaction gegen Empfindungsreiz, was Saissy einigemal nur bei Igeln und Murmelthieren fand.

Nach Saissy soll das Blut der Winterschläfer (Murmelthiere, Igel) auch durch seinen geringern Gehalt an Faserstoff und Eiweiss sich auszeichnen. Die Galle soll süsslich, das Fett nicht verändert seyn. Nach Prunelle und Tiedemann (Meckel's *Archiv T. 1. p.* 481.) zeigt sich bei den Winterschläfern schon vor dem Winterschlafe eine scheinbar drüsige, wohl nur fettige Masse am Halse und im mediastino ant., die nach Jacobson's Bemerkung (ebend. 3. 151. 152.) unpassend mit der Thymusdrüse verglichen wurde. Otto hat gefunden, das bei diesen Thieren ein der Carotis interna zu vergleichendes Gefäss durch den Steigbügel der Trommelhöhle hindurch geht. So ist es bei den Gattungen Vespertilio, Erinaceus, Sorex, Talpa, Hypudaeus, Georhychus (Lemmus), Myoxus, Mus, Cricetus, Dipus, Meriones, Arctomys, Sciurus, die nach Otto sämmtlich bald mehr, bald weniger vollkommen in Winterschlaf verfallen. Hyrtl (Mueller's *Arch.* 1836. *XXIX.*) hat die Bildung auch beim Meerschweinchen beobachtet, dagegen sie beim Siebenschläfer, Myoxus glis, fehlt; eine ähnliche aber sehr kleine Arterie kömmt zuweilen auch beim Menschen vor. Der von Mangili bemerkten Kleinheit der Hirngefässe der Winterschläfer widerspricht Otto bestimmtest; auch fand Otto die von Saissy bemerkte Stärke der Nerven der äusseren Theile nicht. *N. act. ac. caes. nat. cur. T. XIII. p.* 1. Dass die Winterschläfer einen Theil des Herbstfettes in Nahrungstoff verwandeln, ist allgemein bekannt. Auch die Absonderungen hören nicht ganz auf. Denn Prunelle fand bei Fledermäusen vom 19. Februar bis 12. März einen Gewichtsverlust von $\frac{1}{32}$. Dass die Anhäufung des Fettes und die Vergrösserung der Drüsen in der Brust und am Halse im Herbste nicht die Ursache des Winterschlafes durch Einengung der Respirationsnerven ist, wie Prunelle glaubte, beweisen Pallas Erfahrungen, der Winterschläfer im hohen Sommer durch künstliche Kälte in den Schlaf brachte. Das Rückenmark ist beim Igel sehr kurz; allein diess ist kein allgemeiner Charakter der Winterschläfer. Die vorzüglichsten älteren Schriften über den Winterschlaf sind Saissy *recherches experimentales anatomiques chemiques sur la physique des animaux mammifères hivernans. Paris et Lyon* 1808., *übersetzt von* Nasse, Reil's *Archiv für Physiol. T. XII. p.* 293. Saissy *Mém. de Turin.* 1810—1812. Meckel's *Archiv für Physiol. T.* 3. Mangili *über den Winterschlaf, in* Reil's *Archiv. Bd.* 8. Prunelle *recherches sur les phaenomènes et sur les causes du sommeil hivernal; Ann. du mus. T.* 18. Gilbert's *Annalen. Bd.* 40. *u.* 41.

Uebersteigt die äussere Temperatur die eigene Temperatur eines Säugethieres, so steigt zwar die Wärme der letztern um einige Grade, aber nicht gleichmässig mit dem Wachsen der äussern Temperatur. Duntze (*exp. calorem animalium spectantia, Lugd. Bat.* 1754.), Fordyce, Banks, Blagden (*phil. transact.* 1775. v. 65.)

Digitized by Google

und Delaroche und Berger haben Versuche hierüber angestellt. Blagden und Andere hielten mehrere Minuten in einen trocknen Luft von + 79° R. aus. Delaroche und Berger beobachteten bei Kaninchen in einer Temperatur von 50—90° Cent. nur ein Steigen um einige Grade. Auch Vögel setzten sich in hoher äusserer Temperatur nicht mit dieser ins Gleichgewicht, sondern wurden bloss um 6—7° wärmer. *Exp. sur les effets qu'une forte chaleur produit dans l'économie animale. Paris* 1806. *Journal de phys.* 71. Reil's *Archiv* 12. 370. Die Ursache davon liegt in der durch die Verdunstung stattfindenden Kälteerzeugung. Delaroche hat dagegen beobachtet, dass Thiere in einer mit Wasserdämpfen überladenen heissen Luft, worin keine Ausdunstung stattfinden kann, 2—3, ja selbst 3—4° R. wärmer wurden als das Medium. Hierbei kömmt zugleich die grössere Wärmeleitung der feuchten Luft in Betracht. Man darf übrigens nicht vergessen, dass die Verstärkung der Verdunstung in trockner Wärme nicht bloss physikalische Ursachen hat, dass die Wärme hier eine organische Function anregt. In der That wird die Verdunstung bei grosser innerer Hitze sehr häufig durch innere Ursachen verhindert, und in manchen Fiebern ist die Haut nur darum unerträglich heiss, weil sie trocken und die Ausdunstung verhindert ist.

Den kaltblütigen Thieren hat man häufig eine eigene Temperatur abgesprochen, was aber nicht statthaft ist. Was zuerst die Amphibien betrifft, so haben Untersuchungen von J. Davy, Czermack, Wilford, Tiedemann gezeigt, dass die Temperatur dieser Thiere mit der äussern Temperatur im Allgemeinen bis zu einem gewissen Punkte sinkt, aber doch die äussere meist um 1 oder mehrere Grade übertrifft, dass die Temperatur der Amphibien eben so mit der äussern Temperatur steigt, aber nur bis zu einem gewissen Punkte stärker als dieselbe ist, bei höheren Temperaturgraden aber selbst geringer ist. Besonders zahlreich sind die Versuche von Czermack über die Temperatur der Amphibien. Baumgaertner's und Ettinghausen's *Zeitschrift für Physik und Mathematik.* 3. *Bd.* 385.

Bei nackten Amphibien war das Plus der eigenen Temperatur weniger gross als bei den beschuppten Amphibien. So war die Temperatur eines Proteus 14° R. bei $10\frac{1}{2}$° der Luft, $16\frac{1}{4}$° bei 14° der Luft; $14\frac{3}{4}$° bei $10\frac{1}{2}$° des Wassers. Ein Frosch hatte $7\frac{1}{6}$° R. bei $5\frac{1}{2}$° des Wassers, $6\frac{1}{3}$° bei $10\frac{1}{5}$° der Atmosphäre. Die auffallendsten Unterschiede von mehreren Graden Reaumur fand Czermack bei Vergleichung der Temperatur der Eidechsen und Schlangen mit der des Mediums. Vergl. J. Davy, Froriep's *Not.* 579.

J. Davy fand die Temperatur einer Schlange 31,370 C. bei 27,50 der Luft, 32,22 bei 28,30 der Luft, die Temperatur einer Testudo mydas 28,89 bei 29,55 der Luft, 29,44 bei 30,00 der Luft.

Tiedemann beobachtete bei Fröschen eine Temperatur, die höher als die des Wassers war; als Wasser in der Nacht gefror, blieb es um den darin befindlichen Frosch ungefroren, und der Froch hatte + 0,56° Temperatur. Tiedemann *Physiologie I.*

Die Versuche von Berthold (*neue Versuche über die Temperatur der kaltblütigen Thiere. Gött.* 1835.), welche mit besonde-

Digitized by Google

rer Sorgfalt angestellt scheinen, zeigen, dass der Unterschied der Temperatur der Amphibien von der des Mediums sehr gering ist. Es hängt einzig von der Willkühr des Beobachters ab, bei einem kaltblütigen Thiere eine bedeutend höhere, oder eine bedeutend niederere, oder kaum andere Temperatur zu finden, als die des Mediums. Denn diese Thiere erfordern, wenn sie vor dem Versuch in einer andern Temperatur sich befanden, oft eine geraume Zeit, bis sich ihre Temperatur mit der des äussern Mediums, worin das Experiment angestellt wird, ins Gleichgewicht gesetzt hat. Bei den nackten Amphibien fand Berthold im Allgemeinen eine niederere Temperatur als die der äussern Luft wegen des Verdunstungsprocesses. Diess verhielt sich auch im todten Zustande so. Die Temperatur der Frösche ist ziemlich gleich der des Wassers, wenn Frosch und Wasser neben einander beobachtet werden; hat das Wasser eine geringere Verdunstungsfläche, so ist seine Temperatur sogar noch etwas höher als die des Frosches; befindet sich der Frosch in dem Wasser, so ist beider Temperatur gleich. In der Begattung begriffene Frösche zeigen eine Temperatur, die um $\frac{1}{4}$—1° R. höher ist als die des Wassers. Die trocknen Amphibien haben bei mittlerer und höherer äussern Temperatur $\frac{1}{4}$—1° R. Wärme mehr als die Luft und das nebenstehende Wasser.

Nach Delaroche besitzen auch die Frösche eben durch Ausdünstung das Vermögen, eine geringere Temperatur bei äusserer Hitze zu erhalten. Delaroche a. a. O.

Die Temperatur der Fische ist um $\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$° höher als die des umgebenden Wassers, wie die Versuche von Martine, J. Hunter, Broussonet, J. Davy, Despretz lehren. Broussonet fand bei kleinen Fischen die Temperatur $\frac{1}{2}$—$\frac{2}{3}$° höher als im Wasser, beim Aal $\frac{3}{4}$°, beim Karpfen 1° höher. Despretz fand bei 10,83 C. Temperatur des Wassers die Temperatur bei zwei Karpfen = 11,69, bei zwei Schleien = 11,54. Becquerel und Breschet fanden beim Karpfen nur $\frac{1}{7}$ Grad Differenz zu Gunsten der Thiere. Berthold beobachtete bei Fischen gar keinen Unterschied. J. Davy fand die Temperatur eines Squalus 25 C. bei 23,75 des Meeres. Von besonderem Interesse sind J. Davy's Beobachtungen über die bedeutende Temperatur der Thunfische. *L'institut.* 108. Nach ihm hat Thynnus pelamys eine Temperatur von 99° F. bei 80,5 des Meerwassers. Auch der gemeine Thunfisch soll nach Fischernachrichten eine hohe Temperatur besitzen. Ob hiermit die von Eschricht und mir entdeckten Wundernetze an der Pfortader und an den Eingeweidearterien der Thunfische zusammenhängen, müssen fernere Beobachtungen an Thunfischen und den anderen Fischen, welche nach unseren Beobachtungen Wundernetze haben, Squalus cornubicus und Squalus vulpis, lehren. Eschricht und Mueller *über die arteriösen und venösen Wundernetze an der Leber der Thunfische. Berlin* 1836. *Abh. d. Academie d. Wissenschaften. zu Berlin vom Jahre* 1836 *und Nachtrag.*

Die kaltblütigen Thiere sind zum Theil auch dem Winterschlafe unterworfen. Franklin erwähnt von mehreren Fischen, dass sie, wenn sie aufs Eis gelegt werden, fast augenblicklich

Digitized by Google

erstarren, aber nach Stunden und Tagen wieder aufleben. Man will indess öfters beobachtet haben, dass Fische im Eise sich lebend erhalten, und dass das Wasser um dieselben nicht gefroren war. *Jahresbericht der Schwed. Acad., übersetzt von* J. Mueller 1824. Pallas (Rudolphi *Grundriss der Physiologie* 1. *p.* 176.) berichtet das Wiederaufleben der Carauschen in Sibirischen bis auf den Grund gefrornen Seen, und erzählt eine ähnliche Beobachtung von Bell vom Wiederaufleben der Goldfische aus gefrornem Wasser. Bei den Amphibien beobachtet man nicht allein den Winterschlaf, vor dessen Eintritte sich die Amphibien verkriechen, sondern auch den Sommerschlaf in den heissen Climaten. In der trocknen Jahreszeit verkriechen sich die Amphibien und gerathen in einen dem Winterschlafe ähnlichen Zustand, aus dem sie in der Regenzeit wieder aufgeweckt werden. Hierüber hat A. v. Humboldt in seiner Reise sehr interessante Beobachtungen mitgetheilt. Von höheren Thieren kennt man in dieser Art nur ein einziges Beispiel, nämlich vom Tanrec, dem sogenannten Igel von Madagascar.

Ueber die Temperatur der Wirbellosen fehlt es noch an vollständigen Beobachtungen; doch zeigen die vorhandenen, dass die Wärme derselben zwar wie bei den übrigen kaltblütigen Thieren veränderlich ist nach der Temperatur des Mediums, aber doch auch bei Insecten um einen Grad höher oder niedriger seyn kann, wie die Versuche von Martine, Hausmann, Rengger und John Davy zeigen. Dagegen hat man in Bienenstöcken und Ameisenhaufen schon eine sehr viel beträchtlichere Temperatur angetroffen. Beim Flusskrebs sah Rudolphi das Thermometer von 9° R. des Wassers auf 10—12° steigen. Aehnliche, obgleich kleinere Unterschiede hat man bei Mollusken beobachtet. Eine Sammlung der einzelnen Beobachtungen findet man bei Rudolphi *Physiol.* 179. Treviranus *Biol.* 5. 20. Tiedemann *Physiol.* 476—477. Bei den Schnecken ist die Temperatur 1° höher als im Medium. Meckel's *Archiv* 8. 255.

Dass bei den Wirbellosen auch der Winterschlaf sich wiederholt, weiss man wenigstens sicher von den Insecten und den Mollusken der gemässigten und kalten Climate. Einige niedere Thiere scheinen eine ziemlich hohe Temperatur zu ihrem Medium nöthig zu haben. Ausserordentlich scheint das Beispiel der in den warmen Quellen von Abano von 22° R. lebenden kleinen Schnecken, Cyclostomum thermale Ranzani. Rudolphi sah diese noch im Wasser von 30° sich lebhaft bewegen. Indessen leben die Eingeweidewürmer des Menschen und der Säugethiere in einer gleichen, und die der Vögel in einer noch höhern Temperatur. Rudolphi bemerkt, dass die Entozoen der warmblütigen Thiere in der Kälte erstarren, aber durch warmes Wasser wieder aufleben, dagegen die der kaltblütigen sowohl die Kälte als einen hohen Wärmegrad ertragen.

Den Winterschlaf der Schnecken hat Gaspard beschrieben, das Herz soll nicht mehr schlagen und das Athmen aufhören, die Wiedererzeugung verschnittener Fühlhörner stillstehen. Diese Thiere verfallen auch bei grosser Wärme in einen Sommerschlaf,

Digitized by Google

wobei jedoch Athmen, Herzschlag und Reproduction fortdauern. Meckel's *Archiv* 8.

Ich wende mich jetzt zur Untersuchung der *Ursachen* der thierischen Wärmeerzeugung. Hier ist zuvörderst die Verschiedenheit der Temperatur in verschiedenen Theilen von Interesse. J. Davy *phil. transact.* 1814. Meckel's *Archiv II. p.* 312. Die Temperatur nimmt gegen die äussersten Theile hin ab, wie z. B. beim Menschen die Achselhöhle 98 F. zeigte, die Leisten 96,5, Oberschenkel 94, Unterschenkel 93—91, Fusssohle 90° hatten. Sonderbar ist, dass John Davy in mehreren Versuchen die Temperatur des Mastdarms um etwas grösser als die des Gehirns fand, was mir aber doch eher Beobachtungsfehler zu seyn scheint. Becquerel und Breschet (*ann. d. sc. nat.* 1835. *Mai. Oct.*) wandten zu ihren Untersuchungen den thermoelektrischen Multiplicator an. In den zu untersuchenden Theil wird eine Nadel eingestochen, die aus zwei heterogenen Nadeln zusammengesetzt ist, die an ihren Enden zusammengelöthet sind, während die entgegengesetzten Enden mit den Drähten eines thermoelektrischen Multiplicators in Verbindung gebracht werden. Man führt eine dieser Nadeln in den zu untersuchenden Theil ein, so dass die Verbindungsstelle beider Nadeln mitten in den zu untersuchenden Theil kommt, worauf man die beiden freien Enden mit den Drähten des Multiplicators verbindet. Zwischen der Temperatur der Muskeln (4 Centim. Tiefe) und des oberflächlichen Zellgewebes (1 Centim. Tiefe) fanden die Verfasser einen Unterschied von 2° — 1,25 Centim. zu Gunsten der Muskel, was bloss von dem Wärmeverlust an der Oberfläche des Körpers abzuleiten ist. Die mittlere Temperatur der Muskeln des Menschen ist 36°,77 Cent. Beim Hund war die Temperatur der Brust, des Unterleibs, des Gehirns gleich der der Muskeln.

Von ausserordentlichem Interesse sind J. Davy's Versuche über den Unterschied der Temperatur beider Blutarten. J. Davy *tentamen experimentale de sanguine. Ebinb.* 1814. Meckel's *Archiv I.* 109. Es waren an Schafen und Ochsen 11 Versuche. Zieht man aus Davy's Versuchen das Mittel, so folgt, dass das Arterienblut um etwa 1—1½ Grad Fahr. wärmer ist als das Blut der Venen. Mayer (Meckel's *Archiv* 3. 337.) fand sogar, dass das Blut der *vena jugularis* um 1 — 2° R. kälter war als das Blut der *carotis;* niemals aber konnte er, wie Davy, einen Unterschied in der Temperatur des Blutes beider Herzhälften nachweisen. Aehnliches hatte Saissy bei winterschlafenden Thieren beobachtet. Becquerel und Breschet haben diesen Gegenstand weiter untersucht; sie bedienten sich des thermoelektrischen Multiplicators und fanden den mittlern Unterschied des Arterien- und Venenblutes (*aorta* und *vena cava desc.*) beim Hunde 1°,01 Cent., des Bluts in der *arteria* und *vena cruralis* 0°,90. Die Differenz der Temperatur des Bluts im linken und rechten Vorhof eines Truthahns betrug 0°,90 zu Gunsten des linken Vorhofs. Die Temperatur der arteriellen und venösen Systeme nimmt vom Herzen nach den Extremitäten ab. *L'institut.* 190. Diese Thatsachen führen zunächst zur Untersuchung der Theorie, dass die thierische

Digitized by Google

Wärme ihre Quelle in den Lungen habe. Nach der Hypothese von Lavoisier und Laplace, welcher die meisten neueren Chemiker gefolgt sind, wird beim Athmen der Sauerstoff der Atmosphäre mit Kohlenstoff des Blutes verbunden, und als Kohlensäure ausgeathmet. Wenn nun beim Athmen mehr Sauerstoff der Atmosphäre verschwindet, als in der ausgeathmeten Kohlensäure enthalten ist, so wird in einer zweiten Hypothese angenommen, dass das nicht auf Kohlensäure verwandte Sauerstoffgas sich durch Verbindung mit Wasserstoff des Blutes in Wasser verwandle und ausgehaucht werde. Nimmt man diese Hypothese an, so kann man die Ursache der thierischen Temperatur in jener Wärme suchen, welche durch die Vereinigung des Sauerstoffes der eingeathmeten Luft mit dem vom Blute herstammenden Kohlenstoff der Kohlensäure und des Sauerstoffes mit Wasserstoff zu Wasser entsteht. Crawford (*Versuche und Beobachtungen über die Wärme der Thiere. Leipz.* 1799) suchte diess noch wahrscheinlicher zu machen, indem er angab, wie die Verbreitung der Wärme, die einmal in den Lungen entstanden, leichter erklärt werden könne, dass das arterielle Blut eine grössere Wärmecapacität als das venöse, ungefähr im Verhältnisse von 11,5:10,0 besitze. So soll die in den Lungen entstandene Wärme zur Beibehaltung der Temperatur des arteriellen Blutes angewendet, und dann überall im Körper frei werden, wo die Organe sich aus dem Blute ernähren, und das arteriöse Blut in venöses übergeht. J. Davy hat indess gezeigt, dass die Wärmecapacität beider Blutarten entweder gar nicht oder nur sehr unbedeutend (wie 10,11:10,00) differire.

Es lässt sich aber direct berechnen, wie viel Wärme durch das Athmen entstehen kann, angenommen, dass die chemische oder Verbrennungstheorie vom Athmen richtig wäre. Diese Arbeit haben Dulong und Despretz unternommen. Dulong brachte verschiedene, sowohl fleisch- als pflanzenfressende Säugethiere und Vögel in einen Behälter, worin die Veränderungen der Luft bei dem Athmen bestimmt und die Producte quantitativ gemessen werden konnten, während der Wärmeverlust der Thiere zugleich berechnet wurde. Dulong fand, dass von allen Thieren mehr Sauerstoffgas verzehrt als in Kohlensäure verwandelt wurde. Bei den Pflanzenfressern betrug diese Absorption des Sauerstoffgases nur $\frac{1}{10}$ im Durchschnitt, bei den Fleischfressern war die geringste Quantität des absorbirten d. h. nicht in Kohlensäure verwandelten Sauerstoffgases $\frac{1}{5}$, die grösste Qantität $\frac{1}{2}$ der verwandten Menge des Gases. Nimmt man nun an, dass das Sauerstoffgas durch seine Verwandlung in kohlensaures Gas beim Athmen eine gleich grosse Wärme erzeugt, als dieselbe Quantität Kohlensäuregas durch Verbrennung von Kohle in Sauerstoffgas, und geht man dabei von der Bestimmung der Wärmequantität aus, wie sie von Laplace und Lavoisier angegeben wird, so beträgt sie nicht mehr als 0,7 der Wärme, welche das pflanzenfressende Thier in derselben Zeit verliert, und $\frac{1}{2}$ derjenigen, welche das fleischfressende Thier einhüsst. Nimmt man ferner an, dass das Sauerstoffgas, welches durch das Athmen absorbirt und der Luft nicht in Form

Digitized by Google

von Kohlensäure zurückgegeben wird, zur Bildung von Wasser verwandt wird, und dass dabei so viel Wärme sich entwickelt, als wenn eine gleiche Quantität Sauerstoff durch Verbrennung mit Wasserstoff in Wasser verwandelt wird, so entspricht die ganze Quantität der Wärme, welche durch die Verbindung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes mit Sauerstoff entsteht, 0,75—0,80 derjenigen Wärme, welche in gleicher Zeit von fleischfressenden sowohl als pflanzenfressenden Thieren entwickelt wird. Also würde das Athmen im Durchschnitt $\frac{3}{4}$—$\frac{4}{5}$ der thierischen Wärme hervorbringen. Nach Berzelius im *Schwedischen Jahresbericht, übersetzt von* J. Mueller. *Bonn* 1824. *p.* 67. Vergl. *Neues Journal für Chemie und Physik. N. R. Bd.* 8. *S.* 505.

Despretz schloss Thiere $1\frac{1}{2}$ bis 2 Stunden in einem mit Wasser umgebenen Behälter ein, zu welchem ununterbrochen Luft ab- und zugeleitet wurde, und bestimmte deren Menge und Zusammensetzung vor und nach dem Versuche, so wie die durch die thierische Wärme bewirkte Wärmezunahme des umgebenden Wassers; die durch Verbrennung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes beim Athmen nach der chemischen Theorie hervorgebrachte Wärme betrug 0,75—0,91 von der, welche das Thier in derselben Zeit entlässt. Gmelin's *Chemie T.* 4. *p.* 1523. *Ann. d. chim. et de phys.* 26. 338.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass es noch andere Quellen der thierischen Wärme als das Athmen geben müsse, selbst wenn man der chemischen Theorie vom Athmen huldigt. Allein es ist äusserst unwahrscheinlich, dass sich das beim Athmen verdunstende Wasser aus Elementen bildet, wie später beim Athmen gezeigt wird, und es ist vielmehr überaus wahrscheinlich, dass Sauerstoff im Blute bleibt; man kann daher nur die von der Kohlensäurebildung entstandene Wärme in Anschlag bringen, welche nach Dulong bei Pflanzenfressern 0,7, bei Fleischfressern $\frac{1}{2}$ der thierischen Wärme beträgt. Ausserdem ist es noch eine blosse Hypothese, dass der Sauerstoff der Atmosphäre sich beim Athmen mit Kohlenstoff des Blutes zu Kohlensäure verbindet, obgleich neue Thatsachen es unwahrscheinlich machen, dass die Kohlensäure schon im Blute gebildet ist, und nur ausgehaucht wird, während der Sauerstoff der Atmosphäre mit dem Blute sich verbindet. Nach dieser letzten Ansicht würde sich der Sauerstoff mit Kohlenstoff erst in dem Wege der Circulation des Blutes zu Kohlensäure verbinden, und dem Blute eine höhere Temperatur mittheilen, wobei sich nun die Erscheinungen eben so gut, wie bei der andern Hypothese erklären lassen. Wo nun die Quelle der Kohlensäurebildung seyn mag, in den Lungen oder im Blute, jedenfalls wäre der eingeathmete Sauerstoff hierzu die nächste Veranlassung, und man könnte also das Athmen unmittelbar oder mittelbar für eine Quelle der thierischen Wärme ansehen, und die von Dulong erlangten Resultate, dass von Kohlensäurebildung bei Pflanzenfressern 0,7, bei Fleischfressern 0.5 der thierischen Wärme entstehen, annehmen. Hieraus würde sich also erklären lassen, warum der Embryo noch keine merkliche eigene Wärme besitzt, weil noch kein Sauerstoff eingeath-

Digitized by Google

met wird, und warum Blausüchtige, bei denen die Verwandlung des Blutes durch das Athmen wegen Fehler der Kreislaufsorgane gehemmt ist, um einige Grade zuweilen kälter sind, warum die kaltblütigen Thiere, bei welchen nur ein Theil des Blutes oxydirt wird, nur eine sehr unbedeutende eigene Temperatur besitzen. Bei den Amphibien athmet nur ein Theil des Blutes während des allgemeinen Kreislaufes. Bei den Fischen, wo zwar alles Blut während des Durchganges durch die Kiemen athmet, ist das Resultat doch nicht grösser als bei den Amphibien, weil der quantitative Stoffwechsel beim Athmen aus der in dem Wasser aufgelösten atmosphärischen Luft ausserordentlich viel kleiner ist als bei dem Luftathmen. Um die chemische Theorie der Wärmeerzeugung durch das Athmen auf eine entscheidende Weise zu prüfen, müsste man, in der Art wie Dulong und Despretz, Versuche an kaltblütigen Thieren anstellen, um zu sehen, ob die nach den quantitativ bestimmten Producten des Athmens theoretisch berechnete Wärmeerzeugung nicht zu gross ist gegen die sehr geringe von diesen Thieren entwickelte Wärme. Diess ist eine schöne Aufgabe für chemische Untersuchungen.

Indessen muss es noch andere Quellen der thierischen Wärme geben. Einige, wie Ph. v. Walther und Paris, haben eine Hauptquelle der Wärme darin gesucht, dass die Absonderungen aus dem Blute Flüssigkeiten bilden, die eine geringere Wärmefassungskraft als das Blut haben, so dass Wärme frei werden muss. Nach Crawford ist die Capacität der Milch geringer als die des Blutes. Nach Paris (*London med. and phys. journ.* 21. 1809. Meckel's *Archiv* 2. 308.) ist die Wärmecapacität des Urins 0,777, des arteriellen Blutes 1,003. Damit stehen indess die Versuche von Nasse (Meckel's *Archiv* 1. 500.) im Widerspruch, der, so wie die Capacität des Blutes nach Davy kaum von der des Wassers verschieden ist, so auch die der Absonderungen nicht verschieden fand. Auf eine bei organischen Processen stattfindende Quelle der Wärmeerzeugung hat Pouillet (*ann. chem. phys.* 20. 141. Meckel's *Archiv* 8. 233.) aufmerksam gemacht. Alle festen Körper, sowohl unorganische als organische, werden durch Benetzung mit verschiedenen Flüssigkeiten in ihrer Temperatur erhöht. Viel grösser ist die Temperaturerhöhung bei organischen Substanzen, die in mehreren Fällen selbst 6—10° Cent. betrug. Hierauf könnte man besonders bei der Auflösung der Nahrungsmittel durch die Verdauungsflüssigkeiten rechnen, und vielleicht die während der Verdauung stattfindende gelinde Wärmevermehrung erklären. Allein grösser und allgemeiner ist gewiss die Quelle der organischen Wärme, welche bei den organischen Processen durch die Wirkung der organisirenden Kräfte auf die Materie nicht in einem, sondern in allen Organen erzeugt wird, so dass im hohen Grade des Hungers, wenn vorhandene Materie ausgeschieden, aber keine neue organisirt wird, nach Martine die Wärme bedeutend und um einige Grade abnimmt, während doch die in der Kohlensäurebildung liegende Ursache der Wärme fortdauert. (Dagegen ein von Currie erzählter Fall vom Verschliessen des Schlundes. *Wirkungen des kalten und warmen Was-*

Digitized by Google

sers. Leipz. Bd. I. p. 267.). In der Entzündung erhöht sich unter vermehrtem Blutandrange die Temperatur des entzündeten Theiles, die Thomson jedoch nicht für grösser hält als im Blute der grossen Gefässe. *Lect. on inflammation. Edinb.* 1813. 46. Becquerel und Breschet fanden in lebhaft entzündeten skrophulösen Geschwülsten eine Erhöhung der Temperatur um 3° Cent. Die Muskelbewegung erhöht die Temperatur. Die Contraction der Muskeln war in Becquerel's und Breschet's Versuchen jedesmal mit einer örtlichen Temperaturerhöhung von 1—2 Grad Cent. verbunden. Ein fieberhafter Zustand kann nach denselben Beobachtern die Temperatur um 3° Cent erhöhen. Dagegen weiss man, dass die Unterdrückung der organischen Kräfte in Nervenzufällen, im Fieberfrost, die Temperatur vermindert, ohne dass sich das Athmen gleich verändert. (In der Ohnmacht in der Hand nach Currie $22\frac{4}{9}$ R.) Da nun alle organischen Processe am meisten von dem Einflusse der Nerven auf die organisirte Materie abhängig sind, so darf man sich nicht wundern, wenn die Wechselwirkung der Organe mit den Nerven eine Hauptquelle der Wärme ist. Diess haben die Versuche von Brodie, Chaussat und Andern gezeigt. Elliot und Home haben beobachtet, dass nach der Durchschneidung der Nerven eines Gliedes die Wärme desselben abnehme, und alle bestätigen diess von der Durchschneidung des Nervus vagus. Dieser Unterschied ist thermometrisch messbar, dagegen man wohl das subjective Gefühl der Kälte nach Verletzung der Nerven eines Gliedes unterscheiden muss. Earle fand bei einer Lähmung des Armes an der gelähmten Hand 70° F., an der gesunden 92. Durch Elektrisiren des Gliedes erhob sich die Temperatur zu 77. In einem andern Falle hatte der gelähmte Finger 56, die gesunde Hand 62. *Med. chirurg. Transact.* 7. *p.* 173. Meckel's *Archiv* 3. *p.* 419. Yelloly, *Med. chirurg. Transact.* 3. Brecquerel und Breschet fanden bei Hemiplegie keinen merklichen Unterschied zwischen dem gesunden und gelähmten Gliede.

Brodie (*Phil. Transact.* 1811. 4. 1812. 378. Reil's *Archiv* 12. 137. 199.) fand, dass bei einem Thiere, dessen Kopf abgeschnitten ist, oder dessen Medulla oblongata durchschnitten, oder dessen Gehirn zerstört, oder das durch Woraragift getödtet worden, durch künstlich unterhaltenes Athmen mittelst Lufteinblasen, Kreislauf und Umwandlung des Blutes in den Lungen unterhalten werden können, wovon er sich durch Analyse der Luftarten überzeugte, dass aber keine Wärme entwickelt wird, und dass ein solches Thier schneller erkaltet, als wenn das Athmen nicht künstlich unterhalten wird, weil die eingeathmete Luft dasselbe abkühlt. Hall fand dagegen, dass ein geköpftes Thier bei künstlich unterhaltenem Athmen seine Wärme länger behielt. *Lond. med. phys. Journ.* 32. 1814. Vergl. Brodie ebend. p. 295. Meckel's *Archiv* 3. 429. 434. Legallois Versuche (*ann. chem. phys.* 4. 1817. Meckel's *Archiv* 3. 436.) stimmen auch nicht ganz mit dem Resultate von Brodie überein; er fand, dass bei jeder Erschwerung des Athmens, wenn Thiere befestigt auf dem Rücken liegen, wenn sie in verdünnter oder mit Stickgas oder Kohlensäure versetzter

Digitized by Google

Luft athmen, eine Verminderung ihrer Temperatur stattfindet, dass auch das Lufteinblasen durch Erschwerung des Athmens die Temperatur vermindert, und dass das stärkste Erkalten immer dem geringsten Verbrauche von Sauerstoffgas entspricht. Emmert fand bei Wiederholung der Brodie'schen Versuche mit Giften und Lufteinblasen nur eine Temperaturveränderung von 3° R. in 74 Min. Meckel's *Archiv* 1. 184. Wilson Philipp (*Untersuchungen über die Gesetze der Functionen des Lebens, übersetzt* von Sontheimer *Stuttg.* 1822.) fand, dass eine zu frequente künstliche Respiration schnell abkühlt, während eine gemässigte die Abkühlung verlangsamt. Indessen sind Brodie's Versuche in der Hauptsache beweisend. Er hat gezeigt, dass gesunde Kaninchen in ½ Stunde 28,22 K. Z. kohlensaure Luft ausathmen, dass Kaninchen, bei denen nach Vergiftung oder Zerstörung der Medulla oblongata das Athmen künstlich unterhalten wird, in ½ Stunde noch 20,24 bis 25,55, bis 28,27 K. Z. kohlensaures Gas ausathmen, dass also bei gesunden Kaninchen und bei getödteten mit künstlichem Athmen die Produkte des Athmens fast dieselben sind, und dass gleichwohl ein Kaninchen nach Durchschneidung der Medulla oblongata in einer Stunde 6° Wärme verliert. Vergl. über Brodie's Versuche Nasse's Bemerkungen in Reil's *Archiv* 12. *p.* 404.

Chaussat (Meckel's *Archiv* 7. 282.) fand das beständige Sinken der Temperatur bei Thieren, die auf dem Rücken liegend befestigt sind, nicht bestätigt bei Hunden, er fand dagegen Brodie's Beobachtungen bestätigt. Nach Verletzung des Gehirns sank die Temperatur in der 11.—22. Stunde bis zum Tode von 40° auf 24° Cent. Die Durchschneidung des Nervus vagus, welche, ohne dass der chemische Athemprocess wesentlich verändert wird, nach Legallois durch Infiltration der Lungen mit Blut oder Serum tödtet, bewirkt Sinken der Temperatur, während 12—36 Stunden zu 36—37°, zuletzt bis zu 20° Cent. Bei allen diesen Versuchen ist leider die Temperatur der atmosphärischen Luft nicht angegeben. Bei Verletzungen des Rückenmarkes an verschiedenen Stellen zeigte sich der Einfluss um so grösser, je höher die Verletzung stattfand, so dass die Folgen im Verhältnisse der Zahl der unter der Verletzung vom Rückenmarke abgehenden Nerven steigen, was im Allgemeinen auch für die anderen Folgen der Rückenmarksverletzungen gilt.

Chaussat sucht zuletzt zu beweisen, dass auch der Nervus sympathicus einen grossen Antheil an der thierischen Wärme habe; denn er fand nach Verletzung des Nervus splanchnicus auf der linken Seite, die er mit Exstirpation der Nebenniere (bei einer nicht zu grossen Wunde?) bewirkt haben will, dass die Temperatur in 10 Stunden oder bis zum Tode von 40,19 bis 26° C. fort und fort sank. Ferner unterband Chaussat bei einem Hunde die Aorta am Aortenschlitz und mass den Unterschied der Temperatur in der obern und untern Hälfte des Thieres; die Speiseröhre zeigte bei dem wiederholten Versuch bis zum Tod eine etwas geringere Temperatur als der Mastdarm. Diesen geringen Unterschied rechnete Chaussat auf die beim Athmen stattfin-

Digitized by Google

dende Abkühlung. Chaussat schliesst daraus, dass die Brusthöhle viel weniger Antheil an der Wärmebildung habe als die Bauchhöhle durch den Einfluss der Nerven. Das Sinken der Temperatur nach Durchschneidung des *Nervus vagus* könne man nicht als Gegenbeweis anführen, da dieser Nerve eben so gut Organe der Bauchhöhle versieht. Allein Chaussat legt hier auf schwankende Versuche, die wenig oder gar nichts beweisen, ein grosses Gewicht, ohne die vielen Einwürfe, die man denselben entgegenstellen kann, vorauszusehen.

Indessen beweisen mehrere der angeführten Erfahrungen jedenfalls, dass der Nerveneinfluss auf die organischen Processe einen grossen Antheil an der Wärmeerzeugung ausser den Lungen hat. Hiemit stimmt auch Berzelius überein. Was diese Ansicht ferner zu erhärten scheint, ist die schnelle und momentane, bald allgemeine, bald ganz lokale Temperaturerhöhung in Aufregungen der Nerven, das allgemeine Warmwerden bis zum Schweissausbrechen in Leidenschaften, die aufschiessende Gesichtswärme, welche nicht bloss subjectives Gefühl ist, die eben so schnelle Verminderung der Temperatur bei deprimirenden Gemüthsaffecten, Erscheinungen, die sämmtlich freilich auch von vermehrtem und vermindertem Blutzufluss, und zum Theil von der veränderten Bewegung des Herzens abgeleitet werden können. Wir ziehen aus Allem vorläufig den Schluss, dass Temperaturerhöhung bei allen organischen Processen stattfindet, dass sie aber zum Theil bestimmt wird durch die von den Nerven abhängige Belebung der organischen Processe. Vergleicht man nun die warmblütigen Thiere mit den kaltblütigen, so kann man die Ursache des Temperaturunterschiedes zunächst in der geringern Intensität des Athemprocesses oder der organischen Processe überhaupt suchen. Ohne eine Erscheinung von der andern abzuleiten, ist hier zu erwägen, dass bei den niederen Thieren die Nervenmasse in den Centraltheilen des Nervensystems im Verhältniss zu den Nerven selbst abnimmt, dass das Athmen im Verhältniss zur Masse des Körpers weit geringer ist, dass die kaltblütigen Thiere weniger gerinnbare Theile des Blutes besitzen, wie Prevost und Dumas zeigen, wie denn auch nach Saissy das Blut der Winterschläfer in demselben Fall seyn soll, ja dass nach Prevost und Dumas die Vögel und einige Säugethiere, bei grösserer Quantität der Blutkörperchen und des Faserstoffes im Blut, auch eine grössere Wärme haben.

Erst wenn man alle diese Thatsachen über die Ursachen der Wärmeerzeugung erwogen hat, lassen sich mit Erfolg die Untersuchungen über die von selbst entstehende Abnahme der Wärmeerzeugung im Winterschlaf und über die Ursache dieses letztern anknüpfen. Für's Erste darf man den Winterschlaf einiger Säugethiere nicht isolirt betrachten, sondern man muss von der Thatsache ausgehen, dass alle Thiere, wenn die äussere Temperatur unter ein gewisses Minimum herabsinkt, in Scheintod verfallen, erfrieren, ohne dadurch die Fähigkeit zum Leben gerade zu verlieren, dass aber dieses Minimum nach der Organisa-

Digitized by Google

tion und geographischen Verbreitung der thierischen Wesen verschieden ist.

1. Der Mensch zeigt hierbei offenbar eine grosse Tenacität der organischen Kräfte, indem er unter allen Climaten, wo sich thierische Wesen finden, im höchsten Norden, wie unter dem Aequator, seine eigene Temperatur unter günstigen Bedingungen erhält. Indessen wird auch er bei Mangel an Schutz durch Kälte (Reizentziehung) scheintodt, und zwar um so leichter, wenn die organische Kraft durch berauschende Mittel unterdrückt war.

2. Viele Thiere erleiden diesen Zustand leicht, wenn die zu ihrem Leben nöthige äussere Wärme, wodurch ihre geographische Verbreitung bestimmt ist, fehlt, und Vögel wandern wegen dieser Ursache.

3. Säugethiere, die bei einer gewissen niedern Temperatur im erwachsenen Zustande nicht in Scheintod verfallen, verfallen in Scheintod bei dieser Temperatur, wenn sie noch jung sind, wie Legallois Beobachtungen von 6—8wöchentlichen Kaninchen zeigen, welche durch äussere Wärme wieder belebt werden können. Da nun der beim Athmen stattfindende Stoffwechsel als Ursache von Wärmeerzeugung durch die Kälte hier offenbar nicht zunächst beschränkt wird, da alle beim Scheintode durch Kälte eintretenden Symptome, Unempfindlichkeit, Schlafsucht, Kraftlosigkeit, vielmehr eine durch Reizentziehung bedingte Abnahme der organischen Kräfte zeigen, so muss man das geminderte Athmen als Folge, nicht als Ursache dieses Scheintodes ansehen, eben so wie bei der Ohnmacht durch Nervenzufälle, und die Abnahme der eigenen Wärme ist eben so eine Folge der Unterdrückung der organischen Kraft, die auch erst durch Verminderung der Athembewegungen und des Athmens die etwa in den Lungen bedingte Wärmeerzeugung verhindern könnte. Die Ursache, dass gewisse Thiere leichter in Scheintod durch Kälte fallen als andere, liegt also in ihrem zartern Bau und dem grössern Bedürfniss ihres organischen Processes, durch Wärme angefacht und gereizt zu werden. Dieses verbunden mit einem periodisch eintretenden Mangel an Lebensenergie muss man auch als Ursache des Winterschlafs bei den Winterschläfern ansehen, bei dem nur das Eigenthümliche ist, dass ihr Scheintod länger ohne Schaden ausgedehnt werden kann. Die von Saissy und Andern angeführten Ursachen des Winterschlafs sind zum Theil blosse Folgen von der Veränderung der organischen Kraft, zum Theil sind die angeführten Umstände unrichtig, wie Otto von der supponirten Grösse der äusseren Nerven bemerkt, so wie auch die von Mangili behauptete Kleinheit der Hirngefässe nach Saissy und Otto nicht vorhanden ist. Ueber die Kleinheit der Lungen lässt sich nach Saissy's Merkmalen nicht entscheiden.

Der Winterschlaf der Thiere gleicht daher ganz dem Winterschlaf der Pflanzen, dessen Bedingungen theils Reizentziehung theils eine periodische Veränderung der Lebensenergie ist. Der nächtliche Schlaf der Pflanzen, die Lageveränderung der Blätter, ist durch Reizentziehung, nämlich des Lichtes, bedingt, und tritt selbst zuweilen am Tage im Dunkeln ein (*Journ. de phys.* 52. 124.);

Digitized by Google

während der Schlaf der Thiere durchaus nicht von Reizentziehung bedingt ist, sondern von der durch Thätigkeit bedingten Veränderung und Erschöpfung herrührt, daher auch zu jeder Tageszeit natürlich ist, obgleich er mehrentheils aus zufälligen Ursachen mit der Nachtzeit zusammentrifft.

Der Sommerschlaf der Amphibien und des Tanrecs scheint durch die von zu vieler Wärme bedingte Umstimmung der organischen Theile zu entstehen. Der Wassermangel scheint auch bei den sommerschlafenden Thieren mit eine Hauptursache des Verkriechens, und es ist also dieser Zustand durch Mangel des einen und zu starke Wirkung eines andern Lebensreizes bedingt. Vergl. Pastré *Nov. act. acad. nat. cur.* 14. 661. Es schliessen sich diese Thatsachen an die Erfahrungen über die deprimirenden Wirkungen eines hohen anhaltenden Wärmegrades auf die Functionen des Nervensystems bei dem Menschen an, und es lassen sich die Wirkungen der Wärme und Kälte hierbei sehr gut parallelisiren. Beide können sowohl Umstimmung der Reizbarkeit als Reizung, Entzündung und Brand bewirken. Eine plötzliche heftige Einwirkung der Kälte auf warme thierische Theile wirkt zersetzend. Aeusserst kalte Gegenstände fühlen sich auch schmerzhaft an und machen dann gefühllos. In noch höherm Grade entsteht Brand, örtlicher Tod. In geringeren Graden bewirkt die Kälte, verletzend durch Wärmeentziehung, Entzündungs- und Reizungssymptome bei dem Streben der Theile zur Herstellung des Gleichgewichtes. Bei einer mässigen Stärke wirkt die Kälte augenblicklich erregend. So macht kaltes Wasser augenblicklich die Haut ganz roth, wie ich selbst beim Baden im Fluss im October empfand; dies ist aber nur momentan und es folgen schnell Erscheinungen einer innern Umstimmung durch Wärmeentziehung. Man bedient sich der Kälte als Reiz in dieser Art zuweilen, um eine Umstimmung im Nervensystem zu bewirken, die wohlthätig werden kann. Auch ist kaltes Wasser in Fiebern mit sehr heisser trockner Luft mittelbar oft ein belebendes Reizmittel und stellt den Turgor der Haut her, wie die Wärme in kalten Theilen. Die secundären Wirkungen anhaltender Kältegrade sind immer Abspannung des Nervensystems. Die allmählige Einwirkung der Kälte bis zu einem hohen Grade versetzt Menschen in den Scheintod und die Winterschläfer in Winterschlaf durch Reizentziehung, während ein zu hoher Wärmegrad allmählig auch die Functionen des Nervensystems, aber wahrscheinlich durch Alteration herabsetzt, und in den Sandwüsten bei gleichzeitigem Mangel an Wasser asphyktisch macht, und den Sommerschlaf der Amphibien und des Tanrecs in den heissen Climaten bedingt.

3. Lichtentwickelung.

Man weiss jetzt mit Sicherheit, dass das Leuchten des Meeres, jenes Licht, welches die bewegten Wellen, besonders hinter segelnden Schiffen, verbreiten, und welches bis zum 60. Grade südlicher Breite wahrgenommen worden, von thierischen Wesen herrührt. Es sind theils Infusorien (Peridinium tripos, P. fusus,

Digitized by Google

P. furca. Prorocentrum micans Ehrenb.) theils Räderthierchen (Synchaeta baltica Ehrenb.) theils Polypen (Veretillum, Seefedern), bei denen vorzüglich nur die Polypenblumen zu leuchten scheinen, theils Medusen (Oceanien, Beroen, Cydippen), theils Anneliden (Nereiden, Polynoe fulgurans der Ostsee), theils endlich Mollusken (Pholaden, Salpen, Pyrosomen) und Crustaceen (Oniscus fulgens s. Carcinium opalinum Meyen u. a.) Zuweilen leuchtet auch der Schleim und das Wasser, was von leuchtenden Thieren abfliesst, wie bei Salpen, Beroen, Pholaden, Nereiden. Meyen (*nov. act. nat. cur. Vol.* 16 *Suppl.*) unterscheidet 3 Arten von Leuchten des Meers. 1. Leuchten des Seewassers durch darin aufgelösten Schleim. Das Wasser zeigt eine gleichmässige milchweisse ins Bläuliche fallende Farbe. Diess Leuchten findet sich weniger auf offener See, aber häufiger in den Häfen der Tropen. Bewegung und erhöhte Temperatur steigern das Leuchten; eben das geschieht durch süsses Wasser, wenn leuchtende Medusen in einem Gefäss mit süssem Wasser zerquetscht sich befinden. Meyen sah dasselbe an dem von der Oberfläche der Salpen und Beroen mit Wasser abgewaschenen und dann stark geschüttelten Schleim, worin er keine Infusorien gefunden hat. Durch frisch zerquetschte Beroen wird das Wasser sogleich leuchtend. 2. Leuchten des Seewassers durch Thiere, welche mit einem phosphorescirenden Schleime bedeckt sind. Diess Leuchten scheint durch eine Oxydation der Oberfläche der Schleimdecke zu entstehen, da das verschwundene Leuchten durch eine geringe Veränderung der Oberfläche, durch einen Strich mit dem Finger, sofort wieder hergestellt werden kann. Das Leuchten hängt nicht unmittelbar von dem Leben der Thiere ab, da es oft noch eine Zeit lang nach dem Tode fortdauert. Die durch den sie bedeckenden Schleim leuchtenden Thiere sind nach Meyen Infusorien, Räderthiere, Salpen, Medusen, Seesterne, Sepien, Sertularien, Pennatulen, Planarien, Crustaceen, Anneliden. 3. Leuchten des Seewassers durch Thiere, welche eigenthümliche Leuchtorgane besitzen. Meyen untersuchte das Pyrosoma atlanticum; sein Licht ist sehr lebhaft und von grünlich blauer Farbe. Sobald die Thiere beim Fangen mit dem Netz berührt wurden, senkten sie sich und leuchteten nicht mehr. Wenn man die gefangenen und in Wasser bewahrten Thiere berührte, so trat das Licht zuerst als ganz kleine Funken auf, deren jeder aus einem dunkeln fast kegelformigen Körper im Innern der Substanz jedes besondern Thieres, meist ganz dicht unter seiner innern Fläche hervorkam. Dieser dunkle weiche Körper ist rothbraun gefärbt. Die Spitze desselben zeigt unter dem Mikroskop 30 — 40 ausserst kleine rothe Pünktchen. Fasst man ein schwimmendes nicht leuchtendes Pyrosoma an beiden Enden des Körpers, so treten die Funken zuerst an den Enden des Körpers auf, sie vergrössern sich mehr und mehr und endlich fliesst ihr Licht zusammen. Mit dem Tode verschwindet das Leuchten. Dicht hinter der Mundöffnung und etwas vor den Respirationsorganen jedes Individuums des zusammengesetzten Thieres liegt das Leuchtorgan. Ein ebenso bekanntes Leuchtthier der See ist der Oniscus fulgens, Carci-

Digitized by Google

nium opalinum Meyen. Im 4. und 5. Gliede des Leibes dieses Crustaceums sind die keulenförmigen Leuchtorgane. Im Kopfe des Erythrocephalus macrophthalmus soll sich auch ein leuchtendes Organ befinden.

Ehrenberg's Abhandlung über das Leuchten des Meers (Abh. der k. Academie der Wissensch. zu Berlin 1835.) enthält ausser einer ausführlichen historischen Zusammenstellung aller bisherigen Erfahrungen, viele eigenthümliche neue und aufklärende Beobachtungen über das an Dunkelheiten bisher so reiche Phänomen. Bei Alexandrien hatte der Verf. Gelegenheit, Beobachtungen über das angebliche Leuchten des Spongodium vermiculare anzustellen. Es leuchtete wie verschiedene Fucusarten nur durch anhängende leuchtende Pünktchen. Ehrenberg fing solche Leuchtpunkte in einem Uhrglase auf und isolirte sie immer enger. Das Mikroskop zeigte in allen Fällen in dem Wasser kleine schleimige runde Partikeln, ohne alle bestimmte Form, ohne deutliche Organe und ohne Leben. Bei zahlreichen Beobachtungen am rothen Meere gelang es damals auch nicht, das Phaenomen auf bestimmte Thiere zu fixiren. Glücklicher waren die Beobachtungen über die Leuchtthierchen der Ostsee und Nordsee, nachdem Ehrenberg auf die von Michaelis beobachteten leuchtenden Körper aufmerksam geworden war. Zuerst wurde die Erscheinung an Polynoe fulgurans, einem Ringelwürmchen der Ostsee beobachtet. Die Leuchtorgane waren 2 grosse gekörnte Organe, den Eierstöcken vergleichbar. Das hieher gesandte Ostseewasser leuchtete noch von diesen Thieren. In hieher gesandtem Wasser der Ostsee beobachtete der Verf. später noch die leuchtenden Infusorien, Peridinium tripos, P. fusus, P. furca und Prorocentrum micans. Ein Räderthierchen der Ostsee, Synchaeta baltica E. leuchtet nach Michaelis auch. Im Meerbusen von Christiania in Norwegen beobachtete Ehrenberg auch leuchtende Medusen. Oceania microscopica von $\frac{1}{4}$ Linie Durchmesser bildete hüpfende leuchtende Punkte. Bei Cydippe pileus überzeugte sich Ehrenberg, dass das Leuchten von der Mitte gerade da ausging, wo die beiden Eierstocke liegen. Ebenso schien es bei Oceania pileata. Die Medusa aurita sah Ehrenberg weder in der Ostsee noch im rothen Meer leuchten. Beobachtungen auf Helgoland angestellt, zeigten dem Verf. noch fernere leuchtende Formen, die er zu isoliren glücklich war; es waren langsam schwimmende Gallertkügelchen, Oceania scintillans. Die über einen Zoll grosse Oceania hemisphaerica zeigte einen ganzen Kranz von Feuerfunken im Umkreis des Randes. Die Funken entsprachen allemal der verdickten Basis der grosseren Cirren am Rande oder Organen in deren Nähe und mit ihnen abwechselnd. Sonst gab der Körper dieser Thiere weder lebend noch todt irgend eine Spur von Licht. So überzeugte sich Ehrenberg immer mehr, dass alle todte Medusen so wenig leuchteten als Fragmente todter Fische oder umhertreibender Schleim, und er vermuthet, dass auch seine am rothen Meer und bei Alexandrien gemachten Beobachtungen über das Leuchten von Fragmenten zerstörter organischer Körper nicht auf blosse todte Stoffe zu beziehen seyn mögen, sondern

Digitized by Google

dass diese den zerrissenen noch lebenden Noctiluken und Oceanien glichen, welche er auf Helgoland noch leuchten sah. Bei Nereis cirrigera (Photocharis Ehrenberg) geht das Licht von 2 fleischigen Cirren auf jedem ihrer Füsse aus. Erst entstand ein Flimmern einzelner Funken an jedem Cirrus, bis der ganze Cirrus leuchtete; zuletzt floss das Feuer über den Rücken hin und das ganze Thier glich einem brennenden Schwefelfaden. Auch der Schleim der Photocharis leuchtete abgewischt an den Fingern. Ehrenberg bezweifelt, dass die Respiration mit dem Leuchten der Thiere irgendwo im Zusammenhang stehe und erkennt die Verbindung der Lichtentwickelung mit der Sexualfunction an. Das Lichterregende ist nach ihm ein der Entwickelung von Electricität sehr ähnlicher Lebensakt, welcher durch Wiederholung schwächer wird, aussetzt, und sich im directen Zusammenhang mit den Nerven zu erkennen giebt. Die leuchtenden Insecten sind Elater noctilucus, phosphoreus, ignitus, Pausus sphaerocerus Afzel., Scarabaeus phosphoreus, mehrere Arten Lampyris, Scolopendra electrica. Treviranus *Biol.* 5. 97. Bei den leuchtenden Springkäfern sind die Hauptstellen, welche leuchten, zwei ovale, mit dünnen durchsichtigen Platten bedeckte Stellen zu den Seiten des Brustschildes. Treviranus fand die leuchtende Substanz einerlei mit dem Fettkörper der Insecten. Bei dem Johanniswürmchen, Lampyris noctiluca, splendidula, strahlt das Licht aus der untern Seite der drei letzten Bauchringe, besonders aus 2 weisslichen Puncten am letzten Ringe; von Lampyris splendidula leuchten auch die Eier, und es scheint, dass auch selbst Puppe und Larve nicht ganz ohne Licht sind. Nach Treviranus sind hier die inneren Zeugungstheile der Sitz des Lichtes (?) Der scheinbar willkührliche Einfluss des Thieres auf das Leuchten geschieht nach Treviranus durch das Athemholen. Das Leuchten dauert in irrespirablen Gasarten und im luftleeren Raume nicht fort oder nimmt wenigstens ab, worin alle Beobachter ausser Macartney und Murray übereinstimmen. Nach dem Tode des Thieres ist die Fähigkeit zu leuchten nicht ganz erloschen. Die leuchtenden Theile fangen selbst getrocknet von Neuem zu leuchten an, wenn man sie in Wasser aufweicht. Das Licht der Käfer nimmt in Wasser erst nach einigen Stunden ab, in Oel dagegen sogleich, kehrt aber wieder zurück, wenn das Thier, todt oder lebendig, in Dämpfe der rauchenden Salpetersäure gebracht wird. Siehe über alles dieses und das Nähere Treviranus *Biologie* a. a. O. Tiedemann's *Physiologie I.* 488—510. Gmelins *Chemie I.* 81—86. Nach Carrara (*Bibl. Ital. LXXXII.*) soll das Licht der Lampyris italica funkelnd seyn, während das Leuchten der L. splendidula gleichförmig ist; erstere soll einen mit dem Luftröhrensystem nicht zusammenhängenden grossen Luftbehälter haben, welcher der letztern fehlt. Dieser Behälter steht mit dem Munde einerseits und sein spitzes Ende mit dem Leuchtorgan anderseits in Verbindung. Durch den Einfluss der Luft auf die leuchtende Substanz werde ihr Licht verstärkt und der Einfluss der Luft durch Compression der Blase erhöht. Es scheint nach allen bisherigen Untersuchungen Treviranus Ansicht

Digitized by Google

am wahrscheinlichsten, dass das Leuchten von einer phosphorhaltigen Materie herrührt, die sich zwar unter dem Einflusse des Lebens combinirt, aber einmal gebildet auch einigermassen vom Leben unabhängig ist. Mehrere Erscheinungen könnten glauben machen, dass die Leuchtkäfer Lichtsauger seyen, gleich den Bononischen Steinen, und das am Tage absorbirte Licht Abends wieder von sich geben, wie Carradori, Beccaria, Monti glaubten, besonders da ausser vielen mineralischen Substanzen (Schwefelbaryum mit schwefelsaurem Baryt gemengt, Austerschalen mit Schwefelblumen geglüht u. a.) auch organische Theile im getrockneten Zustande (als Samen, Mehl, Stärkemehl, arab. Gummi, Federn, Käse, Eigelb, Muskelfleisch, Sehnen, Hausenblase, Leim, Horn) ziemlich gute Lichtsauger sind. Indessen widerspricht diesem, was Todd und Murray gefunden haben, dass Leuchtkäfer auch Abends leuchteten, wenn sie an dunkeln Orten aufbewahrt waren, obgleich Macartney und Macaire das Gegentheil beobachtet haben wollen. Tiedemann's *Physiologie. I.* 503.

Unter den höheren Thieren kennt man kein Leuchten, als etwa das Phosphoresciren der Eidechseneier und das bisweilen beobachtete Phosphoresciren des Harns. Das Leuchten der Augen bei mehreren Säugethieren, besonders Raubthieren und namentlich Katzen, auch bei Kühen, Pferden, ist fast zum medicinischen Aberglauben geworden. Diejenigen Thiere scheinen zuweilen aus den Augen zu leuchten, welche Licht von einem pigmentlosen glänzenden Tapetum reflectiren, gleichwie besonders auch das pigmentlose Auge der weissen Kaninchen leuchtet, wie denn auch des Kakerlaken Sachs Augen leuchten sollten. Prevost hat die Ursache zuerst gezeigt. *Biblioth. brittannique* 1810. *T.* 45. Er zeigte, dass das sogenannte Leuchten der Thieraugen niemals in vollkommener Dunkelheit und weder willkührlich, noch durch Affecte hervorgebracht wird, sondern durch Reflexion von einfallendem Lichte entsteht. Gruithuisen hat unabhängig hiervon dasselbe gefunden. *Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie p.* 199. Diese Ansicht theilt auch Rudolphi (*Physiologie I.* 197.) mit und bemerkt, dass das Leuchten nur bei einer gewissen Stellung, wo das reflectirte Licht in unser Auge geworfen wird, erscheint, und dass, wie auch Gruithuisen schon bemerkte, auch die Augen todter Katzen bei günstiger Stellung leuchten. Ich habe dieselbe Beobachtungen gemacht und in meiner Schrift *Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes. Leipz.* 1826. *p.* 49. erzählt. Niemals haben die *Albinos* oder Kakerlaken bei ihrem scheinbaren Leuchten der Augen selbst die Empfindung des Lichtes. Man sehe Schlegel's *Beitrag zur nähern Kenntniss der Albinos. Meiningen* 1824. *p.* 70. Ferner hat Esser (Kastner's *Archiv.* 8. 394.) Versuche über das Leuchten der Thieraugen angestellt. Die Augen von Katzen, Hunden, Kaninchen, Schafeu und Pferden leuchteten nicht an ganz dunkeln Orten. Die Reflexion des Lichtes erfolgte sonst eben so gut noch nach Entfernung der Hornhaut, Iris, Linse. Ich freue mich, mit diesen Beobachtungen auch Tiedemann's Erfahrungen übereinstimmend zu finden, der das Leuch-

Digitized by Google

ten an einem Katzenkopf bemerkte, der 20 Stunden vom Rumpfe getrennt war, *Physiol. p.* 509. Um so befremdender ist es, dass neuerlichst in einem sonst so ausgezeichneten Werke wie Rengger's Naturgeschichte der Säugethiere von Paraguay abermals das Ausströmen von Licht bei vielen amerikanischen Thieren behauptet wird, das nach Durchschneidung der Sehnerven aufhören soll. Ich kann jedoch meine Ueberzeugung von der Reflexion selbst auf dieses Zeugniss nicht ändern, und es wäre überhaupt eine blosse Mystification, wenn europäische Schriftsteller die Sache wahrscheinlicher fanden, weil sie von amerikanischen Katzen beobachtet ist. Der verdienstvolle und hochgeschätzte Rengger kann sich hierbei leicht getäuscht haben. Wer für das Leuchten der Katzenaugen aus Neigung eingenommen, dem empfehlen wir, wie wir gethan haben, eine Katze in einen absolut dunkeln Raum mit sich zu nehmen und sich vom Gegentheil zu überzeugen, dabei aber die durch eine schnelle Bewegung unserer eigenen Augen und durch Zerrung des Sehnerven entstehende, bloss subjective Lichtempfindung nicht zu verwechseln. Ein neuerer Versuch, den ich mit einer Katze an einem absolut dunkeln Raum, in einem Keller der hiesigen Anatomie in Gegenwart Mehrerer angestellt, fiel ganz negativ aus. Eine Person hielt die Katze. Diese Person wurde von mir im Dunkeln an einen Ort gestellt, den die andern Anwesenden nicht kannten, den sie aber wahrnehmen mussten, falls die Katze Licht aus den Augen ausströmte. Alle sahen nichts bis auf Einen, dieser wollte 2 feurige Kreise gesehen haben. Sogleich liess ich diesen seinen Arm nach der Gegend ausstrecken, wo er die Kreise gesehen haben wollte. Dann wurde die Thüre geöffnet und nun zeigte sich, dass der Arm nach der entgegengesetzten Seite von derjenigen, wo die Katze gehalten wurde, hinwies, zu nicht geringer Belustigung. Offenbar hatte derjenige, der die 2 feurigen Kreise sah, seine eigene Empfindung gesehen. Bei rascher Wendung der Augen im Dunkeln sieht man wegen Zerrung der Sehnerven sehr leicht zwei feurige Kreise, welche nichts als die gesteigerten Empfindungen der Sehnerven sind.

Dieser Gegenstand hat in der sehr guten Schrift von Hasenstein (de luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto lucido. Jenae 1836.) seinen Abschluss erhalten. Die Versuche, die an den Thieren auch im leidenschaftlich aufgeregten Zustande angestellt sind, zeigen, dass die Augen in einem absolut dunkeln Raume niemals leuchten, wohl aber, sobald in einen solchen Raum ein Minimum von Licht einfällt, wozu Mondlicht hinreicht; diess Leuchten verschwindet auf der Stelle, so wie das Licht entfernt wird. Von besonderem Interesse sind die Beobachtungen über das reflectirende weisse Augenpigment der Fleischfresser. Das Tapetum der Pflanzenfresser verliert beim Trocknen seine Farbe, das Tapetum der Fleischfresser behält sie, und enthält ein weisses Pulver von rundlichen Körnchen. Nach den damit angestellten Versuchen soll Kalkerde wahrscheinlich in Verbindung mit Phosphorsäure seyn.

Einige haben geglaubt, die Empfindungen von Licht beim

Digitized by Google

Druck auf das Auge seyen auch hierher zu zählen. Allein diese Empfindung ist bloss subjectiv, wie der Schmerz in der Haut, weil alle Reizungen der Nervenhaut des Auges, mechanische, elektrische, wie innere organische, z. B. der Blutandrang, Nervenverstimmung, subjective Lichtempfindung erregen. Niemals kann das ein Anderer sehen, wenn unser Auge die heftigsten subjectiven Empfindungen von Leuchten hat. Die subjectiven Gesichtsaffectionen sind bei jedem sehkräftigen Auge nicht selten und bei mir äusserst häufig, aber das sind subjective Bilder, Affectionen der Nervenhaut, welche keine äusseren Gegenstände beleuchten können, weil sie ohne Entwickelung jenes imponderabeln Fluidums sind, welches auch in unserm Sehorgan Lichtempfindung erregt und Licht genannt wird; es sind blosse Empfindungen, die so wenig beleuchten, als mein Schmerz einem Andern Schmerz, mein Ohrenbrausen einem Andern Ohrenbrausen macht. Niemals findet so etwas statt. Ich habe so viel mit subjectiven Gesichtsaffectionen experimentirt, ich müsste es beobachtet haben. Man vergleiche meine Bemerkungen über den gerichts-ärztlich vorgekommenen Fall, wo Jemand durch einen Schlag auf das Auge einen Räuber erkannt haben wollte. Mueller's *Archiv für anat. und Physiol.* 1834. *p.* 140.

Uebersicht der speciellen Physiologie.

I. Von den allgemein verbreiteten thierischen Säften, von der Säftebewegung und dem Gefässsystem.
II. Von den organisch-chemischen Veränderungen in den organischen Säften und den organisirten Theilen.
III. Von der Physik der Nerven.
IV. Von den Muskelbewegungen, von der Stimme und Sprache.
V. Von den Sinnen.
VI. Von den Seelenäusserungen.
VII. Von der Zeugung.
VIII. Von der Entwickelung.

Digitized by Google

Der

speciellen Physiologie

Erstes Buch.

Von den allgemein verbreiteten organischen Säften, von der Säftebewegung und von dem Gefässsystem.

Digitized by Google

I. Abschnitt. Vom Blut.

I. Von der mikroskopisch-mechanischen Analyse des Blutes.
II. Von der chemischen Analyse des Blutes.
III. Von der Analyse des Blutes durch die galvanische Säule.
IV. Von den organischen Eigenschaften und Verhältnissen des Blutes.

II. Abschnitt. Von dem Kreislauf des Blutes und dem Blutgefässsystem.

I. Von den Formen des Gefässsystems in der Thierwelt.
II. Von den Erscheinungen des Kreislaufes.
III. Von dem Herzen als Ursache des Kreislaufes.
IV. Von den einzelnen Theilen des Gefässsystems.
V. Vom Verhalten der Gefässwände bei der Aufnahme und Ausscheidung der Stoffe.

III. Abschnitt. Von der Lymphe und dem Lymphgefässsystem.

I. Von der Lymphe.
II. Von dem Lymphgefässsystem.
III. Von den Actionen der Lymphgefässe.

Digitized by Google

Der speciellen Physiologie

Erstes Buch.

Von den allgemein verbreiteten organischen Säften, von der Säftebewegung und von dem Gefässsystem.

I. Abschnitt. Vom Blut.

Das Blut, dessen nicht genau bestimmbare Menge man beim erwachsenen Menschen sehr verschieden, von 8—30 Pfund geschätzt, ist die Flüssigkeit, welche die Stoffe zur Bildung und Erhaltung aller Theile des thierischen Körpers enthält, welche die zersetzte Materie aus den Theilen in sich zur Ausscheidung nach besonderen Organen aufnimmt, und welche durch neue Nahrungsstoffe, theils aus äusseren Stoffen, theils aus Materien, die schon organisirt waren, von dem Lymphgefässsystem aus ergänzt wird. Die Umwandlung dieser Materien in Blut ist wahrscheinlich weniger eine Wirkung einzelner Organe, als eine allgemeine Wirkung der organisirten Theile, da die Keimhaut, zu welcher sich der Keim durch Anziehung und Umwandlung der Eiflüssigkeiten ausbildet, vor der Existenz der mehrsten Organe, und nachdem die ersten Spuren der Centraltheile des Nervensystems gebildet sind, innerhalb der Area vasculosa schon das Blut erzeugt.

Das von den Lungen durch die Lungenvenen kommende und vermittelst der linken Herzkammer durch die Körperarterie und Aeste dem Körper zugetriebene Blut ist hochroth, das durch die Körpervenen zurückkehrende, und vermittelst der rechten Herzkammer durch die Lungenarterie und Aeste wieder in die Lungen getriebene Blut ist dunkelroth.

Das Blut ist bei einigen Wirbellosen (Anneliden) auch roth, unter den Mollusken wenigstens bei Planorbis röthlich nach Treviranus und meiner eigenen Beobachtung, bei vielen Wirbellosen ist es farblos.

Sowohl in den feinsten Gefässen eines durchsichtigen Theiles als ganz frisch nach dem Ausflusse mikroskopisch untersucht, besteht das Blut aus sehr kleinen rothen Körperchen und einer

Digitized by Google

klaren farblosen Flüssigkeit, *Lympha seu Liquor sanguinis*, welchen man nicht mit dem nach dem Gerinnen sich abscheidenden Blutwasser, *Serum*, verwechseln muss. Von Thieren, welche grössere Blutkörperchen haben, die nicht durch ein Filtrum von weissem Filtrirpapier gehen, wie beim Frosch, kann man noch vor dem Gerinnen sogleich einen Theil des farblosen Liquor sanguinis von den übrigen Theilen abseihen, und sich so eine Anschauung von der farblosen Blutflüssigkeit ausser den rothen Körperchen verschaffen. Die Körperchen des Blutes sind specifisch schwerer als die Flüssigkeit, und können daher keinen luftförmigen Stoff enthalten.

Das Blut des Menschen hat ein specifisches Gewicht von 1,0527 bis 1,057, einen salzigen Geschmack, reagirt schwach alkalisch, und verbreitet einen eigenthümlichen Geruch, Halitus sanguinis, der etwas verschieden ist bei verschiedenen Thieren, und am stärksten am Blute des männlichen Geschlechtes bemerkt wird.

Das aus der Ader gelassene Blut gerinnt in der Regel bei allen Wirbelthieren nach 2—10 Minuten (beim Menschen nach 3—7, bei Kaninchen schon nach 2 Minuten). Zuerst wird das Blut dabei zu einer zusammenhängenden gallertartigen Masse, die sich nach und nach zusammenzieht, und zuerst tropfenweise, dann immer stärker eine klare, schmutzig gelbliche Flüssigkeit auspresst, das *Serum, Blutwasser*. Das rothe Gerinsel wird *Crassamentum, Placenta, Coagulum sanguinis, Blutkuchen* genannt. Das Blutwasser von 1,027 bis 1,029 spec. Gew. ist von salzigem Geschmack, bei den höheren Thieren schwach alkalisch, bei dem Frosche aber sehr undeutlich, fast indifferent. Hermann hielt das Blut für sauer reagirend. Da der Farbestoff der Blutkörperchen sich in Lakmustinctur so gut wie in Wasser auflöst, so muss das mit Lakmustinctur versetzte Blut ein röthliches Serum geben, was Hermann zu dem Fehlgriffe veranlasst hat, das Serum für sauer zu halten. Das Blutwasser enthält thierische Stoffe aufgelöst, namentlich *Eiweiss, Albumen*, das aber nicht von selbst gerinnt, sondern nur bei gewissen Einflüssen, wie von Erhitzung zu 70° Cent. oder Säure, Alcohol u. A. Wird das rothe Coagulum lange in Wasser ausgewaschen, so löst sich die rothe Materie *Cruor*, in Wasser auf, und es bleibt eine weisse, fadenartige Materie zurück, welche man *Faserstoff, Fibrina*, nennt. Dieser Stoff sinkt in Blutwasser unter, gleichwie auch das rothe Coagulum, wenn es nicht zufällig, beigemengte Luftblasen enthält. Bei Schwangeren, Wöchnerinnen, im acuten Rheumatismus und in Entzündungen, überhaupt aber, wenn das Blut langsamer gerinnt, senken sich die rothen Körperchen öfter schon vor dem Gerinnen unter das Niveau der Flüssigkeit; da nun aber doch die ganze Masse gerinnt, so ist der obere Theil des Gerinsels weiss, Crusta inflammatoria, der untere roth. Wenn frisches Blut geschlagen wird, so werden die rothen Körperchen nicht mit von dem Coagulum eingeschlossen, und der Faserstoff gerinnt sogleich in farblosen Fäden, die sich an den Stab anlegen, während das übrige nun flüssig bleibende Blut die rothen Körperchen schwebend enthält. Wird das frische Blut einer sehr niedern Tempe-

Digitized by Google

ratur ausgesetzt, so gefriert es und kann aufbewahrt werden, so dass es erst beim Aufthauen gerinnt. Alkalien verhindern die Gerinnung, schon ein Zusatz von 0,001 Aetznatrum, nach Prevost und Dumas; auch einige Salze, schwefelsaures Natron, salpetersaures Kali, kohlensaures Kali und Natron dem aus der Ader gelassenen Blut beigemengt, verhindern oder verzögern die Gerinnung des Blutes. Auch Viperngift und Ticunasgift hat nach Fontana diese Wirkung, wenn 1 mit 20 Theilen Blut versetzt wird; dagegen Viperngift in Theile des lebenden Körpers gebracht, die Gerinnung des Blutes schnell herbeiführen soll. Bei Menschen und Thieren, die vom Blitz oder starken elektrischen Entladungen getödtet sind, oder nach Vergiftungen von Blausäure, bei Thieren, die bis zum Tode gejagt, beim Tode nach starken Schlagen auf den Magen, worauf die Muskeln nicht todtenstarr werden sollen, vermisst man auch zuweilen die Gerinnung des Blutes in den Gefässen. Abernethy *physiol. lect. pag.* 246.

Das Blut gerinnt sonst ausser dem lebenden Körper sowohl in der Ruhe, als wenn es bewegt wird, auch bei einer Temperatur, welche der des lebenden Körpers gleich ist, es gerinnt im luftleeren Raum und in vollgefüllten, luftdicht verschlossenen Gefässen und in nicht atmosphärischen Gasarten. Schroeder van der Kolk *comment. de sanguinis coagulatione. Groning.* 1820. *Diss. sist. sang. coagulantis historiam. Groning.* 1820. Die einzige Ursache der Gerinnung ist daher, dass sich die Mischung des Blutes nur unter dem Einflusse der lebenden Theile und namentlich der Gefässe erhält. Blut, welches im lebenden Körper aus den Blutgefässen austritt, gerinnt auch meistens. Nach Schroeder's Versuchen gerinnt das Blut ausserordentlich schnell nach gewaltsamer Zerstörung des Gehirns und des Rückenmarks, und man soll einige Minuten nach der Operation schon Coagula in den grossen Gefässen finden. Mayer beobachtete, dass nach Unterbindung des Nervus vagus das Blut in den Gefässen gerinne und so tödte, dagegen in 4 Versuchen bei 2 Hunden und 2 Kaninchen, die unter meiner Anleitung angestellt wurden, nach dieser Operation, als die Thiere unmittelbar nach dem erfolgten Tod untersucht wurden, nur 2mal im linken Herzen ein erbsengrosses Coagulum, keines in den Lungengefässen gefunden ward. Hewson, Parmentier & Deyeux und Schroeder haben beobachtet, dass, je mehr die Lebenskraft eines Thieres abnimmt, die Gerinnung des aus der Ader gelassenen Blutes um so schneller eintritt. Mehrere Beobachter wollen eine Temperaturerhöhung bei der Gerinnung beobachtet haben, wie Gordon, Thomson, Mayer, während J. Davy und Schroeder dies auf das Bestimmteste in Abrede stellen J. Davy *tentamen experimentale de sanguine. Edinb.* 1814. Meckel's *Archiv.* 1. *p.* 117. Vergl. *ebend.* 2. 317. 3. 454. 3. 456. Ueber das Blut im Allgemeinen sind Parmentier und Deyeux in Reil's *Archiv. B.* 1. *H.* 2. *p.* 76., Hewson *vom Blute. Nürnb.* 1780., Prevost und Dumas, *Bibliothèque universelle T.* 17. *p.* 294. Meck. *Archiv.* 8., Scudamore *über das Blut, aus d. Engl. Würzburg* 1826. und Berzelius *Thierchemie* 1831., Denis *rech. experim. sur le sang humain. Paris* 1830. M. Edward's in Todd *Cyclopaedia of ana-*

Digitized by Google

tomy and physiology, C. H. Schultz *System der Circulation, Stuttgart* 1836., H. Nasse das Blut physiologisch und pathologisch untersucht, nachzusehen.

I. Capitel. Mikroskopisch-mechanische Analyse des Blutes *).

(Nach eigenen Untersuchungen. Poggend. *Annal.* 1832. 8.)

a. Untersuchung der Blutkörperchen.

Ueber die Form der Blutkörperchen waren die Angaben der Schriftsteller, welche man in E. H. Weber's Ausgabe von Hildebrandt's *Anatomie* und Burdach's *Physiologie. Bd. IV.* vollständig zusammengestellt findet, sehr verschieden. Die vorzüglichsten Beobachter sind: Muys, Fontana (*Nouvi osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. Lucca* 1766), Hewson (*experimental inquiries part.* 3. *Lond.* 1777), Prevost und Dumas (*Biblioth. univers. T.* 17. Meckel's *Archiv. T.* 8.), R. Wagner *zur vergleichenden Physiologie des Blutes*, 1834. Was ich hier mittheile, ist bloss das Resultat eigner Beobachtung. Um die Blutkörperchen zu untersuchen, darf man sie nicht mit Wasser verdünnen, man würde sie dann ganz anders sehen, als sie im lebenden Körper sind; das Wasser verändert ihre Form augenblicklich, die elliptischen Blutkörperchen werden auf der Stelle rundlich, auch verlieren die Blutkörperchen ihre Plattheit. Daher muss man die Blutkörperchen entweder ohne Beimischung ganz dünn auf dem Objectträger des Mikroskopes ausbreiten, oder man muss sie mit Blutserum verdünnen. Z. B. um die Blutkörperchen des Frosches zu untersuchen, wende ich einen Tropfen Serum von schon geronnenem Froschblute an, und setze dazu etwas von einem Tropfen frischen Froschblutes. Wasser, worin etwas Kochsalz oder Zucker aufgelöst ist, kann ebenfalls zur Verdünnung angewandt werden. Diese Auflösungen verändern die Blutkörperchen durchaus nicht. Die Vermischung des Bluts mit Wasser und der Gebrauch schlechter Instrumente haben die verschiedenen Angaben über die Form der Blutkörperchen veranlasst.

Ich finde die Blutkörperchen beim Menschen grösstentheils gleich gross; einzelne sind ein wenig grösser als die Mehrzahl derselben, aber nicht noch einmal so gross im Durchmesser. Beim Frosch sind sie ebenfalls meistens gleich gross, doch sieht man auch solche, die bei übrigens gleicher Form doch etwas kleiner sind, und gleichsam noch in der Bildung begriffen zu seyn scheinen. Nach Prevost und Dumas sind die Blutkörperchen des Embryo grösser. Beim Embryo des Kaninchens fand ich sie sehr ungleich; hier sieht man einzelne, welche mehr als noch einmal so gross als die Mehrzahl im Durchmesser sind,

*) Dieser Artikel erscheint hier wie in der vorhergehenden Auflage. Zusätze sind in den Anmerkungen enthalten.

Digitized by Google

während die Mehrzahl durchaus in der Grösse denen des erwachsenen Kaninchens gleich kommt. Die Blutkörperchen der Froschlarven scheinen etwas kleiner, als die der erwachsenen Frösche, und sind viel blässer. Die Gestalt der Blutkörperchen ist bei verschiedenen Thieren sehr verschieden, sie sind indess, mögen sie kreisförmig oder elliptisch seyn, immer platt. Runde Scheiben sind sie beim Menschen und den Säugethieren; interessant wäre, zu wissen, wie sie wohl beim Schnabelthier und der Echidna seyn mögen. Elliptisch finde ich sie, übereinstimmend mit anderen Beobachtern, bei den Vögeln (Huhn, Taube), bei den Amphibien (Frosch, Salamander, Eidechse), und bei den Fischen, wo sie sich zuweilen, wie beim Karpfen, der runden Form nähern, ohne vollständig rund zu seyn. Rudolphi giebt sie von den Fischen rund an, wie ich sie früher, als ich sie noch nicht gut zu untersuchen verstand, bei Clupea alosa gefunden habe; diess scheint ein Beobachtungsfehler zu seyn, oder es rührte von Vermischung mit Wasser her, wovon die elliptischen Blutkörperchen der Fische, Amphibien, Vögel, nach meiner Beobachtung, jedesmal rund und kugelig werden *). Später fand ich die Blutkörperchen von Clupea alosa wirklich elliptisch. Die elliptischen Körperchen der Amphibien und Vögel sind im Durchschnitt etwa noch einmal so lang als breit. Dass sie platt sind, dies habe ich nicht allein von den elliptischen Körperchen der Fische, Vögel und Amphibien, sondern auf das Bestimmteste auch von den kreisförmigen Körperchen des Kalbes, der Katze, des Hundes, des Kaninchens und des Menschen gesehen. Hierzu bedarf man aber guter optischer Instrumente. Von der Abplattung überzeugt man sich, wenn man den mit Serum, Kochsalz oder Zuckerwasser verdünnten Blutstropfen unter dem Mikroskop in Bewegung bringt, so dass viele von den Blutkörperchen beim Fliessen sich auf den Rand stellen. Am plattesten sind sie, im Verhältniss zu den andern Durchmessern, bei den Amphibien und bei den Fischen; unter allen Thieren finde ich sie am plattesten beim Salamander, sehr platt sind sie auch beim Frosch, wo ihre Dicke 8 bis 10 Mal geringer ist, als ihr Längendurchmesser. Die Blutkörperchen des Salamanders zeigen, wenn sie senkrecht auf dem Rande stehen, keine von der Mitte der beiden Seitenflächen hervorragende Erhöhung, sondern sind ganz gleichförmig platt; die der Frösche zeigen aber zuweilen, nicht immer deutlich, ein auf beiden Seiten hervorragendes mittleres Hügelchen, wenn sie senkrecht auf dem Rande stehen, so wie es Prevost und Dumas abgebildet haben. Obgleich, wie ich später zeigen werde, die Blutkörperchen einen innern Kern haben, so ragt doch dieser nur bei den Fröschen in der Mitte etwas hervor; bei allen übrigen Thieren dagegen ist er nicht hervorragend. Die elliptischen Blutkörperchen der Vögel sind sich ganz und gar ähnlich, zwar nicht so platt, wie die der Amphibien, sie sind jedoch entschieden platt, ungefähr in dem Verhältniss, wie ein Brod hiesigen Landes. Dass

*) Nach R. Wagner's Untersuchungen sind sie bei den Fischen bald elliptisch bald mehr der runden Form sich nähernd.

Digitized by Google

sie auch bei den Säugethieren und dem Menschen platt sind, davon konnte ich mich früher nicht überzeugen, wohl aber, nachdem ich ein kostbares Fraunhofer'sches Mikroskop anwenden konnte, und gelernt hatte, das man mit Wasser nicht verdünnen dürfe. Die Abplattung ist bei den Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere ganz gleichförmig, und sie haben jedenfalls in der Mitte keine Erhöhung. Wenn sie auf dem Rande stehend gesehen werden, erscheinen sie wie ein kurzer, gleich dicker, dunkler Strich, der an beiden Enden nicht abgerundet, sondern fast scharf aufhört, ähnlich einer Münze, die man gegen den Rand ansieht. Doch ist der öfter gebrauchte Vergleich mit Münzen deswegen unrichtig, weil sie im Verhältniss zum Breitendurchmesser nicht so dünn wie Münzen sind; sie sind beim Menschen nur 4 bis 5mal so dünn als breit.

Die Blutkörperchen der nackten Amphibien sind die grössten, die ich kenne; die der Vögel und Fische und beschuppten Amphibien sind kleiner. Die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere sind die kleinsten, und unter den Säugethieren sind sie bei der Ziege am kleinsten, wie Prevost und Dumas gefunden haben, und ich wiederfinde. Beim Kalbe sind sie ein Weniges kleiner als beim Menschen. Beim Menschen fand ich ihren Flächendurchmesser = 0,00023 — 0,00035 Par. Zoll. W. und E. Weber, so wie Wollaston, geben sie zu 0,00020, Kater zu 0,00023, Prevost und Dumas zu 0,00025 P. Z. an. Die Blutkörperchen der Vögel, neben einander mit denen der Frösche untersucht, sind etwa halb so gross, als die der Frösche, die der Salamander sind etwas grösser, als die der Frösche, aber nicht $\frac{1}{3}$ grösser, sie sind etwas länglicher; die der Eidechse finde ich ungefähr $\frac{2}{3}$ vom Durchmesser derjenigen des Frosches. Die Blutkörperchen des Frosches sind, neben denen des Menschen unter sucht, ungefahr vier Mal grösser, der Flächendurchmesser der Blutkörperchen des Menschen mit dem Längendurchmesser derselben beim Frosche verglichen. Auch das Blut der Wirbellosen enthält Körperchen; sie sind aber noch nicht gehörig untersucht.

In der Mitte der kreisförmigen und der elliptischen Blutkörperchen sieht man einen Fleck, der in den kreisförmigen rund, in den elliptischen elliptisch ist, und auf der Seite der Beleuchtung hell, auf der Seite des Schattens dunkel erscheint; er sieht zuweilen, und zwar bei den Vögeln, Amphibien und Fischen, wie ein Kern im Innern aus, besonders bei heller Beleuchtung, wo die Schatten wegfallen; zuweilen und zwar bei weniger heller Beleuchtung sieht er wie eine Erhöhung aus, und zwar bei den Fröschen vorzugsweise, durchaus nicht bei den Salamandern, und auch nicht bei Vögeln und Fischen. Bei den Fröschen glaubt man deutlicher eine elliptische Erhöhung zu sehen, wenn die Körperchen in wenig Serum enthalten sind; alsdann glaubt man auch beim Frosch eine Vertiefung zwischen dem wulstigen Rande und der mittlern elliptischen Erhöhung zu bemerken. Ich sage hier bloss, was man bei verschiedenen Bedingungen zu sehen glaubt, nicht was ich dafür halte. Da nun aber die Blutkörper-

Digitized by Google

chen der Vögel, Salamander und vieler Fische, auf dem Rande stehend, an den Seitenflächen nicht eine mittlere Hervorragung zeigen, so kann ihr mittlerer Fleck auch keine Erhöhung seyn, und der Fleck rührt von dem Kern des Blutkörperchens her, welches sich auf eine andere Art beweisen lässt. Da ferner die Blutkörperchen des Frosches, auf dem Rande stehend, zuweilen ein flaches Hügelchen an den Seitenflächen zeigen, so muss der Kern hier auch eine wirkliche unbedeutende Hervorragung bilden. (R. Wagner hat indess auch an den Blutkörperchen vieler anderer Thiere, Amphibien und Fische diese Hervorragung beobachtet.) Die kreisförmigen Blutkörnchen des Menschen und der Säugethiere, durch ein gutes Instrument beobachtet, zeigen weder auf dem Rande stehend irgend eine Spur von Hervorragung an den Seitenflächen, noch hat der Fleck, wenn man sie gegen eine der Flächen ansieht, jemals das Ansehn einer Erhöhung. Die Schriftsteller haben, indem sie beständig von einem Thier auf das andere schlossen, hier zum Theil viel Verwirrung herein gebracht. Die Beobachtungen von Prevost und Dumas habe ich dagegen in vielen Punkten bestätigen können. Die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere sehen zuweilen in einer gewissen Beleuchtung so aus, als wenn sie vom Rande gegen die Mitte ganz seicht ausgehöhlt wären. Der Optiker Young ist geneigt, den Fleck für eine wirkliche Aushöhlung zu halten, ich will das nicht sagen. Es ist mir sogar in hohem Grad unwahrscheinlich, weil ich mich zuletzt überzeugt habe, dass die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere einen sehr kleinen Kern enthalten, der die Dicke des platten Blutkörperchens hat. Wenn die Scheibchen schief stehen, so dass man etwas von der einen Fläche und etwas vom obern Rande sieht, so bildet der obere Rand einen dunkeln Halbkreis, nach der einen Seite convex, nach der andern concav. Aus meinen Beobachtungen, die ich sogleich anführen werde, ergiebt sich unzweifelhaft, dass die Blutkörperchen der Frösche und Salamander einen Kern enthalten, der sich ganz anders chemisch verhält, als die Rinde. Da in den Blutkörperchen der Fische und Vögel dieser Kern mikroskopisch gerade so erscheint, wie bei den Amphibien, so ist es schon hieraus sehr wahrscheinlich, dass auch die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere einen Kern enthalten, was sich nur wegen der Kleinheit nicht so leicht wie dort direct beweisen lässt. Ich habe aber auch mit dem Fraunhofer'schen Mikroskope an den Blutkörperchen des Menschen bei einer gewissen Beleuchtung ganz deutlich einen sehr kleinen, runden, scharfbegrenzten Kern gesehen, der mehr gelblich und glänzend aussah, als der durchscheinende Umfang. Wenn man die Blutkörperchen unter dem Mikroskope mit Essigsäure vermischt, so wird die Schale fast ganz aufgelöst, und es bleiben dann diese überaus kleinen Kerne übrig, die beim Menschenblut sehr schwer zu sehen sind, während sie vom Froschblut als ganz deutliche Kerne erscheinen, die man früher im Innern der Blutkörperchen gesehen hat. Beim Menschen sind die Kerne im Innern der Blutkörperchen so klein, dass sie nicht dicker sind, als

Digitized by Google

der Durchmesser der Dicke des platten Blutkörperchens, und darum müssen sie nicht nothwendig eine Erhöhung in der Mitte bilden.

Im Blute der Frösche, so wie es aus dem Herzen selbst erhalten wird, habe ich noch eine zweite, viel kleinere Art von Körperchen gefunden, die sehr sparsam darin vorkommen; sie sind ganz rund, nicht platt, und ungefähr vier Mal kleiner als die elliptischen Blutkörperchen; sie kommen ganz mit den sehr sparsamen Körnchen der Lymphe der Frösche überein, die ich im 3. Abschn. beschreiben werde, und sind offenbar Lymphkügelchen von der in's Blut gelangenden Lymphe, oder Chylusküge lchen. Vielleicht entstehen aus den Lymph- und Chylusküge lchen die Kerne der elliptischen Blutkörperchen. Doch sind die durch Essigsäure von der Hülle befreiten Kerne der Froschblutkörperchen zwar ungefähr so gross, als die seltnere Art von Körnchen im Blut und als die Körnchen der Lymphe; allein die beiden letzteren sind rund, die durch Essigsäure dargestellten Kerne der elliptischen Blutkörperchen sind dagegen elliptisch, und beim Salamander sogar noch deutlich platt. Auch sind die Chylusküge lchen von Säugethieren viel grösser, als die Kerne der Blutkörperchen derselben Thiere. Von den ganzen Blutkörperchen unterscheiden sich aber die Chylusküge lchen dadurch, dass die Chylusküge lchen in Wasser ganz unauflöslich sind, während die Blutkörperchen in Wasser bis auf ihre Kerne sich auflösen.

Man glaubt gewöhnlich, dass die Natur sehr schnell den zum Blut gelangenden Chylus in Blut umwandele; diess mag allerdings so seyn. Indessen werden die Chylusküge lchen im Blut auch durch ihre Zertrennung zwischen den rothen Blutkörperchen unsichtbar. Wenn man aber die Gerinnung des Bluts von Säugethieren oder vom Menschen durch ein Mininum von unterkohlensaurem Kali verlangsamt, so sinken die rothen Blutkörperchen allmählig vor der Gerinnung einige Linien unter das Niveau der Flüssigkeit, und die darüber stehende Flüssigkeit ist weisslich, offenbar von den dem Blute beigemengten Chylusküge lchen. Bei der gewöhnlichen Gerinnung werden die Chylusküge lchen zwischen der ungeheuren Menge der rothen Blutkörperchen mit in das Coagulum eingeschlossen, daher das Serum durchscheinend und nicht weisslich ist, während in obigem Versuche vor der Gerinnung die leichten Chylusküge lchen im obern, die schwereren Blutkörperchen im untern Theil der Flüssigkeit suspendirt sind.

So lange die Blutkörperchen im Serum des Blutes enthalten sind, löst sich ihr Farbestoff nicht auf, wohl aber, wenn Wasser damit in Berührung kommt. Was Home (*Phil. Transact.* 1818.) von der leichten Zersetzbarkeit der Blutkörperchen gesagt hat, davon habe ich nichts bestätigt gefunden. Wenn Blut von Säugethieren geschlagen worden ist, so behalten die Blutkörperchen ihre Form, und mehrere Stunden später, ja selbst am andern Tage, mit den besten Instrumenten untersucht, zeigen die Blutkörperchen nicht die geringste Veränderung ihrer Form und Grösse. Selbst nach 24 Stunden ist fast nichts davon im Blutserum aufgelöst, und das Serum, welches in 24 Stunden einige Li-

Digitized by Google

nien hoch über den im Serum suspendirten Blutkörperchen steht, ist gelb und farblos. Nach 12 bis 24 Stunden stehen die Blutkörperchen von geschlagenem Schaf- und Ochsenblut $1\frac{1}{2}$ Linien unter dem Niveau der Flüssigkeit. Von geschlagenem Menschenblut und Katzenblut sinken die Blutkörperchen etwas tiefer, nämlich 4 bis 6 Linien schon innerhalb einiger Stunden. Solches geschlagene und vom weissen Faserstoffgerinnsel befreite Blut hat ganz das Ansehen des natürlichen Blutes, die Kügelchen schweben darin, und wenn das Blut vom Schaf und Ochsen bei 15° C. mehrere Tage steht, so bleiben sie doch darin suspendirt und sinken nicht ganz zu Boden. Die rothen Körperchen von geschlagenem Ochsen- und Schafblut senken sich in mehreren Tagen nur höchstens $2\frac{1}{2}$ Linien unter das Nivau der Flüssigkeit; das darüber stehende Serum, Anfangs farblos, farbt sich in mehreren Tagen nur ganz unbedeutend. Bringt man aber etwas Wasser zu geschlagenem Blute von Säugethieren, so lost sich ein Theil des Farbestoffes im Wasser auf, und ein grosser Theil der Blutkörperchen sinkt zu Boden. Die Blutkörperchen des Frosches sinken dagegen schon im blossen Serum des Froschblutes schnell zu Boden, und das Serum steht farblos darüber; so erhalten sich die Körperchen, bei nicht zu warmer Witterung, ohne die geringste Veränderung ihrer Form und Grösse mehrere Tage lang. Um von Froschblut ein mit Blutkörperchen gemengtes Serum zu erhalten, nehme ich das sich bildende Gerinnsel, so wie es sich bildet, nach und nach heraus, bis sich nichts mehr bildet; auch rühre ich das Gerinnsel vorher in der noch übrigen Flüssigkeit um, damit die sich anhängenden Blutkörperchen sich ablosen. Auf diese Art erhält man, nach weggenommenem Gerinnsel, Blutserum mit einer grossen Menge von Körperchen, während ein anderer Theil der Körperchen von dem Gerinnsel eingeschlossen ist. In diesem Zustande können die im Serum enthaltenen Blutkörperchen zu verschiedenen Versuchen dienen, worauf man ihre Veränderung mikroskopisch untersucht, während man frisches Blut wegen des sich bildenden Gerinnsels nicht gut zu Versuchen über das Verhalten der Blutkörperchen zu verschiedenen Stoffen brauchen kann.

Wenn man zu dem, auf die angezeigte Art bereiteten, von Gerinnsel befreiten Gemenge von Serum und Blutkörperchen des Frosches Wasser zusetzt, und das Gemenge umrührt, so löst sich der Farbestoff der Blutkörperchen allmählig im Wasser auf, und es bleibt zuletzt ein weisser Satz auf dem Boden des Uhrglases, der nun aus runden Kügelchen besteht, die viermal kleiner sind als die Blutkörperchen, und der sich im Wasser nicht auflöst. Um die Auflösung des Farbestoffes in dem Wasser zu befördern, ist es gut viel Wasser zuzusetzen. Man vermischt in einem Uhrglase das Gemenge von Serum und Blutkörperchen des Frosches mit Wasser, so dass das Gläschen voll wird. Nun wartet man kurze Zeit, bis sich die Blutkörperchen zu Boden gesetzt haben, und senkt sodann das volle Uhrglas in ein grösseres Glas mit Wasser vorsichtig so ein, dass der Satz des Uhrglases nicht aufgerüttelt und zerstreut wird. So lässt man das Glas 12 bis 24

Digitized by Google

Stunden stehen, worauf der rothe Satz weiss geworden ist. Mikroskopisch untersucht, zeigt sich nun nichts mehr von den früheren elliptischen Blutkörperchen, dagegen eine grosse Menge 4mal kleinerer, rundlicher, nur zum Theil ovaler Kügelchen. Untersucht man den Satz in den Zwischenzeiten vor Ablauf der 12—24 Stunden, so kann man sich überzeugen, dass der Farbestoff in dem Maase, als er sich im Wasser auflöst und dasselbe färbt, sich von den elliptischen Blutkörperchen entfernt hat, so dass sie immer kleiner werden, während der Kern derselben bleibt, bis zuletzt bloss der im Wasser unauflösliche farblose Kern übrig ist*). Mit diesem weissen Satze kann man dann weiter kleine Versuche anstellen. Im Wasser sich selbst überlassen, löst er sich nicht auf, sondern bildet zuletzt ein schleimiges, noch aus denselben kleineren Kügelchen bestehendes Wesen auf dem Boden des Glases. In Alkalien wird dieser Satz aufgelöst; Essigsäure verändert ihn in langer Zeit nicht. Der Action der galvanischen Säule ausgesetzt, verhält er sich so, wie eine Auflösung von Eidotter, wie später ausgeführt werden soll.

Dass sich der Farbestoff der Blutkörperchen ganz und in allen Verhältnissen im Wasser auflöst, wie Berzelius gegen Prevost und Dumas bemerkt, und dass er dann nicht in kleinen Fragmenten im Wasser suspendirt ist, davon kann man sich nicht allein am Blute des Menschen und der Säugethiere, sondern auch viel sicherer an den Blutkörperchen des Frosches überzeugen. Was aus den Kernen der Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere wird, wenn die Blutkörperchen mit Wasser gemengt werden, lässt sich wegen ihrer ausserordentlichen Kleinheit nicht ausmitteln, und es ist nach Analogie des Froschblutes nur wahrscheinlich, dass die in Wasser unauflöslichen Kerne im Wasser suspendirt bleiben, wenn man geschlagenes und vom Gerinnsel befreites Säugethierblut mit so viel Wasser verdünnt, dass aller Farbestoff der Blutkörperchen sich auflöst. Beim Gerinnen des ungeschlagenen Säugethierblutes bleiben die Kerne der Blutkörperchen mit dem rothen Coagulum verbunden, vielleicht selbst noch, wenn der Farbestoff aus diesem Coagulum schon ausgewaschen ist; vielleicht werden sie auch hierbei mit ausgewaschen (ohne wie der Farbestoff aufgelöst zu werden). Berzelius scheint die Unlöslichkeit des Farbestoffes im Serum von dessen Eiweiss-

*) Man hat bemerkt, dass die Schale der Blutkörperchen zwar stark in der Form verändert werde, aber sich nicht eigentlich in Wasser auflöse. Wartet man lange genug, so sieht man, dass die Schale ganz zerstört wird und dass nur die Kerne übrig bleiben. Dass in 24 Stunden an den Blutkörperchen die Schale noch nicht zerstört, der Farbestoff aber ausgezogen war, ist eine von mir selbst gemachte Beobachtung Burdach's *Physiologie Bd.* 4. 84. Nach mehreren Tagen ist die Schale der Blutkörperchen vom Wasser ganz zerstört und der übrig bleibende Rest besteht aus blossen Kernen mit einem Satz von sehr feinem körnigem Wesen, der die Kerne verlassen hat. Der Farbestoff der Schale wird schon viel früher aus der Schale ausgezogen. Dass der Farbestoff der Schale von der übrigen Materie der Schale noch verschieden ist, geht auch hieraus hervor, und ist a. a. O. bereits bemerkt.

Digitized by Google

gehalt abzuleiten, und bemerkt, dass, wenn Wasser, womit der Blutkuchen ausgewaschen worden, Farbestoff absetzt, diess von anhängendem Serum herrühre. Ich theile ganz die Ansicht des grossen Chemikers, dass der Farbestoff der Blutkörperchen im Wasser in allen Verhältnissen löslich ist; indessen glaube ich, dass die Nichtauflösung des Farbestoffes im Serum nicht allein von der Auflösung des Eiweisses, sondern auch vorzüglich von der Auflösung der Salze im Serum herrührt. Wenn ich auf dem Objectträger des Mikroskopes zu einem Tröpfchen Froschblut einige Tropfen von einer wässrigen Auflösung von Eidotter zusetzte, so sah ich die Blutkörperchen fast eben so schnell ihre Gestalt verändern und rund werden, als wenn ich reines Wasser zusetzte. Wenn ich aber zu einem Tropfen Froschblut Tropfen von einer Auflösung eines solchen Salzes brachte, welches das Blut nicht zersetzt, z. B. von unterkohlensaurem Kali oder von Kochsalz, so veränderte sich die Form und Grösse der Blutkörperchen durchaus nicht. Auch Zuckerwasser wirkt wie Salzauflösung. Die Natur der Blutkörperchen wird sehr aufgeklärt durch ihr Verhalten gegen verschiedene Reagentien, welches man mit dem zusammengesetzten Mikroskope an den grossen Blutkörperchen der Frösche und Salamander allein deutlich beobachten kann. Man kann hierzu Tropfen frischen Froschblutes nehmen. Da sich indess in diesen ein Gerinnsel bildet, so ist es besser, wenn man sich auf die früher angezeigte Art durch Entfernen des Gerinnsels ein blosses Gemenge von Serum und Blutkörperchen des Froschblutes bereitet. Man bringt ein Tröpfchen davon auf den Objectträger des Mikroskopes, und breitet es aus, daneben bringt man einen Tropfen von einem Reagens. Während man nun observirt, bringt man beide Tropfen mit einander in Verbindung, und betrachtet die Veränderungen der Blutkörperchen; oder man betrachtet zuerst die Blutkörperchen für sich, setzt dann das Reagens auf dem Objectträger hinzu und betrachtet sie wieder. Dieser Methode habe ich mich beständig bei den folgenden Untersuchungen bedient.

Sehr merkwürdig ist die augenblickliche Veränderung der Blutkörperchen durch reines Wasser. Die Blutkörperchen des Menschen werden davon undeutlich, man sieht wegen der Kleinheit das Nähere nicht; doch glaube ich bemerkt zu haben, dass sie ihre Plattheit verlieren. Denn ich konnte beim Vorbeifliessen der Blutkörperchen unter dem Mikroskope keine mehr erkennen, die einen scharfen Rand bei veränderter Stellung sehen liessen. Am Froschblute sieht man aber Alles genau. So wie ein Tropfen Wasser mit einem Tropfen Blutes in Berührung kommt, werden augenblicklich die elliptischen platten Körperchen rund, und verlieren ihre Plattheit, so dass sich beim Vorbeifliessen keine mehr aufstellen und einen scharfen Rand sehen lassen. Ob sie dabei aufschwellen, weiss ich nicht; sie werden kleiner, als der Längendurchmesser der Ellipse war, aber doch grösser als der Breitendurchmesser derselben. Viele zeigen sich ungleich, uneben, verschoben; die meisten sind rundlich, aber ungenau. Der Kern hat sich durch die Berührung des Wassers bei vielen verschoben,

Digitized by Google

er wird nicht mehr in der Mitte, sondern an der Seite gesehen, in anderen fehlt er ganz; solcher sind jedoch nur wenige, und diese scheinen durch die gewaltsame Veränderung, welche sie vom Wasser erlitten haben, ihre Kerne ausgetrieben zu haben; denn man sieht, so wie Blutkörperchen ohne Kerne, so auch elliptische Kerne ohne Hülle auf dem Sehfelde zerstreut, aber nicht zahlreich. Von den erwähnten kleineren Kügelchen des Froschblutes unterscheiden sich diese wenig zahlreichen ausgetriebenen Kerne durch ihre elliptische Gestalt. Nach und nach, wenn man mehr Wasser zusetzt, verändert sich auch die Grösse der rund gewordenen, zum Theil noch kernhaltigen, zum kleinsten Theil kernlosen Blutkörperchen. Sie werden unter den Augen des Beobachters kleiner, zerfliessen, und zuletzt, nach einiger Zeit, ist nichts mehr übrig als die Kerne, die sich im Wasser nicht auflösen. Wasser, worin unterkohlensaures Kali, oder Kochsalz, oder Salmiak, oder Zucker aufgelöst worden, verändert nicht im Geringsten die Form und Grösse der Blutkörperchen. Nur von gesättigter Auflösung von unterkohlensaurem Kali scheinen sie allmählig etwas kleiner zu werden. Bringt man Blutkörperchen des Frosches von dem vom Gerinnsel befreiten Gemenge von Blutkörperchen und Serum mit verdünnter oder concentrirter Essigsäure unter dem Mikroskope in Berührung, so werden sie augenblicklich unförmlich, zum Theil rund, und ihre Farbestoffhülle wird in einigen Minuten fast ganz aufgelöst, so dass nur die elliptischen Kerne übrig zu bleiben scheinen, welche zwischen $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ von der Breite der ganzen Blutkörperchen im Breitendurchmesser haben. Diess sind nicht etwa zusammengeschrumpfte Blutkörperchen, sondern es sind die unveränderten Kerne, die man schon früher sah, und um welche herum die Farbestoffhülle sichtbar kleiner wird, bis sie ganz aufgelöst scheint. Doch wird nicht die ganze Rinde von Farbestoff um den Kern aufgelöst; denn mit dem Fraunhofer'schen Mikroskope konnte ich mich überzeugen, dass ein sehr schmaler, überaus blasser, unscheinbarer Umriss um die deutlich erscheinenden Kerne herum geblieben war, dessen Durchmesser aber sehr viel kleiner ist, als der Durchmesser des ganzen Blutkörperchens. Diese Kerne entsprechen den Umrissen des ganzen Blutkörperchens. Beim Frosche scheinen sie nicht platt zu seyn, wenigstens nicht merklich; beim Salamander habe ich dagegen die Kerne, nach der Behandlung der Blutkörperchen mit Essigsäure, ganz deutlich platt gesehen, so platt wie die Blutkörperchen selbst. Beim Frosche sind sie ungefähr noch einmal so lang als breit, obgleich es auch einzelne giebt, die sich der runden Form mehr nähern; beim Salamander sind die Kerne länglicher, und haben fast parallele Seiten, während sie an beiden Enden abgerundet sind. Auf diese Art kann man durch Essigsäure auch die überaus kleinen Kerne von den Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere darstellen, die man jedoch nur bei der grössten Aufmerksamkeit mit einem sehr klaren Instrumente sieht.

Versetzt man unter Umrühren ein vom Gerinnsel befreites Gemenge von Blutkörperchen und Serum des Frosches in einiger

Digitized by Google

Quantität mit Essigsäure, so erleiden die Blutkörperchen dieselbe Veränderung; aber man sieht nun auch, dass die Kerne, welche sich zu Boden setzen, ein hellbraunes Pulver bilden, welches sich in mehreren Tagen nicht auflöst, und später, mikroskopisch untersucht, noch aus denselben unveränderten Kernen der Blutkörperchen besteht. Faserstoff und Eiweiss wird sonst in Essigsäure nicht braun, sondern durchscheinend und allmählig etwas dadurch aufgelöst. Indessen scheint die braune Farbe des Pulvers von etwas noch anhängendem und vielleicht chemisch verändertem Farbestoff herzurühren; denn die Kerne der Blutkörperchen, welche man durch Behandlung der Blutkörperchen mit Wasser in grösserer Quantität auf die angezeigte Art erhält, sind weiss, und bleiben, mit Essigsäure begossen, ein weisser Satz. Die hierzu angewandte Essigsäure war als chemisch rein geprüft, und etwas mehr concentrirt als die Essigsäure der preussischen Pharmacopoe.

Salzsäure löste unter dem Mikroskope die Blutkörperchen nicht bis auf ihre Kerne auf, sie wurden nur unmerklich kleiner. Chlorgas entfärbte das Froschblut; zuerst wird es nämlich bräunlich, aber schnell ganz weisslich; dabei gerinnt das Eiweiss in Kügelchen. Später, mikroskopisch untersucht, zeigen sich in der weissen Materie noch die Formen der Blutkorperchen, sie sind aber etwas kleiner. Man kann den Versuch so anstellen, dass man die Röhre, wodurch man Chlorgas leitet, mit Froschblut inwendig bestreicht, oder dass man in ein mit Chlorgas gefülltes, sehr enghalsiges Glas Froschblut hineinfliessen lässt und das Glas schnell verstopft. Das Blut fliesst nun eine Strecke an den Wänden herab, gerinnt aber sehr schnell. Sauerstoffgas und Kohlensäure verändern die Form der Blutkörperchen nicht.

Liquor kali caustici veränderte die Form der Blutkörperchen nicht, sondern machte sie in ihren natürlichen Dimensionen immer kleiner, so dass sehr schnell nicht allein die Hülle, sondern auch der Kern ohne Spur aufgelöst wurde. Liquor ammonii caustici löste die Körperchen noch schneller auf, und veränderte im Momente der Berührung schon die Körperchen ins Runde. Auch die Kerne wurden spurlos aufgelöst. Alkohol verändert die Körper nicht; sie schrumpfen nur ein wenig ein, und werden wegen der Kügelchen von Eiweiss, die sich durch Gerinnung aus dem Serum bilden und das Gesichtsfeld trüben, undeutlich. Strychnin und Morphium brachten in den Körperchen keine Veränderung hervor.

Die Blutkörperchen sind im arteriösen und venösen Blute von gleicher Form und gleicher Grösse, was mit den Angaben des sonst genauen Kaltenbrunner im Widerspruch steht, welcher behauptet, dass die Blutkörperchen in den Capillargefässen etwas anschwellen, und dass zugleich ihre Ränder weniger umschrieben werden und etwas zerfliessen. Ich fand auch, dass die Form der Blutkörperchen durchaus nicht verändert wurde, als ich Fröschen die Lungen ganz unterband und darauf abschnitt, worauf sie noch 30 Stunden lebten, wahrscheinlich durch Athmen mit der Haut, wie die Fische in v. Humboldt's und Provençal's Versuchen.

Digitized by Google

Ueber die Blutkörperchen der Wirbellosen siehe die oben angeführte, sehr reichhaltige Schrift von Wagner.

b. Untersuchung der Blutflüssigkeit.

Unter Blutflüssigkeit, Liquor sanguinis, verstehe ich die farblose Flüssigkeit des Blutes ausser den rothen Blutkörperchen, und zwar so, wie sie vor dem Gerinnen des Blutes ist. Bei dem Gerinnen trennt sich diese Flüssigkeit in den Faserstoff, der vorher aufgelöst war, und beim Gerinnen die rothen Körperchen mit einschliesst, und in das Serum, welches nun noch den Eiweissstoff aufgelöst enthält. Wir werden in dieser mechanischen Analyse des Blutes zuerst den Faserstoff, dann das Serum abhandeln.

1) *Vom Faserstoff.*

Die gewöhnliche Ansicht von der Gerinnung des Blutes ist, dass das rothe Gerinnsel sich durch Aggregation der Blutkörperchen bilde, und dass die Kerne der Blutkörperchen eben die Faserstoffkügelchen sind, die von einer Hülle von Farbestoff bekleidet werden, der nach der Coagulation von den aggregirten Faserstoffkügelchen ausgewaschen werden kann, worauf weisses Coagulum zurückbleibt. Diese Ansicht haben besonders Home und Prevost und Dumas vorgetragen, und Dutrochet hat sie bei seinen neueren Untersuchungen über das Verhalten des Blutes zu der galvanischen Säule vorausgesetzt. Berzelius hat indess aus dem Umstande, dass die Lymphe aufgelösten Faserstoff enthält, vermuthet, dass auch das Blut aufgelösten Faserstoff enthalten müsse, weil die Lymphe gleichsam eine von dem Blute abgeseihete Flüssigkeit sey. Man könnte als noch triftigern Grund hinzufügen, weil die Lymphe selbst ins Blut gelangt. Berzelius stellte daher vermuthungsweise die Ansicht auf, dass beim Gerinnen des Blutes der im Blute aufgelöste Faserstoff fest werde und die Blutkörperchen zwischen sich nehme. Diese Ansicht, dass der Faserstoff im Blute aufgelöst ist, ist schon zu verschiedener Zeit proponirt worden.*) Ich bin so glücklich gewesen, einen definitiven Beweis für Berzelius Vermuthung zu finden, und bin im Stande, zu zeigen, dass das rothe Coagulum des Blutes nur ein Gemenge von Faserstoff, der vorher aufgelöst war, und von Blutkörperchen ist.

Ich habe zuerst bemerkt, dass, wenn man Froschblut in einem Uhrglas auffängt, vor der Bildung des ganzen Blutcoagulums schon farblose, wasserhelle Gerinnsel entstehen, die man am Rande mit der Nadel hervorziehen kann; so sieht man auch Punkte und

*) Hewson hat schon gute Gründe dafür beigebracht, dass der Faserstoff nicht in den Blutkörperchen sondern ausser ihnen im Blute enthalten ist. Hier kann er entweder aufgelöst oder fein vertheilt als Körnchen vorhanden seyn, die sich bei der Gerinnung verbinden, wie Milne Edwards vermuthete. Die folgenden Beobachtungen beweisen, dass der Faserstoff so gut wie das Eiweiss in der Blutflüssigkeit wirklich aufgelöst ist.

Digitized by Google

kleine Läppchen von farblosem, wasserhellem Gerinnsel, wenn man das Blut eine bis zwei Minuten nach dem Ausflusse vom Boden des Uhrglases abfliessen lässt. Diese kleinen farblosen Gerinnsel bleiben dann am Boden hängen. Um den Einwurf zu beseitigen, dass beim Abschneiden des Froschschenkels, wodurch man am leichtesten einen Blutfluss verursacht, Tropfen Lymphe mit ausgeflossen wären, deren aufgelöster Faserstoff diese Erscheinung bewirkt hätte, sammelte ich das Blut fernerhin aus der Schenkelarterie, beim Frosche die Art. ischiadica, welche an der hintern Seite des Oberschenkels zwischen den Muskeln verläuft, und die man sogleich auffindet, da sie neben dem grossen Nervus ischiadicus, dem Schenkelnerven, wie die Physiker ihn gewöhnlich nennen, liegt. Diese Arterie legte ich bloss, und sammelte das Blut unter mancherlei vorsichtigen Handgriffen allein aus diesem Gefässe, so dass ich sicher seyn konnte, dass ich reines Blut hatte. Eben so sammelte ich das Blut aus dem blossgelegten und angeschnittenen Herzen, was viel leichter ist. Jedesmal bemerkte ich vor dem vollständigen Gerinnen des Blutes das Entstehen kleiner wasserheller Gerinnsel. Brachte ich einen Tropfen reinen Blutes unter das Mikroskop und verdünnte ihn mit Serum, so dass die Blutkörperchen ganz zerstreut aus einander lagen, so konnte ich bei mikroskopischer Beobachtung sehen, dass zwischen den Blutkörperchen in den Zwischenräumen ein Gerinnsel von vorher aufgelöstem Stoff entstand, durch welches nun allein noch die ganz zerstreuten Blutkörperchen zusammenhingen. So konnte ich alle Blutkörperchen, so zerstreut sie auch waren, und so gross auch die Zwischenräume zwischen ihnen waren, doch zu gleicher Zeit verschieben, wenn ich mit der Nadel das die Zwischenräume ausfüllende Faserstoffgerinsel zerrte. Da die Blutkörperchen des Frosches bei starken Vergrösserungen so ungemein gross erscheinen, so lässt diese Beobachtung die grösste Deutlichkeit zu, und es bleibt kein Zweifel übrig.

Es giebt indessen eine noch viel leichtere, und sogar noch sicherere Art sich zu überzeugen, dass Faserstoff im Froschblute aufgelöst ist. Da ich aus Erfahrung wusste, dass die Blutkörperchen des Frosches ungefähr 4mal grösser sind, als die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere, so schloss ich, dass das Filtrum sie vielleicht zurückhält, während es die Blutkörperchen des Menschen und der Säugethiere durchlässt. So ist es, und auf diese einfache Auskunft kam ich, wie es gewöhnlich geschieht, erst zuletzt; und nun freue ich mich, durch einen leichten Versuch in den Vorlesungen zeigen zu können, dass Faserstoff im Blute aufgelöst ist, der wasserhell durch Filtrum geht und dann gerinnt. Der Versuch lässt sich ganz im Kleinen mit dem Blute eines einzigen Frosches anstellen; ein kleines gläsernes Trichterchen und ein Filtrum von gewöhnlichem weissem Filtrirpapier, oder nicht zu dünnem Druckpapier sind das Einzige, was man nöthig hat. Das Filtrum muss natürlich vorher nass seyn, und es ist gut, wenn man das eingegossene frische Blut des Frosches schnell mit eben so viel Wasser versetzt. Was dann von dem Filtrum abfliesst, ist ein fast ganz farbloses, klares Se-

Digitized by Google

rum von Wasser verdünnt, mit einem ganz leichten Anfluge von Roth, von Farbestoff, welcher von zugesetztem Wasser aufgelöst worden. Da indessen die Auflösung des Blutroths von Froschblut durch Wasser ziemlich langsam geschieht, so ist das Durchgeseihte kaum röthlich zu nennen, und zuweilen ganz farblos. Wendet man statt des zugesetzten Wassers vielmehr Zuckerwasser an (1 Theil Zucker auf 200 Theile und mehr Wasser), so wird während der Filtration gar kein Blutroth aufgelöst, und das Durchgehende ist vollkommen farblos und ohne die geringste Spur einer Beimischung. Untersucht man das durchgehende Serum mit dem Mikroskope, so bemerkt man keine Spur von Kügelchen darin. In diesem klaren Serum entsteht nun innerhalb einiger Minuten ein wasserhelles Coagulum, so klar und durchsichtig, dass man es nach seiner Bildung nicht einmal bemerkt, wenn man es nicht mit einer Nadel aus der Flüssigkeit hervorzieht. Nach und nach verdichtet es sich und wird weisslich, fadenartig; es sieht dann gerade so aus, wie das Coagulum der menschlichen Lymphe in meinen Beobachtungen. Vergl. *Abschn.* 3. Auf diese Art erhält man den Faserstoff von Blut im reinsten Zustande, wie es bisher nicht dargestellt werden konnte. Um die rechte Sorte Filtrirpapier zu finden, muss man erst einige Proben machen. Ist das weisse Filtrirpapier zu dünn, so gehen einige wenige Blutkörperchen mit durchs Filtrum, die man erst bei mikroskopischer Untersuchung in dem klaren, farblosen Coagulum hier und da eingeschlossen findet. Hat man erst die rechte Sorte von Filtrum aufgefunden, so erhält man ein Coagulum von Faserstoff, worin auch keine Spur eines Blutkörperchens vorkömmt. Es versteht sich von selbst, dass nicht aller im Blute aufgelöste Faserstoff auf diese Art erhalten wird; der grösste Theil gerinnt innerhalb des Filtrums, weil er nicht vor seiner Gerinnung durchs Filtrum gelangen kann. Zu einem rohen Versuche kann man das Blut nehmen, wie man es nach der Amputation eines Froschbeines im Knie erhält, und es sogleich in das mit etwas kaum süsslich schmeckendem Zuckerwasser versetzte Filtrum austräufeln lassen. Allein dieser Versuch ist roh, weil hier etwas aus der Lymphe von dem Beine mit ausfliessen kann. Um mit reinem Blute des Frosches zu experimentiren, muss man das Blut aus dem blossgelegten und durchschnittenen Herzen selbst austräufeln lassen. Der Faserstoff, den man in diesen Fällen erhält, ist nicht deutlich körnig, sondern ganz gleichartig, erst wenn er sich zusammengezogen hat und weisslich geworden ist, sieht man mit dem zusammengesetzten Mikroskope eine ganz undeutlich feinkörniges Wesen, einen Anschein, der aber auch von Ungleichheiten der Oberfläche herrühren kann.

Man kann die Existenz von aufgelöstem Faserstoff im Blute des Frosches, wie auch in dem der Säugethiere und des Menschen noch auf eine andere Art beweisen. Indem man einem Gläschen voll Blut irgend eines Thieres oder des Menschen sogleich einige Tropfen von einer sehr concentrirten Auflösung von unterkohlensaurem Kali zusetzt, wird die Gerinnung sehr lange aufgehalten, und die Blutkörperchen senken sich allmählig unter

Digitized by Google

das Niveau der durchsichtigen Flüssigkeit, ehe die Gerinnung eintritt. Nach $\frac{1}{2}$ bis 1 Stunde bildet sich ein zartes Gerinnsel; der untere Theil des Gerinnsels ist, so weit die Blutkügelchen stehen, roth, der obere ist weisslich und fadenziehend.

Prevost und Dumas haben die Quantität der Kügelchen im Blute verschiedener Thiere aus der Menge des rothen getrockneten Coagulums zu bestimmen gesucht, und diese Untersuchungen sind sehr dankenswerth. Berzelius hat indess bereits bemerkt, dass das Resultat einer solchen quantitativen Analyse nie genau ausfallen könne, weil das Coagulum eine grosse Menge Serum in sich einschliesse, das beim Trocknen sein Eiweiss und seine Salze zurücklässt, während das Abwaschen nicht allein Serum, sondern auch Blutroth entfernen würde. Da aber Prevost und Dumas von der Voraussetzung ausgingen, dass der Faserstoff des Blutes von den Kernen der Blutkörperchen herrühre, so bedürfen ihre Resultate einer neuen Correction. Was sie nämlich Menge der Kügelchen nennen, muss Summe der Kügelchen und des vorher aufgelösten Faserstoffes heissen. Mit dieser Correction behalten die zahlreichen quantitativen Bestimmungen der beiden Naturforscher ihren Werth. Diese Correction ist auch bei den sonst sehr dankenswerthen quantitativen Analysen von Lecanu über die Menge der Kügelchen in verschiedenen Temperamenten und Geschlechtern nöthig. Um die Menge des Faserstoffes im Blute verschiedener Thiere und in Krankheiten zu bestimmen, bedarf es ganz neuer Untersuchungen. Das beste Mittel dazu ist das Schlagen des Blutes.

Durch das Schlagen des Blutes lässt sich der vorher aufgelöste Faserstoff des Blutes als farbloses oder fast farbloses Gerinnsel erhalten, während die Blutkörperchen unverändert im Serum suspendirt bleiben. Untersucht man das Blut nach dem Schlagen, so hat es noch ganz sein natürliches Ansehen, man findet die Blutkörperchen gleichförmig schwebend, und, wofern kein Wasser zum Blute gekommen ist, auch unverändert. Ich weiss nicht, woran es liegt, dass Berzelius das Gegentheil sagt. Er bemerkt nämlich, dass, wenn man nach dem Schlagen das Blut mit dem zusammengesetzten Mikroskope untersuche, es keine Blutkörperchen mehr enthalte, sondern kleine, ungelöste, zerriebene rothe Körperchen, die in einer gelben Flüssigkeit schwimmen, und die Berzelius für Theile der Farbestoffhülle ansieht. Sie gehen beim Filtriren durchs Papier; diess thun indess auch die Blutkörperchen des frischen Blutes von höheren Thieren. Berzelius sagt, dass, wenn man das Blut mehrere Tage lang bei 0° aufbewahre, diese rothen Theilchen langsam zu Boden sinken und die Flüssigkeit sich über ihnen aufkläre, wiewohl sie zuweilen noch durch einen kleinen Theil aufgelösten Farbestoffs röthlich bleibe. Mit der Hochachtung, die ich gegen diesen grossen Mann hege, muss ich doch bemerken, dass ich die Blutkörperchen in dem geschlagenen Blute, so lange kein Wasser dazu kömmt, ganz unverändert wieder finde. Ich habe sie vom Kalbe und Ochsen, vom Menschen und von der Katze in diesem Zustande mit dem Fraunhofer'schen Mikroskope und noch

Digitized by Google

einem andern Instrumente untersucht, und sie weder in der Grösse noch in der Form verändert gefunden, so dass ich sogar noch eben so gut ihre Abplattung erkennen konnte, wie im frischen Blute.

Das Schlagen des Blutes gewährt den ausserordentlichen, durch keinen Kunstgriff zu ersetzenden Vortheil, die unversehrten Blutkörperchen von dem vorher aufgelösten Faserstoffe abzuscheiden. Filtrirt man durch Leinentuch die aufgeschwemmten Theile ab und wächst den Faserstoff von anhängendem Serum rein, so hat man nach dem Trocknen desselben sicher die in einer gewissen Quantität Blut enthaltene Menge des Faserstoffs. Dagegen lässt sich die Menge der Blutkörperchen nicht sicher bestimmen. Wenn man die Menge des rothen Coagulums in 100 Th. Blut bestimmt und die Menge des Faserstoffs in 100 Th. Blut davon abzieht, so erhält man zwar die Menge der in diesem Coagulum enthaltenen Blutkörperchen, allein vermengt mit einer unbestimmten Menge Eiweiss von dem Serum, welches in das Coagulum eingeschlossen war, und dessen Eiweiss und Salze beim Trocknen zurückbleiben. Es giebt einen Ausweg, den Lecanu zur Bestimmung der Menge des Blutroths eingeschlagen zu haben scheint; allein er beruht auf einer Voraussetzung. Man bestimmt die Menge von Eiweiss im Serum des Blutes, man trocknet geschlagenes Blut desselben Thieres, vom Faserstoff befreit, ein und bestimmt die Menge Wasser, die es verliert. Wenn man nun voraussetzt, dass dieses Wasser ganz gleichförmig so viel Eiweiss aufgelöst enthielt, als man in dem Serum gefunden hatte, wenn man also annimmt, dass das die Substanz der Blutkörperchen durchdringende Wasser ebenfalls gleichviel Eiweiss aufgelöst enthalte, so kann man die Menge des im eingetrockneten Gemenge von Serum und Blutkörperchen des geschlagenen Blutes befindlichen Eiweisses bestimmen, und es bliebe die Quantität der Blutkörperchen übrig. Diess beruht aber auf einer ganz unerweisbaren Voraussetzung.

Da sich nur die Quantität des vorher aufgelösten Faserstoffes sicher, und zwar aus geschlagenem Blute bestimmen lässt, so habe ich mich nur damit beschäftigt. Vom 3627 Gran geschlagenen Ochsenblutes erhielt ich 18 Gran Faserstoff im getrockneten Zustande, von 3945 Gran Ochsenblut, das nicht geschlagen wurde, 641 Gran rothes Coagulum im getrockneten Zustande; diess macht auf 100 Th. Ochsenblut 16,248 Th. trocknes rothes Coagulum, worin 0,496 Faserstoff enthalten sind. Nach Fourcroy enthält das Blut 0,0015—0,0043 trockne Fibrin, nach Berzelius enthalten 1000 Th. 0,75, nach Lassaigne 1, 2 trockne Fibrin. Aus 22 Beobachtungen fand Lecanu (*Transact. med.* 6. *Oct.* 1831. 92.) die Menge der trocknen Fibrin zu 1,360—7,235 auf 1000 Th. Menschenblut.

Prevost und Dumas haben im arteriellen Blute mehr Blutkörperchen gefunden als im venösen; diess muss auch wieder heissen, mehr rothes Coagulum. Da das Arterienblut ernährt, und da beständig Lymphe mit aufgelöstem Faserstoffe von den Organen kömmt, so lässt es sich schon erwarten, dass das Arterienblut mehr Faserstoff enthalten müsse als das Venenblut. So

Digitized by Google

haben es auch Mayer und Berthold in mehreren Versuchen gefunden. Es schien mir indess nothwendig, mich hierüber durch einen Versuch selbst zu vergewissern. Von einer Ziege sammelte ich aus der Jugularvene 1392 Gran, kurz darauf aus der Carotis 3004 Gran Blut. Beide Blutarten wurden geschlagen, wobei das Ausspritzen des Blutes sorgfältig verhindert wurde. Das Arterienblut lieferte $14\frac{1}{2}$ Gran, das Venenblut $5\frac{1}{2}$ Gran trokkenen Faserstoff. Das Arterienblut der Ziege enthielt also 0,483 Procent, das Venenblut 0,395 Procent aufgelösten Faserstoff. Nach Denis verhält sich der Gehalt von Faserstoff im venösen und arteriösen Blute wie 24: 25; nach Berthold bei Ziegen wie 366:429, bei Katzen wie 474:521, bei Hammeln wie 475:566, bei Hunden wie 500:666. (Burdach *Physiol.* 4. 382.) Das Mittel aus diesen Beobachtungen ist, dass sich der Faserstoff im Arterien - und Venenblut wie 24:29 verhält.

Diese Materie, welche bisher als Faserstoff des Blutes chemisch untersucht worden ist, ist der im Blute aufgelöste Faserstoff, der, im Fall das Blut geschlagen wurde, rein erhalten ward, im Fall der Faserstoff aus rothem, ausgewaschenem Coagulum erhalten wurde, auch noch die Kerne der Blutkörperchen enthalten konnte. Der Betrag dieser Kerne kann indess nicht gross seyn, denn wenn man rothes Coagulum auf dem Filtrum auswäscht, so ist die Quantität des erhaltenen Faserstoffs nicht merklich verschieden von derjenigen, welche man erhält, wenn man Blut schlägt. Es könnte seyn, dass diese im Säugethier - und Menschenblute jedenfalls kleinen Kerne beim Auswaschen sich grösstentheils von dem Coagulum ablösen und in einer Farbestoffauflösung mit suspendirt enthalten sind, so wie man beim blossen Rütteln des rothen Coagulums vom Frosch und von Säugethieren selbst eine ausserordentliche Menge sich ablösender unveränderter ganzer Blutkörperchen mit Serum erhält. In einer Farbestoffauflösung können diese Kerne nicht leicht mit dem Mikroskope entdeckt werden, wenn sie auch wirklich darin enthalten sind. Wenn man von Menschenblut einen Tropfen mit mehreren Tropfen Wasser unter dem Mikroskope verdünnt, so werden die Blutkörperchen ununterscheidbar, der Farbestoff löst sich im Wasser auf, ohne dass man deutlich die Kerne sieht; vermischt man einen Tropfen Menschenblut mit Essigsäure unter dem Mikroskope, so sieht man nur mit genauer Noth noch die kleinen Kerne. Ob die Kerne der Blutkörperchen, die ich vom Froschblut erhalten habe, Faserstoff sind oder nicht, weiss ich nicht; sie haben die allgemeinen Eigenschaften des geronnenen Faserstofs und geronnenen Eiweisses, sie lösen sich leicht in Alkalien und schwer in Säuren, selbst in Essigsäure verändern sie sich innerhalb eines Tages nicht, da Essigsäure sonst von Faserstoff etwas aufnimmt. In Essigsäure bilden die Blutkörperchen des Frosches, in kleinen Mengen zugesetzt, ein braunes Pulver, das, mikroskopisch untersucht, noch etwas von der blass gewordenen Farbstoffhülle zeigt. Faserstoff wird in Essigsäure durchsichtig; indess kann die braune Färbung der ellipsoidischen Kerne, wie ich schon bemerkte, vielleicht auch von anhängendem Far-

Digitized by Google

bestoff herrühren. Wenigstens färbte sich der weisse Satz von Kernen der Blutkörperchen des Frosches durch Essigsäure nicht; jener weisse Satz nämlich, den man erhält, wenn man ein Gemenge von Serum und Blutkörperchen mit viel Wasser verdünnt.

In der Entzündung und in einigen anderen Fällen gerinnt das Blut auf eine etwas abweichende Art. Nämlich ehe das Blut ganz zu einer Gallerte gesteht, senken sich schon die rothen Blutkörperchen unter das Niveau der Flüssigkeit, so dass das flüssige Blut vor dem Gerinnen unten roth und oben farblos oder weisslich aussieht. Nun erst gerinnt es zu einer gallertartigen Masse, die unten roth, oben weiss oder graugelb ist, und allmählig, wie gewöhnlich, das Serum austreibt. Indem sich der Kuchen zusammenzieht, verkleinern sich der obere und der untere Theil in ungleichem Verhältnisse; der graugelbe oder weissgelbe obere Theil des Kuchens zieht sich fester zusammen, und sein Durchmesser wird zuletzt viel kleiner als der Durchmesser des untern Theiles des Kuchens, obgleich der Kuchen vorher in jeder Höhe den Durchmesser des Gefässes selbst hatte. Die Ursachen dieser besondern Art der Gerinnung sind folgende: Wenn sich im entzündlichen Blute die rothen Körperchen schon vor der Gerinnung durch irgend einen Grund senken, während sie sich im gesunden Blute bis zu der Zeit der Gerinnung noch nicht gesenkt haben, so gerinnt zwar der Faserstoff in der ganzen Masse des Blutes, allein der untere Theil des Gerinnsels enthält die gesunkenen rothen Körperchen eingeschlossen, der obere Theil des Gerinnsels ist ohne rothe Körperchen, und heisst nun crusta inflammatoria, obgleich die Materie dieser Kruste auch durch den rothen Kuchen verbreitet, und nichts weiter ist, als der geronnene, vorher aufgelöste Faserstoff. Dass der farblose obere Theil des Gerinnsels sich enger und fester zusammenzieht als der untere rothe Theil, ist sehr natürlich, weil der untere rothe Theil des Faserstoff-Coagulums durch die mit eingeschlossenen rothen Körperchen in einem gewissen Grade von Ausdehnung erhalten wird. Man kann es dem Blute immer vorher schon ansehen, wenn es eine Kruste, d. h. einen obern farblosen Theil des Coagulums erhalten soll; denn da die Bedingung dazu die Senkung der rothen Körperchen unter das Niveau ist, so sieht man an dem Blute, worauf nachher eine crusta inflammatoria entsteht, den obersten Theil der Flüssigkeit vor dem Gerinnen zuerst durchscheinend, dann weisslich werden. Dies ist das durch die ganze Masse verbreitete, aufgelösten Faserstoff enthaltende Serum, welches vor dem Gerinnen des Faserstoffs einen weisslichen opalisirenden Anschein erhält. Hewson und Babington (*Medico-chirurgical Transact. Vol. XVI. p.* 11.) haben gezeigt, dass man dieses farblose Serum vor dem Gerinnen mit einem Löffelchen abschöpfen kann, und dass dieses abgeschöpfte Serum noch gerinnt. Dieses habe ich auch am Blute einer Schwangern bestätigt gesehen.

Es fragt sich nun, was ist die Ursache, dass meistens im Blute der Entzündung, des acuten Rheumatismus und der Schwangeren die rothen Körperchen vor der Gerinnung sich senken,

Digitized by Google

wodurch der obere Theil des aufgelösten Faserstoffs farblos gerinnen kann. Man könnte die Ursache in einer geringern specifischen Schwere der Blutflüssigkeit im Verhältnisse zu den rothen Körperchen jener Blutarten suchen, jedoch ist, soviel man weiss, Serum von entzündlichem Blute nicht specifisch leichter, als Serum von gewöhnlichem Blute. Da entzündliches Blut, wie man allgemein annimmt, in der Regel langsamer gerinnt als gesundes Blut, so können die rothen Körperchen des entzündlichen Blutes noch vor der Gerinnung Zeit haben, sich unter das Niveau zu senken. Diess war schon Hewson's Ansicht von der Entstehung der crusta inflammatoria. Um diese Ansicht zu prüfen, habe ich eine Reihe von Beobachtungen mit verschiedenen Btutarten, und zwar zuerst mit geschlagenem Blute angestellt. Ich wollte zunächst wissen, in wie viel Zeit die Blutkörperchen im geschlagenen Blute sich zu senken anfangen. Ich habe schon bemerkt, dass diess in geschlagenem Schaf- und Ochsenblut überaus langsam geschieht; viel schneller senken sich die Blutkörperchen im geschlagenen Katzenblute und geschlagenen gesunden Menschenblute; sie sinken z. B. hier innerhalb einer Viertelstunde eine Linie, und innerhalb mehrerer Stunden 4 bis 6 Linien unter das Niveau. Allein dieses Factum ist doch nicht hinreichend, die crusta inflammatoria zu erklären, wenn auch das entzündliche Blut langsamer gerinnt, denn so langsam gerinnt es nicht, und gleichwohl hat die crusta inflammatoria zuweilen eine Höhe von $\frac{1}{2}$ Zoll. Nun habe ich ferner beobachtet, dass sich die Blutkörperchen in Menschenblut und Katzenblut (nicht in Ochsen- und Schafblut), dessen Gerinnung man durch Zusatz von etwas unterkohlensaurem Kali verlangsamt, schneller unter das Niveau senken als in geschlagenem Blute, woraus der Faserstoff entfernt ist. In allen Fallen bewährte es sich, dass die Blutkörperchen von gesundem Menschenblute, dessen Gerinnung ich aufgehalten hatte, schon in 5 bis 6 Minuten um 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linien unter das Niveau gesunken waren, und dass sie innerhalb einer Stunde 4 bis 5 Linien unter dem Niveau standen. Das darüber stehende Fluidum wurde allmählig weisslich, und wenn nicht zu viel kohlensaures Kali zugesetzt war, so gerann es in einen weichen, fadenziehenden Faserstoff, der in einem Falle, selbst bei nicht entzündlichem Blut, ziemlich fest wurde und eine Art Kruste bildete. Von Katzenblut erhielt ich dieselben Resultate. Indem ich also die Gerinnung verlangsamte, besass ich das Mittel, den Vorgang bei der crusta inflammatoria künstlich zu erzeugen. Der Unterschied liegt nur darin, dass der Faserstoff des farblosen Gerinnsels mehr weich und fadenziehend ist, was vielleicht von dem Einflusse des kohlensauren Kali herrührt. In wahrhaft entzündlichem Blute ist die Kruste schon darum fest, weil, wie Scudamore gezeigt hat, das entzündliche Blut mehr Faserstoff enthält.

Fragt man, warum die Blutkörperchen im frischen, gesunden Blute bald sich zu senken anfangen, während sie im geschlagenen Blute, selbst wenn es entzündlich war, sich ungemein langsam senken, so scheint die Antwort schwer. Da geschlagenes Blut specifisch leichter ist, als das Blut sonst ist, so muss das

Digitized by Google

Phänomen eine andere Ursache als in der specifischen Schwere haben. Vielleicht ist die Adhäsion der Blutkörperchen zur Flüssigkeit des Blutes, worin noch Faserstoff aufgelöst ist, geringer als zum Serum des geschlagenen Blutes, woraus der Faserstoff entfernt ist.

John Davy hat indess darauf aufmerksam gemacht, dass entzündliches Blut nicht immer langsamer gerinnt. In diesen Fällen können sich vielleicht die Blutkörperchen schon darum schneller senken, weil entzündliches Blut mehr aufgelösten Faserstoff enthält, da die Auflösung des Faserstoffs im Blute überhaupt das Blut geneigt macht, die Blutkörperchen schneller sinken zu lassen als es in Blut geschieht, woraus der Faserstoff entfernt ist. Hiernach sind die Hauptursachen des Senkens der Blutkörperchen und der crusta inflammatoria sowohl die langsamere Gerinnung, als die grössere Quantität des aufgelösten Faserstoffs. Wenn zuweilen auch andere Blutarten eine lockere Kruste absetzen, unter Umständen, wo man mehr eine anfangende Zersetzung des Blutes vermuthen sollte, als eine grössere Quantität von Fibrin, so kann diess hinreichend aus der langsameren Gerinnung eines solchen Blutes erklärt werden, da auch gesundes Blut, wie ich gezeigt habe, ziemlich schnell die Blutkörperchen sinken lässt, und später ein oberes farbloses Gerinnsel bildet, sobald man nur die Gerinnung verlangsamt.*)

2) *Vom Blutwasser.*

Die Blutflüssigkeit, *liquor sanguinis*, welche den Faserstoff aufgelöst enthält, zersetzt sich beim Gerinnen in einen flüssig bleibenden Theil und Faserstoff, welcher beim Gerinnen die Blutkörperchen zwischen sich nimmt und den Blutkuchen bildet. Das neue übrig bleibende Flüssige wird Blutwasser oder Serum genannt, welches also wohl von der ursprünglichen Blutflüssigkeit zu unterscheiden ist. Das Serum ist gelblich, von salzigem Geschmack und 1,027 bis 1,029 specifischem Gewicht; es reagirt bei höheren Thieren deutlich alkalisch und gesteht beim Erhitzen bis 70° — 75° C. durch Gerinnung des darin aufgelösten Eiweisses (*albumen*) zu einer Gallerte, im luftleeren Raum, wie in der atmosphärischen Luft, dagegen der Faserstoff vom Blut ausser den Adern ohne alle äusseren Einflüsse von selbst gerinnt. Der wesentlichste Bestandtheil des Blutwassers ist Eiweiss. Ausserdem enthält das Serum freies Alkali (Natron, auch Kali nach Berzelius), wahrscheinlich mit Eiweiss verbunden, und Salze von

*) Retzius beobachtete einmal eine von der gewöhnlichen Formation der crusta inflammatoria verschiedene Bildung derselben. Schnell nach dem Aderlass coagulirte das Blut in einen Klumpen. In 2 Stunden war noch kein Serum ausgeschieden, aber nach dieser Zeit erschien es in Menge und bedeckte den schwarzen Kuchen. Das Serum wurde opalisirend und nach 4 Stunden hatte es eine dicke Lage Faserstoff abgesetzt. Ein Theil des Faserstoffs war hier bei der ersten Gerinnung in festen Zustand übergegangen, der übrige noch im Serum aufgelöst und der ganze Process von der langsamen Gerinnung des Faserstoffs abhängig. Vergl. über Crusta inflammatoria H. Nasse das Blut. Bonn. 1836.

Digitized by Google

diesen Basen. Prevost und Dumas haben die relative Quantität der festen Bestandtheile im Blutwasser zu den übrigen bei vielen Thieren bestimmt.

	100 Theile Blut.			100 Theile Blutwasser.	
	Blutkuchen.	Eiweiss.	Wasser.	Eiweiss	Wasser.
Mensch	12,92	8,69	78,39	10,0	90,0
Simia Callitriche	14,61	7,79	77,60	9,2	90,8
Hund	12,38	6,55	81,07	7,4	92,6
Katze	12,04	8,43	79,53	9,6	90,4
Pferd	9,20	8,97	81,83	9,9	90,1
Kalb	9,12	8,28	82,6	9,9	90,1
Schaaf	9,35	7,72	82,93	8,5	91,5
Ziege	10,20	8,34	81,46	9,3	90,7
Kaninchen	9,38	6,83	83,79	10,9	89,1
Meerschweinchen	12,80	8,72	78,48	10,0	90,0
Rabe	14,66	5,64	79,70	6,6	93,4
Reiher	13,26	5,92	80,82	6,8	93,2
Ente	15,01	8,47	76,52	9,9	90,1
Huhn	15,71	6,30	77,99	7,5	92,5
Taube	15,57	4,69	79,74	5,5	94,5
Forelle	6,38	7,25	86,37	7,7	92,3
Aalraupe	4,81	6,57	88,62	6,9	93,1
Aal	6,00	9,40	84 60	10,0	90,0
Landschildkröte	15,06	8,06	76,88	9,6	90,4
Frosch	6,90	4,64	88,46	5,0	95,0

Hieraus geht hervor, dass beim Menschen im Blutwasser ungefähr $\frac{1}{10}$ anderweitige Bestandtheile und besonders Eiweiss aufgelöst sind, und dass sich diess Verhältniss so ziemlich bei den Thieren bis zu den Fischen erhält, während nur die relative Menge des Blutkuchens (Kügelchen und Faserstoff zusammen) im Blute bei den *nackten* Amphibien und Fischen abnimmt. Beim Menschen verhalten sich die festen Theile des Blutkuchens zu den im Blutwasser aufgelösten Theilen wie 12,92: 8,69 oder ungefähr wie 3: 2. Das Blut der fleischfressenden Thiere liefert mehr Blutkuchen als das der pflanzenfressenden. Nach J. Davy liefert das Blut vom Lamm weniger und weicheres Coagulum als das vom erwachsenen Schaaf, wie denn auch sowohl Fourcroy als ich das Coagulum beim Foetus weicher fanden. Nach Berthold (*Beiträge zur Anat., Zool. u. Physiol. Gött.* 1831) scheint die Menge des Faserstoffs bei den kaltblütigen Thieren nicht geringer, wohl aber die des Cruors.

Lecanu hat das Blut bei den verschiedenen Geschlechtern, Altern, Temperamenten untersucht. Diese Arbeit macht in diesem Theile der physiologischen Chemie eine neue Epoche, er scheint mit Genauigkeit eine ausserordentliche Anzahl von Beobachtungen gemacht und verglichen zu haben. *a. a. O. p.* 94 — 107. Lecanu fand die Quantität des Wassers in 1000 Blut variiren

Digitized by Google

von 778,625 — 853,135. Mittel 815,880. Beim Weib ist die Variation 790,394 — 853,135. Beim Mann ist die Variation 778,625 — 805,263. Hiernach enthält das Blut des Weibes mehr Wasser, was auch Denis fand in 24 Beobachtungen vom Mann und 28 vom Weibe. Nach ihm variirt die Menge des Wassers beim Mann von 805,00 — 732, beim Weibe von 848, 00 — 750,00, die beiden Mittel verhalten sich wie 767 : 787. Die Quantität des Wassers ist nach Lecanu in keinem bestimmten Verhältniss zu den Lebensaltern, dagegen Denis mehr Wasser bei Kindern und Greisen fand. In Hinsicht der Temperamente fand Lecanu, dass das Blut der Sanguinischen weniger Wasser enthält als das Blut der Phlegmatischen; bei sanguinischen Weibern variirte die Menge des Wassers in 4 Beobachtungen von 790,394 — 796,175, bei phlegmatischen Weibern in 5 Beobachtungen von 790,840 — 827,130. Mittel beim sanguinischen Temperament der Weiber 793,007, beim phlegmatischen Temperament der Weiber 803,710. Aus ähnlichen Beobachtungen an Männern ergab sich das Mittel für das sanguinische Temperament der Männer 786,584, für das phlegmatische Temperament der Männer 800,566. Die Differenz in plus von Wasser beim phlegmatischen Temperament im ersten Fall 10,703, im zweiten 13,982.

Die Menge des Eiweisses variirt im Allgemeinen von 57,890 bis 78,270; indess ist die Quantität des Albumen bei Männern und Weibern fast gleich, auch zeigt sich kein bestimmter Unterschied in den Altern von 20—60 Jahren, eben so wenig zeigt sich ein auffallender Unterschied in den Temperamenten.

Die Menge des Blutkuchens (Faserstoff und Cruor) variirt im Allgemeinen von 68,349 — 148,450, Mittel 108,399. Dieselbe variirt bei Männern von 115,850 — 148,450, bei Weibern von 68,349 — 129,990. Das Blut der Männer enthält also nach Lecanu ungefähr 32,980 mehr Bestandtheile des Blutkuchens, als das der Weiber. Dagegen scheint die Quantität des Blutkuchens nicht proportionell mit dem Alter zuzunehmen, wenigstens nicht vom 20.—26. Jahre. Aber die Quantität des Coagulums ist grösser beim sanguinischen Temperament als beim phlegmatischen, was auch Denis fand. Das Verhältniss des Coagulums variirte in 4 Beobachtungen bei Weibern von sanguinischem Temperament in 1000 Theilen Blut von 121,720 bis 129,654, beim phlegmatischen Temperament in 5 Beobachtungen von 92,670 — 129,990, Mittel beim sanguinischen Temperament der Weiber 126,174, beim phlegmatischen Temperament der Weiber 117,300. Differenz 8,874. Bei den Männern variirte das Verhältniss des Coagulums in 1000 Theilen Blut beim sanguinischen Temperament in 5 Beobachtungen von 121,540 — 148,450, beim phlegmatischen Temperament ergaben 2 Beobachtungen 115,850 und 117, 484. In der Menstruation scheint nach Lecanu das Blut des Weibes an Coagulum zu verlieren.

Digitized by Google

II. Capitel. Chemische Analyse des Blutes.

(Nach Berzelius *Thierchemie* u. A.)

Von den Kernen der Blutkörperchen hat man noch keine vollständige Analyse, weil sie nicht in grösserer Menge zu erhalten sind. Man kann sie von Froschblut wegen der Grösse der Blutkörperchen leicht gesondert erhalten. Die Methode zu ihrer Gewinnung habe ich schon angegeben. Man versetzt ein Gemenge von Blutkörperchen und Blutwasser, woraus der Faserstoff entfernt ist, in einem Uhrglase mit Wasser, das allmählig den Farbestoff auflöst, worauf der weisse Satz von Kernen der Blutkörperchen zurück bleibt. Diese sind in Wasser unauflöslich, verändern sich mit Essigsäure übergossen in mehreren Tagen nicht, sind löslich in alkalinischem Wasser sowohl von Kali und Natron als Ammonium. Hierdurch stimmen sie im Allgemeinen mit dem geronnenen Faserstoff und Eiweiss überein, die jedoch löslicher in Essigsäure zu seyn scheinen. Die chemischen Eigenschaften der Schale der Blutkörperchen sind auch nur wenig bekannt. Diese Schale ist mit dem in Wasser leicht und in allen Verhältnissen löslichen Färbestoff durchdrungen. Durch Behandlung der Blutkörperchen des Frosches mit Wasser kann man den Farbestoff bald aus ihnen ausziehen. Die Schale ist dann unförmlich geworden, hat ihre Farbe verloren und wird erst später vom Wasser angegriffen, nämlich innerhalb einiger Tage. Dann ist die Schale der Blutkörperchen ganz zerstört und die Kerne sind übrig; als Rest der zerstörten Schalen zeigt sich ein schleimiges äusserst feinkörniges Wesen auf dem Boden des Uhrglases, auf welchem die Kerne liegen. Die Essigsäure löst die Schale der Blutkörperchen nicht ganz vollkommen auf, indem um die Kerne ein Rand bleibt, der offenbar Rest der Schale ist. Vergl. das früher Bemerkte über das Verhalten der Essigsäure zur Schale der Blutkörperchen. Zu einer vollständigen chemischen Untersuchung sind der Farbestoff der Blutkörperchen, der im Blut aufgelöste Faserstoff und die Bestandtheile des Blutwassers nach Abscheidung des Faserstoffs fähig.

1. Farbestoff, Blutroth, Haematin, Cruorin. Berzelius untersucht das Blutroth in 3 Zuständen: an den Blutkörperchen, oder im Blutwasser aufgeschlemmt, 2. im Wasser aufgelöst, 3. im geronnenen, für Wasser unlöslichen Zustande. Das Blutroth der Blutkörperchen besitzt die Eigenschaft, bei Berührung von atmosphärischer Luft oder von Sauerstoffgas letzteres anzuziehen und sich heller roth zu färben. Hierbei wird Kohlensäure gebildet und ausgeschieden, was Berthollet, Christison (Froriep's *Not.* 644.) und ich selbst fanden (p. 315.). Ein mit Blutkörperchen gemengtes Blutwasser wird durch Hindurchstreichen von Sauerstoffgas durch und durch hellroth, bei der Berührung der atmosphärischen Luft, wie das Blut selbst, an der Oberfläche hellroth. In längerer Berührung mit Sauerstoffgas schwärzt sich das Blutroth (vielleicht von der Bindung von Kohlensäure) und kann

Digitized by Google

dann nicht wieder hergestellt werden. Kohlensäure, schwefelichte Säure und überhaupt Säuren machen das Blut und Blutroth schwarzbraun. Stickstoffoxydulgas wird in Menge von geschlagenem Blut aufgesogen und das Blut davon purpurroth, worauf atmosphärische Luft durch das Blut durchgetrieben, die natürliche Farbe wieder herstellt. Kohlenwasserstoffgas soll dem dunkeln Blute eine hellere rothe Farbe mittheilen. Berzelius *Thierchemie* 48. Mehrere Salze wie Chlornatrium, salpetersaures Kali, schwefelsaures Natron, geben dem dunkelrothen Blute eine hellrothe Farbe. Schroeder v. d. Kolk beobachtete, dass der elektrische Funke hellrothe Flecke auf venösem Blute bildete. Man erhält den Farbestoff des Bluts aufgelöst, indem man Blutkuchen in Wasser auswäscht, wodurch sich der Farbestoff in Wasser auflöst, wobei sich aber nicht verhüten lässt, dass die vom Coagulum mit eingeschlossenen Kerne der Blutkörperchen zum Theil sich mit ablösen, in die ausgewaschene Flüssigkeit gerathen und in die Analyse des Blutroths mit eingehen. Das Blutroth löst sich in Wasser in allen Verhältnissen auf.

Die Auflösung des Blutroths in Wasser röthet sich schwächer an der Luft als das Blut selbst. Beim Abdampfen bei einer Wärme bis zu 50° Cent. wird sie zu einer schwärzlichen Masse, die sich zu dunkelrothem Pulver reiben und dann wieder in Wasser auflösen lässt, bei 70° C. coagulirt der Farbestoff in der wässrigen Lösung und ist dann unlöslich. Dasselbe geschieht von Alkohol, von Mineral-Säuren, auch wenn zur Behandlung mit Essig-Säure Alkali, oder zur Behandlung mit Alkali Säure hinzugesetzt wird. Die Niederschläge, die von Erd- und Metalloxyd-Salzen bewirkt werden, sind theils braun, theils schwarz, theils roth. Berzelius *a. a. O. p.* 50. 51.

Im dritten Zustande, als Coagulum durch Erhitzen bis 70°, ist der Farbestoff roth und körnig, in der Wärme getrocknet wird er schwarz. Kochendes Wasser verändert den Farbestoff zuletzt, so wie den Faserstoff. Auch bilden die Säuren mit coagulirtem Blutroth so wie mit Faserstoff neutrale, in reinem Wasser lösliche Verbindungen, die vom Blutroth dunkelbraun sind. Alkalien lösen das Blutroth auf, Gerbestoff schlägt es aus seinen Auflösungen in Säuren und Alkalien nieder. Tiedemann und Gmelin haben entdeckt, dass der Faserstoff allmählig von Alcohol aufgelöst und letzterer dadurch dunkelroth wird. Berz. *a. a. O. p.* 50—56. Durch Ausziehung aus geronnenem Blutroth mit Alkohol lässt sich das Blutroth vom Eiweiss trennen, welches von Alkohol nicht aufgelöst wird. Lecanu betrachtete deswegen die Substanz der Schale der Blutkörperchen, die er Haematosin nennt, als eine Verbindung von eigentlichem Blutroth, das er Globulin nennt, und Eiweiss. Hierzu ist aber kein Grund vorhanden, da das hierbei erhaltene Eiweiss vom Serum oder gar von den mit ausgewaschenen Kernen der Blutkörperchen herrühren kann. Lecanu in Poggendorf's *Annal.* 1832. 4. 550. Nach Michaelis Analyse des Farbestoffs ist dessen elementare Zusammensetzung in

Digitized by Google

	arteriellem	venösem Blut.
Stickstoff . .	17,253	17,392
Kohlenstoff .	51,382	53,231
Wasserstoff .	8,354	7,711
Sauerstoff .	23,011	21,666.

Hiernach stimmt die elementare Zusammensetzung des Blutrothes mit der des Faserstoffs, nur dass Blutroth eine grössere Menge von Asche hinterlässt, und diese viel Eisen enthält. Denn dass, wie Brande und Vauquelin glaubten, der Gehalt von Eisen im Blutroth nicht grösser wie im Serum und anderen thierischen Theilen ist, haben Berzelius und Engelhart widerlegt. Oehlenschlaeger hat auch Eisen im Blute von Hunden gefunden, die noch nicht an der Mutter gesogen. Kastner's *Archiv.* 1831. *Sept. Oct. p.* 317. Das Eisen ist also kein zufälliges Ingestum aus den Nahrungsstoffen. Die Asche vom Blutroth ist immer alkalisch und rothbraun, und beträgt nach Berzelius $1\frac{1}{4}$ bis $1\frac{1}{3}$ Procent vom Gewicht des getrockneten Farbestoffs, sowohl vom Menschen- als Ochsenblut, nach Michaelis 2,2 Proc. im Farbestoff von Kalbsblut. Berzelius erhielt aus 1,3 Theilen Asche von 100 Theilen getrockneten Farbestoffs

kohlensaures Natron mit Spuren von phosphors. Natron	0,3
phosphorsauren Kalk	0,1
reine Kalkerde	0,2
basisch phosphorsaures Eisenoxyd	0,1
Eisenoxyd	0,5
Kohlensäure und Verlust	0,1

In einem andern Versuch erhielt Berzelius aus 400 Gran des getrockneten Blutroths 5 Gr. Asche. Diese war zusammengesetzt aus Eisenoxyd 50,0 basisch phosphors. Eisen 7,5, phosphors. Kalk mit einer geringen Menge phosphors. Talks 6,0, reinem Kalk 20,0, Kohlensäure und Verlust 16,5. Das allgemeine Resultat von Berzelius Versuchen ist, dass das Blutroth eine Quantität Eisen enthält, die etwas mehr als $\frac{1}{2}$ Procent seines Gewichts metallischem Eisen entspricht. Das Mangan ist im Blute noch nicht von Mehreren gefunden worden. Wurzer (Schweigg. *J.* 58. *p.* 481.) fand in 2 Grammen Blutkohle 0,108 Eisenoxyd und 0,034 Manganoxyd.

Das getrocknete und pulverisirte Blut reagirt nach Menghini durch seinen Eisengehalt gegen den Magnet, das eingeäscherte Blutroth nach Scudamore nicht, allein keines der gewöhnlichen für Eisenoxyd empfindlichsten Reagentien, wie Blutlaugensalz, Gerbestoff, Galläpfelsäure und die stärksten Mineralsäuren, bringen die geringste Reaction an unverbranntem Blutroth auf Eisen oder phosphorsauren Kalk hervor, und es scheint daraus hervorzugehen, dass Eisen und Calcium nicht im Zustand eines Salzes im Blute enthalten sind. Die Angabe von Fourcroy, dass das Blutroth eine Auflösung von basisch phosphorsaurem Eisenoxyd in Eiweiss sey und dass der auch eisenhaltige, aber weisse Chylus das Eisen als neutrales phosphorsaures Eisenoxydul enthalte, ist durch Berzelius Versuche widerlegt. Denn das basisch phosphorsaure Eisenoxyd ist im Blutwasser und Eiweiss mit oder ohne

Digitized by Google

Zusatz von Alkali unlöslich. Auch die Behauptung von Prevost und Dumas, dass das Blutroth Eiweiss sey, welches Eisenoxyd aufgelöst enthalte, schien nicht richtig, weil sonst Mineralsäuren und Königswasser das Eisen aus unverbranntem Blutroth ausziehen würden. Berz. *Thierchemie. p.* 58.

Engelhart (*de vera materiae sanguini purpureum colorem impertientis natura. Götting.* 1825.) hat schöne Entdeckungen über den Antheil des Eisens an dem Blutroth gemacht. Er zeigte zuerst, dass eine Auflösung von Blutroth in Wasser, die man mit Schwefelwasserstoff imprägnirt, nach einiger Zeit die Farbe verliert, zuerst violett, dann grün wird. Diese Reaction des Schwefelwasserstoffs ganz wie auf Eisen scheint zu beweisen, dass das Eisen im Blutroth zu seiner Farbe beitrage. Dann entdeckte Engelhart, dass sich der wässrigen Auflösung von Blutroth oder dem mit Wasser angerührten koagulirten Blutroth und anderen thierischen Substanzen alles Eisen, Calcium, Magnium, Phosphor entziehen lasse, wenn man Chlorgas durch die Flüssigkeit leitet, oder diese mit Chlorwasser versetzt. Die Auflösung von Blutroth wird zuerst grünlich, und zuletzt ganz entfärbt; die thierische Materie schlägt sich in weissen Flocken mit Salzsäure oder Chlor verbunden nieder, während Eisen, Calcium, Magnium, Phosphor oxydirt oder mit Chlor verbunden, Eisen z. B. als Eisenchlorid, Phosphor als Phosphorsäure, in der Auflösung bleiben und durch Filtration abgeschieden werden können; wogegen die thierische Materie bei der Verbrennung keine Asche mehr giebt. Nun hat aber Chlor keine Verwandtschaft zu Oxyden, wohl aber eine sehr grosse zu regulinischen Metallen, ferner wird Eisen nicht von Salzsäure und anderen Mineralsäuren aus dem Blut ausgezogen, da diese doch eine grosse Verwandtschaft zu Metalloxyden, aber keine zu regulinischen Metallen haben. Hiernach hielt es Berzelius für wahrscheinlicher, dass das Eisen im Blute im regulinischen Zustande und nicht als Oxyd enthalten sey, obgleich man keine Analogie für die Annahme einer Verbindung von Metall mit Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff hat.

Zu der Ansicht, dass das Eisen im Blut als Oxyd enthalten sey, hat Heinr. Rose (Poggend. *Ann.* 7. 81.) neue Stützen geliefert. Rose wiederholte Engelhart's Beobachtung. Wenn er die Flüssigkeit nach der Veränderung durch Chlor und nach der Präcipitation der thierischen Materie filtrirte; so konnte das Eisen aus der Flüssigkeit abgeschieden werden; wurde sie aber nicht filtrirt, sondern Ammoniak im Ueberschuss zugesetzt, so löste sich wieder Alles zusammen zu einer dunkelrothen Farbe auf, und es wurde kein Eisen abgeschieden. Rose vermischte dann eine Auflösung von Farbestoff mit einer gewissen Menge Eisenoxydsalz und setzte Ammoniak im Ueberschuss zu, worauf das Eisenoxyd in der Auflösung blieb und weder durch Schwefelwasserstoff noch Galläpfeltinctur niedergeschlagen werden konnte. Rose fand ferner, dass ein grosser Theil nicht flüchtiger organischer Stoffe, als Zucker, Stärke, Gummi, Milchzucker, Leim u. a., die Eigenschaft haben, dass bei Vermischung ihrer wässrigen Auflösung mit einer kleinen Menge eines Eisenoxydsal-

Digitized by Google

zes, das Eisenoxyd bei Zusatz eines Alkalis nicht, oder nur zum Theil niedergeschlagen wird. Diese Versuche führen wieder zu der Ansicht, dass im Blutroth Eisenoxyd in einer Verbindung mit dem Thierstoff sey.

Dennoch glaubt Berzelius, dass die Art Verbindung, welche bei Rose das Eisenoxyd im Farbestoff oder Eiweiss aufgelöst enthält, nicht die sey, durch welche der Farbestoff eisenhaltig ist, weil sie sonst durch Einwirkung von Säuren ihren Eisengehalt verlieren müsste, und weil eine Verbindung von Farbestoff oder Blutwasser und Eisenoxyd oder Eisenoxydul durch Zusatz von einer Mineralsäure zersetzt wurde, indem Farbestoff oder Eiweiss gefällt wurden, und das Oxyd in der Säure aufgelöst blieb.

Berzelius glaubt daher, dass das Eisen im Blutroth im metallischen Zustande vorkomme, und mit Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, so wie mit kleinen Mengen von Phosphor, Calcium und Magnium *organisch* verbunden sey. und dass sich beim Einäschern des Blutroths dessen Bestandtheile oxydiren, und Phosphorsäure, Kalk, Talk und Eisenoxyd bilden. Für diese Ansicht scheint auch der Zustand des Eisens im Chylus zu sprechen; denn hier muss das Eisen sich in einem ganz andern Zustande und zwar als Oxyd vorfinden, indem es nach Emmert (Reil's *Archiv.* 8.) durch Salpetersäure ausgezogen wird, und dann mit Galläpfeltinctur einen schwarzen, mit blausaurem Kali einen blauen Niederschlag bildet. Indessen bekämpft Gmelin doch die Vorstellung von dem vorzugsweisen Antheil des Eisens an der Farbe des Blutroths, selbst angenommen, dass Eisen regulinisch mit Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff im Blutroth verbunden sey. Er sagt, die Entfärbung des Blutroths durch Chlor mit Entziehung von Eisen beweise nicht, dass diese Entziehung die Ursache der Entfärbung ist, denn es könnte auch das Chlor das Blutroth bloss durch Entziehung von Wasserstoff oder Uebertragung von Sauerstoff auf dessen Bestandtheile entfärben, und die dabei entstehende Salzsäure könnte dann das Eisenoxyd der alkalischen Flüssigkeit aufnehmen. Hierfür führt Gmelin an, dass, wenn man das mit Blutroth gemengte Blutwasser statt mit Chlor mit überschüssiger kalter Salz- oder Schwefelsäure versetzt und von dem zwar verdunkelten, aber keineswegs entfärbten Blutroth abfiltrirt, man in der Flüssigkeit durch schwefelblausaures Kali ebenfalls das Eisenoxyd entdecken kann, also sich Eisenoxyd ohne Zerstörung der Farbe entziehen lässt. Auch liefere der durch wiederholtes Auskochen mit Weingeist grösstentheils entfärbte Rückstand von geschlagenem Blute beim Einäschern noch eine merkliche Menge Eisenoxyd. Gmelin *Chemie* 4. 1169.

Eine eigenthümliche Ansicht über die Natur des Eisens im Blut hat Treviranus aufgestellt. Winterl erhielt, indem er Blut mit Kali verkohlte, eine im Alkohol lösliche Substanz, die nicht wie das blausaure Kali das Eisen aus seinen Verbindungen niederschlug, sondern roth färbte. Nach Treviranus soll diese Substanz, die Winterl Blutsäure nannte, auch im Speichel enthal-

Digitized by Google

ten seyn, und Speichel mit einer salpetersauren oder schwefelsauren Eisenauflösung blutroth werden (ich finde die Farbe nicht blutroth, sondern gelbroth). Nach Treviranus ist diese Substanz in Verbindung mit Eisen die Ursache der rothen Farbe des Blutes. Gmelin hat nun gefunden, dass diese Substanz im Speichel Schwefelblausäure ist (obgleich Kuehn wieder dieses bezweifelt). Siehe den Artikel vom Speichel.

Neulich hat Hermbstaedt aus der Beobachtung, dass aus faulendem Blut und aus Eiweiss Schwefelwasserstoff sich entwickelt, so wie aus mehreren Versuchen geschlossen, das Schwefel im Blut enthalten ist. Die Asche des Blutes enthält ein Alkali, dieses musste, schliesst Hermbstaedt, in der Blutkohle enthalten seyn. Wird aber Blutkohle mit Kali oder Natron geglüht, so werden Cyankalium oder Cyannatrium gebildet. Wird Cyankalium oder Cyannatrium mit Schwefel geglüht, so entsteht Schwefel-Cyan-Kalium oder Natrium, welche das Eisenoxyd blutroth färben. In der That werden Serum oder Eiweisslosung, oder Milch mit Schwefelblausäure versetzt nach Hinzufügung einiger Tropfen Eisenchlorid blutroth. *Schweigg. J.* 1832. 5. u. 6. *p.* 314. Diese Ansicht ist indess von aller Wahrscheinlichkeit entfernt.

II. Faserstoff, Fibrin.

Man hat den Faserstoff bisher nur im geronnenen Zustande untersucht. Nach der von mir angegebenen Methode lässt sich aber auch der noch frische aufgelöste Faserstoff des Froschblutes vor der Gerinnung untersuchen. Man bringt nämlich das Blut vom Frosche schnell mit etwas Wasser oder besser Zuckerwasser zugleich auf das Filtrum von weissem Filtrirpapier. Die durchgehende farblose Flüssigkeit enthält Faserstoff aufgelöst, der erst nachher gerinnt. Lässt man die durchs Filtrum gehende Flüssigkeit in ein Uhrglas, das mit Essigsäure gefüllt ist, träufeln, so gerinnt der Faserstoff in der Essigsäure nicht. Enthält das auffangende Uhrglas Kochsalzlösung, so gerinnt der Faserstoff des Froschblutes darin entweder gar nicht, oder nur zum sehr kleinen Theil, wie auch Kochsalzauflösung dem frischen Froschblute zugesetzt, die Gerinnung desselben ausserordentlich lange aufhält, was auch unterkohlensaures Kali dem frischen Froschblute in Auflösung zugesetzt verursacht, ohne die Gerinnung desselben ganz aufzuheben. Vom Blute des Menschen weiss man schon lange, dass einige Salze, schwefelsaures Natron, salpetersaures Kali, in einiger Menge dem frischen Blute zugesetzt, sein Gerinnen verhindern. Man kann sich hiernach einen Begriff machen, wie die kühlenden Salze bei dem entzündungswidrigen Verfahren auf das Blut wirken; sie wandeln den Faserstoff um, der in der Entzündung eine so grosse Neigung hat, sich anzuhäufen, und in den Gefässen des entzündeten Organes und nach Ausschwitzungen desselben auf der Oberfläche der Häute zu gerinnen.

Dass wässrige Lösung von kaustischem Kali oder Natron die Gerinnung des aus der Ader gelassenen Blutes vom Menschen zu einer zusammenhängenden Masse verhindert, wusste man schon lange; nach Prevost und Dumas gerinnt das gelassene Blut der

Digitized by Google

höheren Thiere nicht mehr, wenn man es mit $\frac{1}{1000}$ kaust. Natron versetzt. Lässt man die vom frischen Froschblute durchs Filtrum gehende Flüssigkeit in ein Uhrglas träufeln, worin sich Liquor kali caustici befindet, so gerinnt der Faserstoff nicht zu einem Klümpchen, sondern es entstehen allmählig ganz kleine Flocken, die man aber nur bemerkt, wenn man recht genau zusieht. Solche kleine Flocken entstehen noch deutlicher, wenn man die Flüssigkeit in ein Uhrglas, das mit Schwefeläther angefüllt ist, träufeln lässt, und im Maasse der Verdunstung des Aethers neuen Aether zusetzt. Von Liquor ammonii caustici setzt der aufgelöste Faserstoff des Froschblutes keine Kügelchen und Flocken ab.

Den frisch geronnenen Faserstoff gewinnt man zur chemischen Untersuchung durch Schlagen des Blutes, worauf der am Stabe sich anhängende Faserstoff ausgewaschen wird, oder durch Auswaschen des rothen Congulums. In diesem Zustande ist der Faserstoff specifisch schwerer als Wasser, als Blutwasser und als das mit Blutkörperchen versetzte Blutwasser von geschlagenem Blute; in allen diesen sinkt der Faserstoff unter, wenn er von anklebenden Luftbläschen befreit ist. Die weitere Beschreibung ist nach Berzelius. Der geronnene und ausgewaschene Faserstoff ist weiss, durch Trocknen wird er gelblich, hart und spröde, nicht durchscheinend, und verliert $\frac{3}{4}$ vom Gewicht. Von Wasser weicht er wieder auf, ohne sich aufzulösen. Er besitzt weder besondern Geruch noch Geschmack. Bei dem Wärmegrade, wo er zersetzt wird, schmilzt er, bläht sich auf, entzündet sich und hinterlässt eine glänzende Kohle, wie andere Körper, welche Stickstoff enthalten. Die Kohle verbrennt zu einer grauweisen zusammengebackenen, halbgeschmolzenen Asche, die $\frac{2}{3}$ Procent vom Gewicht des trocknen Faserstoffes ausmacht. Diese Asche ist weder sauer, noch alkalisch, hinterlässt nach dem Auflösen in Salzsäure Spuren von Kieselerde, und besteht hauptsächlich aus phosphorsaurer Kalkerde, etwas phosphorsaurer Talkerde und einer sehr unbedeutenden Spur von Eisen. Vor dem Verbrennen lassen sich die Bestandtheile der Asche nicht durch Säuren ausziehen, und scheinen daher zu der chemischen Zusammensetzung des Faserstoffes gehört zu haben. Im geronnenen Zustande ist der Faserstoff sowohl in kaltem als im warmen Wasser unlöslich, aber bei lange fortgesetztem Kochen mit Wasser verändert sich seine Zusammensetzung, er schrumpft zusammen, erhärtet und zerfällt zuletzt bei dem geringsten Druck. Es entwickelt sich hierbei kein Gas, aber die Flüssigkeit wird unklar und enthält nun eine aus den Bestandtheilen des Faserstoffes neugebildete Substanz aufgelöst. Diese Auflösung hat keine Aehnlichkeit mit einer Leimauflösung. Berzelius *Thierchemie p.* 35. 36. Faserstoff, geronnenes Eiweiss, Käsestoff und Blutroth haben übrigens gemein, dass aus ihnen durch Kochen in Wasser kein Leim ausgezogen werden kann. Der Faserstoff mit einigen anderen Stoffen (nicht Eiweiss) hat auch das Eigenthümliche, durch blosse Berührung das Wasserstoffsuperoxyd zu zersetzen und mit Entwickelung von Oxygen Wasser zu bilden, ohne dass sich der Faser-

Digitized by Google

stoff verändert. Bei grösseren Mengen von Faserstoff entwickelt sich dabei Wärme. Zu Säuren und Alkalien verhält sich Faserstoff so, dass er bald die Rolle einer Basis, bald die einer Säure oder wenigstens eines elektronegativen Körpers spielen kann. Mit concentrirten Säuren quillt er auf, gelatinirt, wird durchsichtig und stellt einen sauren Körper dar, durch verdünnte Säuren schrumpft der Faserstoff zusammen zu einer neutralen Verbindung von Säure mit Faserstoff. Die saure Verbindung mit den Mineralsäuren ist im Wasser unauflöslich, die neutrale auflöslich, dagegen sind die saure und die neutrale Verbindung des Faserstoffes mit Essigsäure beide im Wasser auflöslich. Cyaneisenkalium bringt in der essigsauren Auflösung einen Niederschlag hervor, was für den Faserstoff charakteristisch ist, da diess bei Zellgewebe, Sehnengewebe, elastischem Gewebe der mittlern Arterienhaut nicht der Fall ist. Diese Verhältnisse zu den Säuren sind jedoch dem Eiweiss wie dem Faserstoff zugleich eigen. Nach Caventou und Bourdois lösen sich Faserstoff, Eiweissstoff, Käse und Schleim in kalter concentrirter Salzsäure auf, und nehmen bei + 18° bis 20° nach 24 Stunden eine schöne blaue Farbe an, was bei dem Leime und den Sehnen nicht der Fall ist. War der Faserstoff hierbei nicht völlig frei von Farbestoff, so wird die Flüssigkeit statt blau, purpurfarben oder violett. Faserstoff, Eiweissstoff und Käse stimmen auch darin überein, dass sie in ätzendem Kali und Natron zu einer Gallerte aufgelöst werden, ohne sich, wie der Hornstoff, in eine seifenartige Substanz zu verwandeln. Die Elemente des Faserstoffes sind nach den Analysen von Gay-Lussac und Thenard, und nach den von Michaelis in folgender Combination:

	G. und T.	Mich. arteriell	Mich. venös
Stickstoff	19,934	17,587	17,267
Kohlenstoff	53,360	51,374	50,440
Wasserstoff	7,021	7,254	8,228
Sauerstoff	19,685	23,785	24,065

Siehe Berzelius *Thierchemie p.* 34—47. E. H. Weber in Hildebrandt's *Anatomie I. p.* 83.

Der Faserstoff findet sich ausser dem Blute noch im Chylus und in der Lymphe im aufgelösten Zustande, im festen in den Muskeln, im Uterus. Die Fasern der Arterien enthalten dagegen keinen Faserstoff.

III. Blutwasser.

Wird das Blutwasser bis 75° und darüber erhitzt, so gerinnt es zu einer festen Masse, die grösstentheils aus Eiweiss besteht. Diese Masse lässt einzelne Tropfen einer braunen Flüssigkeit, *Serositas*, ausschwitzen, welche sich nach Gmelin (Chemie 4. 1381) mit Säuren trübt und beim Erkalten gallertartig gesteht; sie enthält nach demselben Chemiker ausser dem durch Alkali gelöst erhaltenen Eiweissstoff, auch Käsestoff, Speichelstoff, Osmazom und Salze des Natrons und Kali's. Der Käsestoff wurde von Gmelin und Geigert (Gmelin's Chemie 4. 1073) auch bei einem andern Versuch mit Ochsenblut beobachtet. Wurde näm-

Digitized by Google

lich das Serum des geschlagenen Ochsenblutes mit Weingeist ausgekocht und kochend filtrirt, so fiel beim Erkalten des rothen Filtrats Käsestoff in reichlichen Flocken nieder, durch anhängendes Blutroth geröthet und mit Gallenfett verunreinigt.

Lässt man Serum ganz vollkommen durch Wärme coaguliren, und behandelt die eingetrocknete Masse mit kochendem Wasser, das hierdurch Aufgelöste aber wiederholt mit Alkohol, so nimmt der Alkohol auf Chlor-Natrium, Chlor-Kalium, milchsaures Natron, Osmazom, und das nicht vom kochenden Wasser und Alkohol Aufgelöste ist erst das reine Eiweiss. Das Blutwasser enthält also an thierischen Theilen Speichelstoff, Käsestoff, Milchsäure, Osmazom und Eiweiss.

1) *Speichelstoff, Salivin.* Diese Materie, welche ihren Namen vom Speichel hat, hat eine grössere Verbreitung, und erscheint in verschiedenen anderen Absonderungen; sie findet sich auch in dem Wasser mehrerer Wassersuchten und in der durch Blasenpflaster erzeugten Blase. Sie ist im kalten und warmen Wasser, nicht in Weingeist löslich, wird weder von den Metallsalzen noch starken Säuren gefällt, auch nicht oder wenig von Galläpfelinfusion getrübt.

2) *Käsestoff, casein.* Kommt in grosser Menge in der Milch, in geringer Menge nach Gmelin im pankreatischen Saft und in der Galle vor. Er ist in kaltem und heissem Wasser löslich, in kaltem Weingeist wenig, in heissem Weingeist mehr löslich; er wird von salzsaurem Zinn, essigsaurem Blei, Chlorquecksilber, Galläpfelinfusion gefällt. Essigsäure und die Mineralsäuren fällen, grössere Mengen der Säure lösen ihn wieder auf. Alaun fällt und überflüssiger Alaun löst nicht wieder auf. Die saure Auflösung des Käsestoffs wird von Cyaneisenkalium niedergeschlagen wie die eiweissartigen Körper. Die Niederschläge des Käsestoffs von Säuren und Weingeist sind in Wasser wieder löslich; was den Käsestoff vom Eiweiss unterscheidet. Charakteristisch ist die Gerinnung des Käsestoffs vom Verdauungsprincip, Pepsin, welches im Laabmagen der Wiederkäuer und im Magen andrer Thiere enthalten ist. Dieser Niederschlag ist nicht in Wasser löslich.

3) *Milchsäure, Acidum galacticum.* Diese Säure besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, sie ist der Essigsäure verwandt, ist aber nach Berzelius bestimmt von ihr verschieden; sie bildet mit Basen Salze von eigenthümlicher Form, die nach Berzelius nicht durch Verunreinigung von Essigsäure mit einer thierischen Materie entstehen. Siehe das Nähere *Thierchemie p.* 580. Die reine Milchsäure, nach der von Berzelius neulichst beschriebenen Methode dargestellt, ist farblos, ohne Geruch und von einem beissend sauren Geschmack, der bei Zusatz von Wasser sehr rasch abnimmt. Milchsäure löst sich in Alkohol in allen Verhältnissen, in Aether nur in geringer Menge auf. Die Milchsäure findet sich ausser dem Blutwasser auch im Muskelfleische und in der Krystalllinse; ferner finden sich Milchsäure und milchsaure Salze in vielen Absonderungssäften, besonders in der Milch. Milchsäure und ihre Salze sind immer mit Osmazom verbun-

Digitized by Google

den, werden durch Weingeist gemeinschaftlich mit ihm ausgezogen, lassen sich aber durch Galläpfelaufguss von ihm scheiden, der das Osmazom niederschlägt. Berzelius *Thierchemie p.* 576—584. E. H. Weber's *Anatomie I. B. p.* 90.

4) *Osmazom, Fleischextract* von Thouvenel. Es ist in kaltem und heissem Wasser, in kaltem und heissem Weingeist auflöslich, zerfliesst an der feuchten Luft, schmilzt in der Wärme, und wird durch Galläpfelaufguss aus seinen Auflösungen niedergeschlagen. Das Osmazom kommt in grosser Menge im Muskelfleisch in geringerer, in den mehrsten organischen Theilen, nach Gmelin auch im Speichel, pankreatischen Safte und Magensafte vor. Berzelius hält das Osmazom nicht für eigenthümlich, sondern für eine Verbindung von einer thierischen Materie und milchsauren Salzen.

5) *Eiweiss, Albumen.* Das Eiweiss bleibt nach der Ausziehung der übrigen Materien aus dem getrockneten Coagulum des Serums zurück. Dieser Stoff findet sich ausserdem in der Lymphe, im Chylus, in dem Weissen und Gelben des Eies, in letzterem mit Oel gemengt, in dem Absonderungsprodukte der serösen Häute, in den Flüssigkeiten des Zellgewebes, im Humor aqueus des Auges, im Glaskörper desselben, im Gehirne und den Nerven mit phosphorhaltigem Fette, in dem Inhalt der Graaf'schen Bläschen des Eierstockes der Säugethiere und des Menschen. Hier ist zunächst vom Eiweiss des Blutwassers die Rede. Es giebt davon zwei Zustände.

a. Eiweiss im aufgelösten Zustande. Es scheint im Blutwasser mit Natron verbunden, was man Albuminat von Natron nennt. Berzelius glaubt nicht, dass das Eiweiss im Blutwasser durch das Natron aufgelöst erhalten werde; denn man kann das Natron durch Essigsäure sättigen, ohne dass ein Niederschlag erfolgt. Zu dieser Neutralisation sind nach Stromeyer auf $\frac{1}{2}$ Unze Blut 10 Tropfen destillirten Essigs nöthig. Wird Blutwasser oder Eiweissauflösung bei einer nicht bis $+60^0$ C. gehenden Temperatur abgedampft, so trocknet es, wird durchscheinend, und ist nachher wieder in Wasser auflöslich. Bei $70—75^0$ C. gerinnt das Eiweiss und ist dann in Wasser unlöslich. Eiweiss mit sehr viel Wasser vermischt, wird durch Hitze nicht mehr fest, sondern gerinnt in Kügelchen zu einer milchartigen Flüssigkeit, die indessen beim Abdampfen vollkommen geronnenes Eiweiss darstellt. Das aufgelöste Eiweiss gerinnt durch die galvanische Säule, durch Weingeist, Mineralsäuren, von Metallsalzen (z. B. von Zinn, Blei, Wismuth, Silber und Quecksilber), von Chlor, von Galläpfelinfusion und Eiweiss des Blutwassers nach Dutrochet's und meinen Beobachtungen durch sehr concentrirte Auflösung vom fixen Alkali, wenn wenig Blutwasser mit viel Liquor kali caustici versetzt wird, dahingegen dieser nach meinen Beobachtungen nur das unverdünnte Eiweiss des Eies coagulirt. Liquor kali caustici schlägt nach meinen Beobachtungen auch das Eiweiss der Lymphe und des Chylus nieder. Die Essigsäure schlägt das Eiweiss nicht nieder, während Käsestoff und der Leim der Knorpel davon niedergeschlagen werden. Gmelin hat beobachtet und ich habe es bestätigt gesehen, dass das Eiweiss der Eier von weingeistfreiem

Digitized by Google

Aether gerinnt, während dieser aus Blutwasser nichts niederschlägt.

Meine Beobachtungen über den aufgelösten Zustand des Faserstoffes im frischen Blute haben mir Data zur Vergleichung des noch aufgelösten Faserstoffes vor dem Gerinnen mit dem aufgelösten Eiweiss geliefert. Die Essigsäure schlägt nichts aus Blutwasser, aber auch nichts aus der frischen Faserstofflösung nieder; denn lässt man von Froschblut die durchs Filtrum gehende Flüssigkeit in ein Uhrglas, das mit Essigsäure gefüllt ist, träufeln, so gerinnt der Faserstoff in der Essigsäure nicht. Die Neutralsalze schlagen nichts aus Serum nieder, und mehrere derselben, kohlensaures Kali und Natron, salpetersaures Kali, schwefelsaures Natron (beim Frosche auch Kochsalz) erhalten den frischen Faserstoff aufgelöst, oder verhindern dessen freiwillige Gerinnung. Liquor ammonii caustici schlagt nichts aus der frisch vom Froschblute abfiltrirten Faserstofflösung nieder, so wenig als aus aufgelöstem Eiweiss und Blutwasser. Liquor kali caustici schlägt das Eiweiss aus Blutwasser nieder, eben so wie in kleinen Flocken den Faserstoff der vom frischen Froschblute abgeseihten Faserstofflösung, wenn man z. B. diese Flüssigkeit in ein Uhrglas voll Liquor kali caustici träufeln lässt. Aether schlägt nichts aus Blutwasser nieder, aber wohl gerinnt der Faserstoff der vom Froschblute abgeseihten Faserstoffauflösung in Flocken, wenn man die Flüssigkeit in ein Uhrglas mit Aether träufeln lässt, und im Maasse der Verdunstung neuen Aether zusetzt. Künstlich bewirkte Gerinnung von Faserstoff durch Liquor kali caustici oder Aether unterscheidet sich von der freiwilligen Gerinnung desselben, dass letztere ein anfangs durchsichtiges, hernach sich trübendes und ganz fest zusammenhängendes Coagulum liefert, während die künstliche Gerinnung von Faserstoff diesen wie sonst oft das Eiweiss des Blutwassers in nicht fest zusammenhängenden Kügelchen absetzt. Die Hauptunterschiede des aufgelösten Faserstoffes von Eiweissauflösung im Blutwasser sind nun, dass ersterer sich selbst überlassen von selbst gerinnt, dass Eiweiss nur durch Hitze und Reagentien gerinnt, und dass Faserstofflüssigkeit von Aether, nicht aber Eiweiss in Kügelchen gerinnt. Vom geronnenen Kasestoff lassen sich der geronnene Eiweisstoff und Faserstoff leicht unterscheiden, denn der von Säuren und Weingeist geronnene Käsestoff ist im Wasser wieder auflöslich. Eiweiss, Faserstoff und Käsestoff haben aber das mit einander gemein, dass ihre saure Auflösung von Cyaneisenkalium gefällt wird.

Vermischt man aufgelöstes Eiweiss mit Säuren oder Alkalien, so wird der Theil, der sich mit dem Reagens verbindet, in denselben Zustand wie geronnenes Eiweiss versetzt, selbst wenn diess Reagens kein Eiweiss niederschlägt, wie Essigsäure, Ammonium und verdünnte Kalilösung; die essigsaure Eiweissauflösung wird von Kali, die alkalische Auflosung von Säure niedergeschlagen, ganz wie bei dem Farbestoffe.

Wird Blutwasser mit kleinen Mengen von Metallsalzen vermischt und dazu etwas mehr kaust. Kali gesetzt, als zur Zersetzung des Metallsalzes nöthig ist, so wird das Oxyd nicht nieder-

Digitized by Google

geschlagen, sondern bleibt mit dem Eiweiss in löslicher Verbindung. Berzelius, der diess anführt, bemerkt, dass durch diesen Umstand Metallsalze, oder Oxyde vom Darmkanal oder von der Haut absorbirt und vom Blutwasser aufgelöst geführt, und durch die Excretionen ausgeleert werden; wie man denn nach dem Gebrauche von Quecksilber das Oxydul in den Flüssigkeiten des Körpers aufgelöst findet. Autenrieth und Zeller, Reil's *Archiv* 8. Schubarth, Horn's *Archiv* 1823. *Nov.* 417. Cantu, *Mem d. Tor.* 29. 1825. Buchner's *Toxicol.* 538. (Sollten nicht die äusserst innigen Verbindungen der Metalloxyde mit Eiweiss für die arzneiliche Darreichung passen?) Eiweiss oder Blutwasser mit concentrirten Auflösungen von Erd - oder Metallsalzen vermischt, gerinnt, und das Coagulum enthält die Bestandtheile des Salzes. Auch diese geronnenen Verbindungen der Salze mit Eiweiss verdienen eine grössere Berücksichtigung in der Arzneikunde. Unter den schon angeführten Metallsalzen zeichnen sich das essigsaure Blei, und noch mehr der Sublimat (Chlor-Quecksilber), als die empfindlichsten Reagentien für Eiweiss aus. Sublimat trübt noch eine Flüssigkeit, die nur $\frac{1}{2000}$ Eiweiss aufgelöst enthält. Durch seine grosse Neigung, mit diesem Salze Verbindung einzugehen, ist das Eiweiss das Gegengift desselben.

b. Eiweiss im geronnenen Zustande aus aggregirten Kügelchen. So verhält sich das Eiweiss chemisch ganz wie Faserstoff, und Berzelius kennt kein verschiedenes Verhalten gegen Reagentien, ausser dass das geronnene Eiweiss nicht das Wasserstoffsuperoxyd zersetzt. Auch die elementare Zusammensetzung ist wenig abweichend, wie sich aus den von Gay-Lussac, Thenard, Michaelis und Prout gegebenen Analysen ergiebt.

	Gay-L. u. Then.	Mich. arteriell.	Mich. venös.	Prout.
Stickstoff	15,705	15,562	15,505	15,550
Kohlenstoff	52,883	53,009	52,650	49,750
Wasserstoff	7,540	6,993	7,359	8,775
Sauerstoff	23,872	24,436	24,484	26,925

Ueber das Verhältniss des Eiweisses zu den übrigen Bestandtheilen des Blutwassers giebt Berzelius Analyse Auskunft. 100 Theile Blutwasser von Menschenblut enthalten Wasser 90,59, Eiweiss 8,00; Osmazom, milchsaures Natron 0,4 mit Chlornatrium 0,6 durch Alkohol ausgezogen; verändertes Eiweiss, kohlensaures und phosphorsaures Alkali 0,41 in Wasser löslich. Lecanu hat bei der Analyse des Blutwassers auch schwefelsaures Alkali, kohlensaure und phosphorsaure Magnesia und phosphorsauren Kalk gefunden. Berzelius vermuthet, dass die drei Hauptbestandtheile des Blutes Faserstoff, Blutroth und Eiweiss, nur Modificationen eines und desselben thierischen Stoffes sind, wie z. B. das Blutroth seine Eigenthümlichkeit dem Eisengehalt verdanken könnte. Derselben Meinung ist Treviranus.

IV. Fette Materie im Blute.

Das Blut enthält selten etwas weniges freies Fett, das man dann auf der Oberfläche schillern sieht, allein das meiste der fetten Materie ist an Faserstoff, Farbestoff und Eiweiss gebunden.

Digitized by Google

Kocht man das mit Blutroth gemengte Blutwasser von geschlagenem Ochsenblute mit Weingeist, so enthalten die ersten Filtrate nach Gmelin Gallenfett, Talgfett, Oelfett, Talgsäure. Gmelin's *Chemie* 4. 1163. Von jenem Fette glaubte Berzelius früher, dass es durch die chemische Behandlung sich erst bilde. Dass aber Fett in dem Faserstoffe, in dem Eiweiss, in dem Blutrothe, aus denen man es auszieht, im gebundenen Zustande wirklich enthalten ist, ist deswegen sehr wahrscheinlich, weil der Chylus, woraus das Blut sich bildet, fette Materien im ungebundenen Zustande in Form von Emulsion enthält, die sich durch die Blutbildung wahrscheinlich mit der andern thierischen Materie enger verbinden. Vom Faserstoffe des Blutes hat Chevreul mit Aether eine fette Materie abgesondert, analog derjenigen, die man vom Gehirne erhält, und wie diese vorzüglich merkwürdig durch den Gehalt an Phosphor, den sie im gebundenen Zustande enthält. Jetzt ist Berzelius auch der Meinung, dass jenes Fett nur Educt, nicht Produkt der Analyse sey, besonders, da Faserstoff durch Ausziehen des Fettes mit Aether oder Alkohol chemisch nicht verändert wird, und sich nach der Ausscheidung der geringen Menge Fett durch fortgesetzte Behandlung kein Fett weiter ausziehen lässt. Das Fett vom Faserstoffe ist nach Berzelius in einem verseiften Zustande, denn die Auflösung desselben in kaltem Alkohol röthet Lakmuspapier, zum Beweis, dass wenigstens ein Theil davon in demselben sauren Zustande wie nach dem Verseifungsprocesse seyn müsse. Berzelius beschreibt von dem Fette des Faserstoffes zwei Modificationen, und schliesst mit der Bemerkung, dass es sehr den von Chevreul beschriebenen sauren Salzen von Talgsäure und Oelsäure mit Kali gleiche, bis auf die grössere Löslichkeit des erstern in Aether und Alkohol. Nach Chevreul beträgt das Fett im Faserstoffe 4—4,5 Procent. Lecanu fand im Blute eine krystallisirbare fette Materie und eine ölige Materie. Von der erstern fand er 1,20—2,10, von der letztern 1,00—1,30 in 1000 Blutwasser. Nach Boudet (*Essai critique et experimental sur le sang. Paris* 1833.) enthält das Blut auch Cholestrine, wie schon Gmelin fand.

Befindet sich eine grössere Menge freien ungebundenen Fettes im Blut, so ist das Serum durch die Fettkügelchen milchig, was man öfters bei jungen Thieren, seltner beim erwachsenen Menschen sieht.

Alle Fettarten zeichnen sich in ihrer Zusammensetzung durch die geringe Menge des Sauerstoffes und die überwiegende Menge des Kohlenstoffes aus. Merkwürdig ist, dass die frei im Körper vorkommenden Fettarten, Stearin und Elain, welche im frei vorkommenden Fette immer mit einander verbunden sind, gar keinen Stickstoff enthalten.

Stearin		Elain
Sauerstoff	9,454	9,548
Wasserstoff	11,770	11,422
Kohlenstoff	78,776	79,030

Andere Fettarten sind, wie das Fett im Blute, an andere Thierstoffe gebunden, zum Theil beim Erkalten krystallisirbar

Digitized by Google

und stickstoffhaltig (im Blute und Gehirne auch phosphorhaltig), und lassen sich nicht verseifen. Diese Fettarten kommen ausser dem Blute im Gehirne und den Nerven, in der Leber und vielleicht noch in einigen anderen Theilen vor.

Sieht man ab von der durch Absonderungen gebildeten neuen organischen Materie, wie vom Gallenstoff, Käsestoff, Schleim etc., so sind die näheren Bestandtheile aller festen Theile des Körpers bereits im Blute enthalten, als Faserstoff, Eiweiss, Osmazom, Milchsäure, fettige Materie. Nur der in den Sehnenfasern, Knorpeln, Knochen, serösen Häuten, in der äussern Haut und im Zellgewebe überhaupt, besonders auch im Zellgewebe der Muskeln vorkommende *Leim, Gluten,* macht hiervon eine Ausnahme. Zwar haben Parmentier und Deyeux, und Saissy im Blute auch Leim oder Gallerte zu finden geglaubt. Allein diess war offenbar ein Irrthum. Leim wird aus den genannten Theilen durch kochendes Wasser dargestellt, er ist in Weingeist und kaltem Wasser wenig auflöslich, was ihn vom Osmazom unterscheidet, er ist in heissem Wasser auflöslich, er gelatinirt beim Erkalten noch in der 150fachen Menge Wasser, so dass in der Gallerte der Leim mit Wasser gebunden ist, und löst sich durch kochendes Wasser wieder auf, was ihn von Faserstoff und Eiweiss unterscheidet. Er ist in Säuren und Alkalien allmählig löslich, von Gerbestoff, Weingeist, Chlorquecksilber, schwefelsaurem Platinoxyd, Platinchlorid und Chlor wird er niedergeschlagen. Er wird dagegen nicht von Salzsäure, Essigsäure, essigsaurem Blei, Alaun, schwefelsaurer Thonerde, schwefelsaurem Eisenoxyd niedergeschlagen. Die saure Auflösung des Leims wird von Cyaneisenkalium nicht gefällt. Einige Naturforscher halten den Leim für ein Zersetzungsprodukt der thierischen Theile durch Kochen. Man hat dafür angeführt, dass nach Berthollet Fleisch, welches beim Kochen keinen Leim mehr gab, durch Faulen in gesperrter Luft mit Kohlensäureentwickelung die Fähigkeit erlangt, wieder Leim zu liefern. Vergl. Wienholt, Meck. *A.* 1. *p.* 206. Berz. *Thierch. p.* 661. Indessen scheint mir jene Ansicht nicht hinlänglich begründet, und Vieles spricht dagegen. Denn nur die obengenannten Gewebe liefern durch Kochen Leim, keine anderen; es muss also in ihnen schon eine eigenthümliche Materie vorhanden seyn. Neuere Untersuchungen von mir, (Poggend. Ann. XXXVIII) zeigen auch, dass diese Materie noch eigenthümliche Verschiedenheiten zeigt, je nach den Theilen, aus welchen sie gewonnen wird. Das sehnige Gewebe und die zu ihm gehörenden fälschlich sogenannten Faserknorpel (Zwischengelenkknorpel), die Knochen, die äussere Haut, das Zellgewebe, die serösen Häute, die tunica dartos liefern nämlich den gewöhnlichen Leim, *gluten, colla,* dessen Eigenschaften oben angegeben sind. Die Knorpel, sowohl die permanenten als die der Knochen vor der Ossification und der einzige wirkliche Faserknorpel, die Cornea, liefern dagegen beim Kochen eine Leimart, welche in allen Punkten mit dem gewöhnlichen Leim übereinkömmt, aber sich darin wesentlich unterscheidet, dass sie von Alaun, schwefelsaurer Thonerde, Essigsäure, essigsaurem Blei, schwefelsaurem Eisenoxyd gefällt wird, welche

Digitized by Google

den gewöhnlichen Leim nicht fällen. Man kann diese Materie Knorpelleim, Chondrin nennen. Vom Käsestoff unterscheidet sich diese Materie dadurch, dass ihr Niederschlag von Alaun durch überschüssigen Alaun aufgelöst, ihr Niederschlag von Essigsäure von überschüssiger Essigsäure nicht wieder aufgelöst wird, worin sich der Käsestoff umgekehrt verhält, dass sie beim Erkalten gelatinirt, und dass ihre saure Auflösung von Kaliumeisencyanid nicht niedergeschlagen wird.

III. Capitel. Analyse des Blutes durch die galvanische Säule.

(Nach eigenen Beobachtungen. Poggend. *Ann.* 1832. 8.)

Dutrochet hat ingeniöse Versuche über das Verhalten thierischer Substanzen gegen die galvanische Säule gemacht. (*Ann. d. sc. nat.* 1831. Frorier's *Not. N.* 715.) Er glaubte auch durch Galvanismus aus Eiweiss Muskelfasern zu bilden, und behauptete, dass die Blutkörperchen elektrische Plattenpaare seyen, wovon der Kern elektronegativ, die Schale elektropositiv sey.

Wird ein Tropfen von einer wässrigen Auflösung von Eidotter (worin sehr kleine mikroskopische Kügelchen suspendirt sind) galvanisirt, so bemerkt man bald die von Dutrochet zuerst beobachteten Wellen. Die vom Kupferpole oder negativen Pole ausgehende Welle, worin sich das Alkali der zersetzenden Salze anhäuft, ist durchsichtig wegen Auflösung des Eiweisses durch das Alkali. Die vom positiven oder Zinkpole ausgehende Welle, worin sich die Säure sammelt, ist undurchsichtig und weisslich, besonders im Umfange der Welle. Beide Wellen streben einander zu, und in der Berührungslinie entsteht plötzlich ein lineares Gerinnsel, welches ganz die Form der Berührungslinie, und zuweilen, wie der Rand der Wellen im Act der Berührung, gekräuselt ist. Die Berührung der beiden Wellen geschieht mit einer lebhaften Bewegung in der Berührungslinie, worauf die Absetzung des Gerinnsels folgt; sobald aber die Absetzung des Gerinnsels selbst geschehen ist, ist Alles ruhig, und an dem Gerinnsel ist niemals die geringste Spur von Bewegung zu bemerken. Es ist daher unbegreiflich, wie ein Beobachter ersten Ranges, wie Dutrochet, jenes Eiweissgerinnsel für eine durch Elektricität erzeugte contractile Muskelfaser ausgeben konnte. Es ist nichts als geronnenes Eiweiss. Dieses Gerinnsel hat überdiess, so wie das Eiweiss, welches sich beim Galvanisiren des Blutserums um den Zinkpol ansetzt, keine Consistenz, sondern besteht aus Kügelchen, die sich leicht auseinander wischen lassen, und nur in der Form der Berührungslinie der beiden Wellen ohne alle Cohäsion abgesetzt sind. Setzt man einen Tropfen Blutserum, gleichviel ob vom Frosch oder von einem Säugethiere, unvermischt mit Kügelchen, beiden Polen aus, so bemerkt man keine deutlichen Wellen. Aber es erfolgt am Zinkpole die Absetzung von Eiweisskügelchen, die hier von innen nach aussen zunehmen,

Digitized by Google

indem die zuerst um den Pol abgesetzten nach aussen gedrängt werden, und beständig neue Absetzung erfolgt. Nach den Ansichten, welche Dutrochet bei der Anwendung der galvanischen Säule auf Thiersubstanzen befolgt, müsste man das Eiweiss des Blutserums für einen elektronegativen Körper halten, weil es sich am Zinkpole oder positiven Pole absetzt. Allein diese Absetzung erfolgt durch das Gerinnen des Eiweisses von der am Zinkpole sich anhäufenden Säure der zersetzten Salze; am Kupferpole schlägt sich das Eiweiss nicht nieder, weil es dort von Alkali aufgelöst bleibt. Indessen wird doch bei einer sehr starken Säule auch am Kupferpol Eiweiss niedergeschlagen, wie Gmelin gezeigt hat, entweder durch die sich dann entwickelnde Wärme, oder, noch wahrscheinlicher, weil, wie Dutrochet und ich gefunden haben, concentrirte Auflösung von fixem Alkali auch Eiweiss niederschlägt. Offenbar hängt es vom Salzgehalte der Flüssigkeiten ab, dass Eidotterauflösung bei derselben Stärke der angewandten Säule kein Gerinnsel am Zinkpole absetzt, sondern nur eine undurchsichtige Welle bildet und bei der Berührung der Wellen beider Pole gerinnt, dass dagegen Blutserum am Zinkpole Eiweiss absetzt. Lassaigne brachte Eiweiss durch Weingeist zum Gerinnen, und wusch es so lange mit Weingeist aus, bis salpetersaures Silber zeigte, dass kein Kochsalz mehr darin sey. Von dem Geronnenen löst sich 0,007 im Wasser auf. Dieses wenige Aufgelöste gerinnt durch die Volta'sche Säule darum nicht, weil kein Kochsalz darin ist; denn es gerann, wenn Kochsalz zugesetzt wurde. *Ann. de chim. et de phys. T. XX. p.* 97. E. H. Weber *Anatomie, I. S.* 87.

Wenn ich meine Erfahrungen nach Dutrochet's Grundsätzen erklären wollte, so wäre das Eiweiss des Eidotters neutral, weil es erst bei der Berührung der beiden Wellen gerinnt, das Eiweiss des Blutserums dagegen elektronegativ, weil es am Zinkpole gerinnt. Man braucht aber nun nach meiner Erfahrung der Eidotterauflösung nur etwas Kochsalz zuzusetzen, so gerinnt sie am Zinkpol, und es bilden sich keine Wellen.

Setzt man einen flach ausgebreiteten Tropfen Blutes vom Frosch oder von einem Säugethiere der galvanischen Säule aus, so bilden sich um den Kupferpol die gewöhnlichen Gasbläschen, am Zinkpole gerinnt das Eiweiss als ein unzusammenhängender Brei von Körnchen, gerade so, wie wenn Blutserum eben so behandelt wird. Die Blutkörperchen häufen sich weder am positiven, noch am negativen Pole an; der Faserstoff gerinnt weder früher noch später als sonst, und weder am positiven, noch am negativen Pole, sondern im ganzen ausgebreiteten Tropfen zwischen beiden Polen und rund herum in einiger Entfernung der Pole. Unmittelbar um die Pole erleiden die Blutkörperchen eine Zersetzung wegen der dort sich anhäufenden Säuren und Alkalien. Der Faserstoff gerinnt im ganzen Tropfen, ohne alle Veränderung der Blutkörperchen; diese Gerinnung tritt auf gleiche Art ein, wenn man arterielles oder venöses Blut von Kaninchen statt Froschblut anwendet.

Nimmt man vom frischen Froschblute das sich bildende Coa-

Digitized by Google

gulum so lange heraus, bis sich nichts mehr bildet, so bleibt zuletzt ein Gemenge von Blutkörperchen und Serum übrig. Ein Tropfen von diesem rothen Satze flach ausgebreitet und dem galvanischen Apparate ausgesetzt, zeigt dieselben Phänomene wie frisches Blut, mit Ausnahme des Faserstoffes, welcher hier fehlt. Die Blutkörperchen häufen sich weder am positiven noch am negativen Pole an, sie bleiben im ganzen Tropfen an ihrer Stelle. Am Zinkpole entsteht der breiige Niederschlag von Eiweisskügelchen, wie beim Galvanisiren des Serums, nur dass er hier von Blutkörperchen röthlich gefärbt ist; am Kupferpole bildet sich der gewöhnliche Schaum und ein fadenziehendes, bräunliches Wesen von zersetzten Blutkörperchen.

Befreit man rothes Coagulum von Säugethierblut auf Fliesspapier vom Serum, so viel es möglich ist, so erhält man darauf durch Auswaschen des Kuchens eine möglichst reine Auflösung von Farbestoff, in welcher freilich immer etwas Eiweiss des Serums, welches im Coagulum eingeschlossen war, enthalten ist. Wurde ein Tropfen der möglichst starken Auflösung von Farbestoff der Volta'schen Säule ausgesetzt, so erhielt ich verschiedene Resultate, je nachdem ich mit den Kupferdrähten selbst die Kette schloss, oder dem sich stark oxydirenden Kupferdrahte des Zinkpoles ein Endstück von Platindraht ansetzte, um die Oxydation des Kupfers ausser Spiel zu lassen. Im ersten Falle erhielt ich Phänomene, welche von den von Dutrochet beschriebenen verschieden sind, im zweiten Falle erhielt ich die von Dutrochet beschriebenen Erscheinungen. Wandte ich blosse Kupferdrähte zum Schliessen der Kette an, so entstand ein rothes, breiiges Gerinnsel von Eiweiss und Blutroth um den Zinkpol. Dieses Gerinnsel nimmt immer mehr zu, indem der um den Pol entstandene rothe Ring von dem weiter erfolgenden Absatze weiter ausgedehnt wird. Die nachfolgenden Absätze sind aber weniger roth, meist weissgrau. Diese Gerinnung findet rund herum um den Draht statt, indess wächst das Coagulum in der Richtung vom Zinkpol gegen den Kupferpol hin etwas mehr, als sonst in der Peripherie des Zinkpoles. Diess ist eine Art Niederschlag, der die Form der Welle in den früheren Versuchen hat, aber aus einem consistenten Brei besteht. Am Kupferpole bemerkt man die gewöhnliche Gasentwicklung und zuweilen eine sehr undeutliche Welle, in welcher der Farbestoff eben so aufgelöst ist, wie in dem übrigen Tropfen; der Rand dieser Welle ist etwas röther. Dutrochet nennt diess eine rothe Welle, wozu gar kein Grund vorhanden ist. Es ist die um den Kupferpol gewöhnlich stattfindende alkalische Solution des Thierstoffes, die hier, wie das Uebrige des Tropfens, Farbestoff aufgelöst enthält, während am Zinkpol Eiweiss und Farbestoff gerinnen. Dutrochet beschreibt die Phänomene vom Galvanisiren der Farbestoffauflösung ganz anders, vergl. Froriep's *Not. N.* 715. Es zeigten sich bei ihm zwei Wellen; die saure am Zinkpole war durchsichtig, und trieb, indem sie wuchs, den rothen Farbestoff vor sich her, welcher sich um die saure Welle her, so wie ausserhalb derselben anhäufte; die alkalische Welle am Kupferpole wurde dagegen durch den rothen Far-

Digitized by Google

bestoff selbst eingenommen. Die beiden Wellen bildeten, indem sie sich verbanden, ein leichtes Coagulum, welches von dem Eiweiss des mitausgewaschenen Serums herrührt. Der rothe Farbestoff verband sich fast sämmtlich mit diesem Coagulum. Aus diesem Versuche, wo der rothe Farbestoff von dem positiven Pole zurückweichen und am negativen Pole sich anhäufen soll, schliesst Dutrochet, dass diese Substanz positiv elektrisch sey, ein Schluss, wozu dieser Versuch durchaus nicht berechtigt. Ich habe schon erwähnt, dass, wenn ich Kupferdrähte zum Schliessen der galvanischen Kette anwandte, der Faserstoff sogleich mit Eiweiss um den Zinkpol gerann, und dass das rothe Gerinnsel von neuem Gerinnen von Eiweiss nur weiter ausgedehnt wurde. Setzte ich dagegen an das sich beim Schliessen der Kette oxydirende Ende des Kupferdrahtes, zur Vermeidung dieses Einflusses, ein Stück sich nicht oxydirendes Metall, ein Stück Platindrath an, so erhielt ich fast ganz die von Dutrochet beschriebenen Phänomene. Es entstanden nun wirklich am Kupfer- und Zinkpole Wellen, welche gegen einander strebten. Sowohl die Welle des Kupferpoles, als die des Zinkpoles, hatte einen deutlichen rothen Rand; diess hat Dutrochet an der Welle des Kupferpoles übersehen, und diess ist sehr wichtig. Die Welle des Kupferpoles ist nicht röther als der Farbestoff ausser der Welle, nur ihr Rand ist röther; daher ist es unrichtig, wenn Dutrochet sagt, dass sich der Farbestoff am Kupferpole anhäufe; ich habe den Versuch ausserordentlich oft wiederholt, und nie diese Anhäufung gesehen. Der rothe Farbestoff entfernt sich sogar gewissermaassen in dem rothen Rande der Welle des Kupferpoles eben so vom Kupferpole, wie in dem rothen Rande der Welle des Zinkpoles vom Zinkpole. Wenn die Welle des Kupferpoles nicht röther als der Farbestoff im Tropfen ausser der Welle ist, so ist dagegen die Welle des Zinkpoles im Innern wirklich farbloser und weniger gefärbt, als der Farbestoff ausser der Welle, aber doch auch nicht ganz farblos. Der Rand der mehr durchsichtigen Welle des Zinkpoles ist röther, als der Rand der Welle des Kupferpoles, der jedoch ebenfalls durch seine stärkere Färbung auffällt; im Rande der Welle des Kupferpoles ist der Farbestoff concentrirt aufgelöst; im Rande der Welle des Zinkpoles besteht der Farbestoff aus sehr kleinen Kügelchen. Nach meiner Ansicht hat dieser Versuch grosse Aehnlichkeit im Erfolge mit dem, wenn man Eidotterauflösung der Einwirkung der Volta'schen Säule aussetzt. Wendet man bei der Farbestoffauflösung blosse Kupferdrähte zum Schliessen der Kette an, so gerinnt Farbestoff und Eiweiss am Zinkpole. Setzt man etwas Kochsalz zu Eidotterauflösung, so gerinnt das Eiweiss am Zinkpole. Vermischt man Farbestoffauflösung mit etwas Kochsalz, so verhält sie sich selbst am Platindrahte gleich der mit Kochsalz versetzten Eidotterauflösung, es entstehen keine Wellen, und es bildet sich ein weissliches Gerinnsel am Zinkpole. Nach allem diesem halte ich Dutrochet's Behauptung, dass der Farbestoff des Blutes elektropositiv sey, für unerwiesen.

Dutrochet, welcher die Kerne der Blutkörperchen für dasjenige hielt, was den Faserstoff des Blutkuchens ausmache, löste

Digitized by Google

von Farbestoff ausgewaschenes Coagulum oder farblose Fibrine in schwach alkalinischem Wasser auf. Eine solche Auflösung wurde der Volta'schen Säule ausgesetzt. Am negativen Pole entwickelte sich in Menge Wasserstoffgas, am positiven Sauerstoffgas; allein die beiden Wellen waren nicht vorhanden, der aufgelöste Faserstoff häufte sich nur am positiven Drahte oder Zinkpole an; woraus Dutrochet schliesst, dass die alkalinische Lösung von Fibrin sich wie ein Neutralsalz verhalte, dessen Alkali sich nach dem negativen, dessen Säure sich nach dem positiven Pole begiebt, und dass Fibrin negativ elektrisch sey. Nun weiss man aber, dass der Faserstoff sich zu den Alkalien und Säuren so verhält, dass er bald die Rolle einer Basis, bald die einer Säure spielen kann. Aus seinem Verhalten zu Säuren hätte man ganz das Gegentheil von Dutrochet's Behauptung schliessen können, indem er ja mit den Mineralsäuren neutrale Körper bilden kann. Indessen war es nöthig, Dutrochet's Versuche selbst zu wiederholen. Ich fand sie, wie sich bei einem so genauen Beobachter voraussehen liess, in den meisten Punkten bestätigt. Ich erhielt jedesmal, wenn ich eine Auflösung von Faserstoff des Blutes in schwach alkalinischem Wasser auf einer Glasplatte oder in einem Uhrglase der Volta'schen Säule aussetzte, einen geringen Absatz von weissem, breiigem Coagulum am Zinkpole. Da ich nun den Faserstoff, von geschlagenem Ochsenblute genommen, lange Zeit auf dem Filtrum ausgewaschen hatte, so konnte ich ziemlich sicher seyn, dass er rein von Serum und von den Salzen des Serums war, und es scheint also die alkalinische Faserstoffauflösung wirklich auf den ersten Blick sich in elektronegativen Faserstoff und elektropositives Alkali zu scheiden. Bei diesem Schlusse ist indessen von den mineralischen Bestandtheilen und Salzen, welche der ausgewaschene Faserstoff für sich als Bestandtheile enthält, abgesehen, deren Zersetzung durch die Säule auch eine Entwickelung von Säure am Zinkpole bedingen, und dadurch den Faserstoff durch Bildung eines neutralen Körpers gerinnen machen konnte. Indessen lassen sich gegen den Versuch selbst noch gegründetere Einwürfe machen. Der von Dutrochet beschriebene Erfolg findet nur statt, wenn man Kupferdrähte zum Schliessen der Kette braucht, nicht aber, wenn man, um die Oxydation des Endes vom Kupferdrahte des Zinkpoles auszuschliessen, dieses Ende mit einem Stück Platindraht versieht, wie ich bei jedem von mir wiederholten Versuche gefunden habe. Dutrochet scheint seine Versuche bloss mit Kupferdrähten gemacht zu haben. Befindet sich am Zinkpole Platindraht, so bleibt die Entwickelung von Gas dieselbe, am Zinkpole aber sieht man noch mehr Gas in Bläschen als vorher, weil es nun nicht mehr, wie vorher, den Kupferdraht sogleich oxydirt. Aber es bildet sich auch nicht die entfernteste Spur eines Gerinnsels am Zinkpole oder Platindraht. Hieraus muss man schliessen, dass die Bildung von Gerinnsel aus alkalinischer Faserstoffauflösung am Zinkpole beim Kupferdrahte von der Oxydation des Kupferdrahtes abhängig sey.

Genug dass Faserstoffauflösung in alkalinischem Wasser durch die galvanische Säule nicht zersetzt wird, sobald man nicht den

Digitized by Google

sich oxydirenden Kupferdraht am Zinkpole hat, und dass also Faserstoff sich nicht evident als elektronegativer Körper verhält. Wie sehr die Absetzung des Eiweisses und Faserstoffes aus Auflösungen am Zinkpole durch den Salzgehalt der Lösung bestimmt wird, sieht man aus folgendem Umstande: Alkalinische Lösung von Faserstoff setzt niemals am Platindrahte des Zinkpoles eine Spur von Gerinnsel ab, aber diese Gerinnung erfolgt sogleich, wenn man etwas Kochsalz zur Lösung zusetzt, wo dann die Salzsäure des Kochsalzes am Zinkpole das Gerinnsel bildet. Hieraus geht auch hervor, dass, wenn man mit einer Auflösung von Faserstoff in schwach alkalinischem Wasser an der Volta'schen Säule experimentiren will, der Faserstoff vorher von Serum vollkommen rein seyn muss, weil Serum Kochsalz enthält. Man erhält ihn von Serum rein, wenn man ihn von geschlagenem Blute sehr lange mit vielem Wasser auswäscht.

Dutrochet hat den Faserstoff des Blutes, den man aus dem rothen Coagulum erhält, für die Kerne der Blutkörperchen gehalten. Diess ist nicht richtig, da der Faserstoff, wie ich gezeigt habe, im Blute aufgelöst ist.

Da man, nach der von mir angegebenen Methode, Faserstoff des Froschblutes ohne Blutkörperchen erhält, indem er farblos aus frischem Blute durch ein Filtrum von weissem, nicht zu dünnem Filtrirpapiere geht, so schien es mir sehr interessant, das Verhalten des frischen, noch aufgelösten Faserstoffes vor dem Gerinnen gegen die galvanische Säule zu prüfen. Zu diesem Zwecke goss ich gleich viel destillirtes Wasser und Froschblut auf das Filtrum; die durchgehende Flüssigkeit wurde sogleich den Polen der galvanischen Säule ausgesetzt. Am Zinkpol setzte sich breiiges Eiweiss ab, der Faserstoff, wasserklar, sammelte sich weder am Zinkpole noch am Kupferpole, sondern gerann in der Mitte der Flüssigkeit und des Uhrglases als ein isolirtes Klümpchen, gerade so, als wäre die galvanische Säule gar nicht applicirt worden. Die Gerinnung des Faserstoffes erfolgte zur gewöhnlichen Zeit, und die Säule führte diese Gerinnung nicht erst herbei. Der Eiweissniederschlag am Zinkpole war von derselben Art, wie ich ihn beim Galvanisiren der vom Faserstoffklümpchen befreiten Flüssigkeit erhielt.

Ich habe auch die Kerne der Blutkörperchen vom Frosche gegen die Volta'sche Säule geprüft. Man bereitet sich ein Gemenge von Blutkörperchen und Serum, indem man das Gerinnsel umrüttelt und herausnimmt. Das Gemenge von Blutkörperchen und Serum wird in einem grossen Uhrglase mit Wasser versetzt, umgerührt und 24 Stunden stehen gelassen; dann hat sich der Farbestoff aufgelöst, und es sitzt auf dem Boden der weisse Satz von Kernen der Blutkörperchen. Man saugt den grössten Theil der überstehenden Flüssigkeit mit einem Tubulus vorsichtig auf. Mengt man den weissen Satz mit etwas Wasser, und setzt einen grossen Tropfen, auf einer Glasplatte ausgebreitet, der Volta-schen Säule aus, so hat man dieselben Phänomene, wie, wenn man eine wässrige Eidotterauflösung der Säule aussetzt; es entstehen zwei Wellen: die des Zinkpoles ist trübe und treibt Kügel-

Digitized by Google

chen vor sich her, die des Kupferpoles ist durchsichtig und enthält keine Kügelchen. In der Auflösung des Farbestoffes treibt die Welle des Zinkpoles rothe Kügelchen, in dem Gemenge von Wasser und Kernen der Blutkörperchen treibt die Welle des Zinkpoles weisse Körperchen vor sich her. Hier ist kein elektrischer Unterschied zwischen Kern und Schale. Die Welle des Zinkpoles ist bei der Farbestoffauflösung nur durchsichtiger, bei dem Gemenge von Wasser und Kernen der Blutkörperchen, so wie bei der Eidotterauflösung, die auch Kügelchen enthält, trübe. Indem ich nun in den Resultaten meiner Beobachtungen von Dutrochet in mehreren Punkten abweiche, muss ich doch der ingeniösen Art, mit welcher dieser geistreiche Naturforscher ein grosses Problem zu lösen suchte, meine grosse Bewunderung zollen.

Sollte Jemand so glücklich seyn, die Elektricität des Blutes auf eine entscheidende Weise zu ermitteln, so könnte ich der Wissenschaft zu diesem grossen Fortschritte nur Glück wünschen. Ich habe schon erwähnt, dass man mit dem Galvanometer keine elektrischen Ströme in dem Blute entdecken kann, ich erhielt keine Schwankungen der Magnetnadel des Multiplicators, selbst als ich den einen Draht in eine Arterie, den andern in eine Vene des lebenden Thieres einsenkte. Dagegen glaubte Bellingeri ein Mittel gefunden zu haben, die Elektricität des Blutes an den Bewegungen der Froschschenkel zu prüfen, welche entstehen, wenn man Blut und ein Metall mit den Schenkelmuskeln und Nerven und unter einander in Verbindung bringt. Er ging von der Thatsache aus, dass durch Contact zweier verschiedener Körper die vorhandene Elektricität in grössere oder geringere Spannung tritt, und dass diese Spannung um so grösser ist, je weiter beide Körper in der nach ihrem elektrischen Verhalten geordneten Reihe von einander abstehen. Bellingeri ordnete die Metalle folgender Maassen: Zink, Blei, Quecksilber, Antimon, Eisen, Kupfer, Wismuth, Gold, Platina. Nun verglich er das electrische Verhalten des Blutes mit dem der genannten Metalle, wenn Blut mit einem der Metalle in Contact, und Blut und Metall mit Nerven und Froschschenkel in Verbindung gebracht wurde, wobei die Zusammenziehung der Froschschenkel als Elektrometer diente. Nun soll ferner bei Fröschen, die schon etwas von ihrer Reizbarkeit verloren haben, nach ihm, von zwei Metallen, wovon das eine am Nerven, das andere am Muskel angebracht wird, dasjenige sich positiv verhalten, dessen Anbringung am Muskel bei Schliessung der Kette, und dessen Anbringung am Nerven entweder gar nicht, oder nur beim Oeffnen der Kette Zuckung erregt. (Es ist wohl umgekehrt.) So will er nun gefunden haben, dass das Blut gegen verschiedene Metalle sich verschieden verhielt, dass beide Blutarten meist gleich, dass sie in den meisten Fällen wie das Eisen sich verhalten. Diese sogenannte Elektricität des Blutes soll sich lange nach dem Aderlass erhalten (Froriep's *Not.* 408.) Vergl. p. 73.

Es ist unbegreiflich, wie man diesen Versuchen grossen Werth beilegen konnte. Wenn man bei der kältern Jahreszeit (Früh-

Digitized by Google

ling oder Herbst) den Nerven des Froschschenkels in ein Schälchen mit Blut oder Wasser (gleichviel) legt, und die Schenkelmuskeln und die Blutflüssigkeit mit einem Stück Kupferdrath in Verbindung bringt, so erhält man eine Zuckung des Froschschenkels. Hier kann man sich nun überzeugen, dass eine Kette von Kupfer und Wasser zwischen Nerven und Muskel vollkommen gleich gut ist, als eine Kette von Kupfer und Blut. Was hat man nun damit gewonnen, wenn das elektrische Verhalten des Wassers dasselbe ist, als das des Blutes? Dabei kann es wohl seyn, dass nicht einmal das Blut oder Wasser in dieser Kette ein Elektromotor ist, sie können eben so wohl blosse Leiter, und das Kupfer mit den Muskeln die Electromotoren seyn.

IV. Capitel. Von den organischen Eigenschaften und Verhältnissen des Blutes.

a. Belebender Einfluss des Blutes.

Das hellrothe arterielle Blut, dessen Blutkörperchen nach Michaelis kaum etwas weniger Kohlenstoff und kaum etwas mehr Sauerstoff im gebundenen Zustande enthalten, wird auf dem Wege durch die feinsten Gefässe des Körpers wieder dunkelroth oder venös, durch eine noch unbekannte Wechselwirkung mit der organisirten Materie, die die Organe fähig zum Leben, das Blut aber unfähig macht, diesen zum Leben nothwendigen Reiz weiter auszuüben. Nur dadurch, dass das Blut wieder in den Lungen hellroth wird, indem es Sauerstoff aus der Luft aufnimmt, und Kohlensäure ausscheidet, und zwar mehr Sauerstoff aufnimmt, als es Kohlensäure (nach der chemischen Theorie von Kohlenstoff des Blutes und Sauerstoff der Luft gebildet) ausscheidet, erlangt es wieder diese Fähigkeit. Da, wie wir später sehen werden, innerhalb einiger Minuten das Blut den ganzen Körper durchkreiset, so erlangen und verlieren also dieselben Theile des Blutes in einigen Minuten einmal diese belebende Fähigkeit. Nur im hellrothen arteriellen Zustande ist das Blut fähig, das Leben zu unterhalten, die Unterdrückung der Bildung des arteriellen Blutes in den Lungen erstickt, d. h. macht scheintodt und todt, vorzüglich, wie Bichat gezeigt hat, durch Lähmung der Funktionen des Gehirns und Nervensystems. Doch ist diese Nothwendigkeit beim Neugebornen, noch mehr im Winterschlaf und Scheintod und bei den niedern Thieren geringer, scheint selbst bei dem Foetus der Säugethiere ganz zu fehlen. Siehe den Art. vom Athmen. Am meisten sind aber die Kräfte des Nervensystems und des animalischen Lebens vom arteriellen Blut abhängig, diess sieht man an den Erscheinungen der Blausucht, wo durch Fehler in den Kreislaufsorganen (Offenbleiben des beim Foetus vorhandenen ductus arteriosus Botalli zwischen arteria pulmonalis und aorta, Offenbleiben des beim Foetus vorhandenen foramen ovale in der Scheidewand der Vorhöfe) beide Blutarten immer zum Theil gemischt werden. Die Ernährung, die

Digitized by Google

Absonderung leiden hier wenig oder gar nicht, wenn auch das Aussehen der Haut dunkler und bläulich ist; aber die Muskelkraft fehlt, die geringsten Anstrengungen bringen Erstickungszufälle, Ohnmachten und selbst Scheintod hervor, der Geschlechtstrieb bildet sich nicht aus, die Wärme ist geringer. Es ist eine Neigung zu Blutflüssen und selbst zu tödtlichen Blutungen vorhanden. Siehe Nasse über den Einfluss des hellrothen Bluts auf die Entwickelung und die Verrichtungen des menschlichen Körpers aus Beobachtungen blausüchtiger Kranken, Reil's *Archiv. T.* 10. *p.* 213. Dass aber die vegetativen organischen Functionen weniger vom arteriellen Blut abhängen, sieht man auch daraus, dass Absonderungen zuweilen von Organen geschehen, die nicht allein arterielles, sondern noch mehr venöses Blut erhalten. So geschieht die Absonderung der Galle zum Theil vom venösen Blute der Pfortader, die Absonderung des Harns zum grössern Theil bei Amphibien und Fischen aus Venenblut der zuführenden Nierenvenen, welche diese beiden Thierklassen ausser den rückführenden Nierenvenen und den Nierenarterien besitzen.

Unterbindung aller Arterienstämme eines Gliedes hebt das Bewegungsvermögen auf, und erzeugt zuletzt örtlichen Tod. Grosse Blutverluste machen die höheren Thiere sogleich asphyktisch, die kaltblütigen überleben aber lange die Entleerung des grössten Theiles des Blutes, und Frösche leben selbst nach Ausschneidung des Herzens noch viele Stunden lang, und sind aller Bewegung fähig. Aber selbst erschlaffte ausgeschnittene Theile, wie das schon bewegungslose Herz des Frosches in v. Humboldt's Versuchen, scheinen durch Eintauchen in Blut wieder einigermaassen belebt zu werden, und Blut erhält die Flimmerbewegungen der mikroskopischen Wimpern an abgeschnittenen Theilen gewisser Schleimhäute nach Purkinje's und Valentin's Beobachtungen am längsten.

Prevost und Dumas haben gezeigt, dass das Blut seine belebende Wirkung nicht so sehr durch das Blutserum als durch die darin schwebenden rothen Körperchen äussert. Spritzt man in die Gefässe eines bis zur Ohnmacht von Blut entleerten Thieres Wasser oder reines Serum von 30° C., so wird das Thier nicht erweckt. Nimm man dagegen Blut von derselben Art, so wird es durch jeden Stoss merklich wieder belebt und zuletzt hergestellt. Diese Versuche sind von Dieffenbach bestätigt.

Diese Wiederbelebung erfolgt nach Prevost und Dumas, Dieffenbach und Bischoff, (Muell. *Arch.* 1835. 347.) auch dann wenn man den Faserstoff des Blutes durch Schlagen entfernt, und das nicht mehr gerinnende Gemenge von Blutkörperchen und Serum einspritzt. Da, wie ich gezeigt habe, die Blutkörperchen in geschlagenem Blute durchaus unverändert sind, so sollte man, in den wenigen Fällen, wo eine Infusion von Blut in die Adern eines lebenden Wesens gerechtfertigt und wegen Blutleere nöthig ist, lieber geschlagenes, von Faserstoff befreites Blut von der gehörigen Temperatur injiciren. Dieses ist und bleibt vollkommen flüssig. Man vermeidet hierdurch die Hauptbeschwerde der Transfusionen, dass nämlich das Blut während

Digitized by Google

des Uebergangs aus dem einen in den andern Körper allzuleicht gerinnt. Blut von einer andern Art, dessen Körperchen dieselbe Gestalt, aber verschiedene Grösse haben, bewirkt eine unvollkommene Herstellung, und gewöhnlich stirbt das Thier in 6 Tagen. Der Puls wird dann beschleunigt, das Athmen bleibt normal, die Wärme sinkt sehr schnell. Die Excretionen sind schleimig und blutig. Die geistige Thätigkeit scheint nicht abgeändert. Einspritzen von Blut mit Kreiskörperchen in die Gefässe eines Vogels (von elliptischen und grösseren Körperchen) bewirkt heftige und der stärksten Vergiftung ähnliche Nervenzufälle, gewöhnlich den Tod, selbst sehr plötzlich, auch wenn eine geringe Menge eingespritzt wurde. So war z. B. die Wirkung von Schafblut auf Enten. Bischoff's Beobachtungen wichen in dem Punkte ab, dass geschlagenes und dadurch seines Faserstoffs beraubtes Blut ohne alle schädliche Folgen in die Venen eines Vogels eingespritzt werden kann. Auf Frösche wirkt selbst das geschlagene, transfundirte Blut nachtheilig, besonders Menschenblut, weniger das der Säugethiere und Vögel, am wenigsten das der Fische. Der Erfolg der Transfusion des geschlagenen Blutes der drei höhern Thierklassen war hier regelmässig der Tod nach einigen Stunden. Der Kreislauf zeigte sich immer schnell geschwächt. Regelmässige Folgen der Transfusion waren Exsudationen von Serum und selbst von Blutkörperchen, sowohl des eingespritzten Blutes als Blutkörperchen des Frosches. Vergl. die Transfusion des Blutes, von Dieffenbach. Berlin 1828. Eine unvorsichtige Injection von Luft in die Adern und das Blut eines lebenden Thieres tödtet fast auf der Stelle durch Hinderniss des Blutlaufs in den kleinen Gefässen und im Herzen, indess sehr kleine Quantitäten nicht allein von atmosphärischer Luft und Sauerstoffgas, sondern selbst von irrespirabeln Luftarten, wie Stickgas, Stickgasoxydul, Wasserstoffgas, Kohlenwasserstoffgas, Kohlensäuregas, Kohlenoxydgas, in Nysten's Versuchen ohne tödtlichen Erfolg injicirt wurden. Nur Salpetergas, Schwefelwasserstoffgas, Ammoniakgas und Chlorgas waren absolut lethal. Nysten *recherches de physiol. et de chim. pathol. Paris* 1811.

b. Thätigkeitsäusserungen im Blute selbst.

Unstreitig muss das Blut als eine in sich lebendige Flüssigkeit aufgefasst werden, aber es hat bis jetzt nicht gelingen wollen, im Blute einen Akt seines Lebens als sichtbares Phaenomen darzustellen. C. H. Schultz hat von einer sichtbaren lebendigen Wechselwirkung der einzelnen Blutmolecule und der Substanz der Gefässe gesprochen, zufolge welcher die Blutmolecule nicht verharrend bestehen, sondern sich von neuem bilden und untergehen. C. H. Schultz *der Lebensprocess im Blute. Berlin* 1822. In seinen neueren Mittheilungen erklärt sich der Verfasser bestimmter dahin, dass den Blutkörperchen selbst jede Bewegung fehle, dass die flimmernden Bewegungen des Blutes, (welche man an dem, in den Gefässen fliessenden Blute beim Sonnenlicht sieht), den flüssigen Theilen des Blutes angehöre. Diese oscillatorische Bewegung erkenne man noch an den feinsten Saftströmen, wenn

Digitized by Google

sie auch keine Blutkörperchen enthalten. C. H. Schulz *das System der Circulation. Stuttgart.* 1836. *p.* 74. Diese eigenthümlichen Ansichten entfernen sich von derjenigen der übrigen Beobachter wesentlich. Dagegen stimmen die Beobachtungen von Rudolphi, Purkinje, Koch, Meyen und meine eigenen in Hinsicht der Erklärung dessen, was der Verfasser für eine Lebensbewegung des Blutes ansieht, überein. Wenn man bei hellem Tageslichte durchsichtige, vom Blut durchflossene Theile observirt, dagegen die Täuschungen einer flimmernden, aber sehr undeutlichen Beleuchtung von intensivem, durch durchsichtige thierische Theile refrangirtem Sonnenlichte vermeidet, so bemerkt man in den Blutgefässchen niemals die geringste Spur einer selbstständigen Bewegung der einzelnen Blutmolecule, weder eine Attraction und Repulsion der Blutkörperchen, noch der Theilchen der Blutflüssigkeit. Wenn man aber intensives Sonnenlicht durch durchsichtige thierische Theile durchströmen lässt, so hört alle Klarheit des Bildes wegen des Lichtspieles durch so viele wie kleine Linsen wirkende Körnchen des Blutes und die Unebenheiten der Substanz auf; man sieht nicht mehr das Vorbeiströmen der Körnchen, sondern einen allgemeinen Ausdruck flimmernder Bewegung, wobei man oft selbst nicht mehr die Richtung des Stromes unterscheidet. Dieselbe Täuschung hat statt, wenn man eine Flüssigkeit, worin Kügelchen enthalten sind, wie Milch, bei durchscheinendem Sonnenlicht über den Objectträger des Mikroskopes fliessen lässt, oder auch wenn bei diesem Licht klares Wasser über ein matt geschliffenes Glas fliesst. Die körnige Substanz der thierischen Theile ist dem matt geschliffenen Glase zu vergleichen. Vergl. besonders Meyen, *Isis* 1828. 394. und die Recension eines Ungenannten, *Isis* 1824. 3. Noch unstatthafter ist es, die Blutkörperchen als Infusorien zu betrachten, wie Eber und Mayer gethan (Mayer *Supplemente zur Lehre vom Kreislauf. Bonn* 1827.) Ueber die dem Blute mit Unrecht beigelegte Propulsivkraft, sich bei der Circulation zu bewegen, eine Kraft der Bewegung, die noch fortdauern soll, wenn die Kraft des Herzens nicht mehr wirkt, siehe den Artikel *vom Kreislauf. Capillargefässe.* Diese Annahme von Kielmeyer, Treviranus, Carus, Doellinger und Oesterreicher schien am meisten gerechtfertigt durch die Beobachtung Wolff's und Pander's, dass sich das Blut beim Hühnchen in der area vasculosa früher bildet als das Herz schlägt, und dass das Blut von der Peripherie der area vasculosa schon nach dem Herzen ströme, ehe noch das Herz schlägt. Indessen ist der letztere Theil dieses Satzes nicht sicher, und Baer ist zweifelhaft; es scheint ihm sogar, dass zuerst Bewegung im Herzen stattfindet; etwas später die Strömung in dem Raume des durchsichtigen Fruchthofes und zuletzt noch erst ein Hinzuströmen des rothen Blutes aus der area vasculosa. Burdach *Physiol.* 2. 264. Auch Wedemeyer hat sich nicht überzeugen können, dass nicht zuerst vor der Strömung das Herz schlage. Die übrigen Gründe für die Propulsionskraft des Blutes stützen sich auf die Fortdauer der Blutbewegung in abgeschnittenen Theilen. Abgesehen davon, dass diese Kraft der Be-

Digitized by Google

wegung in einer Flüssigkeit ohne eine Anziehung oder Abstossung von Seiten eines andern Gegenstandes unbegreiflich ist, habe ich zwar die Thatsachen, die man für jene Annahme anführt, zum Theil bestätigt gefunden, ich konnte aber nicht diese Schlussfolge daraus ziehen. In einem abgeschnittenen Theile sieht man mittelst des Mikroskopes unter zwei Bedingungen noch fortdauernde Bewegungen des Bluts in den feinsten Uebergängen der Arterien in Venen: 1) so lange das Blut noch aus den durchschnittenen Gefässstämmen ausfliesst, was auf den Zustand des Blutes in den Haargefässen wirken muss. So sieht man nach meinen Beobachtungen noch langsame Bewegungen, und zwar von den feinen Gefässen nach den grössern (also nach den Oeffnungen der durchschnittenen Gefässstämme) bis 10 Minuten nach Abschneiden eines Fusses beim Frosch. Diese Bewegungen entstehen nach meiner Ansicht bloss durch das Ausfliessen des Blutes, während die Gefässe durch die Elasticität einen engern Durchmesser annehmen, als sie vorher im Zustande gewaltsamer Ausdehnung hatten. Man sieht dies Engerwerden auch unter dem Mikroskop. Wird die Durchschnittsfläche, woraus das Blut abfliesst, mit dem Schenkel in die Höhe gehalten, so hört das Ausfliessen des Blutes früher auf, und schon nach 5 — 6 Minuten hört alle Spur der Bewegung in den Capillargefässen auf. Wedemeyer's Beobachtungen stimmen mit den meinigen sehr überein, nur dass er die Zeit nicht angiebt. Er sagt: Gleich nach dem Ausschneiden des Herzens strömt alles Blut in fast ununterbrochenem Zuge aus Arterien, Venen und Haargefässen nach der Wunde hin, indem die Elasticität der weichen Theile das Blut aus den kleinen Gefässen nach der kaum mehr Widerstand leistenden Wunde der grossen Gefässe hindrückt. *Ueber den Kreislauf des Blutes. Hannover* 1828. *p.* 233. 2) Wenn man auf einen feuchten abgeschnittenen Theil das intensive Sonnenlicht wirken lässt. Unter dem letzten Umstande trocknet und runzelt die Oberfläche des feuchten Theils sichtbar schnell. Dies bewirkt eine schnellere Entleerung der Capillargefässe, was beim Durchscheinen des intensiven Sonnenlichtes den schon berührten flimmernden Schein gewährt. Man wird daher, wie ich an einem abgeschnittenen Fledermausflügel, noch viele Stunden lang stellenweise, aber nur da eine Spur von flimmernder Bewegung des Bluts in den feinsten Gefässen bemerken, wo man gerade das intensive Sonnenlicht augenblicklich durchscheinen lässt. Bei nacktem Auge sieht man das ausserordentlich schnelle Runzeln der Oberfläche. Befeuchtet man die einschrumpfende Stelle wieder, so hört das Zusammenschrumpfen und damit auch die flimmernde Bewegung im Innern der Gefässe auf einige Augenblicke auf, beginnt aber sogleich wieder mit der zunehmenden Verdünstung und Austrocknung. Selbst nach $1\frac{1}{2}$ Tagen konnte ich an dem so befeuchteten Flügel noch ein Flimmern im Innern bei intensivem Sonnenlichte sehen. Nach Baumgaertner (*Beobachtungen über die Nerven u. d. Blut. Freiburg* 1830.) dauerte beim Frosch die Bewegung des Blutes nach Unterbindung einer Arterie 3—5 Minuten, eine Bewegung, die der treffliche Baumgaertner von

Digitized by Google

Wechselwirkung der Nerven und des Blutes, nicht von der Elasticität der vorher ausgedehnten Arterien ableitet. Schon Anastomosen können solche Erscheinungen bewirken. Leider beweisen die sinnreichen von Baumgaertner angestellten Beobachtungen nicht evident dasjenige, was sie sollen. Ich habe übrigens beobachtet, dass der Blutlauf in den feinsten Gefässen nach Compression einer Arterie meist schnell aufhört. Gerade dann müsste man die eigene Bewegung der Blutkörperchen sehen, wenn sie wirklich existirte. Mortificirte ich das Herz eines Frosches durch Liq. kali caust., so konnte ich unter dem Mikroskop noch einige Zeit Bewegung in den feinsten Gefässen sehen, wahrscheinlich von der Zusammendrückung des Blutes in den Arterien durch ihre elastische, früher stark ausgedehnte Haut. Das Blut blieb einmal über eine Stunde flüssig in den feinsten Gefässen, und bewegte sich von Zeit zu Zeit bald vorwärts, dann wieder rückwärts, dann stand es still, dann bewegte es sich wieder, wahrscheinlich je nach der Zusammendrückung der Gefässe durch gelinde Bewegungen des Frosches oder einzelner Muskelpartien des Beines. Ich läugne daher die eigenthümliche Propulsionskraft, und nehme nur die, den Kreislauf nicht nothwendig erleichternde, lebendige Wechselwirkung und Anziehung zwischen Substanz und Blut an, wodurch unter sonst gleichen Umständen ein mehr belebter Theil mehr Blut aufnimmt, als sonst und als andere Theile und gewisse Theile selbst sich aufrichten, eine Wirkung, welche man nicht aus der Zusammenziehung der zuführenden Gefässe jener Theile erklären kann, da 1) diese Art von Contractilität der Gefässe, wie in der Lehre vom Kreislauf bewiesen wird, nicht existirt, und 2) keine dauernde Anfüllung dieser Theile hervorbringen könnte. Selbstständige Bewegungen des Saftes ohne Herz, wie bei den Pflanzen, kennt man bis jetzt auch von niederen Thieren nicht mit Sicherheit. Nordmann hat sich über einen von ihm beobachteten Saftumlauf in der Hülse von Alcyonella diaphana, den er der Saftbewegung in den Internodien der Charen vergleicht, nicht weiter erklärt. Carus entdeckte an Echinus edulis in demjenigen zarthäutigen Wasserröhrengewebe, das den Saum zwischen den äusserst feinen Löcherchen der Fühlergänge (ambulacra) immer begleitet, selbst wenn die Theile dieses Gewebes abgeschnitten sind, eine Cirkelbewegung von Kügelchen. *Mikrograph. Beiträge* 2 *H. Berlin* 1832. 75. Vergl. Treviranus *Erscheinungen und Gesetze des organ. Lebens.* 1. 234. Diese so wie die von Nordmann an Diplozoon und von Ehrenberg an Distomen beobachtete Saftbewegung in Gefässen, die ihren Durchmesser nicht ändern und sich nicht zusammenziehen, sind in neuerer Zeit in Hinsicht ihrer Ursachen aufgeklärt worden und können nicht mehr für eine selbstständige Bewegung der Säfte in den Thieren angeführt werden. Sie rühren von schwingenden Wimpern her. Ehrenberg hat schwingende Falten in den Gefässen der Entozoen und Turbellarien, Siebold schwingende Wimpern in den Gefässen des Diplozoon erkannt. Muell. *Arch.* 1836. *Jahresbericht CXXXVI.*

Treviranus, Mayer und Andere haben die mehrere Secun-

Digitized by Google

den dauernde Durcheinanderbewegung der Blutkörperchen in einem Tropfen Blutes, der unter das Mikroskop gebracht wird, für automatische Bewegung angesehen. Man kann diese momentanen wirbelnden Bewegungen indess, wie ich öfter beobachtet, und was entscheidend ist, auch in Tropfen längst aus dem Körper entlassenen Blutes sehen. Wenn man z. B. sich von gerütteltem Froschblut ein Gemenge von Blutkörperchen und Serum bereitet und das Gerinnsel entfernt, und dann nach 12 — 24 Stunden einen Tropfen davon unter das Mikroskop bringt, so sieht man dieselbe Vertheilung, dasselbe Strömen der Blutkörperchen, wie im frischen Blute. Diese Bewegung kann daher nicht lebendig seyn. An Blut von warmblütigen Thieren haben solche Beobachtungen ohnehin keine Beweiskraft, wegen der Bewegung, die von der Verdunstung herrühren kann. Vielleicht hat die kleine Formveränderung welche jeder Tropfen Flüssigkeit, den man auf einer Glasplatte ausbreitet, an den Rändern, zuweilen schnell, erleidet, an jenen Bewegungen grossen Antheil. Dass die Blutkörperchen endlich in der Nähe wimpernder Häute, der Geschlechtsorgane, Athemwerkzeuge u. a. wie alle feinen Körperchen in Bewegung gerathen, darf nicht auffallen.

Heidmann (Reil's *Archiv.* 6. 425.) hat Zusammenziehungen und Dilatationen im Blute beim Gerinnen beschrieben, ich habe sie nicht sehen können, so gewiss der geronnene Faserstoff sich unmerklich auf ein viel kleineres Volumen zusammenzieht. Dass aber die von Tourdes und Circaud beobachtete Zusammenziehung des geronnenen Faserstoffs durch Galvanismus nicht existirt, hat Heidmann selbst bewiesen, und ich habe nicht dergleichen gesehen, als ich in den p. 144 angeführten Versuchen den durchs Filtrum gehenden aufgelösten Faserstoff des Froschblutes galvanisirte und gerinnen liess.

Die Frage, ob das Blut eine lebendige oder nicht lebendige Flüssigkeit sey, erinnert an einen kritischen Zustand unserer Wissenschaft. Alles, was im Organismus auf eine von den unorganischen Gesetzen verschiedene Art Wirkungen zeigt, hat eine organische, oder, was dasselbe ist, lebendige Thätigkeit. Bloss die festen Theile als lebend betrachten zu wollen, ist unangemessen; denn feste organische Theile im strengen Sinne giebt es nicht, fast alle enthalten bis $\frac{4}{5}$ ihres Gewichtes Wasser, und eine bestimmte Grenze giebt es hier nicht. Betrachtet man nun die organische Materie überhaupt als lebensfähig, die organisirten Theile als belebt, so ist doch die Wirkung des Bluts schon aus physikalischen und chemischen Gründen nicht zu begreifen. Der Samen ist nicht bloss Reiz für die Befruchtung des Eies, sondern da er die Eier der nackten Amphibien und Fische ausser dem Körper befruchtet, da das neue Individuum eben sowohl die Fähigkeiten, Aehnlichkeit, ja selbst Krankheitsanlagen des Vaters hat, so ist der Samen offenbar, obgleich eine Flüssigkeit, eine lebende und belebende. Der keimfähige Theil des Eies, die Keimscheibe, ist eine ganz unorganisirte Aggregation von Thierstoff, und dennoch von der ganzen organisirenden Kraft belebt und belebend, obgleich weich und der Flüssigkeit noch verwandt.

Digitized by Google

Auch das Blut zeigt organische Eigenschaften, es wird von dem belebten und gereizten Theil angezogen, es besteht eine lebendige Wechselwirkung zwischen dem Blut und den organisirten Theilen, an der das Blut eben so gut Antheil hat als die Organe selbst. Der bei der Entzündung ausschwitzende Faserstoff des Blutes ist anfangs flüssig, und bildet, indem er erhärtet, Pseudomembranen; aber dieses Exsudat wird durch blosse Wechselwirkung mit dem exsudirenden Organe auch organisirt und von Blut und Gefässen durchdrungen. Das Blut hat daher selbst schon Lebenseigenschaften, und dasselbe gilt von allen thierischen Säften, welche nichts Zersetztes, wie Urin, Kohlensäure, ausführen. Der Speichel, die Galle wirken assimilirend auf die Nahrungsstoffe, die Organe assimilirend auf das Blut, und hier giebt es keine scharfe Grenze zwischen lebensfähigen und belebten Stoffen. Diejenigen aber, welche am wenigsten belebt sind, bleiben, so lange sie nicht zersetzt sind, lebensfähig.

c. Entstehung des Blutes.

Die Materialien zur Bildung des Blutes sind bei dem Erwachsenen die Contenta der Lymphgefässe, die klare Lymphe und der weissliche Chylus, wovon die erstere Nahrungsstoffe aus dem Innern der organisirten Theile, der letztere die im Darmkanal durch die Lymphgefässe ausgezogenen Nahrungsstoffe, in den ductus thoracicus und so fort ins Blut führen. Die Lymphe und der Chylus enthalten aufgelöstes Eiweiss und aufgelösten Faserstoff, weniger als das Blut. Durch diese in der Lymphe aufgelösten Stoffe gleicht die Lymphe ganz der klaren Blutflüssigkeit, liquor sanguinis, aus welcher das Blut besteht, wenn man von den rothen Körperchen absieht. Dieser klare liquor sanguinis enthält auch, wie ich gezeigt habe, den Faserstoff vor dem Gerinnen aufgelöst. Mit vollem Rechte kann man daher den farblosen liquor sanguinis gleichsam die Lymphe des Blutes nennen, und man kann behaupten, dass Lymphe Blut ohne rothe Körperchen, das Blut Lymphe mit rothen Körperchen ist. Das Eiweiss des Blutes hat seine Entstehung in der Verdauung, von da es in die lymphatischen Gefässe übergeht. Die verdauten Nahrungsstoffe enthalten im Darmkanal aufgelöstes Eiweiss, keinen gerinnbaren Faserstoff; dieser bildet sich erst in den Lymphgefässen und gelangt so ins Blut. Merkwürdig ist die von mir beobachtete, fast constante Thatsache, dass bei länger aufbewahrten, also hungernden Fröschen das Blut häufig nicht mehr gerinnt, so wie auch ihre Lymphe, die sonst gleich dem Blute schnell gerinnt, dann nicht mehr coagulirt. Im Winter gerinnt gleichwohl das Blut der Frösche oft, wenn auch nicht so vollständig, gleich wie in allen Fällen, wenn ihr Blut nicht ganz gerinnt, auch ihre Lymphe nicht so fest coagulirt. Diess finde ich so bei mehreren der ausgegrabenen, sonst ganz muntern Frösche. Der Chylus ist weniger deutlich alkalisch als das Blut. Lymphe und Chylus enthalten weniger feste Theile als das Blut und namentlich weniger Faserstoff. 100 Theile Chylus enthalten nach Tiedemann und

Digitized by Google

Gmelin 0,17 — 1,75 trocknen Faserstoff. In dem Chylus ist freies Fett vorhanden, das im Blute inniger gebunden zu werden scheint, auch ist das Eisen im Chylus weniger gebunden als im Blute, und lässt sich nach Emmert nach Behandlung des Chylus mit Salpetersäure durch Galläpfeltinctur darstellen. Die Lymphe und der Chylus enthalten jedoch auch eine eigene Art sparsamer Körnchen. Die äusserst sparsamen Körnchen der gerinnbaren Froschlymphe, die man z. B. unter der Haut des Oberschenkels beim Frosche antrifft, sind ungefähr viermal kleiner als die elliptischen Blutkörperchen des Frosches, so gross als die elliptischen Kerne der Blutkörperchen des Frosches; sie sind indess nicht elliptisch, und noch weniger ganz länglich, wie die Kerne der Blutkörperchen des Salamanders, sondern rund; sonst könnte man vermuthen, dass sie die Kerne der Blutkörperchen würden. Die Kügelchen des Chylus der höheren Thiere sind rund und nicht platt, wie die Blutkörperchen. Von den Blutkörperchen unterscheiden sich die Chyluskorperchen auch, dass sie im Wasser unauflöslich sind, während sich die Schale der Blutkörperchen im Wasser auflöst. Von den im Wasser unauflöslichen Kernen der Blutkörperchen unterscheiden sie sich wieder durch ihre Grösse. Prevost und Dumas fanden die Chyluskügelchen $\frac{1}{1999}$ P. Z., was mehr als halb so viel beträgt, als die Blutkörperchen des Menschen. Ich habe die Chyluskügelchen jedesmal auf derselben Glasplatte mit den Blutkörperchen desselben Thieres untersucht, und fand ihre Grösse bald gleich der der Blutkörperchen, wie bei der Katze, bald und zwar meist etwas kleiner, wie beim Kalbe, bei der Ziege, beim Hunde, bei welchem letztern ich sie von sehr verschiedener Grösse, die meisten sehr klein und alle kleiner als die Blutkörperchen fand. Beim Kaninchen fand ich sogar die Chyluskügelchen zum Theil grösser als die Blutkörperchen; die meisten waren sehr klein, $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ so gross als die Blutkörperchen, und einige waren offenbar grösser, wenigstens noch einmal so gross. Vergl. R. Wagner, Hecker's *Annalen* 28 *Bd.* C. H. Schultz *System der Circulation* 37.

Nach Autenrieth soll der ins Blut ergossene Chylus in 10 bis 12 Stunden in Blut umgewandelt werden, weil man innerhalb dieser Zeit noch häufig das Serum milchweiss sehe. Vielleicht geschieht indess diese Umwandlung noch langsamer; denn ich habe schon bemerkt, dass, wenn man in Blut mit etwas unterkohlensaurem Kali die Gerinnung verlangsamt, beim Sinken der Blutkörperchen die überstehende Flüssigkeit häufig etwas trübe und weisslich ist.

Wo das in der Lymphe und dem Chylus fehlende Blutroth, wovon man bloss in dem Chylus des Ductus thoracicus zuweilen eine Spur findet, oder wo die Schale der Blutkörperchen entstehe, ist ganz unbekannt, wenn auch das Athmen dabei eine Rolle zu spielen scheint. Hewson's Hypothese, dass das Blutroth sich in der Milz und in der zuweilen etwas schmutzigröthlichen Milzlymphe bilde, hat keinen Grund; die Milz kann ohne beschwerliche Folgen bei Thieren exstirpirt werden.

Es ist völlig unmöglich, sich davon einen Begriff zu machen,

Digitized by Google

was die eigenthümliche platte Form, die plattrunde Form dieser Körperchen bei den Säugethieren, die plattovale Form bei den übrigen Wirbelthieren bedingt. Im ganzen Körper giebt es keine ähnlichen Elementarformen. In dem bebrüteten Ei ist das einzige Material zur ersten Blutbildung die Substanz des Keimes oder der Keimhaut selbst, die sich wieder aus der Eiflüssigkeit oder der Dottersubstanz vergrössert. In der Keimhaut erzeugt sich das Blut zuerst, wie man genau beobachten kann, ehe die Gefässe, ehe die Drüsen gebildet sind, welche bei dem Erwachsenen Einfluss auf die Blutbildung haben. Die aus der vergrösserten Keimscheibe entstandene Keimhaut zeigt bald eine obere dünnere Schichte (seröses Blatt), und eine untere dickere Schichte (Schleimblatt). Auch bildet sich um die in der Mitte der Keimhaut sich zeigende Spur des Embryo ein durchsichtiger Hof, *area pellucida*, während der äussere Theil der Keimhaut undurchsichtig bleibt, und dieser undurchsichtige Theil der Keimhaut wird bald wieder durch eine Abgrenzung in ein äusseres und inneres ringförmiges Feld abgetheilt, beim Vogel in der 16. — 20. Stunde (v. Baer). Diese Abgrenzung schliesst zunächst den einen Theil des undurchsichtigen Stückes der Keimhaut ein, welches den innersten oder durchsichtigen Hof der Keimhaut umgiebt, und *area vasculosa* genannt wird, weil sich innerhalb dieses Hofes das Blut und die Gefässe bilden. So weit die Area vasculosa reicht, zeigt sich zwischen den beiden Blättern der Keimhaut eine körnige Lage, welche sich bald in körnige dichte Inseln und durchsichtige Zwischenräume zertheilt, in denen sich zuerst eine gelbliche, hernach rothe Flüssigkeit ansammelt, das Blut (zuerst in der Peripherie der Area vasculosa deutlich). Die Blutkörperchen des Vogelembryo sind nach Prevost und Dumas von der Blutbildung in der Keimhaut an in den ersten Tagen rund, erst am sechsten Tage fangen sie an elliptisch zu werden, am neunten Tage sind sie alle elliptisch. Froriep's *Not.* 175. Aehnliches haben Hewson, Schmidt und Doellinger beobachtet. Schmidt *über die Blutkörner, Würzb.* 1822. Eben so Baumgaertner (*über die Nerven und das Blut. Freiburg* 1830.) bei Amphibien und Fischen, E. H. Weber (*Anatomie* 4. 478) bei Froschlarven. Nach Baumgaertner entstehen die Blutkörperchen folgendermaassen: Die Blutkörperchen sind zuerst runde, nicht platte Kugeln, aus einer Menge kleiner Kügelchen zusammengesetzt, die den Dotterkügelchen gleichen; indem sie allmählig durchsichtig geworden, verschwindet dieses körnige Wesen, worauf der durchsichtige Ring sich ausbildet und der Kern entsteht. Allmählig entsteht die elliptische Form. Auch Weber sah die Blutkörperchen der jüngsten Froschlarven auch aus mehreren kleineren Körnchen zusammengesetzt. Diese Körnchen sollen sich nach Baumgaertner aus Dottersubstanz bilden. Nach Doellinger (*Denkschr. der Akad. zu München.* 7. 169,) und Baumgaertner sollen sich auch bei jungen Thieren, und also auch wohl bei erwachsenen, Blutkörperchen bilden, indem Partikeln der Organe sich ablösen, und mit den nächsten Blutströmchen in Wechselwirkung treten. Es ist offenbar, dass das Blut aus der Substanz der die Dotterflüssigkeit aufnehmenden Keim-

Digitized by Google

haut selbst entsteht, und dass es keiner besondern Organe zu dieser Umwandlung bedarf, da noch keine Organe wie der Darmkanal, die Leber, die Milz, die Lungen u. s. w. existiren. Diese Thatsache belehrt uns, dass wir den Vorgang der Blutbildung und Formation der rothen Körperchen (aus den Chyluskügelchen?) nicht allzusehr in besonderen Organen des Erwachsenen suchen müssen, und es ist sehr wahrscheinlich, das unter dem Einfluss der allgemeinen Lebensbedingungen, wie sie beim bebrüteten Ei stattfinden, auch beim Erwachsenen aus dem Chylus Blut wird. Einen wesentlichen Antheil scheint dabei das Athmen zu haben, insofern auch beim bebrüteten Ei der Einfluss der atmosphärischen Luft und bei den Wasserthieren des lufthaltigen Wassers durchaus zur Entwickelung nöthig scheint, und die Luft die beim Athmen gewöhnliche Veränderung erleidet, mag nun der Sauerstoff der atmosphärischen Luft in das Blut treten und Kohlensäure aus dem Blut entfernt werden, oder der Sauerstoff der Luft mit Kohlenstoff des Blutes zu der ausgeschiedenen Kohlensäure sich verbinden. Eine wichtige Beobachtung von Baer (*de ovi mammalium genesi*) könnte es sogar wahrscheinlich machen, dass zur ersten Entstehung des Blutes in der Keimhaut bei den Säugethieren nicht einmal jene Luftveränderung nöthig ist. Denn Baer hat das Ei der Hunde zu einer Zeit beobachtet, wo die area vasculosa der Keimhaut schon Blut und Gefässe enthielt, aber das Ei noch ganz frei und ohne die Verbindung mit dem Uterus, durch welche das Athmen ersetzt werden könnte, in demselben enthalten war, wobei Burdach vermuthet, dass der den Muttermund geschwängerter Säugethiere schliessende Schleimpfropf doch atmosphärische Luft zum Ei treten lasse. In diesem Zustand ohne Gefässverbindung mit dem Uterus bleibt das Ei der Beutelthiere sogar, siehe Owen *Philos. transact* 1834. *p.* 2. Beim Foetus der Säugethiere giebt es aber auch später noch keinen deutlichen Unterschied zwischen arteriösem und venösem Blute, und das Athmen wird durch einen unbekannten Process anderer Art in der Verbindung des Eies mit dem Uterus unnöthig. Wenigstens ist es mir aus neueren Beobachtungen immer unwahrscheinlicher geworden, dass irgend ein merklicher Unterschied der Farbe zwischen dem Nabelarterienblut und dem aus der Placenta zurückkehrenden Nabelvenenblut existirt. Siehe 2. *Buch.* 1. *Abschn.* 3. *Cap.* Vielleicht ist das Athmen zur Bildung von Blutroth nicht mehr unmittelbar nöthig, wie zum Leben überhaupt. Dagegen spricht freilich die Erfahrung, dass das Chyluscoagulum sich in seltenen (von mir noch nicht beobachteten) Fällen an der Luft etwas röthet. Die Beobachtung, dass der Pferdechylus (selten der Chylus anderer Thiere, wenn er rein gewonnen ist), im ductus thoracicus etwas röthlich ist, kann man vor der Hand noch nicht wohl benutzen zur Entscheidung, ob vielleicht schon in dem lymphatischen System die Bildung des Blutroths beginne, da gar leicht aus dem Venenstamme einige Blutkörperchen in den ductus thoracicus treten und mit dem Chylus sich vermengen können. Goeze's Beobachtung, welche Treviranus anführt, dass das Blut

Digitized by Google

der erstarrten Frösche im Winter weisslich sey, habe ich niemals an aus der Erde gegrabenen Fröschen bestätigt gefunden, obgleich ich fortwährend in der Winterzeit, wenn die Witterung das Ausgraben zuliess, ausgegrabene Frösche, freilich nicht erstarrt, erhielt.

Dass das Blut durch das Athmen eine zur Unterhaltung des Lebens nothwendige Veränderung erleidet, beweiset der Tod, der jedesmal eintritt, sobald diese Function unterbrochen wird. Die Natur dieses Einflusses lässt sich indess nicht weiter bestimmen; den ganzen Einfluss des Athmens auf die Bildung des Blutes können wir nicht im Einzelnen berechnen, wir haben keine Gelegenheit zu beobachten, ob das Blut ohne alles Athmen seine rothe Farbe und die damit verbundenen Veränderungen nicht annähme, ob sich keine Blutkörperchen bildeten, wir können immer nur einen ausserordentlich kleinen Bruch dieses Antheils beim Durchgange des Blutes durch die Lungen beobachten, wo das Blut, nachdem es in den Capillargefässen des Athemorganes dem Einflusse der atmosphärischen Luft oder bei Wasserthieren des lufthaltigen Wassers ausgesetzt ist, seine dunkelrothe Farbe in Hellroth verändert, welches letztere wieder in den Capillargefässen aller übrigen Theile des Körpers in Dunkelroth sich umwandelt. Allein leider kennen wir auch bei dieser Veränderung nur die Farbe, nicht die damit verbundene Umwandlung der Materie, wie sich aus der bei der Lehre vom Athmen folgenden Vergleichung des arteriösen und venösen Blutes ergeben wird.

Eben so wenig lassen die Untersuchungen über die Veränderung der Luft, worin geathmet wird, einen sichern Schluss zu, ob die, gegen das in der Luft verschwindende Sauerstoffgas ausgeathmete Kohlensäure durch Verbindung von Kohlenstoff des Blutes mit Sauerstoff der Atmosphäre entstehe (Lavoisier, Laplace), oder ob Sauerstoff an das Blut übergehe, und die etwa schon im Blute praeexistirende Kohlensäure ausgeathmet werde, welche in den Wegen der Circulation sich bildete (Hassenfratz und Lagrange). Aus den Verdauungsorganen kann sie unmöglich kommen, da Kohlensäure auch bei lange hungernden Thieren ausgeathmet wird. Der weitere Verfolg dieser Untersuchungen wird in der Lehre vom Athmen gegeben. Hier kann das Resultat derselben vorausgeschickt werden, dass sich die Veränderungen der Luft durch das Athmen nach den qualitativen Verhältnissen eben so gut erklären lassen, wenn man eine Bildung von Kohlensäure der ausgeathmeten Luft durch den eingeathmeten Sauerstoff der Atmosphäre und den Kohlenstoff des Blutes annimmt, als wenn man annimmt, dass der Sauerstoff ins Blut übergehe und im Blute überall oder vorzüglich in den Capillargefässen des Körpers mit dem Kohlenstoff des Blutes Kohlensäure bilde, die aus dem Blute ausgeathmet werde, wenn Sauerstoff an die Stelle tritt. Da indess bei allen Thieren und am meisten bei den Fischen mehr Sauerstoff aus der Luft oder aus dem lufthaltigen Wasser beim Athmen verschwindet, als auf die ausgeathmete Kohlensäure verwandt wird, so ist die Aufnahme eines Theils des aus der Luft beim Athmen entschwundenen Sauer-

Digitized by Google

stoffs in das Blut sehr wahrscheinlich, mag nun die eine oder die andere Theorie statthaft seyn. Der ins Blut übergehende Sauerstoff, welcher es hellroth macht, scheint in demselben gebunden zu werden, weil er sich nach neueren Versuchen nicht daraus entwickeln lässt. Der Stickstoffgehalt der Atmosphäre wird durch das Athmen nicht wesentlich verändert. Der Sauerstoff und die Befreiung des Blutes von einem Theil von Kohlenstoff sind daher die Ursache, welche das arterielle Blut zu dem alleinigen Reiz der belebten Organe machen. Venöses Blut, welches diese Veränderung nicht erleidet, wirkt auf die belebten Organe und besonders das Nervensystem tödtlich ein und nimmt ihre Erregbarkeit, gleich wie Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Kohlenwasserstoffgas und andere Gasarten, welche die Erregbarkeit der Organe aufheben und meist das hellrothe Blut dunkel machen. Cuvier (*Vergl. Anat.* 4. *p.* 147.) nimmt zugleich an, dass die arterielle Beschaffenheit im Blute schon auf dem Wege durch den Körper bis zu den Capillargefässen durch materielle Umwandlung abnehme, und erklärt daraus die geringere Vitalität der vom Herzen entfernteren Theile. Wir befinden uns hier wieder in einer völligen Ungewissheit, ob das venöse dunkelrothe Blut deswegen unfähig ist das Leben zu erhalten, weil es etwas nicht hat, was das arterielle hat, oder weil es eine bei der Wechselwirkung des arteriellen Blutes mit den Organen entstandene schädliche Combination der Elemente erlitten, die bei dem Athmen und durch Ausscheiden der Kohlensäure wieder hergestellt wird. Es bleibt immer sehr merkwürdig, dass das venöse Blut des Embryo der Säugethiere, obgleich er nicht im eigentlichen Sinne athmet, diesen schädlichen, gleichsam erstickenden Einfluss auf das Leben nicht hat, mag es nun seyn, dass diese schädliche Beschaffenheit des venösen Blutes, wegen des Mangels des Athmens und des Mangels der Wechselwirkung wahrhaft arteriellen Bluts mit den Organen, noch nicht sich bilden kann, oder weil das Athmen durch die Verbindung des Embryo mit der Mutter ersetzt wird.

Da das Blut durch das Athmen beständig Kohlenstoff verliert, so scheint hiedurch die relative Menge des Stickstoffs im Körper zuzunehmen. Cuvier glaubt, dass hiedurch die Animalisation der thierischen Stoffe zunehme, weil der Charakter der Thierheit der Azotgehalt der Substanzen ist. Wenn diess richtig wäre, so müssten die Theile eines lebenden Thieres mehr Stickstoff enthalten, als das Fleisch der Thiere, von dem sich ein anderes Thier nährt, was ein Widerspruch ist. Bei den Fleischfressern wäre das Athmen in dieser Hinsicht kein Vortheil, und die Pflanzenfresser müssten mehr Athmungsbedürfniss haben als die Fleischfresser, weil ihre Nahrungsstoffe weniger Stickstoff enthalten. Allein die bei dem Athmen durch Ausscheidung von Kohlenstoff relativ steigende Menge des Stickstoffs im thierischen Körper bleibt überhaupt nicht, denn beständig wird in dem Harn mit dem Harnstoff und der Harnsäure, welche mehr Stickstoff enthalten, als irgend ein thierischer Stoff, ein Ueberfluss von Stickstoff aus dem Körper ausgeschieden.

Digitized by Google

Den Einfluss der Milz, Nebennieren, Schilddrüse und Thymusdrüse auf die Blutbereitung kennt man durchaus nicht. Siehe das Nähere im 2. Buch 4. Abschn.

Die Abscheidungen gewisser Stoffe aus dem Blute, welche aus der organischen Oekonomie entfernt werden, haben einen grossen Antheil an der Erhaltung der reinen Mischung des Bluts. Hieher gehört die Ausscheidung überflüssiger oder unbrauchbarer eingeführter Theile, des Wassers (durch Lungen- und Hautausdünstung und Harn) oder der durch die Nahrungsstoffe eingeführten mineralischen Stoffe (meist durch den Harn) und der Stoffe, die einen Ueberfluss von Kohlenstoff, oder Stickstoff, oder Sauerstoff, oder Wasserstoff enthalten, durch die Lunge (Kohlensäure), oder durch die Leber (kohlenstoff- und wasserstoffreiche Verbindungen), oder durch den Harn (stickstoffreiche Verbindungen). Auch die Mischung des Blutes kann durch, im Organismus neu entstandene Zersetzungsprodukte, die das Blut in sich aufnimmt, gestört und die Ausscheidung nothwendig werden, wie es mit gewissen Bestandtheilen des Harns zu seyn scheint. Hienach begreift man, wie die einmal vorhandene Mischung sich erhält. Eine andere Frage ist, ob die Ausscheidung gewisser Stoffe aus den ins Blut geführten Nahrungsstoffen zur ursprünglichen Erzeugung der Blutmischung wesentlich beitrage.

Die Harnsäure des Harns, ein stickstoffreiches Produkt, gehört wohl unzweifelhaft zum Theil wenigstens hieher, da ihre Quantität im Harn schon allein durch stickstoffreiche oder Fleisch-Nahrung vermehrt wird, und da sie im Harn der pflanzenfressenden Säugethiere von Harnbenzoesäure ersetzt wird.

Der Harnstoff wird nach der Entdeckung von Prevost und Dumas nicht erst durch das Organ seiner Abscheidung, die Nieren, gebildet, sondern findet sich schon in dem Blute vor, wenn die Nieren exstirpirt worden sind, so dass diese Materie im gesunden Blute eben darum nicht gefunden wird, weil sie beständig daraus abgeschieden wird. Nach Exstirpation beider Nieren treten die Zufälle am dritten Tage ein, nämlich braune, reichliche und sehr flüssige Stuhlgänge und Erbrechen, Fieber mit erhöhter Temperatur bis 43° Cent., zuweilen Sinken bis 33°; der Puls wird klein, schnell, und steigt bis 200, das Athmen häufig, kurz, zuletzt schwer. Am fünften bis neunten Tage erfolgt der Tod, der in Mayer's Versuchen (Tied. u. Trevir. *Zeitschrift für Physiol.* 2. 2. 278.) schon in 10 — 30 Stunden nach Zittern und Convulsionen erfolgte. Man findet Ergiessung eines hellen Serums in den Hirnhöhlen, die Bronchien voll Schleim, die Leber entzündet, den Darm voll flüssigen, durch die Galle gefärbten Kothes, die Harnblase sehr zusammengezogen. Das Blut der operirten Thiere (Hunde, Katzen, Kaninchen) war wässeriger, und enthielt Harnstoff, der durch Alkohol ausgezogen wurde. 5 Unzen Blut eines Hundes, der 2 Tage ohne Nieren lebte, gaben über 20 Gran Harnstoff, 2 Unzen Katzenblut 10 Gran. *Biblioth. univers.* 18. 208. Meck. *Arch.* 8. 325. Vauquelin und Segalas haben diese Entdeckung bestätigt. Magend. *Journ. d. Physiol.* 2. 354. Meck. *Archiv.* 8. 229. Das Blut wurde getrocknet, der Rückstand ausgewaschen

Digitized by Google

das Wasser abgedunstet, der Rückstand mit Alkohol ausgezogen, und diese neue Auflösung wieder abgedunstet. Hiebei ist jedoch die Vorsicht nöthig, das Wasser in der Kälte und neben Schwefelsäure im leeren Raume verdunsten zu lassen. So erhielten sie aus dem Blut eines Hundes, dem 60 Stunden nach der Operation die Adern geöffnet wurden, $\frac{1}{400}$ Harnstoff. Der Harnstoff und die Harnsäure sind die stickstoffreichsten organischen Stoffe, die man kennt. Der Harnstoff enthält in 100 Thl. 46,65 Stickstoff, 19,97 Kohlenstoff, 6,65 Wasserstoff, 26,63 Sauerstoff. Von der Harnsäure weiss man noch nicht, ob sie schon im Blute vorhanden ist und das Zersetzungsprodukt nur ausgeschieden wird oder erst in den Nieren entsteht, obgleich bei den Gichtanfällen harnsaures Natron aus dem Blute in verschiedene Theile, z. B. in die Nähe der Gelenke, in Gichtknoten, abgelagert wird. Der Harnstoff kann nach Woehler's Entdeckung (wie pag. 3. angeführt wurde) künstlich gebildet werden, und enthält dieselben Bestandtheile, wie cyanichtsaures Ammoniak, oder nach der neuern, auf Woehler's und Liebig's Untersuchungen gegründeten Nomenclatur (Berz. *Jahresb.* 11), wie cyansaures Ammoniak. Die Harnsäure liefert nach Kodweiss bei allen Zersetzungen derselben mit Salpetersäure auch Harnstoff. Berz. *Thierch.* 702.

Da der Harnstoff im Blute selbst schon vorhanden ist, so kann man in Hinsicht seines Verhältnisses zum Blute annehmen: 1. dass er bei der Umwandlung der Nahrungsstoffe in die wesentlichen Bestandtheile des Blutes schon als eine unbrauchbare Combination entstehe, oder 2. dass er erst ein Zersetzungsprodukt der organisirten Theile sey. Das Erstere könnte man daraus schliessen, dass Tiedemann und Gmelin in einem ihrer Versuche mit dem Chylus das dem Osmazom des Chylus beigemischte Kochsalz statt in Würfeln in Octaëdern anschiessen sahen, während das Kochsalz in anderen dieser Fälle würflig war, der Harnstoff aber sonst die Krystallisationsform des Kochsalzes in Octaëder umwandelt. Tiedemann *und* Gmelin *Versuche über die Verdauung.* 2. 91. Allein andere Gründe machen diess unwahrscheinlich. Denn einiger Harn wird auch bei Monate lang hungernden Amphibien gebildet, und Lassaigne hat im Harn eines Verrückten, der 18 Tage hungerte, die Bestandtheile des gesunden Harns gefunden. *J. de chim. méd.* 1. 272. Ferner ist der Harn der pflanzenfressenden Thiere, deren Nahrung doch sehr wenig Stickstoff enthält, nicht arm an stickstoffreichen Bestandtheilen des Harns, wie Harnstoff. Es ist zwar gewiss, dass der Harn beständig Unbrauchbares aus den Nahrungsstoffen ausscheidet, sich nach der Nahrung verändert, z. B. mehr Harnsäure enthält bei Fleischnahrung. Bei mit stickstofffreien Stoffen genährten Vögeln enthalten die Excremente wenig weisse Materie, Harnsäure, viel weniger als bei Fütterung mit Eiweiss. Tiedemann u. Gmelin *die Verdauung.* 2. 233. Bei pflanzen- und fleischfressenden Thieren ist der Harn consequent verschieden (indem der Harn der pflanzenfressenden Säugethiere statt Harnsäure, Harnbenzoesäure enthält und statt sauer alkalisch ist, und der Harn der Vögel saures harnsaures Ammoniak, der Harn der pflanzen-

Digitized by Google

fressenden Vögel aber keinen Harnstoff enthält); aber es ist doch unzweifelhaft, dass gewisse Bestandtheile des Harnes auch von Zersetzung des Blutes oder der organisirten Theile entstehen. Da es also gewiss scheint, dass die Produkte des Harnes nicht allein zur Erzeugung der Mischung des Blutes aus dem Blute ausgeschieden werden, so kann man sich vorstellen, dass Harnstoff entweder durch das Unbrauchbarwerden der Bildungstheilchen des Blutes, oder der Organe entsteht, oder dass bei der zum Leben nothwendigen Wechselwirkung des arteriellen Blutes mit den Organen, entweder gewisse Bestandtheile des Blutes, oder der Organe zu unbrauchbaren Combinationen, d. h. zersetzt werden. Das Letztere wird deswegen unwahrscheinlich, weil der Embryo auch wenigstens Harnsäure bildet, die sich in der Allantois nicht allein der Vögel, sondern auch bei Säugethieren findet, die Säugethierfoetus aber im Uterus der Mutter, dem eigentlichen Sinne des Wortes nach, nicht athmen, wenn das Athmen auch durch die Verbindung mit der Mutter ersetzt ist. Uebrigens fängt die Bildung von Zersetzungsprodukten schon ausserordentlich frühe bei dem Embryo an. Zwar bilden sich die Nieren in dem bebrüteten Vogelei erst gegen den sechsten Tag, und bei dem Embryo der Fische und Salamander nach meinen Untersuchungen erst nach dem Embryonenzustand im Larvenzustand; allein ausserordentlich frühe sind andere Ausscheidungsorgane an der Stelle der Nieren, die von Rathke und mir genau beschriebenen Wolff'schen Körper, bestehend aus hohlen, zu einem Ausführungsgange verbundenen Blinddärmchen, Organe, die sich beim Vogelembryo schon am dritten Tage bilden, nach meinen Beobachtungen vom Vogelembryo später ein wirkliches gelbes, dem Vogelharn ähnliches Sekret aussondern, während die Allantois der Vögel zugleich nach den ersten Tagen der Bebrütung schon Harnsäure enthält, wie Jacobson (Meckel's *Archiv* 8. 332.) entdeckt hat. Diese Organe sind bei dem Embryo aller Wirbelthiere mit Ausnahme der Fische vorhanden, sie verschwinden bald früher, bald später, bei den nackten Amphibien erst mit dem Larvenzustand, bei den Vögeln um die Zeit des Auskriechens und später, bei den Säugethieren sehr früh und bei dem Menschen am aller frühesten: J. Mueller, *Bildungsgeschichte der Genitalien. Düsseldorf* 1830.

Durch die Haut verliert das Blut an Zersetzungsprodukten Milchsäure und milchsaures Ammonium, salzsaures Ammonium, Kohlensäure. Die Milchsäure, die auch im Harne ausgeschieden wird, ist nach Berzelius ein allgemeines Produkt der freiwilligen Zerstörung thierischer Stoffe innerhalb des lebenden Körpers; sie bildet sich in grosser Menge in den Muskeln, wird vom Blute und dessen Alkali gesättigt, und in den Nieren mit saurem Harne abgeschieden.

Die Galle spielt eine wichtige, nicht näher gekannte Rolle in der Umwandlung der Nahrungsstoffe im Darme. Ihre Ergiessung in denjenigen Theil des Darmes, wo die Bildung des Chymus vollendet wird, bei Wirbelthieren und Mollusken beweist, dass sie nicht bloss exkrementiell ist; übrigens wird der quantitativ wichtigste Bestandtheil der Galle, das Pikromel, offenbar auf die Um-

Digitized by Google

wandlung des Chymus verwandt, da es sich unter den Excrementen nicht vorfindet. Aber die Galle enthält gewiss auch excrementielle Stoffe, von welchen das Blut befreit wird, und die wesentliche Theile der Darmexcremente sind, wie das Gallenharz, das Gallenfett und der Farbestoff der Galle, wovon sich wiederum keine Spuren in dem Chylus vorfinden. Das Blut wird daher durch die Leber von einem Ueberschuss von kohlenstoff-wasserstoffigen Bestandtheilen und von Fett befreit, während in den Nieren ein Ueberschuss von überstickstoffreichen Bestandtheilen ausgeschieden wird. Von den excrementiellen Stoffen der Galle ist der Farbestoff derselben stickstoffhaltig. Die Lungen und die Leber können insofern verglichen werden, als beide kohlenstoffhaltige Produkte ausscheiden, erstere jedoch im comburirten Zustande, Kohlensäure, letzte im combustibeln Zustande. Schon ältere Naturforscher, in der neuern Zeit Autenrieth, und besonders Tiedemann und Gmelin haben auf ein gewisses Wechselverhältniss zwischen Lungen und Leber aufmerksam gemacht. Obgleich es sich nicht durchführen lässt, dass die Grösse der Leber im umgekehrten Verhältnisse mit dem Athmungsorgane in der Thierwelt wachse, so sprechen doch pathologische Beobachtungen für eine solche Beziehung.

Die excernirende Thätigkeit der Leber zeigt sich auch unter Umständen, wo nicht verdaut wird. Denn obgleich das Fruchtwasser von dem Foetus in der spätern Zeit verschluckt wird, so ist doch die Leber sehr früh ausgebildet und sondert ab, und die Galle, wenn gleich weniger bitter und gefärbt, enthält nach Lassaigne (*ann. de chim. et de phys.* 17. 304.) eine grüne harzige Materie und einen gelben Farbestoff, aber kein Pikromel. In der That sammelt sich die excrementielle Galle des Foetus mit Darmschleim vermischt im untern Theile des Darmes als sogenanntes Mekonium an. So dauert nach Tiedemann's und Gmelin's Untersuchungen die Absonderung der Galle in dem Darme bei winterschlafenden Thieren fort. Diese Naturforscher führen auch an, dass nach Cuvier's Beobachtung in mehreren Mollusken nur der kleinste Theil der Galle in den obern Theil des Darmes ergossen, und die übrige Galle durch einen besondern Ausführungskanal entweder in den Blinddarm, wie bei Aplysia, oder gar in die Nähe des Afters, wie bei Doris und Tethys, ausgeleert werde. Hier muss ich jedoch bemerken, dass es noch sehr zweifelhaft ist, ob das Secret, welches bei den letztern in die Nähe des Afters ausgeschieden wird, Galle ist, und dass es keineswegs der grösste Theil derselben seyn kann. Nach meinen Untersuchungen an mehreren grossen Doris fand ich den merkwürdigen Ausführungsgang, den Cuvier entdeckt hat. Er scheint aber nicht wie die Gallenkanäle, aus den traubenförmigen Bläschen der Leber, sondern mit vielen Aesten, die zum Theil zwischen den Lappen der Leber verlaufen, aus einem netzförmigen Gewebe, welches sich über die Oberfläche der ganzen Leber ausdehnt, zu entspringen, während ein grosser Stamm aus dem Innern der Leber hinzukömmt. Mir scheinen hier zweierlei Ausscheidungen aus dem Blute, welches sich in die Masse der Leber verbreitet,

Digitized by Google

statt zu finden, während die Apparate der Umwandlung des Blutes in zwei verschiedene Secrete doch vielleicht verschieden sind. Dem Orte der Ausmündung nach hat jener Gang viel Aehnlichkeit mit dem Ausführungsgange des saccus calcareus der Schnecken, aber ihr Ursprung ist freilich sehr verschieden.

Die Häufigkeit der Leberkrankheiten in den heissen Climaten und Jahreszeiten, so wie auch die der Darmkanalaffectionen unter denselben Bedingungen, die Häufigkeit der Leber- und Unterleibsaffectionen bei feuchter und Sumpf-Luft sind noch ein Räthsel. Könnte man sich erklären, wie diese Umstände den Kreislauf erschweren, und Stockungen des Blutes veranlassen, so wäre freilich leicht einzusehen, warum Leber und Darmkanal hiebei am meisten leiden, weil die Circulation in diesen Eingeweiden doppelt erschwert werden muss; indem das Darmvenen- und Pfortaderblut nicht sogleich wieder in den allgemeinen Kreislauf gelangt, sondern erst die Leber zu durchkreisen hat. Vergl. Tiedemann und Gmelin *die Verdauung.* II. Theil. Tiedemann und Gmelin behaupten, dass die vermehrte Gallenabsonderung in tropischen Climaten die verminderte Purification des Blutes in den Lungen compensire, welche Mehrere von der Verdünnung der Luft in Folge der Hitze ableiten. Stevent (*observ. on the healthy and diseased properties of the blood, London* 1832. *p.* 59.) hält diese Annahme für unrichtig. Denn in Westindien, wo die kleinsten Inseln die trockensten und heissesten seyen, wo aber stagnirende Wasser fehlen, seyen die Einwohner frei von Leberkrankheiten oder vermehrter Gallenabsonderung, und diese seyen in heissen Climaten nur bei Sumpfluft herrschend.

II. Abschnitt. Von dem Kreislaufe des Blutes und von dem Blutgefässsystem.

I. Capitel. Von den Formen des Gefässsystems in der Thierwelt.

Die organisch-chemischen Veränderungen des Blutes in einzelnen Theilen, und die Nothwendigkeit dieser Veränderungen des Blutes für alle Theile, machen den Kreislauf des Blutes unentbehrlich. Die Haupttriebfeder dazu ist die rhythmische Bewegung des Herzens. Das Herz ist derjenige Theil des Gefässsystems, welcher durch Muskelsubstanz, die den Blutgefassen sonst fehlt, contractil ist. In der einfachsten Form ist das Herz daher selbst noch gefässartig, wie die gefässartigen mehrfachen Herzen der Anneliden, welche zugleich die Hauptgefässstämme sind, die contractilen Gefässstämme auf dem Darm der Holothurien, das in

Digitized by Google

eine Reihe von communicirenden Kammern getheilte Rückengefäss der Insekten. Wie richtig diese Ansicht ist, sieht man sehr deutlich bei einzelnen Abtheilungen der Krebse, z. B. den Squillen, deren Herz ein contractiles Rückengefäss ist, während dasselbe Herz bei den Dekapoden eine kurze und umschriebene Kammer darstellt.

Bei dem Embryo der höheren Thiere ist das Herz anfangs schlauchartig, und nichts Anderes als eine contractile Umbiegung der Venenstämme in den Arterienstamm. Ja selbst beim Erwachsenen rechtfertigt sich diese Ansicht noch. Das Herz besteht hier bei den höheren Thieren aus einem kurzen doppelten muskulösen Schlauche, aber die contractile Substanz verbreitet sich noch eine Strecke auf die einmündenden Venenstämme, und bei den Fischen und Amphibien sogar noch auf einen Theil des Truncus arteriosus, den sogenannten Bulbus aortae. Dass sich die Stämme der Hohlvenen regelmässig wie das Herz selbst zusammenziehen, kann man beim Frosche unzweifelhaft sehen. Haller, Spallanzani und Wedemeyer haben diess schon gesehen. Haller, *elementa physiol. T.* 1. 125. Die Zusammenziehung erstreckt sich, wie ich sehe, an der untern Hohlvene bis an die Leber, und dauert noch an den Venenstämmen rhythmisch fort nach Entfernung des Herzens. Zuerst ziehen sich die Hohlvenen, dann die Vorhöfe, dann die Kammer, dann der Bulbus aortae zusammen. Dieselbe Erscheinung von Contraction der Venenstämme habe ich bei Säugethieren beobachtet, sowohl beim jungen Marder als bei der jungen Katze, wo die Zusammenziehung der Hohlvenen und der Lungenvenen aber gleichzeitig mit der Zusammenziehung der Vorhöfe ist. So weit man die Lungenvenenstämme in die Substanz der Lungen verfolgen kann, sieht man beim jungen Thiere die deutlichste Zusammenziehung der Lungenvenen, die nur nach Quetschung dieser Venen aufhört. Eben so deutlich ist die Zusammenziehung des Anfanges der obern Hohlvene am Herzen; aber man kann während der Zusammenziehungen deutlich sehen, wie weit sich die contractile Substanz der Hohlvene erstreckt. Ueber diese Grenze hinaus zeigt der übrige Theil der Hohlvene keine Spur von Zusammenziehung, und ist vielmehr vom Blute strotzend und erweitert, zur Zeit, wo die an den rechten Vorhof stossenden Theile der Hohlvenen zusammengezogen sind. An dem Anfangsstücke der Hohlvenen der Schlangen hat Retzius, und an der untern Hohlvene der Säugethiere hat E. H. Weber eine Schichte eigenthümlicher Fasern beschrieben.

Diese Beobachtungen zeigen, dass das Herz in seiner einfachsten Form nur der mit Muskelsubstanz belegte, activ bewegende Theil des Gefässsystems ist, dass es immer noch Herz bleibt, wenn es auch bei den niederen Thieren nur einen contractilen Gefässstamm darstellt. Der übrige Theil des Gefässsystems besteht nur aus Röhrenleitungen, die in Hinsicht der Bewegung passiv sind, aber andere wichtige Einflüsse haben können, z. B. dass sie durch einen nicht näher gekannten Einfluss das Blut flüssig erhalten, obgleich stillstehendes Blut auch in den Ge-

Digitized by Google

fässen gerinnt, und den Stoffwechsel durch ihre Wandungen vermitteln.

Die Circulation des Blutes (im Jahre 1619 von Harvey bei den höheren Thieren entdeckt) bewährt sich mit dem Fortschritte der Beobachtungen immer mehr, auch bei den einfachen Thieren, obgleich man sie noch nicht für einen allgemeinen Charakter aller Thiere erklären kann. Aber je weiter die Beobachtungen fortschreiten, je mehr entdeckt man Spuren von Gefässen bei den einfachsten Thieren. Ehrenberg hat sie von den Räderthierchen beschrieben, und die mikroskopische Kleinheit scheint eine solche Zusammensetzung nicht auszuschliessen.

Im Folgenden habe ich das Hauptsächlichste unserer mehr sicheren Kenntnisse über die Formen des Gefässsystems zusammengestellt. Bei mehreren niederen Thieren giebt es kleine cirkelförmige Kreisläufe von Körnchen, ähnlich wie bei den Charen. Diese Cirkelbewegungen scheinen von einem Herzen unabhängig zu seyn und durch Wimperbewegung bedingt zu werden. Hieher gehören die von Nordmann in der Hülse der Alcyonella diaphana, die von Carus unter den Ambulacra der Seeigel beobachteten kleinen abgeschlossenen Kreisläufe; die von Ehrenberg beobachteten Cirkelbewegungen von Körnchen bei den Medusen und in den einziehbaren Fasern auf den Rücken der Asterien. Muell. *Arch.* 1834. 571. Die auf- und absteigenden Bewegungen in dem Stamme der Sertularinen, die Meyen (*Nov. act. nat. cur. Vol.* 16. *Suppl.*) und Lister (*Philos. Transact.* 1834.) beobachteten, sind ein Phänomen anderer Art. Nach Lister hängen diese Strömungen mit dem Magen zusammen und verändern von Zeit zu Zeit ihre Richtung. Hält man die Höhlung des Stammes dieser Polypen mit Ehrenberg für den Verdauungsschlauch, so verlieren jene Bewegungen ihr Interesse in Hinsicht der Lehre von der Circulation. Bei einigen niederen Thieren mit verzweigtem Gefässsystem wird die Bewegung der Säfte gleichwohl noch nicht durch ein Herz oder Zusammenziehung der Gefässe, sondern durch Wimpern an den Wänden der Gefässe bedingt. Dahin gehören das von Nordmann (*mikrograph. Beitrage* 1832) beobachtete Diplozoon und andere Entozoen, so wie Ehrenberg's Turbellarien. Ehrenberg und v. Siebold haben die Ursache dieser Bewegungen in schlagenden Wimpern erkannt. Muell. *Arch.* 1836. *Jahresb. CXXXVI.*

Bei den Medusinen geschieht die Verbreitung der Säfte durch gefässartig verzweigte Magensäcke. Bei den Planarien und Saugeingeweidewürmern, Trematoda, giebt es auch einen gefässartig verzweigten Darm. Bei den niederen Thieren, deren Kreislauf man genauer beobachtet hat, bei Echinodermen und Hirudineen ist die Blutbewegung durch einfache, doppelte oder mehrfache contractile Gefässstämme bewerkstelligt. Die Gefässstämme sind aber keine Arterien- und Venenstämme, sondern zum Theil contractile Herzen, die das Blut in die Zwischengefässe treiben.

Das von Tiedemann bei den Holothurien entdeckte Gefässsystem gemeinschaftlich auf dem Darmkanale und dem Athemor-

Digitized by Google

gan scheint hierhin zu gehören (in der Haut ist überdiess ein eigenes System von Wasserkanälen zur Anschwellung der Fühlwärzchen.) *Anatomie der Röhrenholothurie etc.* Bei den Würmern mit rothem Blute giebt es auch noch keinen deutlichen Unterschied von Arterien- und Venenstämmen, sondern einfache, doppelte und mehrfache contractile Gefässstämme, welche sich abwechselnd bald füllen, bald zusammenziehen, und das Blut durch die zwischenliegenden Aeste und Gefässnetze treiben. Die Zusammenziehungen der Gefässstämme schreiten in einer gewissen Richtung vorwärts, und treiben das Blut nach Duges in den grösseren Gefässstämmen im Kreise herum; entweder in horizontaler Richtung, wie bei den Hirudineen, wo die Hauptstämme zu beiden Seiten liegen, oder in vertikaler Richtung, wo die Hauptstämme oben und unten liegen, wie bei den Lumbricinen, Arenicolen, Naiden. Zu gleicher Zeit wirft sich das Blut abwechselnd durch die Quergefässe von einer zur andern Seite, indem der eine Stamm gefüllt wird, während der andere sich contrahirt, wie man diess von Hirudo vulgaris weiss. Siehe J. Muellers, Meckel's *Archiv* 1828. und meine Beobachtungen über *Arenicola* in Burdach's *Physiologie. Bd.* 4., über die Würmer überhaupt Duges *Ann. des sc. nat. T.* 15. Es giebt bei diesen Thieren einen unvollständigen Kreislauf (durch die Stämme), und zugleich alternirende Fluctuation. Ich glaubte zu sehen, dass bei Hirudo vulgaris beide Seitengefässe abwechselnd von hinten nach vorne zu leer werden. Duges dagegen behauptet, dass die Bewegung im Kreise herum gehe. Die Athemorgane der Anneliden sind mannigfach, Kiemenbüschel, wie in den Arenicolen, oder Lungenbläschen, und erhalten ihr Blut wie die übrigen Organe von Aesten der Hauptgefässe. Die Nereiden haben nach R. Wagner zwei Längsstämme, einen auf dem Rücken, der von hinten nach vorn das Blut treibt und pulsirt, den zweiten am Bauche, unter dem Darme (oder dem Nervenstrange), der nicht pulsirt oder sich contrahirt; ausserdem finden sich Quergefässe, obere und untere für die Leibesringe; letztere pulsiren herrlich und entspringen aus dem Bauchlängsstamme, sie gehen in die Ruderplatten oder Füsse (Kiemen); aus diesen entspringen die oberen nicht pulsirenden, die zum Rückenstamme gehen. Bei den Thieren mit einem contractilen Gefässstamme giebt es einen vollständigen einfachen Kreislauf ohne Fluctuation mit arteriösen und venösen Strömen. So bei den Insekten, wo Carus den einfachen Kreislauf vom contractilen Rückengefässe aus und hinten zum Rückengefässe zurück entdeckt hat. Carus *Entdeckung eines Blutkreislaufes etc. Leipz.* 1827. *Nov. act. nat. cur. T.* 15. *p.* 2. Die Strömchen sind sehr einfach und ohne Verzweigung; die Füsse z. B. haben nur zwei einfache entgegengesetzte Ströme, die unmittelbar in einander umbiegen. Gefässströme der Organe sind noch nicht bekannt. Doch habe ich schon im Jahre 1824 den Zusammenhang der Eierröhren mit dem Rückengefässe oder Herzen vieler Insekten entdeckt und beschrieben. *Nov. act. nat. cur. T.* 12. 2. Vergl. Wagner *Isis* 1832. 320. Wagner hat diese Verbindungen bestätigt; er hält sie aber mit Carus, Treviranus

Digitized by Google

und Burmeister nicht für Blutgefässe. Die Erklärung ist ungewiss, die Thatsachen sind unzweifelhaft, obgleich ich selbst jene Verbindungen bei zwei Insekten vermisst habe. Wagner hat Carus Beobachtungen über den sichtbaren Kreislauf der Insekten nicht allein bestätigt, sondern auch erweitert, er hat die Blutkörperchen zu den Seiten des Darmes und Rückengefässes in zwei venöse Ströme vertheilt fliessen gesehen, wahrscheinlich ohne Gefässe, und sah zugleich Blutkörperchen von diesen Strömen aus in das Rückengefäss durch Seitenspalten eintreten, Schon Straus hat diese Seitenspalten an den verschiedenen Abtheilungen des Rückengefässes beschrieben. Nach Straus besteht das Rückengefäss des Maikäfers aus acht Kammern, die durch zweilippige, nach vorne gerichtete Klappen communiciren, und das Blut von hinten nach vorne durchtreten lassen. *Considérations générales sur l'anatomie des animaux articulés etc. Paris* 1829.

Einen fast eben so einfachen Kreislauf scheinen die einfachen Crustaceen (Asseln, Daphnien) nach Zenker und Gruithuisen, und die Spinnen zu besitzen. Die Lungen- oder Kiemen-Blutbahn ist noch nicht von der allgemeinen Blutbahn abgesondert. Bei diesen niederen Crustaceen und bei den Lungenspinnen athmet ein Theil des Blutes in dem Athemorgane während des Kreislaufes. Bei den Insekten und Luftröhrenspinnen athmet das Blut im ganzen Körper, da sich die Luftröhren in allen Theilen bis auf das feinste verzweigen. Bei den eigentlichen Krebsen giebt es entweder ein langes röhriges Herz, wie bei den Squillen, oder ein kurzes und breites, wie bei den übrigen Krebsen. Die venösen Ströme führen das Körpervenenblut erst in die Kiemen, die Kiemenvenen zum Herzen, das Herz zum Körper. Dass diese von Audouin und Edward's entdeckten Verhältnisse wirklich stattfinden, davon habe ich mich zu Paris am Hummer durch Injection überzeugt, und ich halte die häutige Decke über dem Herzen mit Meckel nicht für einen Vorhof, wofür ihn Straus nimmt. Siehe *Ann. des sc. nat.* 1827. *Tab.* 24—32.

Bei den Mollusken ist der Kreislauf ähnlich wie bei den Krebsen. Nur bei den schalenlosen Acephalen (Ascidien, Salpen) gehen die Kiemenvenen unmittelbar zur Kammer, bei anderen, wie bei den meisten Gasteropoden (Schnecken), gelangt ihr Blut zuerst zu einem Vorhof, und bei den zweischaligen Muscheln in zwei Vorhöfe, und von dort zur Kammer. Das Körpervenenblut gelangt bei den meisten Mollusken ganz in die Kiemen, bei den zweischaligen Muscheln (nach Bojanus *Isis* 1819.) gelangt ihr Körpervenenblut durch das von ihm für eine Lunge, von Neuern für eine Niere gehaltene hohle, mit einem Ausführungsgange versehene Organ, und dann grösstentheils in die Kiemen, während ein Theil sogleich, ohne erst durch die Kiemen zu gehen, in die Vorhöfe gelangt. Dagegen sagt Treviranus (*Erscheinungen u. Gesetze des organ. Lebens. I. p.* 227.), dass bei den zweischaligen Muscheln ein Theil des Kiemenvenenblutes von den Kiemen noch erst das schwammige Organ durchkreise, und dann zum Herzen gelange; so wie bei den Schnecken, Limax und Helix, das Lungenvenenblut zum Theil, ehe es zum Herzen gelange, zu dem

Digitized by Google

Harnsäure absondernden Organ (sacc. calcareus) gehe, und dann sich wieder sammele, um in den Vorhof zu gelangen.

Bei den Sepien unter den Mollusken sind 3 getrennte Kammern vorhanden, das Körperherz giebt die Körperarterie ab, die Körpervenen führen das Blut in 2 seitliche Kiemenherzen; von dort gelangt es durch die Kiemenarterien in die Kiemen und durch die Kiemenvenen wieder ins Aortenherz.

Sobald in der Thierwelt ein wahrer Kreislauf auftritt, hängen alle ferneren Modifikationen von dem Verhältnisse ab, welches die Gefässe des Athemorganes (Lunge oder Kieme) oder die Gefässe des kleinen Kreislaufes zu den Körpergefässen oder den Gefässen des grossen Kreislaufes haben. Entweder athmet nur ein Theil des Blutes während des grossen Kreislaufes, und der kleine Kreislauf ist nach Cuvier's Ausdruck nur ein Bruch des grossen, oder alles Blut muss zuerst den kleinen Kreislauf der Lungen oder Kiemen durchgehen, ehe es im Körper verbreitet wird. Im ersten Falle befinden sich unter den Wirbellosen die niederen Crustaceen (Spinnen?), Würmer, unter den Wirbelthieren die Amphibien. Im zweiten Falle sind die Mollusken, die eigentlichen Krebse, die Fische, Vögel, Säugethiere und der Mensch. Die Fische scheinen in dieser Hinsicht über den Amphibien zu stehen, und letztere sogar den Mollusken und Crustaceen untergeordnet zu seyn. Allein Cuvier bemerkt richtig, dass das Athmen im Wasser weit unvollkommener als in der Luft sey, und dass also das halbe Athmen der Mollusken, Krebse und Fische bei einem ganzen kleinen Kreislaufe im Resultate nicht abweiche von dem ganzen Athmen der Amphibien bei einem halben kleinen Kreislaufe. Die lufthmenden Schnecken scheinen nun immer noch höher zu stehen, als die luftathmenden Amphibien, insofern nur ein Theil des Blutes bei den letzteren, alles Blut bei den ersteren athmet. Allein das Blut vertheilt sich in den Lungen der Schnecken nur ganz unbedeutend gegen die Verästelung und den Gefässreichthum in den Lungen der Amphibien. Die nackten Amphibien athmen in der Jugend, so lange sie Larven sind, mit Kiemen aus Wasser, und da dann nur ein grosser Theil des Blutes athmet, bei den Fischen aber alles Blut, um in den Körper zu gelangen, durch die Kiemen muss, so sind die Larven der Amphibien allerdings hierin den Fischen untergeordnet. Diese Anordnung ist aber, wie wir sehen werden, nothwendig bei den Larven der Amphibien, wenn sich aus ihrem frühern Kiemenkreislaufe der spätere Lungenkreislauf ausbilden soll.

Die Mannigfaltigkeiten, welche die Natur in dem Ursprunge der Athemarterien und Athemvenen aus dem grossen Kreislaufe darbietet, sind sehr gross, und es scheinen selbst alle denkbaren Fälle dieses Verhältnisses von der Natur erschöpft zu seyn.

A. Der kleine Kreislauf ein Theil des grossen Kreislaufes.

1. Der kleine Kreislauf ein Theil des venösen Gefässsystems. Bei den zweischaligen Muscheln kehrt, wenn Bojanus Darstellung richtig ist, ein Theil des Körpervenenblutes unmittelbar zu den Vorhöfen, der grössere Theil durchkreist die Kiemen, und kehrt zu den Vorhöfen zurück. 2. Der kleine Kreislauf, ein Theil des

Digitized by Google

arteriösen Gefässsystems. Bei den Proteideen (Proteus) unter den nackten Amphibien, und bei den Fröschen und Salamandern im Larvenzustande geben die Aortenbogen die Kiemenarterien als Seitenäste ab, und nehmen die Kiemenvenen als Seitenäste auf. 3. Der kleine Kreislauf, ein Theil des arteriösen und venösen Gefässsystems. *a*) Die Salamander und Frösche haben in der späteren Zeit Lungen, keine Kiemen mehr, die Proteideen haben Kiemen und Lungen durchs ganze Leben. Bei beiden sind die Lungenarterien Aeste von Aortenbogen, die Lungenvenen gehen zum linken Vorhof, die Körpervenen zum rechten Vorhof, wie J. Davy, Martin St. Ange und M. Weber entdeckt haben. *b*) Bei den beschuppten Amphibien geht die art. pulm aus dem Hauptarterienstamme, oder aus der Herzkammer selbst mit den anderen Arterien hervor, Kiemenvenen zum linken, Körpervenen zum rechten Vorhof der einfachen Herzkammer.

B. Der kleine Kreislauf im Gegensatz des grossen Kreislaufes. 1. Der kleine Kreislauf entstehend aus den Körpervenen und rückkehrend zum Herzen: Mollusken, Krebse. 2. Der kleine Kreislauf mit den Kiemenarterien entstehend aus dem Arterienstiele des Herzens, und rückkehrend durch die Kiemenvenen zu einem neuen Arterienstamme für den übrigen Körper: Fische. Ein Vorhof der Körpervenen, eine Kammer. 3. Der kleine Kreislauf entstehend aus der Lungenkammer, rückkehrend zur Kammer des grossen Kreislaufes. *a*) Bei den Sepien sind das Aortenherz und die beiden Kiemenherzen von einander getrennt, und ohne Vorhöfe. *b*) Bei den Vögeln, Säugethieren und dem Menschen giebt es eine Lungen- und eine Körperarterienkammer, beide mit einem Vorhofe; diese Herzen bilden ein vereinigtes Ganze, die Venae pulmonales münden in den Vorhof der Aortenkammer oder in den linken Vorhof, die Körpervenen in den Vorhof der Lungenkammer oder in den rechten Vorhof.

Ein grosses physiologisches Interesse bietet bei den Wirbelthieren die Umwandlung des Kiemenkreislaufes in den Lungenkreislauf dar, die man in der Classe der Amphibien zu beobachten Gelegenheit hat. Das Herz der Fische hat einen Vorhof für die Aufnahme der Körpervenen, und eine Kammer, aus welcher der Truncus arteriosus mit einem contractilen Bulbus entspringt. Der Truncus arteriosus theilt sich ganz in die Kiemenarterien, die Kiemenvenen treten zu den Körperarterien zusammen und bilden die Aorta abdominalis an der Vorderseite der Wirbel. Alle nackten Amphibien haben zwei nur innerlich getrennte Vorhöfe und eine Kammer, zwei Condyli occipitales, kein Drehgelenk zwischen Atlas und Epistropheus, keine Gehörschnecke, keine Fenestra rotunda, keinen Penis, keine wahren Rippen; alle beschuppten Amphibien (Crocodile, Eidechsen, Schlangen, Schildkröten) haben zwei selbst äusserlich getrennte Vorhöfe und eine Kammer, einen Condylus occipitalis, ein Drehgelenk des Atlas und Epistropheus, wie die höheren Thiere, eine Gehörschnecke und Fenestra rot., wahre Rippen, deutlichen Penis und sind ohne Verwandlung. Alle nackten Amphibien scheinen in der Jugend

Digitized by Google

Kiemen zu haben; die nur bei den Proteideen durchs ganze Leben bleiben; man kann sie in fünf Abtheilungen bringen.

I. Coeciliae, ohne Füsse und ohne Schwanz, wurmförmig. Sie haben in der Jugend eine Kiemengrube, worin zwei Kiemenspalten jederseits am Halse, wie ich an Coecilia hypocyanea entdeckt habe; später Lungen ohne Kiemen und ohne Kiemenlöcher. (Ihr Zungenbein behält 4 Paar Bogen, bei der Larve 5.)

II. Derotremata. Sie haben Extremitäten und sind geschwänzt, durchs ganze Leben jederseits ein Loch am Halse ohne wahre äussere oder innere Kiemen; sie athmen mit Lungen. 4 Füsse. Hieher gehören Amphiuma und Menopoma.

III. Proteidea. Sie haben Extremitäten und Schwanz und ausser den Lungen durchs ganze Leben Kiemenspalten am Halse mit äusseren büschelförmigen Kiemen. Siren, Menobranchus, Proteus, Axolotes.

IV. Salamandrina. Als Larven haben sie im ersten Stadium äussere Kiemen und Kiemenspalten, keine Beine, aber einen Schwanz; im zweiten Stadium haben sie ausser dem Schwanze 4 Extremitäten, wovon die vorderen zuerst hervorbrechen; zugleich äussere büschelförmige Kiemen und Kiemenspalten, und Rudimente von Lungen; sie gleichen also dann ganz dem bleibenden Zustande der Proteideen. Als erwachsene Thiere behalten sie den Schwanz, aber ihre Kiemen und Kiemenspalten verschwinden, wenn sie den Larvenzustand verlassen.

V. Batrachia (Frösche und Kröten). Diese sind in der ersten Zeit des Larvenzustandes geschwänzt und ohne Beine, haben Kiemenspalten, Kiemenbogen und äussere büschelförmige Kiemen; im zweiten Stadium verlieren sie die äusseren Kiemen und haben innere Kiemen an den Kiemenbogen, aber die Kiemen sind mit einer Membran bedeckt, welche nur eine Oeffnung an der linken Seite (Frosch) lässt; sie sind auch jetzt noch geschwänzt und ohne Beine. Bei der Verwandlung erhalten sie Beine, wovon die hintern zuerst hervorbrechen; sie verlieren die Kiemen, auch ihr Schwanz verschwindet ganz durch Resorption. So lange die Salamander und Frösche Larven sind, sind ihre Wirbelkörper an beiden Enden conisch ausgehöhlt, wie bei den Fischen; so sind sie bei den Coecilien, Derotremen und Proteideen durchs ganze Leben. Siehe J. Mueller in Tiedemann's *Zeitschr. für Physiol.* 4. 2., über das Herz der Amphibien siehe M. Weber *Beiträge zur Anatomie und Physiologie. Bonn* 1832. Mayer *Analecten. Bonn* 1835. Bei den Proteideen (Proteus) theilt sich der Truncus arteriosus der einfachen Kammer sogleich in mehrere den Kiemenbogen entsprechende Aortenbogen für jede Seite, die sich hinten wieder zur Aorta abdominalis vereinigen. Von diesen Aortenbogen gehen die grossen Kiemenarterien aus, sie nehmen die Kiemenvenen wieder auf. Bei den Salamanderlarven vertheilt sich der Truncus arteriosus wie beim Proteus zum grössten Theil in die Kiemenarterien, diese anastomosiren mit den Kiemenvenen oder Wurzeln des Körperarteriensystems. Bei der Verwandlung zieht sich die Blutbahn von den Kiemen auf bleibende Aortenbogen zurück. Ruscon

Digitized by Google

amours des Salamandres. Milan 1821. Bei den Fröschen gleicht der Kiemenkreislauf in der ersten Zeit des Larvenlebens, wo sie äussere Kiemen haben, dem Kiemenkreislauf der Salamanderlarven, im zweiten Stadium, wo sie innere, bedeckte Kiemen haben und die Lungen sich zu entwickeln anfangen, vertheilen sich die Gefässe nach Huschke mehr wie bei den Fischen, der Truncus arteriosus vertheilt sich in die Kiemenarterien für 4 Kiemenbogen, die Kiemenvenen laufen den Arterien parallel und sammeln sich in entgegengesetzter Richtung, doch findet eine kurze Anastomose am Anfange jedes Kiemenbogens zwischen Arterie und Vene statt, die bei den Fischen fehlt. Nach der Umwandlung ist nur noch jederseits der Bogen übrig, der sich mit dem der andern Seite zur Aorta abdominalis vereinigt, und der die Art. brachialis hinten abgiebt. Die Lungenarterien und die Kopfgefässe sind aber nicht auch Aeste dieser Bogen, wie man gewöhnlich glaubt, sie scheinen nur vom Anfang jenes Bogens auszugehen; denn genau untersucht besteht jeder der 2 divergirenden Stämme, in welche sich der Truncus arteriosus theilt, aus drei verwachsenen Stämmen, deren Lumina nur durch dünne Septa getheilt sind, die Reste von den Arterien der Kiemenbogen, die nur verwachsen sind. Die mittlere dieser Röhren geht in die Aorta jederseits weiter, die untere giebt die Art. pulm. und ein Gefäss des Hinterkopfes, aber die obere geht in die Kopfgefässe über, welche bei ihrem Ursprung eine drüsenartige Anschwellung, die sogenannte Carotisdrüse, zeigen. Diese Drüse besteht aus feinen Verzweigungen des eintretenden Stammes, die sich aus der Drüse wieder zu einem Stamme sammeln, wie Huschke (*Zeitschrift für Physiologie* 4. 1.) gezeigt hat. Die Drüse ist nach ihm ein Rest vom Capillargefässsystem des ersten Kiemenbogens. Ich habe mich überzeugt, dass die Drüse im Innern hohl ist, und dass sich der eintretende Stamm bis zu dem austretenden durch ein schwammiges Gewebe, das an den Aussenwänden am dichtesten ist, fortsetzt, obgleich die äussere Oberfläche der Wände bei feiner Injection auch das von Huschke beschriebene Gefässnetz eintretender und austretender Gefässe zeigt. Die beschuppten Amphibien haben niemals Kiemen, und haben nur im Foetuszustande, wie alle übrigen Wirbelthiere, Zustände der Metamorphose. In der allerersten Zeit des Foetuslebens haben alle Embryonen am Halse Spalten und dazwischen bogenförmige Platten, in welchen die Aortenbogen verlaufen, die sich hinten wieder zu einem Stamme vereinigen. Diess hat Rathke entdeckt, man kann sich beim Embryo der Vögel am dritten Tage der Bebrütung davon überzeugen, wie ich gesehen. Etwas Aehnliches, nur weniger deutlich, findet auch bei den Säugethieren und dem Menschen, noch deutlicher aber bei den beschuppten Amphibien im Embryonenzustande statt. Diess sind jedoch keine Kiemen, wozu Kiemenblättchen gehören, sondern bloss Kiemenbogen, woraus bei den Fischen und nackten Amphibien wirklich durch Verästelung der Aortenbogen Kiemen werden, die aber bei allen übrigen Thieren, den beschuppten Amphibien, Vögeln, Säugethieren allmählig verschwinden und zu Hörnern des Zungenbeins

Digitized by Google

umgewandelt zu werden scheinen. Siehe über die Bedeutung dieser Theile Reichert in Muell. *Archiv.* 1837. Genug, dass bei allen Thieren im frühesten Zustande der Truncus arteriosus in Aortenbogen sich theilt. Diese Bogen bleiben sogar bei den beschuppten Amphibien durchs ganze Leben, zuweilen 2 auf jeder Seite (wie bei den wahren Eidechsen, auch Blindschleichen), zuweilen einer auf jeder Seite (wie bei den Schlangen). Bei den höheren Thieren, Vögeln, Säugethieren, Menschen, welche 2 Herzkammern und 2 Vorhöfe haben, giebt es nur im Foetuszustande mehrere Aortenbogen, und zwar anfangs jederseits mehrere, die sich hinten zur Aorta descendens vereinigen. Bei den Vögeln geben die vordersten von drei Bogen jeder Seite die Gefässe der vorderen Theile des Körpers, die hinteren Bogen die Lungenarterien ab, später bleiben durchs Foetusleben des Vogels 2 Arcus arteriosi (aus dem rechten Ventrikel), welche die Lungenarterien abgeben, und ein Arterienstamm aus dem linken Ventrikel, der die Gefässe der vorderen Theile des Körpers abgiebt und den Arcus aortae bildet. Nach dem Auskriechen des Vogels werden die Lungenarterien auch selbstständig, indem die Verbindung der Arcus arteriosi des rechten Ventrikels mit dem Arcus aortae des linken Ventrikels eingeht. S. Huschke *Isis* 1828. 160. Bei den Säugethieren und dem Menschen bleiben durchs ganze Foetusleben 2 Aortenbogen, die sich hinten zur Aorta descendens vereinigen, und wovon der eine aus dem linken Ventrikel entspringend die Gefässe der oberen Theile des Körpers abgiebt, der andere aus dem rechten Ventrikel entspringend die Lungenarterie abgiebt, welche letztere nach der Geburt selbstständig wird, während der Verbindungsbogen (ductus Botalli) für den bleibenden Arcus ventriculi sinistri oder den bleibenden Arcus aortae schwindet. Da beim Foetus anfangs mehrere Arterienbogen jederseits vorhanden sind, so begreift man, wie es kommt, dass der bleibende Arcus aortae bei den Vögeln und Säugethieren verschieden ist, bei ersteren von rechts, bei letzteren von links sich hinter die Speiseröhre wendet. Beim Foetus stehen übrigens auch beide Vorhöfe mit einander in Communication durch das foramen ovale. Wenn diess Loch oder der Ductus Botalli nach der Geburt krankhafter Weise offen bleiben, entsteht Vermischung des arteriösen und venösen Blutes und die Blausucht.

Bei den warmblütigen Wirbelthieren ist der kleine Kreislauf der Lungen kein Theil des grossen mehr, sondern alles Blut muss durch die Lungen, wenn es in den übrigen Körper gelangen soll. Indessen besitzen diese höheren Thiere so gut wie alle übrigen Wirbelthiere einen kleinsten Kreislauf des Blutes, der ein blosser Anhang des grossen ist, den Pfortaderkreislauf. So wie der Kiemenkreislauf der mit Kiemen versehenen nackten Amphibien als ein blosser Anhang der Arterien von diesen beginnt und in die Arterien zurückkehrt, so ist der Pfortaderkreislauf ein blosser Anhang der Venen, ein Umweg, den ein Theil des Venenblutes macht, ehe es zum übrigen Venenblut gelangt. Es giebt bei den Wirbelthieren 2 Pfortadersysteme, das der Nieren und das der

Digitized by Google

Leber; ersteres kömmt nur bei den Fischen und Amphibien vor, letzteres bei Allen, wie beim Menschen. Bei dem Menschen und den Säugethieren bilden die Venen der Milz, des Magens, des Darmkanals, Mesenteriums, der Gallenblase und des Pankreas die in der Leber nach Art einer Arterie sich verzweigende Pfortader; aus den Capillargefässen der Leber, zu welchen auch das Blut der Art. hep. strömt, kehrt das Blut durch die Lebervenen in die Vena cava inf. zum übrigen Venenblute. Bei den Vögeln, Amphibien und Fischen geht zur Pfortader der Leber auch ein Theil des Blutes der untern Extremitäten, des Schwanzes, des Beckens, bei den Fischen zuweilen auch der Schwimmblase. Jacobson, Nicolai, Rathke. Bei den Amphibien, die ausser den Nierenarterien auch Pfortadern der Nieren haben, geht zu diesen ein Theil des Blutes der hinteren Extremitäten und des Schwanzes. Hier geht das Blut der hinteren Extremitäten, der Bauchmuskeln, des Schwanzes zur Pfortader der Leber und zu den Pfortadern der Nieren, und zwar bei einigen Amphibien, wie Fröschen und Salamandern, zu diesen Eingeweiden allein, bei anderen (Crocodilen) zum Theil zur Vena cava. Bei den Fischen geht das Blut des Schwanzes und des mittlern Theiles des Bauches bald allein zu den Nieren, wie im Gadus; bald geht das Blut der hinteren Theile zu den Nieren, zur Leber und Vena cava, wie im Karpfen, Hecht, Barsch. Die Pfortader der Leber erhält bei mehreren Fischen zuweilen auch die Venen der Genitalien und Schwimmblase, zuweilen gehen diese mit den rückführenden Nierenvenen zur Vena cava. Jacobson Meck. *Arch.* 1817. 147. Nicolai *Isis* 1826. 404. Meckel, der die zuführenden Venen der Nieren auch für zurückführende hält, stützt sich vorzüglich auf die Vögel, wo Jacobson auch zuführende Nierenvenen beschrieben hatte; allein die Nichtexistenz derselben bei den Vögeln, die schon von Nicolai bewiesen wurde, ist kein Grund für die Nichtexistenz derselben bei den Amphibien und Fischen, wo sie Nicolai bewiesen hat. Beim Frosch geht das Blut der Bauchhaut fast ganz zur obern Hohlvene. Eine ausführlichere Beschreibung der Formen des Kreislaufs gab ich in Burdach's *Physiologie B.* 4. Vergl. Schultz *System der Circulation. Stuttgardt* 1836.

II. Capitel. Von den allgemeinen Erscheinungen des Kreislaufs.

Das Herz des erwachsenen Menschen im mittlern Alter zieht sich 70—75mal in der Minute zusammen, in der Jugend häufiger, im Alter seltener; z. B. beim Embryo ist die Zahl der Schläge 150, nach der Geburt 140—130, im ersten Jahr 130—115, im 2. Jahr 115—100, im 3. Jahr 100—90, im 7. Jahr 90—85, im 14. Jahr 85—80, im Greisenalter 65—50. Beim sanguinischen Temperament ist der Herzschlag etwas häufiger als beim phlegmatischen; ebenso beim weiblichen Geschlechte. Bei den Thieren variirt die Zahl der Herzschläge sehr. Bei Fischen

Digitized by Google

hat man 20—24 Schläge beobachtet, beim Frosch gegen 60, bei Vögeln 100—140, beim Kaninchen 120, bei der Katze 110, beim Hund 95, beim Schaf 75, beim Pferd 40.

Nach dem Essen ist der Herzschlag häufiger, noch mehr bei körperlichen Anstrengungen; seltener ist er im Schlaf. Nach Parrot steigt die Frequenz des Pulses, die in der Meeresfläche 70 betrug, bei 1000 Metres darüber auf 75, bei 1500 auf 82, bei 2000 auf 90, bei 2500 auf 95, bei 3000 auf 100, bei 4000 auf 110. Frorief's *Notizen* 212. Vergl. Nick *über die Bedingungen der Heufigkeit des Pulses. Tüb.* 1826. In Entzündungen und Fiebern ist der Puls viel häufiger als sonst; wenn die Kräfte abnehmen, häufig und schwach. In Nervenaffektionen mit mehr Unterdrückung als Erschöpfung der Kräfte ist der Puls oft auffallend langsamer.

Wird das Herz eines lebenden Säugethieres oder Vogels blossgelegt, so sieht man, dass die beiden Herzkammern sich gleichzeitig zusammenziehen, dass die beiden Vorhöfe mit dem Anfang der Lungenvenen- und Körpervenenstämme sich auch gleichzeitig zusammenziehen, und dass die Zusammenziehung der Vorhöfe nicht gleichzeitig ist mit der Zusammenziehung der Kammern. Bei warmblütigen Thieren geht die Zusammenziehung der Vorkammern schnell vor der Zusammenziehung der Kammern vorher. Die kaltblütigen Thiere haben nur eine Kammer und zwei Vorhöfe, aber die nackten Amphibien und vielleicht alle Amphibien haben gleich den Fischen einen Theil, den die warmblütigen Thiere nicht haben, nämlich einen contractilen Bulbus der Aorta. Nach meinen Beobachtungen folgen sich die Contractionen der Venenstämme, der Vorhöfe, der Kammer und des Bulbus aortae beim Frosch in der Ordnung, wie sie genannt sind, so dass die Zwischenzeiten bei diesen 4 Momenten fast gleich sind; die Zwischenzeit von der Contraction der Vorhöfe zur Contraction der Kammer ist eben so gross, wie die Zwischenzeit zwischen der Contraction der Kammer und der des Bulbus. Ich habe mich wiederholt überzeugt, dass Vorhöfe und Kammer nicht in gleichen Zwischenzeiten wie die Bewegungen eines Pendels abwechseln, wie Oesterreicher (*Lehre vom Kreislauf des Blutes. Nürnb.* 1826.) behauptet, sondern dass die Zeit von der Contraction der Vorhöfe bis zur Contraction der Kammer kleiner ist, als die Zeit von der letzten bis zur ersten, dass in der Regel in den grössern Zeitraum von der Contraction der Kammer bis zur Contraction der Vorhöfe gerade die Contraction des bulbus aortae und der Venenstämme hineinfällt. Bei warmblütigen Thieren sah ich die Contraction der Vorhöfe zuweilen einige Momente fehlen, was auf Rechnung der Verletzung kömmt, sonst aber immer wie ein sehr schneller Vorschlag vor der Contraction der Ventrikel, so dass die Zeit von der Contraction der Vorhöfe bis zur Contraction der Ventrikel jedenfalls ausserordentlich viel kürzer ist als die Zeit von der Contraction der Ventrikel bis zur Contraction der Vorhöfe.

Nur die Zusammenziehung (systole) des Herzens ist ein activer Zustand, die Erweiterung (diastole) ist das Moment der Ruhe,

Digitized by Google

wo die Fasern erschlaffen und die Höhlen des Herzens in den hiebei entstehenden hohlen Raum das nächste Blut anziehen, was nach der Anordnung der Klappen zufliessen kann; die Herzhöhlen sind daher in der Erweiterung, diastole, mit Blut gefüllt und ausgedehnt. Die von Bichat und einigen andern französischen Gelehrten angenommene active Erweiterung des Herzens wird durch ein gutes Experiment von Oesterreicher *l. c.* 33. widerlegt. Wenn man auf ein ausgeschnittenes Herz vom Frosch einen Körper legt, der schwer genug ist, das Herz flach zu drükken, und klein genug, dass man das Herz beobachten kann, so sieht man, dass dieser Körper nur bei der Zusammenziehung des Herzens gehoben wird, dass bei der Erweiterung aber das Herz platt bleibt. Hieraus geht hervor, dass die Erweiterung des Herzens nach der Contraction kein Muskularact des Herzens ist; indessen können doch die Wände des Herzens in der Diastole nicht so schlaff, wie an einem ausgeschnittenen Herzen seyn, selbst wenn die Herzhöhle nicht mit Blut gefüllt wäre, weil die Capillargefässe der Herzsubstanz zur Zeit der Erschlaffung vom Blut strotzen, während sie zur Zeit der Contraction zusammengedrückt werden, und weniger Blut enthalten können.

Die Bewegungen der Herzkammern würden das Blut sowohl in die Vorhöfe und Venen als in die Arterien treiben, wenn nicht die Klappen durch ihren Bau und ihre Befestigung das Austreiben des Blutes nur in einer gewissen Richtung, und das Einfliessen nur in einer andern Richtung zuliessen. Die Vorhöfe können durch ihre Contraction das Blut allerdings auch in die Venen zurücktreiben, wenn nicht der Strom des Venenblutes nach dem Herzen diese Bewegung aufhält, aber der Fluss des Bluts aus dem Vorhof in die Kammer ist frei, denn die Valvula an der Vorhofmündung ist so befestigt, dass sie das Blut frei in die Kammer strömen lässt; aber bei der Zusammenziehung der Kammer verhindert diese Klappe, indem sie durch den Druck des Blutes sich ausbreitet und vorlegt, das Rückfliessen in die Vorhöfe.

Die Bewegung des Blutes aus der Kammer ist frei nach den Arterien, weil die am Ostium arteriosum der Kammern liegenden taschenförmigen Klappen, Valvulae seminulares, durch den Strom des Blutes aus den Kammern nach den Arterien auseinander weichen, dagegen kann das einmal in den Arterien enthaltene Blut nicht in die Kammern zurück fliessen, weil die Blutsäule der Arterien die taschenförmigen Klappen am Ostium arteriosum der Kammern herabdrückt und ausbreitet. Das Herz bildet durch diese Anordnung der Klappen eine Art Pumpenwerk, gleichwie die gewöhnlichen Pumpenröhren mit zwei Klappen versehen sind, von denen die eine beim Aufziehen der Pumpenstange das Wasser durchlässt, sich aber beim Senken der Pumpenstange wieder schliesst, während die andere sich dem Wasser öffnet, die sich dagegen beim Wiederaufziehen der Stange schliesst, und das Zurückfliessen des schon geförderten Wassers verhindert.

Das ganze Gefässsystem muss man sich während der Circulation mit Blut gefüllt denken. Nur die Herzhöhlen ziehen sich

Digitized by Google

jedesmal bis fast zur Leere zusammen, obgleich mehrere Beobachtungen zeigen, dass nicht alles Blut bei der Zusammenziehung der Kammern in die Arterien fliesst. Aber die Gefässe sind vom Anfange der Arterien bis in die Capillargefässe, und von dort bis zur Insertion der Venenstämme ins Herz, sowohl während der Zusammenziehung der Kammern, als zur Zeit der Ruhe mit Blut gefüllt; nirgends ist Luft; nirgends ein leerer Raum im Gefässsystem. Die Zusammenziehung der Aorta-Kammer kann z. B. das in den Arterien enthaltene Blut nur dadurch weiter bringen, dass sie mit 1—2 Unzen Blut (Inhalt der Kammer) mit Gewalt gegen die in den Arterien enthaltene Blutsäule drückt, und diese Blutsäule rückt um so viel Raum weiter, als diese 1—2 Unzen Blut, mitten durch die Aortenklappen gedrängt, Raum in dem Anfang der Aorta einnehmen. So wie die Zusammenziehung der Kammer nachlässt, hört die Ursache der Bewegung auf, aber das Blut wird von den elastischen Arterien gegen den Widerstand der Reibung in den kleinsten Gefässen fort getrieben; es bildet immer ein Continuum von den Aorten-Klappen bis in die Capillargefässe, und fliesst beschleunigt, wenn die Aorten-Kammer wieder mit Gewalt mit 1—2 Unzen Blut den Anfang der Blutsäule an den Aortenklappen weiter drängt. Auf diese Art muss in einer gewissen Zeit aus den Venen gerade so viel Blut wieder ins Herz strömen, als durch die Zusammenziehung der Kammern daraus hervor tritt; denn die ganze Blutmasse bildet einen grossen Zirkel, vom Herzen zum Herzen, einen Zirkel, in dem an jeder Stelle so viel Blut weiter rückt, als an jeder andern. Bei der Zusammenziehung der Kammern müssten diese fast leer werden, aber diese Leerheit kömmt nicht einmal zu Stande, denn auf der Stelle fliesst von den Venen und Vorhöfen her wieder das a tergo gedrängte Blut in die leer werdenden Kammern ein, und eben so ist es mit den Vorhöfen.

Indem die Zusammenziehung der Kammern in jedem Moment die Blutmasse in dem Arteriensystem weiter drängt, werden die Arterien ausgedehnt, und diesen von der Zusammenziehung der Kammer herrührenden Druck des Blutes gegen die elastischen Arterienwände nennt man Puls. Wir werden später uns mit dieser Erscheinung besonders beschäftigen; hier ist nur zu bemerken, dass der fühlbare Puls der Arterien mit der Zusammenziehung der Kammer bis auf einen ganz unmerklichen Zeitunterschied synchronisch ist; an den feinsten Gefässen und an den Venen bemerkt man keinen Puls mehr. Mit dem Puls der Arterien muss man den Herzschlag, Pulsus cordis, nicht gleichstellen. Der Puls der Arterien ist um einige Terzen später als der Herzschlag. Der Herzschlag ist eine den Brustwänden in der Gegend der fünften bis sechsten Rippe mitgetheilte Erschütterung, welche von dem Anschlag der Spitze des Herzens herrührt.

Von dem fühlbaren und zuweilen aussen sichtbaren Herzschlag muss man 2 Töne unterscheiden, welche man hört, wenn man das Ohr auf die Stelle des Herzens anlegt, oder sich eines Stethoskops bedient. Man kann sie, wie ich finde, auch zuweilen Nachts an sich selbst hören, wenn man auf der linken Seite

Digitized by Google

liegt. Diese Töne folgen schnell auf einander bei jedem fühlbaren Herzschlag, und lassen, wie der Herzschlag, eine Pause hinter sich. Ich finde die Zwischenzeit zwischen beiden im Verhältniss zur Pause wie 1 zu 3, oder ungefähr $\frac{1}{4}$ der Zeit zwischen zwei Herzschlägen oder circa $\frac{1}{5}$ Secunde (12 Terzen). Auch finde ich nach vielen mit Ausdauer fortgesetzten Beobachtungen, dass der erste Ton synchronisch mit dem fühlbaren Herzschlag ist, und auch fast synchronisch mit dem Puls an der Art. maxill. externa, der nur ein Paar Terzen auf den fühlbaren Herzschlag folgt. Ich hörte den ersten Ton bei einer gesunden Weibsperson nur wo man den Herzschlag fühlt, deutlich, den zweiten aber fast in der ganzen Ausdehnung der Brust bis an die Schlüsselbeine. Bei Schwangern hört man die zwei Töne des Foetusherzschlages durch die Bauchdecken hindurch.

Laennec hat den ersten Ton von der Zusammenziehung der Kammern, den zweiten von der Zusammenziehung der Vorhöfe abgeleitet, was indess unzweifelhaft falsch ist, da die Zusammenziehung der Vorhöfe als Vorschlag der Zusammenziehung der Kammern vorhergeht. Andere leiteten den ersten Ton von der Zusammenziehung der Vorhöfe, den zweiten von der Zusammenziehung der Kammern ab. Siehe Burdach *Physiol.* 4. *Bd.* Allein der Puls der Arterien ist so gut wie synchronisch mit dem Herzschlag, oder folgt zu schnell (ein Paar Terzen) auf den fühlbaren Herzschlag, der zweite Ton aber auf den ersten Ton und auf den fühlbaren Herzschlag in $\frac{1}{4}$ der Zeit zwischen zwei Herzschlägen oder 12 Terzen. Demnach kann der zweite Ton nicht von der Zusammenziehung der Kammern herrühren.

Nach Magendie's neueren Untersuchungen (*Ann. d. sc. nat.* 1834.) hören die Töne sogleich auf, wenn bei einem Thiere die Brust geöffnet wird, und kehren wieder, wenn man auf das Herz einen harten Körper zum Anschlagen auflegt. Er leitet den ersten Ton von der Zusammenziehung der Kammern und dem Anschlage der Spitze des Herzens, den zweiten Ton von dem Anschlage des Herzens in der Erweiterung an die Brustwände ab. Bei Versuchen, welche in der med. Section der British association zu Dublin angestellt wurden (*Lond. med. gaz. Oct.* 777. Froriep's *Not.* 1006.) zeigte sich, dass auch nach Entfernung des Brustbeins und der Rippen, wenn das Herz ausser aller Berührung mit irgend einem Theil der Brustwand schlug, beide Töne durch ein auf das Herz aufgesetztes Stethoskop vernommen wurden. Bei einem Kalbe, bei dem man auf diese Art beide Töne vernommen hatte, wurde eine feine, gekrümmte Nadel in die Aorta, eine andere in die Lungenarterie unter der Ansatzstelle der halbmondförmigen Klappen gestossen, und die Nadeln wurden ohngefähr einen halben Zoll aufwärts und nach aussen durch die respektiven Gefässe hindurchgeführt, so dass in jedem, zwischen der Nadel und der Wand der Arterie eine Klappe eingeschlossen war; als das Hörrohr über den Ursprungsarterien angelegt wurde, fand man, dass der zweite Ton aufgehört hatte. Nach diesen Versuchen scheint es, dass man der Ansicht von Williams folgen muss und dass der erste Ton von der Zusam-

Digitized by Google

menziehung der Ventrikel allein (Muskelgeräusch), der zweite von der Ausspannung der Klappen durch die Blutsäulen der Aorta und Arteria pulmonalis abgeleitet werden müssen, obgleich sie durch das Anschlagen des Herzens gegen die Brustwände, mit der Spitze bei der Systole, mit der vordern Wand bei der Diastole vernehmlicher werden müssen. Ueber Hope's und Williams angestellte Versuche siehe *Lond. med. gaz. oct.* 774.

Wir gehen nun zur Beschreibung des grossen und kleinen Kreislaufs über. Den grossen Kreislauf nennt man die Bahn des Blutes von der linken Hälfte des Herzens durch die Arterien des Körpers, durch die Venen des Körpers zurück nach dem rechten Herzen; den kleinen Kreislauf nennt man die Bahn des Blutes von dem rechten Herzen durch die Lungenarterie nach den Lungen, und durch die Lungenvenen zurück nach dem linken Herzen. Im Grunde giebt es also keine zwei Kreisläufe, sondern nur einen Kreislauf mit zwei Abtheilungen der Bahn, so dass in jeder Abtheilung das Blut durch die feinsten Gefässe aus den Arterien wieder in die Venen übergeht.

a. Kleine Blutbahn der Lungen.

Das Blut der Vena cava inf. und sup. und der grossen Herzvene fliesst dem rechten Vorhofe in dem Maasse zu, als der linke Ventrikel Blut durch die Arterien des Körpers treibt. Während der Contraction des Vorhofes wird das Blut dieser Venen kurz aufgehalten; allein so wie der Vorhof erschlafft, stürzt das Blut der Venen in den rechten Vorhof, und zum Theil schon in die rechte Kammer, sobald sie erschlafft ist. Nun contrahirt sich der Vorhof als Vorschlag der Contraction der Kammer. Bei Vivisectionen sah ich öfter zwei Zusammenziehungen des Vorhofes auf eine Zusammenziehung der Kammer, zuweilen aber auch die Zusammenziehung der Vorhöfe fehlen. Beides scheint jedoch Anomalie. Durch die Contraction des Vorhofes wird das Blut durch diejenige Oeffnung getrieben, welche jetzt nicht geschlossen ist. In die Hohlvenen fliesst das Blut nicht zurück, weil der Strom des Venenblutes durch die vis a tergo zum Herzen fortdauert, die Valvula Thebesii der Herzvene ist durch den Druck des Blutes im Vorhofe geschlossen. Das Blut strömt also in die während der Contraction des Vorhofes erweiterte rechte Kammer, die dadurch auf den höchsten Grad ihrer Anfüllung gebracht wird. Zu der Zeit, wo der rechte Vorhof sich wieder erweitert, um das Blut der Venen aufzunehmen, contrahirt sich die rechte Kammer, und treibt das Blut, da die Valvula tricuspidalis von dem Drucke des Blutes vor der Vorhofmündung der Kammer ausgebreitet wird, durch das Ostium arteriosum zwischen den hier aus einander weichenden Valvulae semilunares in die Art. pulmonalis. Auf diese Art gelangt das aus dem Körper zurückkehrende Venenblut durch die Thätigkeit des rechten Herzens in die Blutbahn der Lungen. Indessen strömt doch nicht jedesmal alles Blut des Vorhofes bei dessen Contraction in die Kammer, vielmehr wird ein Theil in die obere und untere

Digitized by Google

Hohlvene zurückgedrängt. Jedenfalls wird durch die Zusammenziehung des Vorhofes der Zufluss des Blutes von den Venenstämmen nach dem Herzen aufgehalten, der sonst beständig erfolgen müsste, weil das Venenblut beständig durch den Strom des Blutes von der linken Kammer durch die Arterien, Capillargefässe und Venen gedrängt wird. Bei Vivisection sieht man die grossen Venen bei jeder Zusammenziehung des Vorhofes anschwellen, und bei Tritonenlarven sah ich das Blut in der untern Hohlvene und den Lebervenen nur stossweise fortrücken. Dieses Zurückströmen muss vermehrt werden, wenn die Kammer wegen irgend eines Hindernisses nicht alles Blut in die Art. pulm. treiben kann, entweder durch Substanzveränderung derselben, oder durch Verknöcherung der Valvulae semilunares, oder durch ein Hinderniss der Blutbewegung in den Lungen. Dieser Rückfluss oder vielmehr rhythmische Aufenthalt in den Hauptstämmen der Venen wird Pulsus venosus genannt. Er kann sich nicht weit fortpflanzen, weil die Venen zu nachgiebig sind, und die Stauchung nur die nächsten Theile des Venensystems erweitert.

Das einmal in der Arteria pulmonalis enthaltene Blut kann bei der Relaxation der Kammer nicht wieder zurückfliessen, weil die Blutsäule die Valvulae seminulares oder Taschenventile am Ostium arteriosum der Kammer ausbreitet. Die Bewegung des Blutes aus dem rechten Herzen durch die Lungen nach dem linken Herzen, der kleine Kreislauf genannt, ist kein wahrer Kreislauf, indem das Blut am Ende dieser Bahn an einem andern Orte ankömmt, als von wo es ausgegangen ist, sondern ist nur ein Theil der Bahn des ganzen Kreislaufes, und würde besser Lungenblutbahn genannt werden, im Gegensatz der Körperblutbahn, welche zusammen erst einen ganzen Kreislauf bilden. Auf der Lungenblutbahn gelangt das venöse Blut, von immer neuen Blutmassen aus der rechten Kammer getrieben, aus den Zweigen der Art. pulmonalis in die Capillargefässe der Lungen, durch die Capillargefässe, wo es im Momente des Durchganges hellroth oder arteriös wird, in die Venae pulmonales, und sofort in den linken Vorhof. Die Capillargefässe der Lungen sind, wie überall, netzförmige Uebergänge der feinsten Zweige der Arterien in die feinsten Zweige der Venen; aber hier mit ausserordentlich engen Maschen der Netze. Alle diese Capillargefässnetze sind aber in der feinen Membran enthalten und ausgebreitet, welche die Lungenzellen bildet, in die sich die letzten Zweige der Luftröhre endigen, und welche eine feine Fortsetzung der Schleimhaut der Luftröhre ist. Da diese von Capillargefässen durchzogene feine Membran von Zelle zu Zelle ein Continuum bildet, so muss man sich das Innere der Lungen, abgesehen von den Luftröhren, Arterien und Venen, als eine im kleinen Raume realisirte ungeheure Fläche vorstellen, durch zellenhafte Faltungen einer Membran gebildet, die von Capillargefässnetzen durchzogen ist, so dass der Prozess des Athmens geschieht durch den Contact des Blutes und der Luft, welche durch die Luftrohre eingeführt, die Wände dieser Zellen berührt, während die Theilchen des Blutes, in den Capillargefässen der Zellenwände bis ins Kleinste vertheilt, vorbeiströmen.

Digitized by Google

Bei den einfacheren Thieren, wie den nackten Amphibien, bilden die Lungen noch blosse Säcke mit inneren zelligen Vorsprüngen. So sind auch die Kiemen, die zweite Art des Athemorganes, eine grosse Vermehrung der Fläche im kleinen Raume; aber bei den Kiemen ist die Vermehrung der athmenden Fläche nach aussen vorspringend, bei den Lungen sackförmig oder nach innen verzweigt. Auch an den Kiemen vertheilt sich das Blut der Kiemenarterien in eine ungeheuere Ausbreitung durch die Capillargefässnetze aller Kiemenblätter und Blättchen, wovon jedes seine kleine Arterie hat, die am Ende in eine kleine Vene umbiegt, während zahlreiche capillare Queranastomosen zwischen beiden in der Breite der Kiemenblättchen statt haben. Bei den Fröschen und Salamandern kann man die Bewegung des Blutes durch die Capillargefässe der sackförmigen Lungen unter dem Mikroskope beobachten. Siehe die Abbildungen von Cowper *Phil. Trans. abridg.* 5. 331. von den Lungen des Salamanders von Prevost und Dumas in *Magendie préc. élément. de physiol. T.* 2. Die Zwischenräume der Strömchen sind ganz regelmässig zerstreute Inselchen, wie ich sehe, und kaum grösser als die Strömchen selbst. Noch deutlicher sieht man die Bewegung des Blutes durch die Capillargefässe der Kiemen bei den Larven der Salamander. Rusconi *della circolazione della larve delle Salam. aquat. Pavia* 1817. *Amours des Salam. aquat. Milan* 1821. Steinbuch *Analecten f. Naturkunde. Fürth* 1802. Am genauesten sind Marshall Hall's Beobachtungen über den Kreislauf in den Lungen der Salamander, Frösche und Kröten. *A. critical and experimental essay on the circulation of the blood. London* 1831. *Tab.* 5—8. Die Zweige der Lungenarterien und Lungenvenen laufen hier einander immer parallel, so dass in die Winkel der Arterienzweige die Venenzweige, in die der Venenzweige die Arterienzweige eingreifen. An den Scheidewändchen der Lungenzellen, die nach dem Innern der Lunge vorspringen, verbreiten sich Arterienzweige und Venenzweige so, dass die Venenzweigelchen an dem innern Rande der Scheidewändchen verlaufen. Die letzten Zweige der Arterien und Venen enden plötzlich in ein Zwischennetz von Capillargefässen, während in allen andern Organen die Verzweigung der Gefässchen immer fortschreitet, und erst unmerklich in das Capillargefässnetz übergeht. Auf diese Art sind die letzten Zweige der Arterien und Venen überall siebförmig durchlöchert, um das Blut der Capillargefässe abzugeben oder aufzunehmen. Marshall Hall's naturgetreue Abbildungen sind von ausserordentlichem Interesse, besonders Tab. 8.

Die Zerstörung der Capillargefässnetze der Lungenzellen und der Lungenzellen selbst durch Entzündung, Eiterung, Entartungen, hat zwei sehr wichtige Folgen, erstens die Verkleinerung der athmenden Fläche, dessen Folge unvollkommene Ausbildung des Blutes und zuletzt Abzehrung seyn kann; zweitens Verkleinerung und Verhinderung der Blutbahn, welche das Blut nehmen muss, wenn es vom rechten zum linken Herzen, und so in den ganzen übrigen Körper gelangen soll. Bei den warmblütigen Thieren, wo alles Blut die Capillargefässnetze der Lungen passi-

Digitized by Google

ren muss, um in die Bahn des grossen Kreislaufes zu gelangen, muss jede Verkleinerung dieses Capillargefässnetzes der Lungen durch Zerstörung ein Hinderniss im Kreislaufe des Blutes überhaupt bewirken, und bei den Lungenkranken müssen Anstrengungen des Herzens, Neigung zur Blutanhäufung in den Lungen, und Disposition zur Lungenentzündung und fieberhafte Aufregung etwas Gewöhnliches seyn. Jedes andere Organ kann ganz zerstört seyn, ohne dass der Blutlauf in den übrigen gehemmt wird, aber die Zerstörung der Lungen ist ein allgemeines Hinderniss des Kreislaufes, woraus die Warnung hervorgeht, dass die Lungenkranken Alles zu vermeiden haben, was noch mehr Hinderniss und Aufregung in dem Kreislaufe verursacht. Es lässt sich auch hieraus erklären, warum grosse Zerstörungen anderer Theile, wenn sie nur ohne beständigen Säfteverlust sind, nicht immer Fieber erregen, dagegen die Zerstörungen der Lungen so leicht mit hektischem Fieber verbunden sind. Desorganisationen in anderen Theilen bewirken vorzugsweise nur örtliche Hindernisse der Circulation, z. B. Stockungen des Blutes und Austritt von Blutwasser in den örtlichen Wassersuchten, in der Bauchwassersucht nach Desorganisation der Leber etc., ein Ausgang in Wasserergiessung, der bei Lungenzerstörungen verhältnissmässig seltener ist. Wenn die Capillargefässe der Lungen durch fremde Stoffe verstopft werden, die in den Kreislauf gelangt sind, wie durch Oel, Schleim, metallisches Quecksilber, Kohlenpulver, Schwefelpulver, die in Venen injicirt worden, so ist der Tod unvermeidlich, und folgt sehr schnell, wie Gaspard gezeigt hat.

Die Isolation der Blutbahn der Lungen von der Blutbahn des übrigen Körpers würde vollständig seyn, wenn nicht die Bronchialarterien mit den feineren Zweigen der Lungenarterie communicirten. Bei Verengerungen der Art. pulm. und ihrer Aeste werden diese Verbindungen stärker. Hören die chemischen Veränderungen des Blutes in den Lungen auf durch Unterbrechung der Athembewegungen oder durch Athmen irrespirabler Gasarten, so fliesst kein hellrothes, sondern dunkelrothes Blut von den Lungen zurück.

b. Grosse Blutbahn des Körpers.

Aus den Lungenvenen tritt das arteriell oder hellroth gewordene Blut in den linken Vorhof, und der sogenannte grosse Kreislauf oder richtiger derjenige Theil der Blutbahn, welchen das Blut im ganzen Körper mit Ausnahme der Lungen beim ganzen Kreislaufe beschreibt, beginnt nun, um das arterielle Blut in die Arterien, sofort in die Capillargefässe des Körpers, und, hier venös oder dunkelroth geworden, in die Körpervenen und endlich zum rechten Herzen zurückzuführen. Wenn sich der linke Vorhof (gleichzeitig mit dem rechten) erweitert, stürzt das Blut der Lungenvenen in den linken Vorhof, und zum Theil schon in die linke Kammer, sobald diese erschlafft. Die Contraction dieses Vorhofes treibt das Blut in die erweiterte Kammer, die nun bis auf ihren höchsten Punkt gefüllt ist. Bei der nun folgenden Con-

Digitized by Google

traction der linken Kammer schliesst sich die Valvula mitralis an der Vorhofsöffnung derselben, und das Blut strömt zwischen den aus einander weichenden Valvulae seminulares am Ostium arteriosum in die Aorta, welche die einmal in ihr enthaltene Blutsäule nicht wieder zurücktreten lässt, da durch Druck von der Aorta aus diese Taschenventile ausgebreitet werden. Die Gewalt, womit sich die linke Kammer zusammenzieht, ist viel stärker als die der rechten Kammer, auch sind bekanntlich die Wände der erstern gegen 3mal dicker als die der letztern, beim Erwachsenen. Diese Gewalt der linken Kammer musste grösser seyn, da die Körperbahn grösser als die Lungenbahn, und erstere einen ungleich grössern Widerstand in den Capillargefässen aller Organe durch Reibung darbietet.

Von der Aorta aus vertheilt sich das Blut, mit jedem Herzschlage von einer neuen Masse gedrängt, im ganzen Körper mit Ausnahme der Lungen, und geht durch die Capillargefässe in die Venen über.

Bei grossen körperlichen Anstrengungen muss die Bewegung des Blutes in den Capillargefässen in einem grossen Theile des Körpers aufgehalten werden durch den Druck der wiederholten Zusammenziehungen vieler Muskeln. Je ausgebreiteter dieses Hinderniss wird, um so mehr gleicht es demjenigen Aufenthalte der Blutbewegung, der in den Lungen schon durch kleine Hindernisse bewirkt wird. Es stellen sich dann auch ähnliche Wirkungen ein, die Blutsäule der Arterien setzt der Kraft des Herzens einen grössern Widerstand als gewöhnlich entgegen. Das Blut circulirt nicht frei und schnell genug durch die Lungen und häuft sich an, so dass zu gleicher Zeit nicht Blut genug athmet, daher die Athembeschwerden bei solchen Anstrengungen, die man wohl weniger richtig von einem vermehrten Athembedürfniss bei grösserer Muskelbewegung ableitet. Die anhaltende Zusammenziehung der Muskeln bei gewissen Bewegungen, wo einzelne Glieder dauernd bewegt werden, ist auch mit einer Anhäufung des Blutes in diesen Theilen verbunden.

Die feinen Arterien stehen in jedem Organe, noch ehe sie in die Capillargefässnetze übergehen, unter einander in vielfacher Verbindung, wie jede feine injicirte Membran zeigt, und an vielen Stellen erhält derselbe Theil zuführende grössere Arterien aus sehr verschiedenen Gegenden des Gefässsystemes, wie das Gehirn von der Carotis cerebralis und Art. vertebralis. Jedermann kennt die Verbindungen zwischen den Art. epigast. intercost. mammar. etc. Diess wiederholt sich an allen Orten, und da das Capillargefässsystem aller zusammenhängenden Theile continuirlich ist, so sind alle zuführenden und abführenden Gefässe in dem continuirlichen Capillargefässnetze des ganzen Körpers verbunden, so dass, wenn das gewöhnliche zuführende Gefäss eines Theils verschlossen wird, leicht ein neues dessen Stelle ersetzt. So sind durch die feinsten Arterien und durch die Capillargefässnetze alle juxtaponirten Theile eines Organes oder mehrerer Organe in Wechselwirkung gesetzt. Die Capillargefässe des ganzen Körpers, die Anastomosen der zuführenden Gefässe bilden auf diese Art

Digitized by Google

ein ununterbrochenes Netzwerk, welches von unzähligen Arterien aus Blut erhält, und von verschiedenen Wegen bald unmittelbarer, bald mittelbarer von Blut durchdrungen werden kann. Ohne dass nun neue Gefässe entstehen, durch blosse Erweiterung früherer Communicationen, können sich daher neue Wege der Zufuhr ausbilden, wenn die gewöhnlichen verschlossen sind, und so erklärt sich das Phänomen des Collateralkreislaufes, oder die Wiederherstellung des Kreislaufes durch einen Theil nach Verschliessung seines grossen Gefässstammes. Im Anfange erweitern sich eine Menge anastomosirender Zweige, und allmählig bilden sich einzelne stärkere Stämme wieder aus. Bei Thieren lässt sich sogar die Aorta abdominalis ohne absolut tödtlichen Erfolg unterbinden, dagegen man diese Operation beim Menschen bisher zweimal nur mit tödtlichem Erfolge gemacht hat. Dagegen hat man beim Menschen schon alle übrigen grossen Arterienstämme, welche zugänglich sind, mit Erfolg, wo es nöthig war, unterbunden. Es sind sogar Erfahrungen vorhanden, dass, wenn, die Verschliessung nur allmählig geschieht, selbst die Verschliessung der Aorta hinter dem Ursprunge der Arterien der oberen Theile des Körpers die Entwickelung eines Collateralkreislaufes nicht ausschliesst, so dass durch Erweiterung von Anastomosen der Art. mammaria int. und intercost. prima etc. mit den intercostalarterien doch wieder das Blut in den unter der Verschliessung befindlichen Theil der Aorta durch Umwege gelangt. Siehe den von A. Meckel beobachteten Fall *Archiv.* 1827. *Tab.* 5. In einem ähnlichen von Reynaud (Frorier's *Not.* 537.) beschriebenen Falle waren die Hauptverbindungen zwischen der Subclavia jeder Seite, und dem unter der Verschliessung liegenden Theile der Aorta durch Anastomosen der Cervicalis profunda, transversalis cervicis, intercostalis prima mit den Intercostalarterien, und zwischen der Subclavia und der Cruralarteria durch directe Verbindung der mammaria interna und epigastrica bewerkstelligt.

Das durch die Arterien verbreitete Blut, von immer neuen Blutmassen aus dem linken Ventrikel gedrängt, folgt der durch die Gefässe verzeichneten Bahn, und geht aus den feinsten Arterien durch die Capillargefässnetze in die feinen Venen über, um sich weiter in grösseren Venen zu sammeln, und dem rechten Herzen wieder zuzuströmen. Diesen Uebergang kann man in vielen durchsichtigen Theilen mikroskopisch beobachten, so dass er nicht allein ein Schluss aus der Bewegung des Blutes in den Arterien und Venen, sondern ein Gegenstand der unmittelbaren Beobachtung ist.

Hierzu dient die Schwimmhaut der Frösche, der Schwanz junger Fische und der Salamander-, Frosch- und Krötenlarven, das Mesenterium aller Wirbelthiere, die Flügel der Fledermäuse, die Keimhaut des Eies der eierlegenden Thiere. Siehe die Abbildungen der blutführenden Capillargefässe von der Area vasculosa des Eies in Pander *Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Ei*; von jungen Fischchen Doellinger *Denkschr. der Akad. der Wissensch. zu München, Bd.* 7.; von der Schwimmhaut der Frösche Schultz, *der Lebensprozess im Blute, Berlin* 1822. Marshall

Hall *tab.* 3.; von verschiedenen Theilen der Frösche und Säugethiere Kaltenbrunner *exp. circa statum sang. et. vas. in inflammatione. Monach.* 1826.; vom Gekröse der Frösche Reichel *de sanguine ejusque motu. Lips.* 1767. Marshall Hall a. a. O, *tab.* 4.; vom Schwanze des Stichlings Marshall Hall a. a. O. *tab.* 1.; von Fisch-, Frosch- und Salamanderembryonen und Larven Baumgaertner *über Nerven und Blut. Freiburg* 1830. Man sieht die Blutkörperchen deutlich aus sich verzweigenden kleinsten Arterien in nicht weiter dünner werdende Gefässe von netzförmiger Bildung sich ergiessen, und sich aus diesen wieder in dicker werdende und aus Zweigen sich bildende Anfänge der Venen sammeln. Die Blutkörperchen fliessen in den feinsten Capillargefässen einzeln hinter einander, und oft mit Unterbrechung; wenn sie einzeln fliessen, sind sie fast farblos, dichter gehäuft erscheinen sie gelb, noch dichter gelbroth und roth. Bei den noch kräftigen Thieren fliessen sie anhaltend ohne Stoss; wenn die Thiere schwach sind und die Bewegung sich verlangsamt, sieht man die stossweise Bewegung, so dass sie zwar immer fort strömen, aber stossweise schneller strömen; bei noch schwächeren Thieren werden sie nur im Momente des Herzschlages fortgetrieben, und weichen dann auch wohl wieder etwas zurück. Wo mehrere arterióse Strömchen in eine Anastomose zusammenkommen, ist ein Strömchen immer vorherrschend, und durchströmt die Anastomose allein, um sein Blut dem andern Strömchen beizumengen. So sammeln und theilen sich die Strömchen auch in den netzförmigen feinsten Gefässen, bis alles wieder in den Anfängen der Venen gesammelt wird. Zuweilen verändert sich die Richtung eines Strömchens, wenn ein anderes Strömchen stärker wird, und das frühere bestimmende schwächer, je nach dem Druck auf die Theile des Thieres. Alle Kügelchen gehen aus den Arterien in die Venen über, und Niemand ist es leicht begegnet, was Doellinger gesehen haben wollte, dass einzelne Kügelchen haften bleiben und sich mit der Substanz verbinden. Ich glaubte früher zuweilen bei stockendem Kreislaufe so etwas zu sehen, aber bei weiter fortgesetzten Beobachtungen sah ich auch die Kügelchen fortrücken, wenn die Bewegung wieder anhielt. Drückt man das Glied oder unterbindet man es, so steht alles augenblicklich stille und kein Kügelchen verändert seinen Ort mehr.

Während des Durchganges des Blutes durch die Capillargefässe wird das Blut dunkelroth. Die Bewegung des Blutes in den Venen ist nicht stossweise verstärkt, sondern gleichförmig. Diejenigen Venen, welche dem Drucke der Muskeln ausgesetzt sind, haben Klappen, Taschenventile, welche dem Blute die rückgängige Bewegung nach den Capillargefässen versperren, wodurch jeder Druck auf die Venen, statt die Bewegung aufzuhalten, das Blut nach dem Herzen befördert. Die Klappen fehlen in den Venen der in Höhlen geschützten Theile ganz. In den Lungenvenen hat Mayer unvollkommene Klappen beobachtet. An der Pfortader der Pferde hat E. H. Weber Klappen beobachtet, die beim Menschen fehlen.

Digitized by Google

c. Kleinste Blutbahn des Pfortadersystems.

Die Venen, welche sich zur Pfortader der Leber vereinigen, führen das Venenblut ihrer Theile zur Leber in das Capillargefässsystem derselben, zu welchem auch das Blut der Leberarterien gelangt. Vergl. p. 173. Auf diese Art gelangt also das Blut der Milz, des Darmkanales, des Magens, des Pankreas, des Mesenteriums nicht unmittelbar, sondern auf einem Umwege in die untere Hohlvene. Prof. Retzius in Stockholm hat indess beim Menschen auch einige feinere Verbindungen zwischen Darmvenen und Zweigen der untern Hohlvene entdeckt, wie er mir brieflich mitgetheilt hat. Als er nämlich die Vena cava und die Vena portae mit sehr feinen kalten Massen von verschiedenen Farben injicirte, fand er, dass das ganze Mesocolon und Colon sinistrum mit beiden injicirt war, und dass beiderlei injicirte Gefässe an mehreren Stellen Anastomosen bildeten. Die Venen vom Colon und Mesocolon, welche dem Systeme der Vena cava angehörten, gingen zur Vena renalis sinistra, und lagen äusserlich, dahingegen diejenigen, welche der Pfortader angehörten, grösstentheils näher der Schleimhaut lagen. Auch die äussere Oberfläche des Duodenums hatte Injection von der Vena cava aufgenommen. Breschet hat die V. mesenterica minor durch Aeste der V. cava inf. angefüllt, und Schlemm hat offene Verbindungen der V. mesent. minor mit Gefässen von der Vena cava inf. am After gefunden. Eine Beobachtung, welche uns anzeigt, dass man mit Erfolg Blutentziehungen am After in Stockungen und Congestion des Blutes, vielleicht sogar Entzündungen des Darmkanales, machen wird.

Das Blut der Pfortader der Wirbelthiere, und das Blut der Venae renales advehentes bei den Fischen und Amphibien hat zum zweiten Mal den Widerstand der feinen Kanäle eines Capillargefässsystems zu überwinden, ehe es wieder zum Herzen gelangt. Bei den Larven der Salamander habe ich die Beobachtung gemacht, dass man den Blutlauf in der Leber mit einem einfachen Mikroskope bei Beleuchtung von oben betrachten kann. Meckel's *Archiv* 1828. Diese von R. Wagner bestätigte Beobachtung ist von grosser Wichtigkeit. Man kann hier ganz deutlich sehen, dass das Blut der Pfortader bei dem Durchgange durch die Capillargefässe der Leber in die Lebervenen nur in den Interstitien der Acini verläuft, und man kann hier sogar die einzelnen Blutkörperchen, so deutlich wie sonst in durchsichtigen Theilen, beobachten. Siehe die Abbildung in meiner Schrift de *gland. penit. struct. tab.* 10. *fig.* 10. Ich habe bemerkt, dass das Blut in der Hohlvene, wie in allen Rinnen der Lebervenen, stossweise floss, wahrscheinlich, weil während der Contraction des rechten Vorhofes das Blut aufgehalten wird, oder wegen der regelmässigen Zusammenziehungen des untern Hohlvenenstammes, (die man bei Fröschen sieht). Es ist kein Unterschied in der Farbe des Blutes in der Hohlvene, in der Pfortader, in den Lebervenen zu bemerken.

Nach der allgemeinen Beschreibung des Kreislaufes ist jetzt

Digitized by Google

die Geschwindigkeit des Kreislaufes zu untersuchen und auszumitteln, in wie viel Zeit das Blut den ganzen Circuitus vollendet. Von der Geschwindigkeit des ausfliessenden Blutes kann man nicht auf die Geschwindigkeit in den Gefässen schliessen. Der Ausfluss erfolgt unter dem ganzen Drucke, dem das Blut in den Gefässen ausgesetzt ist. In den Gefässen kann jede neue Blutmasse nur durch Weiterrücken der übrigen Masse fortgeschoben werden, und es muss der Widerstand der Reibung in den engeren Gefässen überwunden werden.

Ueber die Zeit, in welcher der Kreislauf des Blutes vollendet ist, sind sehr dankenswerthe Untersuchungen von Hering (*Zeitschrift für Physiologie.* 3. *p.* 85.) vorhanden. Aus 18 Versuchen an Pferden hat Hering folgende Resultate erhalten: Die Zeit, welche eine dem Blute unmittelbar beigemischte verschieden starke Auflösung von blausaurem Eisenoxydulkali brauchte, um von der einen Jugularvene eines Pferdes durch das rechte Herz, den kleinen Kreislauf, durch das linke Herz, den grossen Kreislauf bis in die entgegengesetzte Jugularvene zu kommen, ist zwischen 20 und 25, und zwischen 25 und 30 Sekunden; von der Jugularvene bis zur Vena saphena magna nur 20 Sekunden, von der Vena jugul. bis in die Arteria masseterica zwischen 15 und 30 Sekunden, bis in die Art. maxill. externa einmal zwischen 10—15 Sekunden, ein andermal zwischen 20 und 25 Sekunden, von der Vena jugul. bis in die Art. metatarsi zwischen 20 und 25 Sekunden, 25 und 30 Sekunden, und einmahl mehr als 40 Sekunden. Das Resultat war ziemlich gleich bei verschiedener Häufigkeit des Herzschlages. Hering's Resultate stehen indess mit der Voraussetzung über die Menge des Blutes und über die Menge Blut, welche mit jedem Herzschlage weiter gebracht werden kann, im Widerspruch. Nach Wrisberg hatte eine Frau durch tödtlichen Mutterblutsturz 26 Pfund Blut verloren, und bei der Enthauptung einer Vollblütigen sammelte man 24 Pfund Blut. Wenn man annimmt, dass 2 Unzen Blut bei jedem Herzschlage des Menschen weiter gefördert werden, so dauert der Umlauf bei 20 Pfund (bürgerl. Gewicht) Blut 160, bei 10 Pfund Blut, wie Herbst die Blutmasse des Menschen schätzt, 80 Herzschläge. Ueber die Blutmenge siehe Herbst *de sang. quantitate. Götting.* 1822. Mit mehr Sicherheit kann man daher annehmen, dass der Blutumlauf beim Menschen in 80—214 Herzschlägen, oder in 1—2 Minuten vollendet ist. Vergl. Burdach *Physiol.* 4. 101. 253.

Die Zeit, in welcher das Blut den Weg von der einen zur andern Herzhälfte, oder die Hälfte des Kreislaufes zurücklegt, ist für verschiedene Organe sehr verschieden. Das Blut, das von dem linken Herzen durch die Vasa coronaria cordis zum rechten Herzen gelangt, braucht einen ausserordentlich viel kürzeren Zeitraum zu dieser Bahn, als das Blut, welches vom linken Herzen dem Fusse zuströmt und zum rechten Herzen zurückkehrt, und so bildet die Circulation vom linken Herzen zum rechten unendlich viele verschieden grosse Bogen, wovon der kleinste der durch die Kranzgefässe oder ernährenden Gefässe des Herzens selbst ist. Der Weg vom rechten Herzen durch die Lungen zum lin-

Digitized by Google

ken Herzen ist kürzer als die meisten dieser Bogen im grossen Kreislaufe, und das Blut legt diesen Weg ceteris paribus viel schneller zurück als in den meisten Gefässen, welche zum grossen Kreislaufe gehören.

Obgleich die Menge Blut, welche im grossen Kreislaufe in jedem Augenblicke enthalten ist, wegen der grössern Bahn ausserordentlich viel grösser ist, als die Menge innerhalb des kleinen Kreislaufes, so fliesst doch an einer gedachten Stelle der Arteria pulmonalis in einem Zeitraume eben so viel Blut vorbei, als an einer gadachten Stelle der Aorta; denn es kann an jedem Orte der Hauptstämme der in sich verschlossenen Bahn nur so viel Blut abfliessen, als an einer andern Stelle zuströmt. (Dagegen kann die Circulation in den kleineren Gefässen sehr variiren.) Denkt man sich ferner die Uebergänge der Arterien in Venen in den Lungen und im übrigen Körper gleich dick, so müssen in den Lungen auf einer gewissen Stelle ausserordentlich vielmal mehr Capillargefässe zusammengedrängt seyn, als auf einer gleich grossen Stelle im übrigen Körper. Diess bestätigt die Beobachtung, indem schon in den Lungen der Frösche die Zwischenräume zwischen den Capillargefässen kaum grösser, beim Menschen fast kleiner als die Capillargefässe selbst dick sind, wie Cowper, Wedemeyer, Marshall Hall, Prevost und Dumas (vom Menschen Weber) gezeigt haben, und ich wieder finde. An den Lungen der Salamander und Frösche wenigstens sind, wie Wedemeyer und Marshall Hall zeigen, die feinsten Zweige der Lungengefässe auf den Lungenzellen gleichsam siebförmig durchlöchert, und das Blut fliesst zwischen sehr kleinen Inselchen aus dem Siebe der einen Gefässchen in das Sieb der anderen Gefässchen über.

Endlich ist zu bemerken, dass die Geschwindigkeit des Blutes in den kleinen Aesten kleiner seyn muss, als in den Stämmen der Gefässe überhaupt, weil die Capacität der Aeste eines Stammes zusammengenommen grösser scheint als die Area des Stammes selbst, obgleich dieses Verhältniss keineswegs als streng erwiesen zu betrachten ist. Denkt man sich aber alle Aeste eines Organes vereinigt, und den Kreislauf als eine in sich zurückkehrende Bahn dieses Blutstroms, so geht an allen Stellen dieser Bahn in gleicher Zeit gleichviel Blut vorüber, während die Theilchen derselben Masse sich schneller bewegen müssen, wenn die Röhren eng werden, langsamer in weiten Röhren, so dass dort bei langsamer Bewegung der Theilchen in weiteren, hier bei schnellerer Bewegung in engeren Röhren, doch überall dieselbe Masse Blut in gleich viel Zeit an allen Stellen der Blutbahn weiter gefördert wird.

III. Capitel. Vom Herzen als Ursache des Kreislaufs.

Das Herz zieht sich auf mechanische oder galvanische Irritation gleich den anderen muskulösen Theilen zusammen. Soemmerring, Behrends, Bichat haben den Einfluss des Galvanismus

Digitized by Google

auf das Herz geläugnet, allein ich habe häufig Humboldt's und Fowler's Versuche bestätigt gefunden, und sowohl bei Fröschen als beim Hunde, bei denen die Zusammenziehungen des Herzens aufgehört hatten, durch ein einfaches Plattenpaar oder durch eine schwache galvanische Säule die Zusammenziehungen erregt. Das Herz unterscheidet sich aber mit den nur unwillkührlich beweglichen Theilen, Darmkanal etc., von den übrigen Muskeln, dass der Reiz nicht eine momentane Zuckung, sondern anhaltend eine Reihe rhythmischer Bewegungen erregt, wie sie den meisten unwillkührlich beweglichen Theilen eigen sind. Da das Herz nun gleich allen Muskeln durch Reize zur Contraction angeregt wird, so liegt es sehr nahe anzunehmen: dass das Blut der Herzhöhlen selbst das Herz zu Contractionen reizt, um so mehr, da das Herz sogleich schwächer schlägt, wenn es weniger Blut enthält. Dass diese Contractionen rhythmisch sind, hat man sich daraus erklärt, dass das Herz durch die Contraction den Reiz, nämlich das Blut, nach der einen Seite entfernt, während diese Ortsveränderung des Blutes wieder die Ursache ist, dass von Seiten der Venen das Herz wieder mit Blut gefüllt wird. Auch liesse sich hiernach einsehen, wie die Contractionen der Vorkammern und Kammern alterniren, da die eine Höhle durch ihre Contraction die Ursache wird, dass die andere Höhle sich wieder anfüllt. So nothwendig indess eine gewisse Blutmenge und eine gewisse Anfüllung der Herzhöhlen zur Unterhaltung der Thätigkeit des Herzens ist, und so gewiss jede mechanische Ausdehnung des Herzens von innen Zusammenziehung in ihm hervorrufen muss; so ist der Reiz des Blutes in den Herzhohlen doch nicht der letzte Grund der rhythmischen Zusammenziehungen des Herzens. Denn auch das blutleere Herz setzt seine Contractionen noch schwächer fort. Man könnte das Rhythmische in der Contraction des Herzens auch davon ableiten, dass jede Zusammenziehung das Blut in den ernährenden Gefässen des Herzens zurücktreibt, mit dem Aufhören der Zusammenziehung aber wieder Zuströmen des Blutes in die kleinsten Gefässe der Herzsubstanz unter dem beständigen Drucke des Blutes von den elastischen Arterienhäuten eintritt, so dass die feinsten Gefässe des Herzens bei jeder Erschlaffung mit mehr Blut gefüllt werden, diese Anfüllung mit hellrothem Blute nun wieder die Ursache der Contraction wäre. Diese Ansicht wird aber durch denselben Einwurf widerlegt. Denn das Herz der Thiere, besonders der Amphibien und Fische, zieht sich auch ausgeschnitten und blutleer rhythmisch, bei Amphibien Stunden lang, und zwar in derselben Folge von Vorhöfen und Kammer zusammen. Nun könnte man zwar diess von dem Reize der Luft ableiten, und an jenes pag. 57. erläuterte Gesetz erinnern, dass, wenn ein Reiz auch beständig ist, die Contractionen doch oft noch periodisch erfolgen können. Allein dasselbe geschieht im luftleeren Raume, und ohne einen inneren Grund könnte sich nicht die regelmässige Aufeinanderfolge der Ventricular-Contraction auf die Contraction der Vorhöfe erhalten. Die Ursache muss also viel tiefer liegen. Es muss in der Organisation des Herzens und in der beständigen Wechselwirkung des

Digitized by Google

Blutes in den kleinsten Gefässen mit der Herzsubstanz, oder in der Wechselwirkung der Herznerven und der Herzsubstanz etwas liegen, was entweder anhaltend wirkt, worauf aber das Herz nach dem pag. 57. erläuterten Gesetze nur periodisch reagirt, oder das selbst periodisch auf das Herz einwirkt. Die Lösung dieser Frage ist unendlich schwierig, bei dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft unmöglich.

1) *Abhängigkeit des Herzens vom Athmen.* Sobald die chemischen Veränderungen des Blutes in den Lungen aufhören, durch Verletzungen der Nerven, welche die Athembewegungen aufheben, oder durch mechanische Hindernisse des Athmens oder irrespirable Luftarten, wird die Lebensthätigkeit aller Organe geschwächt, und bei den höheren Thieren sogar schnell aufgehoben. Obgleich dann, wie Bichat und Emmert (Reil's *Archiv* 5. 401.) gezeigt haben, die Bewegung des dunkelroth gewordenen Blutes der Arterien nicht sogleich aufhört, und, obgleich das Herz nach dem scheinbaren allgemeinen Tode selbst bei warmblütigen Thieren noch über $\frac{1}{2}$ Stunde in einzelnen Fällen schwach und langsam zu schlagen fortfährt, so wird es doch durch Hinderniss des Athmens wenigstens so sehr in seiner Wirkung geschwächt, dass der Kreislauf schon bald nicht mehr unterhalten werden kann; dagegen sich bei allen Thieren, deren Athembewegungen durch Verletzungen des Gehirns, besonders der Medulla oblongata, oder durch Vergiftung aufgehoben sind, durch künstlich unterhaltenes Athmen mit Lufteinblasen und Ausdrükken, der Kreislauf viel länger unterhalten lässt. Bei einem nach Unterbindung der Halsgefässe geköpften Hunde sah Brodie unter künstlichem Athmen das Herz noch $2\frac{1}{2}$ Stunden 35mal, und bei einem andern noch $1\frac{1}{2}$ Stunden 30mal in der Minute schlagen. (Reil's *Archiv* 12. 140.) Bei den kaltblütigen Thieren ist dieser Einfluss des Athmens oder des hellrothen Blutes auf das Herz viel geringer, denn ich habe Frösche, denen ich die Lungen unterbunden und abgeschnitten hatte, noch 30 Stunden bei andauernder Thätigkeit des Herzens fortleben sehen. Da nun aber Frösche nach der Zerstörung des Gehirns und Rükenmarkes schneller die Kraft des Herzens verlieren (in 6 Stunden hören die Contractionen auf), so folgt hieraus, dass die Frösche nach dem Abschneiden der Lungen entweder durch die Haut das Athmen einigermaassen ersetzen können, oder dass sehr wahrscheinlich das Gehirn und Rückenmark viel nöthiger sind zur Unterhaltung der Bewegungen des Herzens, als das Athmen selbst. Denn Frösche leben, wenn sie weder mit den Lungen, noch mit der Haut athmen können, in reinem Wasserstoffgas doch noch über 12 Stunden, wie ich selbst sah. Es könnte sogar die endliche Unterbrechung der Herzthätigkeit nach Unterbrechung des Athmens grossentheils auch von der Veränderung des Nervensystems herrühren, die erfolgt, wenn es kein hellrothes Blut mehr empfängt.

Die Störung des Kreislaufes nach Unterbrechung des Athmens bei den höheren Thieren ist jedenfalls nicht von dem Collapsus der Lungen bedingt, insofern diese im collabirten Zustande

Digitized by Google

dem Durchgange des Blutes ein Hinderniss darbieten könnten. Denn wie Bichat und Emmert zeigten, dauert die Bewegung des Blutes in den Arterien anfangs noch ungestört fort.

Goodwyn hat die Schwächung des Kreislaufes nach Unterbrechung des Athmens bei den höheren Thieren davon abgeleitet, dass der linke Ventrikel kein hellrothes Blut mehr erhalte, und vorausgesetzt, dass zur Thätigkeit des linken Herzens dieser Einfluss durchaus nothwendig sey. Dagegen erinnert Bichat, dass das bei nicht athmenden Thieren von den Lungen zum Herzen kommende dunkelrothe Btut die Zusammenziehungen des Herzens nicht sogleich aufhebe. Obgleich diese und andere von Bichat (*rech. sur la vie et la mort*) hiergegen angeführte Gründe gar nichts beweisen, so ist es doch durchaus nicht wahrscheinlich, dass beide Herzhöhlen eine specifische Reizbarkeit für verschiedene Blutarten haben. Denn beim Foetus, wo die Vorhöfe durch das Foramen ovale communiciren, und überhaupt kein Athmen in den Lungen, sondern nur eine gewisse Veränderung des Blutes in der Placenta bewirkt wird, enthalten beide Herzhälften einerlei Blut. Wenn das hellrothe Blut durch eine unmittelbare Wirkung auf das Herz zur Unterhaltung der Herzbewegung wirklich nothwendig ist, so ist Bichat's Meinung viel wahrscheinlicher, dass durch Unterbrechung des Athmens das Herz darum seine Reizbarkeit verliere, weil seinen Muskelfasern durch die Kranzarterien oder ernährenden Gefässe des Herzens nun kein hellrothes Blut, sondern dunkelrothes Blut zugeführt wird. So gewiss nun dieser Einfluss zu seyn scheint, so lässt sich doch nicht ermessen, in welchem Verhältniss dieses Bedürfniss zum Bedürfniss des Nerveneinflusses auf das Herz steht, indem alle Veränderungen des Athmens auch den Einfluss der Nerven auf die übrigen organischen Theile verändern.

2) *Abhängigkeit des Herzens von den Nerven.* Obgleich die Veränderung des Herzschlages in den Leidenschaften und anderen Veränderungen des Nervensystems augenscheinlich ist, indem der Herzschlag z. B. in allen plötzlichen Leidenschaften, excitirenden sowohl als deprimirenden, anfangs gestört, dann häufiger, und zwar in ersteren heftig und häufig, in letzteren schwach und häufig wird, so haben doch Einige diesen Einfluss nicht nöthig gehalten zur Bewegung des Herzens. Haller behauptete diese Unabhängigkeit, weil das ausgeschnittene Herz sich zusammen zu ziehen fortfährt, weil die Reizung der Herznerven nicht jene Convulsionen erzeugt, die die Reizung der Nerven in den übrigen Muskeln erzeugt.

Die Untersuchungen über diesen Gegenstand beginnen wieder mit der Arbeit von Soemmerring und Behrends über die Herznerven 1792, welche zu beweisen suchten, dass die Herzsubstanz gar keine Nerven erhalte, und dass alle Fäden der Herznerven in der Substanz des Herzens nur den Häuten der Herzgefässe angehören. Hierdurch schien Haller's Lehre von der Zusammenziehungskraft der Muskeln bestätigt zu werden, dass nämlich die Muskeln durch sich selbst und nicht durch ihre Wechselwirkung mit den Nerven Bewegkraft besitzen, dass die

Digitized by Google

Nerven gleich wie die äusseren (mechanischen, elektrischen, chemischen) Reize Bewegungen der Muskeln veranlassen, und es folgt also, dass das Herz, indem es dem Einflusse der Nerven entzogen ist, durch das Blut selbst zu Bewegungen gereizt wird. Soemmerring's und Behrends Versuche, dass der Galvanismus keine Zusammenziehungen des Herzens bewirke, da er diess doch in allen mit Nerven versehenen Muskeln thut, schienen diese Ansicht noch mehr zu bestätigen. Allein Scarpa zeigte, dass die Herznerven allerdings auch sehr zahlreich in dem Muskelfleische des Herzens sich verbreiten. v. Humboldt, Pfaff, Fowler und Wedemeyer haben durch Galvanismus Zusammenziehungen des Herzens bewirkt, und mir ist dasselbe sowohl bei Fröschen als Säugethieren gelungen. Humboldt hat sogar durch Galvanisiren der Nervi cardiaci bei Säugethieren Bewegungen des Herzens hervorgerufen. *Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser.* 1. 342. Die Nerven können sonst, wie Burdach mit Recht bemerkt, auch als feuchte Leiter wirken, wenn der eine Pol auf sie, der andere auf das Herz applicirt wird. Burdach sah aber wirklich Verstärkung des Herzschlages eines getödteten Kaninchens, als er das Halsstück des sympathischen Nerven oder das untere Halsganglion armirte. *Physiol.* 4. 464. Solche Versuche über die motorische Kraft von Nerven sind bloss beweisend, wenn die Nerven allein armirt werden, und wenn die galvanische Action sehr schwach ist. Starke Entladungen werden hierbei von jeder Stelle aus durch feuchte Leiter, und so durch Nerven, zum Herzen selbst bloss durchgeleitet. Die Versuche von Burdach, in welchen er bei einem getödteten Kaninchen durch Betupfen des sympath. Nerven mit caust. Kali oder ätzendem Ammonium den Herzschlag wieder beschleunigte, sind daher um so interessanter, besonders auch, da bei einem getödteten Kaninchen keine schmerzhaften Empfindungen mehr einwirken, und den Herzschlag verändern können. Dieser Versuch wollte mir bei Wiederholung nicht so gelingen. Die Versuche, welche Brechet (*rech. sur le syst. ganglionaire*) und Andere über Reizung der Nerven an lebendigen Thieren angestellt haben, können in Hinsicht des Herzens gar nichts erweisen, da der Herzschlag so sehr bei schmerzhaften Empfindungen sich ändert.

Endlich unterscheidet sich das Herz wieder von anderen Muskeln, dass es ausgeschnitten und leer, besonders bei kaltblütigen Thieren, auch ohne Reiz sich zusammen zu ziehen fortfährt, dass es hierbei selbst die regelmässige Aufeinanderfolge in den Abtheilungen des Herzens beobachtet, Verhältnisse, die man nicht anders als aus einem specifischen Einflusse der noch übrigen Nerven in der Substanz des ausgeschnittenen leeren Herzens erklären kann, welcher somit die letzte Ursache der Contractionen des Herzens zu seyn scheint, um so mehr, da die Reizungen der Nerven durch Reizungen des Gehirns und Rückenmarkes, und Leidenschaften einen so grossen Einfluss auf die Veränderung der Thätigkeit des Herzens haben. Könnte man Einflüsse, welche die belebende Wirkung der Nerven zerstören, ohne zugleich das Zusammenziehungsvermögen der Muskeln auch aufzuheben,

Digitized by Google

so würde man diese Frage bis zur Gewissheit entscheiden können; allein die Narkotika, welche an Nerven applicirt, diesen ihre Fähigkeit nehmen, auf Reize, die auf die Nerven angebracht werden, Bewegung der mit ihnen verbundenen Muskeln hervorzurufen, wirken eben so auf die Muskeln applicirt und machen sie unfähig, durch Reizung der Nerven ihre Zusammenziehungskraft zu äussern. Das Opium auf das Herz eines Frosches angewandt, hebt dessen Bewegungen bald auf, (sehr schnell wenn es auf die innere Fläche des Herzens angewandt wird, viel später, wie Henry zeigte, wenn es auf dessen äussere Fläche applicirt wird). Indessen beweist die plötzliche Veränderung und Stockung des Herzschlages nach einer gewaltsamen Zerstörung des ganzen Rükkenmarkes jedenfalls, das die Nerven des Herzens einen grossen Antheil an dessen Bewegungen haben.

Ob dieser Einfluss unmittelbar von den Herznerven und ihren Quellen, dem Nervus sympathicus ausgehe, oder ob das Gehirn und Rückenmark diese Nerven mit derjenigen Kraft versehen, wodurch sie die Bewegungskraft des Herzens erhalten, ist eine andere Frage. Diese Frage wurde vorzüglich durch Bichat in Anregung gebracht. Bichat trennte genauer die Functionen der physiologisch verschiedenen Nervenstämme, der Cerebro-Spinal-Nerven und des Nervus sympathicus. Die Nerven des Gehirns und Rückenmarkes, welche willkührliche Bewegungen veranlassen können, wenn sie sich in Muskeln verbreiten, sind in einer grossen Abhängigkeit von diesen Organen; die Unterbrechung ihres Zusammenhanges mit dem Gehirn oder Rückenmarke hebt ihren Einfluss zur Erregung willkührlicher Bewegungen auf. Die Nerven des Rückenmarkes sind eben so gelähmt, wenn die Leitung zwischen ihnen und dem Gehirn durch Verletzung des Rückenmarkes aufgehoben ist, obgleich ein vom Gehirn oder Rückenmarke getrennter Nerve bei mechanischer oder galvanischer Reizung noch unwillkührliche Bewegung des mit ihm verbundenen Muskels bewirkt. Die von dem Nervus sympathicus versehenen Theile, Herz, Darmkanal, Uterus etc., haben dagegen nur unwillkührliche Bewegungen; der Nervus sympathicus hängt nicht unmittelbar mit dem Gehirn und Rückenmarke, wie die Cerebro-Spinalnerven, sondern nur mittelbar durch Vermittelung der letztern zusammen. Bichat nannte das System der Cerebro-Spinalnerven das *animalische*, das System des Nervus sympathicus das *organische* Nervensystem, schrieb dem letztern eine gewisse Unabhängigkeit von Gehirn und Rückenmark zu, und betrachtete die Ganglien und Geflechte des N. sympathicus als dessen Centraltheile. In der neuern Zeit ist die nach dem Kreislaufe des Blutes zweite grosse Entdeckung gemacht worden, nämlich, dass die Spinalnerven, welche durch eine vordere oder hintere Wurzel von dem Rückenmarke entspringen, durch die vordere Wurzel im Stande sind, Bewegungen in den Muskeln hervorzurufen, durch die hintere Wurzel, welche mit einem Ganglion versehen ist, aber empfindend sind. Bell hat diese Entdekkung gemacht, und ich habe bewiesen, dass mechanische und galvanische Reize, auf die hinteren Wurzeln der Spinalnerven ap-

Digitized by Google

plicirt, nicht im Stande sind, Bewegung in den Muskeln zu erregen, zu welchen die Spinalnerven hingehen. Siehe III. Buch. Scarpa hat nun in der neuern Zeit zu zeigen gesucht, dass der Nervus sympathicus, der in der Brust mit dem Anfange der Spinalnerven zusammenhängt, doch bloss mit den hinteren Wurzeln der Spinalnerven, nicht aber mit den vorderen in Verbindung stehe, und dass also der Nervus sympathicus weder vom Rückenmarke aus zur Erregung des Herzens bestimmt werden könne, noch selbst motorische Kraft besitze. Scarpa *de ganglüs nervorum deque origine et essentia n. intercostalis ad* H. Weber. *Annal. univers. d. medicina. Magg. e Giugn.* 1831. Wutzer's und meine eigenen Untersuchungen, so wie die von Retzius und Mayer, haben indess gezeigt, dass Scarpa's spätere Ansicht unrichtig ist, und dass die Rami communicantes inter n. sympathicum et nervos spinales, sowohl von der vordern motorischen, als von der hintern sensibeln Wurzel der Spinalnerven ihre Fäden erhalten. Siehe Meckel's *Archiv* 1831. 1. *p.* 85. u. 260.

Mit der Untersuchung des Einflusses des Rückenmarkes und Gehirns auf die Bewegungen des Herzens haben sich auf experimentellem Wege besonders Legallois, Philip, Trevibanus, Nasse, Wedemeyer, Clift und Flourens beschäftigt.

Legallois trat mit neuen Thatsachen in seinem Werke (*exp. sur le principe de la vie. Paris* 1812.) hervor, nach welchen der Grund der Herzthätigkeit nur in dem Rückenmarke gelegen seyn sollte. Legallois Beweise lassen sich auf folgende Hauptpunkte reduciren.

Zerstört man bei einem Thiere den Cervicaltheil des Rückenmarkes und die Medulla oblongata, so hört das Athmen wegen der Zerstörung der Quelle der Athemnerven, nämlich der Medulla oblongata und des Rückenmarkes, auf. Der Herzschlag dauert schwächer noch fort, ohne längere Zeit den Blutlauf unterhalten zu können, und die zur Unterhaltung der Circulation nöthige Stärke der Herzbewegung lässt sich durch künstliche Respiration nicht erwecken. Die theilweise und in Pausen aufeinander folgende Zerstörung des Rückenmarkes unterhält die Herzbewegung länger als die plötzliche Zerstörung.

Der Kreislauf des Blutes hört auch auf, wenn man nur den untern Theil des Rückenmarkes durch Einstossen eines Griffels vernichtet. Auch dann wird er durch künstliche Respiration nicht wieder erregt.

Aus diesen Versuchen schloss Legallois, dass der Nerveneinfluss auf die Herzthätigkeit von dem Rückenmarke ausgehe, und zwar nicht von einem bestimmten Theile des Rückenmarkes, sondern von dem ganzen Rückenmarke. Wenn diess wahr ist, schloss Legallois, so wird nach Zerstörung eines Theiles des Rückenmarkes die Nervenkraft des unversehrten Theiles nicht mehr hinreichen, das Herz zur Bewegung der ganzen Masse des Blutes zu erregen. Allerdings wird sie aber hinreichen, bei künstlichem Athmen das Blut durch einen Theil des Gefässsystems zu treiben. Legallois schloss weiter, dass, wenn man nach partieller Zerstörung des Rückenmarkes den Weg des Blutes durch das ganze

Digitized by Google

Gefässsystem, durch Unterbindung einzelner Gefässe einschränke, der Blutlauf in diesen eingeschränkten Theilen noch unterhalten werden könne. Und lege man die Ligatur immer näher dem Herzen an, so würde man einen immer grössern Theil des Rükkenmarkes ohne Unterbrechung des Kreislaufes zerstören können. Legallois unterband an Kaninchen die Aorta in der Gegend der Lendenwirbel, und zerstörte das Lendenmark. In anderen Fällen schnitt er den Kopf ab, als er die Carotiden und Jugularvenen unterbunden, und zerstörte das Halsmark, indem er den Blutlauf durch die künstliche Respiration unterstützte, und in noch grausameren Versuchen nahm er die ganze untere Hälfte des Körpers weg, nachdem er die grossen Gefässe unterbunden. In allen Fällen dauerte der Kreislauf zwischen dem Herzen und den Ligaturen längere und kürzere Zeit fort, und in manchen Fällen, nach Legallois Aussage, noch länger als $\frac{3}{4}$ Stunden.

Aus diesen Versuchen schloss Legallois, dass der Nervus sympathicus nicht unabhängig sey, dass er nicht bloss mit dem Rückenmarke zusammenhänge, sondern von ihm entspringe, und dass es der eigenthümliche Charakter dieses Nerven sey, alle Theile, in welchen er sich verbreitet, unter den Einfluss der motorischen Kraft des ganzen Rückenmarkes zu setzen. Das berichterstattende Comité glaubte, dass diese Versuche alle Schwierigkeiten lösen, die sich früher über die Bewegungen des Herzens erhoben haben, wie namentlich, warum das Herz dem Einflusse der Leidenschaften unterworfen sey, warum es nicht dem Willen gehorche, warum die Circulation in den hirnlosen Missgeburten oder Acephalen bis zur Geburt fortdauere.

Dass indessen Legallois Versuche nicht das ganze Verhältniss zwischen Gehirn, Rückenmark und dem sympathischen Nerven aufgeklärt haben, ist durch Wilson Philip's Versuche gezeigt worden. *Untersuchungen über die Gesetze der Functionen des Lebens. Stuttg.* 1822. Wird ein Thier durch einen Schlag auf den Hinterkopf der willkührlichen Bewegung und der Empfindung beraubt, so hört die Respiration auf, die Herzbewegung dauert aber noch fort, und kann durch künstliche Respiration noch lange unterhalten werden. Wird nun das Rückenmark und Gehirn ganz entfernt durch Ausschneiden, so schlägt das Herz dennoch fort, aber schwächer als gewöhnlich. Auch wenn das Rükkenmark und Gehirn mit einem heissen Stabe zerstört wird, dauert in der Regel die Bewegung des Herzens fort. Philip schliesst hieraus das Gegentheil der Resultate von Legallois, nämlich dass die Thätigkeit des Herzens dem innern Grunde nach unabhängig sey vom Gehirn und Rückenmark. Aber beide Organe, Gehirn und Rückenmark haben gleichwohl nach Philip's Versuchen einen grossen Einfluss auf die sympathischen Affectionen des sympathischen Nerven und des Herzens.

Philip sah, dass, wenn er Weingeist auf das blossgelegte Gehirn oder auf das Rückenmark aufträufelte, die Bewegung des Herzens sich vermehrte, deutlicher, wenn der Weingeist auf den Halstheil des Rückenmarkes, schwächer, wenn er auf den Lumbaltheil applicirt wurde. Opium und Tabaksabsud wirkten ebenso.

Digitized by Google

Die reizende Wirkung trete bei den Opium und Tabak vor der narkotischen ein, denn allmählig werden nun die Bewegungen des Herzens langsamer. Diese Reize wirken durch das Gehirn und Rückenmark noch immer auf die Eingeweide, wenn sie durch Gehirn und Rückenmark keinen Einfluss mehr auf die willkührlichen Muskeln haben. (Marshall Hall bestätigt diess nicht. Weder Opium, noch Weingeist brachten Beschleunigung hervor, und Opiumvergiftung vernichtete bei dem Starrkrampfe auch den Kreislauf.) Das Herz steht nach Philip mit allen Theilen des Gehirns und Rückenmarkes in Relation, gewisse willkührliche Bewegungen aber nur mit gewissen Theilen des Gehirns und Rückenmarkes. Philip hat auch gezeigt, dass der Einfluss des Gehirns und Rückenmarkes auf den N. sympathicus und die Eingeweide sich ganz verschieden zeigt nach der Art der Verletzung. Wird das Gehirn zerstört durch Ausschneiden einzelner Theile, oder das ganze Gehirn entfernt, wird das Rückenmark mit einem heissen Stabe langsam zerstort, so schlagt das Herz nach wie vor noch geraume Zeit schwächer; allein die Herzthätigkeit ist gebrochen, wenn die Zerstörung schnell und wie zerschmetternd geschieht. So wenn das Gehirn eines lebenden Frosches mit einem Hammer zerschmettert wird, so reagirt das Herz nur schwach und langsam mehr, es liegt halbe Minuten still. Wird nun das Rückenmark schnell und gewaltsam zerstört, so ist die Bewegung wieder für eine Zeitlang erloschen. Nachher sammelt sich die Contractionskraft wieder. Clift sah das Herz der Karpfen nach Zerstörung des Rückenmarkes noch 11 Stunden schlagen.

Flourens schliesst nach seinen Versuchen an Fischen, dass die Thätigkeit des Herzens nur vom Athmen abhänge, und dass sie aufhöre durch Aufhebung der Athembewegungen bei Verletzung der Medulla oblongata, von welcher die Athembewegungen abhängen, dass bei Fischen, deren Athembewegungen allein von der Medulla oblongata abhängen, und nach Verletzung des Rückenmarkes deswegen fortdauern können, auch der Kreislauf deshalb fortdaure. Dagegen hat Marshall Hall (*an essay on the circulation. Lond.* 1831.) bei Fischen auch nach Zerstörung der Medulla oblongata den Kreislauf sehr lange fortdauern gesehen. Marshall Hall lässt indess das Herz immer in einer bedingten Abhängigkeit vom Rückenmarke und Gehirn seyn. Vergl. Treviranus *Biol.* 4. 644., Clift *Phil. Trans.* 1815., Wedemeyer *Physiol. Unters. über das Nervensystem und die Respiration. Hannov.* 1817. Nasse in Horn's *Arch.* 1817. 189. Flourens *Versuche über die Eigenschaften und Verrichtungen des Nervensystems. Leipz.* 1824. Eine ausführliche Prüfung von Legallois Versuchen, und eine lichtvolle Darstellung der ganzen Streitfrage hat Nasse gegeben. Nasse *Untersuch. zur Lebensnaturlehre. Halle* 1818. Vergl. Lund *Physiol. Resultate der Vivisectionen neuerer Zeit. Kopenh.* 1825. 162.

Fasst man die Resultate von Legallois, Wilson u. A. mit den schon bekannten Thatsachen zusammen, dass das ausgeschnittene Herz, besonders bei Amphibien und Fischen noch lange fortschlägt, dass deprimirende Affectionen des Nervensystemes die

Digitized by Google

Kraft des Herzschlages schwächen, und dass mit der nervösen Ohnmacht auch Schwächung des Kreislaufes verbunden ist, so folgt:

1) Dass Gehirn und Rückenmark einen grossen Einfluss auf die Bewegung des Herzens haben, dessen Bewegungen beschleunigen, verlangsamen, schwächen und verstärken können.

2) Dass die Herzbewegung aber nach der einfachen Trennung des Rückenmarkes und Gehirns vom Körper noch eine Zeitlang fortdauert (nach Flourens bei Kaninchen mit Pulsation der Carotiden unter künstlicher Respiration über eine Stunde), dass die Herzbewegungen aber viel schwächer sind, und der Kreislauf nicht vollständig längere Zeit unterhalten wird.

3) Dass die Bewegung des Herzens auch beim Herausschneiden des Herzens, also bei der Trennung desselben von dem grössten Theile des N. sympathicus nicht sogleich aufhört.

Rückenmark und Gehirn stehen nicht zu dem Herzen in einem solchen Verhältnisse, dass die Entfernung der ersteren gerade das Princip der Bewegungen in dem Herzen aufhebt; die Herznerven können noch einen Theil des belebenden Einflusses enthalten, selbst derjenige Theil derselben, der noch in einem ausgeschnittenen Herzen enthalten ist. Aber Gehirn und Rückenmark müssen gleichwohl als eine Hauptquelle des Nerveneinflusses überhaupt angesehen werden, ihre Vernichtung schwächt das Herz in hohem Grade, so dass es zwar noch lange sich bewegt, aber nicht mit der zur Unterhaltung des Kreislaufes nothwendigen vollständigen Kraft. Wenn es ein Mittel giebt, den Grad dieser Abhängigkeit zu messen, so ist es das von Nasse angewendete. Er mass die Höhe des Blutstromes aus einer durchschnittenen Arterie im normalen Zustande, zerstörte hierauf das Rükkenmark oder einzelne Theile desselben, und fand nun, dass der Blutstrom nach einigen Minuten in einem der Verletzung angemessenen Grade abgenommen hatte. Auf jeden Fall ist aber der Nervus sympathicus vom Gehirn und Rückenmarke durchaus nicht in der Abhängigkeit wie die Cerebrospinalnerven. Diess geht allein schon aus der Beobachtung hervor, dass bei Fischen sich die Contractionen des Herzens nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarkes selbst noch einen halben Tag lang erhalten.

Eine noch grössere Unabhängigkeit vom Gehirn und Rückenmarke scheint die Blutbewegung bei hirn- und rückenmarklosen Missgeburten zu haben. Allein wir besitzen über diese Monstra noch nicht hinreichende anatomische Kenntnisse, um sie auf eine entscheidende Art zur Lösung der schwebenden Frage anzuwenden. Bei den hemicephalen Missgeburten wird das Gehirn meist durch Gehirnwassersucht zerstört, und dieselbe Krankheit kann auch das Rückenmark zerstören.

Bei den kopflosen Missgeburten fehlt in der Regel (nicht immer) auch das Herz, und die Gefässe bestehen in der Regel nur aus zwei Gefässsystemen, welche nicht durch die Stämme, sondern durch die Capillargefässe zusammenhängen, so dass die Nabelgefässe Zweige dieser Stämme sind. Tiedemann *Anatomie d. kopfl. Missgeburten. Landsh.* 1813. Nur in dem Winslow'schen

Digitized by Google

Falle (Tiedem. *p.* 71.) hing die Nabelvene mit dem Arterienstamme zusammen, wie beim Embryo das Herz eine gleiche Umbiegung des Venenstammes in den Arterienstamm ist.

Brachet (*recherches expérimentales sur les fonctions du système ganglionaire. Paris* 1820.) hat die Fälle von Acephalis gesammelt, bei denen auch das Rückenmark ganz fehlte. Vergl. Meck. *pathol. Anat. I.* Elben *de acephalis. Berol.* 1821. Besonders merkwürdig ist der Fall von Ruysch (*thesaur. anat. IX. p.* 17. *Tab.* 1. *fig.* 2.), wo, freilich an dem Mutterkuchen eines wohlgebildeten Foetus, eine untere Extremität hing. Eine Frucht, die fast aus einer blossen Extremität bestand, an einem Nabelstrange hing, und Gefässe, Arterien und Venen, und einen kurzen Stumpf von Rükkenmark enthielt, hat Emmert (Meck. *Arch.* 6.) beschrieben. Vgl. den ähnlichen Fall Hayn *monstri unicum pedem referentis descriptio anatomica. Berol.* 1824. In mehreren Fällen hat die Erklärung des Kreislaufes in der Missgeburt ohne Herz und Rükkenmark keine Schwierigkeit, wenn die Gefässe des Monstrums bloss Zweige der Gefässe des Nabelstranges eines andern gesunden Foetus sind, wie in Rudolphi's Fall, von einem Monstrum, das aus einem blossen Kopf bestand (*Abhandl. d. Akad. zu Berl.* 1816.). Eben so in dem von mir beobachteten, ganz ähnlichen Fall von einem Kopf, der durch eine Arterie und Vene mit den Nabelgefässen eines vollständigen Kindes zusammenhing. Mueller's *Archiv* 1834. 179. Vergl. den Fall des rudimentären Monstrums, das Gurlt (*pathol. Anat.* 2. *Bd. tab.* 16. *fig.* 1 — 4.) abbildet. Rudolphi erklärt den Kreislauf der übrigen herzlosen Monstra so, dass das Blut der Mutter vom Mutterkuchen durch die Nabelvene zum Foetus gelangt, die sich in ihm gleich einer Arterie vertheilt, und dass die Arterien des Foetus das Blut zum Nabel und Mutterkuchen zurückbringen. *Encyclop. Wörterbuch der med. Wissensch. I.* 226. Diese Erklärung ist aber sehr gewagt, da die Gefässe des Foetus oder Mutterkuchens nicht eigentlich mit den Gefässen des Uterus zusammenhängen.

Dass der sympathische Nerve beim Embryo zuerst entstehe, ist eine sonderbare, bloss hypothetische Behauptung von Ackermann. Auch ist es zu tadeln, dass der sehr verdiente Rolando die erste Spur der Rückenwirbel beim Vogelembryo zur Seite des Rückenmarkes für Ganglien des N. sympathicus erklärt.

Nicht allein Gehirn und Rückenmark, sondern der Lebenszustand aller Organe, und dadurch der ganze Organismus, wirken durch die begleitenden Nerven der Blutgefässe auf den Sympathicus zurück, und bestimmen seine ihm eigenthümliche motorische Kraft zur Wirkung. Die beständige Quelle der Zusammenziehung des Herzens ist daher primo loco die motorische Kraft des Nervus sympathicus. Aber die Ursache für die Erhaltung der letztern, und ihre Erregung ist nicht allein Gehirn und Rückenmark, sondern sind wahrscheinlich die Lebensreize aller Organe, welche durch die Gefässnerven auf die Centraltheile des Sympathicus zurückwirken. Hierdurch wird es möglich, dass eine örtliche Krankheit kranke Gemeingefühle im ganzen Körper erregt,

Digitized by Google

und jede heftige örtliche Krankheit den Herzschlag und Puls verändert.

Die Veränderungen, welche die feinsten Wurzeln des Sympathicus in irgend einem Theile durch örtliche heftige Krankheiten erleiden, und die Rückwirkung dieser Veränderung auf die Centraltheile des Nervus sympathicus, die Herznerven und Geflechte, so wie auf das Gehirn und Rückenmark, scheinen eine Hauptrolle in jenen Erscheinungen zu spielen, die wir Fieber nennen.

Ueber den Einfluss der einzelnen Regionen des Nervus sympathicus auf die Thätigkeit des Herzens hat man noch keine Beobachtungen. Man weiss nur, dass in 13 Versuchen von Pommer die Durchschneidung des Sympathicus am Halse überhaupt gar keine erhebliche Folge hatte. v. Pommer's *Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Heilbronn* 1831.

Da mehrere Hirnnerven mit dem N. sympathicus in inniger Verbindung stehen, und da insbesondere der N. vagus an der Zusammensetzung der Herzgeflechte wesentlichen Antheil hat, so wäre es sehr wünschenswerth, auch den Einfluss dieser Nerven auf die Thätigkeit des Herzens zu kennen. Emmert bemerkte nach Durchschneidung des N. vagus nur eine geringe Störung im Kreislaufe. Bichat und Legallois erklären mit Recht, dass die Veränderungen in dem Herzschlage nicht mit Sicherheit der Durchschneidung des Nerven zugeschrieben werden können, da sie eben so gut von Schmerzen und Furcht herrühren können, und dass sie keinesfalls bedeutend sind.

IV. Capitel. Von den einzelnen Theilen des Gefässsystems.

a. Von den Arterien.

Die mittlere Arterienhaut besteht aus kreisförmigen platten Fasern und Faserbündeln, welchen die Arterien ihre grosse Elasticität verdanken, d. h. ihre Fähigkeit nach vorheriger Ausdehnung wieder sich zu verengern, eine Eigenschaft, die ihrem Gewebe physikalisch zukömmt, und auch nach dem Tode noch längere Zeit bis zur Zersetzung in ihnen bleibt. Dieselbe Faserhaut, die man wohl von Muskelfasern unterscheiden muss, ist die Ursache, dass die Arterien auch im leeren Zustande nicht collabiren, sondern walzenförmig bleiben, und dass sie der grössern oder geringern Anfüllung sich anpassen. Von den Muskelfasern unterscheidet sich dieses nur den Arterien, nicht den Venen zukommende Gewebe auch in chemischer Hinsicht, wie Berzelius gezeigt hat. Die Muskelsubstanz ist weich und schlaff, und enthält mehr als $\frac{3}{4}$ ihres Gewichtes Wasser. Die Arterienfaser ist trokken und sehr elastisch, Muskelsubstanz verhält sich chemisch wie Faserstoff des Blutes, ist auflöslich in Essigsäure, schwer löslich in Mineralsäuren, mit denen sie schwer auflosliche Verbindungen bildet. Die Arterienfaser ist unauflöslich in Essigsäure, aber leicht auflöslich in Mineralsäure, und diese Auflösung wird we-

Digitized by Google

der von Alkali noch von Cyaneisenkalium gefällt, was geschehen müsste, wenn sie Faserstoff enthielte. Sowohl in mikroskopischer als chemischer Hinsicht stimmt die Arterienfaser ganz mit dem übrigen elastischen Gewebe überein, von welchem sie sich nur durch eine geringere Festigkeit unterscheidet. Das elastische Gewebe, welches immer gelblich ist, und seine Elasticität weder nach tagelangem Kochen, noch nach jahrelangem Liegen in Weingeist verliert, charakterisirt sich nach den Beobachtungen von Lauth, Schwann und Eulenberg durch Fasern von verschiedener Dicke, die deutliche Aeste abgeben und eine scharfe, dunkle Contur zeigen. Zu diesem Gewebe gehören die mittlere Arterienhaut, die Ligamenta flava, der Wirbelbogen, die Kehlkopfbänder, das Ligamentum stilo-hyoideum, die Längenfasern an der innern Fläche der Bronchien, das elastische Band, welches den ausstülpbaren Theil der Ruthe bei den dreizehigen Straussen, den Enten und Gänsen zurückzieht, der elastische, dritte Körper am Penis des zweizehigen Strausses, das elastische Band des Krallengliedes der Katzen, der Flughaut der Vögel, das elastische Gewebe der Flughaut der Fledermäuse und des Kehlsacks des Pelikans. Schwann hat das elastische Gewebe sparsamer auch in der Speiseröhre unter der Schleimhaut, am After im Ligamentum suspensorium penis und dem umliegenden Zellgewebe, und in den sehnigen Bündeln, die das Corpus cavernosum penis des Menschen quer durchziehen gefunden. Bei den Arterien und Venen enthält die äussere Zellgewebehaut auch einige elastische Fasern, die innere Haut der Arterien enthält eben solche, die entweder der Länge nach oder nach allen Richtungen verlaufen und um so feiner werden, je mehr man sich der innersten Fläche nähert, so dass sich zuletzt gar keine Fasern mehr unterscheiden lassen. An der Vene cruralis des Ochsen fand Schwann ebenfalls eine mittlere aus querlaufenden Fasern bestehende dicke Schichte, die aber Zellgewebefasern waren, und eine innerste, äusserst dünne Schichte aus längslaufenden, elastischen Fasern. Siehe Schwann im *encyclop. Wörterb. d. med. Wissensch. Artikel Gefässe* und Eulenberg *de tela elastica. Berol.* 1836.

Vom Puls.

In den Arterien fliesst das Blut mit stossweise verstärkter Geschwindigkeit, die Gewalt seines Stromes vermehrt sich mit jeder neuen, durch die Contraction des Ventrikels in die Aorta getriebenen Blutwelle. So sah Hales das Blut in der in eine Arterie gebrachten Röhre bei jedem Pulsschlage um ein oder einige Zoll steigen. Da nun das Blut der Arterien durch die Haargefässe wegen des Widerstandes, den es in diesen engen Röhren erleidet, nicht so schnell entweichen kann, als es in die Arterien getrieben wird, so übt das Blut in den Arterien gegen ihre elastischen Wände einen Druck aus, wodurch es wie jede comprimirte Flüssigkeit nach allen Richtungen auszuweichen strebt. Diesen Druck des Blutes auf die Arterienwände bei der Contraction der Ventrikel fühlt man an ihnen als Puls. Der Puls der Arterien ist also im Allgemeinen synchronisch mit der Zusammenziehung der Ventrikel; diese letztere ist seine Ursache.

Digitized by Google

Die elastischen Wände der Arterien müssen in Folge dieses Druckes bei jedem Herzschlage ausgedehnt und zur Zeit der Diastole der Ventrikel vermöge ihrer Elasticität wieder auf ihren vorigen Zustand reducirt werden. Diese Ausdehnung der Arterien kann in der Länge und in der Breite erfolgen, und sie erfolgt in der That in beiden Richtungen, aber in der Länge viel merklicher, als in der Breite. Die Arterien werden im Momente des Pulses der Länge nach ausgedehnt, und deshalb verschieben sie sich schlängeln und strecken sich wiederum zur Zeit der Ruhe des Ventrikels; sie werden aber auch im Momente des Pulses ein wenig in der Dimension der Breite ausgedehnt. Die Ausdehnung in die Breite ist von Rudolphi, Lamure, Arthaud, Parry und Doellinger geläugnet worden. Dagegen haben sie Bichat, v. Walther, Tiedemann, Meckel, Hastings, Magendie und Wedemeyer gesehen. Die Erweiterung der Arterien im Puls muss jedenfalls kleiner seyn, da sie nicht immer gleich deutlich wahrgenommen und von mir selbst nur zuweilen deutlich gesehen wurde. Dass sie aber existirt, davon kann sich jeder Beobachter an der ganzen Verzweigung der Arteria pulmonalis beim Frosche überzeugen, wo man nicht allein die Schlängelung der Arterien, sondern auch ihre Erweiterung gleich deutlich sieht. Ausserdem habe ich die Erweiterung der Aorta abdominalis beim Frosche und einmal vollkommen deutlich beim Kaninchen gesehen. Vergl. E. H. Weber *Anatomie T. 3. p. 67.* Poiseuille (Magendie *Journ. T. 9. p. 44.*) hat durch einen ingeniösen Versuch sogar die Grösse der Erweiterung an den Arterien gemessen. Er entblösste die Carotis communis eines lebendigen Pferdes auf 3 Decimeter, und schob eine offene Röhre von weissem Blech, die durch ein schmales Deckelstück verschliessbar war, darunter. Mit diesem Stücke verschloss er die Röhre wieder, verschloss die Enden mit Wachs und Fett; den innern Raum der Röhre um die Arterie herum füllte er durch eine in die Röhre eingesetzte Glasröhre von aussen mit Wasser an. Bei jedem Pulsschlage stieg das Wasser in der 3 Millimeter weiten Glasröhre um 70 Millimeter, und fiel um eben so viel jedesmal darauf. Das eingeschlossene Stück Arterie war 180 Millim. lang, und nahm 11440 Cubicmillim. Raum ein; da es nun durch jeden Pulsschlag um einen Wassercylinder von 3 Millim. Durchmesser und 70 Millim. Länge d. h. um 494 Cubicmillim. an Ausdehnung zunahm, so folgt, dass es ungefähr um $\frac{1}{23}$ seines Raumes ausgedehnt wurde.

Man nimmt gewöhnlich an, dass der Puls in allen Arterien bei verschiedener Entfernung vom Herzen gleichzeitig sey. Weitbrecht, Liscovius und E. H. Weber (*Adnotat. anatom.*) haben indess das Gegentheil gezeigt, und in der That ist es leicht, sich vom Gegentheil der Behauptung von Bichat zu überzeugen. Die Arterien pulsiren in der Nähe des Herzens isochronisch mit der Contraction des Ventrikels, denn der Pulsus cordis ist die *Zusammenziehung* der Ventrikel, der Pulsus arteriarum aber die hierdurch und durch den Druck des Blutes bewirkte Ausdehnung der Arterien. Allein bei grösserer Entfernung vom Herzen ist der Puls

Digitized by Google

der Arterien nicht mehr ganz synchronisch mit dem Herzschlage, und variirt davon nach Weber um $\frac{1}{6} - \frac{1}{7}$ Secunde. So ist der Puls der Art. radialis schon um etwas später als der Puls der Carotis communis. Der Puls der Maxill. ext. dagegen, bei ungefähr gleicher Entfernung vom Herzen, isochronisch mit dem Puls der Art. axillaris. Der Puls der Art. metatarsea auf dem Fussrücken um etwas später als der Puls der Maxill. ext. und der Puls der Carotis comm. E. H. Weber hat in der Abhandlung (de pulsu non in omnibus arteriis plane synchronico) die Ursachen dieses Zeitunterschiedes gezeigt. Wäre das Blut von ganz festen Röhren eingeschlossen, deren Wände keiner Ausdehnung fähig waren, so würde sich der Stoss des von der Herzkammer in die Arterien getriebenen Blutes bis zu den Enden der Blutsäule mit derselben Schnelligkeit fortpflanzen, mit welcher der Schall durch diese Flüssigkeit sich fortpflanzt (d. h. viel schneller als der Schall in der atmosph. Luft), dann würde der Druck des Blutes mit einem ganz unmerklichen Zeitverlust bis zu den Enden der Arterien sich fortpflanzen. Da aber die Arterien einiger Ausdehnung in die Breite und noch grösserer in die Länge fähig sind, so bewirkt die Zusammendrückung des Blutes vom Herzen aus zunächst nur die Ausdehnung der nächsten Arterien. Worauf diese durch ihre Elasticität sich wieder zusammenziehen, und so die nächsten Fortsetzungen der Arterien durch das comprimirte Blut ausdehnen, die auch wieder durch ihre Zusammenziehung die nächsten Theile ausdehnen und so weiter, so dass ein, wenn auch noch so kleiner Zeitraum verstreicht, ehe die Welle, d. h. die successive Zusammendrückung des Blutes, Erweiterung und Verengerung der Arterien bis zu den entfernten Arterien gelangt. Weber vergleicht diess mit der Fortpflanzung der Wellen, die ein in einen See geworfener Stein bewirkt. Auch diese Wellen pflanzen sich nicht mit der Schnelligkeit des Schalles fort. Die Schnelligkeit dieser Fortpflanzung ist vielmehr nach den Versuchen der Gebrüder Weber (*Wellenlehre. Leipz.* 1825. *p.* 188.) in einem 23 Zoll tiefen Wasser $5\frac{1}{4}$ Par. Fuss in einer Secunde. Bichat verwechselte die Bewegung der Wellen in einem Flusse mit seiner Strömung, und glaubte, der Puls rühre nicht von den fortschreitenden Wellen, sondern von dem allem Arterienblute zu gleicher Zeit mitgetheilten Stoss her. Die Bewegung der Wellen hängt aber immer von der durch Stoss bewirkten fortgepflanzten Oscillation, niemals von der Strömung ab, so dass das Wasser einer Welle sich hebt und senkt, aber an seinem Orte bleibt, während die Welle und Oscillation weiter fortschreitet, die also beständig in anderen Theilen Wassers stattfindet. Daher auch die leichtesten Körper auf den Wellen sich zwar heben und senken, aber bei dem Fortschreiten der Wellen an ihrem Orte bleiben.

Zur Fortpflanzung des Pulses wird eine continuirliche Blutsäule erfordert; wären die Arterien an einzelnen Stellen leer, so würde, wie Weber schliesst, die Fortpflanzung des Pulses viel langsamer seyn, oder ganz unterbrochen werden. Denn von Blut leere Stellen der Arterien müssten erst vom Strome des Blutes gefüllt werden, ehe der Stoss sich fortpflanzen könnte, und der

Digitized by Google

Strom des Blutes ist doch jedenfalls viel langsamer als die Fortpflanzung des Stosses. Daher leitet es Weber ab, dass der Puls in einer aneurysmatischen Arteriengeschwulst mit dem Herzschlage und dem Puls anderer Arterien nicht synchronisch ist. Denn das Coagulum im aneurysmatischen Sacke oder nicht ganz mit Blut gefüllte Räume desselben können ein Hinderniss der Fortpflanzung des Stosses seyn. Nach allem diesem ist der Puls der Arterien *die Wirkung der fortgepflanzten Oscillation in den Arterienhäuten und dem Blute der Arterien, welche ihre Ursache in dem Drucke des Blutes vom Herzen aus hat.* Weber *adnotat. anatom. et physiol. prolus. I.*

Weber hat noch weitere sehr nützliche Bemerkungen über den Nutzen der elastischen Haut der Arterien mitgetheilt. In dem Zeitraum von einem Herzschlage zum andern rückt das Blut in der Aorta nur um so viel weiter, als das vom Herzen ausgeflossene Blut Raum in dem ersten Stücke der Aorta einnimmt, d. h. einige Zoll. Die elastische Haut der Arterien bewirkt aber durch ihren beständigen Gegendruck, dass das Blut nicht bloss absatzweise, sondern ununterbrochen vorwärts gedrückt wird; das Blut fliesst aus einer geöffneten Arterie ununterbrochen, und der Strom wird nur in den grösseren Arterien während jedes Herzschlages augenblicklich verstärkt, eine Verstärkung, die um so weniger merklich ist, je kleiner die spritzenden Arterien sind. Weber bemerkt, dass das Herz einige Aehnlichkeit mit den Feuerspritzen habe, dass aus ihm die Flüssigkeit durch periodisch wiederholte Stösse ausgetrieben wird. Der Zweck beider Instrumente erfordert es aber, dass die Flüssigkeit ununterbrochen ausströme, diess ist in beiden dadurch bewirkt, dass bei jedem Drucke dieser Pumpenwerke nicht nur die Flüssigkeit fortgestossen, sondern auch ein elastischer Körper gespannt wird, welcher auf die Flüssigkeit zu drücken und sie auszutreiben fortfährt, während das Pumpenwerk selbst nicht drückt. Dieser elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Wand derselben, bei den Feuerspritzen die in ihrem Windkessel über dem Wasser befindliche Luft. Weber *l. c. de utilitate parietis elastici arteriarum. Anatomie* 3. *p.* 69. (Es ist eben so mit dem Regulator der Gebläse.) Bei Verknöcherung verliert sich diese Elasticität, daher die Anlage zu Schlagfluss, Gangrän etc.

Durch ihre Elasticität besitzen die Arterien die merkwürdige Fähigkeit um so enger zu werden, je weniger sie Blut enthalten, und, wie beim Blutflusse aus durchschnittenen Arterien, auszutreiben können. Wenn eine Arterie durchschnitten ist, so wird der Blutstrom allmählig immer kleiner. Bei einem Pferde, das Hunter zu Tode bluten liess, fand er, dass die Aorta um mehr als $\frac{1}{16}$, die Iliaca $\frac{1}{6}$, die Cruralis $\frac{1}{3}$ sich im Durchmesser verengerten, und dass Arterien von der Dicke der Art. radialis im Menschen bis zum Schliessen sich verengten. Abernethy *physiol. lect.* 224. Je stärker die Kraft des Herzschlages ist, um so mehr werden die Arterien ausgedehnt, und um so mehr Blut ist in ihnen im Verhältniss zu den Venen enthalten, je schwächer der Herzschlag ist, um so mehr kann die Elasticität der Arterien dem Antriebe des

Digitized by Google

Blutes das Gleichgewicht halten, um so enger sind die Arterien und um so weniger Blut enthalten sie im Verhältniss zu den Venen. Diese Folge tritt vor dem Tode ein, daher zum Theil die Blutleere der Arterien nach dem Tode; sie sind eigentlich grossentheils nicht ganz leer, sondern viele enthalten so viel Blut, als sie im verengtesten Zustande zu fassen vermögen. Bei einer Vivisection kann eine unverletzte Arterie ihren Durchmesser allmählig verkleinern, wie Parry, Tiedemann und auch ich gesehen haben. Diess braucht man aber weder von dem Reize der Luft, noch überhaupt von der vitalen Contractilität der Arterien abzuleiten, sondern es ist eine nothwendige Folge von der verminderten Kraft des Herzens.

Die älteren Schriftsteller und mehrere neuere haben die nach der Ausdehnung der Arterien erfolgende elastische Zusammenziehung der Arterien fälschlich für einen Muskularakt, und die Fasern der Arterienhaut für Muskelfasern gehalten, wovon sie sich, wie Berzelius gezeigt hat, in jeder Hinsicht unterscheiden. Die Fähigkeit, sich nach der Ausdehnung zusammenzuziehen, behalten die Arterien noch lange nach dem Tode, Tage lang, und die stossweise in die Arterien gestorbener Thiere getriebenen Flüssigkeiten bieten dieselben Erscheinungen des Pulses und der darauf folgenden Zusammenziehung dar, wie im lebenden Körper. Man hat für die nicht existirende Muskularcontractilität verschiedene Gründe aus der vergleichenden und pathologischen Anatomie beigebracht, welche gar nichts beweisen. Allerdings ziehen sich das gefässartige Herz der Insekten und die Hauptgefässstämme, nicht einmal alle Gefässstämme der Würmer, wie bei den Blutigeln, durch Muskularcontraction zusammen. Allein diess sind eben die Herzen jener Thiere, und es lässt sich zeigen, wie das Herz bei den niederen Thieren immer mehr die Form eines länglichen Schlauches annimmt, wie es denn bei dem Embryo in frühester Zeit nur ein erweiterter Theil des Gefässsystems ist. Das Herz ist daher in der Thierwelt überhaupt nur der mit Muskelsubstanz bekleidete und contractile Theil des Gefässsystems, der bald kurz, bald lang ist. Man hat auch für die Muskularcontractilität der Arterien die kopflosen Missgeburten angeführt, bei denen das Herz fast regelmässig fehlt, und deren Cirkulationssystem aus zwei Gefässsystemen besteht, die an zwei verschiedenen Stellen, nämlich in der Placenta und in den Organen des Körpers, durch Capillargefässe zusammenhängen; in manchen genauer bekannten Fällen, waren die Gefässe des Acephalen nur Aeste der Nabelgefässe eines zweiten vollständigen Embryo. Vergl. p. 197. Der Bulbus aortae der Fische und der nackten Amphibien zieht sich allerdings ganz deutlich zusammen, was Spallanzani, Wedemeyer und ich bei Fröschen und Salamandern gesehen, und ich habe auch selbst den Bulbus aortae der Frösche an der abgeschnittenen Aorta noch sich ganz vollkommen und so deutlich wie das Herz selbst zusammenziehen gesehen. Allein dieser Theil ist von der Aorta ganz verschieden, gehört zum Herzen und ist jenen Thieren, welche durchs ganze Leben oder in der Jugend einen Kiemenkreislauf haben, eigenthümlich. Man sieht hier gerade ganz deutlich,

Digitized by Google

dass die Aorta der Frösche über dem deutlich muskulösen Bulbus während der Contraction des letztern keine Spur von Contractilität besitzt, und es ist vollkommen unrichtig, wenn Spallanzani (*de' fenomeni della circolazione, Modena* 1773.), der sonst gegen die Muscularcontraktilität der Arterien streitet, behauptet, die Aorta descendens der Salamander bewege sich ausgeschnitten noch fort. Marshall Hall wollte bei dem Frosche und der Kröte eine auch nach Entfernung des Herzens noch pulsirende Arterie gefunden haben, die über dem grossen Querfortsatze des dritten Wirbels hergehen soll. Diess ist indess ein Missverständniss. An dieser Stelle habe ich allerdings ein eigenes pulsirendes Lymphherz gefunden, das aber mit keiner Arterie, wohl aber mit einer Vene zusammenhängt. Siehe Abschn. 3. Cap. 2. Die oscillirende Bewegung des Blutes nach Unterbindung der Aorta des Frosches, wobei das Blut unregelmässig bald eine Strecke vorwärts rückt, bald wieder zurücktritt, ist auch kein Beweis für Muskularcontraction der Arterien, obgleich es Hall dafür anführt. Diess hängt ganz von der fortdauernden Elasticität der Arterien und von mechanischen Hindernissen ab. Die Vena cava der Fische besitzt nahe am Herzen Muskularcontractilität, und zieht sich nach Nysten auf galvanischen Reiz zusammen. Nysten *l. c. p.* 351. Diess sah auch Wedemeyer bei warm- und kaltblütigen Thieren. *l. c. p.* 47. Nach meinen Beobachtungen ist diess vollkommen richtig; ich sah die Stämme der untern und der beiden oberen Hohlvenen des Frosches, der Lungenvenen und Hohlvenen bei jungen warmblütigen Thieren ohne Reizung sich deutlich rhythmisch contrahiren und die Venenstämme des Frosches sich auch nach abgeschnittenem Herzen und Vorhof rhythmisch zusammenziehen; aber die übrigen Venen zeigen keine Spur von Contractilität, weder ungereizt noch gegen galvanischen Reiz, und wenn Flourens regelmässige Contractionen der Hauptvenenstämme des Unterleibes beobachtet hat, so rühren diese wohl offenbar von den von mir entdeckten Lymphherzen des Frosches her, welche die Lymphe in die Venae jugulares und ischiadicae hineinpumpen. Das Kaudalherz des Aals am Ende der Vena caudalis ist contractil, aber die Vene selbst durchaus nicht. So scheinen auch die Arterien der Brustflossen der Chimaeren nach Duvernoy accessorische Herzen zu haben. Man hat für die Muskularcontractilität der Arterien den Umstand angeführt, dass der Puls an den gleichnamigen Gliedern zuweilen an Stärke verschieden ist, wie in Lähmungen; allein hier sind andere örtliche Ursachen vorhanden, und diess kann erklärt werden. In gelähmten Gliedern ist die Wechselwirkung zwischen Blut und Substanz vermindert, sie sind schlaff und welk, und oft weniger ernährt. Dagegen die vermehrte Wechselwirkung zwischen Substanz und Blut in activen Congestionen einen grössern Zufluss des Blutes und stärkern Puls durch verstärkte organische Affinität bewirkt. In entzündeten Theilen wird der Puls stärker gefühlt, bei der Anhäufung des Blutes und dem gehemmten Durchgange durch die Capillargefässe. Dass aber der Puls in verschiedenen Theilen an Frequenz verschieden sey, darüber existirt keine zuverlässige Beob-

Digitized by Google

achtung, und es ist unbegreiflich, wie Schriftsteller heut zu Tage ein solches Mährchen ohne Prüfung nacherzählen können.

Der Ausfluss des Blutes aus einer an zwei Stellen unterbundenen Arterie beim Anstich, ist auch nur eine Folge der elastischen Contraction der Arterien. Man hat endlich für die Muskularcontractilität der Arterien und ihren vitalen Antheil an der Bewegung des Blutes angeführt, dass die Gangraena senilis vorzugsweise bei Verknöcherungen in den Arterien stattfindet. Allein Wedemeyer bemerkt, dass die Gangraena senilis zuweilen ohne diese Verknöcherungen, und die Verknöcherungen ohne Gangraena senilis vorkommen, so dass die Gangraena senilis noch andere Ursachen zu ihrer Entstehung erfordert, und das alte Falsum cum hoc, ergo propter hoc nichts erklärt. Siehe über Alles diess Wedemeyer l. c. Wenn nun alle bisherigen Gründe für die Muskularcontractilität der Arterien auf nichts beruhen, so sind offenbare Gegenbeweise gegen die Contractilität derselben vorhanden.

Berzelius bemerkt mit Recht, dass die stärksten galvanischen und elektrischen Reize keine Spur von Contraction an den Arterien erregen. Nysten (*recherches de physiol. et pathol. chimiques. Paris* 1811.) stellte öfter galvanische Versuche an der Aorta kurz vorher enthaupteter Verbrecher an, bemerkte aber keine Spur von Contraction. Derselbe entdeckte keine Spur von durch Galvanismus erregter Contraction an der Aorta abdominalis der Fische. Schon Bichat hatte ähnliche Resultate erhalten; dann hat Wedemeyer an vielen Thieren mit einer galvanischen Säule von 50 Plattenpaaren an den Carotiden, und an der Aorte thoracica nie eine Spur von Muskularcontraction bemerkt; ich habe sehr oft den Galvanismus als Prüfungsmittel hierzu benutzt, und weder bei Fröschen mit geringen und starken galvanischen Reizen, noch bei Säugethieren, namentlich Kaninchen, mit einer Säule von 60—80 Plattenpaaren die geringste Spur von Contraction bewirken können. Man hat zwar bemerkt (Bichat, Treviranus), dass auch das Herz nicht empfänglich für den galvanischen Reiz sey, wovon Humboldt gerade das Gegentheil beobachtete. (*Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser* 1797, *I.* 340.) Allein Pfaff, J. Fr. Meckel., Wedemeyer haben auf entschiedene Art diese Empfänglichkeit am Herzen bemerkt, und ich selbst habe nicht allein an dem schon ruhenden Froschherzen mit einem einfachen Plattenpaar Zusammenziehung auf der Stelle erregt, sondern auch beim Hunde, dessen Herz schon zu schlagen aufgehört hatte, durch den Reiz einer Säule von 40 Plattenpaaren auf der Stelle die lebhafteste Contraction erregt.

Der mechanische Reiz bewirkt so wenig als der galvanische Reiz Contractionen der Arterien. Dagegen ist es nicht zu läugnen, dass manche chemische Substanzen, z. B. Mineralsäuren, salzsaurer Kalk, an den Arterien Zusammenziehungen bewirken; sie thun diess aber nur, indem sie eine chemische Veränderung in der Substanz der Arterien hervorbringen, was oft davon abhängt, dass der Substanz ein Theil ihres Wassers entzogen wird. Weber's *Anat.* 3. Diese Veränderungen beweisen nichts für die Muskular-

Digitized by Google

contractilität der Arterien. Die Reizbarkeit der Muskeln dauert bei Säugethieren nie über $\frac{3}{4}$ Stunden nach dem Tode, in der Regel viel kürzere Zeit; jene Veränderungen lassen sich aber noch Tage lang nach dem Tode, und zwar nicht allein an den Arterien, sondern auch an anderen Theilen, welche keine Muskularcontractilität haben, erzeugen, wie an der Haut. Tiedemann und Gmelin sahen, dass Schwefelsäure Arterien zusammenzog, die schon ein Jahr in Weingeist aufbewahrt waren. *Versuche über die Wege etc.* 68. So erzeugt auch, wie Wedemeyer bemerkt, heisses und kochendes Wasser noch am 4. Tage in der menschlichen Haut eine der Muskularcontraction sehr ähnliche Contraction und Kräuselung, und ähnliche Zusammenziehungen kann man mit Säure in längst erstorbenen Muskelfiebern, am Bauchfell, in der äusseren Haut erzeugen. l. c. p. 75. Alles diess beweist, dass die meisten thierischen Theile, ohne Unterschied, ob sie Muskularcontractilität besitzen oder nicht, gegen chemische Einflüsse durch Aeusserung von chemischer Affinität im lebenden und todten Zustande Zusammenziehungen zeigen können, welche aber von der Muskularcontraction ganz verschieden sind, welche letztere nach dem Absterben der Theile nicht mehr erregt werden kann, und welche nicht allein auf chemische Einflüsse, sondern auch auf mechanische und galvanische Einflüsse deutlich und schnell sich äussert. Hastings hat in seiner Abhandlung über die Irritabilität der Arterien (*über Entzündung der Schleimhaut der Lungen, übers.* Busch. *Bremen* 1822.) nach den mit chemischen Mitteln an Arterien angestellten Versuchen zu viel geschlossen, indem er die durch sie verursachte Zusammenziehung für Muskularcontraction hielt, auch hat er die auf die Erweiterung oder den Puls der Arterien folgende Zusammenziehung derselben nicht in ihrer wahren Ursache erkannt, die als Elasticität der Arterienwände so gut in den todten und mit Flüssigkeit stossweise eingespritzten Arterien, als während des Lebens alle Phänomene des Pulses erzeugt. Vergl. Parry *über die Ursache des arter. Pulses. Hannov.* 1817.

Aus allen diesen Thatsachen folgt, dass rhythmische Muskularcontractionen der Arterien durchaus nicht bei dem Kreislaufe wirken, und dass die Verminderung des Durchmessers der Arterien nach der Ausdehnung durch den Impuls des Blutes Folge ihrer Elasticität ist. Ob die bei Blutstillung verwundeter Arterien, beim Blosslegen und beim Drehen der Arterien beobachteten Verengerungen derselben ganz nur eine Folge der Elasticität sind, oder ob eine lebendige, allmählig, nicht rhythmisch wirkende Zusammenziehungskraft der Arterien (*tonus*) ausser der Elasticität mitwirke, wie Parry, Tiedemann und E. H. Weber (*Anat.* 4. 75.), (Tiedemann auch am Stamme der Lymphgefässe) annehmen, ist eine ganz andere Frage: Mehrere Beobachter haben bereits eine Zusammenziehung der kleinen Arterien von Kälte gesehen. Die Versuche von Schwann erweisen die langsam wirkende Contractilität von Kälte an den Arterien im Mesenterium des Frosches und der Feuerkröte zur Evidenz. Nachdem das Mesenterium derselben unter dem Mikroskope ausgebreitet war, brachte er einige Tropfen Wasser auf dasselbe von einer Tem-

Digitized by Google

peratur, die einige Grade niedriger war als die Temperatur der Luft. Bald darauf begann die Verengung und die Gefässe verengerten sich binnen 10 — 15 Minuten allmählig so, dass der Durchmesser des Lumens einer Arterie, der Anfangs 0,0724 engl. Lin. betrug, auf 0,0276 reducirt, als um das 2 — 3fache verkleinert, das Lumen der Arterie selbst also um das 4 — 9fache verengt wurde. Die Arterie erweiterte sich darauf wieder und hatte nach einer halben Stunde ihre frühere Ausdehnung wieder erlangt. Wurde nun von neuem Wasser darauf gebracht, so verengte sie sich wieder, und so liess sich der Versuch an derselben Arterie mehrmals wiederholen. Die Venen aber verengerten sich nicht. Ich habe diese Phänomene oft beobachtet, so wie sie Schwann beschrieben. Von welchem Gewebe diese langsam wirkende Contractilität herrühre ist noch nicht bekannt. Von Muskelfasern rührt sie keinesfalls her; denn diese sind nicht vorhanden. Die Wirkung der Kälte zur Hervorrufung der Zusammenziehung ist für mehrere nicht musculöse Theile characteristisch, und ebenso die geringe Wirkung der Elektricität. In beidem stimmt das contractile Gewebe der Arterien ganz mit dem leimgebenden contractilen Gewebe der Tunica dartos überein, dessen mikroskopische Structur sonst ganz vom elastischen Gewebe abweicht und dem Zellgewebe ähnlich ist. Von diesen und ähnlichen Geweben wird ausführlicher im 2. Bande der Physiologie gehandelt. Die langsame Verengung durchschnittener Arterien, ihr Zurückziehen in die Zellgewebescheide und die Gerinnung des Blutes erklären die freiwillige Stillung des Blutes aus nicht zu grossen durchschnittenen Arterien. Aus der unmerklichen den Arterien eigenen lebendigen Zusammenziehung lässt sich auch sehr gut die theilweise Leerheit der Arterien nach dem Tode erklären, weil die Arterien dann ihre lebendige unmerkliche Contractilität, durch welche sie das Blut zuletzt noch weiter getrieben, verlieren und wieder weiter werden, worauf bloss ihre physikalische Elasticität bis zur Entmischung zurück bleibt.

Nach der bisherigen Untersuchung ist es gewiss, dass die Kraft, durch welche sich das Blut in den Arterien bewegt, hauptsächlich die Kraft des Herzens ist; es fragt sich jetzt, wie gross dieselbe ist, um die Phänomene, welche sie bewirkt, zu erzeugen, und wie sich die Kraft und Geschwindigkeit des Blutes in verschiedenen Theilen des arteriellen Systems verhält. Hales, *Haemastatik, Statik des Geblüts. Halle.* 1748. *p.* 1—41. beobachtete, wie hoch das Blut in Glasröhren stieg, die er in die Arterien eingefügt hatte; aus der A. cruralis des Pferdes stieg es 8—9 Fuss, aus der Arteria temporalis des Schafes 6½, bei Hunden 4—6 Fuss, während es in der Vena jug. beim Pferde nur 12—21 Zoll, beim Schafe 5½ Zoll bei Hunden 4—8½ Zoll stieg. Wir werden indess hierüber vorzüglich die genauen Untersuchungen von Poiseuille zu Rathe ziehen. Magend. *Journ.* 8. 272. Poiseuille bediente sich eines eigenen von ihm erfundenen Instrumentes. Diess besteht aus einer langen Glasröhre, welche in ihrem Anfange an einer kurzen Strecke horizontal, dann unter rechtem Winkel herabsteigt, und in ein langes Stück wieder aufsteigt. Wird Quecksilber in den

Digitized by Google

herab- und aufsteigenden Theil gebracht, so nimmt es ein gleiches Niveau in beiden Schenkeln ein, und bei einer senkrechten Stellung der Schenkel ist die Höhe der Quecksilbersäule in beiden unten communirenden Schenkeln gleich. Kann nun das Blut aus einer Arterie durch den horizontalen Schenkel in den herabsteigenden Schenkel gelangen, so drückt es mit der Kraft, durch die es in den Arterien bewegt wird, auf das Quecksilber des herabsteigenden Schenkels, und das Queksilber wird in diesem Schenkel fallen, und in dem aufsteigenden sich erheben. Reichte das Quecksilber vorher in beiden Schenkeln bis zum Abgange des Horizontalstückes der Röhre, so wird die Tiefe, zu welcher es in dem einen Schenkel fällt, summirt zur Höhe, zu welcher es in dem andern steigt, die ganze Höhe der Quecksilbersäule angeben, welche dem Drucke des Blutes das Gleichgewicht hält, wovon indess die Schwere der Blutsäule, die an die Stelle der Quecksilbersäule in den herabsteigenden Schenkel tritt, abgezogen werden muss; die mehr als 10mal kleiner ist, als eben so viel Maass Quecksilber. Poiseuille berechnet die Kraft, womit sich das Blut in den Arterien bewegt, nach Gesetzen der Hydrostatik aus der Grösse des Durchmessers der Arterie und der Höhe der Quecksilbersäule; die Kraft des in den Arterien bewegten Blutes wird nämlich durch das Gewicht einer Quecksilbersäule gemessen, deren Basis ein Zirkel ist vom Durchmesser der Arterie, und deren Höhe die Differenz des Quecksilberstandes im Instrumente ist. Um die Gerinnung des Blutes bei dem Eindringen in die horizontale Röhre zu verhüten, wurde dieser Theil der Röhre vor dem Quecksilber mit einer Auflösung von unterkohlensaurem Kali gefüllt, was das Blut flüssig erhält. Nach Poiseuille ist der Druck eines Theilchens Blut in den grösseren Arterien gleich; sie mögen nun dem Herzen näher oder ferner, etwas grösser oder kleiner seyn, z. B. Carotis und Aorta, Carotis und Cruralis. So war die Höhe der verdrängten Quecksilbersäule an allen Arterien desselben Thieres gleich. Nach Poiseuille hält das Blut einer Arterie beim Hunde einer Quecksilbersäule von 151 Millimet. oder einer Wassersäule von $6\frac{1}{3}$ Par. Fuss, bei Rindern einer Quecksilbersäule von 161 Millim. oder einer Wassersäule von 6 Fuss 9 Zoll, bei Pferden einer Quecksilbersäule von 159 Millim., und bei jenen Säugethieren im Mittel von 156 Millim. oder einer Wassersäule von 6 Fuss 7 Zoll das Gleichgewicht.

Poiseuille sah auch vermittelst seines Instrumentes, was Haller und Magendie schon beobachtet hatten, dass die Stärke des Bluttriebes in der Exspiration, wobei die Brust mit Zusammendrückung der Gefässstämme verengert wird, vermehrt ist, so dass die Quecksilbersäule bei jeder Exspiration etwas steigt, bei der Inspiration fällt. Dieses Steigen und Fallen ist bei Arterien in verschiedener Entfernung vom Herzen gleich, und es beträgt 10—20 Millim. bei ruhiger Respiration. Diese Verstärkung des Bluttriebes durch das Ausathmen ist bei manchen Menschen besonders gross, so dass der Puls an der Art. rad. bei langem anhaltendem Einathmen unfühlbar wird. In diesem Falle bin ich; ich mache auf der Stelle den Puls der Art. rad. verschwinden, sobald ich

Digitized by Google

nur tief inspirire und den Athem einhalte, was einiges Licht auf die Mährchen von willkürlicher Veränderung des Herzschlages wirft.

Da sich nun endlich nach Poiseuille,s Versuchen ein Theilchen Blut in den verschiedensten Arterien mit gleicher Kraft bewegt, so schloss er, dass man, um die Kraft des Blutdruckes in einer Arterie von bestimmtem Caliber zu messen, nur den Umfang derselben, und die Höhe des Blutdruckes im Instrumente zu nehmen habe; denn die Kraft des Blutes in einer bestimmten Arterie wird durch das Gewicht einer Quecksilbersäule repräsentirt, deren Höhe das Instrument angiebt, und deren Umfang der Umfang der Arterie ist. Nimmt man nun mit Poiseuille in einem Manne von 29 Jahren den Durchmesser der Aorta bei ihrem Ursprunge =34 Millimeter, so beträgt der Flächeninhalt des Umfanges 908,2857 Quadratmillimeter. Nimmt man nun für die Höhe der Säule des Instrumentes beim Menschen das Mittel der an Thieren beobachteten höchsten und niedrigsten Höhen zwischen 180 und 140 Millimeter, also 160 Millimeter, so giebt $908{,}2857 \times 160 = 145325{,}71$ Cub. Millimeter Quecksilbersäule, deren Gewicht=1,971779 Kilogr. oder 4 Pfund, 3 gros, 43 gr. statische Kraft des Blutes im Momente, wo es in die Aorta strömt. So erhält man für das Rind 10 Pfund, 10 Unzen, 7 gros, 61 gr., für die Art. radialis 4 gros.

Ehemals glaubte man, dass die stumpfen und spitzen Winkel, unter welchen die Aeste von den Gefässen abgehen, einen Einfluss auf die Geschwindigkeit haben, indem die stumpfen Winkel die Bewegung mehr hemmen. Weber (*Anat.* 3. 41.) bemerkt hingegen, dass diess nur einen Einfluss auf die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit habe, wenn sie bei ihrer Fortbewegung so wenig Widerstand findet, dass ihr Lauf durch Summirung der Stösse, die sie empfängt, nach einer bestimmten Richtung hin beschleunigt wird. Im entgegengesetzten Falle befindet sich die Flüssigkeit in den Röhren überall unter gleichem Drucke, und strebt mit gleicher Kraft nach allen Richtungen hin. Dagegen muss das Blut in den kleineren Arterien dadurch langsamer fliessen, als in den grösseren, dass die Summe der Lumina der Aeste immer grösser ist, als das Lumen der Stämme, weil eine engere Röhre bei gleicher Kraft schneller von derselben Masse erfüllt und durchströmt wird, als eine weitere Röhre, die in kurzen Abschnitten so viel enthält, wie eine engere Röhre in längeren Abschnitten. Ursachen, welche die Geschwindigkeit der Blutbewegung überhaupt vermindern, sind weniger die häufigen Anastomosen der Arterien als die immer mehr zunehmende Reibung an den Wänden in den kleinsten Gefässen. Die Anastomosen erleichtern die Mittheilung des Blutes. Wenn zwei Arterien anastomosiren, so gehen aus den anastomosirenden Gefässen, oder aus der Anastomose selbst Aeste hervor. Im erstern Falle wird, so weit man diess mit dem Mikroskope beobachten kann, die Anastomose in der Richtung durchströmt, welche am wenigsten Widerstand darbietet, und das Blut geht aus der Anastomose in das Gefäss über, dessen Weite gross genug ist, um das Blut von zwei Gefässen zugleich aufzunehmen. In solchen Fällen wird aber die Anastomose im-

Digitized by Google

mer in einer Richtung durchströmt. Giebt die Anastomöse selbst einen Ast ab, so strömt das Blut von zwei Seiten zugleich in diesen Ast weiter, oder in der einen Richtung weiter.

Während des Lebens muss nach Einwirkung eines zufälligen Druckes die Richtung, in welcher die Anastomosen durchströmt werden, sehr veränderlich seyn.

b. Von den Capillargefässen.

1. *Bau der Capillargefässe.*

In allen organisirten Theilen geschieht der Uebergang des Blutes aus den feinsten Zweigen der Arterien in die feinsten Zweige der Venen durch netzförmige mikroskopische Gefässchen, in deren Maschen die eigentliche Substanz der Gewebe liegt. So sieht man es an allen feinen Injectionen, eben so bei mikroskopischer Beobachtung des Blutlaufes an lebenden durchsichtigen Theilen, wie an der Schwimmhaut, den Lungen und der Harnblase der Frösche, dem Schwanze der Froschlarven, am bebrüteten Ei, an jungen Fischchen, an den Kiemen der Larven der Wassersalamander, an den Flügeln der Fledermäuse und im Gekröse aller Wirbelthiere, endlich selbst an undurchsichtigen Theilen der Larven der Salamander mit dem einfachen Mikroskope, wie ich in Meck. *Archiv für Anat. u. Physiol.* 1829. beschrieben habe. Die feinsten Arterien bilden bei der Verzweigung immer mehr Anastomosen unter einander, und diese Anastomosen gehen zuletzt in ein continuirliches Netz über, von denen aus sich die Venenanfänge wieder sammeln. Man nennt diese netzförmigen Uebergänge der Arterien in Venen wegen ihrer Feinheit Capillargefässe. Es lässt sich nicht bestimmt angeben, wo die feinsten Gefässe aufhören Arterien zu seyn und wo die feinsten Venen in diesem Netze anfangen. Denn der Uebergang ist allmählig, aber die netzförmigen Uebergänge haben doch das Eigenthümliche, dass die Gefässchen einen gleichen Durchmesser behalten, dass sie nicht mehr in einer Richtung dünner werden, wie Arterien und Venen, und dass gerade, wo die Gefässchen wieder in zunehmenden Zweigen sich sammeln, Arterien- und Venenanfänge allmählig daraus hervorgehen. Diess berechtigt aber nicht, mit Bichat ein eigenes Capillargefässsystem im Unterschiede von Arterien und Venen anzunehmen.

Die feinsten Capillargefässe sind dem Durchmesser der Blutkörperchen angemessen; man misst sie an fein injicirten Theilen. Der Durchmesser derselben variirt von $\frac{1}{1000}$ — $\frac{1}{4000}$ ja bis $\frac{1}{5000}$ P. Zoll; im Durchschnitt ist er am häufigsten 0,00025—0,00050. Die feinsten Capillargefässe hat man im Gehirne beobachtet, wo sie nach E. H. Weber's Messungen bis $\frac{1}{5100}$ = 0,00019 P. Z. betragen; in den Nieren des Menschen betragen sie nach meinen Messungen 0,00037 — 0,00058, in den Processus ciliares 0,00053. E. H. Weber fand ihren Durchmesser in der Schleimhaut des Dickdarmes 0,00033 — 0,00050, in einer Lymphdrüse eben so, in der äussern Haut 0,00080, in einer entzündeten Haut 0,00025 — 0,00050. Im mit Blut gefüllten Zustande, wo sie wohl nicht so ausgedehnt als

Digitized by Google

im injicirten Zustande sind, sind sie noch wenig gemessen worden. Weber fand sie am Hodensacke eines neugebornen Kindes, wo sich die Oberhaut abziehen liess $= \frac{1}{323}$ P. Z. Bei ganz jungen Thieren sind die Capillargefässe grösser, so wie auch die Blutkörperchen des Embryo zum Theil grösser sind. Keine anderen Elemente der thierischen Gewebe sind viel feiner. Die Muskelfasern, welche man früher wohl zu fein angegeben hat, sind nach Prevost und Dumas $\frac{1}{6100}$ P. Z. $= 0{,}00012$. Die Primitivfasern der Muskeln des Menschen sind 5 — 6mal feiner als seine Blutkörperchen. Ich fand die Primitivfasern der Nerven bei Säugethieren $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ so dünn als die Blutkörperchen breit sind.

Mit anderen Kanälen verglichen, sind die Capillargefässe immer kleiner, die Gallenkanälchen der Leber, die Harnkanälchen der Nieren sind, wo sie am feinsten sind, immer noch einige Mal stärker als die Capillargefässe, so dass letztere sich in ihren Zwischenräumen und ihrem Bindegewebe oder Interstitialzellgewebe verbreiten. So fand ich die Ductus uriniferi serpentini corticales der Pferdenieren injicirt $= 0{,}00137 - 0{,}00182$ P. Z.; die Harnkanälchen der Schlangennieren bis ans Ende mit Quecksilber gefüllt $0{,}00232 - 0{,}00423$ nach meiner Injection. Die gefiederten blinden Enden der Harnkanälchen bei den Vögeln fand ich im injicirten Zustande $= 0{,}00174$ P. Z., die feinsten Gallenkanälchen der Leber bis ans Ende nach meinen glücklichen Versuchen beim Kaninchen mit Leim und Zinober injicirt, fand ich $= 0{,}00108 - 0{,}00117$ P. Z. Die feinsten bläschenförmigen Anfänge der Speichelkanälchen der Parotis injicirt, fand E. H. Weber $= 0{,}00082$, nach meinen neueren Messungen sind sie beim Hunde mit Quecksilber gefüllt $0{,}00187$. Die bläschenförmigen Anfänge der Kanäle im Pankreas der Gans mit Quecksilber injicirt, fand ich $0{,}00137 - 0{,}00297$. In der Milchdrüse vom säugenden Igel fand ich sie $0{,}00712$, beim säugenden Hunde injicirt $= 0{,}00260$. Die Samenkanälchen im Hoden des Menschen haben nach meinen Messungen nicht injicirt $0{,}00470$, mit Quecksilber gefüllt $0{,}00945$. Siehe das Weitere über meine älteren Injectionen und Messungen Meck. *Arch. für Anat. u. Phys.* 1830. J. Mueller *de glandularum structura penitiori earumque prima formatione in homine et animalibus. Lips. fol. cum. tab.* 17. *p.* 112. Alle diese verschiedenen Elemente der Gewebe, Drüsenkanälchen, Muskelfasern, Nervenfasern, werden von den Netzen der Capillargefässe umgeben und verbunden. Die Primitivfasern der Muskeln, die Primitivfasern der Nerven erhalten selbst keine Gefässe mehr, denn sie sind selbst dünner als die feinsten Capillargefässe. Nie sieht man bei Untersuchung frischer glücklicher Injectionen von diesen Theilen andere Capillargefässe, als solche, die sich in den Zwischenräumen der Primitivfasern verbreiten. Es ist wohl eben so mit den feinsten Drüsenkanälchen. Die Capillargefässe der Nieren legen sich überall zwischen und über die Ductuli uriniferi hin, aber diese selbst werden nach meinen Beobachtungen niemals injicirt.

Die Form der Capillargefässnetze ist im Allgemeinen sehr einfach, und variirt bloss in dem Unterschiede von engeren und weiteren Maschen der Netze, gleichförmigen oder länglichen Ma-

Digitized by Google

schen. In den Muskeln und Nerven bilden die Capillargefässnetze auch längliche Maschen an den Primitivfasern, und diesen entsprechend. Was Soemmerring und Doellinger, und namentlich Berres in seinen verdienstlichen Untersuchungen (*med. Jahrb. d. österr. Staates. Bd.* 14.) über den Unterschied der kleinsten Gefässe in den verschiedenen Geweben beobachtet haben, ist sehr richtig, gilt aber nicht von den feinsten Capillargefässnetzen selbst, sondern von der Form der in diese Netze sich verzweigenden kleinsten Arterien und Venen. So bemerkt Soemmerring, dass die Verzweigung in den dünnen Därmen einem unbelaubten Bäumchen, im Mutterkuchen einem Quästchen, in der Milz einem Sprengwedel, in den Muskeln einem Reiserbündel, in der Zunge einem Pinsel, in der Leber einem Sterne, in den Hoden und im Adergeflechte des Hirnes einer Haarlocke, in der Riechhaut einem Gitter ähnlich sey. In den Kiemen nehmen Arterien und Venen die Richtung der Kiemenblätter, so dass das arterióse Strömchen an der einen Seite aufsteigt, an der andern das venöse herabsteigt. In den Sehnen ist die Vertheilung der Gefässe nach E. H. Weber dendritisch, ohne dass diese Gefässe genau mit den länglich reiserförmigen Gefässen der Muskeln zusammenhängen. In der Nierenrinde giebt es eigenthümliche glomeruli von Blutgefässen mitten in den Capillargefässnetzen. Diese runden Körperchen, corpora Malpighiana, sind blosse Knäuel des in sie eintretenden arteriösen Zweiges, auf dem sie wie eine Frucht aufsitzen; sie stehen durchaus nicht im Zusammenhange mit den Harnkanälchen, was man früher angenommen hat, wie meine Untersuchungen und die von Huschke und Weber zeigen. Mueller *de gland. struct. penit. p.* 100. 101. Huschke hat neuerlichst bewiesen, dass die feine Arterie, die in diese Körperchen tritt, nach vielen Windungen wieder aus denselben hervortritt, um in das Capillargefässnetz über zu gehen, wie sich beim Wassersalamander beobachten lässt. Tiedemann und Treviranus *Zeitschrift für Physiologie.* 4. *Bd.* 1. *H. p.* 116. *tab.* 6. *fig.* 8. An den Enden der Zotten der Placenta des Menschen biegt eine Capillararterie in eine Capillarvene um, wie E. H. Weber's schöne Untersuchungen zeigen, *Anatomie* 4. In der Vertheilung der feinsten Arterien giebt es also viele Formen, allein in den Capillargefässnetzen selbst giebt es keinen weitern Unterschied; als die Grösse der Maschen, und ihre mehr längliche oder gleichförmige Gestalt. Davon habe ich mich besonders bei Untersuchung der Drüsen überzeugt, wo, so verschiedenartig die Anordnung der feinsten Drüsenkanäle seyn mag, die Capillargefässe selbst aber nur Netze sind, und die Vertheilung der Drüsenkanälchen nicht nachahmen. In der Marksubstanz der Nieren, wo die Harnkanälchen zu pyramidenförmigen Büscheln zusammentreten, bilden die feinen Arterien, und wie ich neuerlichst durch Injection mich abermals überzeugt, auch die Venen lauter langgestreckte Gefässe zwischen den Harnkanälchen, so dass man sie gewöhnlich für von den Blutgefässen aus injicirte Harnkanälchen fälschlich gehalten hat; allein auch diese gestreckten Blutgefässe bilden wieder sehr längliche Maschen von Capillargefässen, indem sie von

Digitized by Google

der Rinde gegen die Nierenwarzen feiner werden, und bilden zuletzt ein Netz an den Warzen selbst um die Mündungen der Harnkanäle. So gehen auch die Gefässreiserchen zwischen den Nerven- und Muskelfasern fort, allein die Capillargefässe sind hier um die parallelen Fasern eben so gut Netze, wie in den Hoden um die gewundenen Samenkanäle, und in der Nierenrinde um die gewundenen Harnkanälchen. Die feinen Arterien folgen zwar in den Kiemen der Salamanderlarven der Vertheilung der Kiemenblättchen, und gehen in herabsteigende Kiemenblutäderchen über; allein zwischen beiden ist ein Netz auch in dem feinsten Blättchen, welches Rusconi und Andere übersehen haben; ich sah die Bewegung der Blutkörperchen durch dieses Netz.

Die dichtesten Netze mit den kleinsten Maschen finden sich in den Lungen, in der Chorioidea, schon weniger in der Iris und im Ciliarkörper; ferner in den Lungen, Leber, Nieren, Schleimhäuten, Lederhaut. In der Chorioidea des Truthahns finde ich die Zwischenräume gerade so breit, oder noch kleiner, als der Durchmesser der Capillargefässe. In den Lungen des Menschen sind die Zwischenräume fast noch kleiner als die Strömchen. Weber *Anat.* 4. 203. In den Nieren des Menschen und des Hundes finde ich den Durchmesser der injicirten Capillargefässe im Verhältnisse zu den Zwischenräumen wie 1 : 4 — 1 : 3. Im Gehirne, das zwar eine sehr grosse Menge Blut erhält, aber auch das Blut im Innern in seinen sehr feinen Capillargefässen in weniger zahlreiche Netze vertheilt, sondern dieselbe Blutmenge schneller wieder abgiebt, fand E. H. Weber das Verhältniss des Durchmessers der Capillargefässe zum Längendurchmesser der Maschen = 1 : 8 — 10, zum Breitendurchmesser der Maschen wie 1 : 4 — 6. In Schleimhäuten, z. B. in der Conjunctiva palpebrarum, und in der Lederhaut fand Weber die Röhrchen viel dicker als in dem Gehirne, aber die Zwischenräume enger, im Verhältnisse zu diesen wie 1 : 3 — 4. An der Knochenhaut waren die Zwischenräume viel grösser. Siehe E. H. Weber's Ausgabe von Hildebrandt's *Anat.* 3. *B. p.* 45. Die Knochen, Knorpel, Bänder, Sehnen haben die wenigsten Blutgefässe und Capillargefässe. An den Grenzen zwischen Muskel- und Sehnenfasern sieht man den grossen Unterschied in dem Gefässreichthum beider, die Blutgefässchen der Muskeln kehren hier nach Doellinger grösstentheils um, und hängen nicht eng mit den sparsamen Gefässen der Sehnen zusammen. Dasselbe Verhältniss beobachtete Prochaska zwischen dem freien Theile der Synovialhäute, und demjenigen, welcher die Gelenkknorpel überzieht. Prochaska *disquisitio anatomico-physiologica organismi humani. Viennae* 1812. *p.* 96. Weber *l. c.* 3. *p.* 43. Eine sehr schöne Injection der Knorpel der Luftröhre, des Kehlkopfes, der Rippenknorpel vom Fuchse sah ich im Museum von Fremery in Utrecht. Zweifelhaft schienen die Gefässe noch in der innern glänzenden Schicht der serösen Häute; nach den Injectionen von Bleuland, die ich zu Utrecht sah, habe ich Anstand, Rudolphi's Meinung zu theilen, dass die Gefässe der serosen Häute in dem subserösen Zellgewebe sich befinden; van der Kolk besitzt Injectionen des

Digitized by Google

Peritonäums, die keinen Zweifel übrig lassen, dass diese Häute selbst Gefässe enthalten. *Observ. anat. path.* 27. Zweifelhaft sind sie im Glaskörper, in der Substanz der Cornea.

Das Resultat der mikroskopischen Beobachtungen und der feinsten Injectionen ist, dass die Capillargefässe nur Uebergänge der Arterien in die Venen sind, und dass keine andere Art von Gefässen aus ihnen entspringt, dass die feinsten Arterien an keiner Stelle aufhören, ohne durch Capillargefässe in Venen überzugehen, mit einem Worte, dass es keine feinsten Gefässenden giebt. Man muss diess Ergebniss der feinen Anatomie um so sicherer feststellen, da Haller leider die Hypothese von den offenen Arterienenden, von denen er 5 Arten, Oeffnung in Membranen, in Lymphgefässe, in secernirende Kanäle, in Fett, endlich in Venen annahm, nur zu sehr nach den rohen physiologischen Vorstellungen seiner Vorgänger befestigt hat. Allein in jenen Zeiten waren die offenen Gefässenden ein nothwendiges Postulat, weil man sich nicht einmal die Absonderung des Schleimes und Fettes ohne offene Blutgefässenden denken konnte. Von allen diesen Uebergängen existirt kein einziger, als der beständige Uebergang der arteriösen in venöse Kanäle. Nachdem Mascagni, Hunter, Prochaska, Soemmerring schon jene Hypothese glücklich bekämpft hatten, blieb der Uebergang der Blutgefässe in die secernirenden Kanäle der Drüsen immer noch zweifelhaft. Indessen haben meine Untersuchungen, über alle Drüsen ausgedehnt, um den Bau und die feinsten Anfänge der secernirenden Kanäle kennen zu lernen, so wie die ähnlichen Beobachtungen von Huschke und Weber, Arbeiten, welche sich auf bessere Hülfsmittel, nämlich Injection der secernirenden Kanälchen selbst, Anwendung des Mikroskopes, Entwickelungsgeschichte des Embryo, gründen, für die Nichtexistenz dieses Zusammenhanges in allen absondernden Drüsen entschieden, und bewiesen, dass die Wurzeln der secernirenden Kanäle, wie mannigfaltig sie auch in den verschiedenen Drüsen gebildet sind, blinde Anfänge haben. J. Mueller *de gland. struct. penit. Lips.* 1830. Auch die Vasa exhalantia, welche selbst Bichat noch als offene Seitenzweige der Capillargefässe supponirte, sind eine reine Fiction, und eine exhalirende Membran, wie das Peritonäum, enthält nur Capillargefässnetze mit flachenhafter Ausbreitung, so dass Flüssigkeiten aus den Capillargefässen in die Höhlen nur eben so ausdünsten können, wie sie die Substanz der Organe selbst tränken, durch die Permeabilität aller thierischen Theile für aufgelöste Stoffe, durch die zwar nicht sichtbare, aber doch nothwendig vorhandene allgemeine Porosität der thierischen Substanz auch in ihren kleinsten der Aufweichung fähigen Moleculen. So dringt, wie Mascagni zeigte, wenn man Arterien mit einer durch Zinnober gefärbten Leimauflösung einspritzt, eine ungefärbte Flüssigkeit wie Thau auf der Oberfläche der Häute hervor, ohne dass die Farbetheilchen durchgelassen werden. Dass es Vasa serosa, d. h. so feine Zweigelchen der Blutgefässe gebe, die keine Blutkörperchen, sondern nur die Lymphe des Blutes durchlassen, ist möglich, lässt sich aber nicht beweisen. Aber man führt für jene Hypothese einige Theile an, in denen man

Digitized by Google

noch keine rothes Blut führende Gefässe entdeckt hat, nämlich die Cornea, die Linsenkapsel, den Glaskörper. Die Gefässe der Cornea in der Substanz derselben sind zweifelhaft, und noch nie injicirt worden. Indessen giebt es penetrirende Geschwüre der Hornhaut, Wucherung derselben, welche ohne Gefasse nicht denkbar sind, und es ist hieraus wahrscheinlich, dass sie Gefässe enthält. Dass aber das Bindehautblättchen der Hornhaut wenigstens bei fast ausgetragenen Kalbsfoetus Blutgefässe besitzt, welche Blut enthalten, und noch mehr als eine Linie über den Hornhautrand mit der Loupe verfolgt werden können, habe ich wiederholt gesehen, und Henle hat diese Gefässe fein injicirt und abgebildet. Sie messen 0,00070 — 0,00133, und die dünnsten Zweige waren nicht injicirt; ihre Stämmchen, die von einem kreisförmigen Gefässe, das um die Hornhaut herlief, in das Bindehautblättchen drangen, waren noch etwas dicker. Die Präparate davon bewahre ich bei mir auf. Herr Prof. Wutzer hat sie gesehen. Prof. Retzius hat durch Injection dieselbe Beobachtung an Erwachsenen gemacht. Henle *de membrana pupillari aliisque membranis oculi pellucentibus. Bonnae* 1832. Dass nun bei der Entzündung die Hornhaut blutführende Gefässe enthält, ist bekannt. Ich sah in Utrecht bei Schroeder von einem leicht entzündeten Auge die schönste Injection, sowohl der Bindehaut als der Membrana Descemetii.

Die hintere Wand der Linsenkapsel enthält bei ausgebildeten Thieren noch blutführende Gefässe von jenem Aste der Arteria centralis, der sich durch den Glaskörper dahin begiebt. Diess habe ich an frischen Kalbs- und Ochsenaugen gesehen, wo die Gefässe der hintern Kapselwand, die von einem starken Aste der Art. centralis herrühren, zuweilen noch bluthaltig sind. Dasselbe sah Zinn. Henle hat gezeigt, dass diese Gefässe beim Foetus mit Gefässen der Zonula Zinni und des Corpus ciliare zusammenhängen, und diese Verbindung injicirt und abgebildet. Beim Embryo der Säugethiere hängen sie durch eine sehr gefässreiche, von mir beobachtete Haut, *Membrana capsulo-pupillaris*, mit den Gefässen der Membrana pupillaris zusammen, indem diese neue Haut zwischen dem innern Rande der Iris und dem innern Rande der Zonula oder dem Rande der Linsenkapsel ausgespannt ist, lauter parallele Längsgefässe enthaltend, die von der Iris und Pupillarmembran zur Zonula und zur hintern Kapselwand gehen. In der vordern Kapselwand sind die Gefässe äusserst schwer nachzuweisen. An entzündeten Augen sind sie auf der vordern und hintern Kapselwand deutlich, wie ich von einem cataractösen Auge eine vortreffliche Injection dieser Art bei Schroeder van der Kolk in Utrecht sah. Die Zonula Zinni ist nach Henle's und Schroeder's Injection ein gefässhaltiges Organ, und scheint für die Ernährung der durchsichtigen Theile von grosser Wichtigkeit. Der Glaskörper enthält wenigstens bei dem Embryo und bei den Fischen blutführende Gefässe. Alles Bisherige macht es aber wahrscheinlich, dass auch Cornea und Linsenkapsel, denen man Vasa serosa zuschreiben wollte, wirklich Blutgefässchen besitzen, und von der Linsenkapsel des Ochsenauges ist ja ohne-

Digitized by Google

hin gewiss, wie von der Bindehaut der Cornea beim ausgetragenen Schaffoetus, dass sie Blut enthalten. Freilich sind die Gefässe des Bindehautblättchens der Cornea unendlich weniger zahlreich, als die der Conjunctiva bulbi, und es ist hier ein ähnliches Verhältniss, wie zwischem dem Theile der Synovialhaut, welcher frei ist, und demjenigen, der die Gelenkköpfe überzieht. E. H. Weber bemerkt sehr richtig, dass eine einfache Schicht von Haargefässnetzen mit blossen Augen gar nicht erkannt werde, daher das Ausschen jener Theile nichts beweist. Das Mesenterium zwischen den noch mit blossen Augen sichtbaren Gefässen scheint auch gefässlos und durchsichtig, enthält aber lauter Capillargefässnetze bei Anwendung des Mikroskopes. Siehe über alles diess Henle. Wenn wir nun behaupten, dass selbst in den durchsichtigen Häuten noch blutführende Gefässe vorhanden sind, so ist damit nicht zugleich erwiesen, dass alle Gefässe dieser Theile wirklich auch so stark sind, dass sie die rothen Blutkörperchen aufnehmen; im Gegentheil ist es wahrscheinlich, dass gerade in diesen Theilen die meisten zarteren Gefässe nur den flüssigen Theil des Blutes, Liquor sanguinis aufnehmen. Und auch in anderen Theilen mag es so feine Capillargefässe geben, welche für gewöhnlich nur Liquor sanguinis aus den Arterien aufnehmen und in die Venen abgeben. Eine Unterscheidung dieser feineren Capillargefässe als Vasa serosa ist jedoch nicht angemessen, da sie von anderen Capillargefässen nicht verschieden sind, und da dieselben Gefässe oft lange Zeit von Liquor sanguinis durchströmt werden, während von Zeit zu Zeit auch wieder einzelne Blutkörperchen durch dieselben sich Bahn brechen.

Eine wichtige Frage ist, ob die feinsten Capillargefässe häutige Wände haben. Es ist ein allgemeines Zeugniss von Malpighi bis Doellinger, dass bei lebenden Thieren mit Hülfe des Mikroskopes keine häutigen Wände an denselben zu entdecken sind. Doellinger (*Denkschriften der Academie zu München* 7.) sieht das Blut als fliessenden Thierstoff, den Thierstoff als festes Blut an. Gruithuisen sah das Blut zwischen den Acini der Leber beim Frosche frei strömen. Viel deutlicher ist dieser Anschein nach meinen Beobachtungen an der Leber der Tritonlarven, welche ich allein zu diesen Beobachtungen geeignet fand, da man hier auch in undurchsichtigen Theilen mit dem einfachsten Mikroskope den Blutlauf beobachten kann. Siehe Meckel's *Archiv* 1829.

Wedemeyer zweifelte an den häutigen Wänden, nachdem er die breiten Blutströmchen und die kleinen Substanzinseln in den Lungen der Salamander beobachtet hatte. So läugnen C. Fr. Wolff, Hunter, Doellinger, Gruithuisen, Baumgaertner, Wedemeyer, Meyen und Oesterreicher die Existenz der häutigen Wände an den Capillargefässen; dagegen Leeuwenhoeck, Haller, Spallanzani, Prochaska, Bichat, Berres, Rudolphi feine unsichtbare häutige Wände an ihnen annehmen. Das Entstehen neuer Gefässe, was Doellinger und Oesterreicher als Grund der Nichtexistenz der Membran anschen, beweist indess nichts für die schon gebildeten Gefässe. Allein genauere Untersuchungen scheinen gera-

Digitized by Google

dezu die Hypothese von der Nichtexistenz der häutigen Wände zu widerlegen. Schon hat man dagegen angeführt den Uebergang der eingespritzten Flüssigkeiten aus den Arterien in die Venen, ohne dass sie zugleich ins Zellgewebe austreten, das Uebereinanderweggehen der Strömchen, ohne dass sie sich verbinden. Auch beweist die Menge der Ströme, und die Kleinheit der dazwischen liegenden Inseln in der Lungenmembran der Frösche und Salamander eher das Gegentheil; denn diese kleinen Inselchen müssten wohl zuweilen selbst an den Strömungen Antheil nehmen. Es giebt auch directe Beweise von der Existenz feinster Wände um die Capillargefässströmchen. Hierzu bedarf es eines ganz zarten Parenchyms, welches sich in Wasser leicht auflockert, und die Netze der Capillargefässe zurück lässt. So zeigten sich die Capillargefässe der Nieren, welche die Ductus uriniferi corticales umweben, als etwas Selbstständiges, wenn ich Stückchen der Nierensubstanz vom Eichhörnchen nur kurze Zeit in Wasser aufgeweicht hatte, und dann mikroskopisch untersuchte. In der Chorioidea, Iris und im Ciliarkörper zeigen sich die Capillargefässe noch deutlicher als selbstständig. Ebenso können sie an einem Organe erwiesen werden, welches Treviranus entdeckt hat. Ich meine das plattenartige Organ in der Schnecke des Gehörorganes der Vögel. Nach den Beobachtungen von C. Windischmann (*de penitiori auris structura in amphibiis, cum tab. 3. Bonnae* 1831. *Lips apud* Voss) sind diese Platten nur die Falten und Runzeln einer Haut, welche sich über die Spiralplatte in der Schnecke der Vögel wölbt. Diese Haut ist überaus zart und pulpös; die weiche Substanz derselben wird aber von einem ausserordentlich schönen Gefässnetze durchzogen, welches Windischmann von der Carotis aus injicirt hat; sie löst sich leicht in Wasser auf, und es bleibt das wunderschöne Gefässnetz mit leeren Maschen zurück. Auch im nicht injicirten Zustande erhalten sich nach Auflösung der pulpösen Substanz die schönen Gefässnetze. Siehe Windischmann *l. c. tab. II.* Schwann hat endlich kürzlich durch das Mikroskop nachgewiesen, dass die Capillargefässe nicht bloss eine eigene Haut haben, sondern dass diese deutliche Cirkelfasern enthält, in ähnlicher Ordnung wie in den Arterien. Diese Entdeckung ist in den Capillargefässen des Mesenteriums des Frosches und der Feuerkröte gemacht worden. Es sind starke Vergrösserungen und gedämpftes Licht dazu nöthig. Die Sache lässt sich sowohl am todten als lebenden Frosch erkennen.

2. *Blutbewegung in den Capillargefässnetzen.*

Untersucht man die durchsichtigen Theile eines lebenden Thieres unter dem Mikroskope, so bemerkt man, dass die pulsatorische oder die rhythmisch verstärkte Bewegung des Blutes in den kleinsten Arterien und in den Haargefässen aufhört, wenigstens bei erwachsenen Thieren, und dass das Blut continuirlich gleichförmig strömt. Wenn die Thiere aber schwächer werden, so bemerkt man, dass das Blut mehr pulsatorisch fliesst, und man bemerkt dann ein zwar continuirliches, aber pulsweise verstärktes Fortrücken der Blutkörperchen in den kleinen Arterien und Ca-

Digitized by Google

pillargefässen. Diess beobachtet man auch bei ganz jungen Thieren, wenn sie nicht gerade geschwächt sind. Nimmt die Kraft des Herzens noch mehr ab, so sieht man die Blutkörperchen in den kleinsten Arterien und in den feinsten Haargefässen gar nicht mehr continuirlich bewegt, sondern nur stossweise fortgeschoben, und bei grösserer Schwäche weichen sie selbst nach jedem Ruck wieder etwas zurück. Diese Beobachtungen sind bereits ganz so von Wedemeyer gemacht, und ich muss sie als das Resultat aller meiner Beobachtungen bestätigen. Sie sind von grosser Wichtigkeit, denn sie beweisen, dass selbst im Zustande der grössten Schwäche das Blut durch die Capillargefässe, an denen man im ruhigen Zustande nie die geringste Spur einer Veränderung des Durchmessers wahrnimmt, von der Kraft des Herzens fortgetrieben wird. Dass die continuirliche, aber pulsatorisch verstärkte Bewegung des Blutes der Arterien in den Haargefässen im ungeschwächten Zustande gleichförmiger wird, konnte ein blosser Schein seyn, wegen der ausserordentlichen, unter dem Mikroskope scheinbar vergrösserten Geschwindigkeit, so dass diese pulsatorische Verstärkung bei langsamen Bewegungen deutlicher werden müsste. Allein da das Blut aus den Venen offenbar ohne Spur von Puls gleichförmig ausfliesst, so ist es gewiss, dass in den Haargefässen wirklich die pulsatorisch verstärkte Bewegung in die gleichförmige übergeht, und nur bei grosser Schwäche zur pulsatorisch verstärkten und im höchsten Grade der Schwäche zur blossen pulsatorischen wird. Die Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung suche ich in Folgendem: So wie die zusammengedrückte Luft in dem Windkessel der Feuerspritze, eben so macht die im Puls erweiterte, durch ihre Elasticität sich verengende Arterie die pulsatorische Bewegung des Blutes in den Arterien zur continuirlichen, aber pulsatorisch verstärkten Bewegung, indem die Verengerung der Arterien auch in den Zwischenzeiten des Pulses das Blut fortzutreiben fortfährt. Das stossweise Fortrücken des Blutes in der Aorta von jeder neuen in die Aorta gepressten Masse erlischt in den kleineren Arterien, wegen der compensirenden Ausdehnung der Arterien. Ungleiche Hemmungen in verschieden feinen Gefässen, wodurch das Blut in dem einen Gefässchen bald aufgehalten wird, während es in dem andern rasch fortfliesst, solche ungleiche Einflüsse müssen immer mehr im weitern Verlaufe der Gefässe die Bewegung vielfach modificiren. Aber der stossweise Druck des Herzens wird zuletzt nicht mehr bemerkt werden. Wenn aber ein Thier sehr schwach ist, und die Stosskraft des Herzens abnimmt, so werden auch die elastischen Wände der Arterien bei jedem Puls von weniger Blut erweitert, und werden auf das Blut weniger drücken, d. h. die Ursache, welche die stossweise Bewegung des Blutes in den Arterien zur continuirlichen macht, hört auf, und das Blut fliesst nur stossweise, und nun lässt sich dieser schwache Stoss noch in den Haargefässen mit dem Mikroskope erkennen. Nach Koch soll die oscillirende Bewegung des Blutes bei schwachen Thieren nicht vom Herzschlage abhängig seyn. Meckel's *Archiv für Anat. u. Physiol. 6. Bd. p. 216.* Mir schien sie dagegen wie Wedemeyer

Digitized by Google

ganz abhängig von den schwachen Zusammenziehungen des Herzens, wodurch das Blut den Widerstand der Capillargefässe nicht überwinden kann, und beim Nachlasse jeder Zusammenziehung des Herzens, trotz der Klappen, wieder etwas zurückfliesst.

Die Grösse des Widerstandes, welchen die Haargefässe dem Blute darbieten, lässt sich aus Hales und Keill's Versuchen ermessen. Keill verglich die aus der durchschnittenen Schenkelarterie und aus der Schenkelvene eines lebenden Hundes ausfliessenden Blutmengen, die sich wie $7\frac{1}{2}$ zu 3 verhielten, so dass der Widerstand also $\frac{9}{15}$ der Kraft des Arterienblutes beträgt. Nach Hales (Weber *Anat.* 3. 41.) floss, als er das Innere der Art. mesent. eines todten Thieres dem Drucke einer $4\frac{1}{2}$ Fuss hohen Wassersäule aussetzte, und den Darm dem Mesenterium gegenüber zerschnitt, aus den durchschnittenen feinen Gefässen in einer Zeit nur $\frac{1}{3}$ der Wassermenge aus, die aus den durchschnittenen Stämmen dieser Gefässe ausfloss, so dass der Widerstand der kleinsten Gefässe also $\frac{2}{3}$ der Kraft des Druckes betrug.

Da das Blut zur Zeit des Pulses in den Arterien pulsweise schneller fliesst, und die Bewegung in den verschiedenen Haargefässen, wie man unter dem Mikroskope sieht, verschieden schnell ist, so lässt sich nur die mittlere Geschwindigkeit des Blutes in den Haargefässen mit der mittlern Geschwindigkeit desselben in den Arterien vergleichen. Wäre die Summe der Lumina der Aeste eines Gefässes jedesmal gleich dem Lumen des Stammes, und die Summe aller Haargefässlumina gleich dem Stamme der Aorta, wären die Räume, durch welche das Blut fliesst, bei zunehmender Vertheilung doch beständig gleich weit, so würde die mittlere Geschwindigkeit des Blutes in den Haargefässen eben so gross als in den Arterien ersten Ranges seyn müssen, so wie unter gleichen Voraussetzungen auch die mittlere Geschwindigkeit des Venenblutes der Geschwindigkeit des Arterienblutes gleich sein müsste. Denn die Kraft, von welcher das Blut in den Arterien getrieben wird, ist zwar viel grösser als das, was in den Venen von dieser Kraft übrig ist, aber die in den Arterien grössere Kraft der Bewegung hat auch den ganzen Widerstand bis durch die Capillargefässe zu überwinden, das Blut der Venen hat ihn überwunden, und da die Summe des Widerstandes im ganzen Haargefässsystem und in den Arterien auf die ganze Blutsäule bis zum Herzen zurück wirkt, so hat die ganze Kraft des Herzens sogleich schon am Anfange der Aorta diesen Wiederstand zu überwinden, und bei gleicher Weite der Räume müsste sich das Arterienblut in jedem Theile mit gleicher Geschwindigkeit und nicht schneller als das Venenblut bewegen, so wie es aus den Capillargefässen hervorkömmt. Die Vergleichungen des Arterienblutflusses und des Venenblutflusses geben gar keine richtige Vorstellung von der Geschwindigkeit des Arterienblutes und des Venenblutes, sondern bloss von der Bewegungskraft der beiden Blutarten; dahingegen ihre Geschwindigkeiten erst gefunden werden, wenn man den Widerstand, den diese Kraft erleidet, abzieht. Hieraus folgt nun, dass, wenn die Wege des Blutes von dem Stamme bis in die Aeste

Digitized by Google

gleich weit bleiben, seine Geschwindigkeit in den Arterien im Capillargefässsystem und in den Venen gleich seyn müsste.

Da nun aber die Summe des Raumes der Aeste bei gewisser Länge immer grösser ist, als der Raum eines gleich langen Stammes, so ist dennoch die Geschwindigkeit in den engeren Stämmen grösser als in den zusammengenommen weiteren Aesten, und diese Geschwindigkeit nimmt im geraden Verhältnisse der Raumvergrösserung bis durch die Haargefässe ab.

Verschiedene Schriftsteller haben geglaubt, die Kraft des Herzens reiche nicht aus, um das Blut durch die Haargefässe zu treiben, und es bedürfe hierzu besonderer Hülfskräfte, welche hierzu supponirt worden sind, wie die Zusammenziehung der Haargefässe, oder die selbstständige Bewegung des Blutes, wovon die Beobachtung nichts zeigt. Dass die Bewegung des Blutes durch die Haargefässe bloss das Herz bewirkt, zeigt unumstösslich die Beobachtung, dass die stossweise Bewegung sich bei schwachen Thieren bis in die Haargefässe fortpflanzt, und die Thatsache, dass das Blut aus den Venen eines Thieres bei jeder Exspiration stärker ausströmt, wobei die Zusammendrückung der Gefässe der Brust durch die Exspiration, die den Strom des Arterienblutes verstärkt, selbst durch die Haargefässe hindurch wirkt. Diess beweist auch folgender Versuch von Magendie. Er unterband den Schenkel eines Hundes, ohne dass die Schenkelarterie und Schenkelvene in der Ligatur mitbegriffen waren. Wurde nun die Schenkelvene besonders unterbunden, so schwoll sie von dem Blute, welches aus dem Schenkel zurückkehrte, an, und ergoss ihr Blut strahlförmig beim Anstechen. Als man die Schenkelarterie comprimirte, hörte der Strom des Venenblutes allmählig auf zu fliessen, stellte sich aber wieder her, als man aufhörte die Arterie zu comprimiren. Poiseuille hat mittelst des schon öfter erwähnten Instrumentes den Druck des Blutes in dem peripherischen Stücke einer Vene gemessen, und bei wiederholten Versuchen gefunden, dass dieser Druck dem des Blutes in den Arterien durchaus proportional ist, mit jenem abnimmt und zunimmt. Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 365.

Die Bewegung des Blutes in den verschiedenen Capillargefässen und kleinsten Arterien ist verschieden schnell, je nach den Hindernissen, welche den Strom durch anastomotische Zweigelchen aufhalten. Wedemeyer hat über das Verhalten der Strömchen, die sich vereinigen, Folgendes bemerkt, was ich mit der Natur vollkommen übereinstimmend finde. Zuweilen fliessen die Blutkörperchen aus einem Kanälchen einem zweiten Strömchen schnell, und wie wenn sie angezogen würden, zu. In anderen Fällen ist der Strom, in den sie hinüber fliessen, rasch, sie selbst aber werden in dem zuführenden Strömchen aufgehalten, und es gelingt ihnen nur gelegentlich, sich mit dem Strome zu vereinigen. Zuweilen wird selbst aus dem reissenden Strome ein Kügelchen eine Strecke in den schwächern Kanal zurück geschleudert, und dann wieder zurück getrieben. Ich habe auch bemerkt, dass ein und dasselbe Verbindungskanälchen zwischen zwei zuführenden Strömen das Blut zuweilen in der einen, zuweilen in der andern Richtung erhält,

Digitized by Google

und dass Veränderungen im Drucke, in der Lage, Bewegungen des Thieres, immer die Ursache dieser Veränderungen sind; so wie denn alle diese Verhältnisse der Strömung hier nach rein mechanischen Ursachen, eben so wie in einem bewässerten Terrain, variiren. In den feinsten Capillargefässen, welche nicht roth, auch nicht einmal gelb aussehen, sondern ganz durchsichtig sind, sieht man die Blutkörperchen nicht mehr dicht hintereinander oder nebeneinander fliessen, hier haben die Körperchen nur hintereinander Raum, aber sie fliessen in ungleichen Zwischenräumen getrennt, und bald sieht man Kügelchen dadurch rinnen, bald wieder nicht, bald wieder mehrere. Indessen habe ich niemals Räume bemerkt, welche anhaltend ohne Kügelchen gewesen wären, und welche die Benennung Vasa serosa rechtfertigten (vergl. Seite 216.), und Wedemeyer, der diess gesehen haben will, gesteht selbst, dass er von Zeit zu Zeit doch Kügelchen durch solche Gefässe habe hindurch gehen gesehen. Die Kügelchen rotiren beim Durchströmen der Capillargefässe nicht; beim Frosche scheinen sie meist mit dem Längendurchmesser in der Achse des Gefässes zu strömen, aber häufig ist ihre Achse auch schief gestellt, und ihre Lage erleidet vielfache Veränderungen durch den mechanischen Einfluss der Wände, wobei sich die Kügelchen ganz passiv verhalten, und nie eine Spur selbstständiger Bewegung zeigen. Mehrere Beobachter haben bemerkt, dass die Kügelchen zuweilen an den engen Wänden zusammengedrückt und verlängert wurden. Doellinger und Dutrochet behaupten gesehen zu haben, dass Blutkörperchen in Gefässrinnen stockend sich hier mit dem Gewebe verbunden haben. Ich habe zwar auch häufig ein solches Stocken, besonders bei schon geschwächten Thieren beobachtet, und habe es früher für möglich gehalten, dass Blutkörnchen auf diese Art ihre Bewegung verlieren könnten; allein genauere Beobachtungen haben mich gelehrt, dass diese stockenden Kügelchen bald auch wieder frei werden, und dass es nur bei grosser Schwäche eine vollkommene Stockung, nämlich die Gerinnung in den kleinen Gefässen giebt, die gewiss eher das Gegentheil der Ernährung ist, als dieselbe erklären kann. Die von Doellinger angenommene Ernährung durch Vereinigung der Kügelchen mit dem Gewebe ist von keinem einzigen Beobachter bestätigt worden, und ich werde später aus anderen Beobachtungen sehr wahrscheinlich machen, dass die Ernährung nicht auf diese Art geschieht. Immer sieht man alle Kügelchen, welche in die Capillargefässe strömen, mit Schnelligkeit in die venösen Strömchen übergehen, und keine Kügelchen bei einem lebenskräftigen Thiere zurück bleiben. Prevost und Dumas haben zwar in dem Arterienblute mehr Kügelchen als in dem Venenblute zu finden geglaubt, diess ist aber ein theoretischer Irrthum; sie haben die Kügelchen für die alleinige Materie des Faserstoffes im Blute genommen; da der Faserstoff aber, wie meine Beobachtungen zeigen, im Blute aufgelöst ist, so ist es ganz unrichtig, nach der Quantität des Gerinnsels in beiden Blutarten die Menge der Kügelchen zu schätzen.

Sobald man das Glied comprimirt, hören alle Strömungen

Digitized by Google

auf, und jedes Kügelchen haftet unbeweglich auf der Stelle, die es vorher einnahm. Nach Kielmeyer haben Treviranus, Carus, Doellinger und Oesterreicher dem Blute eine eigene Propulsionskraft, sich nach den Capillargefässen hin, und von diesen ab zu bewegen, angenommen, eine Kraft, die nach dem Aufhören der Herzthätigkeit noch und unabhängig von derselben im Leben wirken soll. Ich habe mich schon in der Lehre vom Blute aus Gründen dagegen ausgesprochen. An sich kann das Blut eine gewisse Direction nicht haben, es müsste denn von der Substanz der Capillargefässe angezogen werden, wie Baumgaertner und Koch anzunehmen scheinen. Würde nun wirklich das Blut von den Capillargefässen und der lebenden Substanz angezogen, so kann es sich wohl darin anhäufen, aber man sieht nicht ein, wie eine solche Anziehung den Kreislauf unterstützen könnte, denn das Blut wird dadurch zum Aufenthalte in den Capillargefässen bestimmt; oder man müsste wieder annehmen, dass das Blut nur so lange von der Substanz in den Capillargefässen angezogen werde, als es aus den Arterien kommend noch hellroth ist, dass aber mit der Umwandlung invenöses Blut diese gegenseitige Verwandtschaft von Blut und Substanz aufhöre. Dann allein könnte in den Capillargefässen eine Hülfskraft des Kreislaufes liegen. Die Turgescenz gewisser Theile zu gewissen Zeiten beweist dagegen gar nichts für diese Hülfskraft, denn hier findet auch Anhäufung des Blutes statt. Ich komme wieder darauf zurück, was bei der Lehre vom Blute bemerkt worden, wo ich meine Versuche über die Dauer der Blutbewegung in abgeschnittenen Theilen, und ohne Solutio continui mit Mortification des Herzens durch Kali causticum bei Fröschen erzählt habe. p. 151. Obgleich die bloss durch Anziehung bedingte Saftbewegung der Pflanzen uns die Moglichkeit zu ähnlichen Phänomenen bei Thieren zeigt, so haben wir doch bis jetzt keine hinreichenden empirischen Gründe für dieselbe; ich habe schon bemerkt, dass ich die rhythmische Oscillation des Blutes bei stockendem Kreislaufe nicht für einen solchen Grund ansehe, und die von scharfsinnigen Männern, Baumgaertner und Koch, beigebrachten Gründe nicht für hinreichende Beweise halte.

Man kann die Frage von der Unterstützung des Kreislaufes durch Anziehung des Blutes nach den Capillargefässen verneinen, und doch diese Anziehung allein, in Fällen, wo eine Anhäufung von Blut in gewissen gesunden Theilen, in denen sich ein thätigeres Leben zeigt, zugeben, wie ich schon bemerkte. Diese Art der Anziehung bewirkt Anhäufung, nicht Unterstützung des Kreislaufes. Bei den Pflanzen sind diese Phänomene ganz augenscheinlich; dem Fruchtknoten, der das befruchtete Ei einschliesst, fliesst, wie Burdach sagt, mehr Saft zu; ubi stimulus ibi affluuxs. Aehnliche Phänomene giebt es auch bei Thieren.

Alle diese Phänomene örtlicher, vom Herzen unabhängiger activer Säfteanhäufung, die nicht durch ein Hinderniss des Rückflusses entsteht, hat man unter dem Namen Turgescenz, turgor vitalis zusammen gefasst. (Hebenstreit *de turgore vitali. Lips.* 1795., welche Abhandlung indess wohl keine richtige Ansicht dieser Gegenstände enthält.)

Digitized by Google

In vielen Lebensumständen wird die Wechselwirkung zwischen Substanz und Blut, die organische Affinität zwischen beiden, welche in der Ernährung ein Factum ist, unter Anhäufung des Blutes in den erweiterten Gefässen der Organe vermehrt. So bei der Brunst in den Genitalien, bei der Schwangerschaft im Uterus, im Magen, der in der Verdauung blutreicher ist, bei der Wiedererzeugung der Geweihe, wo die Höcker der Schädelknochen, auf welchen die Geweihe aufsitzen, gleichsam ein wahrhaftes Aufsteigen der Säfte wie in den Pflanzen zeigen, nachdem sie bis dahin auch von Blut durchzogen oder blutarm waren. Am häufigsten sind diese örtlichen Anhäufungen des Blutes, Gefässerweiterungen und Gefässentwickelungen aber beim Embryo, je nach den verschiedenen Organen, welche gerade als successiv nothwendige Theile oder Glieder des Ganzen durch die producirende Kraft entstehen. Die Kiemen der Salamander und Frösche, der Schwanz der Froschlarven sterben dagegen ab, wenn die organische Affinität zwischen Substanz und Blut aufhört. Man hat zur Erklärung dieser Phänomene an verstärkte Contraction der Arterien gedacht. Allein die pulsatorischen Muscularcontractionen existiren nicht, und dauernde Zusammenziehungen der Arterien, wenn sie nicht wurmförmig fortschreitend sind, oder wenn sie nicht durch besondere Klappen unterstützt sind, können keine Turgescenz hervorbringen. Eine Vermehrung der Blutmenge in einzelnen Organen kann auch plötzlich eintreten, und es gehören hierher die plötzlichen Blutanhäufungen im Gesicht bei der Schamröthe am ganzen Kopf bei heftigen Leidenschaften, Zustände, in welchen die localen Phänomene offenbar durch Nervenwirkung bedingt sind. Eben so gehören hierher die activen Congestionen des Blutes zu Organen, welche in einem gereizten Zustande sich befinden, zum Gehirn u. s. w. Vgl. Bonorden, Meck. *Archiv* 1827. 537. Wedemeyer *l. c.* 412. Schwann hat eine andere mögliche Erklärung dieser Phaenomene aufgestellt, wobei die Annahme einer Anziehung des Blutes vermieden wird. Durch ein Nachlassen der anhaltenden, lebendigen Contractilität einzelner Arterien kann nämlich grössere Erweiterung derselben durch den Druck des Blutes, und dadurch grösserer Blutandrang zu einzelnen Organen bedingt seyn. Schwann im *Encyclop. Wörterbuch der med. Wissenschaften. XIV.* 233.

Wenn die Gefässe eines Organes, in dem die Affinität zwischen Blut und Substanz gesteigert werden kann, einer beträchtlichen Erweiterung fähig sind, so findet Anschwellung dieses Organes und Erection desselben statt. Erectil ist bloss der Penis, vielleicht bei Einigen die Clitoris. Der scheinbar erectile Anhang am Kopfe des Truthahns besteht nach Schwann grösten Theils aus Muskelfasern. Die Erectionen scheinen daher in eine Ordnung mit den eben genannten Phänomenen zu gehören, sie bilden aber eine besondere Reihe, weil zur Erection ein eigenthümlicher Bau der Gefässe, nämlich beträchtliche Erweiterungsfähigkeit derselben bei einem sehr sinuösen Bau der Venen gehört. In diesem Falle bilden die erweiterungsfähigen Venen die zahlreichsten Anastomosen und Geflechte, und der Raum

Digitized by Google

aller dieser erweiterten Geflechte ist ohne Vergleich grösser als die zuführenden und abführenden Kanäle. Im nicht erweiterten Zustande fliesst diesen Gefässen so viel Blut zu, als Blut abfliesst. Durch eine gesteigerte Affinität zwischen dem Blute und den Wänden der Gefässe wird vielleicht das Blut in ihnen zurück gehalten. Sie schwellen um so straffer an, wenn die Zwischenräume der Venengeflechte von einem fibrösen Faden- oder Balkengewebe unterstützt sind, welches letztere mit einer fibrösen äussern Haut zusammen hängt, wie an den Corpora cavernosa penis. Injectionsmassen gelangen aus den Arterien der Ruthe ziemlich leicht in die Venen, besonders an dem Corpus cavernosum der Urethra und der Eichel; M. J. Weber hat mir eine Suite schöner Injectionen des Penis von den Arterien aus gezeigt. Vergl. Cuvier *vergl. Anat.* 4. 468. Moreschi, Meck. *Archiv* 5. 403. Ribes, ebend. 447. Tiedemann, Meck. *Archiv* 2. 95. Panizza *osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche. Pavia* 1830. Zwischen den anastomotischen Venen des Corpus cavernosum penis liegen beim Pferde blassröthliche Faserbündel, welche im Allgemeinen der Länge nach verlaufen, aber balkenartig zusammenhängen. Mikroskopisch untersucht zeigen sie sich nicht wie Muskelfasern; beim Kochen geben sie selbst nach 7 Stunden keinen Leim. Die essigsaure Auflösung wird von Cyaneisenkalium gefällt; daraus kann man indess nur schliessen, dass das fragliche Gewebe nicht in die Classe der niedern Gewebe, des Zellgewebes, Sehnengewebes und elastischen Gewebes gehört. Beim Versuche an einem lebenden Pferde konnte ich an diesem Gewebe durch eine galvanische Säule keine Contraction erregen. S. Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 50. 1835. *p.* 26.

Die Ursache der Erection ist bekanntlich vorzüglich örtliche oder vom Gehirn und Rückenmarke ausgehende Nervenreizung, so wie auch Congestion zum Gehirn und Rückenmark diess verursacht, wie zuweilen bei Erhängten. Die Ruthennerven, deren Zweige sich in dem Gefässgewebe der Ruthe verbreiten, sind die nächste Ursache zur Anhäufung des Blutes in demselben. Guenther hat beobachtet, dass nach Durchschneidung dieser Nerven beim Pferde das Glied nicht mehr erigirt werden kann. Meck. *Archiv* 1828. 364. Als der operirte Hengst zu einer Stute gebracht wurde, zeigte er zwar Lust zum Bedecken, allein die Ruthe blieb schlaff herabhängend. Am andern Tage war sie geschwollen, aber nicht erigirt.

Einige französische Schriftsteller, Chaussier und Adelon, und unter uns Stieglitz (*pathologische Untersuchungen* 1. 175.) nehmen an, dass der Zufluss des Blutes bei der Erection nicht das Erste, sondern die selbstständige Expansion des Gewebes das Ursprüngliche, die Anfüllung mit Blut die Folge bei der Erection sey. Hiergegen kann erwiedert werden, dass wir bis jetzt kein Beispiel einer activen Erweiterung kennen, und dass die künstliche Einspritzung des Penis die Erection vollständig nachahmt. Stieglitz vermuthet zugleich, dass die Stämme der Venen vielleicht auch einer Verschliessung durch Zusammenziehung fähig seyen. Versuche an der Vena dorsalis penis des Hundes und Schafbok-

Digitized by Google

kes, die ich anstellte, sind dieser Hypothese entgegen. Krause (Stieglitz a. a. O. p. 188.) theilt den Musculi ischiocavernosi die Fähigkeit zu, die Venen des Penis zu drücken, und so die Erection zu bewirken. Houston (*Dublin Hospital Reports* 1830. *T.* 5. Stieglitz a. a. O. 189.) hat sogar bei Thieren besondere Muskeln zwischen Penis und Schaambogen zur Compression der Vena dorsalis penis beschrieben. Sie sollen von den Schaambeinen entspringen, und sich über der Vena dorsalis mit einander in der Mittellinie verbinden. Sie sollen eine dünne Schichte musculöser und sehniger Fasern bilden. Diese Fasern sollen beim Menschen undeutlich seyn. Ich habe sie niemals finden können. Man kann zwar, wenn die Erection eben beginnt, durch eine willkührliche Zusammenziehung der Muskeln des Dammes diese momentan verstärken, aber diese Verstärkung ist nur momentan, wenn nicht die wahren Ursachen zur Erection vorhanden sind. Man kann die Musculi ischiocavernosi willkührlich zusammenziehen; aber hierdurch kann man keine Erection bewirken, wenn der Penis schlaff ist.

Nach einer von mir gemachten Entdeckung über den merkwürdigen Bau gewisser Arterien im Innern der Corpora cavernosa lernen wir ganz neue Elemente der Erklärung der Erection kennen. Ich habe nämlich gefunden, dass es ausser den letzten feinsten, in Venenanfänge übergehenden und zur Ernährung der Corpora cavernosa dienenden Zweigen der Arteriae profundae penis noch eine ganz andere Art von Zweigen derselben giebt, welche theils kurze rankenartige Auswüchse von $\frac{1}{6}$ Millim. Dicke, theils Quästchen solcher rankenartigen Auswüchse mit gekrümmten, stumpfspitzen, blinden Enden giebt, die ich Arteriae helicinae nannte. Diese Auswüchse ragen sämmtlich in die venösen Zellen der Corpora cavernosa penis hinein; sie finden sich vorzüglich im hintern Theile der C. cavernosa penis und des C. cavernosum urethrae. Obgleich sich an den Wänden dieser freien Arterienauswüchse, die sich am deutlichsten beim Menschen zeigen, keine Oeffnungen sehen lassen, so leidet es doch keinen Zweifel, dass sie es sind, welche das Blut, das bei der Ernährung durch die viel feineren Zweige der Arteriae profundae penis in die Venenanfänge übergeht, bei der Erection sogleich in die venösen Zellen ergiessen. Bei der Injection der Art. profunda penis geht die Masse von Leim und Zinnober jedesmal in die Zellen über; beim Auswaschen der ausgeschnittenen cavernösen Körper finden sich dann die Art. helicinae injicirt. Bei der lebendigen Ergiessung des Blutes aus diesen Ranken müssen dieselben durch den vom Rückenmarke ausströmenden Nerveneinfluss das Blut in grösserer Quantität anziehen. Diese Entdekkung wirft zugleich ein neues Licht auf die Wechselwirkung des Blutes, und der kleinsten Gefässe in anderen Theilen und auf den Turgor vitalis. Siehe Mueller's *Archiv f. Anat. u. Physiol.* 1834. *p.* 202. *tab.* 13. Aus den cavernösen Körpern fliesst das Blut theils durch Emissarien an den Seiten und an der Oberfläche dieser Körper zurück in die Zweige der Vena dorsalis penis; theils durch tiefere Venen, die an der Wurzel der C. caver-

Digitized by Google

nosa hervorkommen, unmittelbar in den Plexus pubicus hinter der Symphyse der Schaambeine, wohin auch die Vena dorsalis übergeht. Da diese tieferen Venen gar nicht in die Vena dorsalis gehen, so kann auch keinerlei Druck auf die Vena dorsalis Ursache der Blutanhäufung im Penis werden. S. Mueller im *encyclop. Wörterb. d. medicin. Wissensch. Art. Erection.*

Die Empfindungen der Geschlechtstheile hängen von dem Nervus pudendus ab; aber die Erection selbst scheint vorzugsweise vom organischen Nervensystem abzuhängen. Der Plexus hypogastricus giebt nämlich ein Geflecht sehr feiner, von mir beobachteter Fäden, welche unter dem Schaambogen auf die Wurzel der Ruthe treten, und sich mit Zweigen der Ruthennerven verbindend, ins Innere der Corpora cavernosa penis et urethrae treten, und sich auf den Gefässen verzweigen. Siehe J. Mueller *über die organischen Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Berlin* 1836. Die Empfindungsnerven der Ruthe wirken auf das Rückenmark, von dort aus wird wahrscheinlich die Thätigkeit der organischen Nerven und der Gefässe bei dem Acte der Erection erregt; hierauf folgt die Ergiessung des Blutes in die Corpora cavernosa, und die Erection wird vollständiger durch die Zusammenziehung der Musculi ischiocavernosi, welche den Rücktritt des Blutes zum Theil hemmen. Es ist interessant die Stärke des Druckes zu kennen, welche nöthig ist, um dem Penis durch Anhäufung von Flüssigkeit im Innern der Corpora cavernosa Steifigkeit zu ertheilen. In eine in das Corpus cavernosum penis einer Leiche gemachte Oeffnung, band ich eine gläserne Röhre von 6 Fuss Höhe fest, welche senkrecht stehend mit Wasser gefüllt wurde. Der Rückfluss des Wassers in die Unterleibsvenen wurde durch einen Druck im Becken verhindert. Bei einer Wassersäule von 6 Fuss Höhe wurde der Penis vollkommen erigirt und steif. Das bei der Erection in den Corpora cavernosa angehäufte Blut steht also unter einem Druck, der einer 6 Fuss hohen Wassersäule gleich ist. So stark ist ohngefähr auch der Druck, unter welchem das Blut in den Arterien fliesst.

Mit dem Phaenomen der Erection darf die Erhebung der Brustwarze des Mannes und Weibes bei mechanischer Reizung und die Bewegung des Fleischlappens am Gesicht des Truthahns bei Leidenschaft nicht verwechselt werden. Die Erhebung der Brustwarze tritt beim Mann sogleich ein, wenn man rasch darüber wegfährt. Die Warze wird dann dünner und länger. Säugende Weiber fahren auch zuweilen rasch über die Brustwarze weg, um sie, wenn sie eingefallen ist, zur Erhebung zu bringen. Diese Erscheinung rührt wahrscheinlich von jenem contractilen Gewebe her, das an verschiedenen Stellen unter der Haut zerstreut ist, wie in der Tunica dartos, in der Vorhaut und welches auch um die Hautfollikeln vorzukommen scheint, wo es das Phaenomen der Gänsehaut erzeugt. Der bewegliche Lappen am Gesicht des Truthahns enthält keine Spur von erectilem Gewebe, sondern nach Schwanns Entdeckung ein starkes Bündel wahres Muskelfleisch.

Es schien anfangs, dass directe Versuche über die Wirkung

Digitized by Google

von verschiedenen Stoffen bei der Application auf die Capillargefässe unsere Kenntnisse über die Fähigkeit derselben, die Capillargefässe zu verengern, oder vielleicht durch Vermehrung der Turgescenz zu erweitern, sehr vermehren würden. Allein wir befinden uns in einer gänzlichen Verwirrung über die Zustände, welche verschiedene chemische Substanzen auf die Capillargefässe applicirt, in ihnen hervorrufen. Thomson, Wilson, Hastings, Kaltenbrunner, Wedemeyer und Koch haben hierüber interessante Beobachtungen angestellt. Man beobachtet auf Application chemischer Agentien auf die kleinen Arterien, Haargefässe und Venen zweierlei Veränderungen. In vielen Fällen tritt Erweiterung der Haargefässe nach einigen Minuten ein, wie z. B. immer nach Application des Kochsalzes (Thomson, Hastings, Wedemeyer, Oesterreicher und Koch). Doch sah Wedemeyer, dass die kleinen Arterien des Mesenteriums durch Kochsalz sich zuert um $\frac{1}{3}$ ihres Durchmessers verengten, und dass dann eine grosse Erweiterung eintrat. Nach Application von Ammonium hat Thomson Verengerung der Gefässe mit Abnahme der Schnelligkeit der Blutbewegung, Wedemeyer und Hastings dagegen Erweiterung der Gefässe mit Stockungen beobachtet; Oesterreicher sah auf Application einer schwachen Auflösung von Ammonium Erweiterung, nach Application concentrirter Stoffe Verengerung der Gefässe mit endlicher Stockung der Blutbewegung; Weingeist verengerte die Gefässe in Hastings Versuchen eben so, wie heisses Wasser bei Fröschen; Eis zog die Gefässe ebenfalls zusammen. Häufig bemerkte Hastings, dass diese Mittel zuerst Verengerung, späterhin Erweiterung bewirkten. Wedemeyer sah von Tinct. opii, Acidum tartaricum, höchst verdünnter Salzsäure, Alcohol keine constante Resultate. Nur in ein paar Fällen sah er, dass Alcohol auf Arterien und Haargefässe applicirt, den Blutlauf hemmte, ohne doch in den Arterien eine deutliche Contraction hervorgebracht zu haben. In den Fällen, wo Stoffe eine Erweiterung hervorbringen, sieht man in der Regel auch Stockung des Blutes, nur Thomson bemerkte bei der Erweiterung von Kochsalz bald vermehrte Schnelligkeit, bald Stockung. Man bemerkt auch bei verengerten Gefässen bald vermehrte, bald verminderte Schnelligkeit. In einem verengerten Kanale muss die Schnelligkeit ceteris paribus zunehmen, nach einer andern Ursache dagegen abnehmen, wenn die Ursache, welche den Kanal zusammenzieht, auch das Blut zäher macht und zum Gerinnen bringt. In einem erweiterten Kanale müsste das zugeführte Blut ceteris paribus langsamer fliessen; nur insofern die von aussen bewirkte Erweiterung die Friction vermindert, wird das Schnellerfliessen begreiflich. Die Erklärung jener Phänomene ist jetzt noch ganz unmöglich.

Es kann seyn, dass die Zusammenziehung in allen jenen Fällen eine active Contraction der thierischen Theile, es kann aber auch seyn, dass sie eine bloss chemische Wirkung ist, und in der todten Materie eben so wirkt, indem eine Materie z. B. den thierischen Theilen einen Theil ihres Wassers entzieht. Es kann seyn, dass die Wirkung der Stoffe, welche Erweiterung der Haargefässe bedingen, durch vermehrte Turgescenz oder organische Affinität

Digitized by Google

zwischen Blut und Substanz wirkt; es kann aber auch diese Erscheinung eben so gut durch blosse Endosmose erfolgen. Siehe 5. Cap. Ein Salz durchdringt die Theile bis zu den Capillargefässen, dieses Salz strebt sich in dem Blute aufzulösen; das Blut der Capillargefässe strebt das Salz zu lösen. Durch diese Anziehung muss das Blut in den Capillargefässen aufgehalten und angehäuft werden, und die Gefässe müssen sich erweitern und die Blutbewegung stocken. Es ist sogar wahrscheinlich, dass in der Regel, wenn ein Salz Erweiterung der Capillargefässe bewirkt, diess durch blosse Endosmose geschieht.

Da die genannten Versuche mit Application fremder Materien auf die Capillargefässe in Hinsicht der Resultate so verschiedene Auslegung zulassen, so tragen sie auch fast gar nichts zur Erklärung des Zustandes der Capillargefässe in der Entzündung bei, und wir müssen uns beschränken, hier bloss das Thatsächliche des Entzündungsprozesses mitzutheilen, wie es besonders Thomson, Kaltenbrunner und Koch kennen gelehrt haben. Thomson *über die Entzündung*, übers. von Krukenberg. *Halle* 1820. Kaltenbrunner *exp. circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione. Monach.* 1826. Eine kritische, auf eigene Beobachtungen gestützte Arbeit hat Koch, Meck. *Archiv f. Anat. u. Physiol* 6., geliefert.

Ein entzündetes Organ enthält zu jeder Zeit der Entzündung mehr Blut in den kleinsten Gefässen oder Capillargefässen; allein die Bewegung des Blutes durch die Gefässe ist in verschiedenen Zeiten ganz verschieden, im Anfange strömt das Blut nicht allein in Menge dem entzündeten Parenchyma zu, es wird auch wieder ohne grosses Hinderniss in die Venen weiter geführt; in dem Grade aber, als die Entzündung weiter schreitet, stockt die Circulation zuerst in einzelnen, dann in immer mehr ausgefüllten Capillargefässen, und im höchsten Grade der Ausbildung sind alle Capillargefässe mit wahrscheinlich geronnenem, jedenfalls aber auf irgend eine Art zersetztem stockendem Blute gefüllt. Nach Koch soll sich dabei der Färbestoff der Blutkörperchen im Serum auflösen, was im gesunden Blute unmöglich ist, und mir auch noch in der Entzündung zweifelhaft scheint, da die faserstoffigen Exsudate blutig seyn müssten. Nach Koch entstehen keine neuen Gefässe in entzündeten Theilen (wobei aber zu erinnern ist, dass sie jedenfalls sicher oft in dem exsudirten Faserstoffe entstehen). Membranen, welche eine freie Oberfläche darbieten, ergiessen im Zustande der höchsten Ueberfüllung der Capillargefässe den im Blute aufgelösten Faserstoff, welcher dann auf der Oberfläche der Membran coagulirt und eine Pseudomembran bildet. Wo die Exsudation nicht erfolgen kann, häuft sich die gerinnbare Materie in den Capillargefässen der Organe selbst an. Wenn diese Stockung nur in einzelnen Strecken der Capillargefässe stattfindet, andere aber noch eine unvollkommene Circulation in dem Organe unterhalten, so ist das Organ bloss verdichtet, was man in den Lungen hepatisirt, in anderen Organen verhärtet nennt. Wenn aber durch die Heftigkeit der Entzündung alle Circulation in einem Organe aufhört, und alle Capillargefässe nicht allein coagulirtes, sondern auch zersetztes Blut enthalten, und die Substanz selbst zersetzt ist, so

Digitized by Google

wird ein solcher Theil brandig, d. h. es tritt örtlicher Tod ein. Thomson (Meck. *Archiv* 1. *p.* 448.) hat beobachtet, dass die Gefässe im Brande zuweilen mit coagulirtem Faserstoffe gefüllt, zuweilen durch Entzündung verwachsen sind. Brand tritt leichter bei geschwächtem Nerveneinflusse und in gelähmten Theilen ein.

Wird endlich die Entzündung noch längere Zeit durch neue Ursachen oder durch die Dauer der alten hingehalten, so wird die Substanz der Organe auf eine eigenthümliche Weise zersetzt; es stossen sich nämlich die zersetzten Theile als Eiter ab, eine aus Kügelchen bestehende Materie, die grösser sind als die Blutkörperchen. Niemand, auch Kaltenbrunner nicht, hat die Entstehung des Eiters noch gehörig mikroskopisch beobachtet. Man kann hierzu kein kaltblütiges Thier brauchen, und man müsste die Untersuchung an Säugethieren, Fledermausflügeln anstellen.

Zwar beginnt die Entzündung mit Phänomenen, die der Turgescenz ähnlich sind. Die Organe nehmen durch veränderte organische Affinität zwischen Blut und Substanz mehr Blut auf als sonst, und verhindern seinen Ausfluss. Allein man muss sich sehr hüten, diess vermehrtes Leben zu nennen, was eine Störung der Function bewirkt, und ein Bestreben der Natur zur Folge hat, die durch den Entzündungsreiz verursachte materielle Veränderung, eine die Action des Organes verhindernde Verletzung, wieder auszugleichen. Wäre das Leben erhöht, so würden die krankhaften Ausgänge der Entzündung nicht eintreten. In der Wiedererzeugung der Geweihe, in dem Phänomen der Erection, in der Turgescenz des Uterus nach der Conception ist wirklich Turgescenz mit örtlich vermehrter Lebenskraft verbunden. Reizung und Lebenskraft steigen hier gewissermassen in gleichem Grade, aber in dem Phänomen der Entzündung steigt nur die materielle Veränderung; der Schein von Turgescenz, wobei die materiell veränderten Theile das Blut zurückhalten oder anziehen, um ihren Zustand wieder herzustellen(?), geht allmählig mit der Anhäufung des Blutes und mit der materiellen Veränderung des Organes in örtlichen Tod über, sobald die materiell veränderten Theile die Fähigkeit, welche sie im gesunden Zustande haben, die vitalen Eigenschaften des Blutes zu erhalten, verlieren und das Blut sich innerhalb der Capillargefässe zersetzt. Entzündung entsteht von Reizung der Capillargefässe, ist aber an sich weder ein vermehrtes, noch ein vermindertes Leben, weder Sthenie noch Asthenie, sondern ein eigenthümlicher Zustand, der bald mit noch normalen allgemeinen Lebenskräften, bald mit unterdrückten Lebenskräften vorkömmt, und im Maasse seiner Ausbildung in einem wichtigen Organe jedesmal auch die Lebenskräfte erschöpft, wenn sie im Anfange nicht erschöpft waren; sie ist wesentlich eine durch materielle Veränderung bewirkte krankhafte Wechselwirkung zwischen Substanz und Blut, zusammengesetzt aus einer örtlichen Verletzung, einer örtlichen Neigung zur Zersetzung und einer organischen Thätigkeit, welche dem Zersetzungsstreben das Gleichgewicht zu halten strebt, was zuweilen unter den Erscheinungen einer heilenden Wunde gelingt, zuweilen nicht gelingt.

Wenn die Haut in Entzündung versetzt wird, durch ein Ve-

Digitized by Google

sicans, so sondert sie zuerst statt Perspiration und Schweiss eine Flüssigkeit ab, welche nur aufgelöstes Eiweiss enthält; wird die Entzündung aber heftiger, so kann jede Haut Faserstoff ausschwitzen, und in der letzten Zeit der Entzündung wird nur Eiter gebildet.

Verschiedene Schriftsteller haben in der neuern Zeit zu beweisen gesucht, dass die Nerven einen grossen Antheil an der Bewegung des Blutes in den Capillargefässen haben. Treviranus und Baumgaertner haben am meisten diese Ansicht unterstützt. So gewiss es ist, dass vom Einflusse der Nerven die Turgescenz der Theile abhängt, ihre Anziehung gegen die ernährende Flüssigkeit, so wenig wird der Kreislauf hierdurch nothwendig unterstützt. Die zahlreichen, von dem trefflichen Baumgaertner angestellten Versuche beweisen den Antheil der Nerven an dem Kreislauf durch die Capillargefässe durchaus nicht evident. Dieser wahrheitliebende Forscher ist aufrichtig genug, zu gestehen, dass viele seiner ingeniösen Versuche nicht stringent beweisen; allein durch die Zahl unvollkommener Beweise wird die Sache nicht besser bewiesen. Baumgaertner bewirkte zwischen dem Nervus ischiadicus und den Fusszehen eines Frosches einen starken galvanischen Strom, welcher die Reizbarkeit dieser Nerven zerstörte, worauf der Blutlauf in den mehrsten Fällen in dem Gliede aufhörte. Da aber hier durch den starken galvanischen Strom die Nervenkraft zerstört wurde, so wurde auch die Ursache aufgehoben, welche die Gerinnung des Blutes verhindert, und ausserdem bewirkt schon der Galvanismus die Gerinnung des Eiweisses im Blute. Nach Zerstörung des Rückenmarkes und Gehirns sah Baumgaertner den Blutlauf sich verlangsamen, obgleich das Herz noch fortschlug; allein die Bewegung des Herzens selbst war geschwächt, und alle Versuche, wo es auf ein unbestimmtes Mehr oder Minder ankömmt, beweisen nicht. Treviranus hatte behauptet, dass nach Durchschneidung des Nervus ischiadicus der Blutlauf in der Schwimmhaut aufhöre, diess fand jedoch Baumgaertner selbst nicht bestätigt, wenn die Schwimmhaut gehörig nass erhalten wurde. Die zahlreichen Versuche von Wilson Philip (*an experimental inquiry into the laws of the vital functions. London* 1817.) beweisen nichts weniger als den Einfluss der Nerven auf die Bewegung des Blutes in den Capillargefässen. Die von ihm auf Gehirn und Rückenmark applicirten Narkotica, Opium, Infusum Nicotianae, machen die Bewegung des Blutes in den Capillargefässen langsamer, aber durch das Herz; die plötzliche Zerstörung der Centraltheile des Nervensystems hebt den Kreislauf in den Capillargefässen auf, aber durch das Herz. Koch (Meck. *Archiv* 1827. *p.* 443.) hat einen ingeniösen Versuch angestellt, um zu sehen, ob die Nerven Antheil an der Blutbewegung in den Capillargefässen haben, ein Versuch, der durch seine Einfachheit wirklich zu einem Resultate führen könnte. Er beobachtete nach Amputation des Beines eines kleinen Frosches in der Schwimmhaut des amputirten Gliedes nur 3 Min. lang Bewegung. Wenn er aber alle Theile bis auf den Nervus ischiadicus durchschnitt, so dauerte die Bewegung $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunde. Ich habe diesen Versuch wiederholt, er hat mir aber nicht dieselben Re-

Digitized by Google

sultate geliefert. Nach völliger Amputation des Beines bei starken Fröschen sah ich in der Schwimmhaut langsame Bewegungen noch 10 Minuten lang, und es war kein Unterschied, als ich den Nervus ischiadicus allein die Communication bilden liess. Etwas, was hier Irrthum veranlassen kann, ist, dass der Frosch die Muskeln des amputirten Unterschenkels noch willkührlich bewegt, so lange der Nervus ischiadicus unverletzt ist und die Communication erhält. Nach einer Zusammenziehung dieser Muskeln sieht man immer wieder eine kleine Bewegung in dem Blute der Capillargefässe, welche aber eine ganz mechanische Ursache hat.

Bei den Fröschen kann man leicht das Rückgrat öffnen, die hinteren Wurzeln der Nerven für die Hinterbeine vom Rückenmark ablösen, und mit einer Zink- und Kupferplatte galvanisiren. Diese hinteren Wurzeln der Spinalnerven erregen keine Zuckungen in den Muskeln, wenn man sie mechanisch oder galvanisch durch Application beider Pole auf die Wurzeln irritirt, dagegen die vorderen Wurzeln unter diesen Umständen auf der Stelle Zuckungen erregen. Ich wollte nun sehen, ob Application des Galvanismus auf eine hintere Wurzel die Bewegung des Blutes in der Schwimmhaut beschleunigt, ein delicater und etwas complicirter Versuch, bei dem Herr Stud. Hoevel assistirte. Ich fand durchaus keine Veränderung der Blutbewegung mit dem Mikroskope in dem Momente, als der Assistent die Kette an der hintern Wurzel schloss. Die vorderen Wurzeln eignen sich zu diesem Versuche nicht, weil dann Zuckungen entstehen, welche die Blutbewegung verändern. Es könnte indess freilich seyn, dass gerade die vorderen Wurzeln Einfluss auf die Turgescenz in den Capillargefässen ausübten. Erwägt man alles diess, so folgt, dass die Nerven wahrscheinlich nicht zur Unterstützung des Kreislaufes in den kleinen Gefässen beitragen, obgleich es gewiss ist, dass die Anhäufung des Blutes in gewissen Theilen bei der Turgescenz vorzüglich von den Nerven abhängig ist. Zur Unterhaltung des Kreislaufes in den kleinen Gefässen ist übrigens keinerlei Hülfskraft nöthig, weil selbst bei geschwächtem Herzen des Frosches das Blut noch stossweise in den kleinen Gefässen durch die Kraft des Herzens weiter getrieben wird.

c. Von den Venen.

Wenn die Kraft des Herzens ausreicht, das Blut durch die Arterien, durch die Capillargefässe, und trotz aller Hindernisse wieder durch die Venen zum Herzen selbst zu treiben, so dringt innerhalb einer gewissen Zeit so viel Blut durch die Venen wieder ins Herz, als durch die Arterien aus ihm heraustritt. Die Kraft des Herzens kann aber auch für diesen Zweck noch durch besondere Hülfsmittel unterstützt seyn. Dies sind die Klappen, welche so angeordnet sind, dass abwechselnder Druck auf die Venen die Bewegung des Blutes nach dem Herzen befördert, während der Mangel an gehöriger Körperbewegung schon aus diesem Grunde den Kreislauf erschweren muss. Eigenthümliche Bewegungen der Venen giebt es ausser an dem Anfange der Hohlvenen

Digitized by Google

und der Lungenvenen nicht, und man sieht bei Säugethieren deutlich die Grenze, wie weit sich diese Bewegung der Hohlvenen erstreckt, weil der darüber hinaus gelegene Theil der Venenstämme vielmehr ausgedehnt ist, während sich die contractilen Anfänge der Hohlvenen verengern. Flourens, der die Abdominalvenenstämme der Frösche sich bewegen sah, kannte den Einfluss der Lymphherzen der Frösche nicht, welche die Lymphe in die Venenstämme treiben. Aber bei dem Aal giebt es nach Marshall Hall's Entdeckung eine Art Hülfsherz am Schwanzende, ein Organ, das ich bei anderen Fischen nicht gefunden habe. Froriep's *Not.* 727. Dies liegt zu den Seiten des letzten Schwanzwirbels, ist doppelt und treibt das Blut, das es aus den feinen Venen des Endes der Schwanzflosse aufnimmt, in die Vena caudalis. Viele Neuere halten die Kraft des Herzens für ungenügend, und schreiben der Saugkraft des Herzens einen gewissen Antheil an dem Kreislaufe zu, indem nach dieser Ansicht nach der Zusammenziehung der Höhlungen diese wieder zu einem mittlern Zustande von Erweiterung gelangen, und einen relativ leeren Raum bilden. Zugenbuehler *diss. de motu sang. per venas, Archiv der Med. und Chir. Schweiz. Aerzte.* 1816. Schubarth in Gilbert's *Annalen* 1817. Dagegen Carus, Meck. *Archiv* 4. 412. Die Erweiterung der Herzhöhlen nach der Zusammenziehung ohne eine Flüssigkeit, welche sie ausdehnt, kann zwar nur gering seyn. Es fragt sich aber, wie viel auf die Saugkraft des Herzens bei der Circulation zu rechnen ist. Die grossen Venen werden bei der Zusammenziehung des Vorhofes vom Blute voller, indem ein Theil des Blutes zurückprallt, oder das zuströmende Blut aufgehalten wird, und während der Erweiterung leerer. Diess haben Magendie, Wedemeyer gesehen, und ich habe mich davon beim Hunde überzeugt. Diess Factum muss man kennen zur Beurtheilung der Versuche. Wedemeyer und Guenther öffneten einem Pferde die Vena jug., nachdem sie oberhalb unterbunden war, in diese wurde ein Catheter gesteckt, der mit einer gebogenen Glasröhre verkittet war. Die absteigende längere Branche der Glasröhre (2 Fuss) wurde in ein Glas mit Wasser gehalten. Anfangs traten Inspiration und Herzschlag fast gleichzeitig und gleich schnell, 30 Mal in der Minute ein, eben so häufig stieg das gefärbte Wasser 2 und mehrere Zolle in der Glasröhre rasch auf, und sank dann jedesmal auf seinen frühern Standpunkt zurück. Allmählig wurden die Inspirationen doppelt so häufig als die Pulsschläge, und nun sahen Wedemeyer und Guenther lange Zeit, dass die Flüssigkeit nicht bei jeder Inspiration, sondern bei jedem Pulsschlage, und mithin gleichzeitig bei jeder Erweiterung des Vorhofes aufstieg. Dieser Versuch scheint die Saugkraft des Herzens ausser Zweifel zu setzen. Dass indess diese Kraft nicht die vorzüglichste Ursache ist, durch welche das Blut sich in den Venen bewegt, beweist das Factum, dass die Kraft des Herzens bis in die Venen reicht, dass ein durchschnittener Venenstamm fortdauernd aus dem, dem Herzen entgegengesetzten, mit den Capillargefässen und Arterien in Verbindung stehenden Stücke Blut ergiesst. Bei der Zusammendrückung der Brust durch das Ausathmen werden

Digitized by Google

die Gefässe der Brust comprimirt. Dieser Druck hält das Blut in den Venenstämmen auf, und verstärkt den Strom in den Arterien. Magendie zeigte, dass die Arterien bei der Exspiration stärker spritzen; er durchschnitt den Venenstamm eines Gliedes, unterband das zum Herzen gewandte Stück, und beobachtete nun, dass das Venenblut bei jeder Exspiration mit verstärktem Strome floss. Offenbar ist nun doch die Zusammendrückung der Gefässe bei der Exspiration eine weit geringere Kraft, als die des Herzens.

Neulich hat Parry den Untersuchungen über die Bewegung des Blutes in den Venen eine neue Wendung gegeben. Im vollen Zustande erfüllt das Herz den Herzbeutel ganz. Wenn es sich nun zusammenzieht, so entsteht ein relativ leerer Raum in demselben. Das Blut der Venenstämme muss die Vorhöfe füllen, und diese den relativ leeren Raum des Herzbeutels auszufüllen streben. Parry legt aber noch mehr Gewicht auf die Inspiration, er behauptet, durch das Einathmen oder Erweitern der Brusthöhle entstehe in der Brusthöhle ein relativ leerer Raum, und es müsse daher jede Flüssigkeit von aussen oder von innen streben, diesen Raum einzunehmen. Von aussen thut es die atmosphärische Luft, indem sie die Lungen im Maasse der Erweiterung der Brusthöhle ausdehnt, von innen müssen vermöge des äussern Luftdruckes die Flüssigkeiten der Gefässe zuströmen, und die Gefässstämme sich strotzend füllen. Da aber nach jeder Zusammenziehung des Herzens in dem Herzbeutel ein relativ leerer Raum entsteht, den die sich mit Blut füllenden Vorhöfe auszufüllen streben, so muss das Zuströmen des Blutes nach der Brusthöhle im Acte der Inspiration auch vorzugsweise nach den Vorhöfen stattfinden. Froriep's *Notizen n.* 260. 374. 393. 394. Parry schob eine gebogene Röhre in die geöffnete und oberhalb unterbundene Vena jugularis eines Thieres, und liess das untere Ende in ein Gefäss mit gefärbter Flüssigkeit halten. Er sah, dass bei jeder Inspiration die gefärbte Flüssigkeit in der Röhre aufstieg, bei der Exspiration aber still stand, oder selbst theilweise zurücktrat. Wenn die Röhre dieses Apparates in den Herzbeutel selbst gebracht wurde, so beobachtete er auch das Aufsteigen der Flüssigkeit.

Poiseuille hat diesen Gegenstand auf eine zuverlässigere Art untersucht. Er bediente sich des schon beschriebenen, dem Heberbarometer ähnlichen Instrumentes. Während sich die Röhre in einer verticalen Lage befindet, wird eine Auflösung von unterkohlensaurem Natron hinein gebracht, welches die Eigenschaft besitzt, das Blut, mit welchem sie sich vermischt, in flüssigem Zustande zu erhalten. Die Flüssigkeit füllt den kleinen herabsteigenden Schenkel, und steigt im grossen aufsteigenden Schenkel bis zu gleicher Höhe des horizontalen Anfangsstückes. Dieser Punkt ist der Nullpunkt der Scala, welche in Millimetern auf dem grossen verticalen Schenkel verzeichnet ist. Indem man nun in eine Vene das an dem horizontalen Theile angeschraubte Anfangsstück einführt, wird die Flüssigkeit, wenn eine Anziehung durch Saugen stattfindet, zum Theil in die Vene übertreten; und in dem langen verticalen Schenkel unter Null fallen, im umgekehrten Falle steigen. Nachdem das Instrument in die Ven. jug. ext. eines Hundes ein-

Digitized by Google

geführt war, beobachtete man, dass die Flüssigkeit im Momente der Exspiration steigt, im Momente der Inspiration fällt. Das Steigen betrug 85 Millim., das Fallen — 90, später das erste 60, das zweite — 70. Bei grossen Anstrengungen betrug das Steigen während der Exspiration 140 = 155 Millimeter, das Fallen — 240 — 250 beim Einathmen. Diese Versuche, welche wiederholt gleiche Resultate lieferten, bestätigen die Schlussfolge von Parry, dass die Brust im Augenblicke des Einathmens in den starken Venenstämmen der Brust eine Annäherung des Blutes der Venen erzeugt. Anderseits kann die Exspiration die Bewegung des Venenblutes nicht in allen Venen aufhalten, weil die Klappen in den Venen, welche dem Muskeldrucke ausgesetzt sind, das Zurückweichen des Blutes verhindern.

Parry hat den Einfluss des Einathmens auf die Anziehung des Venenblutes überschätzt. Dieser Einfluss zeigt sich nur an den der Brust nahen Venenstämmen. Dagegen erhielt Poiseuille gar keine Veränderung des Niveaus an seinem Instrumente, an den ferneren Venen, z. B. den Venen der Extremitäten. Das Einathmen entleert die Venenstämme der Brust, das Blut der anderen Venen findet dadurch weniger Widerstand; aber dieser Einfluss ist nicht die Hauptursache der Bewegung des Venenblutes, er fällt ohnehin bei den nicht durch Erweiterung der Brust, sondern durch Schlucken einathmenden Amphibien, bei den Fischen und im Foetus weg.

Es ist also keinem Zweifel unterworfen, dass die Kraft, welche das Blut in den Arterien bewegt, auch seine Bewegung in den Haargefässen, und sein Zurückströmen in den Venen bis zum Herzen bedingt, und dass die Anziehung des Blutes in den Hauptvenenstämmen beim Einathmen, die Saugkraft, die Klappen der Venen nur einen Theil des Widerstandes, den das Blut auf diesem Wege erfährt, wieder aufheben. Dass die Capillargefässe diese Kraft nicht aufheben, wird auch aus dem Kreislaufe der Fische bewiesen, deren Arterienblut noch zu allen Organen geführt wird, nachdem es zuvor schon durch das Capillargefässsystem der Kiemen durchgegangen ist. Die Kraft des Herzens hat hier das Blut durch zwei Capillargefässsysteme, zuerst durch die Kiemen, dann durch die Arterien, die, wie wir von Nysten wissen, hier auch nicht contractil sind, und wieder durch das Capillargefässsystem des ganzen Körpers zu treiben. So reicht auch die Kraft des Herzens hin, das Blut bei allen Wirbelthieren noch durch das Capillargefässsystem der Pfortader zu treiben, nachdem es schon die Capillargefässe des Darmes, der Milz etc. durchgegangen ist.

Die Veränderungen der Blutbewegung, welche durch die Athembewegungen entstehen, bewirken in einigen Theilen eine Art von Anschwellung, indem die Zusammendrückung der Brust im Ausathmen die Gefässstämme comprimirt, das Blut der Arterien stärker aus der Brusthöhle austreibt, und das Einströmen des Venenblutes in den rechten Vorhof aufhält. Man sieht daher nicht allein die Jugularvenen beim Ausathmen voller, sondern selbst das Gehirn zur Zeit des Athmens blutreicher werden, so

Digitized by Google

dass das blossgelegte Gehirn auch bei Menschen, welche trepanirt sind, beim Ausathmen sich etwas erhebt, und beim Einathmen senkt. Magendie will diess auch vom Rückenmarke beobachtet haben. Während des Lebens kann bei geschlossenem Schädel keine Bewegung des Gehirnes durch das Athmen entstehen, da die Schädelhöhle von festen Wänden eingeschlossen ist und das Gehirn sein Volumen nicht verändern kann. Was man darüber vorgebracht hat, lässt sich leicht durch die physikalische Unmöglichkeit widerlegen.

Wenn die Bewegung des Blutes in den Venenstämmen durch mechanische Hindernisse gehemmt wird, so entsteht Erguss von wässerigen eiweisshaltigen Theilen des Blutes in die Höhlen und ins Zellgewebe. Faserstoff wird gewöhnlich nicht ergossen; in einem von A. Magnus beobachteten Falle von Ascites aber, gerann die durch die Punction entleerte Flüssigkeit ausser dem Körper nach einigen Minuten vollständig.

Häufig findet man in den Arterien nach dem Tode Blut, wie bei Erhängten, Ertrunkenen, im Kohlendampfe Erstickten, nach Entzündungen, in verknöcherten Arterien. Siehe Otto *path. Anat.* 1. 343. Aber gemeiniglich findet man die Arterien leerer als die Venen. Es ist bekannt, dass die Arterien gewöhnlich sich in dem Maasse verengern und verkürzen, als sie weniger Blut enthalten, d. h. bis auf eine gewisse Grenze. Die elastische Verengerung der Arterien treibt nun im Tode noch das Blut in einem gewissen Grade weiter, insoweit nämlich die Arterien streben, ihren spätern engen Zustand einzunehmen. Einige Zeit nach dem Tode muss die Menge der Flüssigkeiten in den Gefässen beträchtlich vermindert seyn, weil bei der Fähigkeit der thierischen Theile, durch ihre Porosität sich mit wässerigen Flüssigkeiten zu imbibiren, sie flüssige Theile des Blutes durchlassen. Carson (Meck. *Archiv* 6. 604.) schreibt das Leerseyn der Arterien vorzüglich den Lungen zu; indem diese nach dem letzten Athemzuge durch ihre Elasticität sich zusammenziehen, soll ein leerer Raum entstehen, den die Flüssigkeiten durch Erweiterung der venösen Stämme der Brust und der Lungen einnehmen sollen. Carson sah die Arterien voller bleiben, wenn er bei sterbenden Thieren den Brustkasten öffnete. Allein die Elasticität der Lungen kann nicht so gross seyn.

Parry, welcher zwar die rhythmische Contractilität der Arterien läugnet, aber den Tonus oder die unmerkliche gleichförmige Contractilität derselben ausser der Elasticität annimmt, erklärt die Erscheinungen folgendermaassen: Nach dem Tode ziehen sich die Arterien durch ihren Tonus stärker zusammen, als sie durch ihre Elasticität gethan haben würden, wodurch das Blut zum Theil in die Venen getrieben wird. Bald hört der Tonus auf, und die Arterien werden nun wieder weiter. Diese Veränderungen des Durchmessers der Arterien will Parry nach dem Tode beobachtet haben. Bei der unerwiesenen Hypothese, dass die Theilchen des arteriellen Blutes von den Theilchen der Substanz angezogen werden, aber dunkelroth geworden, diese Anziehung verlieren, liesse sich eine Erklärung aufstellen, die unwahrscheinlicher ist.

Digitized by Google

d. Wundernetze der Arterien und Venen.

Zu den vergleichend anatomischen Thatsachen von grossem physiologischem Interesse gehören ohne Zweifel die Wundernetze. So nennt man die plötzliche Zertheilung einer Arterie oder Vene in ein Büschel von feineren Zweigen, oder in viele unter einander anastomosirende Aeste, welche entweder für sich zu ihrer Bestimmung hingehen, oder sich selbst wieder in einen neuen Stamm sammeln. Die Wundernetze der letztern Art sind seltener. Man kennt diesen Bau an den Arterien der Extremitäten und des Schwanzes einiger langsam sich bewegenden Säugethiere, wie Bradypus, Myrmecophaga, Manis, Stenops. Carlisle *Philos. transact.* 1800. Vrolik *de peculiari art. extremitatum in nonnullis animalibus dispositione. Amst.* 1826. Es kommen aber auch Wundernetze an Theilen vor, wo eine Beziehung zur Muskelbewegung wegfällt, wie das Rete mirabile caroticum, das aus Gehirnästen der Carotis communis bei den Wiederkäuern und beim Schwein gebildet wird, und dessen sämmtliche Zweige sich erst wieder zur Carotis cerebralis sammeln. Rapp (Meck. *Arch.* 1827.) zeigt, dass bei den Thieren mit einem Rete mirabile caroticum die Vertebralarterie nicht zum Gehirn geht, und mit der Carotis externa zusammenhängt, wie bei der Ziege und beim Kalb, oder bei Verbindung mit dem Wundernetz sich doch vorzüglich in die Nackenmuskeln verbreitet, wie beim Schaf. Aehnliche Netze von Arterien finden sich in der Augenhöhle der Wiederkäuer, Katzen, Vögel nach Rapp und Barkow (Meck. *Arch.* 1829.). Hier entspringen die Arterien des Bulbus daraus. Von ungeheurem Umfang sind die Wundernetze der Intercostalarterien und der Venae iliacae der Delphine. Breschet *hist. anat. et physiol. d'un organ de nature vasculaire decouvert dans les cetacés. Paris* 1836. Baer *nov. act. XVII.* Bei einigen Vögeln ist an der Art. tibialis antica ein Netz. Unter den Amphibien kennt man nur das kleine Wundernetz am Stamm der Carotis der Frösche, die sogenannte Carotisdrüse. Huschke in Tiedemann's *Zeitschrift IV.* 1. Einige der grössten Wundernetze sind kürzlich bei mehreren Fischen von Eschricht und mir entdeckt worden; sie sind um so merkwürdiger, als sie zugleich von Venen und Arterien zusammengesetzt werden. Eschricht und Mueller *über die arteriösen und venösen Wundernetze an der Leber des Thunfisches. Berlin* 1836. Die grosse Eingeweidearterie der Thunfische (Thynnus vulgaris und brachypterus) giebt der Leber ihre Leberzweige, bildet aber an derselben Stelle mehrere sehr grosse büschelartige Wundernetze, von vielen hunderten Zweigen, welche sich wieder zu Stämmen sammeln, die sich in den Verdauungseingeweiden verbreiten; aber das vom Darm und Milz rückkehrende Blut geht, ehe es in die Leber gelangt, durch eben solche Wundernetze der Pfortader. Bei Squalus cornubicus und Squalus vulpes habe ich an anderen Stellen Wundernetze gefunden. Sie liegen beim erstern über der Leber zu jeder Seite der Speiseröhre. Das Blut der Eingeweidearterie durchgeht sie, und das aus den Lebervenen rückkehrende Blut durchgeht den venösen Theil der-

Digitized by Google

selben, ehe es zum Herzen gelangt. Beim Squalus vulpes befinden sich die Wundernetze an den Gefässen des Darms, Magens und der Milz. Andere Haifische haben nichts davon.

Entweder haben diese Bildungen einen mechanischen oder einen chemischen Einfluss auf das Blut. Die Vertheilung des Blutes auf viele feinere Rohren, die sich doch wieder sammeln, scheint den Zweck einer örtlichen Verlangsamung des Blutstroms zu haben, indem die vermehrte Reibung diese Folge haben muss. Diese Erklärung passt auf alle Formen der Wundernetze. Die Erklärung, dass die Wundernetze an den Extremitäten und an dem Schwanze einiger kletternder Thiere zur Erleichterung der Circulation bei den Anstrengungen der Muskeln bestimmt seyen, passt nur auf wenige Formen. Für die Supposition einer chemischen Wirkung hat man bis jetzt keine anderen Gründe als die Vergleichung mit den Lymphgefässplexus und Lymphdrüsen, und die Beobachtung von J. Davy dass die Thunfische eine eigene hohe Temperatur (99° F. bei 80°, 5 des Mediums) haben. Diese Erklärung ist wenig wahrscheinlich. Der Durchgang des Blutes des Verdauungssystems durch 2 Capillargefässnetze, des Darmkanals und der Leber, scheint schon bei allen Wirbelthieren auf örtliche Verlangsamung des Blutstroms berechnet zu seyn; die Wundernetze der erwähnten Fische müssen den Blutstrom noch langsamer machen.

V. Capitel. Vom Verhalten der Blutgefässe bei der Aufnahme und Ausscheidung der Stoffe.

a. Von der Resorption.

Vor der Entdeckung der Lymphgefässe durch Asellius 1622 schrieb man den Venen die Resorption zu. Nach dieser Entdekkung, und nachdem man die Lymphgefässe in den meisten Organen kennen gelernt hatte, hielt man sie für die alleinigen Organe der Resorption. Die Ansicht von der Resorption der Lymphgefässe stützt sich auf das Anschwellen der Lymphgefässe des Darmes einige Zeit nach dem Essen; ferner auf das anatomische Verhältniss, dass diese Gefässe durch Klappen den Lauf des Chylus und der Lymphe gegen den Ductus thoracicus befördern, den entgegengesetzten hemmen müssen. Indessen hat man in verschiedenen Zeiten dagegen gewarnt, dass man die Lymphgefässe nicht als einzige Organe der Resorption betrachten konne. Bekannt ist die Resorption der Knochenmasse im innern der Knochen bei Entstehung ihrer Zellen, die Absorption der Alveolen der Zähne bei den Alten, und doch existiren in den Knochen keine Lymphgefässe. Man kennt die Resorption von Eiter, Stücken der Crystalllinse und von Blut im Auge, von dessen Innerm doch keine Lymphgefässe bekannt sind. Endlich dürfte man nur an die Aufsaugung der Dotterflüssigkeit von der Keimhaut erinnern, von welcher Niemand behaupten wird, dass sie in den ersten Tagen schon Lymphgefässe besitze, wenn nicht auch die wirbellosen Thiere

Digitized by Google

(ohne Lymphgefässe) dasselbe lehrten. Allein die Thatsache einer unmittelbaren Resorption in das Blut ohne Vermittelung der Lymphgefässe musste auf einem langwierigen experimentellen Wege gefunden werden, wobei sich Magendie, Emmert, Mayer, Lawrence, Coates, Tiedemann, Gmelin und Westrumb vorzügliche Verdienste erworben haben. Delille und Magendie trennten bei einem Hunde den Schenkel vom Körper bis auf die Art. und Ven. cruralis, welche die Communication mit dem Stumpfe unterhielten. Diese beiden Gefässe wurden rein präparirt und ihre äussere Zellhaut weggenommen, 2 Gran eines sehr starken Giftes (upas tieute) wurden darauf in den Fuss eingebracht (enfoncés). Die Wirkung des Giftes war eben so schnell, als wenn der Schenkel unverletzt gewesen, so dass die Symptome in 4 Minuten sich zeigten, und das Thier in 10 Minuten dem Tode unterlag. Magendie und Delille machten einen ähnlichen Versuch an der Darmschlinge eines Hundes, dessen Lymphgefässe durch eine gute Mahlzeit vorher sichtbar gemacht worden. Die Darmschlinge wurde an zwei Stellen unterbunden, mit einem Zwischenraume von 4 Decimeter. Sie unterbanden auch die Lymphgefässe dieser Schlinge mit zwei Ligaturen, und schnitten sie dazwischen durch. Sie überzeugten sich, dass keine weiteren Lymphgefässe von der Darmschlinge führten, so dass dieselbe nur durch die Arterien und Venen mit dem Kreislaufe in Verbindung stand. Darauf injicirten sie in die Darmschlinge 2 Unzen Decoct. nuc. vom., der Ausfluss wurde durch eine Ligatur gehindert. Nach 6 Minuten zeigten sich die Symptome der Vergiftung. Meck. *Arch.* 2. 1816. *p.* 253. *précis de physiol.* 2. 203.

Magendie legte bei einem jungen Hunde von 6 Wochen eine Jugularvene bloss, und isolirte sie in ihrer ganzen Länge, so dass er eine Karte darunter bringen konnte. Dann liess er auf die Vene eine wässerige Auflösung von Extract. nuc. vom. spirit. wirken. Die Vergiftungssymptome zeigten sich vor der 4ten, bei erwachsenen Hunden nach der 10ten Minute. *Physiol.* 2. 279

Segalas (Magendie *Journal de Physiol.* 2. *p.* 117.) hat diese Versuche auf andere Art wiederholt. Er konnte nach Unterbindung der Blutgefässe oder der blossen Venen einer Darmschlinge und bei unversehrten Lymphgefässen, in einer Stunde nicht einen Hund durch Application des Giftes in der Darmschlinge tödten.

Mayer's Versuche mit Einspritzung von blausaurem Kali in die Lungen verdienen eine umständlichere Erwähnung. In 2—5 Minuten kann dieses Salz schon im Blute gefunden werden, in dessen Serum durch Anwendung von salzs. oder schwefels. Eisenoxyd ein grüner oder blauer Niederschlag erfolgt. Dieser Uebergang ins Blut ist zu schnell, als dass er durch Vermittelung des langsameren Laufes der Lymphe erklärt werden könnte. Bei Einspritzung jener Salzauflösung in die Lungen zeigte sie sich zuerst im Blute, viel später im Chylus, früher im linken Herzen, wann im rechten Herzen nach keine Spur zu erkennen war, was sich umgekehrt verhalten müsste, wenn die Aufsaugung durch die Lymphgefässe geschehen wäre, indem die Lymphe zunächst in das Körpervenenblut geführt wird. Schon 8 Minuten nach der Ein-

Digitized by Google

flössung in die Lungen erkennt man die Flüssigkeit im Harn. Man bemerkt sie ferner in der Haut, in der Feuchtigkeit der Gelenkhöhlen, in der Höhle des Unterleibes, in der Brusthöhle, im Herzbeutel, im Fette, in den fibrösen Häuten, z. B. Dura mater, in den Aponeurosen, in der Arachnoidea, in den Kapsel- und Seitenbändern, inneren Gelenkbändern (z. B. Lig. cruciat. des Kniegelenkes, Lig. teres der Pfanne), in der Knorpelhaut, in den Klappen des Herzens.

Von den Absonderungsorganen wurden nur die Nieren und der Harn gefärbt, weil das blaus. Kali, wie die meisten Salze, durch die Nieren wieder ausgeschieden wird. Die Leber zeigte keine Färbung an ihrer äussern Oberfläche, wohl aber in ihrem Parenchym, jedoch nur an Stellen, wo grosse Gefässe lagen, und wo das Zellgewebe der capsula Glissonii sie umgab. In der Galle liess sich keine, in der Milch nur eine unbedeutende Farbenveränderung erkennen. Deutlicher war die Färbung, namentlich des Zellgewebes in Hoden, Speicheldrüsen und Pankreas. Die Milz zeigte keine, die Nebennieren kaum eine Farbenveränderung. Gar keine Farbenveränderung zeigten die Muskeln, ausser an Stellen, wo fibröse Häute die Muskelbündel bekleideten. Die Nerven wurden zwar äusserlich grün, aber diess rührte von dem sie umgebenden Zellgewebe her. Das Nervenmark, das Gehirn und Rückenmark zeigte fast gar keine Farbenveränderung. In den Knochen keine Spur von Farbenwechsel. Da indess das blaus. Kali durch das Blut in alle Theile gleich verbreitet wird, so scheint es, dass es von einigen Theilen vielleicht verhüllt oder zersetzt wird, so dass dessen Entdeckung durch Reagentien unmöglich gemacht wurde. Meck. *Archiv. T.* 3. 1817. 485.

Die Versuche, welche die Akademie der Medizin von Philadelphia anstellte (*Philadelph. Journ. N.* 6. Frorier's *Not. N.* 49.), scheinen zum Theil mit Mayer's Resultaten und allen den vorhergehenden im Widerspruch zu stehen, und für die vorzugsweise Aufnahme durch die Lymphgefässe zu sprechen. Allein sie sind nach der Art, wie sie angestellt wurden, nicht beweiskräftig. Die Akademie fand nach Injection in das Abdomen oder den Darm von der Solution von blausaurem Kali, 35 Minuten und mehr, nachher in der Mehrzahl der vielen Versuche den Chylus deutlich bei Zusatz von Eisensalz blau gefärbt, dagegen sich in dem Serum des Blutes und im Urin meist auch eine schwache Färbung zeigte. Der Zeitraum von 35 Minuten ist viel zu gross; man hätte, wie in Mayer's Versuchen, mehrere Minuten nach der Injection Blut und Harn untersuchen müssen. Denn so wie die Versuche angestellt wurden, beweisen sie nur, dass chemische Agentien auch durch die Lymphgefässe aufgesogen werden. So fanden die Verfasser in einem Falle (N. 36.) 2 Minuten, nachdem eine Katze 1 Unze von der blausauren Kalisolution verschlungen, als sie die Katze verbluten liessen, das Salz im Urin, wenn gleich nicht im Serum des Blutes und im Chylus, wo das Salz doch lediglich in das Blut, und vom Blute in den Harn gelangt seyn konnte. Die Commission der Akademie unterband in mehreren Fällen die Vena portarum, welche das Blut vom Darme aufnimmt;

Digitized by Google

gleichwohl erzeugte Nux vomica in eine Darmschlinge gebracht, nach 23 und mehr Minuten Tetanus, während die blosse Unterbindung der Vena portarum in anderen Fällen zwar auch, aber ohne Krämpfe tödtete. Diese Versuche scheinen zu beweisen, dass die Lymphgefässe des Darmes das Gift ins Blut gebracht hatten. Diess kann auch wohl seyn in einem Zeitraume von 23 Minuten, ohne dass daraus die Resorption in das Blut in kürzerer Zeit widerlegt wird. Auch anastomosiren Zweige der Darmvenen mit Zweigen der untern Hohlvene. Siehe oben p. 185.

Westrumb fand nach Einspritzung von blaus. Kali in den Magen diess schon nach 2 Minuten im Harn, ohne dass Lymphe und Chylus blaus. Kali enthielten. Die Ureteren waren durchschnitten und daran Röhrchen befestigt worden, woraus der Harn aufgefangen wurde. Meck. *Archiv* 7. 525. 540.

Tiedemann und Gmelin fanden in ihren zahlreichen Versuchen mit Farbestoffen und Salzen, die sie in den Mund eingegeben, und die leicht als solche oder durch Reagentien erkannt werden, nach mehreren Stunden niemals etwas von Farbestoffen in den Chylus übergegangen, obwohl diese Stoffe im Blute und im Urin erkannt wurden, und obgleich sie bis in den Darm gelangt waren. Von Salzen fand sich unter zahlreichen Versuchen nur einigemal etwas in den Chylus übergegangen; bei einem Pferde, das schwefelsaures Eisen bekommen hatte, so wie einmal blausaures Kali im Chylus eines Hundes vorkam, dagegen nicht in einem andern Versuche; schwefelblaus. Kali zeigte sich im Chylus eines Hundes. Der Einwurf, dass die Substanzen schon aufgesogen seyn konnten, widerlegt sich aus dem Umstande, dass der Darm noch eine Menge aufsaugbarer Stoffe enthielt. Diese Resultate, welche durch die Genauigkeit der Versuche einen hohen Grad von Zuverlässigkeit haben, stimmen mit den von Hallé (Fourcroy *syst. des connaiss. chim.* 10. 66.) und Magendie (*physiol. ed.* 1. *T.* 2. 157.) gemachten Versuchen überein. Dagegen sie mit den Versuchen von Martin Lister und Musgrave (*Phil. Trans.* 1701. 819.), von Hunter, Haller und Blumenbach im Widerspruch stehen, wie denn auch Viridet und Mattei an dem Chylus eine gelbe und rothe Farbe nach Füttern mit Eigelb und rothen Rüben bemerkt haben wollen.

Fodera füllte bei einem lebenden Thiere eine Darmschlinge mit einer Auflösung von blausaurem Kali, und unterband sie an zwei Stellen, tauchte die Darmschlinge dann in eine Solution von schwefelsaurem Eisen, und sah die Lymphgefässe und Venen blau werden. *Recherch. exp. sur l'exhalation et l'absorption. Par.* 1824. Schroeder v. d. Kolk sah bei diesem Experimente bloss die blaue Farbe in den Lymphgefässen, aber nicht in den Venen. Das blausaure Kali im Darme hatte nach einer halben Stunde noch nicht seine Farbe verändert, so dass das schwefelsaure Eisen noch nicht durch die ganzen Darmwände eingedrungen war. Diess beweist nicht absolut gegen den unmittelbaren Uebergang der Stoffe ins Blut. Denn die ins Blut übergegangenen kleinen Quantitäten werden sogleich weiter bewegt, dagegen die Bewegung des Chylus in den Lymphgefässen nicht sehr schnell ist. Auch ist eine

Digitized by Google

blaue Farbennuance am Blute selbst äussert schwer, und nur sicher am Blutserum zu erkennen. Lawrence und Coates erkannten das Salz nicht eher im Blute, bis es sich im obern Theile des Ductus thorac. zeigte. Froriep's *Not.* 77.

Mehrere Versuche sind mit Unterbindung des Ductus thoracicus von Brodie, Magendie, Delille und Segalas angestellt worden. Brodie sah tödtliche Wirkung des Weingeistes, des Woraragiftes, auch nach Unterbindung des Ductus thoracicus. Brodie, *Phil. Trans.* 1811. Reil's *Archiv. T.* 12.

Da der Ductus thoracicus zuweilen Nebenverbindungen bei Thieren eingeht, zuweilen wie beim Schweine, Zweige in die Vena azygos übergehen, zuweilen sogar selbst ein rechter Ductus thoracicus vorhanden ist, die Lymphgefässe aber vielfach mit einander in Verbindung stehen, so kann die Unterbindung des Ductus thoracicus den Uebergang der vergifteten Lymphe in das Blut nicht absolut hindern. Emmert's Versuche zeigen den unmittelbaren Uebergang von Stoffen in das Blut durch den Mangel jenes Ueberganges nach Unterbindung der Blutgefässe. Emmert unterband die Aorta abdominalis. Nun brachte er blausaures Kali und ein Decoct der Angustura virosa in verschiedene Wunden der Füsse. Das blausaure Kali wurde resorbirt und im Urin entdeckt, aber die Angustura wirkte nicht vergiftend wie gewöhnlich. In einem andern Versuche sah Emmert nach Unterbindung der Aorta abdominalis von Blausäure, die in eine Wunde des Fusses gebracht worden, selbst nach 70 Stunden keine Folgen; als aber dann das Ligament von der Aorta gelöst wurde, trat die Vergiftung nach einer halben Stunde ein. Meck. *Archiv I.* 1815. *p.* 178. Schnell *diss. sist. hist. veneni upas antiar. Tub.* 1815. *Tübing. Blätter* 3. 1. 1817. Schabel *de effectibus veneni rad. veratri albi et hellebori nigri. Tub.* 1819. Vergl. Westrumb *physiologische Untersuchungen über die Einsaugungskraft der Venen. Hannover* 1825. Tiedemann und Gmelin *Versuche über die Wege, auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanal ins Blut gelangen. Heidelb.* 1820. Seiler und Ficinus in *Zeitschrift für Natur- und Heilkunde* 2. 378. Jaeckel *de absorptione venosa. Vratislav.* 1819. Lebkuchner *diss. utrum per viventium adhuc animalium membranas atque vasorum parietes materiae ponderabiles illis applicatae permeare queant nec ne. Tub.* 1819. Wedemeyer *über den Kreislauf. Hannover* 1828. 421. Jacobson endlich hat gezeigt, dass blausaures Kali bei den Mollusken, welche keine Lymphgefässe besitzen, doch leicht von allen Oberflächen ins Blut gelangt, und daraus wieder durch die Secretionsorgane (Lunge, Leber, Saccus calcareus) ausgeschieden wird. Froriep's *Notizen* 14. *p.* 200.

Der Uebergang von Stoffen unmittelbar in die Capillargefässe des Blutes ist nach allen diesen Versuchen, am meisten aber durch die überaus schnellen Wirkungen eines Giftes erwiesen, da sich eben so bestimmt beweisen lässt, dass die allgemeinen Vergiftungswirkungen nicht von dem Nervenzusammenhang, sondern nur von dem Kreislaufe abhängen. Siehe das erste Capitel der Nervenphysik. Gleichwohl liessen sich alle diese Erscheinungen auch

Digitized by Google

aus der Resorption der Lymphgefässe erklären, wenn die Annahme einiger Neueren von der Communication der Lymphgefässe und kleinen Venen in oder ausser den Lymphdrüsen richtig wären. Allein dieser Einwurf lässt sich durch Thatsachen über die Imbibition der thierischen Gewebe vollkommen widerlegen. Man hat diesen Uebergang bisher von einer eigenen Resorptionskraft der Venen abhängig gemacht. Allein es lässt sich zeigen, dass aufgelöste Stoffe auch ohne die eingebildete Resorptionskraft der Venen in das Blut der Capillargefässe dringen, und wenn diess ist, so verbreiten sie sich darum zunächst mit dem Venenblute, weil alles Blut aus den Capillargefässen von den Arterien aus die Bewegung nach den Venen und nach dem Herzen hat. Das Urphänomen des unmittelbaren Ueberganges von aufgelösten Stoffen ins Blut ist die Tränkung der thierischen, auch todten Theile mit Flüssigkeit durch ihre unsichtbare Porosität oder die Imbibition, und insofern diese Resorption auch von ganz todten thierischen Theilen ausgeübt wird, werden wir sie mit Recht im Gegensatz der lymphatischen Resorption die unorganische nennen.

Gase und tropfbare dünnflüssige Stoffe durchdringen mit dem, was sie aufgelöst enthalten, nasse thierische Theile. Zweierlei Gase in und ausser einer nassen thierischen Blase, die vorher trocken gewesen seyn kann, setzen sich ins Gleichgewicht der Vertheilung. Ein Gas durchdringt eine nasse Blase, um von darin befindlicher Flüssigkeit absorbirt zu werden; schon hieraus sieht man, wie luftförmige Stoffe beim Athmen an das Blut treten können, ohne dass Blutkörperchen ausfliessen. Denn die Gase durchdringen die Häute, welche von Capillargefässen und kreisendem Blute durchzogen sind, und lösen sich im Blute dieser Capillargefässe auf, während die Häute der Gefässe zwar durch ihre allgemeine unsichtbare Porosität für Gase und tropfbarflüssige aufgelöste Stoffe permeabel sind, aber keine dem Durchmesser der Blutkörperchen entsprechende Oeffnungen haben. Ueberbindet man ein mit Wasser gefülltes Glas dicht auf dem Wasser mit einer feuchten Thierblase, und streut ein Salz auf die feuchte Blase, so löst sich das Salz in dem die Poren der Blase durchdringenden Wasser auf, und theilt sich von diesem Wasser dem Wasser des Gefässes mit. Die Grundursache der Imbibition, der Permeabilität der thierischen Theile, ist daher das Vermögen der Stoffe, sich in der Flüssigkeit, in der sie aufgelöst worden, gleichförmig zu verbreiten. Ein aufgelöstes Salz strebt sich in einer andern Flüssigkeit, womit es sich mischen kann, weiter zu vertheilen, wie Salzwasser und Wasser sich ins Gleichgewicht der Vertheilung setzen. Da nun die thierischen Theile von wässerigen Flüssigkeiten weich, und ihre Poren von wässeriger Flüssigkeit angefüllt sind, so wird ein aufgelöster Stoff sich dem Wasser dieser Poren mittheilen, und selbst durch die Poren einer Membran hindurch sich wieder in Flüssigkeiten, welche die Membran berühren, weiter zu vertheilen streben, bis das Gleichgewicht der Vertheilung zwischen zweien die Membran berührenden Flüssigkeiten hergestellt ist. Es giebt indessen besondere Umstände, wo die Imbibition durch Capillarität und Anziehung

Digitized by Google

verstärkt wird. Das Erstere ist der Fall beim Aufweichen eines trockenen thierischen Theiles, wo die Capillarität der leeren Poren das Eindringen der tropfbarflüssigen Stoffe befördern muss. Das Zweite zeigt sich in dem Phänomen der *Endosmose* und *Exosmose*. Diess ist ein zuerst von Parrot entdecktes, von Porret und Dutrochet u. A. weiter untersuchtes Phänomen. Bringt man in eine Glasröhre, die unten mit Thierblase zugebunden ist, eine Auflösung von irgend einem Salz, von Zucker, so dringen die Theilchen desselben zwar in die Poren der Blase, aber nicht aussen hervor. Stellt man die gefüllte Röhre in ein Gefäss mit dest. Wasser, so steigt allmählig das Niveau der innern Flüssigkeit und bisweilen um mehrere Zoll. Durch Reagentien erkennt man aber auch, dass zugleich Theilchen der Auflösung in das äussere Wasser durchgedrungen. Das Steigen des Niveaus dauert so lange fort, bis beide Flüssigkeiten in und ausser der Röhre homogen geworden sind. Enthält die Röhre Wasser, das äussere Gefäss die Salzlösung, so sinkt das Wasser der Röhre. Enthalten beide Gefässe Lösung verschiedener Salze von gleicher Concentration, so verändert sich das Niveau nicht, aber beiderlei Salze vermischen sich. War dagegen die eine Lösung concentrirter, so erhöht sich ihre Oberfläche. Dieselben Phänomene beobachtet man, wenn man statt Thierblase mineralische poröse Körper anwendet. Man hat zwei Erklärungen des Phänomens. Die erste von Magnus und Poisson besteht darin, dass die Attraction zwischen den Theilchen einer Salzlösung zusammengesetzt ist aus den gegenseitigen Attractionen des Wassers und Salzes, und aus der Attraction der homogenen Theile des Wassers für sich und des Salzes für sich. Diese vereinte Attraction ist grösser als die der Wasserpartikelchen. Berzel. *Thierchem.* 128. Die zweite Erklärung besteht in Folgendem: Die thierische Blase lässt sich insofern sie porös ist, als ein System capillarer Röhrchen betrachten, welche anziehend auf die durchgehenden Flüssigkeiten wirken, welche sich durch das die Poren ausfüllende Wasser auszugleichen streben. Nimmt man nun an, dass eine dieser Flüssigkeiten eine stärkere Anziehung zum Stoff der Blase erleidet, so wird sie länger beim Durchgang durch die Capillarporen aufgehalten, als die andere, die darum in ihrem Gefässe fallen muss. Das Niveau der erstern wird aber so lange steigen, bis der zunehmende Druck der steigenden Wassersäule jener stärkeren Anziehung das Gleichgewicht hält. Biot *Experimental-Physik*, übers. von Fechner. 1. *p.* 384. Vergl. Poisson, Poggend. *Ann.* 11. 134. Fischer ebend. 126. Magnus ebend. 10. 153. Wach, Schweigg. *Journal* 1830. *p.* 20.

Dutrochet hat jene Erscheinungen Endosmose und Exosmose nach dem Steigen der einen oder andern Flüssigkeit bei verschiedenen Bedingungen genannt. Es ist ohne Zweifel, dass bei dem unmittelbaren Uebergange von aufgelösten Theilen in die Capillargefässe und das Blut, sowohl Endosmose als einfache Imbibition stattfindet. Dutrochet hat diess durch Versuche versinnlicht. Er nahm ein Stück Darm von einem jungen Hühnchen, füllte es zur Hälfte mit einer Lösung von Gummi, Zucker oder

Digitized by Google

Kochsalz, und legte es, an beiden Enden zugebunden, in eine Schale mit Wasser, worin es sich bald so füllte, dass es ausgespannt wurde. Enthielt das Darmstück reines Wasser, und lag in Zuckerwasser, so wurde es allmählig schlaffer, während zugleich Zucker in den Darm überging. Dutrochet *l'agent immédiat du mouvement vital. Paris* 1826. *Nouv. rech. sur l'endosmose. Paris.* 1828.

Seine Hypothese, dass hierbei elektrische Wirkungen stattfinden, hat sich nicht bestätigt. Es ist auch nicht constant, dass die dichtere Lösung mehr von der dünnern, als diese von jener anzieht, wovon die Gase besonders schon das Gegentheil zeigen, sondern es scheint die chemische Constitution und das physikalisch-chemische Verhältniss der Flüssigkeit zur Thierblase dabei eine grosse Rolle zu spielen. Wässeriger Weingeist in einer Thierblase aufbewahrt, concentrirt sich, indem bloss das Wasser verdunstet. Vergl. Staples Versuche in Kastner's *Archiv für Chemie. Bd. 3. H. 1—3. p.* 282. Ein Darmstück eines Huhns mit wässeriger Lösung von Mimosengummi und Rhabarbarin zum Theil gefüllt, und zugebunden in Wasser gelegt, schwoll auf, während Rhabarbarin heraustrat. Aehnliche Säcke mit schwacher Lösung von schwefelsaurem Eisenoxydul in Wasser gelegt, das Blutlaugensalz enthielt, schwollen auch auf, weil Wasser eingedrungen war; sie hatten an die umgebende Lösung Eisensalz abgegeben und dieselbe gebläuet. Im Darme war aber keine Spur von blauer Farbe. Die Verhältnisse, die bei den Gasen stattfinden, sind sehr merkwürdig. Faust hat hierüber Versuche angestellt. Froriep's *Not. N.* 646. Eine mit atmosphärischer Luft halbgefüllte Blase unter einer mit kohlensaurem Gas gefüllten Glocke schwoll an, eine mit Wasserstoffgas gefüllte Blase unter eine mit kohlensaurem Gas gefüllte Glocke gebracht, schwoll bis zum Zerplatzen auf. Dagegen ein leichteres Gas in der Glocke das Zusammenfallen der mit dem schwereren Gas gefüllten Blase bewirkt.

Ich wünschte zu wissen, wie schnell etwas durch Imbibition in die erste Schicht der Capillargefässe eines von Epidermis freien Theiles, und so in das Blut eindringen kann. Da das zarte Häutchen der Darmzotten vom Kalbe und Ochsen von 0,00174 P. Z. Dicke noch blutführende Capillargefässe enthält, so kann man sich nach dieser Dicke einen Begriff von der Tiefe machen, bis zu welcher aufgelöste Substanzen eindringen müssen, um in die erste Schicht von Capillargefässen einer von Epidermis freien Haut einzudringen. Ich spannte nun über ein Gläschen von sehr dünnem Hals die Urinblase eines Frosches, und bei einem zweiten Versuche die Lunge eines Frosches, nachdem ich vorher etwas von einer Auflösung von blausaurem Kali in das Gläschen gethan hatte; auf die Oberfläche des nassen Häutchens brachte ich mit einem Pinselchen etwas von einer Auflösung eines Eisensalzes (salzsaures Eisenoxyd). In demselben Moment drehte ich das Gläschen um, so dass das blausaure Kali die innere Fläche des Häutchens berührte. In nicht längerer Zeit als einer Secunde hatte sich ein schwacher blauer Fleck gebildet, der bald stärker wurde; daraus geht hervor, dass aufgelöste Stoffe spurweise innerhalb einer Se-

Digitized by Google

cunde eine Membran von der Dicke einer ausgespannten Urinblase des Frosches durchdringen. Diese Membran enthält noch mehrere Hautschichten, und ist sehr viel dicker als das organisirte Häutchen der Darmzotten von 0,00174 P. Z. Man kann also annehmen, dass eine aufgelöste Substanz spurweise schon innerhalb einer Secunde in die oberflächlichen Capillargefässe eines von Epidermis freien Theiles und so ins Blut gelangt. Da nun das Blut nach Hering in $\frac{1}{2}$, nach Anderer Berechnung in 1 — 2 Minuten im ganzen Körper herumgetrieben wird (p. 186.), so kann man annehmen, dass eine Spur einer aufgelösten Substanz, die mit einer epidermislosen organisirten Haut in Berührung kommt, innerhalb $\frac{1}{2}$ — 2 Minuten spurweise durch den Kreislauf verbreitet seyn kann.

Die narkotischen Gifte wirken zwar durch Zerstörung der Nervenkräfte, allein sie bringen auf Nerven, örtlich applicirt, nur örtliche Wirkungen hervor. Tauchte ich den Nerven eines abgelösten Froschschenkels einige Zeit in eine wässerige Opiumauflösung, so verlor die eingetauchte Strecke des Nerven ihre Reizbarkeit, d. h. ihre Fähigkeit, auf Reize Zuckungen des Schenkels zu erregen. Allein unter der mit dem Gifte in Berührung gekommenen Stelle behielt der Nerv seine Reizbarkeit, woraus folgt, dass das Opium die Nervensubstanz selbst verändert, dass aber die örtliche narkotische Vergiftung nicht durch die Nerven zur allgemeinen Vergiftung verbreitet wird. Auch wird ein Frosch, der sonst gegen Opium sehr empfindlich ist, innerhalb mehrerer Stunden, nicht vergiftet, wenn man den Schenkel so amputirt, dass nur der Nerve die Communication zwischen Rumpf und Unterschenkel unterhält, und nun den Unterschenkel in eine Opiumauflösung gesenkt erhält, den Frosch aber so befestigt, dass der Rumpf desselben nicht durch Bewegung des Frosches von der Opiumauflösung bespritzt wird. Diese Versuche, wie so viele andere von namhaften Physiologen angestellte Versuche, beweisen, dass die narkotischen Gifte ihre allgemeinen Wirkungen auf das Nervensystem nach ihrer Aufnahme ins Blut durch die Circulation ausüben. Dupuy und Brachet behaupten zwar, dass man Thiere nicht durch narkotische Gifte, die in den Magen gebracht werden, vergiften könne, wenn man den Nervus vagus beider Seiten durchschnitten habe, oder dass die Thiere dann wenigstens später stürben; allein wir haben hier in dreissig Versuchen an Säugethieren, die Herr Wernscheidt darüber, unter meiner Leitung, anstellte, durchaus keinen Unterschied in der Wirkung der in den Magen gebrachten narkotischen Gifte gesehen, wenn wir bei Thieren gleicher Art und Grösse den Nervus vagus beider Seiten vor der Vergiftung durchschnitten oder nicht durchschnitten.

Die schnelle Wirkung der meisten narkotischen Gifte lässt sich nach den oben angeführten Thatsachen über die Aufsaugung durch Imbibition vollkommen erklären. Die Blausäure jedoch äussert ihre Wirkung schon lange vor $\frac{1}{2}$ — 2 Minuten, innerhalb welcher sie in das Blut durch die Capillargefässe eingedrungen und verbreitet seyn könnte. Auch die weingeistige Auflösung des Ex-

Digitized by Google

tracti nucis vomicae spirituosi bewirkt, in einiger Quantität in den Mund von jungen Kaninchen gebracht, den Tod auf der Stelle; dagegen dieses Gift, in einiger Entfernung vom Gehirn auf einen blossgelegten Nerven, z. B. den Nervus ischiadicus, applicirt, gar keine allgemeinen Wirkungen hervorbringt, wie denn auch Wedemeyer beobachtet hat, dass concentrirte Blausäure, auf einen blossen Nerven applicirt, nicht wirkte. Die schnellen Wirkungen der Blausäure kann man nur aus ihrer Flüchtigkeit und Expansionskraft erklären, durch welche sie sich schneller in dem Blute verbreitet, als die Circulation desselben geschieht, und durch welche sie, selbst abgesehen von der Verbreitung durch das Blut, die thierischen Theile schnell zu durchdringen fähig ist, durch welche sie ferner um so schneller materielle Veränderungen in dem Centralorgane des Nervensystems, im Gehirn, bewirkt, je näher dem Gehirn sie applicirt wird. Schliesslich erlaube ich mir eine Bemerkung über die materielle Veränderung durch narkotische Gifte. Dass nämlich die narkotischen Gifte bei ihrer Wirkung auf die Nerven auch durch materielle Veränderung wirken, wird wenigstens daraus gewiss, dass einige schon das Blut materiell verändern. Denn abgesehen von den bekannten Wirkungen der Blausäure, bewirkt das Viperngift und das Ticunasgift, nach Fontana, wenn es aus der Ader gelassenem Blute zugesetzt wird, dass das Blut nicht mehr gerinnt, während Viperngift, in Wunden von Thieren gebracht, nach Fontana, das Blut des noch lebenden Körpers zum Theil gerinnen machen soll, worauf ein Zustand entsteht, der dem in der heftigsten asiatischen Cholera nicht unähnlich ist. Fontana *über das Viperngift etc. Berlin* 1787.

Durch die schnelle Aufnahme aufgelöster Stoffe in die Capillargefässe und ihre schnelle Verbreitung durch den Kreislauf erklärt sich vollkommen leicht der schnelle Uebergang der genossenen aufgelösten Stoffe in den Harn, ohne dass man in die Barbarei verfallen kann, geheime Harnwege, zwischen Magen und Nieren anzunehmen. Nach Westrumb erfolgt dieser Uebergang bei löslichen Salzen schon in 2—10 Minuten spurweise. Denn nach dieser Zeit konnte er blausaures Kali, das einem Thiere gegeben worden, in dem Urin entdecken, indem er den Urin unmittelbar aus dem Harnleiter des eröffneten Thieres auffing. In der Regel erfolgt dieser Uebergang aber viel später, wie aus Stehberger's Versuchen hervorgeht. Siehe den Art. vom Harn.

Die durch Imbibition durch die Wände der Capillargefässnetze zum Blute dringenden Stoffe müssen jedenfalls aufgelöst seyn, sie dürfen nicht aus Kügelchen bestehen. Es folgt schon hieraus, dass die verdauten Stoffe und der Kügelchen enthaltende Chylus nicht durch die Imbibition in die Capillargefässe eindringen und zum Venenblute gelangen können. Tiedemann, Gmelin und Mayer haben zwar Chylusstreifen im Blute der Darmvenen und der Pfortader gefunden. Allein diese Materie kann nicht durch die Wände der Capillargefässe eingedrungen seyn, denn sonst müssten diese auch Blutkörperchen durchlassen. Vielleicht rührten diese Chylusstreifen von der noch problematischen Verbindung der Lymphgefässe mit den kleineren Venen her.

Digitized by Google

Die Endosmose erklärt nicht die Aufsaugung aller Flüssigkeiten von thierischen Geweben. Wenn die Flüssigkeiten des thierischen Körpers concentrirtere Auflösungen sind, als die aufzusaugenden Flüssigkeiten z. B. in der Pleura, in den Lungen, so werden letztere nach den Gesetzen der Endosmose leichter in die thierischen Theile übergehen, als die thierischen Flüssigkeiten heraustreten. Wenn aber die aufzusaugende Flüssigkeit eine gleich concentrirte Auflösung ist als die Flüssigkeiten der thierischen Theile, so werden zwar nach den Gesetzen der Imbibition beiderlei Flüssigkeiten sich durchdringen, allein die Quantität der Flüssigkeiten wird auf beiden Seiten nicht verändert; und wenn die thierischen Flüssigkeiten weniger concentrirte Auflösungen sind, so wird die Quantität der aufzusaugenden Flüssigkeit nach den Gesetzen der Endosmose selbst wachsen. Hieraus sieht man, dass die Imbibition nur die Vermischung, z. B. den Uebergang von Giften etc., nicht aber die quantitativen Verhältnisse der Aufsaugung erklärt. Denn eine in der Pleura befindliche Quantität Flüssigkeit, deren Eiweiss und Salze gleich concentrirt sind, wie die des Blutes, würde sich durch Imbibition durchaus nicht vermindern, sondern nur Salze an das Blut abgeben und davon empfangen, aber ihre Quantität behaupten, ja sogar wachsen, wenn die Lösung der Salze in der Flüssigkeit der Pleura concentrirter ist.

Wenn nun angesammelte Flüssigkeiten aufgesogen werden, so muss diess entweder in vielen Fällen auf eine durch Imbibition und Endosmose unerklärliche Weise, vermittelst der Lymphgefässe geschehen, oder man muss annehmen, dass die Anziehung des Venenblutes nach dem Herzen die Aufsaugung verstärkt. Vielleicht erleiden die Gesetze der Endosmose dadurch eine die Aufsaugung begünstigende Veränderung, dass die thierischen Theile eine Anziehung gegen die in ihnen circulirenden Flüssigkeiten ausüben, wodurch verhindert wird, dass diese gegen die aufzusaugenden Flüssigkeiten ausgetauscht werden, da doch sonst ein solcher Austausch erfolgen müsste. Wasser z. B. wird das Bestreben haben, sich in dem Blute der Capillargefässe zu vertheilen, aber das Blut, mit den Capillargefässen in lebendiger Wechselwirkung, hat wohl nicht das Bestreben, sich in dem aufzusaugenden Wasser zu vertheilen. Vielleicht haben die Blutkörperchen selbst, die, wie p. 111. gezeigt worden, eine so ausserordentliche Anziehung zum reinen Wasser haben, an der Aufsaugung desselben bei ihrem Durchgange durch die Capillargefässe einigen Antheil.

Ob das Blut in den Capillargefässen, oder diese selbst auch eine von den gewöhnlichen physikalischen Gesetzen abweichende organische Anziehung auf gewisse Stoffe äussern, ist eine ganz andere Frage. Diess ist zweifelhaft, nur von einem Orte ist es gewiss, nämlich von den Capillargefässen der Placenta. Da die Lymphgefässe der Placenta und des Nabelstranges durchaus zweifelhaft sind, so muss der Uebergang der ernährenden Flüssigkeiten von der Mutter in das Kind durch die Capillargefässe in der Placenta erfolgen. Eine eigentliche Communication zwischen den

Digitized by Google

Gefässen der Mutter und denen des Foetus findet nicht statt. Die Arterien des Uterus gehen in die Venen des Uterus, die Arterien des Kindes in der Placenta nur in die Venen des Kindes über. Weber hat über die Art dieser Gemeinschaft sehr interessante Aufschlüsse gegeben. *Anat.* 4. 496. Die feinsten Verzweigungen der Gefässe in der Placenta finden auf zottenförmigen Fortsätzen derselben statt. Auf diesen ganz geschlossenen verzweigten Zotten verbreiten sich die feinsten Arterien und gehen durch einfache Umbiegung in feine Venen über. Die Büschel dieser Zotten mit den capillaren Umbiegungen der Arterien in Venen sind nun in die sehr dünnhäutigen Venen der Mutter an der innern Fläche des Uterus eingesenkt, und werden von dem venösen Blute der Mutter umspült. Wahrscheinlich zieht das Blut des Foetus hier aufgelöste Stoffe aus dem Blute der Mutter an, während das Foetusblut durch die Capillargefässe der Zotten fliesst.

Hier findet ohne Zweifel zwischen Blut der Mutter und Blut des Kindes eine Art Endosmose statt, wodurch das Blut des Kindes durch die zarten Häute seiner Gefässe mehr aufnimmt als abgiebt, aber diese organische und lebendige Endosmose ist von den Gesetzen der chemischen Durchdringung bei den von Dutrochet beschriebenen Erscheinungen ganz verschieden. Bei den wiederkäuenden Thieren stecken die Zotten der Cotyledonen des Eies nicht in Venen des Uterus, sondern in scheidenförmigen Vertiefungen des Uterus, gleich wie Wurzeln. Allein diese Vertiefungen im Uterus sind mit den Capillargefässen des Uterus ausgekleidet, während die selbstständigen Capillargefässe des Kindes sich nur auf den Zotten der Cotyledonen verbreiten. Hier müssen die Capillargefässe der Mutter Stoffe ausscheiden, die von den Capillargefässen des Kindes angezogen werden.

Ob die Venen auf die durch Imbibition in die Capillargefässe eindringenden aufgelösten Stoffe auch eine Anziehung ausüben, vermöge der Bewegung des Herzens und des bei der Ausdehnung der entleerten Höhlungen entstehenden hohlen Raumes, den das Venenblut zunächst auszufüllen strebt, und der dadurch auf alle Venen bis in die Capillargefässe zurückwirkt, ist noch zweifelhaft. Jedenfalls muss aber die Bewegung des Blutes die Imbibition befördern, insofern mit der Entfernung des Durchgedrungenen die Ursache der Imbibition, nämlich das Vermögen der Stoffe, sich in Flüssigkeiten gleichförmig auszubreiten, unterhalten, die Sättigung also immer wieder aufgehoben wird.

Fodera hat die Beobachtung gemacht, dass der Galvanismus die Resorption beschleunigt. Es wurde blaus. Kali in die Pleura eingespritzt, schwefels. Eisen in den Unterleib. Gewöhnlich gehen 5—6 Minuten vorüber, ehe beide Substanzen sich verbinden; allein ihre Verbindung ist augenblicklich, wenn das Zwerchfell einem leichten galvanischen Strom unterworfen wird. Dasselbe Phänomen soll sich zeigen, wenn die eine Flüssigkeit in die Urinblase, die andere in den Unterleib, oder in die Lungen

Digitized by Google

und in die Pleurasäcke gebracht wird. *Journ. de physiol.* 3. *p.* 35. Die Nerven haben auf die unorganische Imbibition keinen Einfluss, wir haben keinen Unterschied in der Aufsaugung der Gifte nach Durchschneidung des Nervus vagus gefunden.

Die Stoffe, welche in das Blut der Darmvenen durch Imbibition gelangen, kommen nicht sogleich in die Hohlvene, sondern mit dem Darmvenenblut durchkreisen sie zunächst erst die Leber, und kommen dann erst in den ganzen Kreislauf. Magendie hat beobachtet, dass dieser Umweg durch die Leber die Wirksamkeit mancher Stoffe verändert. So bewirkt eine Gramme Galle oder viel atmosphärische Luft in die Ven. crur. eines Thieres eingespritzt, sogleich den Tod. Diess hat bei der Injection in die Pfortader gar keinen Nachtheil. Manche Stoffe erleiden schon im Darmkanal eine Veränderung, weil sie durch Wunden, nicht aber im Darmkanal aufgesogen werden. So soll Viperngift innerlich genommen nach Redi und Mangili (Meck. *Archiv* 3. 1817. *p.* 639.), Stevens (*on the blood. p.* 137.) keine giftigen Wirkungen äussern; und nach Coindet soll der Speichel der Hydrophobischen nicht durch den Darmkanal anstecken. Froriep's *Not.* 1823. *Septbr.* 170.

Magendie hat die Beobachtung gemacht, dass Ueberfüllung der Blutgefässe mit Flüssigkeit die Resorption schwächt. Nach Einspritzung von Wasser in die Venen eines Thieres fand die Absorption von fremdartigen Stoffen durch thierische Häute nicht statt, die sich nach einem Aderlasse wieder einstellte. Dagegen beschleunigte ein Aderlass die Absorption, so dass Phänomene, die sonst nur nach 2 Minuten, jetzt schon in $\frac{1}{2}$ Minute eintraten.

Am schnellsten geschieht die Aufsaugung in den Schleimhäuten, serösen Häuten und Wunden, viel langsamer in der mit Epidermis überkleideten Haut, und überhaupt scheint die äusserste Schichte der belebten Haut ein weit geringeres Absorptionsvermögen zu besitzen, vielleicht weil sie Hornstoff absondert. So bleiben zuweilen in Ritzen der Haut eingeriebene, aus Körnchen bestehende Farbestoffe oder Pulverkörner von einer Explosion, das ganze Leben hindurch unaufgelöst, und werden nicht absorbirt. Kranke, welche lange salpetersaures Silber nehmen, werden in der Haut zuletzt schieferfarben und schwärzlich, wahrscheinlich wegen einer chemischen Verbindung mit dem Thierstoff. Gleichwohl lässt sich die Resorption der mit Epidermis bedeckten Haut nicht bezweifeln, wenn die Stoffe aufgelöst oder von thierischen Säften leicht löslich sind. Da dieser Theil am häufigsten mit fremdartigen Stoffen in Berührung kommt, und auch der Application der Arzneien fähig ist, so ist die nähere Untersuchung hierüber von Wichtigkeit. Seiler und Ficinus fanden bei Pferden, deren Füsse mit Kalibleiauflösung benetzt erhalten wurden, dieses im Blute und im Chylus wieder. Westrumb (Meck. *Arch.* 1827.) hat eine vollständige Arbeit geliefert. Vergl. Sewall, Meck. *Arch.* 2. 146. Alle metallischen Präparate wirken, in die Haut eingerieben, in geringerem Grade als innerlich. Das Quecksilber heilt auf diese Art die Syphilis und bewirkt Speichelfluss; Tart.

Digitized by Google

stibiat. erregt Erbrechen nach Letsom und Brera; Arsenik vergiftet durch die Haut. Auch die vegetabilischen aufgelösten und auflösbaren Stoffe wirken. So erregt nach Haller weisse Niesswurz, auf den Unterleib gelegt, Erbrechen und heftiges Purgiren, wenn die Füsse mit Abkochung dieser oder der schwarzen Niesswurz gewaschen werden. Sabadillsamen erregte in Lentin's Beobachtung die heftigsten Krämpfe, und in den Bauch eingerieben Purgiren; Canthariden erregen Harnstrenge; Narkotica narkotisiren. Campher ist nach Magendie in der Lungenausdünstung erkennbar; Terpenthinöl am Veilchengeruch des Urins; Quecksilber im Blut, Speichel, Harn, Milch, nach Bloch, Autenrieth und Zeller, und Cantu, nach Fricke (Horn's *Archiv* 1826. 459.) auch in den Knochen; blausaures Kali, Rhabarber, Färberröthe geben sich im Blute, Harn etc. zu erkennen. Allein sehr viel stärker wirkt die Application aller Arzneien und Gifte auf die von der Oberhaut (durch Blasenpflaster) entblöste Haut (methodus endermica).

Ob die mit Oberhaut bedeckte Haut Wasser aufzunehmen fähig ist, ist lange ein Streit gewesen und schwer auszumitteln, weil die Haut durch Ausdünstung Wasser verliert. Sicher ist die Epidermis hygroskopisch und quillt im Wasser auf. Die mit Wiegen des Körpers und des Wassers bei Bädern angestellten Versuche von Falconer, Alexander und Andern halte ich für unzuverlässig. Seguin und Currie erhielten überdiess keine Gewichtszunahme. Seguin *Ann de chimie T.* 90. 185. *T.* 92. 33. Meck. *Archiv* 3. *p.* 585. Dann beweisen allerdings solche Versuche, wo im Wasser aufgelöste Färbestoffe oder blausaures Kali nach einem Bade sich im Urin erkennen liessen, wie Westrumb's und Stuart's Versuche zeigten, nicht für die Aufsaugung des Wassers selbst, da Salze durch eine von zwei Seiten mit Wasser in Berührung stehende thierische Membran durchdringen können, ohne dass sich das Niveau des Wassers verändert. Die Resorption von Gasarten durch thierische Theile theils durch das Athmen, theils in der Haut selbst ist durch die Versuche von Abernethy, Cruikshank, Autenrieth, Beddoes, Collard de Martigni ausser Zweifel gesetzt. Dass hierbei die aus der Umgebung aufgenommenen Gase sich mit den tropfbaren Flüssigkeiten binden und den Gaszustand verlassen, versteht sich von selbst. Mehrere haben Absorption des Stickgases durch die Haut beobachtet. Beddoes sah den Arm eines Negers in Chlorgas für einige Zeit bleich werden, Abernethy beobachtete, dass Sauerstoffgas, Stickgas, Kohlensäure und andere Gasarten, die er unter mit Quecksilber gesperrten Glocken auf seine Hände einwirken liess, bedeutend vermindert wurden.

In Hinsicht der Resorption innerer Theile bleibt es immer zweifelhaft, welchen Antheil daran die Aufnahme in die Blutgefässe oder in die Lymphgefässe hat. Doch giebt es viele Beispiele auffallender Resorption innerer Stoffe in Theilen, deren Lymphgefässe man nicht kennt, wie in den Knochen.

Von vielen anderen Erscheinungen ist es durchaus zweifelhaft, in welche Ordnung von Gefässen das aus inneren Theilen Aufge-

Digitized by Google

nommene zuerst gelangt, wo nämlich ausser Blutgefässen auch Lymphgefässe vorhanden sind. Hierher gehören z. B. die Wiederaufsaugung des in der Gelbsucht abgelagerten Farbestoffes der Galle und die Aufnahme angesammelter Secreta, Galle, Harn, in die Säftemasse, das Verschwinden der Thymusdrüse bis zum 12. Jahre, das allgemeine Schwinden des Fettes bei Hungernden, Schwindsüchtigen und nach Säfteverlusten, im Winterschlaf, das oft schnelle Schwinden der Warzen an den Fingern. Diese Erscheinungen sind nicht alle von gleicher Art. Von der Aufsaugung von Säften, welche ausser der Wechselwirkung mit den Capillargefässen sind, indem sie keine Theile der Organe selbst sind, muss man diejenigen Fälle unterscheiden, wo die Partikeln der organisirten Theile selbst zwischen den Capillargefässen schwinden. Bei diesem Process, wie er in dem schwindenden Schwanze der Froschlarven, der Membrana pupillaris, bei der Entstehung der Zellen in den Knochen stattfindet, scheint die Auflösung der Partikeln zwischen den Capillargefässen fast das Wesentlichste zu seyn, wobei denn das Aufgelöste mit den Blutströmchen nur in Wechselwirkung zu treten braucht, oder (ausser den Knochen) vielleicht in die Lymphgefässe aufgenommen wird. Unter den organisirten Theilen zeigen die Knochen die auffallendsten Phänomene dieser Art von Resorption. Ihre Zellen entstehen erst hernach bei dem Kinde und vergrössern sich durch Resorption. Die Diploe der Schädelknochen schwindet im Alter, und diese werden dünner. In der Jugend entstehen die Sinus frontales, sphenoidales. Selbst Theile, welche nicht organisirt sind, sondern nur mit organisirten Keimen in Verbindung stehen, wie die Wurzeln der Zähne, sind der Resorption unterworfen. Die Wurzeln der ersten Zähne schwinden zur Zeit des Zahnwechsels, und Soemmerring hat beobachtet, dass sie weich werden, wahrscheinlich durch Auflösung. *Vom Bau des menschlichen Körpers I.* §. 226. u. 233. Indess werden auch bei der Caries der Zähne von fehlerhafter Zusammensetzung der Elemente der Zähne diese durch die Mundflüssigkeit angegriffen und erweicht. Ob nekrotische Knochenstücke durch lange Berührung mit thierischen Theilen Substanz verlieren, ist noch unbekannt.

Wird die Ernährung durch Krankheiten des Blutes, durch Lähmung etc. vermindert, so ist die Resorption grösser als die Ernährung, und der Theil schwindet. Ob in der Phthisis Muskelfasern oder nur Zellgewebe schwindet, ist ungewiss, doch scheinen die zarten Mulkeln zu schwinden, wie der platysmamyoides und einige Muskeln des äussern Ohres. In der Lähmung schwinden aber häufiger die Muskeln, und namentlich hat Schroeder v. d. Kolk die Umwandlung in Fett bemerkt. Knorpel, Knochen, Gehirn und Nerven schwinden in der Lungenschwindsucht nach Desmoulins und Schroeder's Untersuchungen nicht. Bei allgemeinen Ursachen der Atrophie schwinden die Theile in folgender Reihe, Fett, Zellgewebe, Muskeln, Knochen, Knorpel, Sehnen. Bei anhaltendem Druck kann jedes Gewebe resorbirt werden, wenn seine Ernährung aufhört. Das Schwinden der Knochen von Druck bleibt indess immer noch räthselhaft, denn

Digitized by Google

wenn das Aufhören der Ernährung von Druck die alleinige Ursache wäre, so müssten auch die Gelenkköpfe an den unteren Extremitäten schwinden. Vielleicht wird durch eine um sich greifende Geschwulst, Aneurysma, Schwamm, Entzündung der Umgebung und auch der Knochen bewirkt, die Folge davon ist Auflockerung, und im aufgelockerten Zustande ist der Knochen leichter der Resorption fähig, sobald seine Ernährung durch Druck beeinträchtigt wird. Doch entsteht hierbei keine Caries. Vergl. Schroeder v. d. Kolk in Luchtmans *de absorptionis sanae et morbosae discrimine. Traj. ad R.* 1829.

Bekanntlich befördert die Jodine das Schwinden und die Resorption der organischen Theile.

b. Von der Ausschwitzung, exsudatio.

Viele Stoffe, welche in thierischen Flüssigkeiten aufgelöst sind, namentlich die fremdartigen, welche in den Kreislauf eingedrungen, sich im veränderten oder unveränderten Zustande mit dem Blute verbreiten, werden nach den Gesetzen der Imbibition und Endosmose ausgeschieden. Blausaures Kali, durch Endosmose in den Kreislauf aufgenommen, durchdringt nach denselben Gesetzen auch die thierischen Gewebe, welche an die Aussenwelt grenzen, und mischt sich den natürlichen Absonderungsflüssigkeiten bei, so dass es bald in den verschiedensten Absonderungsflüssigkeiten, im Harn z. B. nach Westrumb 2—10 Min. nach der Application spurenweise wieder erscheint. Die in dem Absonderungsorgane enthaltene Flüssigkeit (z. B. der in den Harnkanälchen enthaltene Harn) und das mit blaus. Kali imprägnirte Blut sind die beiden Flüssigkeiten, welche sich durch die thierischen Wände nach rein physikalischen Gesetzen in Gleichgewicht ihrer aufgelösten Theile setzen können. In der Gelbsucht werden auf diese Art fast sämmtliche innere Organe und auch Absonderungsflüssigkeiten, wie der Harn, von dem im Blutwasser aufgelösten Färbestoff der Galle durchdrungen.

Die verdunstbaren Theile des Blutes, natürliche oder fremdartige beigemischte, können von den freien Oberflächen der thierischen Membranen verdunsten, sofern sie nicht durch eigenthümliche Anziehung von dem thierischen Gewebe zurückgehalten werden. Wenn Druck den Durchgang durch die Poren der thierischen Wände begünstigt, so müssen nach physikalischen Gesetzen auch tropfbare Flüssigkeiten in freie mit Gas oder Dunst gefüllte Räume durchdringen. Diess geschieht nach dem Tode schon durch blosse Schwere, so dass Blutwasser und später aufgelöster Färbestoff die Gewebe durchdringen und sich in freien Räumen ansammeln können. Die Galle durchdringt dann die Gallenblase und färbt anliegende Theile gelb. Während des Lebens hält die Resorption diesem Durchdringen der Membranen durch eine organische Anziehung das Gleichgewicht; allein verschiedene Ursachen in Krankheiten heben dieses Gleichgewicht auf, und es sammelt sich dann Wasser mit aufgelöstem Thierstoff und Salzen in den Höhlen und im Zellgewebe, und verursacht die Erschei-

Digitized by Google

nungen der Wassersucht und des eiweissstoffhaltigen Urins. Nach Verschliessung grosser Venenstämme der Eingeweide und der Extremitäten entsteht Exsudation von eiweisshaltigem Wasser aus dem Blute in den anliegenden serösen Säcken oder im Zellgewebe, besonders der unteren Extremitäten, und man kann, wie Bouillaud gezeigt hat, eine Wassersucht des Zellgewebes künstlich erzeugen durch Unterbindung grosser Venenstämme. Die Wassersuchten nach Degeneration der Eingeweide entstehen vielleicht auch zum Theil von Verschliessung der Circulationswege dieser Eingeweide. Aus denselben Ursachen könnte man die Exsudation des aufgelösten Faserstoffes in den Entzündungen erklären, obgleich für die Qualität der ausschwitzenden Materie noch besondere Ursachen einwirken.

Hiernach scheinen die Exhalationen (Dunst) und Exsudationen (tropfbar Flüssiges) nach rein physikalischen Gesetzen der Imbibition, Endosmose und des Druckes auch im lebenden Körper zu erfolgen. Dem ist aber nicht so. Nach physikalischen Gesetzen könnte alles Aufgelöste durchdringen. Im lebenden Körper durchdringt aber nicht alles Aufgelöste unter dem Einflusse der Endosmose und des Druckes die thierischen Gewebe, sondern das Exhalirte und Exsudirte ist oft nur ein Theil der im Blute aufgelösten Stoffe. So exsudirt in der Entzündung unter der örtlichen Blutanhäufung aufgelöster Faserstoff durch die Häute, Faserstoff, der, wie ich bewiesen habe, im lebenden Blutwasser aufgelöst ist. Bei den Wassersuchten, wie sie z. B. durch verhinderten Rückfluss des Blutes bewirkt werden, exsudirt dagegen nicht der Faserstoff des Blutes, das Exsudat gerinnt meist nicht von selbst, sondern nur durch Reagentien werden Stoffe daraus niedergeschlagen, es enthält nur den aufgelösten Eiweissstoff des Blutes. Hieraus geht hervor, dass dem Durchdringen des aufgelösten Faserstoffes in den Wassersuchten noch durch eine Kraft das Gleichgewicht gehalten seyn muss, welche in der entzündlichen Exsudation gelähmt ist, und diess muss eine Anziehung des lebenden Gewebes zum aufgelösten Faserstoff seyn, während dasselbe Gewebe bei der Wassersucht eiweissstoffiges Wasser durchlässt. Im Anfange der Entzündung wird nur Blutwasser, wie in einer Wunde oder nach dem Legen eines Blasenpflasters, bei heftigerer Entzündung auch Faserstoff ausgeschieden. Dass ähnliche Verhältnisse bei der Exhalation z. B. der Haut stattfinden, ist wahrscheinlich, dagegen unwahrscheinlich, dass Alles von den thierischen Oberflächen exhalirt, was verdünstbar ist.

Manche Ausscheidungen sind gar nicht nach den Gesetzen der Endosmose zu erklären, z. B. die des Harnstoffes aus dem Blute durch die Nieren. Diess ist wirklich eine blosse Ausscheidung; denn der Harnstoff wird nicht in den Nieren erst gebildet, sondern Prevost und Dumas haben entdeckt, und Segalas bestätigt, dass nach der Exstirpation der Nieren der Harnstoff im Blute gefunden wird. Diese allerdings aufgelöste Materie wird daher im Blute nur so lange nicht gefunden, als sie nicht durch die Nieren daraus ausgeschieden wird. Wenn aber Harnstoff

Digitized by Google

schon im Blute aufgelöst ist, warum wird er allein durch die Nieren ausgeschieden und nicht durch alle anderen Absonderungsorgane? Die Gesetze der Endosmose reichen zur Erklärung dieser wahrhaften Ausscheidung nicht aus.

Auch andere Ausscheidungen geschehen aus Bestandtheilen des Blutes und erfolgen nur unter bestimmten örtlichen Bedingungen, wie der Menstrualfluss. Nach Lavagna, Toulmouche, Brande und meinen eigenen Beobachtungen enthält das Menstrualblut keinen Faserstoff. Es formt sich allerdings im Urin oft in Klumpen, aber diese Klumpen sind wie Brei und bestehen vorzüglich nur aus den rothen Körperchen. Dass das Menstrualblut nur eine concentrirte Auflösung von Farbestoff der Blutkörperchen sey, wie Brande behauptet, ist gewiss falsch; ich habe bei Untersuchung des Menstrualblutes wirkliche unveränderte Blutkörperchen darin gefunden. Diess setzt voraus, dass im Uterus der Menstruirenden eine solche Auflockerung der Capillargefässwände eintrete, dass sie zu dieser Zeit Kügelchen durchlassen. An Venenmündungen ist hierbei so wenig als an irgend einem Orte zu denken. Es giebt keine Venenmündungen.

Die langsame Ausscheidung von Blut, welche die Pathologie Diapedesis (per secretionem) nennt, kann auch keine einfache Ausscheidung seyn; sie setzt auch Auflockerung der Gefässwände voraus, und ist in vielen Fällen, wenn nicht in allen, gewiss in einer Zerreissung der kleinsten oder Capillargefässe begründet, wie bei dem Blutspeien und blutigen Auswurf in der Lungenentzündung. Dass aber der die Blutkörperchen färbende Stoff sich unter besonderen Umständen in Blutwasser der lebenden Thiere auflösen könne, und blutig gefärbtes Blutwasser durchschwitzen könne, hat Wedemeyer (*über den Kreislauf. Hannover* 1828. 463.) wahrscheinlich gemacht. Bei Pferden, welchen viel warmes Wasser in die Venen gegossen wurde, trat Exsudation von blutigem Wasser aus der Nase und in die Bauchhöhle ein. Bekanntlich hat der Färbestoff der Blutkörperchen die Eigenschaft sich im Wasser aufzulösen. So scheint sich auch Blutroth im Serum beim Scorbut, im Morbus maculosus, und nach dem Schlangenbiss (Autenrieth *Physiol.* 2. 154.) aufzulösen. Nach einem geistreichen Arzt soll die Diapedesis ein Durchdringen von bloss aufgelöstem Blutroth, nicht von Blutkörperchen seyn. Diess ist schwer zu beweisen und vor dem Beweis nicht annehmbar. Selbst das blutige Serum des Blutes im Scorbut enthält vielleicht nicht einmal Farbestoff aufgelöst, sondern zerstreute Kügelchen, was immer leicht geschehen kann; wenn das Blut nicht fest gerinnt.

Die Erscheinung von Kügelchen in den Secreta setzt eine Bildung derselben im Momente der Abscheidung voraus. Aus dem Blute aus den Capillargefässen können diese nicht durchgehen. Die Kügelchen des Eiters sind grösser als die Blutkörperchen, zum Theil noch einmal so gross (Weber), sie können nicht aus den Blutkörperchen ihre Entstehung nehmen, sie sind entweder abgestossene Theilchen der eiternden Oberfläche, oder bilden sich erst im Momente der Abscheidung, da der Eiter im

Digitized by Google

Momente der Bildung dünn und klar nach Brugmans und Autenrieth abgeschieden werden soll. Die Ausscheidung von Eiterkügelchen, die ins Blut gekommen, durch die Nieren erscheint daher als eine reine Unmöglichkeit, nur die näheren Bestandtheile des Eiters im aufgelösten Zustande können abgeschieden werden.

III. Abschnitt. Von der Lymphe und dem Lymphgefässsystem.

I. Capitel. Von der Lymphe.

Die Lymphe ist der Inhalt der lymphatischen Gefässe. Sie ist eine blassgelbe klare und, wenn sie nicht mit Blutkörperchen zufällig verunreinigt worden, in der Regel nicht röthliche Flüssigkeit. Beim Frosch ist sie ganz klar, nicht einmal gelblich; beim Menschen haben sie Wutzer, H. Nasse und ich gelblich klar beobachtet. Die Lymphe ist geruchlos, reagirt schwach alkalisch, und schmeckt salzig. Die Lymphe des Darmkanals, wenn sie aufgesogene Nahrungsstoffe enthält, ist weniger klar, sondern immer mehr oder weniger getrübt, bald gelbgrau, bald weisslich, von einer grossen Menge von runden Kügelchen. Die Lymphe des Darmes wird bei gefütterten Thieren Chylus genannt.

Lymphe und Chylus enthalten aufgelöstes Eiweiss und aufgelösten Faserstoff. Der letztere gerinnt in der Lymphe innerhalb 10 Minuten zu einer Gallerte. In Reuss und Emmert's Untersuchung (Scherer's *Journ.* 5. 691.) gaben 92 Gr. Lymphe des Pferdes 1 Gr. Coagulum im weichen Zustande, also noch nicht $\frac{1}{3}$ Proc. trocknen Faserstoff. Die übrige Flüssigkeit hinterliess abgedunstet $3\frac{3}{4}$ Proc. trocknen Rückstand, vorzüglich Eiweiss und Kochsalz. Reuss, Emmert und Lassaigne erhielten von der Lymphe der Pferde, wie ich und Nasse von der Lymphe des Menschen, und ich in allen Fällen von der Lymphe der Frösche, den Faserstoff ganz farblos. Nur Tiedemann und Gmelin geben den Faserstoff der Lymphe von Thieren blassröthlich an, was vielleicht von zufälliger Verunreinigung von etwas Blut herrührte. Lassaigne giebt die Zusammensetzung der Pferdelymphe folgendermassen an: Wasser 92,500, Faserstoff 0,330, Eiweiss 5,736, Chlornatrium, Chlorkalium, Natron, phosphorsaurer Kalk zusammen 1,434. Tiedemann und Gmelin fanden in der Lymphe auch

Digitized by Google

Speichelstoff; Osmazom, kohlen-, schwefel-, salz- und essigsaures Natron und Kali nebst phosphorsaurem Kalk.

Von der Lymphe unterscheidet sich der Chylus dadurch, dass der Chylus freies Fett enthält, dass die Menge der festen Theile in ihm grösser ist (100 Chylus aus den Lymphgefässen des Mesenteriums vom Pferde gaben Tiedemann und Gmelin 0,37 trocknen Faserstoff, die Lymphe des Beckens nur 0,13), und dass der Chylus viel mehr Kügelchen enthält und trüber ist. Die Kügelchen der Lymphe sind sparsam und sind bisher übersehen, Dr. H. Nasse und ich haben sie in der Lymphe des Menschen, und ich sehr häufig in der Lymphe der Frösche gesehen.

Die Lymphe des Menschen scheint zuerst von uns untersucht zu seyn. Denn Soemmerring's Lymphe aus Varices von Lymphgefässen, die nicht gerann, konnte keine Lymphe seyn.

Im Winter 1831—1832 bot sich in Bonn diese ausserordentliche Gelegenheit dar, Lymphe des Menschen zu untersuchen. Im chirurgischen Clinico des Hrn. Professor Wutzer befand sich ein junger Mensch, dem, in Folge einer vor längerer Zeit erlittenen Verletzung am Fussrücken, beständig Lymphe aus der, allen Versuchen zur Heilung trotzenden, kleinen Wunde ausfloss. Wenn man über den Rücken der grossen Zehe in der Richtung gegen die Wunde hinstrich, floss jedesmal eine Quantität ganz klarer Flüssigkeit, zuweilen spritzend, hervor. Diess war Lymphe. Sie setzte nach ungefähr 10 Minuten ein spinngewebeartiges Coagulum von Faserstoff ab. Hier konnte man nun Lymphe in Menge sammeln. Was mich am meisten zu wissen interessirte, war: ob die Lymphe Kügelchen enthalte, welche alle neueren Beobachter, Reuss und Emmert, Soemmerring, Tiedemann und Gmelin, Brande, Lassaigne, nicht beobachtet haben; wogegen Hewson in der freilich zweideutigen Lymphe von der Thümusdrüse des Kalbes unzählige weisse Körnchen von der Grösse der Kerne der Blutkörperchen, und in der röthlichen Lymphe der Milz rothe Körperchen gesehen haben wollte. Bei der mikroskopischen Untersuchung jener Lymphe des Menschen sah ich, dass die Lymphe, obgleich sie klar und durchsichtig war, doch eine Menge farbloser Kügelchen enthielt, die kleiner schienen, als die Blutkörperchen des Menschen, und sehr viel sparsamer darin enthalten waren, als die Blutkörperchen im Blute. Diese Kügelchen verbinden sich beim Gerinnen zum kleinern Theil mit dem Coagulum. Der grösste Theil bleibt im Lymphserum suspendirt. Das Coagulum besteht, wenn es sich zusammengezogen hat, aus einem weissen fadenartigen Gewebe. Das Merkwürdigste ist nun aber, dass das Gerinnsel nicht durch Aggregation der Kügelchen entsteht, sondern man sieht, dass eine vorher aufgelöste Materie gerinnt und die zerstreuten Kügelchen zum Theil in sich aufnimmt. Untersuchte man das Gerinnsel von einer sehr kleinen Quantität Lymphe, die man in einem Uhrglase hatte gerinnen lassen, so erkannte man die Lymphkügelchen bei starker Vergrösserung eben so zerstreut in dem Coagulum, wie sie vorher in der Lymphe selbst erschienen. Die Materie, welche die Lymphkügelchen verbindet, lässt sich besonders an dem zarten Rande

Digitized by Google

des Coagulum beobachten; sie ist ganz gleichartig, schwach durchleuchtend, und besteht nicht deutlich aus Kügelchen, die, wenn sie darin enthalten sind, sehr viel kleiner seyn müssen, als die Kügelchen der Lymphe. Vergl. H. Nasse, Tiedemann's *Zeitschrift V.* Diese neuen Beobachtungen beweisen, dass, obgleich die Lymphe Kügelchen suspendirt enthält, doch der Faserstoff in ihr aufgelöst ist. Beim Menschen wird sich die Gelegenheit sehr selten darbieten, jene Beobachtungen zu wiederholen. Dagegen werde ich jetzt angeben, wie man sich zu jeder Zeit, wo man Frösche haben kann, die Lymphe dieses Thieres sehr leicht und rein verschaffen kann. Es ist bekannt, dass die Haut der Frösche überaus locker mit den Muskelschichten verbunden ist. Dass zwischen beiden ansehnliche Lymphräume enthalten seyn müssen, erkennt man schon an der Natur der zwischen Haut und Muskeln enthaltenen Flüssigkeit. Wenn man bei grossen Fröschen die Haut am Oberschenkel anschneidet, und, indem man die Zerschneidung grösserer Blutgefässe vermeidet, die Haut eine Strecke weit von den Muskeln ablöst, so fliesst öfter (nicht immer) eine klare, farblose, salzig schmeckende Flüssigkeit aus, und zwar oft sehr reichlich, wenn der Frosch sehr gross und frisch war. Diese Flüssigkeit ist Lymphe. Der Beweis davon liegt in dem Umstande, dass diese Flüssigkeit innerhalb mehrerer Minuten ein ansehnliches, anfangs wasserhelles Coagulum absetzt, das sich allmählig zu einem fadenartigen weisslichen Gewebe verdichtet. Wenn man von einer Anzahl grosser Frösche die Lymphe sammelt, so erhält man genug, um eine nähere Untersuchung anzustellen. Das Faserstoffgerinnsel einer gewogenen Quantität Lymphe wurde getrocknet und mit einer sehr empfindlichen Waage gewogen; so erhielt ich aus 81 Th. Froschlymphe einen Theil trocknen Faserstoff; ein Verhältniss, welches wegen der Menge des Faserstoffes sehr merkwürdig scheint, wenn sich auf einen einzigen Versuch bei so kleiner Quantität ein bestimmter Werth legen liesse. Bewahrt man Frösche lange auf, so gerinnt die gewonnene Lymphe nicht mehr, so wie auch ihr Blut entweder sehr wenig, oder gar kein Gerinnsel absetzt. Die Froschlymphe enthält im frischen Zustande Kügelchen, jedoch ausserordentlich sparsam darin zerstreut. Sie sind ungefähr vier Mal kleiner als die elliptischen Blutkörperchen des Frosches. Sie sind rund und nicht platt. Da man beim Einschneiden der Haut des Frosches jedesmal auch einige Blutgefässe zerschneidet, so ist es unvermeidlich, dass sich bei mikroskopischer Untersuchung in der Lymphe einige elliptische Blutkörperchen zeigen. Diese Beimengung ist aber ganz unbedeutend, und die Lymphe bleibt wasserhell. Durch diese Beobachtung hat man den grossen Vortheil, sich schnell und zu jeder Zeit Lymphe verschaffen zu können; und man kann so die Haupteigenschaften derselben, da sie mit der menschlichen sehr übereinkömmt, in den Vorlesungen zeigen. Dagegen man bisher keinem Arzte einen Vorwurf machen konnte, wenn er in seinem ganzen Leben keine Lymphe gesehen hatte, die doch sonst in den pathologischen Werken und von den Aerzten so viel besprochen wird, so dass sie wegen Unkenntniss der

Digitized by Google

wahren Natur der Lymphe vielerlei der verschiedensten Dinge mit diesem Namen belegen. Nicht allein faserstoffhaltige und eiweisshaltige Exsudate, sondern auch Wundflüssigkeiten und eiterförmige Stoffe, besonders aber alle Materien, welche sie nicht genau kennen, werden von ihnen Lymphe genannt.

Diese Versuche vom Frosche liefern die Bestätigung jener Beobachtung von der menschlichen Lymphe. Es ist sehr instructiv, unter dem Mikroskope die Entstehung des Gerinnsels in einem Tropfen Froschlymphe zu untersuchen, wo man sich auf das Bestimmteste überzeugen kann, dass die hier in ganz grossen Zwischenräumen zerstreuten Kügelchen gar keinen Antheil an der Gerinnung des vorher aufgelösten Faserstoffes haben. Der Eiweissstoff der Lymphe lässt sich auf die gewöhnliche Weise aus der Lymphe niederschlagen. Merkwürdig ist aber, dass nicht allein die Froschlymphe von viel zugesetztem liquor Kali caustici trüb wird, und dass der Chylus der Säugethiere von zugesetztem liquor Kali caustici sogleich das Eiweiss absetzt, sondern dass nach meiner Beobachtung das Eiweiss auch aus kleinen Quantitäten Blutwasser von viel zugesetztem liquor Kali caustici niedergeschlagen wird. Die Kaliauflösung muss aber ganz concentrirt seyn.

Die Lymphe scheint unter gewöhnlichen Umständen in den meisten Theilen farblos zu seyn, zuweilen hat man sie röthlich gesehen; Magendie, Tiedemann und Gmelin sahen sie so bei fastenden Thieren, aber diese Färbung ist in den Lymphgefässen der Milz nicht selten. Hewson, Fohmann, Tiedemann und Gmelin haben diess bemerkt. Seiler hat es nur ausnahmsweise gefunden. Rudolphi hält es für zufällig. Ich habe indess im Schlachthause an der Milz des Ochsen wiederholt unter den vielen und ansehnlichen Lymphgefässen der Oberfläche der Milz jedesmal einige bemerkt, deren Lymphe schmutzig röthlich war. Ich halte diese ganz leichte durchscheinende Färbung nicht wie Hewson für Färbung von rothen Körperchen des Blutes. Ich glaube vielmehr, dass die Lymphe in dem blutreichen Gewebe der Milz vom Farbestoffe des Blutes etwas aufgelöst hat.

Der Chylus der Thiere ist fast immer trüber als ihre Lymphe, und diese Trübheit scheint von den Kügelchen des Chylus herzurühren. Bei den Säugethieren ist der Chylus meist weisslich, besonders nach fettiger und Fleischnahrung. Bei Vögeln ist der Chylus nicht weiss, sondern mehr durchscheinend. Im Ductus thoracicus der Pferde, seltener bei anderen Thieren, ist der Chylus röthlich, und sein Coagulum wird dann in der Luft noch rother.

Was die Vergleichung der Blutkörperchen und Chyluskörnchen betrifft, so sind die Chyluskügelchen der Säugethiere, die ich vom Kaninchen, von der Katze, vom Hunde, vom Kalbe und von der Ziege mikroskopisch untersucht habe, nicht platt, wie die Blutkörperchen, sondern rund. Prevost und Dumas fanden die Chyluskügelchen $\frac{1}{7999}$ Par. Zoll, was mehr als halb so viel beträgt, als die Blutkörperchen des Menschen. (Siehe E. H. Weber in Hildebrandt's *Anatomie I.* S. 160.) Ich habe die Chylus-

Digitized by Google

kügelchen jedesmal auf derselben Glasplatte mit den Blutkörperchen desselben Thieres untersucht, und fand ihre Grösse bald gleich der der Blutkörperchen, wie bei der Katze, bald, und zwar meistens, etwas kleiner, wie beim Kalbe, bei der Ziege, beim Hunde; bei welchem letztern ich sie von sehr verschiedener Grösse, die meisten sehr klein, und alle kleiner als die Blutkörperchen fand. Beim Kaninchen fand ich sogar die Chyluskügelchen zum Theil grösser als die Blutkörperchen, die meisten waren sehr klein, $\frac{1}{3}$ bis $\frac{2}{3}$ so gross als die Blutkörperchen; viele waren nicht kleiner als die Blutkörperchen, und einige waren offenbar grösser, wenigstens noch einmal so gross; fein zertheilte Fetttheilchen waren diess nicht, wie ich solche allerdings von ansehnlicher Grösse ganz deutlich in dem Chylus eines mit Butter gefütterten Hundes von den anderen Kügelchen verschieden erkannte. Damit stimmen R. Wagner's Beobachtungen überein. Hecker's *Ann.* 1834. Mueller's *Archiv* 1835. 107. Auch Wagner ist in Hinsicht der Identität der Lymph- und Chyluskörperchen mit den Kernen der Blutkörperchen sehr zweifelhaft. Tiedemann und Gmelin scheinen den Chylus für eine vollkommene Auflösung der Thierstoffe zu halten, in welcher keine anderen Kügelchen als Fettkügelchen schweben. In der That haben sie gesehen, dass beim Schütteln des milchigen Serums vom Chylus mit weingeistfreiem Aether allmählige Klärung des Serums eintrat. Die Gewissheit über den Ursprung der Kügelchen im Chylus ist von ausserordentlicher Wichtigkeit; denn wenn z. B. Chylus ganz aufgelöster Thierstoff wäre, und bei der Resorption keine Kügelchen in die Lymphgefässe eindrängen, als etwa bloss flüssige Fetttheilchen, so wäre es denkbar, dass die Oeffnungen, die man bisher vergebens an den Zotten des Darmkanals gesucht hat, wirklich fehlen könnten, und dass die Anfänge der Lymphgefässnetze keine grösseren Poren hätten, wie alle weiche Thiersubstanz, welche für Aufgelöstes permeabel ist. Es ist mir aber wahrscheinlich, dass aus dem Darmkanal auch wirklich Kügelchen in den Chylus übergehen, und dass es nicht bloss fein zertheilte Fetttröpfchen sind. Als ich milchiges Serum vom Chylus der Katze in einem Uhrglase mit weingeistfreiem Aether versetzte, schien sich zwar anfangs allmählig das Serum etwas aufzuklären; aber es blieb doch, selbst nach langer Fortsetzung des Versuches unter immer neuem Zugiessen von Aether, unten ein trübes Wesen zurück, und als ich dieses unter dem Mikroskope untersuchte, bemerkte ich darin die ganz unveränderten Chyluskügelchen. Ich gebe gerne zu, was Tiedemann und Gmelin so allgemein beobachtet haben, dass der Chylus bei fettiger Nahrung trüber wird; allein ich kann nicht annehmen, dass alle Kügelchen des Chylus Fetttheilchen seyen. Wenn aber auch der Aether das Chylusserum wirklich ganz klar machte, so würde daraus doch noch nicht folgen, dass die Kügelchen blosse Fetttheilchen seyen. Denn die Lymphe ist ganz klar, und enthält doch zerstreute Kügelchen.

Die sparsamen Kügelchen der Lymphe müssen bei der Resorption von den Partikeln der Organe abgestossen werden, oder

Digitized by Google

sich in der Lymphe bilden. Dass die Kügelchen des Chylus erst in den Lymphgefässen entstehen, dafür sind keine Beweise vorhanden. Diese Bildung der Kügelchen müsste, schon in den Lymphgefässnetzen der Darmhäute stattfinden; denn beim Kalbe, wo man an der Oberfläche des Darmes sehr gut die mit Chylus gefüllten Lymphgefässe sehen kann, habe ich in dem Chylus dieser Gefässe schon die gewöhnlichen Kügelchen bemerkt. Nach einer Hypothese von Doellinger würden sich die Kügelchen im Chylus auch ohne Durchdringen der Lymphgefässwände und ohne Poren erklären lassen. (Froriep's *Notizen*, *Bd.* 1. n. 2.) Doellinger nimmt an, dass die Zotten äusserlich durch Aggregation und Apposition von Bildungstheilchen aus dem Chylus des Darmkanales wachsen, wie die Keimscheibe des Embryo vor dem Entstehen der Blutgefässe aus der Dottersubstanz durch Apposition wächst. Während nun die Darmzotten äusserlich Stoff ansetzen, soll sich ihr Inneres in Chylus auflösen; allein Beobachtungen machen diese Hypothese unwahrscheinlich. Der Chylus ist bei Säugethieren immer mehr oder weniger trüb nach der Fütterung, und unterscheidet sich hierdurch constant von der Lymphe oder dem Resorptionsproducte anderer Theile, er variirt offenbar nach der Natur der Nahrungsmittel. Jedermann weiss, wie schnell Flüssigkeiten im Darmkanale aufgesogen werden, die doch schwerlich bloss unmittelbar in die Capillargefässe und so ins Blut gelangen und dass Farbestoffe, wenn gleich selten, doch einigemal in den Lymphgefässen beobachtet worden sind. Schlemm hat eine Beobachtung an jungen Kätzchen. die noch an der Mutter trinken, gemacht, wodurch es einigermaassen wahrscheinlich wird, dass bei ihnen wirklich Milch ins Blut gelangt. Eine Beobachtung die Rudolphi und ich verificirt haben, und welche auch Mayer bestätigt hat. (Siehe Froriep's *Not. N.* 536. 565.) Diese Kätzchen haben zuweilen, nicht immer, eine gewisse Zeit nach dem Trinken ein gelbrothes Blut, welches beim Gerinnen sich in ein rothes Coagulum und milchweisses Serum scheidet. Rudolphi und Mayer behaupten es auch von ganz jungen Hunden. Bei jungen Thieren scheinen also wirklich die Kügelchen der Milch, welche eben die Milch weiss machen, in die Lymphgefässe des Darmkanales zu gelangen, gleichwohl gerinnt ein Theil der Milch im Magen jener Thiere, wie Mayer bemerkt. Kastner (*das weisse Blut. Erlangen* 1832.) wollte die Wiederholung von Schlemm's Beobachtung nicht gelingen. Eine ausführliche Untersuchung des Chylus wird übrigens bei der Verdauung im 2. Buch 4. Abschn. gegeben.

II. Capitel. Von dem Ursprunge und Bau der Lymphgefässe.

a. Verhalten der feinsten Lymphgefässe.

Die wichtigen älteren Untersuchungen über den Bau der Lymphgefässe sind in der von Ludwig herausgegebenen Sammlung der Schriften von Mascagni, Cruikshank und Anderen zu-

Digitized by Google

sammengestellt. In der neuern Zeit hat dieser Gegenstand wichtige Aufschlüsse erhalten, besonders durch die ausgezeichneten Arbeiten von Fohmann (*das Saugadersyst. der Wirbelthiere. I. II. Heidelb.* 1827. *fol.*), von Lauth (*essai sur les vaisseaux lymphatiques. Strasb.* 1824. *Ann. des sc. nat. T.* 3.) und von Panizza (*osservazioni antropo-zootomico-fisiologiche. Pavia* 1830. *fol.*, und *Sopra il sistema linfatico dei rettile ricerche zootomiche. Pavia* 1833.)

Die Anfänge der Lymphgefässe zeigen sich in Quecksilberinjectionen in einer zweifachen Form.

1) Als Netze mit bald länglichen, bald mehr gleichförmigen Maschen. Die Maschen sind häufig kleiner als der Durchmesser der feinsten Lymphgefässe selbst, und letztere erscheinen daher als ein sehr eng zusammengezogenes Netzwerk von unregelmässiger Bildung, so dass die ungleichen Theile des engen Netzwerkes dem Unaufmerksamen wie Aggregate von Zellen erscheinen können, während sie doch nur Ungleichheiten und kleine Erweiterungen des Netzwerkes bei sehr engen Maschen sind. In anderen Theilen, wo das Netzwerk viel weitere Maschen hat, ist die netzförmige Bildung sogleich in die Augen fallend. Die Stärke des Durchmessers dieser Gefässe in den Netzen ist sehr verschieden, niemals aber sind sie so fein als die Capillargefässe, und ich kenne keine Lymphgefässe, welche nicht mit blossen Augen sichtbar wären. Am feinsten müssten sie wohl in den Kiemen seyn, nach Fohmann's schöner Entdeckung und nach dessen Abbildungen. Dass es noch feinere Lymphgefässe giebt, ist sehr unwahrscheinlich, weil eben die Lymphgefässnetze, wie wir sie jetzt kennen, nur sehr kleine Zwischenräume zwischen sich lassen.

2) In anderen Fällen sieht man die Anfänge derselben nicht als Netze, sondern als mit einander zusammenhängende kleine, mehr oder weniger regelmässige Zellen. So waren die Lymphgefässinjectionen des Nabelstranges, die zweifelhaften Lymphgefässe der Cornea, die ich gesehen. So fiel die Injection auch am Darmkanale aus, wenn ich beim Kalbe eines der mit Chylus gefüllten, am Darme hervorkommenden Lymphgefässe gegen den Darm hin, um den Widerstand der Klappen zu überwinden, durch eine Stahlspritze mit Quecksilber füllte, was mir in einem Falle bei gewaltsamer Injection ziemlich gut gelang. Die grosse Menge der kleinen Zellen, die sich dann füllen, führt auf den Gedanken, dass das Zellgewebe selbst der Anfang der Lymphgefässe sey. Fohmann ist sogar der Meinung, dass Alles, was wir für Zellgewebe ansehen, Lymphgefässe sind. Tiedemann *Zeitschrift f. Physiol.* 4. 2. Diess scheint mir noch sehr problematisch. Die Zellen werden dann besonders als Anfänge der Lymphgefässe zweifelhaft, wenn sie sich gerade vorzugsweise bei solchen Theilen vorfinden, in denen man sonst keine längeren regelmässigen Lymphgefässe antrifft, wie an dem Nabelstrange und der Cornea. Vergleichung glücklicher und weniger gelungener Injectionen und eigene Versuche machen mich glauben, dass viele der sogenannten zellenförmigen Lymphgefässanfänge gar keine wahren Lymphgefässe sind, und dass die Lymphgefässanfänge in der Regel

Digitized by Google

auch im dichtesten Zustande gedrängte, oft regelmässige Netze bilden. So gross meine Bewunderung der herrlichen Lymphgefässinjectionen des trefflichen Fohmann ist, die ich wiederholt im Museum zu Heidelberg gesehen, so sehr ich anerkenne, dass diese Arbeiten Alles übertreffen, was ich in dieser Art von Lymphgefässen gesehen habe, so weiss ich jedoch sehr gut einen Unterschied zwischen den vielen gelungenen Injectionen und einigen weniger guten zu machen, und hege den bescheidenen Zweifel, dass nicht Alles Lymphgefässe sind, was man bei Injectionen erhält. So kann ich die von mir gesehenen Quecksilberanfüllungen unter der Conjunctiva corneae oder zwischen den Lamellen der Cornea nicht für Lymphgefässe halten. In Hinsicht der von Fohmann (*Zeitschrift für Physiol.* 4. 2.) beschriebenen Lymphgefässe des Nabelstranges bin ich ganz ungewiss. Ich injicirte nach Fohmann's Vorschrift den Nabelstrang, es gelang mir die Quecksilberinjection (mit einem Stahlspritzchen) selbst am Nabelstrange eines 6monatlichen Foetus stellenweise, so dass ich die Injection aufbewahren konnte. Ich erhielt lauter kleine mit Quecksilber gefüllte Zellchen von $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{10}$ Millim. Diese Zellchen sind gewiss nicht künstlich gebildet, die meisten sind fast gleich gross, und aus einem Zellchen rückt das Quecksilber in das andere ohne alle Extravasation. Der grösste Theil des Gewebes des Nabelstranges um die Blutgefässe besteht aus ihnen. Nur an der Insertio umbilicalis des Nabelstranges füllten sich mehrere ganz kurze parallele Kanälchen. Ich weiss nicht, ob jene Zellen Lymphzellen sind, und bezweifle, dass sie der Resorption dienen.

Die Lymphgefässe des Darmkanales entspringen im Dünndarm, zum Theil in den Darmzotten, aber auch in der ganzen Schleimhaut des Darmkanales. Bei Injection der Lymphgefässnetze der Schleimhaut des Darmes dringt kein Quecksilber hervor. Auch die Darmzotten haben keine offenen Enden, welche Lieberkuehn, Cruikshank, Hedwig und Bleuland fälschlich angenommen. Siehe Rudolphi, *anatomisch-physiol. Abhandlungen* Alb. Meckel in Meck. *Archiv T.* 5.

Eine wichtige Bemerkung wäre es, wenn der leichte Uebergang von Milch, der nach meinen Versuchen in die Lymphgefässe eines mit dem Gekröse ausgeschnittenen frischen, mit Milch injicirten Darmstückes erfolgt, ohne Zerreissung des innersten Darmhäutchens vor sich ginge. Wenn man ein ausgeschnittenes Stück Darm des *Schaafes* an einem Ende zubindet und mit einer Spritze dieses Darmstück strotzend mit Milch füllt, so erhält man sogleich die Lymphgefässe des Darmes ausgedehnt von Milch, die sehr schnell in ihnen fortrückt. Wenn man die Milch in den Lymphgefässen nach der Richtung der Klappen fortstreicht, so bemerkt man sogleich, wie die vom Darme kommenden Lymphgefässe sich wieder füllen, besonders wenn man den Darm comprimirt. Am schnellsten folgt die Anfüllung der Lymphgefässe mit Milch, wenn man das strotzende Darmstück durch Zusammendrücken in der Längenrichtung zu verkürzen sucht, weniger, wenn man es von der Seite comprimirt. Nimmt man statt Milch

Digitized by Google

eine feine Injectionsmasse von Zinnober, so füllen sich die Lymphgefässe sehr schwer, und mit Quecksilber gar nicht. Mit einem vollkommen aufgelösten Farbestoff, wie z. B. mit löslichem Indigo, kann man indess auf diese Art sehr leicht Injectionen der Lymphgefässe des Gekröses machen. Dieser von mir beobachtete schnelle Uebergang scheint aber jedesmal mit Zerreissung des innersten Darmhäutchens an einer Stelle zu erfolgen, denn die Anfüllung der Lymphgefässe erfolgt plötzlich, und bei Untersuchung der innersten Darmhaut findet man diese oft hier und da verletzt. Dem zufolge lege ich auch auf diesen leichten Uebergang, den ich nur beim Schaafe, aber bei keinem andern Thiere beobachtete, in der gegenwärtigen Frage keinen Werth. Es bleibt indess immer zweifelhaft, ob die Chyluskügelchen schon gebildet in die Lymphgefässe des Darmes eindringen, vorzüglich spricht dafür die verschieden trübe Beschaffenheit des Chylus nach Maassgabe verschiedener Nahrung. Nun fragt sich, wo sind Oeffnungen für diesen Durchgang, die jedenfalls grösser seyn müssten, als die in anderen weichen, thierischen Theilen vorauszusetzenden Poren, vermöge welcher sie für Wasser und für Aufgelöstes permeabel sind; denn die Capillargefässe sind zwar permeabel für Flüssiges und Aufgelöstes, aber nicht für die Blutkörperchen. Alle guten Beobachter stimmen darin überein, dass an den Darmzotten keine Spuren von Oeffnungen zu bemerken sind; und ich selbst habe bei wiederholten Untersuchungen der Darmzotten von Kaninchen, Kalb, Ochsen, Schwein und von der Katze nie eine Oeffnung an dem Ende der Darmzotten bemerkt. An dieser Stelle sind die Oeffnungen der Darmzotten jedenfalls fabelhaft.

Folgendes ist das Resultat meiner mikroskopischen Untersuchung über den Bau der Darmzotten. Die Zotten sind bald walzenförmige, bald blättchenförmige, oft pyramidale, kurze Fortsätze der innersten Haut des Darmes von $\frac{1}{4}$ bis 1, höchstens $1\frac{1}{4}$ Linien Länge, welche ihr, im Wasser vergrössert, das Ansehen eines dichten Pelzwerkes geben. In dieser Art kommen sie in der Regel nur beim Menschen, den meisten Säugethieren und vielen Vögeln vor. Bei einigen Fischen bemerkt man etwas Aehnliches, und bei einer Schlange, Python bivitatus, hat Retzius zottenartige Fortsätze der innersten Darmhaut beschrieben, welche man schwerlich für etwas Anderes halten kann, obgleich Rudolphi den Fischen und Amphibien wahre Zotten abspricht. Alb. Meckel hat Unrecht, wenn er alle Zotten auf ein an der Basis breites, an der Spitze verschmälertes Blatt reduciren will. Sie sind allerdings bei den meisten Säugethieren platt, wie beim Kaninchen, Hund, Schwein; allein beim Kalbe, Ochsen, Schaaf sind viele Zotten walzenförmig; zuweilen findet man in einem Theile des Darmes mehr platte, in einem andern Theile desselben mehr walzenförmige Zotten, wie beim Ochsen und Schaafe, zuweilen stehen platte und walzenförmige vermischt, wie ebenfalls beim Ochsen und Schaafe, und bei denselben Thieren, besonders beim Schaafe bemerkt man oft an manchen Stellen platte, breite Zotten mit walzenförmigen Endzipfeln. Indem die Zotten

Digitized by Google

an der Basis breiter werden und in Fältchen zusammenhängen, gehen sie in die Fältchen über, welche bei vielen Vögeln und bei den Amphibien die Zotten ersetzen. Diesen Uebergang beobachtet man sogar an einem und demselben Thiere. Im obern Theile des Dünndarmes des Kaninchens sind die pyramidalen Zotten an der Basis in Fältchen vereinigt, im mittlern Theile sind sie mehr abgesondert. Das Ende der Zotten ist bald rund, bald etwas zugespitzt, bald wie abgeschnitten, letzteres beim Hunde. Rudolphi glaubte früher, dass die Zotten ohne Blutgefässe seyen, und A. Meckel hielt die in sie bei Injectionen eindringende Masse für imbibirt und extravasirt. A. Meckel, der sonst die besten Abbildungen der Zotten gegeben hat, konnte bei dieser Behauptung unmöglich gute Injectionen von Darmzotten vor sich gehabt haben. Ihre Gefässe lassen sich nicht allein sehr schön injiciren, sondern ich habe einmal beim Kalbe, und später wieder beim Hunde, die ich unmittelbar nach dem Tode, ohne auszuwaschen, untersuchte, selbst noch Blut in den zarten Gefässen der Darmzotten mit und ohne Loupe gesehen. Doellinger, Seiler und Lauth haben diese Gefässe nach Injectionen beschrieben und abgebildet.

Die Zotten zeigen niemals am Ende eine Oeffnung, und die von Bleuland u. A. angenommenen Mäuler am Ende derselben gehören seit Rudolphi's Widerlegung unter die Fabeln. Ihr Ende zeigt dasselbe zarte Gewebe, wie ihre ganze Oberfläche. Rudolphi hat unsere bisherigen Kenntnisse vom Bau dieser Theile mit folgenden Worten zusammengefasst: „Niemals haben sie eine sichtbare Oeffnung, in ihrem Innern sind Netze von Blutgefässen, die sich aber selten anders, als durch Einspritzen darstellen lassen, so wie auch in ihnen die Netze der Saugadern anfangen.“ Ein wichtiger Umstand scheint mir, dass die Darmzotten zum Theil im Innern hohl sind, und aus einem überaus zarten Häutchen bestehen, in welchem die Blutgefässe verlaufen. Diese einfache Höhlung fand ich vorzüglich dann, wenn die Zotten walzenförmig sind. Ich ward zuerst sehr überrascht bei einem ganz frisch untersuchten Darme vom Kalbe, dessen Lymphgefässe weissen Chylus enthielten, zu sehen, dass die Zotten im Innern mit derselben weissen, undurchsichtigen Materie von oben bis unten gefüllt waren. Später untersuchte ich den Dünndarm eines Kalbes, und fand die Zotten nicht mit weisser Materie angefüllt, sondern leer und deutlich hohl, wie Rudolphi selbst einmal beim Ferkel beobachtet hat. Hier, wie ferner an den Zotten des Ochsen, konnte ich unter dem Mikroskope diese zarten Theile mit der Nadel aufritzen; auch beim Kaninchen glaubte ich die blattförmigen, etwas breiten Zotten hohl zu sehen. A. Meckel hat einmal einen Anschein von Hohlheit gesehen und abgebildet; aber für Umbiegung der Blättchen erklärt, woran bei meinen Beobachtungen nicht zu denken ist. Die Dicke des Häutchens, woraus die Zotten beim Kalbe bestehen, habe ich durch Vergleichung zu 0,00174 P. Zoll ausgemittelt. In dieser Dicke verlaufen also die blutführenden Capillargefässe der Darmzotten, die man auf 0,00025 bis 0,00050 P. Zoll schätzen kann. So leicht ich

Digitized by Google

mich beim Kalbe, Ochsen, Schaafe und Kaninchen von der Hohlheit der Zotten überzeugen konnte, und zwar an denjenigen Zotten, welche weniger platt und breit, sondern schmal oder gar walzenförmig waren, so wenig konnte ich es an den Zotten der Katze, des Schweines und des Hundes; die des Hundes scheinen nur in ihrem obern Theile hohl zu seyn; auch die Fältchen im Darmkanale der Fische, wie des Aales, des Karpfens und der Clupea alosa, sind durchaus nicht hohl, sondern fest an einander liegende Duplicaturen. Auch die im Darmkanale des Schaafes an gewissen Stellen vorkommenden platten, breiten Zotten bestanden offenbar nicht aus einer einfachen Höhlung, eben so wenig, wie solche ganz breite Zotten im Darme des Kaninchens; und überhaupt scheinen alle breiten, platten Zotten mehr, als eine einfache Höhlung, als Anfang der Lymphgefässe zu enthalten. Die Darmzotten des Menschen zeigten auf der hiesigen Anatomie bei einem Menschen, dessen Lymphgefässe des Darmes bis in die Zotten mit weissem Chylus gefüllt waren, eine einfache Höhlung von oben bis unten, wie die mikroskopische Untersuchung von Henle und die von Schwann ausgeführte Injection dieser Zotten mit Quecksilber von den deutlich sichtbaren Lymphgefässen der Mucosa bewies. Das Quecksilber füllte die Zotten bis an die blinden Enden.

Man kann etwas für hohle Zotten halten, was ganz davon verschieden ist. Diess ist eine Art Epithelium, wenn gleich von ausserordentlicher Zartheit. Rudolphi hat das Epithelium zuerst vom Dachs erwähnt. Bei Kälbern und jungen Katzen ist es sehr leicht, sich zu überzeugen, dass die Zotten von einem leicht abstreifbaren, überaus zarten, unorganisirten Häutchen überzogen sind, welches sich wie ein Handschuh von den Zotten ablöst; es ist sehr zart und zerreiblich. Um diess zu beobachten, darf man das Darmstück nicht sehr auswaschen, weil es sich sonst von selbst löst. Beim Ochsen ist es noch viel zarter und nicht leicht zu beobachten; es wäscht sich wie eine schleimige Materie ab, an der man nur hier und da noch die Form der Zotten erkennt. Mit dem festen Epithelium anderer Schleimhäute lässt sich diess nicht vergleichen. Es ist keine epidermisartige Masse, sondern, wenn auch zusammenhängend hautartig, doch dem Schleime so verwandt, dass mir die Absonderung hier zwischen Epithelium und Schleim in der Mitte zu stehen scheint.

Obgleich ich niemals am Ende der Zotten eine Oeffnung bemerkt habe, und obgleich ich bei früheren Untersuchungen niemals auf der ganzen Oberfläche der Zotten kleine Löcherchen sehen konnte, so habe ich doch neulich an sehr ausgewaschenen Darmstücken des Schaafes und Ochsens auf den Wänden der Darmzotten, und zwar auf der ganzen Oberfläche der Zotten, ganz undeutliche zerstreute Grübchen bemerkt, die man wohl für schief durchgehende Oeffnungen halten könnte. Ich theile diese von mir wiederholte Beobachtung jedoch nur mit grosser Zurückhaltung und viel Misstrauen mit. Die Untersuchung muss mit einem einfachen Mikroskope geschehen, und das kleine Ob-

Digitized by Google

ject muss in Wasser über einer schwarzen Unterlage beobachtet werden. Den Anfang der Lymphgefässe in den Darmzotten kann man übrigens in dem früher angeführten Versuche beobachten. Spritzt man Milch in das Innere eines Darmstückes vom Schaafe ein, bis sich die Lymphgefässe, wahrscheinlich durch Zerreissung des innersten Häutchens, plötzlich füllen, so findet man hernach auch wohl die Darmzotten hier und da mit Milch gefüllt. Man muss den Versuch sehr oft anstellen, um eine zufälligerweise erfolgte Anfüllung der Darmzotten mit Milch zu erhalten, die wahrscheinlich nicht von der innern Fläche der Zotten aus, sondern rückwärts von den durch Zerreissung angefüllten Lymphgefässnetzen erfolgt. Untersucht man solche mit Milch gefüllte Zotten mit dem Mikroskope, so glaubt man in den dünnen walzenförmigen Zotten nur einen einfachen Kanal zu sehen: die breiten, platten Zotten enthalten mehrere unregelmässige anastomosirende, meistens aber von der Basis nach dem Ende der Zotte gerichtete Kanäle, welche hier blind endigen oder sich in die fingerförmigen Fortsätze der platten Zotten fortsetzen. Diese Kanäle in den platten Zotten liegen dicht an einander, wie ein sehr unregelmässiges Netzwerk; sie sind viel stärker als die blutführenden Capillargefässe zu seyn pflegen. Die Darmzotten, mögen sie nun Oeffnungen haben oder nicht, können unmöglich die einzigen Organe der Einsaugung seyn, da sie so vielen Thieren fehlen. Diese Betrachtung führte mich zur mikroskopischen Untersuchung des Häutchens, von dem die Darmzotten ausgehen, und welches allen Thieren gemein ist.

Untersucht man ein wohl ausgewaschenes Stückchen vom Dünndarme eines Säugethieres, und die Beschaffenheit des Häutchens, welches die Zotten an der Basis verbindet, mit dem einfachen Mikroskope, so erkennt man ohne viele Mühe eine wunderbare Menge von sehr kleinen Oeffnungen, die ungefähr 2 bis 3 Mal so gross als die Blutkörperchen des Frosches, und 8 bis 12 Mal so gross als die der Säugethiere sind. Diese Oeffnungen stehen bei den Säugethieren zuweilen so dicht an einander, dass die Brücken zwischen denselben kaum so dick als die Oeffnungen selbst sind. Meistens sind sie jedoch mehr zerstreut; in diesem Falle geben diese Vertiefungen dem innersten Darmhäutchen ein schwammiges, überaus zartes Ansehen. Selbst die Basis der Zotten erscheint beim Schaafe und Ochsen wie durchlöchert. Es sind die Oeffnungen der mikroskopischen Lieberkuehn'schen Drüschen. Siehe Boehm *de gland. intestinal. struct. Berol.* 1835.

Gegen den Ursprung der Lymphgefässnetze aus mikroskopisch sichtbaren Oeffnungen sprechen des trefflichen Formann Beobachtungen, welcher bei den gelungensten Quecksilberinjectionen der Lymphgefässnetze in den Darmhäuten der Fische niemals Quecksilber aus der innern Fläche des Darmkanales herauskommen sah. Dasselbe beweist die oben angeführte, Schwann gelungene Injection einzelner Darmzotten des Menschen mit Quecksilber von den Lymphgefässen der Mucosa.

Die Lymphdrüsen, welche den Vögeln fast ganz (ausser am Halse) fehlen, und bei den Amphibien und Fischen gar nicht

Digitized by Google

vorhanden sind, scheinen bei Vögeln, Amphibien und Fischen durch blosse Geflechte von Lymphgefässen ersetzt. Auch die Lymphdrüsen selbst bestehen nur aus netzförmigen Anastomosen und Verwickelungen der Lymphgefässe. Die Vasa lymphatica inferentia einer Lymphdrüse theilen sich beim Eintreten in dieselben in kleine Zweige, und aus kleinen Zweigen bilden sich wieder die Vasa efferentia derselben, welche weniger zahlreich und etwas stärker sind. Da aber beide im Innern der Lymphdrüse durch die Netze der Lymphgefässe, woraus die ganze Drüse besteht, anastomosiren, so kann man aus den ersteren die letztern durch diese Drüsen hindurch mit Quecksilber füllen. Die einfachen Lymphdrüsen sehen wie blosse Geflechte der Lymphgefässe aus, eine mit Quecksilber gefüllte stärkere Drüse hat dagegen ein scheinbar zelliges Ansehen. Indessen scheinen auch diese Zellen nur kleine Erweiterungen geschlängelter Lymphgefässe zu seyn, so wie auch die Lymphgefässnetze in anderen Theilen, wenn man nicht auf die kleinen Maschen Acht giebt, häufig zellig aussehen. Hierfür spricht auch das Fortschreiten des Quecksilbers beim Anfüllen der Drüse. Es lassen sich wohl die entgegengesetzten Ansichten von Cruikshank, der hier Zellen annimmt, mit denen von Meckel, Hewson und Mascagni, welche sie für Erweiterung der Lymphgefässschlingen halten, vereinigen. Siehe übrigens über diese Controverse E. H. Weber *Anatomie* 3. *p.* 109—113. Dass die Lymphgefässe in den Drüsen, wie in anderen Theilen, noch in ihren Wänden von Capillargefässnetzen durchzogen sind, ist unzweifelhaft; selbst die Lymphgefässe des Darmes haben nach Fohmann's Untersuchungen noch eine innere Haut bis in die Netze, und dass in den Darmzotten noch Capillargefässe zahlreich enthalten sind, ist schon erwähnt worden. Daher sind die Lymphgefässanfänge immer noch als eine sehr zusammengesetzte Bildung zu betrachten, als Theile, deren Wände blutführende Capillargefässnetze als Elemente enthalten. Die Lymphgefässe ausser den netzförmigen Anfängen sind aus zwei Häuten gebildet, einer äussern glatten und einer innern, welche Klappen bildet, die den Lauf der Lymphe gegen die Lymphgefässstämme erleichtern und umgekehrt erschweren.

Nun ist zu untersuchen, ob die Lymphgefässanfänge oder überhaupt die Lymphgefässe ausser der Verbindung des Lymphgefässstammes, Ductus thoracicus, mit dem Venensystem noch mit anderen Kanälen zusammenhängen.

Cruikshank, J. Fr. Meckel d. Aelt. und Panizza haben bei Injectionen der Ductus lactiferi der Milchdrüse und des Ductus hepaticus, auch das Quecksilber in die Lymphgefässe übergehen gesehen. Auch Walter erfüllte Lymphgefässe durch Injection der Gallenkanäle der Leber. Hieraus darf man aber nicht schliessen, dass die Lymphgefässanfänge mit den absondernden Kanälen der Drüsen in offener Verbindung stehen. Auch ich habe neulich bei Injection der Milchdrüsen des Hundes eine Injection der umherliegenden Lymphgefässe erhalten, allein diese erfolgte gerade dann, wenn die glückliche Injection der bläs-

Digitized by Google

chenförmigen Enden der Ductus lactiferi nicht gelang; wenn also Extravasat entstanden war, das hierbei in keine Theile so leicht übergeht als in die Lymphgefässe, weil die Anfänge derselben viel weiter als die Capillargefässe sind. Wenn jener offene Zusammenhang wirklich bestände, den Panizza läugnet, und der gewiss nicht stattfindet, so könnte er nur zwischen Lymphgefässen und den Stämmchen der absondernden Kanäle stattfinden; denn die netzförmigen Anfänge der Lymphgefässe sind ausserordentlich viel grösser als die blinden Anfänge der absondernden Kanälchen in den zusammengesetzten Drüsen. Der Zusammenhang von Lymphgefässen und Arterien, wovon Magendie so nebenbei spricht, ist eben so wenig statthaft. Dagegen sind die Verbindungen der Lymphgefässe mit kleinen Venen in der neuern Zeit wirklich durch Fohmann's Untersuchungen wieder Gegenstand der Controverse geworden. Bei den Vögeln gehen nach Fohmann, Lauth und Panizza die Lymphgefässe auf eine mit blossem Auge erkennbare Art in die Venen des Schenkels und Beckens über. Ich werde in der Folge nach eigenen Beobachtungen den Zusammenhang der Lymphgefässe des Schenkels beim Frosche mit der Vena ischiadica anführen. Eine ganz andere Frage ist, ob einzelne Lymphgefässe mit kleineren Venen zusammenhängen. Fohmann behauptet diess von den Lymphgefässen der Vögel, Amphibien und Fische, und hat es sogar abgebildet. Dass dieser Zusammenhang bei Menschen und Säugethieren, welche Lymphdrüsen besitzen, ausser den Lymphdrüsen nicht stattfinde, erkennt Fohmann an. Lippi's Versicherungen und Abbildungen von einem solchen Zusammenhange verdienen nach der Kritik dieser Arbeiten durch Fohmann und Panizza kein besonderes Zutrauen. Lippi *iliustrazioni fisiologiche e pathologiche del sistema linfatico-chilifero etc. Firenze* 1825. Fohmann *l. c. p.* 4. Dagegen behauptet Fohmann, dass ein solcher Zusammenhang beim Menschen und den Säugethieren in den Lymphdrüsen stattfinde, wie ihn auch J. Fr. Meckel d. Aelt., Ph. F. Meckel, bei Quecksilberinjection der Lymphgefässe beobachteten. Dieser auch von Beclard bestätigte Uebergang ist überaus leicht, und man erhält nach Injection der Vasa inferentia einer Lymphdrüse oft schon eine Anfüllung der aus den Drüsen hervorgehenden Venen viel schneller als eine Anfüllung der Vasa efferentia lymphatica der Drüse. Diess hat indess Fohmann zu einer Irrung veranlasst. Er sah bei einer Phoca bei Injection der Vasa lymphatica inferentia jener Masse von Lymphdrüsen des Gekröses, welche man hier beim Hunde und Delphin Pancreas Asellii nennt, dass nur die Venen nach Injection der Drüsenmasse, nicht aber Vasa lymphatica efferentia derselben sich füllten, und schloss daraus, dass diese Drüsenmasse keine solche besitze. Fohmann, *anat. Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Heidelb.* 1821. Rosenthal (Fror. *Not.* 2. p. 5.) hat diess berichtigt. Er fand beim Seehunde, dass alle Lymphgefässe des Dünndarmes in jene Drüse gehen, dass aber aus der Drüse ein grosses Lymphgefäss hervorgeht, Ductus Rosenthalianus, während nach Rudolphi beim Hunde und beim

Digitized by Google

Delphin aus jener Drüsenmasse eine Menge Vasa efferentia lymphatica hervorgehen. Vergl. Rudolphi *Physiologie* 2. *Bd.* 2 *Abth. p.* 241—250. Rosenthal's Abbildungen, *Nov. act. nat. cur T.* 15. *p.* 2. Rosenthal's Beobachtungen sind von Knox (*Edinb. med. surg. Journ. I. Juli* 1824. Froriep's *Notizen N.* 158.) bestätigt worden.

Indessen bleibt es ein Factum, dass die Venen sich überaus leicht aus den Lymphdrüsen füllen. Auch Schroeder van der Kolk sah diesen leichten Uebergang, ohne dass etwas in den Ductus thoracicus gelangte. Luchtmans *de absorptionis sanae et morbosae discrimine. Traject. ad Rhen.* 1829. Panizza (p. 56.) sah beim Schweine eine Lymphdrüse mit zwei Vasa inferentia, das Quecksilber in eins derselben injicirt, ging ganz in die Vene der Drüse, von dem andern Vas inferens ging dagegen das Quecksilber in das Vas efferens über. Gerber und Alb. Meckel (J. Fr. Meckel's *Archiv* 1828. *p.* 172.) sahen auch den leichten Uebergang in die Venen. Allein A. Meckel bezweifelt die Beweiskraft, wie Rudolphi und E. H. Weber, und führt als Gegengrund an, dass auch das Nebenhodengefäss bei Injection desselben in Hunden regelmässig Venenanfüllung bewirke. Wenn ich die Extravasate in Venennetze bei Injection der Drüsenkanäle von ihrem Ausführungsgange aus bedenke, Extravasation, die mir gerade dann erfolgte, wenn die vollkommene Injection der Drüsenkanälchen bis in die Acini nicht gelang, wenn ich die Extravasation aus den Ductus lactiferi in die Lymphgefässe bedenke, die auch dann erfolgt, wenn die Injection der Acini nicht gelingt, so zweifle auch ich sehr an dem wirklichen Zusammenhange der Lymphgefässe und feinen Venen in den Drüsen. Die geronnene Lymphe in den Drüsen bietet dem Quecksilber Widerstand dar; es entsteht im Innern Zerreissung, und da die Lymphgefässwände selbst von Capillargefässnetzen durchzogen sind, die mit Venennetzen in Verbindung stehen, so muss die Zerreissung eines Lymphgefässes im Innern der Drüse nothwendig mit Zerreissung der Capillargefässe und der Venennetze verbunden seyn. So dringen, wie E. H. Weber bemerkt, auch sehr leicht Flüssigkeiten aus den Zweigen der Lungenarterie in die Luftröhrenäste, ohne dass doch ein natürlicher Zusammenhang hier bestände. Aus demselben Gesichtspunkte betrachte ich den Uebergang aus einer Ordnung der Gefässe in die andere, aus Blutgefässen in absondernde Gefässe und umgekehrt in den Drüsen. Vergl. E. H. Weber *Anatomie* 3. 113—121. Wenn ich aber jemals ausser einer Drüse einen unmittelbaren Zusammenhang eines Lymphgefässes mit einer feinen Vene sähe, so würde ich dieses als augenscheinlich zugeben, ohne den unsichtbaren Zusammenhang in einer Drüse anzuerkennen. Da man indess diesen freien Zusammenhang von Lymphgefässen und feinen Venen von Menschen und Säugethieren nicht kennt, so bleibt bei Menschen und Säugethieren bloss die Verbindung des Hauptstammes der Lymphgefässe mit der Vena subclavia sinistra, und kleiner Stämmchen mit der Vena jug. int. dextra und subclavia dextra. Andere Verbindungen mit Venenstämmen scheinen hier nur Ausnahmen zu

Digitized by Google

seyn, wie ein Fall, den Hr. Prof. Wutzer und ich bei einer Leiche sahen, wo vom Ductus thoracicus ein Lymphgefäss unmittelbar in die Vena azygos überging. Siehe Wutzer in Mueller's *Archiv* 1834. Diess verdient Aufmerksamkeit, da Panizza beim Schweine regelmässige Verbindung zwischen der Vena azygos und Zweigen des Ductus thoracicus gefunden hat. Vergl. Otto *path. Anat.* 366.

b. Lymphherzen der Amphibien.

Die Lymphherzen der Amphibien sind im Jahre 1832 entdeckt worden. Es sind musculöse Säckchen, welche die Lymphe in die vorderen und hinteren Hauptstämme der Venen eintreiben. Die Amphibien haben in der Regel 4 Lymphherzen, zwei vordere und zwei hintere; beim Frosch liegt das hintere Lymphherz jeder Seite in der Regio ischiadica unter der Haut, das vordere mehr verborgen über dem Querfortsatz des dritten Wirbels. Die Organe pulsiren ganz unabhängig vom Herzen, selbst nach Ausschneidung desselben und Zerschneidung des ganzen Frosches, die Pulsationen der oberen sind nicht immer gleichzeitig mit den Pulsationen der unteren, und selbst die der paarigen Organe beider Seiten sind nicht immer gleichzeitig. Sie ziehen sich circa 60 Mal in der Minute zusammen. Die pulsirenden Organe enthalten farblose Lymphe, und man kann von ihnen aus die Lymphgefässstämme und Lymphräume der Extremitäten aufblasen. Bläst man in das untere Lymphherz, so füllen sich die Lymphgefässstämme und Lymphräume des Schenkels unter der Haut und zwischen den Muskeln, und ein oberflächlicher Lymphgang des Rückens. Einigemal füllte sich ein feinhäutiger Gang, der die Aorta abdominalis begleitete. Beim Aufblasen der oberen Lymphherzen schwellen Lymphräume der Achsel an. Die unteren Lymphherzen ergiessen die Lymphe in einen Zweig der Vena ischiadica. Die oberen Lymphherzen ergiessen die Lymphe in einen Zweig der Vena jugularis, der vorn aus dem Organe hervorgeht, und bei jeder Zusammenziehung des Organes angeschwellt wird. Diese Vene geht vorwärts, nimmt eine Vene des Hinterkopfes auf, die Vena jug. geht dann abwärts, nimmt eine Vene von der Kehle auf und mündet nun in die obere Hohlvene. Diese Organe scheinen allen Amphibien eigen zu seyn. Die unteren habe ich schon ausser dem Frosche und den Kröten, bei den Salamandern und Eidechsen gefunden, wo sie an der Wurzel des Schwanzes seitwärts hinter dem Darmbein liegen und schwieriger zu finden sind, dagegen sie beim Frosche sogleich unter der Haut gefunden werden. Die oberen Organe habe ich bis jetzt bloss in froschartigen Thieren aufgesucht. Mueller, Poggend. *Ann.* 1832. *Hft.* 8. *Philosophic. Transact.* 1833. *p.* 1. Panizza hat die unteren pulsirenden Lymphherzen auch bei den Schlangen gefunden. Siehe Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 300. Ueber den Bau derselben und über ihre Wirkung als Saugwerke siehe E. Weber in Mueller's *Archiv* 1835, *p.* 535.

Digitized by Google

III. Capitel. Von den Actionen der lymphatischen Gefässe.

Während das Blut durch die Capillargefässe oder Uebergänge der Arterien in Venen von 0,00025—0,00050 P. Zoll fliesst, gehen die Blutkörperchen, indem sie einen belebenden Einfluss auf die Organtheilchen, an denen sie vorbeigehen, ausüben, und dabei dunkelroth werden, sichtbar in die Venen über, die aufgelösten ganz flüssigen Theile des Blutes aber, nämlich das aufgelöste Eiweiss und der aufgelöste Faserstoff, können während des Durchströmens der Capillargefässe, wie alles Aufgelöste, durch die zarten Wände der Capillargefässe zum Theil wenigstens durchdringen und die Partikeln der Organtheile zwischen den Capillargefässnetzen tränken, wobei diese aufgelösten Theile des Blutes zur Ernährung und Absonderung verwandt werden müssen. Daher das von den Organen abfliessende Venenblut weniger Faserstoff (siehe p. 119.) enthält, indem derselbe im Arterienblute 0,483 proc., im Venenblute der Ziege 0,395 proc. nach meiner Beobachtung beträgt. Die aufgelosten Theile des Blutes, Eiweiss und Faserstoff, werden also in Menge die kleinsten Theilchen der Organe tränken, zu ihrer Ernährung dienen, und was überflüssig ist, wird in den überall in den Interstitien der Organtheile vorkommenden Lymphgefässnetzen sich sammeln, ohne dass ein unmittelbarer Uebergang aus den Capillargefässen in die Lymphgefässe durch Vasa serosa, die keine Blutkörperchen durchlassen, nöthig oder erwiesen wäre. Die zur Ernährung überflüssigen, rein aufgelösten Theile des Blutes werden daher durch die Lymphgefässe wieder in die Blutmasse gebracht. Natürlich muss nun die Lymphe, in Hinsicht ihrer Zusammensetzung, ganz mit dem flüssigen Theile des Blutes übereinstimmen, und das Blut selbst aus Lymphe (aufgelöster Faserstoff und Eiweiss) und rothen Körperchen bestehen. Dass die, von den Organen durch die Lymphgefässe abgeführte Lymphe grossentheils ihren Ursprung aus den die Gewebe tränkenden flüssigen Theilen des Blutes hat, und nicht ganz neu gebildet wird, wird aus der von mir gemachten, leicht zu wiederholenden Beobachtung bewiesen, dass, wenn das Blut der Frösche nicht gerinnt, jedesmal auch ihre Lymphe nicht gerinnt, und wenn ihr Blut gerinnt, jedesmal auch ihre Lymphe gerinnt. So gerinnt das Blut des Frosches oft im Sommer nicht, wenn die Frösche 8 oder mehr Tage ausser Wasser aufbewahrt werden, dagegen es frisch, ohne Ausnahme ausser den Adern ganz gerinnt. Ganz so verhält es sich jedesmal mit der Lymphe der Lymphraume des Frosches. Der eigenthümliche Zustand oder der Mangel des Faserstoffes im Froschblute zu gewissen Zeiten bestimmt also durchaus denselben Zustand des Faserstoffes oder den Mangel desselben in der Lymphe.

1) *Resorption der lymphatischen Gefässe.*

Dass die Lymphgefässe oder Saugadern wirklich auch aufsaugen, könnte man zuerst für zweifelhaft halten, wenn die

Digitized by Google

Lymphe nicht nach meinen Beobachtungen auch eigenthümliche Partikelchen führte, wenn die Resorption durch die Lymphgefässe des Darmkanales nicht eine ausgemachte Thatsache wäre, und die weisse oder mehr opalartige Farbe des Chylus sich nicht nach den Nahrungsmitteln änderte. Indessen kennt man auch einige Thatsachen von Aufsaugung von Stoffen durch andere Lymphgefässe als die des Darmkanales. Nicht allein dass die Lymphgefässe nach Einreibungen reizender Stoffe oft schmerzhaft werden, worauf röthliche Streifen im Verlaufe der Lymphgefässe zuweilen sich zeigen und die benachbarten Lymphdrüsen anschwellen. Auch in der Nähe eigenthümlicher thierischer Stoffe hat man die Lymphgefässe damit angefüllt gesehen. Ich will keinen Werth auf Mascagni's in dieser Rücksicht etwas abenteuerliche Behauptungen legen, dass man bei Thieren, die in Folge von Pulmonal- oder Abdominal-Haemorrhagien gestorben, die Lymphgefässe der Pleura und des Peritoneums mit Blut gefüllt gesehen. Assalini, Saunders, Mascagni und Soemmerring beobachteten Galle in den von der Leber kommenden Lymphgefässen bei Verstopfung der Gallengänge. Weber *Anat.* 3. *p.* 123. Tiedemann und Gmelin fanden nach Unterbindung des Ductus choledochus bei Hunden die Lymphgefässe der Leber mit hochgelber Flüssigkeit gefüllt, die Lymphdrüsen, zu welchen sich jene begeben, gelb, und Bestandtheile der Galle selbst in der gelb gefärbten Flüssigkeit des Ductus thoracicus. *Die Verdauung nach Versuchen.* 2. 40. In der Nähe von Knochengeschwülsten fand man in den Lymphgefässen Kalkerde. Otto *pathol. Anat.* 1. 372.

Magendie, welcher die Resorption der lymphatischen Gefässe bezweifelt, erzählt einen von Dupuytren beobachteten Fall. Eine Frau, welche eine ungeheure fluctuirende Geschwulst an der innern Seite des Schenkels hatte, starb. Einige Tage vor ihrem Tode hatte sich eine Entzündung des Unterhautzellengewebes an dem Schenkel eingestellt. Bei der Section der Haut, welche die Geschwulst bekleidete, sah Dupuytren sich weisse Punkte auf den Lippen des Einschnittes bilden, und es zeigten sich weisse Linien in dem Unterhautzellengewebe, die man für mit Eiter gefüllte Lymphgefässe erkannte. Die Schenkeldrüsen waren mit derselben Materie angefüllt, wovon die Lendenlymphdrüsen und der Ductus thoracicus keine Spur zeigten. Magendie citirt auch einen anderen Fall aus dem Hôtel Dieu, wo sich in Folge einer complicirten Fractur ein grosser Abscess gebildet hatte, und Eiter sich in den Venen und Lymphgefässen zeigte, die von dem kranken Theile her kamen. *Précis de physiol.* 2. 218. Dagegen sah Andral bei häufigen Untersuchungen der Lymphgefasse in der Umgegend der Eiterheerde keine mit Eiter gefüllt. Meck. *Arch.* 8. 227. Da der Eiter Kügelchen enthält (grösser als die Blutkörperchen, zum Theil noch einmal so gross nach Weber), so tritt hier dieselbe Frage ein, wie in Hinsicht der Resorption der Kügelchen des Chylus, welche ihrem Durchmesser entsprechende Oeffnungen in den Lymphgefässnetzen voraussetzen. Indessen die Lymphgefässe, die im Parenchym der Theile wurzeln, kön-

Digitized by Google

nen nicht einmal solche Oeffnungen haben, da sich ihnen keine freie Oberflächen darbieten. Die aufgelösten Theile des Eiters können leicht von den Lymphgefässnetzen aufgesogen werden, aber die Erscheinung des körnigen Eiters in den Lymphgefässen scheint mir nichts mit der Aufsaugung zu thun zu haben; durch Entzündung der Lymphgefässe kann sich Eiter in ihnen bilden, auch nach Zerstörungen kann der Eiter ganz mechanisch diese Gefässe infiltriren. Wenn sich Eiter im Blute vorfindet, z. B. in den Venen, so ist er in der Regel in den Venen durch Venenentzündung gebildet, und dann nicht aufgesogen, oder bei der Zerstörung von Capillargefässen eines Theiles durch Eiterung ist der Eiter mechanisch in die zerstörten kleinen Venen eingedrungen. So z. B. kann Eiter aus verschlossenen Abscessen an einem Amputationsstumpf in Blutgefässe gelangen, ohne aufgesogen zu werden, oder bei der Entzündung der bei der Amputation durchschnittenen Gefässstämme kann sich im Innern der Gefässe Eiter bilden. Wirklicher Eiter in den Venen verursacht dann als zersetzte Materie wieder Ablagerung und Entzündung, und dadurch die Entstehung neuer Abscesse in anderen Theilen, wie man diess nach grossen Eiterungen und bei eiternden Amputationswunden nicht selten sieht, auf welche z. B. oft zerstreute Abscesse der Leber und Lungen, der Muskeln oder irgend eines andern Theiles folgen. Dieser Eiter ist nicht aufgesogen, das wäre schwer sich zu denken. Siehe die trefflichen Bemerkungen von Cruveilhier in *anat. pathol.* bei dem Artikel *Venenentzündung.* Die Folgen von Eiter im Blute sind secundäre Entzündungen und wieder Abscesse, aber keine eiterigen Absonderungen, z. B. in den Nieren. Dass körniger Eiter, in der Blutmasse enthalten, in den Nieren abgesondert werde, halte ich für unmöglich. Nur die näheren Bestandtheile des Eiters können hierbei abgesondert werden; Eiterkügelchen im Blute können nicht aus dem Blute abgesondert werden, da die Capillargefässe keine Art von Kügelchen durchlassen können. Wird wirklich in Folge einer Eiterung eines Theiles plötzlich auch Eiter von den Nieren abgesondert, so musste Eiter in das Blut eingedrungen seyn, und Entzündung und Abscesse in den Nieren bewirkt haben. Was man mehrentheils für metastatischen Eiterharn hält, ist ein nicht untersuchtes Sediment im Harne.

Hunter hatte behauptet, dass gefärbtes Wasser in die Darmhöhle eines Thieres eingespritzt, sich in kurzer Zeit in den Lymphgefässen wieder zeige. Diess hat Flandrin bei Pferden nicht gefunden. Magendie und Dupuytren haben, wie der Erstere versichert, diese Versuche mehr als 150 Mal wiederholt, und niemals die aufgesogenen Substanzen in den Lymphgefässen gefunden. Dagegen haben Mayer und Schroeder v. d. Kolk die zwar langsame, aber doch offenbare Resorption von fremdartigen Stoffen im Darmkanal beobachtet. Die Akademie von Philadelphia sah blaus. Kali (aber nicht vegetabilische Färbestoffe), Lawrence und Coates blaus. Kali aufgesogen; Hallé und Andere fanden nach Eingeben von Färbestoffen in dem Ductus thoracicus diese nicht wieder, während sie ins Blut und den

Digitized by Google

Kreislauf übergegangen waren. Vergl. Tiedemann und Gmelin *Versuche über die Wege, auf welchen Stoffe vom Magen und Darmkanal ins Blut gelangen. Heidelberg* 1820.

Die meisten Beobachtungen lehren, dass man zwar Resorption fremder aufgelöster Stoffe, aber nur der Salze durch die Lymphgefässe bemerkt hat. Ich habe pag. 240. Tiedemann's und Gmelin's zahlreiche Erfahrungen angeführt, aus welchen hervorgeht, dass Färbestoffe im Darm nicht von den Lymphgefässen aufgenommen werden, obgleich diese Stoffe im Urin und im Blut erkannt wurden. Nur Salze fanden sie einigemal in den Chylus übergegangen, so unter zahlreichen Versuchen nur ein Mal etwas Eisen bei einem Pferde, das schwefelsaures Eisen bekommen, und einmal blausaures Kali im Chylus eines Hundes und schwefelblausaures Kali im Chylus eines Hundes. Hierzu kann ich eine eigene Beobachtung vom Frosch hinzufügen. Ich steckte einen Frosch mit den Beinen bis nahe an den After in ein Gefäss mit blausaurer Kalilösung, und liess ihn darin 2 Stunden eingezwängt. Darauf wusch ich ihn sorgfältig, trocknete die Beine ab, und untersuchte die Lymphe unter der Haut durch Eisenoxydsalz, ob blausaures Kali durch die Lymphgefässe absorbirt worden; die Lymphe wurde sogleich ganz hellblau, das Serum des Blutes reagirte kaum deutlich auf blausaures Kali. In einem zweiten Versuch, wo ich den Frosch 1 Stunde in der Lösung liess, reagirte die Lymphe nicht.

Fasst man alle Thatsachen zusammen, so geht daraus hervor, dass die Lymphgefässe zwar resorbiren, dass sie in der Regel nur Flüssigkeiten eigenthümlicher Art hierbei aufsaugen, gegen welche sie wahrscheinlich eine Affinität haben, dass fremdartige Stoffe schwer und nur ausnahmsweise in die Lymphgefässe eindringen, wie Salzlösungen, während die meisten Färbestoffe in der Regel gar nicht einmal in die Lymphgefässe eindringen. Das gewöhnliche Resorptionsprodukt der Lymphgefässe ist der bei der Circulation aus den Capillargefässen in die Partikeln der Organe eindringende Liquor sanguinis. Indessen gehen doch auch kleine Molecule aus dem Parenchyma der Theile in die Lymphgefässe über, wie die eigenthümlichen Kügelchen der Lymphe, so wie die Lymphgefässe des Darms nicht allein Aufgelöstes aus den Nahrungsstoffen, sondern selbst die Chyluskügelchen aufzusaugen scheinen. Man sieht, dass die organische Resorption der Lymphgefässe weit von der Imbibition der Capillargefässe mit allen aufgelösten fremdartigen Stoffen verschieden ist; sie unterscheidet sich auch von der Resorption der Wurzelfasern der Pflanzen, welche alles Aufgelöste einsaugen. Tiedemann *Physiol.* 1. 223.

Aus der Vergleichung des Chylus der Lymphgefässe und des Speisebreies des Darmkanals ergiebt sich sogleich schon, dass die Lymphgefässe nicht allein resorbiren, sondern auch das Resorbirte umwandeln; denn nur wenn der Nahrungsstoff in den Lymphgefässen enthalten ist, erhält er die Eigenschaft von selbst, zum Theil zu gerinnen, und je weiter er in den Lymphgefässen fortschreitet, nimmt diese Eigenschaft zu. Vielleicht verwandeln auch die Lymphgefässe des übrigen Körpers Eiweiss in gerinnbare Ma-

Digitized by Google

terie. Man sieht jedenfalls ein, dass hierin die organische Resorption der Lymphgefässe durchaus von der Imbibition und dem unmittelbaren Uebergange der aufgelösten Stoffe in das Blut verschieden ist. Es ist wahrscheinlich, wie E. H. Weber zu zeigen gesucht hat, dass die Lymphgefässe auch bei der Resorption fremdartiger Stoffe eine Umwandlung derselben bestreben. So hat Emmert beobachtet, das man nach Unterbindung der Aorta abdominalis durch das Gift der Angustura virosa, welches in eine Wunde des Fusses gebracht wurde, Thiere nicht vergiften konnte, und dass nach dieser Unterbindung auch Blausäure, auf dieselbe Weise applicirt, keinen Erfolg hatte. Da nun diese Gifte durch Imbibition auch in die Lymphgefässe gelangen können, und durch sie, obgleich langsamer als durch die Blutgefässe verbreitet werden, so muss man zur Erklärung dieser Beobachtungen annehmen, dass die Lymphgefässe auch bei der Resorption fremdartiger Stoffe dieselben umwandeln.

Ich gestehe, das mir der Act der Resorption in anderen Theilen sowohl, als im Darm völlig räthselhaft ist. Die Capillarität, mit welcher man zur Erklärung thierischer Vorgänge so freigebig ist, erklärt nur die Anfüllung von Capillarröhren, wenn diese leer sind, oder wenn sie abwechselnd leer werden; sie erklärt aber nicht das Aufsteigen der Säfte. Als ich die Lymphgefässe des Gekröses durch Ausdehnung der Darmwände mit injicirter Milch gefüllt sah, glaubte ich augenblicklich, mir die Resorption im Darmkanal erklären zu können. Von dieser Idee kam ich aber sogleich zurück, als ich bedachte, wie gering die Zusammenziehungen der Gedärme sind, welche man bei unmittelbarer Oeffnung des Bauches findet, und dass die dünnen Gedärme meistens collabirt erscheinen. Noch mehr kam ich von dieser Ansicht zurück, als ich einsah, dass meistens, und vielleicht immer, diesen Injectionen eine Zerreissung des innersten Darmhäutchens vorausgeht. Bei der Resorption muss irgend eine Anziehung stattfinden. Sind einmal die Lymphgefässe bis über die Muskelhaut gefüllt, so muss auch die schwächste Contraction des Darms den Chylus weiter treiben, indem die zwischen den Fasern der Muskelhaut verlaufenden Lymphgefässe comprimirt werden. Jede Compression der Lymphgefässe bewirkt aber eine Bewegung des Chylus nach der Cisterna chyli, wegen des Baues der Klappen in den Lymphgefässen. Die einmal entleerten Lymphgefässnetze müssen sich, wenn die Zusammenziehung eines Darmstücks nachlässt, wegen Entstehung leerer Räume füllen. Alles diess kann aber nicht einmal in anderen nicht contrahirbaren Theilen stattfinden; und bei den Fischen fehlen die Klappen der Lymphgefässe. Es ist daher wahrscheinlich, dass hierbei noch eine andere Art von Anziehung stattfindet; und es bleibt nicht zweifelhaft, dass diese keine physikalische, z. B. Capillarität, sondern eine noch unbekannte organische Anziehung ist. An den Zotten selbst habe ich durchaus keine Bewegungen gesehen, als ich bei einem lebenden Kaninchen den Darm aufschnitt und die innere Fläche desselben in warmem Wasser beobachtete. Auch habe ich nie, weder an den Lymphgefässen des Gekröses, noch an der Cisterna chyli, noch am Ductus

Digitized by Google

thoracicus, irgend eine Spur von Bewegung gesehen; auch als ich auf den Ductus thoracicus einer möglichst schnell lebendig geöffneten Ziege eine starke galvanische Säule wirken liess, sah ich keine Zusammenziehung, est nach einiger Zeit schien der Gang an dieser Stelle etwas enger, und zeigte mehrere ganz unbedeutende Einschnürungen.

Da die Resorption der lymphatischen Gefässe bei den Thieren in so grosses Dunkel gehüllt ist, so scheint es mir zweckmässig, die Gesetze dieses Processes bei den Pflanzen zu untersuchen. In keinem Punkte gleichen sich vielleicht die Pflanzen und Thiere so sehr, als in dem Aufsteigen der Säfte von den Resorptionsflächen in den lymphatischen Gefässen bei den Thieren, und dem Aufsteigen der Säfte in den Gefässen der Pflanzen.

Dutrochet hat bewiesen; dass die Organe, welche das Frühlingsaufsteigen der Säfte in den Pflanzen bewirken, die Endtheile der Wurzeln sind, und dass die ganze Kraft, mit welcher der Saft emporgetrieben wird, a tergo von der Wurzel aus wirkt. Dutrochet schnitt an einer Weinrebe von 2 Meter Länge das Ende ab, und überzeugte sich, dass die verkürzten Stengel den Saft fort und fort ununterbrochen ergossen. Die Ursache des Aufsteigens ist also keine Attraction von dem obern Theil der Pflanze auf die Säfte im untern Theil des Stengels. Darauf schnitt er die Rebe über der Erde ab, während er das obere Ende des abzuschneidenden Stücks beobachtete. Im Moment des Durchschnittes hörte das Ausfliessen aus dem obern Ende der abgeschnittenen Rebe auf. Die Ursache des Aufsteigens liegt also auch nicht im Stengel. In der That ergoss das Stück des Stengels, das noch mit den Wurzeln in Verbindung stand, ununterbrochen noch immer Saft; Dutrochet entfernte darauf die Erde um die Wurzeln, und durchschnitt diese. Die untern Stücke der Wurzeln ergossen noch immer Saft, und so schritt er mit dem Abschneiden nach abwärts fort, wobei er immer fand, dass die unteren Theile noch immer Saft ergossen, bis er an die Wurzelenden selbst gelangte, die daher, indem sie der Sitz der beständigen Resorption sind, zugleich durch die beständige Aufnahme der Säfte das Aufsteigen der schon resorbirten Säfte bedingen. Dutrochet setzte eine der Radicellen, die mit einem weisslichen Conus enden, mit dem Ende in Wasser, und beobachtete mit der Loupe, dass der Durchschnitt sich mit Wasser bedeckte, das durch das Centralsystem austrat. Dutrochet *l'agent immédiat du mouvement vital. Paris* 1826. 90. Die Aufsaugung der Stoffe vermöge der Wurzeln durch die blossen Wurzelspitzen haben schon De la Baisse und Hales gezeigt. Hales tauchte die Spitze einer Baumwurzel in Wasser, womit eine Glasröhre gefüllt war, und fand, dass die Wurzel in 6 Minuten eine merkliche Menge von dem Wasser eingesogen hatte. Agardh *allgemeine Biologie der Pflanzen. Greifswald* 1832. *p.* 9.

Diese Wurzelenden sind die Organe, welche de Candolle Spongiola nennt. Agardh bemerkt, dass die Wurzelspitze dem übrigen Theile der Wurzel sonst nicht ungleich organisirt ist, als dass die Zellen klein und dadurch gehäuft sind, obgleich diesel-

Digitized by Google

ben Zellen, welche in diesem Augenblick klein und gehäuft sind, und dadurch einsaugen, nach einiger Zeit ausgewachsen sind, und nicht einsaugen, indem sie diese Function neu entstandenen Zellen überlassen, welche später und unterhalb ihrer gebildet werden. Die Spongiola oder Papilla saugt übrigens nur Wasser und in diesem aufgelöste Stoffe ein.

Agardh erklärt das Aufsteigen der Säfte aus einer polarischen Thätigkeit der Wurzeln und der Blätter, indem die ersteren Säfte anziehen, die letzteren Stoffe aushauchen, und hält diesen Act für etwas weiter Unerklärliches, gleichwie die polarische Action des Magnetes. Diese Erklärung lässt sich jedenfalls nicht auf die Thiere anwenden, wenn ich mich jener Sprache bedienen soll, da hier nur das eine Moment in den Anfängen der Lymphgefässe existirt, anderseits die Lymphe aber in das Blut übergeht. Dagegen ist es von grossem Interesse für uns, zu wissen, dass, wie De la Baisse, Hales und Dutrochet zeigten, das Aufsteigen der Säfte in den Pflanzen allein schon durch die Thätigkeit der Wurzel und der Spongiola, nämlich durch ihre beständige Resorption geschehen kann.

Obgleich die Darmzotten keine zur Aufsaugung durch Lymphgefässe nöthigen Organe sind, vielmehr die lymphatische Resorption durch die netzartigen Lymphgefässanfänge in den meisten Theilen ohne Zotten, ja bei vielen Thieren selbst im Darm ohne Zotten geschieht, so kann man doch die Zotte mit der Spongiola der Wurzeln vergleichen; nur muss man bedenken, dass auch in den Zotten die Anfänge der Lymphgefässe nicht anders gebildet sind, als in den zottenlosen Theilen.

Dutrochet erklärte die Resorption bei Pflanzen und Thieren durch die Endosmose. Es ist jedoch nicht schwer einzusehen, dass die Erscheinungen der Endosmose durch todte thierische Membranen durchaus nicht hinreichen, die Aufsaugung in beiden Reichen zu erklären. Denkt man sich die Lymphgefässe des Darms und Gekröses, z. B. mit Säften gefüllt, und die Darmzotten oder Lymphgefässnetze mit Chymus in Berührung, so würden die aufgelösten Theile des Chymus nach den Gesetzen der Endosmose in die Lymphgefässe eindringen, und die aufgelösten Theile des Saftes in den Lymphgefässen dagegen heraus dringen, und sich mit dem Chymus mischen; ist der Chymus flüssiger als der Chylus, und enthält er dünnere Lösungen, so wird mehr Chymus in die Lymphgefässe eindringen, als Chylus herausdringen. Enthält dagegen der Chymus dichtere Lösungen, so wird mehr Chylus aus den Lymphgefässen heraus dringen, als Chymus herein dringt. Von einem solchen Spiel können die wunderbaren Wirkungen der Aufsaugung nicht abgeleitet werden. Nur wenn der in den Lymphgefässnetzen einmal enthaltene Chylus eine durch den Lebensprocess selbst entstandene chemische Verwandtschaft zu dem Chymus des Darmkanals äusserte, und diesen anziehen könnte, ohne dass er selbst von dem Chymus angezogen würde, könnte man die Resorprion auf eine den Gesetzen der Endosmose analoge Art erklären. Aber diese Verwandschaft, diese Anziehung würde eine

Digitized by Google

lebendige seyn, indem im todten Zustand eine solche Anziehung nicht existirt.

Wollte man die Aufsaugung durch Anziehung der Flüssigkeit von der aussern Fläche der Lymphgefässe und durch Abstossung von der innern nach den Lymphgefässen erklären, so giebt es weder Thatsachen, diess zu beweisen, noch es zu widerlegen.

Mechanische Apparate zur Aufsaugung des Chylus sind wahrscheinlich in den Anfängen der Lymphgefässe nicht vorhanden, da die Aufsaugung in den Pflanzen ohne dieselben geschieht. Hier wirkt eine noch ungekannte Anziehung, wovon bei der Absonderung gleichsam das Gegentheil stattfindet, indem die verwandelten Flüssigkeiten nur nach der freien Seite der absondernden Flächen abgestossen werden, und durch immer neue Absonderung in den Ausführungsgängen weiter rücken. In vielen Theilen kommen auf derselben Fläche Aufsaugung durch die Lymphgefässe, und zugleich Absonderungen durch absondernde Organe vor, wie auf den Schleimhäuten.

Da die Resorptionskraft der Lymphgefässe eine organische Eigenthümlichkeit derselben ist, so muss dieselbe auch unter gewissen Einflüssen, welche in die Organisation eingreifen, erhöht und vermindert werden. So scheint sie in der Entzündung vermindert, wie Autenrieth bemerkt, weil sich in diesem Fall oft eine dauernde ödematöse Geschwulst im Umfange des entzündeten Theils bildet. *Physiologie* 2. 224. Wie die Mittel, welche in dem Rufe stehen, die Resorption anzuregen, diess thun, ist noch zweifelhaft; es lässt sich deren Wirkung nur in einigen Fällen einsehen. Es giebt Stoffe, welche im Stande sind, die zwischen den Elementartheilen der Gewebe angehäuften überflüssigen Materien zu erweichen und aufzulösen, resolventia. Wie diess möglich ist, scheinen die organischen Flüssigkeiten schon zu zeigen, in welchen häufig der eine Stoff das Menstruum des andern ist, so dass z. B. Thierstoffe durch organische Bindung mit mineralischen Stoffen, z. B. mit Alkali, wie im Blutwasser, oder auch mit anderen organischen Stoffen in einem Zustande vollkommener Auflösung sind. So ist das Pikromel das Auflösungsmittel des zweiten Gallenbestandtheils, des Gallenstoffes. Die Anwendung der Resolventien in der Arzneikunde ist aber sehr beschränkt, weil viele Stoffe, die ausser dem Körper thierische Stoffe aufzulösen im Stande sind, auf lebende thierische Theile zerstörend wirken. Dass die Lymphgefässe nach dem Tode noch aufsaugen sollen, halte ich für ganz unerwiesen. Vergl. E. H. Weber *Anatomie* 3. 101.

2. *Veränderung der lymphatischen Flüssigkeiten durch die Lymphgefässe.*

Die von Capillargefässnetzen durchzogenen Wände der Lymphgefässe scheinen die Mischung des Chylus und der Lymphe zu verändern. Auf dieselbe Art wirken die Lymphdrüsen, welche nur als Apparate dienen, die Oberfläche der Einwirkung zu vergrössern, da sie bei den niederen Wirbelthieren durch blosse Plexus ersetzt werden, und in der That weiter ausgebildete Plexus sind. Der Chylus der Lymphgefässe des Gekröses ist nach Tie-

Digitized by Google

DEMANN und GMELIN nicht gerinnbar, bis er die Lymphdrüsen durchgegangen ist. Die Lymphgefässe und Lymphdrüsen scheinen also durch die Einwirkung ihrer Wände das Eiweiss des Chylus zum Theil in Faserstoff umzuwandeln. In manchen Krankheiten ist diese Wirkung der Lymphgefässe auf die Mischung ihres Inhaltes verändert, oder sie leiden von der Einwirkung fehlerhaft gebildeter Säfte, wie in der Scrophelsucht.

Die Lymphgefässe haben eine eigenthümliche Empfindlichkeit gegen fremdartige Materien, sie werden durch die Resorption derselben schmerzhaft, zuweilen entzündet und angeschwollen, und lassen sich dann als rothe Streifen durch die Haut erkennen. Unter denselben Umständen schwellen die dem Resorptionspunkte nahe gelegenen Lymphdrüsen an, und werden auch schmerzhaft. In der Regel verschwindet die Anschwellung, wenn keine neue Materie mehr aufgesogen wird, zuweilen gehen die Drüsen in Entzündung und Eiterung über. So schwellen die Lymphdrüsen der Nähe nach Inoculation eines thierischen Giftes unter die Epidermis an, so nach der Application eines Blasenpflasters, nach dem Schlangenbiss, nach einem Schnitt oder Stich bei der Section eines fauligen Cadavers, nach der Inunction von Brechweinsteinsalbe, von Quecksilber in der Nähe eines Blutschwäres, eines entzündeten Theiles, indem sich Eiter bildet; so schwellen die Inguinaldrüsen an beim venerischen Harnröhren-Schleimflusse, und auch ohne diesen nach venerischer Infection der Genitalien. In dem Verhältniss, wie die oberflächlichen Drüsen zur Haut, scheinen die Mesenterialdrüsen zum Darm zu stehen, welche selbst bei der Entzündung und Verschwärung des Darms (im Typhus abdominalis) sich auch entzünden.

3. *Bewegung der Lymphe.*

MAGENDIE erhielt bei einem gefütterten Hunde von mittlerer Grösse aus dem angeschnittenen Ductus thoracicus alle 5 Minuten ungefähr $\frac{1}{2}$ Unze Chylus. Die Ursachen seiner Bewegung sind unbekannt. Man weiss nicht, ob die Lymphgefässe und der Ductus thoracicus Lymphe und Chylus durch unmerkliche fortschreitende Zusammenziehungen forttreiben. TIEDEMANN und GMELIN sahen durch mechanische und chemische Reizmittel keine Zusammenziehungen an dem Ductus thoracicus entstehen, was früher SCHREGER (*de irritab. vas. lymph. Lips.* 1789.) gesehen haben wollte (ich sah diese Zusammenziehung nicht, als ich bei einer Ziege die galvanische Säule auf den Ductus thoracicus einwirken liess, und sah erst nach einiger Zeit einige ganz unbedeutende Einschnürungen). Doch beobachteten sie, dass der angestochene Brustgang seinen Inhalt in einem Strahle ausleert. Daher sie annehmen, dass die Lymphgefässe, ohne rhythmische Contraction zu besitzen, doch ihren Inhalt weiter fördern. Die Klappen müssten eine solche Bewegung, wenn sie wirklich existirt, erleichtern. Durch die Richtung derselben muss Lymphe und Chylus bei einigem äusseren Druck auf die Lymphgefässe durch die Muskeln ohnehin von selbst weiter rücken. Bei mikroskopischer Untersuchung der Lymphgefässe im Mesenterium von Ka-

Digitized by Google

ninchen, sahen Schwann und ich weder eine Bewegung der Wände der Lymphgefässe, noch eine Bewegung der Klappen, noch eine Spur von Wimpern im Innern der Gefässe. Die Bewegung der Lymphe selbst ist kürzlich von E. H. Weber bei Froschlarven im Schwanze beobachtet worden, wo die Lymphgefässe die Blutgefässe so umgaben, dass die Lymphkörnchen langsam an den Seiten der rasch strömenden Blutkörnchen zu fliessen scheinen, ohne dass man die vorhandene Zwischenwand wahrnehmen kann. Die Bewegung der Lymphkörnchen ist sehr ungleichförmig, bald mehr, bald weniger langsam. Zuweilen setzt sie aus. E. H. Weber in Muell. *Arch.* 1837. 267. Die Saugkraft des Herzens ist keinesfalls die erste Ursache der Bewegung der Lymphe; denn nach Autenrieth (*Physiol.* 2. 115.), Tiedemann und Carus (Meck. *Arch.* 4. 420.) wird der Ductus thoracicus auch unterhalb einer Ligatur von der vordringenden Lymphe bis zum Zerplatzen ausgedehnt.

Die Bewegung der Lymphe und des Chylus in den lymphatischen Gefässen hängt daher höchst wahrscheinlich grösstentheils von der fortdauernden Resorption in den Lymphgefässnetzen ab, gerade so wie das Aufsteigen der Frühlingssäfte in den Pflanzen nur von der beständigen Resorption in den Wurzeln abhängt.

Die von mir entdeckten Lymphherzen in der Classe der Amphibien müssen die Bewegung der Lymphe in hohem Grade fördern, sie bewirken den unmittelbaren Erguss der Lymphe der untern Theile des Körpers in die Vena ischiadica, der obern in einen Ast der Vena jugularis. Bei den Säugethieren und beim Menschen gelangen Chylus und Lymphe allein in die Schlüsselbeinvenen und namentlich der Chylus und grösste Theil der Lymphe durch den Ductus thoracicus in die Vena subclavia sinistra zum Venenblut, und sind in dem Blut der Vena cava sup. oft noch spurweise zu erkennen. Im Blut selbst werden sie während der Circulation auf die pag. 154. dargestellte Art zu vollkommenem Blut umgebildet. An dem Ductus thoracicus und an der Cisterna chyli, an den Lymphgefässen der Säugethiere überhaupt, und ausser den Lymphherzen an den Lymphgefässen der Amphibien habe ich nie eine Spur von Bewegung bemerken können.

Die Schnelligkeit der Lymphbewegung ist nach E. H. Weber's Beobachtungen an Froschlarven ohngefähr $10 = 20$ Mal langsamer als die des Blutes. Man kann sich auch eine ungefähre Vorstellung von der Art der Bewegung machen aus der ziemlich kurzen Zeit, in welcher die mit Chylus gefüllten Lymphgefässe des Mesenteriums bei eröffneten Thieren unscheinbar werden und aus der Menge der aus dem Ductus thoracicus ausfliessenden Flüssigkeit. In Magendie's Versuch bei einem Hunde mittlerer Grösse floss in 5 Min. $\frac{1}{2}$ Unze Chylus aus dem angeschnittenen Ductus thorac., in dem Versuch von Collard de Martigny 9 Gran Lymphe in 10 Min. aus dem Ductus thorac. eines seit 24 Stunden hungernden Kaninchens. Nachdem Collard

Digitized by Google

die Lymphe in dem Lymphgefässstämmchen des Halses eines Hundes durch Compression fortgeschafft hatte, füllte es sich von neuem in 7 Min. und in einem zweiten Versuch in 8 Min. *Journ. d. physiol. T.* 8. Bei der oben angeführten Beobachtung von der Lymphe des Menschen füllten sich die Lymphgefässe des Fussrückens und der grossen Zehe innerhalb einer $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Stunde so, dass man in einem Uhrglase ziemlich viel sammeln konnte. Bei den Fröschen ist die Menge der Lymphe ausserordentlich gross, bei ihren ansehnlichen Lymphräumen. Nimmt man die Capacität eines jeden ihrer 4 Lymphherzen zu 1 Cub. Linie an (die vorderen sind kleiner, die hinteren grösser), so treiben die 4 Lymphherzen in einer Minute 60 Mal 4 = 240 Cubiklinien Lymphe in die Venen, wenn die Lymphherzen sich ganz entleeren. Allein sie entleeren nur einen Theil ihres Inhalts bei jeder Zusammenziehung.

Digitized by Google

Digitized by Google

Der

speciellen Physiologie

Zweites Buch.

Von den organisch-chemischen Veränderungen in den Säften und den organisirten Theilen.

Digitized by Google

I. Abschnitt. Vom Athmen.

I. Von dem Athmen im Allgemeinen.
II. Organologie der Athemwerkzeuge.
III. Von dem Athmen des Menschen und der Thiere.
IV. Von den Veränderungen des Bluts durch das Athmen.
V. Von dem chemischen Process des Athmens.
VI. Von den Athembewegungen und Athemnerven.

II. Abschnitt. Von der Ernährung, vom Wachsthum und von der Wiedererzeugung.

I. Von der Ernährung.
II. Von dem Wachsthum.
III. Von der Wiedererzeugung.

III. Abschnitt. Von der Absonderung.

I. Von den Absonderungen im Allgemeinen.
II. Von dem innern Bau der Drüsen.
III. Von dem Secretionsprocess.

IV. Abschnitt. Von der Verdauung, Chylification und Ausscheidung der zersetzten Stoffe.

I. Von der Verdauung im Allgemeinen.
II. Von den Verdauungsorganen.
III. Von den Bewegungen des Darmkanals.
IV. Von den Verdauungssäften.
V. Von den Veränderungen der Speisen im Darmkanal.
VI. Von der Chylification.
VII. Von der Function der Milz, der Nebennieren, der Schilddrüse und der Thymusdrüse.
VIII. Von der Ausscheidung der zersetzten Stoffe.

Digitized by Google

Der speciellen Physiologie

Zweites Buch.

Von den organisch-chemischen Veränderungen in den organischen Säften und den organisirten Theilen.

Wenn die Elemente, welche ausser dem Organismus sich durch ihre eigene Affinität binär verbinden, im Organismus durch eine der binären Verbindung widerstrebende Kraft zu ternären oder quaternären Verbindungen vereinigt werden, so ist es gewiss, dass diese Affinität von einer eigenthümlichen, in der unorganischen Natur nicht erkennbaren Kraft oder der Mitwirkung einer unbekannten imponderabeln Materie bedingt wird, von demselben Princip wahrscheinlich, welches die zweckmässige Erzeugung und Erhaltung aller Organe des Ganzen einleitet. Es wäre eine ganz unerwiesene Hypothese, wenn man der Electricität die Aufgabe ertheilen wollte, alle organischen Verbindungen zu erzeugen. Ehe die Eigenschaften jener Kraft bekannt sind, kann man sie als eine zwar gewisse, aber nicht näher zu bezeichnende Grösse, als Lebensprincip oder *organisirende Kraft* anerkennen. Das Gesetz, nach welchem die von diesem Princip belebten Theile auf andere Stoffe wirken, ist das der Assimilation. Wir haben nun das Eigenthümliche derselben auseinander zu setzen.

Man kann die im Organismus erfolgenden Umwandlungen der Stoffe in rein chemische und organisch-chemische eintheilen.

Rein chemische Umwandlungen erfolgen nach den Gesetzen der Wahlverwandtschaft der Stoffe, wie sie sich bei den binären Verbindungen äussern, in dem Maass, als die organisirende Kraft an Einfluss auf die Gebilde verliert, oder unfähig wird, der Gewalt der chemischen Affinität zu binären Verbindungen das Gleichgewicht zu halten.

Concentrirte Säuren und Alkalien binden sich mit den Stoffen der lebenden Thierkörper, und erzeugen neue Körper mit Zersetzung der thierischen Materie. Im verdünnten Zustand dienen

Digitized by Google

die Salzsäure und Essigsäure im Magensafte selbst zum Theil zur Auflösung der Speisen. Die Metallsalze verbinden sich grösstentheils leicht mit thierischen Stoffen und selbst nach verschiedenen Verhältnissen. Siehe Mitscherlich in Muell. *Arch.* 1836. 1837. Solche rein chemische Verhältnisse finden häufig selbst in der Therapie ihre Anwendung. Die Eigenschaft des Eiweisses, den aufgelösten Sublimat niederzuschlagen und sich mit ihm zu einem unlöslichen Stoff zu verbinden, veranlasste Orfila zu der glücklichen Idee, das Albumen als Gegengift zu versuchen. Huenefeld *physiol. Chemie.* 1. 65. 89. Ein Gegengift muss, wie Huenefeld bemerkt, eine starke chemische Affinität zu dem Gift, aber geringe chemische Affinität zum thierischen Körper haben, damit es fähig sey, das Gift bis in das Innere des Körpers auf unschädliche Art zu verfolgen. Der Schwefel neutralisirt den Arsenik und macht ihn, indem er eine unlösliche Verbindung verursacht, weniger schädlich. Aus diesem Grunde sind auch beim Gebrauche von Quecksilbermitteln gegen Syphilis solche Präparate, welche Schwefel enthalten, unwirksam. Huenefeld *l. c.* 1. 66. Schwefelsaure auflösliche Salze sind Gegenmittel gegen Baryt und Bleisalzvergiftung, weil Baryt und Bleioxyd mit Schwefelsäure sich zu unlöslichen Verbindungen vereinigen. *Ebend.* 67. Magnesia stumpft die Magensäure ab. Kohlensaure Alkalien werden mit Erfolg gegen harnsaure Sedimente und Steinbildung im Harn gegeben, weil die Harnsäure dabei aufgelöst und der Harn alkalisch wird. Aus demselben Grunde wirken pflanzensaure Alkalien vortheilhaft, weil sie im thierischen Körper in kohlensaure Alkalien umgewandelt werden oder als solche in den Harn übergehen. In den Geschwüren des Hospitalbrandes und in Krebsgeschwüren hat man mit Erfolg Salpetersäure, Chlor, chlorigsaure Salze angewandt, in Beziehung auf die Bildung von Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Hydrothion-Ammoniak in diesen Geschwüren. Aus demselben Gesichtspunkte lässt sich die Anwendung der Mineralsäuren im Faulfieber bei herrschender Tendenz zur Alkalität betrachten. Huenefeld *l. c.* 72. Die Rubia tinctorum hat eine grosse Anziehung zur phorphorsauren Kalkerde, und äussert diese selbst noch im Organismus, indem sie eingenommen nur die Knochen roth färbt. Endlich werden vielerlei fremdartige Stoffe in den Kreislauf aufgenommen, sie verwandeln sich zum Theil und werden verändert oder unverändert ausgeschieden.

2. In anderen Fällen wirken Stoffe, besonders zersetzte Thierstoffe, die in kranken Thierkörpern erzeugt worden, auf eine dem chemischen Fermentationsprocess analoge Art auf lebende Thiere ein. Die Contagien verursachen die Erzeugung ähnlicher Zersetzung und Mischungen in anderen lebenden Wesen.

3. Chemische Verbindungen und die Elemente können aber auch, indem sie fehlende Bildungstheile zur Erzeugung neuer organischer Verbindungen liefern, statt diese zu zersetzen, sie vielmehr befördern, und die Wirkungen der organischen Kraft unterhalten. So ist ein gewisser Antheil mineralischer Stoffe in den

Digitized by Google

Nahrungsmitteln nothwendig. Die Veränderung des Blutes beim Athmen ist eine organische Umwandlung, wobei eine binäre durch das Athmen erzeugte Verbindung ausgeschieden wird.

4. Die organischen Stoffe selbst können dagegen wieder, indem sie auf einander wirken, gegenseitige Zersetzungen bedingen, welche noch ausser den Wirkungen der organisirenden Kraft erfolgen. Speichel wandelt nach Leuchs und Schwann gekochte Stärke in Zucker um (Poggend. *Ann.* 1831. 5. Mueller's *Archiv* 1836. 138.), und Stärkemehl wird im Magen der Thiere in Stärkegummi und Zucker umgewandelt, wie Tiedemann und Gmelin zeigen. Fibrin oder Muskelfleisch sollen wässerige Zuckerlösung wie Hefe in Gährung setzen, während J. Davy mittelst Rindfleisch auf diese Art in 3—4 Tagen keinen Alkohol, sondern Gummi erhielt. Kastn. *Arch.* 1831. 396. Das von den Magenwänden abgesonderte organische Verdauungsprincip, Pepsin, löst auch ausser dem thierischen Körper geronnenes Eiweiss und Faserstoff leicht auf, und wandelt ihre Zusammensetzung so um, dass sie ganz andere chemische Eigenschaften annehmen. Im Organismus selbst ist die Wirkung organischer Flüssigkeiten auf einander noch durch das Lebensprincip verändert. Die Wirkungen des Speichels, der Galle bei der Verdauung lassen sich nicht aus ihrer Wirkung auf organische Verbindungen ausser dem Organismus ermitteln.

5. Die organische Assimilation zeigt sich zunächst in der Abänderung der Mischung organischer Flüssigkeiten durch Wechselwirkung mit den von dem Lebensprincip beseelten Wänden der organisirten Theile. So verändert sich die Mischung des im Darmkanal aufgesogenen Chylus im lymphatischen System, und er enthält mehr Faserstoff, wenn er durch mehr Lymphdrüsen durchgegangen ist. Diese Drüsen, welche den Vögeln, Amphibien, Fischen fehlen, sind nur Apparate, um die Einwirkung der organischen Oberflächen auf den Chylus zu vergrössern. In den Absonderungen ist dasselbe Phänomen modificirt, indem die von den organisirten Theilen verwandelten Bestandtheile des Blutes abgestossen werden.

6. Endlich zeigt sich die Assimilation noch merkwürdiger in der Umwandlung der organischen Flüssigkeiten zu Bildungstheilen der Organe selbst, indem das Blut in den Capillargefässen mit den kleineren Partikeln der Nerven, Muskeln, Schleimhäute, Drüsen etc. in Berührung kommt, jedes Organ die Bestandtheile des Blutes assimilirt, ihre Mischung hierzu verändert, sich durch Aneignung derselben vergrössert, aber ihnen auch die Fähigkeit ertheilt, selbst wieder zu beleben und zu organisiren. Wunderbar, dass sich die organisirende Kraft so lange erhält, indem sie sich über mehr Masse ausdehnt. Das Urphänomen dieser Assimilation zeigt sich vor der Entstehung der Gefässe und des Blutes an der Keimscheibe des Eies (Blastoderma), indem diese sich am Rande auf Kosten der Dotterflüssigkeit zur Keimhaut vergrössert. Das Eiweis des Dotters erleidet allmählig eine chemische Umwandlung seiner Zusammensetzung, und verliert zuletzt seine Gerinnbarkeit in der Wärme. Wenn einmal Gefässe gebildet

Digitized by Google

sind, so geschieht das Wachsthum durch Vergrösserung der Partikeln zwischen den Capillargefässen und durch Entstehung neuer Gefässe. Sind in einem organisirten Theil oder belebten Stoff (a, b, c, d) die Elemente, die in jedem organischen Molecule in bestimmtem Verhältnisse verbunden sind, so bedingt die organisirende Kraft des belebten Theiles nicht allein die Bindung von a, b, c, d zu Bildungstheilchen, sondern auch die Vereinigung der letzteren zu organischen Productionen, und zwingt die organischen Fluida, ihre Zusammensetzung auch zu der Verbindung (a, b, c, d), d. h. zu Atomen dieser Zusammensetzung zu ändern und diese Atome, sich mit dem assimilirenden Organ zu verbinden. Wenn hier von Atomen geredet wird, so sind darunter nicht organische Kügelchen verstanden, sondern jene unsichtbaren Atome, wie sie in der Chemie als kleinste Theilchen einer Verbindung supponirt werden. Die Erzeugung der organischen Erscheinungen, der Muskelbewegungen etc., befördert beständig die Zersetzung einer gewissen Quantität Materie, die durch die Nahrungsstoffe wieder zugeführt wird, und so unpassend in anderer Hinsicht der Vergleich ist, so gleicht die thierische Maschine doch hierin jeder andern Maschine, die mit Zersetzung einer Materie ihre Kräfte producirt, und wie die Dampfmaschine eine gewisse Menge neuer zersetzbarer Stoffe zu ihrem Gange erfordert. Das Wunderbare bei der Assimilation ist nun, dass der Organismus, indem er zersetzte Bestandtheile seiner selbst auswirft, und organische Kraft in neuer Materie zur Erscheinung bringt, durch die Ausscheidung der zersetzten Bestandtheile seiner selbst nicht sobald an organischer Kraft verliert; daher es fast scheint, dass entweder das organisirende Princip die zersetzten Bestandtheile verlässt und sich mit neuer Materie bindet, oder dass die Nahrungsstoffe selbst eine Quelle zur Vermehrung der organischen Kraft sind, während diese auf der andern Seite durch Zersetzung von früheren Bestandtheilen des Thierkörpers unwirksam wird. Vergl. pag. 39.

Das erste allgemeine Gesetz der verschiedenen Productionen scheint allerdings, wie Autenrieth bemerkt, das Gesetz der Anziehung ähnlicher Theile unter sich zu seyn. Aber die Theilchen der belebten Organe haben schon eine grosse Anziehung zu sich selbst, sie verlassen ihre Verbindung nicht, um sich mit Theilchen des ernährenden Fluidi zu vereinigen, sie ziehen die analogen Theilchen des Blutes an, nur das Blut scheint hierbei vorzugsweise eine Trennung seiner Elemente zu erfahren. Ich kann diese Bemerkungen nicht besser als mit einigen Worten von Autenrieth schliessen. Der Knochen sondert nur Knochenerde, der Muskel Faserstoff und Cruor ab, es vermehrt sich auch ein widernatürlich entstandener Scirrhus, ein Steatom immer mehr auf gleiche Art. Die Vermehrung durch Anziehung des Aehnlichen findet nicht bloss in den chemischen Bestandtheilen eines Organes statt. Auch in seinen Bildungsgesetzen findet sich etwas Aehnliches. Ein polypöser Auswuchs der Mutterscheide, der innern Nasenhaut entfernt sich weniger durch seine chemische Mischung

Digitized by Google

als durch seine Organisation von den ihn umgebenden gesunden Theilen. Einmal entstanden aber wächst er bis auf einen gewissen Grad immer auf eine ähnliche Art fort. Eine Narbe wird, ungeachtet sie eine von der ursprünglichen Organisation der Haut abweichende Structur besitzt, doch immer wieder auf eine ähnliche Art ernährt; sie wächst selbst mit dem übrigen Körper. AUTENRIETH *Physiol.* 2. 181.

I. Abschnitt. Vom Athmen.

I. Capitel. Vom Athmen im Allgemeinen.

Der wesentliche athembare Bestandtheil der Atmosphäre ist der Sauerstoff derselben, den sie im Verhältniss von 21 Th. Sauerstoffgas auf 79 Theile Stickstoffgas enthält. Der Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft ist in der Regel äusserst gering. 10000 Volumtheile atmosphärischer Luft enthalten nach DE SAUSSURE 4,15 Kohlensäuregas. Auf dem Lande war das Maximum 5,74, das Minimum 3,15. In der Stadt Genf war der Kohlensäuregehalt der Luft um 0,31 Th. auf 10000 Th. Luft vermehrt. BERZELIUS *Jahrb., übers.* v. WOEHLER 11. 64. Hierzu kommen örtliche Verunreinigungen, wie eine die Silberauflösung bei Einwirkung des Lichtes röthende organische Materie, die sich auch im Regenwasser findet. GMELIN's *Chemie* 1. 442. In der Luft, in welcher Menschen und Thiere athmen, vermindert sich der Gehalt an Sauerstoff, an dessen Stelle fast eben so viel Kohlensäure tritt. Beim Athmen in reinem Sauerstoffgas wird die Luft eben so verändert. Ohne das Athmen für eine Verbrennung zu erklären, kann man doch die Aehnlichkeit zwischen den Veränderungen der Luft durch das Athmen und das Verbrennen nicht verkennen. Hier wie dort scheint das Stickgas indifferent zu seyn, und nur den Process durch seine Beimengung zu mässigen.

Bei der Betrachtung der Gasarten, in Beziehung auf das Athmen und die Athemorgane, muss man wohl unterscheiden, dass eine Gasart den belebenden Process im Athmen nicht unterhalten kann, ohne dass sie deswegen gerade giftig ist. Stickgas und Wasserstoffgas scheinen für das Athmen indifferent, sie unterhalten rein geathmet das Leben nicht, eben weil Sauerstoffgas fehlt, und sind daher, der zum Athmen nöthigen Menge Sauerstoffgas bei-

Digitized by Google

gemengt, unschädlich. Andere Gase sind nicht indifferent, sondern wegen der Affinität zu thierischen Stoffen geradezu giftig. Dann muss man unterscheiden, dass manches Gas in die Athemorgane eingeführt werden kann und doch giftig ist, dass es aber gewisse Gase giebt, die nicht einmal in grösserer Menge in die Athemorgane eingeführt werden können, weil sie krampfhafte Zusammenziehungen der Respirationsorgane, vorzüglich Verschliessung der Stimmritze bedingen.

I. Gase, welche den chemischen Process des Athmens unterhalten.

1. Dauernd und ohne Nachtheil für das Leben: Die atmosphärische Luft. 2. Eine Zeitlang, aber nicht dauernd: Sauerstoffgas und Stickstoffoxydulgas. Beim Athmen in Sauerstoffgas soll das Blut selbst in den Venen hellroth werden. Es soll zuletzt zerstörend wirken. Dagegen haben Allen und Pepys beim Menschen keine Beschwerden, und bei einer Taube nur Unruhe, nach dem Versuch aber Erholung bemerkt. Lavoisier und Seguin sahen bei Meerschweinchen, die 24 Stunden in Sauerstoffgas athmeten, keine Beschwerde. Allen und Pepys fanden beim Athmen in Sauerstoffgas mehr Kohlensäure als beim Athmen in atmosphärischer Luft gebildet. Dagegen wollten sie bei einer Taube weniger Kohlensäurebildung als in atmosphärischer Luft gefunden haben. Schwindsüchtige befinden sich beim Athmen in Sauerstoffgas schlechter.

Stickstoffoxydulgas unterhält zwar das Leben eine kurze Zeit, wirkt aber doch schnell berauschend und betäubend, wobei Exaltation, subjective Sinneserscheinungen, Verwirrung des Geistes, und zuletzt Ohnmacht eintreten. H. Davy *Untersuchungen über das oxydirte Stickgas. Lemgo.* 1814. Ein Theil des Gases wird beim Athmen dieser Gasart im Blut aufgelöst, welches purpurroth wird, die Farbe des Gesichtes, der Lippen, wird wie die eines Todten. Es entwickelt sich aus den Lungen Stickgas und kaum etwas Kohlensäuregas.

II. Gase, welche zwar inspirabel sind, aber nicht den chemischen Process des Athmens unterhalten.

1. Gase, die keinen positiven giftigen Einfluss ausüben, sondern nur aus Mangel der Gasart, die allein das Leben unterhält, tödten: Stickgas und Wasserstoffgas. Nach Lavoisier's und Seguin's Versuchen athmen Meerschweinchen in einem Gemenge von gleichviel Sauerstoffgas und Wasserstoffgas ohne besondere Beschwerde, indem sie eben so viel Sauerstoffgas verzehren, wie in einem Gemenge von gleichviel Sauerstoffgas und Stickgas, und kein Wasserstoffgas absorbiren. Beim Athmen von Wasserstoffgas wird nach Allen und Pepys Stickgas aus dem Blut ausgehaucht. Nach Allen, Pepys und Wetterstedt (Berzel. *Thierchem.* 101.) macht Wasserstoffgas schläfrig. Frösche, die ich in unreinem Wasserstoffgas, wie es eben aus Zink und verdünnter Schwefelsäure bereitet wird, athmen liess, wurden schon nach einigen Stunden wie scheintodt; als ich aber das Wasserstoffgas zu solchem Zweck reinigte und von dem stinkenden Oel vermittelst Hindurchleiten durch Weingeist befreite, lebte ein Frosch darin

Digitized by Google

über 12 Stunden; indem er noch von Zeit zu Zeit athmete; nach 22 Stunden war er scheintodt, bewegte sich aber noch etwas, als er herausgenommen gekniffen wurde. In anderen Fällen lebten die Frösche selbst in gereinigtem Wasserstoffgas nur 3 — 4 Stunden.

2. Giftige Gasarten. Kohlenwasserstoffgas, Phosphorwasserstoffgas, Schwefelwasserstoffgas, Arsenikwasserstoffgas, Kohlenoxydgas, Cyangas? Atmosphärische Luft, die $\frac{1}{1500}$ Schwefelwasserstoffgas enthält, tödtet nach Thenard einen Vogel, $\frac{1}{800}$ einen Hund, $\frac{1}{300}$ ein Pferd. Hieher gehört wohl auch die Kohlensäure; denn sie bewirkt keinen Husten, wenn sie auch in grosser Menge eingeathmet wird. Sie narkotisirt und macht scheintodt ohne Erstickungszufälle. Atmosphärische mit mehr als 10 P. C. Kohlensäuregas tödtet bald. Diese giftigen Gasarten tödten auch, wenn sie in kleinen Quantitäten ins Blut injicirt werden. Nysten. Vergl. pag. 148.

III. Gase, welche in grösserer Menge gar nicht einmal inspirirt werden können, indem sie eine krampfhafte Verschliessung der Stimmritze bewirken. In kleinerer Quantität erregen sie Husten.

Alle sauren Gasarten, (mit Ausnahme der Kohlensäure, welche nicht erstickend, sondern vergiftend tödtet), ferner Chlor-, Stickstoffoxyd-, Fluorboron-, Fluorsilicium-, Ammoniakgas. Berzel. *Thierch.* 103. Gmelin *Chem.* 4. 1527. Flüssigkeit, Wasser reizt wie feste Körper auch zu krampfhafter Verschliessung der Stimmritze bis zum Ersticken, sehr wenig dagegen, wenn etwas Flüssigkeit einmal in den Lungen ist, und man kann durch eine Oeffnung der Luftröhre ziemlich viel Wasser einspritzen. Der Tod erfolgt im ersten Fall durch die Verschliessung der Stimmritze, welche bei einem Loch in der Luftröhre ganz unschädlich ist.

Die Thiere, welche im Wasser leben, athmen zum Theil atmosphärische Luft an der Oberfläche des Wassers, wie die Amphibien und Wassersäugethiere, durch Lungen, zum Theil athmen sie das Wasser selbst, oder vielmehr die im Wasser aufgelöste Luft, wie die Fische durch Kiemen. Das Wasser der Seen, Flüsse und des Meeres enthält nämlich auch atmosphärische Luft oder vielmehr Sauerstoffgas und Stickgas in bestimmten Proportionen aufgelöst, welche es aus der Atmosphäre absorbirt. v. Humboldt und Provençal entwickelten durch Kochen aus Seinewasser 0,0264—0,0287 Theile seines Volumens Luft. Diese enthielt 0,306 bis 0,314 Theile Sauerstoffgas und 0,06 bis 0,11 Theile kohlensaures Gas. Man darf sich also nicht vorstellen, dass das Wasser selbst eine Veränderung durch das Athmen erleide, nur die darin aufgelöste Luft wird verändert, Sauerstoff daraus absorbirt, und Kohlensäure ausgeschieden. Fische athmen im Wasser, welches mit Sauerstoffgas und Wasserstoffgas imprägnirt ist, nur das erstere, das Wasserstoffgas, bleibt unverändert. In ausgekochtem Wasser sterben die Fische wegen Mangel an Sauerstoffgas schnell, innerhalb 4 Stunden, wobei sie ihre Athembewegungen fortsetzen. Priestley sah Fische in luftfreiem, mit Stickoxydgas (Salpetergas) imprägnirtem Wasser 10—15 Min. leben, als aber die geringste Menge atmosphärischer Luft hinzukam, starben sie unter Krämpfen.

Digitized by Google

Der chemische Process des Athmens ist nicht wesentlich von den Athmenbewegungen abhängig; diese dienen nur zur Ventilation, d. h. das während dem beständigen chemischen Process zwischen Luft oder Wasser und Blut veränderte Medium, Luft oder Wasser, auszutreiben und frische Luft oder Wasser in den Apparat des chemischen Processes zu bringen. Die Lungen bieten durch ihre innere Oberfläche eine ungeheure Fläche zur Wechselwirkung zwischen Blut und Luft dar, diese Wechselwirkung ist beständig, weil die Lungen auch beim Ausathmen nicht von Luft leer werden. Die Verengerung und Erweiterung des Brustkastens, dem die anliegenden Lungen folgen, werfen einen Theil der Producte aus dem Reservoir der Lungen von Zeit zu Zeit aus, und führen das neue Material zur neuen Production in das Reservoir der Lungen. Die Fische nehmen das frische Wasser durch den Mund auf und treiben einen Theil darauf zwischen den Kiemen heraus, wobei sie die Kiemendeckel öffnen und schliessen.

Die menschliche Lunge enthält nach H. Davy nach möglichst starkem Ausathmen noch 35, nach gewöhnlichem Ausathmen 108 Cubikzoll Luft; nach Davy werden gewöhnlich 10—13 C. Z. ein- und ausgeathmet. Herbst (Meck. *Arch.* 1828.) fand, das grössere Erwachsene bei ruhigem Einathmen 20—25 C. Z., kleinere 16—18 C. Z. ein- und ausathmen.

Das Athembedürfniss ist sehr verschieden, am grössten bei den Wirbelthieren, und unter diesen bei den warmblütigen. Die warmblütigen Thiere sterben in der Luftpumpe schon innerhalb einer Minute, Vögel in 30—40 Secunden. Amphibien dagegen leben ziemlich lange im luftleeren Raume und irrespirabeln Gasarten, eine Schildkröte starb unter Oel in Carradori's Versuchen (*ann. d. chim. et d. phys.* 5. 94.) erst in 24—36 Stunden. Frösche sterben unter Oel in weniger als 1 Stunde, unter lufthaltigem Wasser leben sie (durch Athmen mit der Haut) lange; nach Edwards lebten Kröten in der Seine in verschlossenen Körben, Tage lang, in luftlosem Wasser nach Spallanzani und Edwards einige Stunden. Edwards, Meck. *Arch.* 5. 141. Nach meinen Versuchen lebten Frösche mit unterbundenen und ausgeschnittenen Lungen circa 30 Stunden, wahrscheinlich durch Athmen mit der Haut. Ein Frosch zeigte einmal in den vorher erwähnten Versuchen in *reinem* Wasserstoffgas noch nach 12 Stunden deutliche Lebenszeichen und athmete von Zeit zu Zeit, und war selbst nach 22 Stunden nur scheintodt.

Nach v. Humboldt's und Provençal's Versuchen lebten Goldfische in ausgekochtem Wasser 1 Stunde 40 Min.; nach ihren Versuchen sterben Fische in wässeriger Kohlensäure und kohlensaurem Gas in wenigen Minuten, während sie in Stickgas und Wasserstoffgas, worin sie ihre Kiemendeckel schliessen, erst in 5 Stunden sterben. Die Insecten sterben in Oel nach Carradori sogleich, auch schnell nach Trevibanus, wenn man ihre Luftlöcher mit Oel bestreicht. Dagegen lebten Blaps- und Tenebrio-Arten in Biot's Versuchen unter der Luftpumpe in verdünnter Luft von 1—2 Millimeter Spannung 8 Tage. Bremsenlarven lebten nach den Versuchen von Schroeder v. d. Kolk lange in ir-

Digitized by Google

respirabeln Gasarten. Die Larven einiger Insecten leben in faulenden Theilen von Pflanzen und Thieren und scheinen wenig freies Sauerstoffgas zu bedürfen, obgleich man kein Insect kennt, welches nicht ein Luftröhrensystem und also Luft im Innern enthielte. Berzelius sah Larven im Quellwasser leben, das kohlensaures Eisenoxydul und etwas Schwefelwasserstoffgas enthielt. Blutegel scheinen lange ohne Wassererneuerung zu leben. Holothurien starben in Tiedemann's Versuchen im Seewasser, das nicht erneuert wurde, in einem Tage. Die Eingeweidewürmer scheinen durch ihren Aufenthalt in belebten Wesen das Athmen nicht zu bedürfen. Aber überhaupt scheint das Athmen zum Leben der niedersten Thiere nicht wesentlich nothwendig zu seyn. Ueber das Athmen im Winterschlaf, siehe oben pag. 78., über das Athmen der Thiereier unten Cap. 3. Die vorzüglichsten Arbeiten über das Athmen sind: Goodwyn *on the connexion of life with respiration. London* 1788. Lavoisier et Seguin *Ann. d. Chim.* 91. 318. Menzie's *tentamen physiol. de resp. Edinb.* 1790. Crell *Ann.* 1794. 2. 33. H. Davy, Gilb. *Ann.* 19. 298. Pfaff, in Gehler *J. de Chem.* 5. 103. Provençal et Humboldt, Schweigg. *J.* 1. 86. Edwards *Ann. de Chim. et de Phys.* 22. 35. Dulong, Schweigg. *J.* 38. 505. Despretz *Ann. d. Chim. et de Phys.* 26. 337. Spallanzani *mém. sur la respiration. Genève* 1803. Hausmann *de anim. exsang. resp. Hannov.* 1803. Sorg *de resp. insect. et verm. Rudolst.* 1805. Nitzsch, *de resp. animalium. Viteb.* 1808. Nasse, Meck. *Arch.* 2. 195. 435. Treviranus, *Zeitsch. für Physiol.* 4. 1.

II. Capitel. Organologie der Athemwerkzeuge.

Viele der niedersten Thiere scheinen mit der ganzen Haut zu athmen. Das Athemorgan entsteht, indem ein zur chemischen Veränderung der Luft oder des lufthaltigen Wassers bestimmter Theil der Haut sich in einem kleinen Raume zu einer grossen Oberfläche, welche den Contact zu vermehren bestimmt ist, vergrössert. Diese Vergrösserung der die Luft zersetzenden Oberfläche geschieht entweder nach innen in den *Lungen* als sackförmige oder verzweigte Höhlungen, oder durch Vermehrung der Oberfläche nach aussen, in der Kieme in Form von Blättern, Zweigen, Kämmen, Quasten, Wimpern, federformigen Auswüchsen, Formen, die so mannigfaltig sind, dass die Natur hierin gleichsam die Aufgabe gelöst zu haben scheint, die denkbaren Formen der Flächenvermehrung nach aussen durch vorspringende Bildungen zu realisiren. Diese Art des Respirationsorganes nennt man *Kieme*. Die dritte Art der Respirationsorgane ist durch Contactsvermehrung der thierischen Theile und der Luft in einem durch alle Organe verzweigten Luftröhrensystem gegeben, welches sich mit den feinsten Zweigen bis in die kleinsten Theile aller Organe verbreitet. Diess ist das Tracheensystem der Insekten und Tracheenspinnen. Die Lungen athmen gemeiniglich nur Luft, doch giebt es Ausnahmen, wie z. B. das Respirationsorgan der Holothu-

Digitized by Google

rien, welches einen hohlen Baum mit hohlen Endzweigelchen vorstellt, der von seiner innern Fläche aus athmet, indem er das Wasser aufnimmt, das von Zeit zu Zeit ausgetrieben wird. Die Kiemen athmen meistens Wasser, aber zuweilen auch Luft, wie die Kiemen der auf dem Lande lebenden Crustaceen, der Landasseln. Lungen und Kiemen, in ihren extremen Formen durchaus verschieden, nähern sich doch oft so sehr, dass es schwer ist, zu bestimmen, ob etwas Lunge oder Kieme ist. Nicht allein dass die Kiemen der Cyclostomen, der Haien und der Rochen in den Wänden von Kiemensäcken angebracht sind, dass die Kieme der Ascidien unter den Mollusken ein Kiemensack ist; in dem Athemorgan der Lungenspinnen ist die Vermischung der Charaktere noch grösser. Diese Organe haben die Charaktere der Lungen und Kiemen zu gleicher Zeit, und wurden vielleicht mit eben so viel Recht oder Unrecht von Treviranus Kiemen, als von mir Lungen genannt. Diess sind Säckchen, welche beim Aufblasen durch ihr Luftloch fächerförmige blinde Vorsprünge am Rande des Säckchens zeigen, wie ich beim Scorpion gezeigt habe, während das Innere der Säckchen zugleich durch eine Anzahl zarter Scheidewände in innere Fächerchen abgetheilt ist. Diese Organe athmen Luft. Das Tracheensystem der Insecten athmet meist Luft durch Luftlöcher ein; allein einige derjenigen Insekten, die im Wasser leben, athmen die im Wasser aufgelöste Luft durch kiemenförmige Anfänge des Tracheensystems, so dass sie die im Wasser aufgelöste Luft durch diese Tracheenkiemen in gasförmige Luft verwandeln, die dann in ihrem Luftröhrensysteme weiter verbreitet wird.

Bei den Infusorien scheinen die einzigen Athemorgane die zarten, nur bei den stärksten Vergrösserungen sichtbaren Wimpern zu seyn, womit viele theilweise oder ganz besetzt sind. Bei den Polypen scheint die ganze Körperoberfläche dem Athemprocess zu dienen. Bei einigen, wie den Alcyonellen, scheinen ihre Büschel zugleich Kiemen zu seyn. Unter den Echinodermen bildet das Athemorgan bei den Holothurien ein hohles Strauchwerk oder Bäumchen mit Endzellchen, welches das Wasser durch den Stamm aufnimmt, und von der innern Oberfläche des Organes aus athmet. Bei den Seesternen sind die Respirationsorgane nach Tiedemann weiche Röhrchen auf der Haut des Thiers, in welche das Wasser eindringen kann. Tiedemann *Anatomie d. Röhrenholothurie etc.* Bei den Anneliden sind die Athemorgane theils freie büschelförmige Kiemen, in Form von Zweigelchen wie in den Arenicolen, und ähnliche Organe an den Füssen der Nereiden, bald Athembläschen, die unter der Haut verborgen liegen, und wovon jedes durch eine Oeffnung nach aussen führt, wie bei den Lumbricinen, Naiden, Hirudineen; ich habe indess einmal bemerkt, dass die eigentlichen Athembläschen der Hirudo med. eine tropfbarflüssige Absonderung, etwas weniges weissliche Materie enthielten.

Die Mollusken athmen theils durch Kiemen Wasser, theils durch Lungen Luft. Im ersten Fall sind z. B. die Cephalopoden, ein Theil der Gasteropoden, die Acephalen, im zweiten Fall be-

Digitized by Google

findet sich ein Theil der Gasteropoden, wie z. B. die Helicinen und Limacinen. Die Kiemen stellen Falten oder Blätter dar, die parallel nebeneinander verbunden sind, oder von einem Schafte ausgehen, wie bei den Sepien, oder verzweigt sind, wie bei den Doris, wo sie um den After stehen. Bei den zweischaligen Muscheln sind jederseits 2 in der Länge des Thieres verlaufende doppelwandige Blätter, zwischen deren Lamellen zugleich die Eier gelangen können, um sich zu entwickeln. Siehe v. Baer, Meck. *Archiv* 1830. Bei den Ascidien bilden die Kiemen eine sackförmige Vorhalle des Darmschlauches, wo die innere Haut gitterförmige Vorsprünge bildet. Die luftathmenden Gasteropoden leben theils im Wasser, wie z. B. die Süsswasserschnecken, und athmen Luft an der Oberfläche des Wassers, wie die Limnäen u. a., theils leben sie auf dem Lande, wie die Limacinen und Helicinen. Das Athemorgan ist eine sackförmige Lunge, deren Athemloch sich rhythmisch öffnet und schliesst.

Bei den Crustaceen sind die Kiemen entweder wasserathmend, wie bei den meisten, sie sind dann theils federförmig vereinigte Blätter, wie bei den Brachiuren, theils Büschel von Fäden ausschickende Fortsätze, wie bei den Macruren, theils einfache Blätter, wie bei den Wasserasseln. Die luftathmenden Kiemen der Landasseln stellen auch einfache hohle Blätter dar. Bei mehreren Crustaceen sind die Kiemen mehr blasenartig, wie bei den Amphipoden. Die Kiemen der Crustaceen sind entweder mit den Füssen verbunden oder mit der Unterseite des Bauches.

Die Spinnen zerfallen in Lungenspinnen und Tracheenspinnen. Die Athemorgane der Lungenspinnen liegen an der untern Seite des Hinterleibes, bald 1 Paar, wie bei den meisten Spinnen, bald 2 Paar, wie bei den Mygaler, bald 4 Paar, wie bei den Scorpioniden. Diese Organe, welche ich in Meck. *Archiv* 1828. und *Isis* 1828. 707. weitläufiger beschrieben habe, sind Säckchen, zu welchen jedesmal ein Luftloch führt. In diesen Säckchen sind viele parallele Scheidewändchen oder Blätter aufgestellt. Die Abtheilungen zwischen diesen Blättern springen am untern Rande der Kieme beim Aufblasen vor, so dass die Kieme auch äusserlich am hintern Rande abgetheilt ist. Die im Wasser lebenden Spinnen, wie Aranea aquatica, nehmen zwischen den Haaren ihres Leibes Luft mit in das Wasser hinab, die sie verzehren; doch scheinen die Hydrachnen so wie die Pycnogoniden nicht Luft zu athmen. Die Tracheenspinnen, wie Solpuga, Chelifer, Phalangium, und die Acariden verhalten sich im Bau ihrer im ganzen Körper sich verbreitenden Luftröhren, die durch Luftlöcher Luft erhalten und ausscheiden, wie die Insekten. Dugès hat auch Spinnen (Dysdera, Segestria) beobachtet, welche Lungen und Luftröhren zugleich haben. Die beiden hinteren der 4 Stigmen derselben sind Tracheal-Stigmen.

Alle Insecten haben ein Tracheensystem, die meisten athmen in der Luft, diese nehmen die Luft durch eine Anzahl Luftlöcher, Stigmata, meist an den Seiten der Leibesringe auf. Siehe die Abbildungen des ganzen Luftröhrensystems mehrerer Insecten bei Marcel de Serres, *Isis* 1819. 4. Die Luftröhren führen die Luft

Digitized by Google

von den Stigmata theils in Säckchen, wovon die übrigen Luftröhrenstämmchen ausgehen, theils in Längsstämme, die sich durch das ganze Thier bis in die kleinsten Theile verzweigen. Bei mehreren, besonders bei den Orthopteren, sieht man deutliche Athembewegungen durch abwechselnde Erweiterung und Verengerung des Hinterleibes. Vor dem Fliegen scheinen die Käfer sich mit mehr Luft zu füllen, wobei ihre Flügel, die ebenfalls Luftröhren enthalten, sich entfalten. Treviranus hat neulich behauptet, dass die Stigmata einiger Insekten ganz undurchbohrt sind. Diess ist indess von Burmeister bereits verneint. Burmeister *Entomologie. Berlin* 1832. *p.* 172. Ueber den Bau der Luftlöcher siehe Burmeister ebend.

Einige Insekten leben im Wasser und athmen doch Luft an der Oberfläche des Wassers, wie die Larven mancher Diptera, die Wasserwanzen und einige Käfer, die im Wasser leben. Die Dytisken kommen an die Oberfläche des Wassers und nehmen die Luft in Luftlöcher am After auf. Die Hydrophilen nehmen Luftblasen zwischen den Haaren ihres Körpers mit in die Tiefe. Beide Käfer haben ihre Luftlöcher als Larven am Schwanzende. Burmeister. Die Larven der gemeinen Stechmücke, Culex pipiens, haben eine Athemröhre am letzten Hinterleibsringe, die Puppen derselben 2 Athemröhren aus dem Brustkasten hervorragend. Andere dieser Mücke verwandte Gattungen dagegen athmen als Larven Wasser mit Kiemen. Aber die Larven der Federmücken, Chironomus, haben wieder zwei Athemröhren am Schwanzgliede. Bei den Stratiomys endigt das letzte Glied des Leibes in eine Athemröhre. Sehr interessant ist die Athemröhre der Larven der Gattung Eristalis, die im Schlamm von Pfützen, Gossen und Abtritten leben. Das letzte Glied des Leibes verlängert sich in eine häutige Röhre, in welcher eine zweite hornige steckt, die wie die Athemröhre der Culex und Stratiomys zur Suspension auf der Wasseroberfläche mit einem Borstenkranze versehen ist. Die Larve richtet dieses Rohr, dessen inneres Stück, wenn es nöthig ist, hervorgeschoben wird, bis an die Oberfläche des Wassers, die Röhre kann zu diesem Zwecke ausserordentlich verlängert werden, während die Larve auf dem Grunde lebt und an der Oberfläche des Wassers athmet. Burmeister *Entomologie I.* 178. Auch einige Wasserwanzen, Nepa und Ranatra haben Athemröhren.

Einige Insekten, die als Larven im Wasser leben, athmen obgleich sie in ihrem Innern ein Luftröhrensystem haben, zunächst Wasser. Diese besitzen statt Luftlöcher, Kiemen, als Anfänge der Luftröhren. Diese Kiemen haben die Function, die im Wasser aufgelöste Luft von dem Wasser abzuscheiden, und im gasförmigen Zustande dem Luftröhrensystem zu überliefern.

Die Kiemen sind theils haarförmige Fäden, deren Inneres die Anfänge der Luftröhren enthält. Diese Haare sind bald strahlig vereinigt, bald verzweigt. Solche Kiemen haben z. B. die Larven und Puppen mehrerer Mücken. Blattförmig sind die Kiemen mehrerer Neuroptera. Mit haarförmigen Kiemen an den Seiten der Ringe athmen die Larven des Drehkäfers Gyrinus. Am häu-

Digitized by Google

figsten sind die Kiemen bei den Larven der Neuropteren. Bei Ephemera sind es flossenartige Kiemenblättchen an der Seite des Leibes, im Innern der Blättchen beginnen die Zweige der Luftröhren. Die Kiemen der Larven der Wasserjungfern liegen im letzten Leibesringe, bei Agrion bilden sie 3 grosse gefranzte Blätter. Die büschelförmigen Kiemen der Larven der Libellen liegen im Mastdarme, so dass die büschelförmigen Enden der Luftrohrenstämme, die Haut des Mastdarms durchbohrend, in die Höhle des Mastdarms hereinragen. Die Larven der Phryganeen und Semblis besitzen faden- oder blattförmige Fortsätze an den Seiten des Hinterleibs. Unter den Dipteren athmen die Larven der Chironomus Luft durch Athemröhren, die Puppen aber die im Wasser aufgelöste Luft durch Kiemenbüschel am Brustkasten. Anopheles athmet als Larve mit Kiemen am Schwanzende, mit Athemröhren als Puppe. Unter den Schmetterlingen lebt die Raupe einer Motte, Botys stratiotalis, im Wasser. Eine ausführlichere Darstellung der Athemorgane hat Burmeister in seiner schätzbaren Entomologie gegeben, wovon hier ein Auszug mitgetheilt worden. Abbildungen der Kiemen der Wasserinsekten hat Suckow in Heusinger's *Zeitschrift für organ. Physik. B.* 2. gegeben. Wenn die mit Kiemen athmenden Larven und Puppen sich verwandeln, verlieren sie ihre Kiemen, und athmen Luft durch Luftlöcher.

Ueber den Bau der Kiemen der Fische hat Rathke gründliche Untersuchungen angestellt. *Untersuchungen über den Kiemenapparat und das Zungenbein der Wirbelthiere. Riga und Dorpat* 1832. Das Folgende ist zum Theil ein Auszug derselben.

1. *Kiemengerüst.* Der Unterkiefer der Grätenfische ist an dem Quadratbein aufgehängt, einem Suspensorium, welches hier aus mehreren Stücken besteht, an welche sich hinten noch 3 Stücke des Kiemendeckels anschliessen.

Auf den Unterkiefer folgt nach hinten bei den Grätenfischen der Zungenbeingürtel. Diess sind 2 aus mehreren Gliedern bestehende Bogen, deren Extreme mit dem Quadratbein verbunden, und die unten in der Mitte hinter der Zungenstütze vereinigt sind, zwischen sich oft eine Copula und unter sich den Zungenbeinkiel haben. An den Bogen des Zungenbeins die knöchernen Radii branchiostegi, Kiemenhautstrahlen.

Hinter dem Zungenbeingürtel liegen bei den Grätenfischen 4 Knochengürtel, die Kiemenbogen, an welchen die Kiemenblättchen wie die Zähne eines Kammes befestigt sind. Das gefässreiche Gewebe der Kiemenblättchen ist durch knorpelige Stützen, den Blättchen, entsprechend getragen, welche man den Radii branchiostegi des kiemenlosen Zungenbeingürtels vergleichen kann. Die Kiemenbogen bestehen aus mehreren Stücken, meist vier, in dem hintersten weniger. Bei vielen Grätenfischen befinden sich an der innern Seite der Kiemenbogen mehrere kleine Knochenplatten mit kleinen Zähnen. Ist das oberste Glied eines Kiemenbogens stärker bewaffnet, so wird es zum obern Schlundknochen, Os pharyngeum superius. Zwischen den unten paarweise verbundenen Kiemenbogen befinden sich 2—4 Knochen- oder Knorpel-

Digitized by Google

stücke als Copulae derselben. Hinter dem letzten Paare der Kiemenbogen liegen die unteren Schlundknochen oder die Schlundkiefer aus einem Stücke jederseits bestehend. Sie stellen gleichsam einen Kiemenbogengürtel dar, der aber ohne Kiemen ist. Die Kiemenbogen und Schlundkiefer liegen bei den meisten Fischen unter dem Schädel, bei anderen zum Theil unter den ersten Wirbeln.

In den Haifischen und Rochen tragen die knorpeligen Quadratbeine den Unterkiefer und die Zungenbeinbogen. Sowohl mit dem Quadratbein als dem Zungenbeinbogen sind Knorpelstreifen in Form von Strahlen verbunden. Die Knorpelstrahlen des Quadratbeins entsprechen den Kiemendeckelstücken, welche bei den Grätenfischen am Quadratbein angeheftet sind, die Knorpelstrahlen der Zungenbeinbogen entsprechen den Radii branchiostegi der Grätenfische. Die 4 knorpeligen Kiemenbogen der Haifische und Rochen liegen unter dem Anfange der Wirbelsäule. Sie bestehen aus 4 Segmenten. Eine Knorpelplatte hinter den Kiemenbogen entspricht den Schlundkiefern der Grätenfische. Die Kiemenbogen tragen auch Knorpelstreifen, die nach aussen und hinten wie Strahlen gerichtet sind.

Bei den Larven der Salamandrinen, Frösche und bei den Proteideen ist das knorpelige Kiemengerüst zum Theil aus ähnlichen Theilen gebildet. Das Quadratbein trägt den Unterkiefer, in der Regel auch das vordere Zungenbeinhorn. Die Kiemenbogen bestehen nicht aus mehreren Segmenten; es sind 4 Bogen (beim Proteus 3), sie sind an die einfachen oder doppelten hinteren Zungenbeinhörner befestigt, die Rathke für Segmente der Kiemenbogen selbst ansieht.

Bei der Verwandlung bleiben die Zungenbeinhörner der Batrachier und Salamandrinen nebst dem Mittelstück und verändern sich. Die Kiemenbogen verschwinden, nur von dem ersten Bogen verbindet sich ein Rest mit den 2 Zungenbeinhörnern beim Salamander. Siebold. Bei den Coecilien besitzt das Zungenbein durchs ganze Leben 4 Paar Bogen. Vergl. Rusconi *descrizione anatomica degli organi della circolazione delle Larve delle Salamandre.* Siebold *observ. de Salamandris et Tritonibus. Berol.* 1828. Bemerkenswerth ist, dass die Hörner des Zungenbeins bei den Eidechsen selbst im erwachsenen Zustand noch 2 Paar oder selbst 3 Paar Bogen darstellen. Rathke hat nun eine gleichlaufende Reihe von Beobachtungen an Embryonen der Säugethiere angestellt, woraus ebenfalls hervorgeht, dass die zarten Kiemenbogen derselben, wie bereits pag. 172 erwähnt wurde, in das Zungenbein zuletzt reducirt werden, indem namentlich der Zungenbeinbogen vorderes, der erste Kiemenbogen zweites Horn des Zungenbeines wird, dass aber die Kiemenbogen nichts zur Ausbildung des Kehlkopfes beitragen, dieser vielmehr selbstständig entsteht.

2. *Kiemenblätter.* Die Kiemenblätter der Grätenfische bilden an jedem Bogen eine doppelte Reihe von lanzettförmigen Blättchen, die wie Zähne eines Kammes auf den Kiemenbogen aufsitzen, an ihrer Basis sind sie häufig auf eine gewisse Höhe mit einander verwachsen. Die Kiemenblätter schicken wieder quere

Digitized by Google

kleinere Blätterchen aus. Die Kiemenarterien treten am untern Ende der Kiemenbogen ein, verlaufen in der Furche an der Convexität des Bogens bis zum obern Ende, dünner werdend, die Kiemenvenen in umgekehrter Richtung, so dass diese unter der Wirbelsäule zu dem Arteriensystem zusammen treten. Auf jenem Weg giebt jede Art. branchialis so viel Aeste als Kiemenblätter. Diese Aeste theilen sich zweimal gabelförmig, und führen in quere Capillargefässe der feinsten Kiemenblättchen, aus welchen auf ähnliche Art die Venen auf der entgegengesetzten Seite der Kiemenblättchen entstehen. Cuvier *hist nat. des Poissons. Tab.* 8. Ueber Nebenkiemen siehe Rathke a. a. O., über die baumförmigen Nebenkiemen des Heterobranchus anguillaris Burdach's *Physiol.* 4. 161. Ehrenberg hat bei Sudis aegyptiaca ein mit den Kiemen verbundenes, ausserst räthselhaftes spiralförmiges Organ entdeckt. Ueber die runzeligen Nebenkiemen der Anabas und anderer Fische, die ausser dem Wasser einige Zeit zubringen, siehe Cuvier *hist. nat. des Poissons. Tab.* 205. 206. Im Fötuszustande besitzen die Haifische und Rochen auch fadenförmige äussere Kiemen, die merkwürdiger Weise auch aus dem Spritzloch (vor dem Quadratknorpel) hervorragen, wodurch dieses Loch an die übrigen wahren Kiemenlöcher erinnert.

Die Störe besitzen eine halbe Kieme am Kiemendeckel, eben so die Haifische und Rochen am Gürtel vor den Kiemenbogen. Bei den Grätenfischen und bei dem Stör sind die Kiemenbogen nach der äussern Seite frei, und nur von dem beweglichen Kiemendeckel bedeckt, oder von der Kiemenhaut bis auf eine Oeffnung bedeckt, wie beim Aal. Bei den Haifischen, Rochen dagegen geht von jedem Kiemenbogen zwischen den Kiemenblättchen der vordern und hintern Seite eine häutige Fortsetzung bis zur Haut, die bei diesen Thieren die Kiemen ganz bis auf 5 Oeffnungen bedeckt. Dadurch entstehen vollständige Scheidewände zwischen Schlund und Haut, in welchen die Kiemenbogen eben liegen. Von diesen Kiemenbogen gehen die Kiemenblätter als parallele Fältchen der Schleimhaut, welche diese Säcke auskleidet, aus. Von den 5 Oeffnungen zu 5 Kiemenhöhlen liegt die erste hinter der ersten oder halben Kieme und dem 1. Kiemenbogen, die 2., 3., 4. Oeffnung zwischen den 1—2., 2—3., 3—4. Kiemenbogen, die 5. Oeffnung hinter dem 4. Kiemenbogen. Die hintere Wand der 5. Kiemenhöhle ist ohne Kiemenblättchen.

Bei den Cyclostomen giebt es auch Kiemensäcke mit äusseren Oeffnungen, indem je zwei Kiemen zu einem Sack sich verbinden. Die Kiemenbogen fehlen, und statt deren giebt es bloss häutige Scheidewände, welche nach zwei Seiten hinten mit Schleimhaut ausgekleidet sind. Starke Falten dieser Schleimhaut bilden die Kiemenblätter. Bei Ammocoetes sind 6, bei Petromyzon 7 Kiemensäcke und Oeffnungen. Bei Ammocoetes öffnen sich die inneren Kiemenlöcher der Säcke in den Schlund, gleich wie die Kiemenspalten der Grätenfische. Bei den Petromyzen dagegen öffnen sich die 7 inneren Kiemenlöcher in einen vor der Speiseröhre liegenden, am Ende blinden, vorn mit dem Munde zusammenhängenden Bronchus.

Digitized by Google

Die Froschlarven haben in ihren auf der rechten Seite ganz, auf der linken Seite bis auf ein kleines Loch bedeckten Kiemenhöhlen 4 mit Kiemenblättchen versehene Kiemenbogen. In die Kiemenhöhlen brechen auch die vorderen Extremitäten hervor. Die Salamanderlarven haben bei äusseren Kiemen 4 Kiemenspalten. Unter den Proteideen hat Siren 3, Proteus 2, Axolotl 4 Kiemenspalten, beim letzten ist die erste Spalte zwischen dem häutigen Kiemendeckel und 1. Bogen; der 4. Bogen ist angewachsen. Alle Proteideen haben wie die Salamander keine innere, aber 3 äussere Kiemenbüschel, von Kiemenbogen ausgehend. Bei dem Proteus sind nach Rusconi die Kiemenarterien die Aeste des Truncus arteriosus, die Kiemenvenen vereinigen sich zu dem Arteriensystem des Körpers, aber die Kiemenarterien anastomosiren auch mit den Wurzeln des Arteriensystems. Ebenso bei den Larven der Salamander, so dass die Kiemengefässe gleichsam Aeste von Aortenbogen sind, auf welche sich die Blutbewegung nach dem Verluste der Kiemen zurück zieht. Die Kiemenarterien und Venen der Froschlarven verlaufen in entgegengesetzter Richtung, anastomosiren aber auch mit einander. Vergl. oben pag. 170. Die Proteideen und die Frosch- und Salamanderlarven in der spätern Zeit athmen ausser dem Wasser durch Kiemen auch Luft durch die Lungen.

3. *Kiemendecken.* Bei den Grätenfischen sind die Kiemen durch die Deckelstücke, welche dem Quadratbein verbunden sind, gemeinschaftlich gedeckt. Bei den Haifischen und Rochen, wo die Kiemen bis auf blosse kleine Oeffnungen zwischen 2 Kiemenbogen von der Haut bedeckt sind, giebt es nicht allein an dem Quadratknorpel jene die Kiemendeckelstücke vertretende Knorpelstreifen, sondern mit jedem Kiemenbogen liegt noch unter der Haut ein Knorpelstreifen parallel. Diese bilden eine obere und eine untere Reihe, in welchen gleichsam die Stücke des Kiemendeckels der Gräthenfische multiplicirt sind. Rathke a. a. O. *Tab. III. fig.* 1. 2. Diese äusseren Kiemendeckelknorpel bilden sich bei den Petromyzen zu einem sehr zusammengesetzten äussern Knorpelskelet der Kiemen aus, während das Kiemenbogenskelet bei diesen Thieren in den Scheidewänden der Kiemensäcke fehlt.

Bei den Salamanderlarven, dem Proteus und Axolotl ist eine kiemendeckelartige Platte vorhanden, die aber keine Knochen- oder Knorpelstücke enthält, und die häutige Kiemendecke der Froschlarven, welche die Kiemen bis auf die eine kleine Oeffnung auf der linken Seite bedeckt, ist auch eben bloss membranös. Hieraus geht nun hervor, wie Rathke bewiesen hat, dass die Kiemendeckelstücke am Quadratbein der Fische keinem Knochen bei höheren Thieren entsprechen, sondern den Fischen eigenthümliche Bildungen sind, die am wenigsten mit den Gehörknöchelchen der höheren Thiere verglichen werden können. Dass letztere nicht aus Theilen der Kiemenbogen entstehen, wie Huschke vermuthet hatte, geht aus der Beobachtung von Windischmann hervor, dass der Axolotl Kiemenbogen und doch 2 Gehörknöchelchen (ohne Trommelhöhle) besitzt.

Digitized by Google

Ueber den Bau der Athemwerkzeuge der Amphibienlarven und Proteideen siehe Cuvier *oss. fossil. T.* 5. 2. Humboldt und Bonpland *Beobacht. aus der Zool. Tüb.* 1806. Rusconi, Configliachi *del proteo anguino. Pavia* 1819. J. Mueller's *Beiträge zur Naturgeschichte und Anatomie der Amphibien,* in Tiedemann's *Zeitschr. für Physiologie.* 4. 2. und vergleiche oben pag, 170.

Die Lungen der Amphibien sind eigentlich blosse Säcke, mit zellenförmigen Vorsprüngen im Innern, wodurch die Fläche vermehrt wird. Die Lungen der meisten *nackten* Amphibien haben nur eine häutige, meist sehr kurze Luftröhre, bei den Batrachiern führt der Kehlkopf fast sogleich in die häutigen Bronchien. Die erste Erscheinung von Knorpelstücken in den Bronchien ist bei Dactylethra, wo sie ganz unregelmässig verzweigte und selbst durchlöcherte Platten bilden, ohne alle Aehnlichkeit mit Luftröhrenringen. Knorpelringe kommen an den Bronchien der verwandten Pipa vor. Die Luftröhre der Coecilien enthält schon regelmässige Knorpelringe. Bei den beschuppten Amphibien vergrössert sich die athmende Fläche durch Vermehrung der Zellen im Innern. Die Lungen der Vögel füllen nicht, wie bei den Säugethieren, den grössten Theil der Brusthöhle aus, sondern liegen im hintersten Theil derselben (an den Rippen sogar verwachsen), während Brusthöhle und Bauchhöhle noch nicht durch ein Zwerchfell geschieden sind. Auf der Oberfläche der Lungen befinden sich aber Oeffnungen, welche die Luft aus den Lungen weiter in grosse Zellen um den Herzbeutel her und zwischen den Eingeweiden des Unterleibes führen, so dass man durch die Luftröhre diese Zellen aufblasen kann. Durch Anfüllen der Zellen kann sich indess, wie Kohlrausch (*de avium saccorum aëriorum utilitate Gott.* 1832.) zeigt, der Vogel für den Zweck des Fliegens nicht leichter machen. Diese Zellen stehen sogar durch besondere Oeffnungen mit den hohlen Knochen in Verbindung, so dass die meisten Knochen (mit wenigen Ausnahmen) mit Luft gefüllt sind. Hierdurch ist der Körper des Vogels natürlich leichter, als wenn seine Knochen Mark enthielten. Wenn ein Vogel aus einer bedeutenden Höhe, wo die Luft sehr verdünnt ist, in dichtere Luft sich herabsenkt, so wird die Tension der Luft im Innern seines Körpers sich mit der Tension der Atmosphäre schnell ins Gleichgewicht setzen. Die Lungen der Vögel haben noch das Ausgezeichnete, dass ihre Luftröhrenzweige zuletzt kurze blinde, pfeifenartig neben einander liegende Röhren bilden, deren Wände eine zellige Structur haben. Beim Embryo der Vögel sind diese Röhren noch deutlicher und von einander mehr getrennt mit Endanschwellungen. Siehe Retzius, Froriep's *Not.* 749. Retzius bemerkt auch, dass die Röhrchen bei den Vögeln mit einander communiciren. Die Lungen des Menschen und der Säugethiere sind von jenen wesentlich verschieden gebaut, dass, wie Retzius bemerkt, die feinsten Luftröhrenzweige, ohne Cellulae parietales zu besitzen, in Cellulae terminales führen. Die Zellen communiciren nicht mit einander, sondern nur mit ihren zuführenden Luftröhrenzweigelchen. Nach Reisseisen (*de fabrica pulmonum. Berol.* 1822.) hat in der Lunge des Menschen jede Zelle noch ihre

Digitized by Google

kleine Arterie und Vene, zwischen denen die Capillargefässnetze. Letztere sind äusserst dicht, so dass die Zwischenräume fast kleiner sind als der Durchmesser der Capillargefässe. Eine Lungenzelle ist 20 Mal im Durchmesser grösser als der Durchmesser eines Capillargefässes in den Wänden dieser Zelle. Da der Durchmesser der Lungenarterie $\frac{1}{6}$ kleiner als der Durchmesser der Aorta, der Durchmesser der ersten zu dem der zweiten wie 5 zu 6, so verhalten sich ihre Durchschnitte wie 25 zu 36, oder fast wie 2 zu 3. Verhielten sich die feinen Zweige der Lungenarterienäste zur Lungenarterie so, wie die feinen Zweige der Körperarterien zu der Aorta, so würden die Durchschnitte der Capillargefässe der Lungen $\frac{2}{3}$ des Raums einnehmen, den die Durchschnitte aller Capillargefässe des übrigen Körpers fassen. Diess ist aber sehr unwahrscheinlich, daher man annehmen muss, dass die Raumvermehrung bei der Verzweigung der Körperarterien in einem weit grössern Verhältnisse zunimmt als in den Lungenarterienästen. Das Athmen geschieht durch Contact der Luft und des Blutes, während dieses durch die unzähligen Capillargefässe der Lungenzellen vertheilt vorüber strömt, wobei die kleinsten Theilchen des Bluts der Einwirkung der Atmosphäre auf der ungeheuren Contactsfläche aller Lungenzellen ausgesetzt werden. Die Wechselwirkung geschieht durch die zarten Wände der Capillargefässe nach den Gesetzen, welche schon pag. 242—248 erläutert worden sind.

III. Capitel. Vom Athmen des Menschen und der Thiere.

1. *Vom Athmen in der Luft.*

Die ersten genauen Versuche über das Athmen sind von Lavoisier und Seguin angestellt. Man fand, dass die ausgeathmete Luft mehr Kohlensäure und Wasser enthielt, dass der Gehalt an Sauerstoffgas darin geringer ist, als in der eingeathmeten Luft, und dass die Luft durch das Athmen etwas mehr Sauerstoffgas verliert, als Kohlensäure erzeugt wird. Weil nun ein Maass Sauerstoffgas, das durch Verbindung mit Kohlenstoff Kohlensäure erzeugt, wieder ein Maass Kohlensäuregas bildet, so schloss man, dass der grösste Theil des beim Athmen verschwindenden Sauerstoffgases durch Verbindung mit Kohlenstoff des Blutes in den Lungen Kohlensäure bilde, die frei werde, und der übrige Theil des beim Athmen verschwindenden Sauerstoffgases durch Verbindung mit Wasserstoff des Blutes das ausgeathmete dunstförmige Wasser bilde. Die Menge des durch die Lungen ausgeschiedenen Wassers beträgt bei einem Erwachsenen in 24 Stunden nach dem Mittel der Beobachtungen von Lavoisier, Menzies, Abernethy, Thomson und Hales 7963 Gran. Vergl den Artikel *Ausdünstung* im 2. *Buch.* 4. *Abschn.* 7. *Cap.* Dieses Wasser enthält etwas thierische Materie. Gmelin *Chemie* 4. 1524.

H. Davy athmete fast eine Minute lang (19 Respirationen) 161 Cubikzoll Luft, welche 117 C. Z. Stickgas, 42,4 C. Z. Sauerstoffgas, 1,6 C. Z. kohlensaures Gas enthielten. Hernach enthielt

Digitized by Google

die Luft 111,6 C. Z. Stickgas, 23,0 C. Z. Sauerstoffgas, 17,4 C. Z. kohlensaures Gas. Gilb. *Ann.* 19. 307. In einer Minute wurden also 15,8 C. Z. kohlensaures Gas ausgeschieden. Allen und Pepys haben eine sehr musterhafte Untersuchung des Athmens angestellt. *Phil. Transact.* 1808. 1809. Schweigg. *J. B.* 1. und Meck. *Arch.* 3. 233.

Einathmungen und Ausathmungen geschahen aus und in verschiedene Gasometer. Der 13. Versuch ist von besonderem Interesse. Ein Wassergasometer war das Reservoir der atmosphärischen Luft, welche eingeathmet wurde, Quecksilbergasometer dienten zum Auffangen der ausgeathmeten Luft. Nachdem 11 Quecksilbergasometer mit ausgeathmeter Luft angefüllt waren, fuhr der Athmende so lange fort in dem zwölften zu athmen, bis das Wassergasometer wieder mit frischer Luft gefüllt war. Dann wurden wieder 11 Quecksilbergasometer und später eben so zum dritten Male mit ausgeathmeter Luft gefüllt. Der Versuch dauerte $24\frac{1}{2}$ Min. Die während dieser Zeit eingeathmete Luft betrug 9890, die ausgeathmete 9872 C. Z. Hundert Theile der ausgeathmeten Luft gaben bei der Prüfung 8 Theile Kohlensäure, 13 Sauerstoff, 79 Stickstoff. Hiernach beträgt die ganze Menge der in $24\frac{1}{2}$ Minuten erzeugten Kohlensäure 789,76 C. Z., oder für die Minute 32 C. Z. engl.

Als in dem 14. Versuch 300 C. Z. atmosphärische Luft 3 Minuten lang geathmet worden, betrug die Kohlensäure doch nur 9,5 in 100 Theilen Luft. Häufige Wiederholung der Versuche ergab, dass die eingeathmete Luft mit 0,08 bis 0,085 proc. Kohlensäure beladen ausgeathmet wird, und dass, wenn man das Einathmen derselben Luft so oft als möglich wiederholt, die Menge der erzeugten Kohlensäure nicht über 0,10 in 100 Th. der ganzen Luftmasse beträgt. Während im 13ten Versuch bei $24\frac{1}{2}$ Minuten langem Athmen frischer Luft 789,76 C. Z. oder in der Minute 32 C. Z. Kohlensäure ausgeathmet wurden, wurde (Versuch 14) bei 3 Minuten langem Athmen derselben 300 C. Z. Luft nur $3 \times 9{,}5 = 28{,}5$ C. Z. oder in einer Minute 9,5 C. Z. Kohlensäure gebildet und ausgeathmet. Im Versuch 13 waren in einer Minute $\frac{9890}{24{,}5} = 403$ C. Z. frische atmosphärische Luft durch die Lungen gegangen, im Versuch 14 in einer Minute nur $\frac{300}{3} = 100$ C. Z., also war im Versuch 13 in 1 Minute circa 4 Mal mehr frische Luft durch die Lungen gegangen, als im Versuch 14, und dafür auch 3,3 Mal mehr Kohlensäure als im Versuch 14 gebildet worden.

Allen und Pepys nehmen als Mittel ihrer Beobachtungen Versuch 11 an, wo während 11 Minuten 302 C. Z. engl. (250 franz. C. Z.) Kohlensäure ausgeathmet wurden, was 22,7 franz. C. Z. Kohlensäure auf die Minute beträgt. Sie fanden ferner, dass der Mensch beim Athmen in Sauerstoffgas mehr Kohlensäure als in atmosphärischer Luft erzeuge. So wurden beim Athmen von Sauerstoffgas im Versuch 17 auf 100 Theile Sauerstoffgas 12,0 Kohlensäure erzeugt. Hierbei wurde eine beträchtliche Menge Stickgas entwickelt. Beim mehrmaligen Ein- und Ausathmen derselben atmosph. Luft fanden sie weniger kohlensaures Gas

Digitized by Google

vor, als Sauerstoff verschwunden war, z. B, 86 Stickgas, 4 Sauerstoffgas, 10 kohlens. Gas, da doch 17 Sauerstoffgas verschwunden waren. Diess erklären sie dadurch, dass vom Blut ein Theil des kohlensauren Gases zurückgehalten wurde.

Bei ihren Versuchen mit Meerschweinchen (Meck. *Archiv* 3. 233.) fanden Allen und Pepys, dass beim Athmen von atmosphärischer Luft ein Volum Sauerstoffgas durch ein Volum Kohlensäure ersetzt werde. Beim Athmen von reinem Sauerstoffgas wurde etwas mehr Sauerstoffgas absorbirt als Kohlensäure erzeugt, und durch eine entsprechende Menge Stickgas ersetzt, ebenso beim Athmen eines Gemisches von Wasserstoffgas und Sauerstoffgas, in dem Verhältnisse wie Stickgas und Sauerstoffgas in der atmosphärischen Luft.

Bei einem 20 Jahre später angestellten Versuch mit Tauben, fanden sie, dass in reinem Sauerstoffgas mehr von diesem absorbirt werde, als zur Bildung der ausgeathmeten Kohlensäure verwandt wird.

Dulong (Schweigg. *Journ.* 38. 505.) brachte die Thiere in einen Apparat, zu und von dem beständig Luft zu- und abgeleitet werden konnte, so dass die Veränderungen der Luft quantitativ bestimmt werden konnten. Vergl. den von Allen und Pepys angewandten Apparat (Meck. *Archiv* 3. *Tab.* 5.). Dulong fand, dass alle Thiere, fleisch- und pflanzenfressende, Säugethiere und Vögel, mehr Sauerstoffgas verschwinden machten, als Kohlensäure an dessen Stelle trat. Bei den pflanzenfressenden Thieren betrug die Menge des nicht durch Kohlensäuregas ersetzten Sauerstoffgases im Durchschnitt $\frac{1}{10}$ derjenigen Menge, die durch Kohlensäuregas ersetzt war, bei den Fleischfressern dagegen $\frac{1}{5}-\frac{1}{2}$. Aehnliche Resultate, nämlich einen Verlust von Sauerstoffgas, fand Despretz in seinen schon bei dem Artikel von der thierischen Wärme pag. 86. erwähnten Versuchen. Das erzeugte Kohlensäuregas betrug $\frac{2}{3}-\frac{3}{4}$ vom verschwundenen Sauerstoffgas.

Nach Davy, Pfaff, Berthollet, Allen und Pepys zeigt sich die atmosphärische Luft nach einmaligem Ein- und Ausathmen dem Umfange nach vermindert. Nach Allen und Pepys wäre diese Verminderung, die sie nur $\frac{1}{122}$ fanden, von zufälligen Umständen abzuleiten (?). Wird dieselbe Luftmenge wiederholt ein- und ausgeathmet, bis sie nicht mehr vertragen wird, so zeigt sie eine deutliche Volumsverminderung, nach dem Mittel der Beobachtungen von Lavoisier, Goodwyn. Davy, Allen und Pepys, Pfaff $\frac{1}{24}$. Gmelin's *Chemie* 4. 1525.

Gmelin hat die Resultate der verschiedenen Analysen von Davy, Berthollet, Allen und Pepys, Menzies, Prout zusammengestellt. Zieht man aus diesen Resultaten das Mittel, so ergiebt sich, dass 100 Theile einmal eingeathmete Luft nach dem Ausathmen 5,82 kohlensaures Gas enthalten, Nach Prout's Versuchen (Meckel's *Archiv* 2. 145. Schweigg. *Journ.* 15. 47.) ist die Menge der ausgeathmeten Kohlensäure am grössten zwischen 11 Uhr Morgens und 1 Uhr Mittags, das Minimum dagegen von $8\frac{1}{2}$ Uhr Abends bis $3\frac{1}{2}$ Uhr Morgens. Wenn die Menge der gebildeten Kohlensäure aus irgend einem Grunde vermehrt wird,

Digitized by Google

so sinkt sie nachher in demselben Maasse unter den einer gewissen Periode angemessenen Grad herab. Die Menge der gebildeten Kohlensäure nimmt bei demselben Menschen ab in deprimirenden Leidenschaften, nach heftigen Bewegungen, beim Genuss von weingeistigen Flüssigkeiten, von Thee, bei vegetabilischer Nahrung und nach längerem Gebrauch von Quecksilber. Dagegen wird die relative Menge der durch das Athmen gebildeten Kohlensäure durch einen niedern Barometerstand vermehrt. Wegen Krankheiten siehe Nysten a. a. O.

Berechnet man die Menge des durch das Athmen entstehenden Kohlensäuregases auf 24 Stunden, so beträgt diess nach Lavoisier und Seguin 14930 C. Z. oder 8534 Gran franz., nach Davy 31680 C. Z. engl. oder 17811 Gr. engl., nach Allen und Pepys 39600 C. Z. oder 18612 Gran engl. Diess beträgt an auf Kohlensäurebildung verwandtem, und also aus dem Blut weggegangenem Kohlenstoff nach Lavoisier 2820 Gran franz., nach Davy 4853 Gran engl., nach Allen und Pepys 5148 Gr. engl. Nach Berzelius Bemerkung sind diese Resultate indess offenbar viel zu gross. Denn da die feste Nahrung an $\frac{3}{4}$ ihres Gewichtes Wasser und das andere $\frac{1}{4}$ selten mehr als sein halbes Gewicht Kohlenstoff enthält, so wären schon $6\frac{1}{4}$ Pfund fester Nahrung nöthig, um die Quantität Kohlenstoff zu ersetzen, die in 24 Stunden durch das Athmen ausgeschieden wird, abgesehen von anderen Excretionen.

Ueber das Athmen der Frösche habe ich mehrere Versuche angestellt. Die Frösche wurden bei zusammengepressten Lungen und Kehle in einen mit Quecksilber gesperrten graduirten Cylinder gebracht, und die Quantität der erzeugten Kohlensäure durch eingebrachtes Kali causticum an der Absorption des Gases gemessen.

1) Ein Frosch von 440 Gran Gewicht bildete in 6 Stunden in einem Cylinder von 10 C. Z. atmosphärischer Luft $\frac{2}{3}$ C. Z. Kohlensäure.

2) Ein Frosch von 655 Gran bildete in 8 C. Z. atmosph. Luft $1\frac{1}{4}$ C. Z. Kohlensäure in 12 Stunden, bei 27 Z. $9\frac{1}{2}$ L. Luftdruck und 10° R.

3) Ein sehr grosser Frosch von 1260 Gran bildete in $16\frac{5}{6}$ C. Z. atmosph. Luft in 14 Stunden 2 C. Z. Kohlensäure bei 27 Z. 7 L. Luftdruck und 6° R. Diess beträgt auf 28″ Barometerstand und 15° R. Temperatur und 6 Stunden Athmen reducirt.

Im ersten Versuch auf 440 Gran Thier in 6 Stunden 0,66, im zweiten Versuch auf 655 Gran Thier in 6 Stunden 0,63, im dritten Versuch auf 1260 Gran Thier in 6 Stunden 0,88 C. Z. Kohlensäure.

Ich habe diess wieder auf 100 Gran Thier und 100 Min. Athmen reducirt, und mit Versuchen von Treviranus (*Zeitschrift für Physiologie* 4. 1. p. 23.) an Kröten und Fröschen zusammengestellt, wobei Treviranus die Luftmenge auf 15° R. Temp. und 28″ Luftdruck berechnet und auf 100 Gran Thier und 100 Minuten Athmen reducirt hatte.

Digitized by Google

Arten der Thiere.	Beobachter.	P. C. Z. Kohlens. für 100 Gr. Thier und 100 Min. Athmen.
Bufo cinereus A. . .	Treviranus	0,02
Bufo cinereus B. . .	Treviranus	0,03
Rana temporaria A. .	Treviranus	0,10
Rana temporaria B. .	Treviranus	0,14
Frosch A.	Müller	0,041
Frosch B.	Müller	0,027
Frosch C.	Müller	0,019
Mittel		0,039

Es folgt als Mittel von 7 Beoachtungen, dass 100 Gran Kröte oder Frosch in 100 Minuten 0,04 Kohlensäure durch Athmen bilden. Nach Edward's (*influence des agens physiques sur la vie. Paris* 1824. *p.* 648.) bildete ein Frosch Kohlensäure in 24 Stunden einmal 5,24 Centil. bei 27° C. = 2,55 P. C. Z. bei 15° R.; ein andermal 2,57 Centil. bei 18° C. = 1,30 C. Z. bei 15° R.; ein andermal 2,44 Centil. bei 14° C. = 1,25 C. Z. bei 15° R. Diess macht in 6 Stunden 0,63 C. Z. 0,32 C. Z. 0,31 C. Z. Diess mit den 3 Beobachtungen von mir zusammengestellt, giebt für 6 Stunden folgende Quantitäten Kohlensäure:

0,66 C. Z.
0,63 »
0,88 »
0,63 »
0,32 »
0,31 »

Mittel 0,57 C. Z.

Treviranus Versuche an 2 jungen Fröschen lasse ich ausser der Berechnung. Also bildet ein erwachsener Frosch in 6 Stunden etwas mehr als $\frac{1}{2}$ C. Z. Kohlensäure.

Treviranus hat die Resultate einer ganz vortrefflichen Arbeit über das Athmen der niederen Thiere auf gleiche Verhältnisse, nämlich auch auf 15° R. und 28″ Luftdruck, 100 Gran Thier und 100 Minuten Athmen reducirt, wodurch man eine sehr interessante Zusammenstellung gewinnt. Hieraus geht nun hervor, dass die wirbellosen Thiere, Insekten und Mollusken und Würmer, im Verhältniss zu ihrer Masse, nicht weniger Kohlensäure bilden, als die Amphibien. Treviranus hat auch die an Säugethieren und Vögeln von anderen Beobachtern angestellten Versuche auf 100 Gran Thier und 100 Minuten Athmen berechnet, woraus folgende Tabelle entstanden ist.

Digitized by Google

Thiere.	Beobachter.	Excernirtes kohlens. Gas.	Absorbirtes Sauerstoffgas.
Meerschweinchen	Bertrollet	0,42 C. Z.	0,67 C Z.
—	Allen u. Pepys	0,60	0,74
—	Despretz	0,47	0,68
Kaninchen . . .	Bertrollet	0,44	0,60
Katze	Despretz	0,66	0,98
Taube	Despretz	0,99	1,58
—	Allen u. Pepys	0,96	1,14

Zieht man aus diesen Daten das Mittel, so bilden 100 Gran Säugethier in 100 Minuten 0,52 C. Z. Kohlensäuregas, 100 Vogel in 100 Min. 0,97 C. Z. Kohlensäuregas. Da nun 100 Gran Krote oder Frosch in 100 Minuten 0,05 C. Z. Kohlensäuregas bilden, so bildet ein Gewichtstheil eines kaltblütigen Thiers, und zwar Amphibiums, in gleicher Zeit 10 Mal weniger Kohlensäuregas, als ein gleicher Gewichtstheil Säugethier, und 19 Mal weniger Kohlensäuregas, als ein gleicher Gewichtstheil Vogel. Bei Insekten hat Treviranus in den meisten Fällen sogar eine eben so starke Kohlensäurebildung gefunden, als sie bei Säugethieren stattfindet, obgleich sie in einigen Fällen sich den Verhältnissen der Amphibien nähert. Treviranus erklärt die Kaltblütigkeit dieser Thiere trotz ihrer starken Kohlensäurebildung aus der bei ihnen stattfindenden Aushauchung von Stickgas, wobei Wärme wieder latent werde.

Wenn man diese Menge bei Insekten auch für allzu gross hält, und diese Thiere wegen der Kleinheit und Trüglichkeit der Resultate ausser der Berechnung lässt, wenn man bloss die Amphibien mit Säugethieren vergleicht, so kann man doch mit einiger Wahrscheinlichkeit die Temperatur der Säugethiere und die Kaltblütigkeit der Amphibien nicht davon ableiten, dass ein Gewichtstheil eines Frosches in einer Zeit 10 Mal weniger Kohlensäure bildet, als ein gleicher Gewichtstheil Säugethier. Vgl. p. 87.

Es scheint nach den mehrsten Beobachtungen unzweifelhaft, dass beim Athmen weniger Kohlensäure gebildet wird, als Sauerstoffgas verschwindet. Nur Allen und Pepys hatten diess beim Athmen in atmosphärischer Luft nicht beobachtet. Indessen haben sie die geathmete Luft für kohlensäurefrei genommen, was sogleich schon einen bedeutenden Unterschied im Resultate macht. Nach Treviranus Versuchen an niederen Thieren ist die Erzeugung des kohlensauren Gases abhängig von der Temperatur des Mediums. Eine Honigbiene excernirte beinahe 3 Mal so viel Kohlensäure bei 22° als bei $11\frac{1}{2}$°. Im Allgemeinen athmeten die Thiere in freier Luft weniger Kohlensäure aus, als sie Sauerstoffgas absorbiren. Die kaltblütigen Thiere sollen oft 3 Mal so viel Sauerstoffgas verzehren, als sie Kohlensäure bilden.

Mollusken verzehren aber nicht allein alles Sauerstoffgas einer Luft, sondern fahren nach dieser Absorption noch fort Kohlensäure auszuhauchen. Allgemein wurde in Treviranus Unter-

Digitized by Google

suchungen Stickgas ausgeschieden, in einigen Versuchen selbst mehr als Kohlensäuregas.

Bei den höheren Thieren hat man zuweilen eine Absorption von Stickgas der Atmosphäre, zuweilen Aushauchung von Stickgas beobachtet.

1) H. Davy (Gilb. *Ann.* 19. 298.) glaubte beobachtet zu haben, dass beim Athmen Verminderung des Stickstoffgehaltes der Atmosphäre stattfinde, welche nach Davy $\frac{1}{17}$ des absorbirten Sauerstoffgases, und in 24 Stunden 2246 Gran engl. betragen soll. Auch Pfaff (Gehlens *Journ. der Chemie.* 5. 103.) hat eine Verminderung des Stickgases von $\frac{1}{80} - \frac{1}{107}$ der eingeathmeten Luft beobachtet. Gmelin's *Chemie.* 4. 1524.

2) Andere, wie Allen und Pepys, bemerkten weder eine Vermehrung, noch Verminderung des Stickgases beim Athmen der atmosphärischen Luft.

3) Mehrere Beobachter haben beim Athmen in atmosphärischer Luft Vermehrung des Stickstoffgehaltes der Luft beobachtet, wie Berthollet, Nysten, Dulong und Despretz. Am entscheidensten erscheint diess Resultat in Despretz Versuchen, der die Aushauchung von Stickgas gewöhnlich, aber bei Pflanzenfressern stärker als bei Fleischfressern fand. Diess Letztere ist deswegen unerklärlich, weil die Pflanzenfresser stickstoffärmere Nahrung als die Fleischfresser geniessen. Despretz fand, dass die Aushauchung von Stickgas $\frac{1}{7} - \frac{11}{7}$ von demjenigen Sauerstoffgas ausmacht, welches beim Athmen verschwindet, ohne auf Kohlensäure verwandt zu werden. Am entscheidendsten liesse sich die Aushauchung von Stickgas in einer Luft ermitteln, die kein Stickgas enthält. So fanden Allen und Pepys allerdings, dass Meerschweinchen, die in Sauerstoff oder einem Gemenge von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas athmeten, Stickgas aushauchten. Diess Stickgas konnte nicht schon vorher in den Lungen gewesen seyn. Denn in Allen und Pepys Versuchen war die Menge des ausgehauchten Stickgases grösser als das Volum des athmenden Thiers. Aus diesen Versuchen scheint also hervorzugehen:

4) dass beim Athmen in atmosphärischer Luft Stickgas sowohl aus der Luft an das Blut treten, als Stickgas aus dem Blut frei werden kann, und dass man die Aushauchung des Stickgases deswegen nicht bemerkt, weil sie von der Absorption von Stickgas der Luft compensirt wird, und dass sie erst beim Athmen in stickstofflerer Luft bemerklich wird. Edwards (*Ann. de chim. et de phys.* 22. 35.) erklärt aus der Ungleichheit der Aushauchung von Stickgas und der Aufnahme desselben die Ungleichheit in den Resultaten der Beobachter. Collard de Martigny (*J. d. physiol.* 1830.) fand eine Vermehrung des Stickstoffs beim Ausathmen, wie denn Collard auch eine Exhalation von Stickgas durch die Haut beobachtete. Da nun Stickgas, wie alle Gase, von den nassen thierischen Häuten und von der äussern Haut absorbirt wird, so nimmt Collard an, dass Absorption und zugleich Exhalation von Stickgas in den Lungen stattfinde, dass letztere aber grösser sey. Berzelius (*Jahrb.* 4. 217.) widersetzt sich der Vorstellung

Digitized by Google

von gleichzeitiger Exhalation und Aufsaugung von Stickgas, weil sie ungereimt sey.

2) *Vom Athmen im Wasser.*

Was den zuletzt berührten Gegenstand noch verwickelter macht, ist, dass die Fische nach A. v. Humboldt und Provençal auch ziemlich viel Stickgas aus dem Wasser absorbiren. Sie liessen in 4000 Cubikcentimeter Wasser 8 Stunden 30 Min. athmen. Vor dem Athmen enthielten 2582 Th. dieses Wassers 524 Th., nach demselben 453 Th. Luft. Den Verlust von 71 Th. halten sie für Wirkung der Respiration, und berechnen das Maass des excernirten und absorbirten Gases nach dem Unterschiede dessen, was vor dem Athmen in den 524 und nach dem Athmen in den 453 Theilen enthalten war. In jenen fanden sie 155,9 Sauerstoffgas, 347,1 Stickgas, 21,0 kohlensaures Gas; in diesen 10,5 Sauerstoffgas, 289,3 Stickgas, 153 kohlensaures Gas. Hiernach wären beim Athmen 145,4 Sauerstoffgas nebst 57,6 Stickgas absorbirt und 132 kohlensaures Gas excernirt. Treviranus vermuthet indess, dass die nach dem Athmen fehlenden 71 Theile Luft mit verschlucktem Wasser in den Magen gekommen seyen. Indessen haben v. Humboldt und Provençal doch keinen Verlust von Wasserstoffgas beobachtet, als sie Fische in luftleerem, bloss mit Wasserstoff und Sauerstoff künstlich geschwängertem Wasser athmen liessen. Schweigg. *J.* 1. *p.* 111.

Man sieht übrigens aus den von Humboldt und Provençal angestellten Versuchen, dass auch die Fische mehr Sauerstoffgas absorbiren, als Kohlensäure ausathmen. Die Kohlensäure beträgt höchstens $\frac{4}{5}$ des verschwundenen Sauerstoffs und oft nur $\frac{1}{2}$ desselben.

Nach den Untersuchungen von Humboldt und Provençal befinden sich die Fische in den Flüssen in Rücksicht auf den Sauerstoffgehalt der umgebenden Flüssigkeit in der nämlichen Lage, wie ein in einem Gasgemeng, welches weniger als 0,01 Sauerstoff enthält, athmendes Thier. Denn die im Wasser aufgelöste Luft geht nie über 0,027 des Volums des Wassers, und 0,51 von der aufgelösten Luft sind reiner Sauerstoff. Nach Treviranus Reduction der Beobachtungen von Humboldt und Provençal bilden 100 Gr. Schleihe beim Athmen 0,01 C. Z. Kohlensäure, in 100 Minuten, während 100 Gran Säugethier, wie wir oben gesehen, 0,52 bilden, also circa 50 Mal weniger in gleicher Zeit. Die Fische absorbiren nicht allein mit den Kiemen, sondern mit der ganzen Oberfläche Sauerstoffgas, wogegen sie Kohlensäure erzeugen. Diess geschieht im lufthaltigen Wasser, aber nicht in der freien Luft. Humboldt brachte den Kopf von Fischen in Halsbänder von Korkholz mit Wachsleinwand überzogen. Der Fisch wurde dann in ein cylindrisches Gefäss gebracht, so dass der Kork den Pfropf bildete, und Kopf und Kiemen nicht mit dem Seinewasser des Gefässes in Berührung waren. Die Fische lebten an 5 Stunden und veränderten das Wasser durch ihre Haut auf die bei dem Athmen gewöhnliche Art. Die Fische athmen mit den Kiemen, so lange sie nass sind, auch in freier Luft, und absorbiren nicht mehr und nicht weniger Sauerstoff, als in lufthaltigem Wasser.

Digitized by Google

So reducirte eine Schleihe in 19½ Stunden ein Gasvolumen von 133,9 Cub. Centimet. atmosphärischer Luft auf 122,9, und der Fisch hatte 0,52 Cub. Cent. Sauerstoffgas absorbirt. Hieraus ergiebt sich, dass das Athmen im Wasser sich weniger wesentlich vom Athmen in der Luft unterscheidet, als es auf den ersten Blick scheint. Zum Athmen in der Luft ist auch eine nasse innere Oberfläche der Lungen nöthig. Cobitis fossilis, der sich viel im Schlamm aufhält, verschluckt nach Erman Luft an der Oberfläche des Wassers, wonach die Luft im Darmkanal die beim Athmen gewöhnliche Veränderung erleidet, und die veränderte Luft durch den Darmkanal wieder entleert wird *).

Viele Thiere, welche durch Kiemen Wasser athmen, erzeugen durch die Kiemen merkwürdige Bewegungen in dem Wasser. Diese Bewegungen sind zuerst bei den Salamanderlarven von Steinbuch (*Analecten zur Naturkunde. Fürth* 1802.) beschrieben und vollständig dargelegt, später von Sharpey (Froriep's *Not. N.* 618.) weiter verfolgt, und an mehreren Thieren beobachtet worden.

---

*) Die Schwimmblase der Fische enthält zwar auch sauerstoffhaltige Luft, allein diese Luft dringt nicht von aussen herein, sondern wird von der innern Oberfläche des Organes selbst abgesondert. Die darin enthaltene Luft enthält bald mehr, bald weniger Sauerstoffgas oder Stickgas als die atmosphärische Luft. Sauerstoffarme Luft fand darin Erman bei Landseefischen. Gilb. *Ann.* 30. 113, Dagegen fand Biot (Gilb. *Ann.* 26, 454.) bei Fischen, die in einer grossen Meerestiefe leben, in der Schwimmblase derselben eine Luft, die 69—87 proc. Sauerstoffgas enthielt, während das Meerwasser in der Tiefe nur 29 Sauerstoff u. 71 Stickstoff enthielt. Sonst ist der Luftgehalt bei derselben Fischart sehr veränderlich. Im Frühling und Sommer soll die Luft sauerstoffärmer als im Herbst seyn. Bisweilen fehlt das Sauerstoffgas gänzlich. Vergl. Delaroche Schweigg. *J.* 1. 161. Configliachi ebend. 137. Nach A. v. Humboldt und Provençal ist das mittlere Resultat einer grossen Menge von Versuchen über die Luft in der Schwimmblase der Karpfen 0,071 Sauerstoff, 0,052 Kohlensäure, 0,877 Stickstoff. Fische, denen man die Schwimmblase exstirpirt hatte, brachten beim Athmen nicht $\frac{1}{100}$ Kohlensäure hervor, obwohl sie viel Sauerstoff und Stickstoff absorbirten. Bei vielen Fischen communicirt die Schwimmblase durch einen Gang mit dem Schlunde, wie beim Karpfen. Die Oeffnung dieses Ganges ist zuweilen weit, beim Karpfen aber so eng, dass durch ihn keine Luft aufgenommen und vielleicht nur bei grosser Ausdehnung der Blase etwas ausgeschieden werden kann. Bei vielen Fischen fehlt diese Verbindung. Diese haben gewöhnlich ein rothes, gefässreiches, eigenthümliches Gewebe in den Wänden der Schwimmblase zur Absonderung der Luft, die auch in den Fischen mit Luftgang wahrscheinlich abgesondert wird; bei vielen Fischen fehlt die Schwimmblase ganz. Der Aal hat den Luftgang und jenes drüsige Gewebe. Bei den Sciaenen hat die Schwimmblase viele blinde hohle Fortsätze, die in einigen Arten verzweigt sind. Cuvier *hist. nat. des poiss. tab.* 138. 139. Bei mehreren Fischen der Gattungen Cyprinus, Cobitis, Sparus, Clupea existirt eine von E. H. Weber entdeckte Verbindung der Schwimmblase mit dem Gehörorgan, wovon später. Wenn die Schwimmblase der Fische zerrissen ist, so verlieren sie nicht immer und nothwendig das Gleichgewicht, sie fallen nicht immer auf die Seite. Wahrscheinlich ist ihre Luft bestimmt von Zusammendrücken der Bauchwände und Ausdehnung das specifische Gewicht des Fisches zu ändern. Vergl. G. Fischer *über die Schwimmblase der Fische. Lpz.* 1795. G. R. Treviranus *vermischte Schriften.* 2. *Bd.* 156.

Digitized by Google

Die Strömungen kommen auch an den primitiven äusseren Kiemen der Froschlarven, aber nicht an ihren späteren, inneren Kiemen, und eben so wenig an den Kiemen der Fische vor, welche das Wasser durch die Bewegung der Kiemendeckel erneuern. An den Kiemen der Muscheln und Anneliden dagegen sind die Strömungen allgemein.

Bei der Miessmuschel, Mytilus edulis, streicht das Wasser am hintern Ende des Thiers ununterbrochen in die Kiemenhöhle ein, und unfern desselben Orts durch eine besondere Oeffnung wieder aus.

Die Strömungen, welche die letzten Thiere erregen, rühren von den Bewegungen ihrer Wimpern her. Purkinje und Valentin haben die Wimpern aber auch an den Salamanderkiemen, ja sogar die Wimperbewegungen in allen Schleimhäuten der Amphibien, Vögel, Säugethiere (mit Ausnahme der Schleimhaut des Darms, der Harnwerkzeuge und männlichen Geschlechtstheile) entdeckt. Mueller's *Archiv.* 1834. *p.* 391. 1835. 128. 159. Purkinje *et* Valentin *de phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continui in membranis cum externis tum internis animalium plurimorum. Wratisl.* 1835.

3. *Vom Athmen der Thiereier.*

Die Embryonen der Batrachier, der Haien und Rochen, und des Schwertfisches besitzen selbst äussere Kiemen im Foetuszustande zum Athmen des Wassers.

Mehrere Beobachtungen beweisen, dass die Eier der eierlegenden Thiere bei ihrer Entwickelung die Luft so verändern, wie erwachsene Thiere, und ohne atmosphärische Luft und lufthaltiges Wasser sich nicht entwickeln. So verdirbt der Embryo des Vogeleies, wenn das Ei mit einem Firniss oder Oel überzogen wird. Nach Michellotti's Versuchen mit Insekteneiern zersetzten diese während der Entwickelung die Luft, doch nur bei + 15° bis 20°, während sie unter 0 die Atmosphäre nicht verändern. In irrespirabeln Gasarten findet keine Entwickelung statt. Pfaff und Friedlaender *Französ. Ann.* 4. *H.* 48. Burmeister *Entomologie* 365. Vogeleier entwickelten sich im warmen Wasser nicht und eben so wenig nach Viborg's Versuchen in irrespirabeln Gasarten. *Abhandl. für Thierärzte und Oeconomen.* 4. 445. Dagegen will Erman (*Isis* 1818.) beim Bebrüten von Eiern in irrespirabeln Gasarten Entwickelung beobachtet haben. Schwann (*de necessitate aëris atmosph. ad. evol. pulli in ovo. Berol.* 1834. Mueller *Archiv.* 1835. *p.* 121.) hat dagegen mit sehr genauen Versuchen diejenigen von Viborg bestätigt. Er hat gezeigt, dass bei der Bebrütung von Hühnereiern in sauerstofffreien Gasarten zwar die Vergrösserung der Keimhaut, die Trennung in ein seröses und Schleimblatt, die Bildung der Area pellucida vor sich gehen, aber weder das Blut noch der Embryo gebildet wird. Eier, welche 24 Stunden in Wasserstoffgas bebrütet waren, entwickelten sich bei Fortsetzung der Bebrütung in atmosph. Luft weiter, dagegen die 30 Stunden und darüber in Wasserstoffgas bebrüteten Eier sich in der atmosph. Luft nicht weiter entwickelten.

Da die atmosphärische Luft durch die Poren der Eischale

Digitized by Google

freien Zutritt hat, so ist es fast unmöglich, dass nicht eine Wechselwirkung zwischen dem Blute in den Gefässen der Allantoisblase des Vogeleies und der Luft stattfinde, ja es scheint sogar der Hauptzweck der Allantoide zu seyn, eine Gefässentwickelung möglichst nahe an die Oberfläche zu bringen. In den Eiern der Vögel verdunstet beständig Wasser aus dem Eiweiss, mögen die Eier bebrütet werden oder nicht. Diese Ausdünstung scheint in beiden Fällen ziemlich gleich zu seyn, und durch diese Ausdünstung des Wassers vermindert sich das Volum des Eiweisses in beiden Fällen, und weicht, je älter ein Ei wird, immer mehr von dem stumpfen Theil der Eischale zurück. Hierdurch entsteht ein Raum, der durch die Poren der Schale mit atmosphärischer Luft gefüllt wird. Bischof fand in dieser Luft mehr Sauerstoffgas als in der atmosphärischen Luft, indem es in verschiedenen Eiern von 22 bis $24\frac{1}{4}$ proc. vom Volum der Luft variirte. Schweigg. *J. N. R.* 9. 446. Dulk fand in dieser Luft $25\frac{1}{4}$—$26\frac{3}{4}$ Sauerstoffgas, beim Bebrüten nahm der Sauerstoffgehalt bis auf 17,9 proc. ab, und es fanden sich dafür 6 proc. Kohlensäuregas. Schweigg. *J.* 1830. 1. 363. Berzelius *Jahresb.* 11. 336.

Die erste Entwickelung des Eies der Säugethiere ist nicht allein ohne atmosphärische Luft, sondern selbst vor der Verbindung des Eies mit dem Uterus der Mutter möglich, wenn das Ei noch bloss von den Secreten des Uterus umgeben ist. Die Eier der Säugethiere athmen im gewöhnlichen Sinn des Wortes nicht, sondern dieser Process ist durch die Verbindung mit der Mutter ersetzt. Nach E. H. Weber's schönen Beobachtungen sind die Zotten der Placenta des Menschen, auf welchen die feinsten Zweigelchen der Nabelarterien in die feinsten Zweigelchen der Nabelvene übergehen, wie Quasten oder Franzen in die sehr dünnhäutigen venösen Sinus des Uterus der Mutter, welche zwischen den Läppchen der Placenta verlaufen, eingesenkt, und werden von dem Blute der Mutter umspült. Dagegen findet diese Umspülung bei den wiederkäuenden Thieren mit zerstreuten Placenten oder Cotyledonen nicht statt, sondern die Zotten der Cotyledonen stecken in scheidenartigen Vertiefungen des Uterus ganz lose inne, gleichsam wie Wurzeln im Boden. Diese Scheiden sind auf ihren Wänden bloss mit den Capillargefässen der mütterlichen Gefässe ausgekleidet, und es wird hier in diesen Scheiden wie auf der ganzen innern Fläche des Uterus eine weissliche Materie abgesondert. Eine Communication der Gefässhöhlen der Mutter und des Kindes findet übrigens hier so wenig wie beim Menschen statt.

Dass in der Placenta eine das Athmen der übrigen Thiereier ersetzende Function stattfinde, ist wahrscheinlich aus der tödtlichen Folge, welche die Unterbrechung des Blutlaufs in den Nabelgefässen hat, ferner aus dem Umstand, dass eben das Athmen zur Entwickelung der übrigen Thiereier nöthig ist und durch die Allantoide geschieht, welche dieselben Gefässe erhält, wie das Chorion des Menschen und der Säugethiere, Vasa umbilicalia, und weil endlich in einer und derselben Thierklasse lebendig gebärende und eierlegende Thiergattungen zugleich vorkommen. So entwickeln

Digitized by Google

sich die Eier der meisten Eidechsen und Schlangen in der Luft, die Eier der Lacerta crocea, der Blindschleiche und der Vipern im Eierleiter. Ja selbst in den Eiern der Eidechsen hat die Entwickelung des Embryo längst begonnen, wenn die Eier gelegt werden. Es scheint also, dass der Eierleiter, in dem die Eier der Vipern ohne nähere Verbindung mit der Mutter sich entwickeln, durch Absonderung eigenthümlicher Flüssigkeiten gleichsam das Athmen der übrigen Amphibieneier ersetze. Hiefür spricht, dass die Eischalenhaut der Lacerta crocea und der Vipern ein zartes Häutchen ist, während sie bei den eierlegenden Eidechsen und Schlangen sehr fest ist. v. Baer, Meck. *Arch.* 1828. 573. Unter den nackten Amphibien giebt es auch eierlegende und lebendig gebärende; die meisten legen Eier, der Erdsalamander brütet seine Eier im Eierleiter aus und gebiert lebendige Junge. Nun haben aber sowohl die einen als die andern schon im Foetuszustande äussere Kiemen. Bei den Fröschen und Kröten scheinen sie auf den Foetuszustand berechnet zu seyn; denn sie verschwinden sehr bald nach dem Auskriechen aus dem Ei, und an ihre Stelle treten innere Kiemen, während die äusseren Kiemen bei den Tritonen und Salamandern durch den Larvenzustand bleiben. Noch merkwürdiger sind aber die bei den Haifischen und Rochen vorkommenden Verhältnisse. Alle diese Thiere besitzen äussere Kiemenfäden im Fötuszustande. Siehe Leuckart *Untersuchungen über die äusseren Kiemen der Embryonen von Rochen und Haifischen. Stuttg.* 1836. Auch diese Thiere werden zum Theil ausser der Mutter, zum Theil im Eierleiter ausgebrütet; unter den Rochen ist die Gattung Raja, unter den Haifischen die Gattung Scyllium eierlegend. Die Zitterrochen Torpedo und die übrigen Haifische gebären lebendige Junge. Bei einer Gattung der Haifische, wohin der γαλεὸς λεῖος des Aristoteles gehört, findet sogar eine Verbindung des Dottersacks mit der Wand des Uterus statt, indem der ganz faltige Dottersack wie die Zotten der Cotyledonen des Wiederkäuer-Fötus zwischen die Falten eines mütterlichen Cotyledo des Uterus fest eingeschoben ist. Der Dottergang dieser Haifischgattung ist auch mit Zotten besetzt, zu einer Zeit, wo die äusseren Fötuskiemen schon ganz verschwunden sind *). Alles diess zeigt, dass die Bedingungen, unter welchen sich der Fötus der eierlegenden und lebendig gebärenden Thiere entwickelt, nicht sehr verschieden sind; und hierauf beruht die Supposition, dass die Placenta der Säugethiere das Athmen ersetze; jedoch ein merklicher Unterschied der Farbe zwischen dem Blute der Nabelarterien und dem Blute der Nabelvene findet bei dem Menschen und

*) Aristoteles und Stenonis haben diese Verbindung gekannt. Sie kömmt, wie ich an einem andern Orte zeigen werde, bei einer eigenen Gattung vor, die keine Spritzlöcher hat, aber weder Carcharias noch Lamna ist. Ihre Zähne unterscheiden sich von denen der Carcharias dadurch, dass sie nicht gezähnelt, sondern nur schneidend sind. Cuvier giebt von den Carcharias an, dass ihr Dottersack fest am Uterus anhänge, und dass ihr Dottergang mit Zotten besetzt sey. Aber ich finde den Dottergang der Carcharias ohne Zotten, und weiss nicht, ob auch diese die Verbindung haben.

Digitized by Google

den Säugethieren nicht statt. Einen solchen Unterschied haben Haller, Hunter und Osiander nie beobachtet. Autenrieth und Schuetz (*exp. circa calorem foetus et sanguinem. Tub.* 1795.) haben bei Kaninchen nie einen Unterschied der Farbe bemerken können. Eben so wenig Emmert bei Meerschweinchen. Reil's *Arch.* 10. 122. Dagegen an den Gefässen des Chorions der Vögel nach Blumenbach und Emmert einiger Unterschied der Farbe statt finden soll. Freilich wollten Herissant und Diest (Haller *Disp. V. p.* 516. 526.) und Baudelocque (Bichat *anat. gén.* 2. 465.) einen Unterschied bemerkt haben. Bichat erklärt sich einmal dagegen, *l. c. p.* 343. Ein andermal sagt er, dass der Unterschied bei Meerschweinchen nicht gross sey, *l. c. p.* 465. Auch ich habe bei Kaninchen, Meerschweinchen und Katzenfötus schon früher niemals einen Unterschied bemerken können. Und doch sind kleinere Thiere hier eben so gut, ja noch besser zu Beobachtungen geeignet, als grössere Thiere. Ich habe zwar auch zur selben Zeit, da ich als Studirender mich für jenen Gegenstand interessirte, einst bei Vivisection eines hochträchtigen Schaafes einen solchen Unterschied zu bemerken geglaubt, und andere Umstehende glaubten es auch, und Joerg will am Chorion des Pferdes einen Unterschied bemerkt haben. Joerg *die Zeugung. Leipz.* 1815. 273. Allein meine späteren Beobachtungen sind jener einen vom Schaaf nicht günstig, sondern stimmen mit den von mir an kleineren Thieren früher gemachten Erfahrungen. Da in Bonn viel weibliche Schaafe geschlachtet werden, so kann man in der ersten Winterhälfte jederzeit Eier von den Schaafen (selbst von Kühen) mit sammt dem Uterus erhalten und man erhält sie oft noch warm. Regelmässig wurden mir im Winter solche Früchte zu anatomischen Zwecken zugebracht, und nie habe ich wieder einen deutlichen Unterschied wahrnehmen können. Auch nach E. H. Weber (*Anat.* 4 524.) findet kein Unterschied beider Blutarten beim Fötus statt, und die Geburtshelfer haben diesen auch nicht gesehen. Gleichwohl ist der Unterschied des Lungenvenenbluts von dem Körpervenenblut bei den Amphibien noch so deutlich, dass man beide Blutarten am linken und rechten Vorhof, ja selbst noch neben einander am Ventrikel an der Farbe unterscheidet. Bei den Fischen dagegen habe ich freilich bis jetzt noch keinen evidenten Unterschied des Blutes bemerkt, vielleicht weil sie in einem Medium athmen, welches nur 0,01 Sauerstoff enthält, während die Luft 0,21 enthält.

Das Blut der Nabelgefässe des Fötus färbt sich an der Luft hellroth, wie es Venenblut des Erwachsenen thut. Ich habe diess oft gesehen; vielleicht geschieht es ein wenig langsamer und weniger stark, was Fourcroy gesehen haben will. Das Blut der Nabelgefässe und des Fötus gerinnt weniger fest, wie schon Fourcroy sah und ich öfter beobachtet habe. Bei Vivisection eines hochträchtigen Schaafes gerann das in ansehnlicher Quantität gesammelte Nabelvenenblut langsamer als das Blut der Nabelarterien, wahrscheinlich, weil jenes zuerst gewonnen wurde. Ich habe auch schon früher gesehen, dass, als ich etwas Blut der Nabelgefässe eines Katzenfötus in ein mit Kohlensäuregas gefülltes Gläschen

Digitized by Google

fliessen liess, jenes dunkler, violett wurde. Dass diese Beobachtung richtig war, habe ich vor Kurzem am Blute eines Schaaffötus wieder gesehen. Auch hierin gleicht das Blut der Nabelgefässe dem Blute der Venen, das ebenfalls (nicht bloss Arterienblut) in Kohlensäure noch dunkler wird. Wenn man etwas Blut der Nabelgefässe in einem Uhrgläschen der Luftpumpe aussetzt, so verändert es seine Farbe nicht, es wird weder heller noch dunkler, und wenn ich es in einem frühern Versuch ein wenig dunkler zu sehen glaubte, so war diess gewiss, wie ich aus neueren Versuchen schliesse, nicht richtig beobachtet.

Erhitzt man Blut des Erwachsenen allmählig in einem Gefässe mit Gasentwickelungsrohr bis 200° F. (74,6 R.), also zuletzt über die Gerinnungshitze des Eiweisses, so entwickelt sich keine merkliche Quantität Luft aus dem Blute, weder Sauerstoffgas, noch Kohlensäuregas, und die übergehende Luft ist nur die unveränderte atmosphärische, die im Gefäss und Gasentwickelungsrohr enthalten war. H. Davy wollte zwar bei einem frühzeitigen Versuch dieser Art eine Entwicklung von Luft bemerkt haben. Indess ist hier leicht Täuschung möglich. Als ich auf jene Art das bei Vivisection eines trächtigen Schaafes erhaltene Nabelvenenblut erhitzte, so konnte der Erfolg auch kein anderer seyn. Die übergehende Luft konnte nur die unveränderte des Gefässes seyn. Eben so beim Erhitzen der durch Zerschneidung der Nabelgefässe und Placenta von Katzenfötus in warmem Wasser erhaltenen wässerig blutigen Auflösung.

Davy wollte einmal bei einer Temp. von 108 bis 200° F. (33,7—74,6 R.), als er frisches Arterienblut des Kalbes in eine an einem Ende verschlossene Glasröhre that und in Blut von derselben Art umstürzte und sie dann dem Sonnenlicht aussetzte, Sauerstoffgas entwickelt haben. Als ich nun früher bei Vivisection einer trächtigen Katze das Blut der zerschnittenen Nabelgefässe in Wasser auffing, und die Placenta in diesem Wasser zerschnitt, mit der blutigen Flüssigkeit ein kurzes am Ende verschlossenes Glasröhrchen füllte, in derselben Flüssigkeit umstürzte und nun dem Lichte aussetzte, konnte ich keine Entwicklung von Gasbläschen beobachten. Vor einiger Zeit habe ich diess mit Nabelvenenblut des Schaffötus so wiederholt, dass ich den Apparat gelinde erwärmte und selbst dann keine Anhäufung von Gasbläschen in dem Ende des Glasröhrchens bemerkt. Aber selbst am Arterienblute des Erwachsenen lässt sich Davy's Versuch nicht mit jenem Erfolg wiederholen, und es muss bei Davy eine Täuschung, vielleicht von mechanisch beigemengten Gasbläschen statt gefunden haben. Aus Allem geht nun hervor, dass sich das Blut des Fötus, seiner Arterien wie Venen, der Nabelarterien und der Nabelvene gar nicht merklich von dem Venenblute des Erwachsenen unterscheidet. Das Blut, welches durch die Nabelvene aus der Placenta zum Fötus zurückkehrt, wird theils durch den Ductus venosus Aurantii sogleich zum Körpervenenblute des Fötus in die Vena cava inf. geführt, theils gelangt es in die Pfortader, so dass es mit dem Pfortaderblute die Leber durchkreist, und nun erst zum übrigen Venenblute gelangt.

Digitized by Google

Einige haben behauptet, der Liquor amnii, wovon der Fötus umgeben ist, diene zum Athmen der Frucht durch die Haut, oder weil man Liquor amnii auch in die Luftröhre eingedrungen gefunden hat, zum Athmen durch die Lungen. Scheel *de liq. amnii nat. et usu. Hafn.* 1799. Leclarc und Geoffroy St. Hilaire haben dieses Athmen des Fötus angenommen. Ja, da Rathke bei dem Embryo der Wirbelthiere kiemenbogenartige Fortsätze am Halse entdeckt hat, so glaubten Andere, dass diese auch zum Athmen dienen könnten. Diese zarten Fortsätze mit Zwischenspalten können aber beim Vogelembryo nur in den ersten Tagen, z. B. am 3—4. Tag, wo ich sie gesehen, deutlich beobachtet werden, und sie sind nichts anders als ein allen Wirbelthieren gemeinsames Gerüst, auf dem sich bei den Fischen und einigen Amphibien, die als Larven oder später noch Kiemen haben, wirkliche Kiemenblättchen entwickeln, während diese Entwicklung bei den übrigen Thieren durchaus fehlt, und die Bogen in die Hörner des Zungenbeins umgewandelt werden. Vergl. oben pag. 298. Dass nun der Liquor amnii nicht zum Athmen dienen kann, geht schon aus den von mir in der Jugend angestellten Versuchen hervor, in welchen Fische im Liquor amnii der Kuh und des Schaafes bald starben und nicht länger als in Oel (40 Min.) lebten, während sie in derselben Quantität Rheinwasser sehr viel länger ausdauerten. Die Beobachtung von Lassaigne (*arch. gén. de méd.* 2. 308.), dass sich in dem Liquor amnii einer Sau Luft befand, welche sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung aus Oxygen und Azot sehr der atmosphärischen Luft näherte, kann nicht wohl richtig angestellt gewesen seyn, oder der Liquor amnii muss durch längeres Liegen des Eies, an der Atmosphäre oder durch Stehen des Liquor amnii an der Atmosphäre Luft absorbirt haben. Da ich mich unmöglich mit einigen früheren fehlerhaften Versuchen, aus welchen ich bereits auf den Mangel respirabler Luft in Liquor amnii schloss, befriedigen konnte, so habe ich mit Begierde die Gelegenheit ergriffen, diesen Gegenstand auf eine sorgfältige Weise zu ermitteln. Da man sich beim Erhitzen einer Flüssigkeit in einem Gefässe mit Gasentwicklungsrohr leicht bei Berechnung der in dem Gefässe vorhandenen Luft irren kann, so stellte ich den Versuch so an: Ich füllte ein anatomisches, 10 Zoll langes, $1\frac{1}{2}$ Zoll breites Glasgefäss von 17 Cubikzoll Inhalt, welches nach Cubikzoll graduirt worden, mit Liquor amnii des Schaafs, und stürzte es in einem Gefässe mit derselben Flüssigkeit um. Diess Gefäss machte ich mit warmem Wasser voll und erhitzte den ganzen Apparat bis zum Kochen in dem untern Theile der Flüssigkeit. Wenn sich hier eine Luftart in dem Liquor amnii der Glasröhre befand, so musste sie sich in dem obern Ende der Röhre ansammeln. Es entwickelte sich aber ausser dem sich wieder condensirenden und schnell verschwindenden Wassergas nur eine sehr kleine Menge Schaum, die noch nicht $\frac{1}{5}$ Cubikzoll Raum einnahm. So fand ich es auch in einem zweiten und dritten Versuch, und ich erhielt nicht mehr Luft, selbst als ich das Kochen lange fortsetzte. Prof. Bergemann war bei diesem Versuche gegenwärtig, und überzeugte sich, dass hierbei keine Luft entwickelt

Digitized by Google

wird. In einem 4. Versuche erhielt ich wirklich ein wenig Luft, die auch nach dem Erkalten noch nicht verschwunden war, es war aber sehr wenig und betrug, als ich sie in eine ganz kleine Eprouvette übergeleitet hatte, aus den 17 Cubikzoll Liquor amnii nur $\frac{1}{5}$ Cubikzoll. Diese Luft verminderte sich weder von Kalkwasser, noch von Auflösung von Schwefelkali und enthielt daher sicherlich weder respirirte Luft, Kohlensäure, noch respirable Luft. Vergl. Weber *Anat.* 4. 491.

Von meinen früheren Versuchen ist noch anzuführen, dass Kaninchenfoetus von 4 Zoll Länge, aus dem Uterus der lebenden Mutter genommen, mochten sie mit geschlossenen oder geöffneten Eihüllen der Luftpumpe ausgesetzt werden, nach 15 Min. scheintodt waren, und beim Herausnehmen wieder sich bewegten. Diess beweist aber nichts in der Frage über das Athmen. Die Luftpumpe hebt hier bloss den Luftdruck auf.

IV. Capitel. Von den Veränderungen des Blutes durch das Athmen.

Durch das Athmen wird das Blut hellroth, an der Oberfläche ebenso, wenn Venenblut an der Luft steht, und durch und durch hellroth, wenn Blut mit Sauerstoffgas geschüttelt wird. Hellroth wird das Blut auch bei Beimengung von Zucker, von Neutralsalzen, wie Salpeter, Glaubersalz, Salmiak, Kochsalz, kohlensaurem Kali. Kalilösung macht das Blut (wie ich sehe) brann, und es ist ein Irrthum, wenn in einigen Büchern das Gegentheil steht. In Ammoniakgas soll das Blut nach Thenard und Huenefeld kirschroth werden. Chlor macht das Blut braun, dann weiss, Säuren machen es braun, Kohlensäure aber dunkler roth, violett, zuletzt fast schwärzlich. Blausäure allein soll das Blut nach Wedemeyer heller roth machen (?). Nach Hertwich macht sie indess das Blut auch ganz dunkel. Froriep's *Not.* 759. Schwefelblausäure macht es nach Stevens dunkler. Kohlenoxydgas, Kohlenwasserstoffgas, Salpetergas machen das Blut nach Huenefeld violett, Stickstoffoxydulgas, Hydrogengas, nach Huenefeld purpurfarben oder rothbraun. Blut mit Hydrogengas geschüttelt, sah ich seine Farbe gar nicht verändern. Kohlenwasserstoffgas soll nach Berzelius dem schon etwas dunkeln Blute eine hellere Farbe mittheilen. Man sieht, dass das Blut äusserst empfindlich für vielerlei Stoffe in Hinsicht seiner Farbe ist. Der Halitus des Blutes scheint eine wichtige Materie des Blutes zu seyn. Man weiss aber nicht, dass er im Arterien- und Venenblute verschieden wäre.

Die specifische Schwere des arteriösen und venösen Blutes ist nach J. Davy fast gleich, 105,03 : 105,49. Vergl. Burdach *Physiol.* 4. 381. Nach ihm verhält sich die Wärmecapacität des erstern zu der des letztern wie 10,11 : 10,10.

Das Arterienblut ist nach J. Davy um 1—$1\frac{1}{2}^0$ Fahrenh. wärmer als das venöse Blut (vergl. p. 86.), was Krimer und Scudamore bestätigen. Andere Beobachter hatten keinen Unterschied bemerkt. Burdach's *Physiol.* 4. 382. Nach Autenrieth, Mayer,

Digitized by Google

Davy, Berthold und Blundell gerinnt das Arterienblut schneller als Venenblut, wovon Thakrah das Gegentheil beobachtet hat. Burdach's *Physiol.* 4. 382. Nach Mayer, Blainville und Denis enthält das Venenblut etwas weniger Serum und mehr Kuchen. Das Arterienblut enthält nach Mayer mehr Faserstoff, und giebt ihn in dickern festen und glänzenden Bündeln, was schon Emmert sah, ab. Die grössere Menge des Faserstoffs im Arterienblut ist von Berthold und Denis (Burd. *Physiol.* 4. 382.) und von mir in einer Beobachtung bestätigt worden. Nach Denis verhalte sich der Gehalt von Faserstoff im venösen und arteriösen Blut beim Hunde wie 24 : 25, nach Berthold bei Ziegen wie 366:429, bei Katzen wie 474 : 521, bei Hammeln wie 475 : 566, bei Hunden wie 500 : 666. Nach meiner Beobachtung an der Ziege enthielt das Venenblut 0,395, das Arterienblut 0,483 Procent Faserstoff. Zieht man das Mittel aus diesen 6 Beobachtungen, so verhält sich der Faserstoff im Venen- und Arterienblute wie 24 : 29.

Die weichere Beschaffenheit des Faserstoffs im Venenblut, die schon Emmert beobachtete, könnte auf die Vermuthung führen, dass durch das Athmen der Faserstoff weiter ausgebildet werde. Indessen lässt sich die weichere Beschaffenheit auch aus der grössern Vertheilung der geringern Menge von Faserstoff in gleicher Quantität Blut ableiten. Die geringere Menge des Faserstoffs im Venenblute rührt auch wohl bloss von dem Verlust eines Theils des aufgelösten Faserstoffs in den Capillargefässen bei der Ernährung her, theils von der Abführung von aufgelöstem Faserstoff aus dem Gewebe der Organe durch die Lymphgefässe, eine Quantität Faserstoff, die erst wieder durch den Ductus thoracicus zum Venenblute gelangt. Dass aber das Athmen auf die Ausbildung des Faserstoffs dennoch einwirke, wird wahrscheinlich daraus, dass das Blut des Fötus viel weniger Faserstoff enthält, obgleich er mit Unrecht darin geläugnet wurde, und dass bei der Blausucht von Herzfehlern, wie Offenbleiben des Ductus Botalli oder des Foramen ovale im Septum atriorum (wegen geringerer Gerinnbarkeit des Blutes?) Neigung zu Blutungen beobachtet worden ist, obwohl die merkwürdige Neigung zum Verbluten aus kleinen Wunden von der Blausucht verschieden ist. Dass das venöse Blut weniger Cruor (Blutkörperchen) enthalte, wie Denis behauptet, halte ich für ganz hypothetisch. Wir besitzen kein Mittel, die Menge der Blutkörperchen in einer Blutart zu schätzen. Vergl. oben pag. 118. Denis *rech. exp. sur le sang humain. Paris.* 1830.

Die widersprechenden Beobachtungen über die Wassermenge in beiden Blutarten hat Burdach (*Physiol.* 4. 383.) zusammengestellt.

Eine Vergleichung beider Blutarten auf ihre letzten Bestandtheile ist von Abildgaard und Michaelis angestellt worden. Nach Abildgaard sollte Venenblut um $\frac{1}{11} - \frac{1}{10}$ weniger Nitrum zu alkalisiren vermögen, als Arterienblut. Pfaff, *Nord. Arch.* 1. 493. Michaelis hat beide Blutarten durch Verbrennung mit Kupferoxyd analysirt. Schweigg. *J.* 54. Er fand

	Kohlenstoff	Stickstoff.	Wasserstoff	Sauerstoff.
im venös. Eiweiss	52,650	15,505	7,359	24,484
» arteriösen »	53,009	15,562	6,993	24,436
im venösen Cruor	53,231	17,392	7,711	21,666
» arteriösen »	51,382	17,253	8,354	23,011
im ven. Faserstoff	50,440	17,207	8,228	24,065
» arteriösen »	51,374	17,587	7,254	23,785

Macaire und Marcet (*ann. d. chim. et phys. T. 51. p. 382.*) haben ähnliche Versuche mit ähnlichen Resultaten angestellt.

Hiernach scheint, dass der arteriöse Cruor weniger Kohlenstoff enthält, als der venöse, was sehr gut mit der Ausscheidung von Kohlenstoff als Kohlensäure in den Lungen stimmen würde. Das Arterienblut enthielt mehr Sauerstoff, was für eine Aufnahme von Sauerstoff in das Blut beim Athmen zu sprechen scheint. Indessen liesse sich doch auf diese gefundenen Verhältnisse nur dann Werth legen, wenn sie durch wiederholte Analysen beständig gefunden werden. Denn sonst kann ein kleiner Unterschied in der Austrocknung der zu analysirenden Stoffe schon grosse Differenzen in den Resultaten erzeugen.

Das arteriöse Blut wird in den Capillargefässen des Körpers dunkelroth, das venöse Blut wird in den Capillargefässen der Lungen hellroth. Hört das Athmen auf, so fliesst dunkelrothes Blut von den Lungen. Wird aber nach Tödtung eines Thieres das Athmen künstlich unterhalten, so wird das Blut in den Lungen auch wieder hellroth. Die Durchschneidung der Nerven der Lungen (nervi vagi) hebt diesen Process nicht auf, das Blut röthet sich dann eben so gut noch in den Lungen, so wie das Blut selbst ausser dem Körper noch an der Luft seine Farbe ins Hellrothe verändert, und Sauerstoff in die Venen der Thiere eingespritzt das Venenblut hellroth macht.

Die Kenntniss der Ursachen dieser Veränderungen führt zur Theorie des Respirationsprocesses und zur Entscheidung der Frage: ob die beim Athmen entweichende Kohlensäure aus dem Blute bloss ausgehaucht wird, oder durch Verbindung von Kohlenstoff des Blutes mit Sauerstoff der Luft sich erst bildet.

Die Thatsachen lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen.

1. *Venenblut wird unter der Luftpumpe nicht merklich heller.* Ich konnte an ganz frischem, noch flüssigem Venenblute des Menschen kein Hellerwerden beobachten. Wurde indess das Auspumpen längere Zeit fortgesetzt, so zeigte sich in Magnus Versuchen (Poggend. *Ann. XXXX.* 602.) eine geringe Veränderung der Farbe, ohne dass jedoch das Blut so hellroth wie arterielles geworden wäre. Das Hellrothwerden des Blutes beim Athmen kann also nicht bloss von Aushauchung der im Blute vorhanden gewesenen Kohlensäure herrühren, sondern die hellrothe Farbe des Arterienblutes rührt wahrscheinlich von der Aufnahme von Sauerstoff her.

2. *Auch das mit Kohlensäure künstlich imprägnirte Blut wird*

Digitized by Google

unter der Luftpumpe nicht hellroth. Ich goss circa eine Unze von geschlagenem Ochsenblut, das eine halbe Stunde vorher beim Schlachten gesammelt war, in eine mit Kohlensäure gefüllte enghalsige Flasche, verschloss dieselbe möglichst dicht, und schüttelte das Blut, wobei es schnell ganz violett dunkelroth wurde, worauf ich ein Uhrgläschen voll dieses Blutes, der Luftpumpe aussetzte, und keine Farbenveränderung bemerkte.

3. *Mit Kohlensäure künstlich imprägnirtes Blut wird an der Luft wieder etwas heller.* Diess habe ich bei derselben Gelegenheit beobachtet. Es scheint also auch hier ziemlich deutlich, dass das Hellrothwerden des Blutes an der Luft und beim Athmen nicht von der Entfernung von Kohlensäure aus dem Blute, sondern von der Einwirkung des Sauerstoffes herrührt.

4. *Mit Kohlensäure imprägnirtes, ganz dunkelviolettes Blut wird von Sauerstoffgas wieder hellroth.* Ich hatte vorher zwei Flaschen, die eine mit Kohlensäure, die andere mit Sauerstoffgas gefüllt. In die Flasche mit Kohlensäure goss ich etwas Ochsenblut, schüttelte es, bis es ganz violett-dunkelroth geworden, und liess es einige Zeit stehen. Dann goss ich das auffallend dunkle Blut in die mit Sauerstoffgas gefüllte Flasche, die ich schnell verstopfte, und schüttelte das Blut mit dem Sauerstoffgas, in dem es sehr schnell wieder hellroth, fast so hellroth wie arterielles Blut wurde.

5. *Wenn Blut, dass mit Kohlensäure künstlich imprägnirt ist, mit Sauerstoffgas geschüttelt wird, so enthält das Gas hierauf Kohlensäure.* Denn als ich nach dem Versuche Nr. 4. die Flasche in Wasser öffnete, und das Blut durch Verdünnung desselben mittelst Zugiessens von immer mehr Wasser zu entfernen suchte, die Flasche nun mit dem Finger unter dem Wasser schloss, und in einem Gefässe mit Kalkwasser umstülpte, entstand eine Trübung, während von dem Gas der Flasche etwas absorbirt wurde.

6. *Auch frisches Blut, das mit atmosphärischer Luft geschüttelt wird, giebt Kohlensäure ab;* wie die Versuche von Berthollet, Christison und mir beweisen. Berthollet in Schweigg *Journ.* 1. 181. Christison in Froriep's *Notizen* 644. Als ich 7 C. Z. Blut mit 10 C. Z. atmosphärischer Luft innerhalb 6 Stunden häufig geschüttelt, hatte sich $\frac{1}{2}$ C. Z. Kohlensäure gebildet. Siehe die früheren Auflagen dieses Handbuchs.

7. *Aus Venenblut lässt sich durch Erhitzung keine Kohlensäure entwickeln.* H. Davy beobachtete die Ausscheidung von Kohlensäure aus dem Arterienblut, 12 C. Z. Blut sollten 1,1 C. Z. Kohlensäure enthalten haben. Davy füllte auch eine kleine Schaafblase mit Venenblut des Menschen, tauchte sie darauf in Wasser von 112° F., und fing das sich entbindende Gas im pneumatischen Apparate auf. Es bestand aus Kohlensäure und aus wässerigem Dunst. Gilb. *Ann.* 12. 594. Dagegen konnten John Davy, Strohmeyer Bergemann und ich durch Erhitzung keine Luft aus Venenblut entwickeln. Bergemann und ich erhielten bei Erhitzung von 1 Pfund Blut bis 60°, später bis 70° und 74° R. oder 200° F. nur $\frac{6}{32}$ C. Z. Kohlensäure. Die Ursache, dass auf diese Weise keine merkliche Quantität frei wird, ist, wie Magnus zeigt, die, dass die Temperatur, bei welcher das Blut flüssig bleibt, zu gering

Digitized by Google

ist, um die Kohlensäure zu entbinden, und dass stärkere Erhitzung das Eiweiss des Bluts gerinnen macht. Eiweiss, das mit Kohlensäure vorher versetzt zum Gerinnen gebracht wird, setzt seine Kohlensäure auch nicht durch Wärme ab.

8. *Dagegen lässt sich sowohl durch die Luftpumpe, als durch Hindurchleiten von Wasserstoffgas oder Stickgas Kohlensäure aus dem Venenblute frei machen.* Vogel fand, dass das Blut unter der Luftpumpe schäumend Gas entwickelte, und dass sich beim Hindurchleiten des Gases durch Kalkwasser ein wenig kohlensaurer Kalk bildete. Schweigg *Journ.* 11. 401. Aehnliche Beobachtungen hat Brande gemacht; er mittelte aus, dass in Arterien- und Venenblut Kohlensäure sich befindet, und dass davon in einer Unze Blut 2 C. Z. enthalten seyen. *Ann. de chim. et de phys.* 10. 207. Home und Bauer bestätigten diess, indem Barytwasser mit Blut zugleich unter der Luftpumpe kohlensauren Baryt bildete. *Philos. Transact.* 1818. 172. Meckel's *Archiv* 5. 369. *Philos. Transact.* 1820. Endlich hatte auch Scudamore (*an essay on the blood. Lond.* 1824.) Kohlensäure im Blute beobachtet. Reid Clanny fand neulich, dass in 16 Unzen Blut 1 C. Z. Kohlensäure enthalten sey. Behrends *Rep. der med. J. Mai* 1832. Vergl. Mueller's *Archiv.* 1835. 120. Vergl. Collard de Martigny *Journ. de physiol.* 10. 126.

Dagegen beobachtete John Davy ganz das Gegentheil dieser Erfahrungen, dass nämlich frisch gelassenes Blut keine Spur von Kohlensäuregas, weder im luftleeren Raum, noch beim Erhitzen bis zum Gerinnen in Destillationsgefässen abgiebt; dass das Blut vielmehr $\frac{1}{4}$ seines Volums Kohlensäuregas absorbirt (von Mitscherlich, Tiedemann und Gmelin bestätigt), welches dabei vom Alkali im Blute gebunden wird, so dass es selbst bei einer Temp. von 93° C. daraus nicht wieder zu erhalten ist. *Journ. de chim. méd.* 5. 246. *Jahresb.* von Berzelius. 10. 233. Froriep's *Not.* 21. 209. Auch Strohmeyer (Schweigg. *Journ.* 1831.), Tiedemann, Gmelin, Mitscherlich (*Zeitschr. für Physiol.* 5.) und ich selbst konnten keine Entwickelung von Kohlensäure durch die Luftpumpe wahrnehmen. Siehe die früheren Auflagen dieses Handbuchs.

Mit diesen Thatsachen standen wieder Versuche von Hoffmann und Stevens in Widerspruch, nach welchen sich zwar durch die Luftleere und Wärme keine Kohlensäure aus dem Blute entwickeln lässt, wohl aber, wenn dasselbe mit einer andern Gasart, z. B. Wasserstoffgas, geschüttelt wird. Mueller's *Archiv.* 1835. 119.

Diese Beobachtungen sind neuerlichst von den verschiedensten Seiten bestätigt worden. Bertuch und Magnus hatten sich schon seit geraumer Zeit davon überzeugt, und ich hatte das Resultat ihrer Versuche vorläufig im *Archiv* 1836. *CXXVII.* angeführt. Zu demselben Resultat ist Bischoff durch genaue Versuche gelangt. *Commentatio de novis quibusdam experimentis chemico-physiologicis ad illustrandam theoriam de respiratione institutis. Heidelb.* 1837. Und auch Gmelin hat sich von der Existenz der Kohlensäure im Blut überzeugt. Aus allen diesen Versuchen geht hervor, dass sowohl

Digitized by Google

Wasserstoffgas als Stickgas durch Venenblut durchgeleitet, Kohlensäure daraus aufnehmen, und diese Quantität ist nach Magnus Versuchen selbst nicht kleiner, als wenn man atmosphärische Luft hindurchleitet. Die durch Wasserstoffgas erhaltene Kohlensäure beträgt wenigstens $\frac{1}{5}$ vom Volumen des Blutes. Bischoff erhielt auch mittelst der Luftpumpe Kohlensäure wiewohl in sehr geringer Menge. Magnus beobachtete wiederholt, dass aus dem Blute nur dann eine wahrnehmbare Menge Kohlensäure entweicht, wenn die Spannkraft der über dem Blute enthaltenen Luft nur noch 1″ Quecksilber beträgt, woraus sich nun das frühere Resultat so vieler Beobachter erklären lässt.

9. *Aus arteriellem Blut lässt sich durch Erhitzung keine merkliche Quantität Luft entwickeln, wohl aber vermittelst der Luftpumpe.* H. Davy beobachtete im Jahre 1799, dass 12 Unzen arterielles Kalbsblut eine Stunde lang bei einer Temperatur von 96—108—200° F. erhitzt, 1,8 C. Z. Gas gaben, wovon 1,1 C. Z. Kohlensäure und 0,7 C. Z. Sauerstoff waren. Gilb. *Ann.* 12. 593. Collard de Martigny erhielt mit der Luftleere aus arteriellem Blut nur Kohlensäure, aber kein Sauerstoffgas. Durch Erhitzen von geschlagenem arteriellem Ziegenblut erhielt ich nur äusserst wenig Luft. Von diesem Blut wurde eine an einem Ende verschlossene weite Glasröhre von 12 C. Z. Inhalt gefüllt und im Quecksilber umgestürzt. Bei der Erwärmung des Apparates durch Wasser von 50—52° R. in mehreren Stunden, entwickelte sich nur sehr wenig Luft, die in eine Eprouvette übergeleitet noch nicht $\frac{1}{16}$ C. Z. betrug, wovon Phosphor $\frac{1}{5}$—$\frac{1}{4}$ absorbirte.

Durch den von Magnus angewandten luftleeren Raum liess sich nicht bloss eine ansehnliche Quantität Luft aus arteriellem Blute entwickeln: der Apparat war auch so eingerichtet, dass sich die entwickelten Gase leicht sammeln liessen. Aus diesen Versuchen ging mit Sicherheit hervor, dass das arterielle Blut nicht weniger Luft als das venöse aufgelöst enthält.

10. *In beiden Blutarten ist Kohlensäure, Stickgas und Sauerstoffgas enthalten, aber in verschiedenem Verhältniss, im Venenblut mehr Kohlensäure als im arteriellen Blut, in diesem mehr Sauerstoffgas als in jenem; der Stickgasgehalt ist nicht constant verschieden.* Dieses wichtige und über die Theorie vom Athmen entscheidende Resultat ist durch die höchst sorgfältigen und genauen Versuche von Magnus gewonnen worden. Die folgende Tabelle stellt die angestellten Versuche übersichtlich dar.

	Cubikcentimeter.				
Blut von einem Pferde	125	gaben	9,8	Luft	5,4 Kohlensäure 1,9 Sauerstoff 2,5 Stickstoff
Venöses Blut vom Pferde	205	»	12,2	»	8,8 Kohlensäure 2,3 Sauerstoff 1,1 Stickstoff
Dasselbe Blut	195	»	14,2	»	10,0 Kohlensäure 2,5 Sauerstoff 1,7 Stickstoff

Digitized by Google

	Cubikcentimeter.					
Arterielles Blut vom Pferde	130	gaben	16,3	Luft	10,7	Kohlensäure
					4,1	Sauerstoff
					1,5	Stickstoff
Dasselbe Blut	122	»	10,2	»	7	Kohlensäure
					2,2	Sauerstoff
					1	Stickstoff
Venöses Blut von denselben	170	»	18,9	»	12,4	Kohlensäure
					2,5	Sauerstoff
					4,0	Stickstoff
Arterielles Blut vom Kalb	123	»	14,5	»	9,4	Kohlensäure
					3,5	Sauerstoff
					1,6	Stickstoff
Dasselbe Blut	108	»	12,6	»	7,0	Kohlensäure
					3,0	Sauerstoff
					2,6	Stickstoff
Venöses Blut von demselben Kalbe	153	»	13,3	»	10,2	Kohlensäure
					1,8	Sauerstoff
					1,3	Stickstoff
Dasselbe	140	»	7,7	»	6,1	Kohlensäure
					1,0	Sauerstoff
					0,6	Stickstoff

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der Sauerstoff in der vom venösen Blut erhaltenen Luft höchstens $\frac{1}{4}$, oft nur $\frac{1}{5}$ von der gefundenen Kohlensäure beträgt, während er im arteriellen Blute wenigstens $\frac{1}{3}$ und fast die Hälfte derselben ausmacht. Die von dem Blute erhaltenen Luftmengen betragen durchschnittlich $\frac{1}{10}$ bisweilen $\frac{1}{5}$ vom Volumen des Blutes.

Man darf sich dieselben übrigens nicht im gasförmigen Zustande vertheilt im Blute denken; die Gase sind im aufgelösten Zustande vorhanden, so wie Sauerstoffgas und Stickgas im Wasser der Flüsse und Seen aufgelöst, aber nicht als Gase enthalten sind.

Dass die Gase mehr sich mit den Blutkörperchen verbinden als mit der Blutflüssigkeit, lässt sich aus der Farbenveränderung des Blutes im Allgemeinen nur vermuthen. Diese Körper werden unaufhörlich in den Lungen hellroth, in den Capillargefässen des übrigen Körpers dunkelroth. Vielleicht sind sie Träger für die Stoffveränderungen beim Athmen, eine blosse Vermuthung indess, die wir in der ersten Auflage dieses Handbuchs p. 343. ausgesprochen. Dass diese Körperchen im arteriellen und venösen Blute des Frosches in der Gestalt und Grösse nicht im mindesten verschieden sind, davon habe ich mich auf das Bestimmteste überzeugt.

11. *Dunkelrothes Blut wird durch Beimengung von Neutralsalzen auch heller, entwickelt aber dabei keine Kohlensäure.* Ich füllte eine Eprouvette mit *geschlagenem* Ochsenblut, setzte eine ansehnliche Quantität Salpeter hinzu, und stürzte die Eprouvette in einem Gefäss mit geschlagenem Ochsenblut um, und erhitzte den Apparat. Es entwickelte sich kein Gas.

Stevens (*observ. on the healthy and diseased properties of the*

Digitized by Google

blood. Lond. 1832.) hat einige interessante Beobachtungen über den Antheil der Salze an der hellern Farbe des Bluts gemacht.

12. *Die rothe Farbe des Blutcoagulums wird im destillirten Wasser dunkler, und zwar schwärzlich.* Dass Blutcoagulum in destillirtem Wasser, welches die Salze auszieht, dunkel und von Salzlösung wieder heller roth wird, hat R. Froriep bestätigt. Froriep's *Not.* 759. Diese Färbung erfolgt auch im luftleeren Raum. Mueller's *Archiv.* 1835. 119. Hieraus schliesst Stevens, dass nicht das Oxygen der Atmosphäre, sondern dass das salzhaltige Serum das Blut hell färbe, daher sey bei Mangel der Salze im Blut, wie in der Cholera, im gelben Fieber, das Blut dunkler, röthe sich an der Luft nicht, wohl aber bei Zusatz von Salzen. Hieraus schliesst nun Stevens, dass die dunkle schwärzliche Farbe des Blutes die natürliche des Farbestoffs sey, und dass der Farbestoff der Blutkörperchen nur so lange roth sey, als er mit salzigen Theilen des Serums in Berührung ist. Daher könne sich Blutcoagulum, das in destillirtes Wasser getaucht worden, an der Luft nicht mehr hellroth färben, es färbe sich aber sogleich, wenn man es in eineSalzlösung tauche. Stevens hält die Kohlensäure im Venenblut für die Ursache der dunkeln Farbe dieses Blutes; sobald diese an der Atmosphäre oder beim Athmen aus dem Blute entfernt werde, werde das Blut von selbst und nicht durch den Sauerstoff hellroth. Wenn diess richtig wäre, so müsste Venenblut unter der Luftpumpe hellroth werden, was nicht der Fall ist. Ebenso müsste das dunkelrothe Blut auch im Wasserstoffgas hellroth werden, weil darin eben so gut Kohlensäure sich entwickeln kann, indem ja eine mit Wasserstoffgas gefüllte Blase Kohlensäuregas bis zum Zerplatzen anzieht. S. p. 244. Ohne die Nothwendigkeit der Salze im Blute zur Erzeugung der hellrothen Farbe zu leugnen, muss man doch gestehen, dass der Sauerstoff, wenn er auf die von salzigem Serum umgebenen Blutkörperchen wirkt, die Ursache zur hellern Färbung wird, ohne dass der Salzgehalt im Blute sich ändert. Vergl. Bischoff a. a. O.

V. Capitel. Von dem chemischen Process des Athmens.

Es würde eine sehr falsche Vorstellung seyn, wenn man sich dächte, während des Einathmens dringe der Sauerstoff der eingeathmeten Luft durch die Capillargefässhäute in den Wänden der Lungenzellen bis zu dem Blute derselben ein, und beim Ausathmen werde Kohlensäure aus dem Blute durch die Gefässwände hindurch ausgehaucht. Die Aufnahme von Sauerstoff in das Blut, welches durch die Capillargefässe der Lungenzellenwände strömt, und die Aushauchung von Kohlensäure findet vielmehr beständig ohne Unterbrechung, sowohl während des Ausathmens, als während des Einathmens statt. Die Bewegung des Einathmens und Ausathmens ist nichts anders, als eine abwechselnde Erweiterung und Verengerung der Brust und der Lungen; die Lungen werden dabei nie leer von Luft, und enthalten unter fortdauernder Auf-

Digitized by Google

nahme von Sauerstoff ins Blut, und Aushauchung von Kohlensäure, theils atmosphärische Luft, theils etwas der ausgehauchten Kohlensäure. Durch das Ausathmen wird die veränderte Luft nur grossentheils entfernt, und die Luft der Lungen erhält einen neuen Zufluss respirabler atmosphärischer Luft. Bei vielen Thieren fehlen die Athembewegungen am Athemorgane ganz, und es findet nur der beständige Stoffwechsel statt, wie an den vorstehenden unbeweglichen Kiemen der Salamanderlarven.

Wie der Sauerstoff der Atmosphäre beständig durch die Wände der Lungenzellen in das diese Wände durchströmende Blut, und aus demselben durch die Wände der Zellen die Kohlensäure gelange, bedarf keiner Erklärung, nachdem im vorigen Buch pag. 242. die Permeabilität der weichen thierischen Theile, namentlich Häute, für flüssige und gasförmige Stoffe erwiesen worden ist. Eine nasse Thierblase, welche mit einer von der Atmosphäre verschiedenen Luftart gefüllt ist, enthält nach einiger Zeit diese Luft nicht mehr, sondern atmosphärische Luft. Beiderlei Luftarten setzen sich durch die Wände der nassen Blase hindurch ins Gleichgewicht der Vertheilung. Derselbe Process findet zwischen zwei verschiedenen Lösungen statt, die eine thierische Membran von 2 Seiten berühren. Dunkelrothes Blut in einer nassen Thierblase soll sich durch die Wände der Blase hindurch von der atmosphärischen Luft hellroth färben. Durch die feinen Wände der Lungenzellen muss diese Durchdringung ausserordentlich schnell geschehen, und das die Capillargefässe dieser Lungenzellenwände durchströmende Blut muss dieser Aufnahme theilhaftig werden. Hierzu kommt, dass das Blut, namentlich die rothen Blutkörperchen, eine ausserordentlich grosse Verwandtschaft zu dem Sauerstoff haben, indem sich dunkles Blut auch ausser dem Körper schnell auf der Oberfläche hellroth färbt, wobei Kohlensäure aus dem Blute ausgehaucht wird. In der That dauert die beständige hellrothe Färbung des Blutes in den Lungen selbst nach Durchschneidung der Lungennerven, Nervi vagi, fort.

Die Vertheilung des Blutes in so unendlich viele feine Capillargefässe in den Wänden der Lungenzellen hat also offenbar den Zweck, den Contact der kleinsten Theilchen des Blutes mit der Luft in der ungeheuren Oberfläche aller Lungenzellen zu vermehren, indem die ganze, die Lungen durchströmende Blutmasse auf dieser ungeheuren Contactsfläche vertheilt wird. Ob das Gewebe der Lungen einen specifischen Einfluss auf Veränderung der Atmosphäre besitzt, der grösser ist, als in anderen Theilen, ist immer noch zweifelhaft, da die Blutkörperchen selbst hierbei die Hauptrolle zu spielen scheinen, da auch gleiche Veränderungen der Luft von andern thierischen Oberflächen wie auf der Haut der Fische und Frösche, im Darmkanal (bei Cobitis fossilis) stattfinden, da nach Durchschneidung der Lungennerven der chemische Process des Athmens fortdauert. Endlich leben die Frösche nach meinen Versuchen nach Unterbindung und Ausschneidung der Lungen, selbst noch 30 Stunden durch Athmen mit der Haut in der Luft fort, während sie in ausgekochtem Wasser untergetaucht, viel schneller sterben. Die Lungen

Digitized by Google

sind durch ihre Organisation, durch die Feinheit der zu durchdringenden Membran, durch die Grösse der Contactsfläche der am meisten geeignete Theil zu dem chemischen Processe des Athmens.

Ueber die Theorie des chemischen Processes beim Athmen sind verschiedene Ansichten aufgestellt worden.

1. Nach Lavoisier, Laplace und Prout haucht das Blut beständig in die Lungenzellen eine Flüssigkeit aus, die vorzüglich Kohlenstoff und Wasserstoff enthält. Diese vereinigen sich mit dem Sauerstoff der Luft zu Kohlensäure und Wasser, welche beim Ausathmen entfernt werden. Diese Annahme einer aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden Flüssigkeit ist vom chemischen Gesichtspunkte sehr gewagt. Gmelin's *Chem.* 4. 1529. Da man bei dieser Theorie die thierische Wärme aus der Kohlensäure- und Wasserbildung ausser dem Blute, nämlich innerhalb der Lungenzellen erklärt, so muss bemerkt werden, dass die Lungen im Allgemeinen keineswegs wärmer als andere Theile sind.

2. Die von den meisten Chemikern getheilte Ansicht ist die von H. Davy, dass die Luft durch die Wände der Lungenzellen in das Blut der Capillargefässe eindringe, dass die nun im Blute aufgelöste Luft wegen Verwandtschaft des Sauerstoffs zu den Blutkörperchen zersetzt und Kohlensäure frei wird, wobei zugleich der grösste Theil des Stickstoffs wieder entweiche. Gilb. *Ann.* 19. Davy gab nach seinen Athemversuchen mit oxydirtem Stickgas und Wasserstoffgas zu, dass etwas kohlensaures Gas aus dem venösen Blute selbst entwickelt werde. Nach der letztern Ansicht nimmt man die Wärmeerzeugung von der Kohlensäurebildung im Blute der Lungen an, und dieser sind die Beobachtungen von J. Davy günstig, dass das Blut des linken Herzens und der Arterien (Carotis) um $1—1\frac{1}{2}^{0}$ Fahr. wärmer seyn soll, als im rechten Herzen und in den Venenstämmen (Jug.)

3. Einige, welche von der Thatsache ausgehen, dass beim Athmen mehr Sauerstoff verschwindet, als Kohlensäure gebildet wird, die Kohlensäurebildung in den Lungen oder in den Gefässen der Lungen zugeben, aber die Wassererzeugung leugnen, nehmen an, dass durch Verbindung von Sauerstoff der Luft mit Kohlenstoff des Blutes Kohlensäure sogleich beim Athmen entstehe, dass jener Antheil von Sauerstoff, der nicht auf Kohlensäurebildung verwandt werde, mit dem Blute gebunden werde, und daher das Blut hellroth färbe, dass die Blutkörperchen mit gebundenem Sauerstoffe das Leben der organischen Theile anregen. Dass beim Athmen mehr Sauerstoff verschwindet, als Kohlensäure gebildet wird, berechtigt durchaus nicht zu der Annahme von Lavoisier, Laplace, Dulong und Despretz, dass dieser Antheil von Sauerstoff auf die Bildung des ausgeathmeten Wassers durch Verbindung von Wasserstoff des Blutes und Sauerstoff verwandt werde. Das in den Lungen ausdünstende Wassergas aus einer Erzeugung von Wasser aus Elementen abzuleiten, ist auch überaus gewagt, weil unter den obwaltenden Umständen von nassen thierischen Oberflächen, besonders bei der Temperatur der warmblütigen Thiere, Wasser verdunsten muss. Die Hypothese der Wassererzeugung in den

Digitized by Google

Lungen ist daher bloss zum Vortheile der Verbrennungstheorie von Lavoisier und Laplace erfunden, aber nicht erwiesen worden. Nach den Versuchen von Collard de Martigny wird in jeder Gasart, z. B. auch Wasserstoffgas, Wassergas ausgeathmet, wo also kein Sauerstoff zur Erzeugung von Wasser vorhanden war (doch ist nach meiner Ansicht dieser Versuch nicht ganz stringent, weil Thiere, die in irrespirable Gasarten gebracht werden, immer noch atmosphärische Luft in den Lungen haben). Nach Magendie soll sich die Quantität des beim Athmen transpirirten Wassers vermehren, wenn man einem Thiere Wasser von der Temperatur des Körpers in die Venen injicirt. Magendie *précis élémentaire de physiologie.* 2. *éd.* 2. 246. Man kann daher wohl die Wassererzeugung in den Lungen nicht anders als eine der gewagtesten Hypothesen ansehen, welche nur von Chemikern, nicht von Physiologen lange Zeit hin angenommen werden konnte, und es ist ganz einfach, die Aushauchung von Wasser aus den Lungen gleichwie von der Haut als eine blosse Aushauchung aus dem Blute zu betrachten, obgleich diese Aushauchung nicht eine rein physikalische Verdampfung ist, wie sich deutlicher bei der Hautausdünstung im 7. Abschn. dieses Buches ergeben wird. Da nun kein Wasser in den Lungen erst entsteht, so muss jedenfalls dasjenige Sauerstoffgas, welches nicht auf ein gleiches Maass Kohlensäure beim Athmen verwandt wird, wirklich ins Blut übergehen; dieser verschwindende Ueberschuss von Sauerstoffgas ist schon in den meisten Versuchen über das Athmen in der Luft und im Wasser vollkommen constatirt. Offenbar wird also ein grösserer oder geringerer Theil des Sauerstoffs der Luft mit dem Blute verbunden, und ist die Ursache der hellrothen Farbung des Arterienblutes und des Blutes an der Luft. Wie man weiss, wird auch ein Gemeng von Blutkörperchen und Serum, oder geschlagenes Blut durch blosses Hindurchstreichen von Sauerstoffgas durch und durch hellroth. Für diese Bindung von Sauerstoff an das Blut spricht auch die Beobachtung, dass beim Schütteln von Luft und Blut sehr viel mehr Sauerstoffgas absorbirt, als Kohlensäure gebildet wird. Es sprechen ferner dafür Nysten's Versuche mit Gaseinspritzungen in die Adern der Thiere, wobei Sauerstoffgas das dunkelrothe Blut in den Venen hellroth färbte, wo also gar keine gebildete Kohlensäure ausgeschieden wurde. Nysten *rech. de physiol. et de chim. pathol.*

4. Nach Lagrange und Hassenfratz wird der Sauerstoff der atmosphärischen Luft nur locker vom Blute gebunden (im Blute aufgelöst oder mit den Blutkörperchen verbunden), und bildet erst während der Circulation mit dem Kohlenstoffe des Blutes Kohlensäure, die im Blute absorbirt ist, bis sie in den Lungen aus dem Blute frei wird. Lagrange stützte diese Ansicht zum Theil darauf, dass arterielles Blut in verschlossenen Gefässen nach einiger Zeit von selbst wieder dunkler wird. Da nun das arterielle Blut bis in die feinsten Arterien immer noch hellroth ist, und beim Durchgang durch die Capillargefässe des Körpers erst dunkelroth wird, so kann man, wenn man der Ansicht von Lagrange

Digitized by Google

zugethan ist, die Kohlensäurebildung doch nur in den Capillargefässen des Körpers annehmen. Nach dieser Ansicht muss das Venenblut vorzüglich Kohlensäure aufgelöst enthalten, das Arterienblut muss locker gebundenen Sauerstoff enthalten. Diese Ansicht war immer unter einem grossen Theil der Physiologen verbreitet, und stützte sich früher auf die Versuche von Vogel, Home, Brande, Scudamore, Collard de Martigny, dass Venenblut wirklich Kohlensäure enthalte, und H. Davy's Versuch, dass sich aus Arterienblut Sauerstoffgas entwickeln lasse. Nach dieser Theorie ist es erklärlich, warum die Lungen nicht wärmer als andere Theile sind. Fr. Nasse hat in einer ausgezeichneten Abhandlung über das Athmen (Meck. *Arch.* 2. 195. 435.) alle früheren diese Ansicht stützenden Thatsachen zusammengestellt. Widersprechende Versuche, die oben mitgetheilt worden, hatten diese Ansicht wieder zweifelhaft gemacht. Durch die Beobachtungen von Stevens, Hoffmann, Bischoff, Bertuch über den Kohlensäuregehalt des Venenblutes und besonders durch diejenigen von Magnus über den Luftgehalt beider Blutarten ist indess diese Theorie die wahrscheinlichste geworden.

5. Vor Kurzem hat Stevens eine eigenthümliche Ansicht über den chemischen Process des Athmens aufgestellt, welche auf den ersten Blick sinnreich erscheint. Stevens sagt, der Farbestoff der Blutkörperchen ist an sich dunkel, durch das Serum wird er hellroth, weil die Salze das Blut hellroth machen. Die hellrothe Farbe ist daher die natürliche Farbe der Blutkörperchen, so lange sie von Serum umgeben sind. Bringt man Wasser mit hellrothem Blutcoagulum zusammen, so wird das hellrothe Blut dunkel, weil das Serum des Coagulums ausgewaschen wird. Kohlensäure macht das hellrothe Blut dunkel. Diese Kohlensäure entsteht nach Stevens in den Capillargefässen des Körpers, daher ist das Venenblut dunkel; in den Lungen wird diese Kohlensäure ausgeschieden, daher tritt wieder die natürliche Farbe des Blutes, die hellrothe, ein, ohne dass der Sauerstoff die Ursache der hellrothen Färbung wäre. Wäre Stevens Ansicht richtig, so müsste Venenblut unter der Luftpumpe durch das Entweichen der Kohlensäure zum hellrothen Blute werden. Diess geschieht aber nicht, wie wir oben gesehen haben. Das ins Blut aufgenommene Sauerstoffgas muss daher einen wesentlichen Antheil an der hellrothen Farbe des Blutes haben. De Maack (*de ratione quae colorem sanguinis inter et respirationis functionem intercedit.* Kil. 1834.) fand, dass der oxydirte sowohl als der kohlensaure Cruor von schwärzlicher Farbe ist, wenn er nicht mit einer Neutralsalze haltigen Flüssigkeit in Berührung kommt. Salze machen beide heller roth, die kohlensauren nur bis zur Farbe des Venenblutes, die oxydirten bis zur Farbe des Arterienblutes. Der Verf. fand übereinstimmend mit Berzelius, dass Blutwasser nur äusserst wenig Sauerstoffgas absorbirt und keine Kohlensäure ausbaucht. Dagegen absorbiren $2\frac{1}{2}$ Maass Farbestoffauflösung von 2 Maass Sauerstoffga $1\frac{1}{2}$ Maass, und werden dann durch Berührung mit einer salzhaltigen Flüssigkeit hellroth. Der Verfasser nimmt an, dass der koh-

Digitized by Google

lensaure Cruor durch Sauerstoffgas zersetzt werde, so dass der Cruor oxydirt, die Kohlensäure aber frei werde, gleichwie das kohlensaure Eisenoxydul an der feuchten Luft zersetzt, und in Eisenoxydhydrat verwandelt wird.

6. Verschieden von dieser ist wieder folgende Ansicht, dass die Kohlensäure nicht durch Verbindung von Sauerstoff der Luft und Kohlenstoff des Blutes entstehe, weil die Aushauchung von Kohlensäure in sauerstofffreien Gasen fortdauere, dass daher die Kohlensäure aus den letzten Bestandtheilen des Blutes sich wie andere Secreta bilde. Mann kann für diese Vorstellung die Absonderung verschiedener Gase durch die Schwimmblase der Fische anführen. Nach dieser Ansicht wäre die Kohlensäure nicht im Venenblute nothwendig präexistirend, sondern sie würde im Momente des Durchganges des Blutes durch die Capillargefässe der Lungen ohne Mitwirkung des Sauerstoffs der Luft gebildet. Diese Ansicht stützt sich auf Beobachtungen, dass die Bildung von Kohlensäure in sauerstofffreien Gasen bei kaltblütigen Thieren fortdauert; Beobachtungen, welche schon Spallanzani gemacht und Edwards wiederholt. Indess die Existenz der Gase im Blute beweist, dass sie nicht durch Secretion erst entstehen.

7. In neuerer Zeit haben Mitscherlich, Gmelin und Tiedemann eine eigenthümliche Theorie des Athmens entwickelt. Sie gehen von der Existenz der Essigsäure oder Milchsäure im freien oder gebundenen Zustande in den meisten Secreten und im Blute aus, welche sich im thierischen Körper selbst erzeugen muss, da sie in viel kleinerer Menge in der Nahrung enthalten ist, als die durch Schweiss und Urin beständig ausgeleert wird. Nun haben sie ferner ausgemittelt, dass das venöse Blut mehr unterkohlensaures Alkali enthält als das arterielle, indem 10000 venöses Blut wenigstens 12,3 und 10000 arterielles Blut wenigstens 8,3 gebundene Kohlensäure enthalten. Diess wenden sie auf ihre Hypothese an, dass sich beim Athmen unter reichlicher Berührung mit der Luft Essigsäure erzeuge, welche das kohlensaure Alkali des venösen Blutes zersetze, worauf die Kohlensäure ausgeathmet werde. Sie vermuthen, dass der Sauerstoff der Luft beim Athmen theils direct an Kohlenstoff und Wasserstoff trete und Kohlensäure und Wasser erzeuge, zum Theil sich unmittelbar mit den im Blute enthaltenen organischen Verbindungen vereinige. Hierdurch werden nun organische Producte, die zum Leben nöthig sind, erzeugt. Zugleich ist diese Bildung aber auch mit einer Umwandlung organischer Stoffe in niedere, wie z. B. Essigsäure oder Milchsäure, verbunden, welche einen Theil der im Blute enthaltenen kohlensauren Materie zersetzt und diese Kohlensäure in die Lungenzellen austreibt. Tiedemann *Zeitschr. f. Physiol.* 5. Diese Theorie war, so lange an der Existenz der Gase im Blut gezweifelt werden konnte, ein ingeniöser Versuch zur Erklärung der Facta. Gmelin hat indess selbst später die Existenz der Kohlensäure im Blute anerkannt.

Die Entscheidung der ganzen Frage vom chemischen Process des Athmens hängt von der Beantwortung von folgenden 3 Fragen ab.

Digitized by Google

1. Ist Kohlensäure im Venenblute, Sauerstoffgas im Arterienblute vorhanden? Diese Frage ist durch die oben mitgetheilter Versuche, namentlich durch die treffliche Arbeit von Magnus bejahend beantwortet.

2. Wird die im Blute enthaltene Kohlensäure durch verschiedene Gase und nicht bloss durch die atmosphärische Luft daraus ausgetrieben? Auch diess ist durch die Versuche von Hoffmann, Stevens, Bischoff, Bertuch, Magnus bejahend beantwortet. Wasserstoffgas und Stickgas durch Blut geleitet, nehmen eben so viel Kohlensäure daraus auf, als wenn atmosphärische Luft durch Blut durchgeleitet wird.

3. Wird Kohlensäure von kaltblütigen Thieren in reinem Wasserstoffgas oder reinem Stickgas ausgehaucht? Wir werden sehen, dass diess unzweifelhaft ist.

Ich werde nun den ganzen Verfolg der Untersuchungen über das Aushauchen von Kohlensäure in sauerstofffreien Gasarten mittheilen. Die älteren Versuche an warmblütigen Geschöpfen von H. Davy (Gilb. *Ann.* 19. 320.), Coutanceau und Nysten (Meck. *Arch.* 2. 256.) beweisen wohl nichts, da die Lungen von solchen Thieren, die kurze Zeit in Wasserstoffgas gebracht werden, noch Kohlensäure von vorher enthalten. Die Versuche werden nur dann beweisend, wenn Thiere lange in Wasserstoffgas oder Stickgas ausdauern können, und wenn die erzeugte Kohlensäure beträchtlich ist. Diess hat Edwards beobachtet; nämlich ein Frosch hauchte einmal in Wasserstoffgas in $8\frac{1}{2}$ Stunden 2,97 Centil. = 1,49 P. C. Z. Kohlensäure aus, was indess nicht richtig seyn kann, da ein Frosch selbst in atmosphärischer Luft in dieser Zeit lange nicht so viel Kohlensäure bildet. *Influence des agens physiques p.* 445. Collard de Martigny (Magendie *Journ. de physiol.* 1830. *p.* 121.) hat diese Versuche mit Stickgas ausgeführt, und auch Aushauchung einer Quantität Kohlensäure beobachtet, die nicht viel kleiner war als in Edwards Versuch. Er nahm den Frosch in Zwischenzeiten von $1\frac{1}{2}$ — 2 Stunden aus der mit Stickgas gefüllten Glocke heraus, sammelte die Luft in einem andern Gefäss auf durch eine besondere Vorrichtung, füllte die Glocke wieder mit Stickgas und liess den Frosch wieder darin athmen. Diess wiederholte er bei jedem Versuche mehrere Mal. Beim Einbringen des Frosches wurden die Lungen und Kehle zusammengedrückt. Diese Methode hat einige Vortheile, allein bei dem öfteren Wiedereinbringen des Frosches wird jedesmal doch wieder eine kleine Quantität atmosphärischer Luft durch seine auch noch so sehr comprimirten Athemorgane in den Versuch gebracht. Collard hat nicht bemerkt, wie er das Stickgas bereitet und gereinigt hat. Die Resultate der Versuche von Collard sind folgende.

A. Ein Frosch bildete in $7\frac{1}{2}$ Stunden 2,80 Centilitres Kohlensäure, diess macht 1,41 P. C. Z.

B. 3 Frösche bildeten in 8 Stunden 7,98 Centilitres Kohlensäure; diess macht auf einen Frosch 1,34 C. Z.

C. 2 Frösche bildeten in $8\frac{1}{2}$ Stunden 5,22 Centilitres Kohlensäure; diess macht auf einen Frosch 1,31 C. Z.

Digitized by Google

D. 2 Frösche bildeten in 8 Stunden 5,43 Centilitres Kohlensäure; diess macht auf einen Frosch 1,36 C. Z.

E. 2 Frösche bildeten in $7\frac{1}{2}$ Stunden 4,89 Centilitres Kohlensäure; diess macht auf einen Frosch 1,22 C. Z.

F. 2 Frösche bildeten in 9 Stunden 5,15 Centilitres Kohlensäure; diess macht auf einen Frosch 1,29 C. Z.

G. 2 Frösche bildeten in 8 St. 40 Min. 5,70 Centilitres Kohlensäure, diess macht auf einen Frosch 1,43 C. Z.

Es schien mir durchaus nöthig, die Versuche von Edwards und Collard zu wiederholen. Da mir 20 Pfund Quecksilber zu Gebote standen, so konnte ich den Versuch schon in einem grossen Gefäss anstellen.

A. Ein Cylinder von 20 C. Z. Inhalt wurde mit Quecksilber gefüllt, und mit Hülfe einer geschliffenen Glasplatte im Quecksilber umgestürzt, der Cylinder darauf mit Wasserstoffgas (aus Zink und verdünnter Schwefelsäure bereitet) gefüllt. Nun brachte ich 4 Frösche bei Zusammendrückung ihrer Lungen in den Cylinder. Nach 4 Stunden machten sie keine Athembewegungen mehr, obgleich sie noch Lebenszeichen von sich gaben. Nach 12 Stunden nahm ich sie heraus, sie waren todt, und lebten an der Luft nicht wieder auf. Kali caust. in den Cylinder gebracht, absorbirte $1\frac{4}{5}$ C. Z. Kohlensäure; diess macht auf jeden Frosch 0,45 C. Z. Bei diesem Versuche war das Wasserstoffgas ungereinigt; es enthält dann ein stinkendes Oel und selbst etwas Kohlensäure. Gmelin's *Chemie.* 1. 217.

B. Bei einem mit Prof. Bergemann gemeinschaftlich angestellten Versuche wurde das Wasserstoffgas durch Weingeist streichen gelassen, und ein kleinerer Cylinder von 10 C. Z. Inhalt angewandt. In diesem *reinen* Wasserstoffgas lebte ein Frosch nach 12 Stunden noch matt mit lange aussetzenden Athembewegungen, und war selbst nach 22 Stunden nur scheintodt. Bei der Prüfung der Luft mit Kali caust. wurde $\frac{1}{2}$ C. Z. absorbirt. Der Frosch lebte wieder auf und wurde von Prof. Bergemann noch zu mehreren anderen Versuchen, nämlich zu 4 mit Wasserstoffgas und 2 mit Stickgas gebraucht. Nach einiger Zeit wurde er mir wieder eingehändigt. Ich fand ihn ganz lebhaft. Sein Blut gerann wie sonst bei Fröschen.

C. Ich liess einen Frosch 4 Stunden in Wasserstoffgas athmen, das ich vorher durch Weingeist hatte streichen lassen. Er war nach 4 Stunden scheintodt. Sein Herz setzte Minuten lang im Schlagen aus, er lebte an der Luft wieder ganz auf. In demselben Cylinder wurde ein zweiter Frosch $2\frac{1}{2}$ Stunden athmen gelassen, worauf er scheintodt schien. Bei der Untersuchung der Luft durch Kali caust. wurden 0,83 C. Z. Kohlensäure absorbirt. Luftdruck 27 Z. 2 L.

D. Ich liess 2 Frösche 6 Stunden in Wasserstoffgas athmen, das ich hatte durch Auflösung von Kali caust. streichen lassen. Sie waren zuletzt scheintodt. Es hatten sich 0,66 C. Z. Kohlensäure gebildet. Luftdruck 27 Z. 5 L. Temp. 17° R.

E. Das zur Entwicklung des Wasserstoffgases bestimmte Gefäss war jedesmal fast voll, so dass es nur sehr wenig atmo-

Digitized by Google

sphärische Luft über der Flüssigkeit enthielt, und man liess jedesmal eine grosse Menge Gas weggehen, ehe man das Wasserstoffgas auffing, so dass man in dieser Hinsicht sicher war. Um aber allen Verdacht von Beimengung von Sauerstoffgas bei dem Wasserstoffgas zu entfernen, brachte ich in das schon durch Kalilösung geleitete, in dem Cylinder angesammelte Wasserstoffgas eine Kugel von Platinaschwamm, und liess sie darin 24 Stunden liegen. Darauf brachte ich einen Frosch in den Cylinder, wie gewöhnlich mit zusammengedrückten Lungen, er war nach 8 Stunden scheintodt. Die Absorption von Kohlensäuregas betrug 0,4 C. Z.

In allen Versuchen geschah die Ueberleitung und Sperrung des Gases mit dem Quecksilberapparat. Ich habe noch 3 andere Versuche angestellt, wo ich das Gas aber, nachdem es aufgefangen war, mit Liquor kali caustici schüttelte. Das Resultat der Athemversuche war ganz analog. Im Versuche F. waren nach 12 Stunden durch den Frosch 0,37 C. Z., im Versuche G. 0,41 C. Z., im Versuche H. 0,4 C. Z. Kohlensäure gebildet. Diese 3 letzten Versuche halte ich aber für fehlerhaft, da das Wasser, womit ich das zur Reinigung des Wasserstoffgases angewandte Kali causticum ausgespült, wie alles ungekochte Wasser etwas Luft enthielt, und also auch etwas Luft an das Wasserstoffgas beim Auswachsen abgegeben haben konnte.

Ein Frosch, den ich durch Verbrennung von Phosphor bereitetes Stickgas athmen liess, lebte darin 6 Stunden. Kohlensäure $\frac{1}{4}$ C. Z. Ich freue mich, hierbei auch einige Versuche von Prof. Bergemann anführen zu können. Folgende Notizen hat er mir mitgetheilt. Die Versuche wurden mit Wasserstoffgas und Stickgas angestellt in einem Zimmer, dessen Temperatur nicht über $+ 10^0$ und nicht unter $+ 4^0$ war. Ein und derselbe Frosch wurde zu allen Versuchen benutzt. Es wurde eine Vermehrung des Gasvolumens beobachtet, diese war in den ersten 3 Stunden, sowohl bei der Respiration des Frosches in Wasserstoffgas als in Stickgas, am stärksten. Nach Verlauf von 4—6 Stunden nahm die Lebensthätigkeit des Frosches bedeutend ab. Das Athmen war ungleichförmig und nach 8—9 Stunden hörte es in langen Zeiträumen ganz auf, konnte jedoch durch eine gelinde Bewegung des Cylinders wieder hervorgebracht werden. Nach der Beendigung der Versuche war der Frosch immer ganz betäubt, nach wenigen Stunden jedoch bewegte er sich freier, und nach einigen Tagen konnte er zu neuen Versuchen benutzt werden. Bei jedem einzelnen Versuche hatte der Frosch *seine gelbliche Farbe in eine dunkelbraune verwandelt*. Das angewandte Hydrogen war aus Zink und verdünnter Schwefelsäure bereitet und durch Alcohol gereinigt. Das Stickgas wurde aus der atmosphärischen Luft durch einen brennenden Körper abgeschieden und darauf mit Kalkwasser geschüttelt. Geringe Antheile Oxygen bleiben jedoch in solchem Azot immer zurück. Die Versuche mit Stickgas können daher auf eine grosse Genauigkeit keine Ansprüche machen. Der Frosch wurde mit eingedrückter Kehle in die Gasart gebracht. Die Menge des angewandten Wasserstoff-

Digitized by Google

gases und Stickgases variirte von 7—8 C. Z. Die Resultate der Versuche von Prof. Bergemann habe ich in einer Tabelle mit den meinigen zusammengestellt. Unter den von mir angestellten Versuchen habe ich die Versuche A. F. G. H., weil sie nicht ganz fehlerfrei sind, hier nicht mit angeführt.

Beobachter	Gasart	Nummer des Versuchs	Dauer des Versuchs	Menge der gebildeten Kohlensäure
Mueller	Stickgas	A	6 St.	0,25 C. Z.
Bergemann	»	A	14	0,75
»	»	B	12	0,5
M. u. B.	Wasserstoffgas	B	22	0,5
Mueller	»	C	$6\frac{1}{2}$	0,83
»	»	D	6	0,33
»	»	E	8	0,4
Bergemann	»	A	10	0,55
»	»	B	12	0,8
»	»	C	13	0,7
»	»	D	14	0,5

Gegen diese Versuche konnte man immer noch den Einwurf machen, dass die Frösche in ihren Lungen einen Theil atmosphärischer Luft in den Versuch mitgebracht, und dass auch ihr Darmkanal Kohlensäuregas enthalten konnte. Ich habe daher die Versuche so wiederholt, dass ich die Frösche zuerst dem luftleeren Raum aussetzte und diesen mit gereinigtem Wasserstoffgas anfüllte. In einem Versuche wurde auch dieses Wasserstoffgas wiederholt ausgepumpt, um den letzten Antheil atmosph. Luft aus dem Raume zu bringen. Auch überzeugte man sich durch eine Probe, dass das Wasserstoffgas nach Absorption des Wasserdampfes von salzsaurem Kalk durch Kali caust. nicht vermindert wurde. Die Frösche wurden 3 Stunden in dem Wasserstoffgas gelassen, sie waren schon viel früher scheintodt. Dann wurden die Frösche herausgenommen, und alles Wasser aus dem Gase entfernt, dadurch, dass ein Röhrchen mit salzsaurem Kalk wiederholt innerhalb eines ganzen Tages in den Raum gebracht wurde, bis der salzsure Kalk darin trocken blieb. Erst dann wurde das Gas auf Kohlensäure mit Kali caust. geprüft. In beiden der angestellten Versuche zeigte sich die gewöhnliche Aushauchung von Kohlensäure, welche im ersten Versuche 0,3, im zweiten 0,37 Cubikzoll betrug.

Die Menge Kohlensäure, welche ein Frosch in 6—12 Stunden in sauerstofffreien Gasarten bildet, kann man ohne Irrthum also auf $\frac{1}{4}$—$\frac{4}{5}$ C. Z. anschlagen. Da die Lungen und Kehle des Frosches im Durchschnitt nur $\frac{3}{8}$—$\frac{1}{2}$ C. Z. enthalten, die Luft derselben bei jedem Versuche zugleich vorher ausgedrückt war, und wenn auch etwas atmosphärische Luft und Kohlensäure zu-

Digitized by Google

rückgeblieben, diess doch sehr wenig seyn konnte, so lässt sich das schon von Spallanzani gefundene Resultat nicht in Abrede stellen, dass die kaltblütigen Thiere auch in sauerstofffreier Luft fortfahren Kohlensäure auszuhauchen, und dass diess selbst fast so viel als beim Athmen in atmosphärischer Luft beträgt, indem ein Frosch nach den pag. 306 mitgetheilten Versuchen in 6 Stunden im Durchschnitt 0,57 C. Z. Kohlensäure in atmosphärischer Luft erzeugt. Diese Ergebnisse sind kürzlich durch Biscboff's nicht minder lehrreiche Versuche bestätigt worden. Derselbe fand auch, dass Frösche mit unterbundenen und ausgeschnittenen Lungen noch Kohlensäure durch die Haut aushauchen (in 8 Stunden 0,20 C. Z.).

In den vorhergehenden Auflagen dieses Lehrbuchs wurden diese Thatsachen mitgetheilt, ohne dass sie sich damals mit den Beobachtungen über das Blut in Uebereinstimmung bringen liessen, nach welchen keine Kohlensäure im Blute enthalten seyn sollte. Man schien daher damals zu der Ansicht berechtigt, dass die beim Athmen gebildete Kohlensäure zum Theil blosse Secretion der Lungen sey, und sich unabhängig von der atmosphärischen Luft erzeugen könne, und man verglich diese Art von Kohlensäurebildung derjenigen bei der Gährung, wo die Kohlensäure sich auch ohne wesentlichen Einfluss des Sauerstoffs der Luft aus den Elementen der organischen Stoffe bildet. Man sollte aber dann erwarten, dass bloss die Lungen oder die Haut das eigenthümliche Vermögen besässen, Kohlensäure abzuscheiden und das Blut allein mit atmosphärischer Luft geschüttelt keine Kohlensäure bilde. Dem ist aber nicht so, wie schon in den früheren Auflagen dieses Handbuchs gezeigt worden. Blut bildet mit atmosphärischer Luft geschüttelt, auch Kohlensäure, und zwar 7 C. Z. Blut mit 10 C. Z. atmosphärischer Luft fast beständig geschüttelt, geben in 6 Stunden $\frac{1}{2}$ C. Z. Kohlensäure. Die Lehre vom Athmen befand sich daher noch vor mehreren Jahren in einer unauflöslichen Schwierigkeit. Blut bildet mit dem Sauerstoffe der atmosphärischen Luft etwas Kohlensäure ohne die Einwirkung des lebenden Organs, indem es hellroth wird, das Blut sollte keine Kohlensäure praeexistirend enthalten, und doch hauchen Amphibien ohne Mitwirkung von Sauerstoffgas fast eben so viel Kohlensäure als in der Atmosphäre aus.

Jetzt ist diess Räthsel zur vollkommenen Genüge gelöst. Beiderlei Blutarten enthalten nach Magnus vortrefflichen Untersuchungen Sauerstoffgas, Stickgas und Kohlensäure, das arterielle Blut mehr Sauerstoffgas als das venöse, letzteres mehr Kohlensäure als das arterielle. Die im Blut enthaltene Kohlensäure wird beim Athmen durch die atmosphärische Luft ausgetrieben, und an ihre Stelle tritt zum Theil Sauerstoffgas, während ein Theil der Kohlensäure selbst im arteriellen Blute aufgelöst bleibt; in den Capillargefässen wird durch Wechselwirkung mit den Organtheilen, für welche Sauerstoff ein belebender Reiz ist, Kohlensäure gebildet, die sich daher in grösserer Menge im Venenblute vorfindet, aber nicht aller im arteriellen Blute vorhandene

Digitized by Google

Sauerstoff verschwindet in den Capillargefässen; ein Theil derselben findet sich auch noch im venösen Blute vor, in den Lungen wird die Kohlensäure durch die atmosphärische Luft zum Theil wieder ausgetrieben. Dieser Austausch der Gase ist vollständig nach den physikalischen Gesetzen der Absorption der Gase erklärbar. Eine mit einem Gase geschwängerte Flüssigkeit giebt diess Gas nicht ab, wenn sie unter dem Druck derselben Gasart steht. Steht aber diese Flüssigkeit mit einem andern Gase in Verbindung, so tauschen sich beide Gase bis zum Gleichgewicht der Vertheilung aus. Daher ist es leicht erklärbar, warum die Frösche in Wasserstoffgas und Stickgas ebenso viel Kohlensäure aushauchen, als in atmosphärischer Luft, und warum Wasserstoffgas und Stickgas beim Durchgehen durch Blut die in ihm enthaltene Kohlensäure aufnehmen.

Die im Blute enthaltene Kohlensäure reicht übrigens hin, um von ihr die ganze beim Athmen frei werdende Menge der Kohlensäure herzuleiten.

Nimmt man 2 Unzen Blut für jeden Herzschlag gefördert an, so erhält man, dass 10 Pf. in einer Minute an den Lungen vorbeigehen und dass 10 Pf. Blut also 22,7 C. Z. Kohlensäure enthalten müssten, die in einer Minute ausgeschieden werden. Nimmt man das von Allen und Pepys gefundene Resultat von 22,7 C. Z. Kohlensäure um die Hälfte zu gross an, wie es denn wirklich zu gross ist, nimmt man an, dass, wie in Davy's Versuch in einer Minute 15,8 C. Z. Engl. = 13 C. Z. Franz. ausgeathmet werden, so müssten doch 13 C. Z. Kohlensäure in 10 Pf. Blut aufgelöst seyn.

Aus Magnus Versuchen folgt die Lösung dieses früher aufgestellten Problems. Denn aus seinen Versuchen ergiebt sich, dass das Blut wenigstens $\frac{1}{5}$ seines Volumens an Kohlensäure enthält, und da ein Pfund Blut etwa 25 C. Z. beträgt, so würden also in jedem Pfunde venösen Blutes mindestens 5 C. Z. Kohlensäure enthalten seyn. Die in einer Minute an den Lungen vorbeigehenden, 10 Pfund Blut enthalten, also der Berechnung nach 50 C. Z. Kohlensäure, wovon beim Athmen sehr gut 13 C. Z. (Davy) oder 22,7 C. Z. (Allen und Pepys) abgegeben werden können.

Das Stickgas der atmosphärischen Luft welches beim Athmen zum kleinen Theil ins Blut übergeht, scheint keine weitere Rolle zu spielen; da seine Quantität in beiden Blutarten nicht verschieden scheint. Der letzte Zweck des Athemprocesses besteht offenbar in Aufnahme des Sauerstoffs ins Blut und in der Belebung der Organe durch diess Princip, zweitens in der Befreiung des Blutes von der in den Capillargefässen entstehenden Kohlensäure. Dass das letztere nicht der Hauptzweck ist, sieht man deutlich an dem Scheintodtwerden der Frösche in Wasserstoffgas und Stickgas, welche Gase die Aushauchung der Kohlensäure nicht im mindesten verändern.

Digitized by Google

VI. Capitel. Von den Athembewegungen und Athemnerven.

a. Athembewegungen.

Das Ein- und Ausathmen geschieht bei dem Menschen und den Säugethieren durch Erweiterung und Verengerung der Brusthöhle. Sobald die Brustwände sich ausdehnen, und die Brusthöhle erweitert wird, dringt die Luft in der Luftröhre und ihren Zweigen bis in die Zellen nach, die sich in dem Maasse ausdehnen, als die Brusthöhle sich erweitert, so dass also die Oberfläche der Lungen durchaus den sich ausdehnenden Wänden der Brusthöhle folgt. Diess ist nur so lange möglich, als die Brusthöhle von allen Seiten geschlossen ist, und so lange kein Druck der Luft von aussen dem Druck der Luft von der Luftröhre aus das Gleichgewicht hält. Bei penetrirenden Bruswunden aber ist kein volles Einathmen mehr möglich, weil der Luftdruck dann durch die Wunde auf die äussere Oberfläche der Lungen wirkt, und dem Luftdruck von der Luftröhre her das Gleichgewicht hält. Die Lungen bleiben dann collabirt, wenn auch die Brustwände sich ausdehnen. Zur Erweiterung der Brusthöhle beim Einathmen dient ganz vorzüglich das Zwerchfell. Im erschlafften Zustande ist das Zwerchfell gewölbt, bei der Contraction desselben wird es flach, und indem seine Wölbung herabsteigt, erweitert es also die Brusthöhle, wodurch zugleich die Eingeweide der Bauchhöhle von oben gedrückt werden. Dieser Druck auf die Baucheingeweide von oben beim Einathmen verursacht das Hervortreiben derselben nach vorn oder das scheinbare Anschwellen des Bauches beim Einathmen.

Sobald das Zwerchfell erschlafft, weichen die Eingeweide wieder mehr zurück, und der Bauch wird flacher. Beim leisen Einathmen bewirkt das Zwerchfell zum grossen Theil allein die Erweiterung der Brust. Die seitliche Erweiterung der Brust geschieht vorzüglich durch die Wirkung der Musculi intercostales, aber auch durch Unterstützung der Musculi scaleni, levatores costarum, des serratus posticus superior, und der Brustmuskeln überhaupt. Das Ausathmen kann beim ganz ruhigen Athmen schon durch blossen Collapsus, durch die Elasticität oder Herstellung der vorher ausgedehnten Theile in den Status quo erfolgen, und das ruhige Athmen scheint weniger aus der Abwechselung antagonistischer Muskelbewegungen, als vielmehr periodischer Inspirationsbewegungen zu bestehen. Hierbei wirken zwar die Exspirationsmuskeln durch jenes mässige Contractionsspiel, welches allen Muskeln auch ausser den stärkeren Zusammenziehungen eigen ist, mit. Wenigstens erfolgt das Ausathmen von selbst, so wie die Inspiration aufhört. Beim stärkern Ausathmen wirken diese Muskeln stärker, noch mehr, und selbst krampfhaft, wenn Reizung in den Lungen oder im Kehlkopfe stattfindet, und Husten eintritt. Die Exspirationsmuskeln sind die Bauchmuskeln, welche die

Digitized by Google

Rippen niederziehen, und durch Zusammendrückung des Bauches die Baucheingeweide gegen das erschlaffte Zwerchfell in die Höhe treiben, und so die Brusthöhle auch von unten verengern. Diess sind der gerade, die schiefen, der quere Bauchmuskel, der Musculus quadratus lumborum, Musculus serratus posticus inferior, Musculus sacrolumbaris und longissimus dorsi.

Das Ausathmen wird unterstützt 1) durch die Elasticität der Luftwege, nachdem ihre Ausdehnung durch die Luft aufgehört hat. 2) Durch Zusammenziehung von Muskelfasern der Luftwege (?).

Beim Einathmen ist die Stimmritze weiter, beim Ausathmen enger. Die Luftröhrenzweige werden beim Einathmen weiter, beim Ausathmen enger. Die Luft wird entweder durch Mund oder Nase aufgenommen und ausgetrieben. Beim Athmen durch die blosse Nase ist der Ausgang durch den Mund durch Anlegen der Zunge wider den Gaumen oder durch die Lippen geschlossen, beim Athmen durch den Mund ist das Gaumensegel erhoben und die Luft geht durch den weitern Gang aus. Durch Annäherung der hintern Gaumenbogen gegen einander, wodurch, wie Dzondi entdeckt hat, eine vollständige Verschliessung eintritt, und durch Anlegen des hintersten Theils der Zunge gegen den Gaumen, kann Mund und Nase zugleich von den Respirationswegen abgeschlossen werden. Eine Bewegung, die oft willkürlich geschieht, wenn man den Athem anhält, und das Durchströmen übler Gerüche durch die Nase aufgehoben wird. Dzondi *die Functionen des weichen Gaumens. Halle* 1831.

Bei den Vögeln dringt die Luft beim Einathmen nicht allein in die Lungen, sondern auch in die grossen Zellen. Es giebt hier kein vollständiges Zwerchfell mehr, sondern nur einige Muskelzipfel steigen vom hintern Winkel der 3., 4. und 5. Rippe zu einer fibrösen Haut an der untern Fläche der Lungen empor. Die Erweiterung der Brust erweitert die grossen Zellen, welche mit den Lungen in Verbindung stehen, wodurch die Luft genöthigt wird, sich in die Lungen zu stürzen. Die Luft wird aus den Zellen und den Lungen durch die Thätigkeit der Bauchmuskeln ausgetrieben. Unter den Amphibien athmen die Chelonier, deren Rippen unbeweglich verbunden sind, und die nackten Amphibien, welche keine wahren Rippen haben (Coecilien, Derotemata, Proteiden, Salamandrina, Batrachia) bloss durch Verschluckung der Luft ein. Die Frösche schliessen den Mund, erweitern die Mundhöhle an der Kehle, wodurch ein leerer Raum entsteht, den die Luft, durch die Nasenlöcher eindringend, einnimmt. Dann ziehen sie die Kehle zusammen, verschliessen den Schlundkopf, und treiben durch die Zusammenziehung der Kehle die Luft durch die Stimmritze in die Lungen, während sie durch einen eigenthümlichen Mechanismus die Nasenlöcher schliessen. Die Luft wird theils durch die Bauchmuskeln, theils durch die Elasticität der Lungen bei geöffneter Stimmritze ausgetrieben. Sobald die Frösche den Mund nicht mehr schliessen können, können sie auch nicht mehr athmen. Das Ausathmen geschieht bei den Schildkröten durch Zusammenziehung der Bauchmuskeln zwischen dem Bauchschild und den hinteren Extremitäten. Die mit beweglichen

Digitized by Google

Rippen versehenen Amphibien athmen durch Erweiterung und Verengerung der Körperhöhle vermöge der Rippen. Ueber die Athembewegungen der Fische und ihren Mechanismus siehe Cuvier *Vergl. Anat. T.* 4. 222.

Die Hypothese von der Mitwirkung der Lungen bei den Athembewegungen ist seit den ältesten Zeiten bald erhoben, bald verworfen worden. Für diese Hypothese stritten Averroes, Riolan, Plater, Sennert, Bremond (*mém. de l'acad. d. sc. Par.* 1739.), gegen dieselbe Th. Bartholin, Diemerbröck, Mayow und Haller. Haller *elementa physiol. T.* 3. *l.* 8. *p.* 226. Die Ersteren sahen bei Thieren, deren Brusthöhle geöffnet war, die Lungen nicht immer zusammen fallen, sondern in einigen Fällen sich dauernd bewegen, obgleich die Brustmuskeln ausser Thätigkeit waren. In der neuern Zeit haben Flormann und Rudolphi diese Hypothese vertheidigt. Rudolphi *anat. physiol. Abhandl. p.* 111. Flormann sah, dass die Lungen eines ersäuften Hundes selbst nach Zerschneidung des Zwerchfelles noch fortfuhren sich zu bewegen, Rudolphi sah die Bewegung der Lungen an einem erdrosselten Hunde, bei entferntem Brustbeine, zerschnittenem Zwerchfelle und Intercostalmuskeln. Man leitete schon solche Bewegungen der Lungen von den Erschütterungen des Brustkastens ab, sie können auch wohl von den Zusammenziehungen des Herzens, und von den von mir beobachteten Zusammenziehungen der Lungenvenen herrühren. Haller hatte nie so etwas gesehen, er sah immer die Lungen bei vollständiger Oeffnung der Brusthöhle ganz collabirt; ich habe auch nie dergleichen gesehen, und ich vermuthe bei den Erfahrungen der ehrwürdigen Männer Flormann und Rudolphi eine Täuschung. Die weitere Auseinandersetzung dieser Controverse hat bloss ein geschichtliches Interesse. Die Gründe und Gegengründe wiederholen sich, und man ist zuletzt auf das Zeugniss seiner Augen angewiesen, das nach meinen Erfahrungen gegen die Hypothese spricht. Tiedemann sah Bewegungen an dem Athemorgan der Holothurien. Treviranus hatte an den Lungen der Frösche auf Application von Opiumtinctur und Belladonnenextract Bewegungen gesehen. Die Frösche füllen von der Kehle aus ihre Lungen mit Luft, die beim Oeffnen der Stimmritze und Nasenlöcher entweicht. Ist die Stimmritze geöffnet, so sind die Lungen für immer collabirt, und man kann keine Zusammenziehungen an ihnen erregen. Vergl. über diesen Gegenstand Lund *Vivisectionen p.* 243—250.

Dagegen ist die Contractionsfähigkeit der Luftröhre und ihrer Aeste wohl weniger zu bezweifeln. Man könnte vermuthen, dass die Luftröhrenäste an den von Houstoun, Bremond, Flormann und Rudolphi gesehenen Phänomenen Antheil haben. Indessen ist es doch problematisch, dass die Fleischfasern der Luftröhre rhythmische Bewegungen ausüben. Die queren Fleischfasern der Luftröhre an ihrer hintern Seite sind bekannt. Fleischfasern sollen sich auch noch an den ziemlich kleinen Zweigen der Luftröhrenäste finden. Diese Fasern sind durch Reisseisen *de fabrica pulmonum. Berol.* 1822. *fol.* am meisten berühmt geworden. Reisseisen wollte die Fleischfasern mit der Loupe noch an

Digitized by Google

so kleinen Luftröhrenzweigen erkannt haben, an welchen er keine Knorpel mehr wahrnahm.

Es ist merkwürdig, dass die Contractionskraft der Muskelfasern der Luftröhre und Luftröhrenzweige noch durch keinen directen Beweis entschieden ist. Alle Ausführungsgänge der Drüsen haben wahre Muscularcontractilität, sie sind unwillkürlich beweglich. Den Ductus choledochus der Vögel kann man bei Vivisectionen sich rhythmisch bewegen sehen, wie ich mehrmals selbst ohne Reize sah. Die Ureteren sah ich bei Säugethieren und Vögeln auf starken galvanischen Reiz sich zusammenziehen. Tiedemann sah Zusammenziehungen am Ductus deferens des Hoden beim Pferde. Aber die Zusammenziehungen der Luftröhrenfasern auf Reize sind bis jetzt nur von Krimer (*Untersuchungen über die nächste Ursache des Hustens. Leipz.* 1819.) gesehen worden. Wedemeyer dagegen beobachtete bei einem Hunde und einem Meerschweinchen weder auf mechanische, noch auf galvanische Reizungen auf den ganzen Umfang der Luftröhre, mit und ohne Trennung der Schleimhaut angewandt, irgend etwas von Contraction. Dagegen zeigte sich in den Bronchialzweigen von $\frac{3}{4}$—1 Linie Durchmesser eine allmählige Verengerung ihres Lumens, fast bis zum gänzlichen Erlöschen desselben. Bei einem lebenden Hunde befreite Wedemeyer die Luftröhre 2 Zoll lang von allem Zellgewebe, und schnitt vorn ein Stück aus der Luftröhre aus. Wedemeyer sah bei der Reizung der hintern Wand der Luftröhre durch mechanischen und galvanischen Reiz keine Spur von Zusammenziehung. Wedemeyer öffnete nun schnell die Brust, nahm die Lungen mit ihren Bronchien heraus, und machte mehrere Durchschnitte derselben. Die Stämme der Bronchien zeigten kein Zeichen einer Zusammenziehungskraft. Dagegen glaubte Wedemeyer in kleineren Aesten von circa 1 Linie Durchmesser auf den galvanischen Reiz eine deutliche Constriction zu sehen, doch geschah diess sehr langsam. Den letzteren ähnliche Beobachtungen machte bereits Varnier. Eine rhythmische Bewegung der Luftröhre mit den Athembewegungen, die in diesem Falle willkürlich seyn könnte, wäre ein ganz isolirtes Factum. Der Ductus choledochus zieht sich zwar auch rhythmisch zusammen, aber diese Bewegungen sind doch aller Willkür entzogen, dahingegen rhythmische Bewegungen der Luftröhre, welche mit den anderen Respirationsbewegungen gleichzeitig geschehen, auch mit diesen der Willkür unterworfen seyn müssen. Ein solcher Einfluss der Willkür bis auf die Zweige des Ausführungsganges eines Eingeweides ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Vielleicht könnte eine beständig sich äussernde Contractilität in den Fasern der Luftröhrenzweige, bei dem Nachlass jeder Ausdehnung durch Inspiration, zur rhythmischen Verengerung wirken. Diess kann aber auch durch blosse Elasticität erfolgen, und wirklich sind die Luftröhren, so wie ihre Aeste mit elastischen gelben Längsfasern besetzt. Bei den Vögeln giebt es allerdings willkürliche Verkürzungen der Luftröhre durch besondere Muskeln, M. sternotracheales und M. ypsilotracheales (und bei vielen Vögeln für den Zweck des Gesan-

Digitized by Google

ges an dem untern Kehlkopfe bei der Theilung der Luftröhre noch besondere Muskeln). Sehr interessant ist, dass jene Muskeln, wie ich sehe, von einem besondern Nerven versehen sind, einem zweiten Ramus descendens N. hypoglossi, der bis fast zum untern Kehlkopfe herabgeht, und (bei dem Truthahn) die M. sternotracheales und ypsilotracheales versieht, während der N. recurrens, grösstentheils der Speiseröhre bestimmt, einen verhältnissmässig nur kurzen Ramus trachealis entgegen schickt. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, Desmoulin's Angabe zu prüfen, dass die Muskeln des untern Kehlkopfs, von den unteren Cervicalnerven versehen sind. Beim Menschen scheint die Erweiterung der Luftröhrenzweige und die von Einigen beobachtete Verkürzung der Luftröhre beim Einathmen, die Verlängerung beim Ausathmen eine bloss mechanische Folge der Ausdehnung und Verengerung der Brust zu seyn. Der Kehlkopf selbst rückt beim heftigen Einathmen ein wenig nach abwärts, und beim Ausathmen wieder aufwärts.

b. Einfluss der Nerven auf das Athmen.

Die Athembewegungen sind sehr zusammengesetzt, und dem Wirkungskreise sehr verschiedener Nerven unterworfen. Gleichwohl ist die Quelle der gemeinschaftlichen Thätigkeit dieser Nerven eine und dieselbe. Die Athembewegungen bestehen 1) aus Bewegungen im Gesichte, die sich aber nur selten rhythmisch äussern, wie die Erhebung und Senkung der Nasenflügel, die Anstrengung mehrerer Gesichtsmuskeln beim Athmen. Diese Bewegungen erfolgen bei unwillkürlichen heftigen Athembewegungen, und bei grosser Schwäche selbst mit, sie sind von dem Nervus facialis abhängig, den Charles Bell den Athemnerven des Gesichtes nennt. 2) Erweitern der Stimmritze beim Einathmen, Verengern derselben beim Ausathmen. Diese Bewegung ist ganz von dem Nervus vagus, und zwar von seinen beiden Kehlkopfästen, Nervus laryngeus superior et inferior seu recurrens abhängig. 3) Erweiterung der Brust beim Einathmen. Nervi spinales. Nervus respiratorius externus Bellii. Nervus accessorius Willisii, insofern er den M. cucullaris beim Heben der Schulter beherrscht. 4) Zusammenziehung des Zwerchfelles beim Einathmen. N. phrenicus. 5) Endlich Zusammenziehung der Bauchmuskeln beim Ausathmen. Nervi spinales. Wir sehen, das zu dem System der Athemnerven der Nervus facialis, vagus, accessorius, und viele Spinalnerven, die sich in den Rumpfmuskeln verbreiten, gehören. Jeder dieser Nerven hat seinen verschiedenen Wirkungskreis, und es kann der eine ohne den andern vernichtet werden. Die Durchschneidung jedes dieser Nerven hebt seinen Antheil an diesen Bewegungen auf. Aber die Vernichtung der Medulla oblongata hebt alle Athembewegungen zu gleicher Zeit auf, auch die Wirkung derjenigen Nerven, welche von dem Rückenmark entspringen. Das Rückenmark verhält sich zu dieser Quelle der Athembewegungen gleichsam als Stamm der Nerven, die von ihm abgehen. Durchschneidet man das Rückenmark oberhalb

Digitized by Google

des Abgangs der Dorsalnerven, so werden die Bewegungen der Rippen und der Bauchmuskeln gelähmt, die anderen Bewegungen dauern fort. Durchschneidet man das Rückenmark über dem Zwerchfellsnerven, so wird auch dieser mit unthätig, während die von der Medulla oblongata selbst abgehenden Nerven noch wirksam sind. Die unter der Verletzung abgehenden Nerven sind zwar noch wirksame Erreger der Bewegung, wenn man sie einzeln reizt, aber sie können nicht mehr von der gemeinsamen Quelle aller gleichzeitigen unwillkürlichen und willkürlichen Athembewegungen aus bestimmt werden. Mit der Verletzung der Medulla oblongata hören alle Athembewegungen zugleich auf, sowohl diejenigen, die vom N. vagus abhängen, als die des Rumpfes.

Legallois hat dieses Verhältniss gezeigt; er hat bewiesen, dass keine anderen Theile des Gehirns die Quelle der Athembewegungen sind, und dass man bei einem Thiere das Gehirn von vorn nach hinten allmählig abtragen kann, bis bei Verletzung der Medulla oblongata, an einer dem Abgange des Nervus vagus entsprechenden Stelle, alle Athembewegungen zu gleicher Zeit aufhören. Deswegen ist auch die Medulla oblongata gleichsam der vulnerabelste Theil, wenigstens derjenige, dessen Verletzung unter allen Verletzungen der Nerven und der Centraltheile des Nervensystems die gefährlichsten Folgen hat.

Die Verletzung des Nervus vagus am Halse lähmt die unter der Verletzung des Nerven abgehenden Zweige, also den Nervus recurrens. Die Folge davon ist, dass das Thier die Stimme verliert, und die Oeffnung der Stimmritze erschwert wird. Die Stimme kehrt jedoch nach einigen Tagen wieder, weil die Muskeln des Kehlkopfes gemeinschaftlich von dem Nervus laryngeus superior und inferior versehen werden. Nach Durchschneidung des Nervus laryngeus superior und des recurrens auf beiden Seiten ist der Kehlkopf ganz gelähmt. Magendie's Behauptung, dass der Nervus laryngeus inferior sich nur zu den Muskeln begebe, welche die Erweiterung der Stimmritze bewirken, der N. laryngeus superior zu denen, welche die Stimmritze verengern, hat sich bei näherer Untersuchung durch Schlemm und Andere nicht bestätigt. Beiderlei Nerven verbreiten sich in beiderlei Muskeln. Wenn es einen Unterschied in den Functionen beider Nerven giebt, so entsteht er gewiss nur dadurch, dass der Nervus recurrens bei seinem merkwürdigen Verlaufe und seinen Verbindungen mit dem N. sympathicus, plexus cardiacus nicht allein Fasern von dem willkürlichen Bewegungsnerven Vagus, sondern auch viele Fasern vom Sympathicus enthält. Wir wissen nicht, ob der N. recurrens willkürliche Bewegungen der Kehlkopfmuskeln hervorbringen kann. Andere tiefe Zweige des N. vagus, welche sich viel mit dem Sympathicus verbinden, sind keiner Leitung zur willkürlichen Bewegung mehr fähig, wie die der Speiseröhre, des Magens.

Hier ist der Ort, Charles Bell's Ansichten über die Athemnerven zu entwickeln. Der Anblick eines Menschen, im Zustande aufgeregter Thätigkeit, überzeugt uns, dass die vom Athmen ab-

Digitized by Google

hängigen Bewegungen fast über den ganzen Körper sich erstrekken, indem sie dann an Bauch, Brust, Hals und Gesicht beobachtet werden. Bell vermuthet, dass ein besonderes System von Fasern in der Medulla oblongata und im Rückenmark die gleichzeitigen und übereinstimmenden Wirkungen der Athemnerven der 2 Systeme beherrsche. Alle Athemnerven dienen auch vorzugsweise dem Ausdruck der Leidenschaften. Ausser der Concurrenz eines grossen Theils der Spinalnerven zum Athmen, unterscheidet Bell als besondere Athemnerven für besondere Regionen:

1) Nervus vagus, Athemnerve des Kehlkopfs.

2) N. facialis, Athemnerve des Gesichtes. Die Wirkungen dieses Nerven treten beim Athmen um so mehr hervor, je angestrengter es ist, z. B. bei aufgeregter Thätigkeit und bei sehr geschwächten Menschen. Die Erhebungen und Senkungen der Nasenflügel und die Verzerrungen der Gesichtsmuskeln bei diesem ängstlichen Athmen sind von jenem Nerven abhängig. Die Durchschneidung dieses Nerven nimmt dem Antlitze seine Sympathie mit den Athemorganen und den Ausdruck des Affectes. Bei den Thieren nimmt die Ausbildung dieses Nerven mit dem Mangel der leidenschaftlichen Bewegungen in ihrem Gesichte ab.

3) Der obere Rumpfathemnerve, Nervus accessorius Willisii, ausgezeichnet durch seinen merkwürdigen Verlauf, dass seine vom obern Theile des Rückenmarks kommenden einfachen, zwischen den doppelten Wurzeln der Spinalnerven entspringenden Wurzeln, zu seinen Wurzeln von der Medulla oblongata aufsteigen, dass er also mit einem grossen Theile seiner Wurzeln in die Schädelhöhle aufsteigt, um als Nervenstamm wieder aus ihr herauszutreten. Dieser Nerve verstärkt zum Theil den Vagus, und beherrscht die Thätigkeit des Musc. cucullaris bei Ausübung seiner Functionen als Athemmuskel, indem er durch das Heben der Schulter die Brust von ihrem Gewichte befreit. Durchschneidet man den Nervus accessorius bei einem lebenden Thiere, so hört nach Bell die Mitwirkung jenes Muskels beim Athmen auf, während die Fähigkeit desselben zu willkürlichen Bewegungen (durch Aeste von Cervical-Nerven noch fortdauert.

4) Der grosse innere Athemnerve. Nervus phrenicus. Zwerchfellsnerve.

Auf den Nervus thoracicus posterior ist von Bell mehr Gewicht gelegt worden, als er verdient.

Die Quelle aller dieser Nervenwirkungen ist, wie wir gesehen haben, die Medulla oblongata. Ihre Verletzung hebt alle Athembewegungen auf. Dagegen eine Verletzung des Rückenmarks im 5. Halswirbel, welche den N. phrenicus noch nicht betheiligt, nach Bell das Athmen durch den Nervus phrenicus, accessorius und respiratorius externus noch nicht aufhebt. Hier erfolgt die Exspiration durch blosse Elasticität der Brust- und Bauchwände. Dagegen athmet nach Bell ein neugebornes Kind noch, wenn das Gehirn grösstentheils zerstört ist, wenn nur die Quelle der Athemnerven in der Medulla oblongata unverletzt ist. Bell *physiol. pathol. Untersuchungen des Nervensystems*, übers. von M. H.

Digitized by Google

Romberg. *Berlin* 1832. *p.* 126. 338. Vergl. Muellers's *Archiv.* 1834. 168.

Ich habe schon angeführt, dass das ganze respiratorische System der Nerven dem Ausdrucke der Leidenschaften dient. Dasselbe wird aber auch in vielen anderen Fällen gleichzeitig oder in einzelnen Theilen seiner Wirkungssphäre afficirt. Die asthmatischen Nervenaffectionen sind ein Beispiel von convulsivischer Affection des Systems aller Athemnerven. Aber ein Umstand, worauf Bell nicht aufmerksam gemacht hat, und der mir sehr viel Licht über viele Erscheinungen zu verbreiten scheint, ist, dass das System der Athemnerven durch locale Reize in allen Theilen, welche mit Schleimhäuten versehen werden, in krankhafte Thätigkeit zu Erzeugung convulsivischer Bewegungen gesetzt werden kann. Reize auf die Schleimhaut der Nase bewirken Niesen, Reize im Schlund, in der Speiseröhre, im Magen, im Darm bewirken die Concurrenz der respiratorischen Bewegungen zum Erbrechen, heftige Reizung im Mastdarme, in der Urinblase, im Uterus, bewirken die Concurrenz der respiratorischen Bewegungen zum unwillkürlichen Stuhlgang, und Harnlassen und zum Austreiben der Frucht. Reize der Schleimhaut des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Lungen, ja selbst ein Jucken erregender Reiz in der eustachischen Trompete bewirken Husten.

Alle diese Bewegungen, Husten, Erbrechen, krampfhaft unwillkürlicher Stuhlgang, unwillkürliches, mit Zwang verbundenes Harnlassen, werden mit Hülfe der Respirationsbewegungen ausgeführt. Der locale Reiz wirkt hier von der innern Haut der Eingeweide auf die darin sich verzweigenden Aeste des Sympathicus, bei Magen, Schlund, Kehlkopf, Lungen auch auf die Aeste des N. vagus, in der Nase auf Nasaläste des N. trigeminus, und reflectirt sich auf die Quelle der Athembewegungen in der Medulla oblongata und auf das Rückenmark, von welchen aus nun die Gruppen der respiratorischen Bewegungen ausgehen, welche Erbrechen, Husten, Niesen etc. bewirken. Reizung der Nasaläste des N. trigeminus in der Nase bewirkt Niesen, und selbst dann, wenn die Reizung secundär ist, wenn z. B. der Reiz des Sonnenlichtes auf den Sehnerven zuerst, dieser auf das Gehirn wirkt, das Gehirn eine secundäre Erregung der Nasennerven und gleichzeitig der Athemnerven verursacht. Ich niese, wie viele Andere, sobald ich helles Sonnenlicht sehe. Reizung des Vagus allein in Kehlkopf, Luftröhre, Lungen erregt Husten, Reizung des Schlundastes des Vagus und des glossopharyngeus im Schlunde, des Vagus im Magen erregt Erbrechen. Wir wollen nun die einzelnen Gruppen dieser sympathischen Respirationsbewegungen durchgehen.

Alle einzelnen Athembewegungen können isolirt ausgeführt werden, und verbinden sich zuweilen zu Gruppen, wie sie in der Regel beim Athmen nicht stattfinden.

Die Zusammenziehung des Zwerchfells, verbunden mit den Athembewegungen zum Ausathmen, findet beim gewaltsamen Austreiben eines Körpers aus Theilen der Bauchhöhle, willkürlich oder unwillkürlich statt, z. B. willkürlich beim Stuhlgang und

Digitized by Google

Harnlassen, unwillkürlich beim Erbrechen, Gebären, unwillkürlichen Stuhlgang nach zu langem Zurückhalten der Excremente und beim unwillkürlichen Harnlassen nach zu langem Zurückhalten des Harns. Sowohl der Schlund als Magen, als Mastdarm, die Urinblase, der Uterus, alle diese Theile stehen durch ihre Nerven in einem solchen Zusammenhang mit den Gehirn- und Rückenmarksnerven, dass jeder heftige Reiz in Schlund, Magen, Mastdarm, Urinblase, Uterus nicht bloss die Zusammenziehung dieser Theile, sondern auch die Zusammenziehung der Bauchmuskeln und des Zwerchfells verursacht zum Austreiben des Reizes nach oben oder nach unten. Diese Wirkung geschieht durch Reflexion der Reizung von Aesten des Nervus vagus im Schlunde und Magen auf das Gehirn und von sympathischen Zweigen des Magens auf das sympathische System und auf Gehirn und Rückenmark, durch Reflexion der Reizung von Nerven des Mastdarms, des Uterus, der Urinblase, theils sympathischen Nerven, theils Aesten der Sacralnerven auf das Rückenmark. Bei allen jenen Bewegungen zum Austreiben eines Theiles nach oben oder nach unten, wird die Stimmritze eine Zeitlang verschlossen.

Für die Genesis des Erbrechens ist eine Beobachtung von mir sehr instructiv, dass, wenn man bei einem Kaninchen die Unterleibshöhle öffnet, und den N. splanchnicus (an der innern Seite der Nebenniere) auf der linken Seite blosslegt, diesen Nerven mit einer Nadel zerrt, öfter eine Zuckung der Bauchmuskeln entsteht. Beim Hunde habe ich diess nicht wieder gesehen.

Beim Husten wird die Reizung des N. vagus in Kehlkopf, Luftröhre, Lungen auf die Medulla oblongata verpflanzt. Die Medulla oblongata erregt darauf Zusammenziehung der Stimmritze, mit krampfhaften Exspirationsbewegungen der Brust- und Bauchmuskeln, wobei in jeder Exspirationsbewegung die vorher geschlossene Stimmritze sich etwas öffnet, und ein lauter Ton entsteht. Das Zwerchfell hat mit dem Husten nichts zu thun, als dass zuweilen vor dem Husten ein tieferes Einathmen erfolgt. Nach Krimer (*Untersuchungen über den Husten*) und Bracket kann man nach Durchschneidung des Nervus vagus auf beiden Seiten bei einem Thiere keinen Husten mehr durch heftige Reizung der innern Fläche der Luftröhre erregen. Nach Durchschneidung des N. sympathicus am Halse kann man nach Krimer allerdings noch Husten erregen.

Wir sind im Stande, den Eingang in den Kehlkopf nicht bloss durch die Schliessung der Stimmritze, sondern selbst im Rachen von dem Nasenkanal und Mundkanal abzuschliessen. Diess geschieht durch die von Dzondi entdeckte Annäherung der hinteren Gaumenbogen, die sich fast gleich zwei von der Seite sich nähernden Vorhängen aneinander legen, und durch Anlegen des hintern Theils der Zunge gegen dieses Planum inclinatum. Diese Bewegung geht jedesmal dem Niesen vorher.

Das Niesen ist eine heftige plötzliche Zusammenziehung der Exspirationsmuskeln, nachdem die Luftgänge vorher vorn abgeschlossen waren. Diese Verschliessung ändert sich im Moment der heftigen Exspiration in ein plötzliches Oeffnen des Mundgan-

Digitized by Google

ges und Nasenkanales zugleich, oder des Nasenkanales allein. Mit dem Zwerchfelle, das so viele ältere und neuere Autoren nach dem Volksglauben eine Rolle spielen lassen, hat das Niesen gar nichts zu thun. Das Zwerchfell ist kein Musculus exspiratorius, und nur bei dem dem Niesen vorhergehenden tiefen Einathmen ist das Zwerchfell thätig. Die weitläufigen Nervensympathien zur Erklärung des Niesens scheinen ganz unnöthig. Bei der falschen Supposition, dass das Niesen durch das Zwerchfell erfolge, liess man die Reizung des Nasalnerven auf den tiefen Zweig des N. vidianus und auf den sympathicus, und von dort auf die Halsnerven und den N. phrenicus sich fortpflanzen. Da nicht das Zwerchfell, sondern die Expirationsmuskeln den Akt des Niesens (mit vorhergehender Abschliessung des Mund- und Nasenkanals) bewirken, so ist es am einfachsten, als Vermittler zwischen den Nasalästen des Trigeminus, den Exspirationsmuskeln und den Muskeln des Gaumensegels, die Medulla oblongata selbst anzusehen, nach Analogie der sympathischen Bewegung der Iris durch den Lichtreiz. Denn hier wirkt, wie es sich deutlich zeigen lässt, der Lichtreiz weder unmittelbar auf die Ciliarnerven, noch von der Netzhaut auf die Ciliarnerven. Die Arteria centralis ist zwar nach Tiedemann's Entdeckung von einem feinen Zweigelchen vom Ciliarknoten begleitet. Diess Zweigelchen verbreitet sich aber auf der Arteria centralis retinae, und steht mit der Retina in keinem erwiesenen Zusammenhange. Bei voller Lähmung der Retina bewirkt das Licht in der Regel keine Zusammenziehung der Iris mehr, wohl aber noch durch das gesunde Auge eine Zusammenziehung der Iris des kranken Auges. (Es giebt indess Ausnahmen von dieser Regel, welche Tiedemann *Zeitschr. für Physiol.* 1. 252. zusammengestellt hat.) Die Bewegung der Iris erfolgt daher auch offenbar durch eine Reflexion der Reizung der Retina auf das Gehirn, vom Gehirn zurück auf den N. oculomotorius, und das Ganglion ciliare. Die Sympathieen eines grossen Theils von Nerven mit einer örtlichen Reizung durch Vermittelung des Gehirns und Rückenmarks, werden sehr gut erläutert durch die bei der Narkotisation eines Thiers erfolgenden Erscheinungen, wo eine leise Berührung auf der Haut schon allgemeine tetanische Krämpfe erzeugt.

Das Gähnen ist eine tiefe und langsame Inspiration und Exspiration mit Antheil der Respirationsmuskeln des Gesichts, die vom facialis abhängig sind. Der Mund wird dabei weit geöffnet, eine Bewegung, die auch vom N. facialis durch den Musc. digastricus beherrscht wird. Das Gähnen erfolgt gewöhnlich nach einer Ermüdung, besonders leicht und häufig bei Menschen mit gereiztem und geschwächtem Nervensysteme, auch bei der Schläfrigkeit, bei dem Eintritte eines Fiebers. Dass es von Hindernissen im kleinen Kreislauf entstehe, scheint mir eine durchaus falsche Supposition. Lachen und Weinen sind auch mit Affectionen der Respirationsnerven, im Gesichte und am Rumpfe verbunden.

Das Schluchzen ist eine wahre Zwerchfellsaffection, ein abruptes Einathmen bloss durch das Zwerchfell; zuweilen zieht sich das Zwerchfell zusammen, während die Stimmritze zugleich geschlos-

Digitized by Google

sen ist. Das Schluchzen entsteht meist durch Druck auf Schlund, Speiseröhre beim Verschlingen zu grosser Bissen, oder bei zu schneller Aufeinanderfolge der Verschlingungen. Häufig ist es ein Zeichen von Nervenaffection. Nach Krimer soll man das Schluchzen bei Thieren durch Reizen und Drücken des linken Magenmundes hervorbringen können.

Alle Athembewegungen erfolgen ausser dem Einfluss des Willens unwillkürlich, und sind doch auch innerhalb einer gewissen Grenze dem Willen unterworfen. Sie erfolgen, ohne dass wir es wissen, im Schlafe und zu anderer Zeit in beständigem Rhythmus; häufig als blosse periodische Inspirationen, in deren Zwischenzeiten die Theile wieder durch die Elasticität sich verengern, häufig auch als abwechselnde Inspirations- und Exspirationsbewegungen. Sind die Lungen zum Theil zerstört, oder mit Blut überfüllt, so kann in gleichen Zeiten viel weniger geathmet werden, und die Athembewegungen sind dann in gleichem Grade schneller. Die Athembewegungen sind insofern dem Willen unterworfen, als wir den Eintritt der einzelnen Athemzüge, aber nur innerhalb einer gewissen Grenze, willkürlich bestimmen, dieselben verkürzen, verlängern, verschieben können, und die Athembewegungen auf einzelne Gruppen der Respirationsmuskeln beschränken können, indem wir z. B. bald mit den Brustwänden, bald mit dem Zwerchfelle, bald mit beiden zugleich die Inspirationsbewegung machen. Diese Willkür üben wir wie bei fast allen Bewegungen, die von Gehirn- und Rückenmarksnerven abhängig sind, aus, und die Willkür dauert so lange, als die entsprechenden Nerven noch mit dem Gehirne und Rückenmark in Verbindung stehen. Ausserordentlich merkwürdig und räthselhaft ist nun aber der Rhythmus der unwillkürlichen Athembewegungen, welcher, wie wir schon gesehen haben, auch in der Medulla oblongata seine Quelle hat. Bei dem Fötus fehlen diese Athembewegungen bis nach der Geburt. Es liegt sehr nahe zu glauben, dass der Einfluss der atmosph. Luft auf die Lungen-, Luftröhren- und Kehlkopfnerven die Ursache der Athembewegungen sey, insofern die Reizung der feinsten Zweige der Nervi vagi in diesen Theilen nach dem Gehirne und der Quelle der Athembewegungen verpflanzt werde. Diess ist indess unzweifelhaft falsch; denn wenn diess richtig wäre, so müsste die Zerschneidung der Nervi vagi am Halse mit gleichzeitiger Durchschneidung des höher abgehenden Nervus laryngeus superior bei Thieren das Athmen ganz aufheben, weil dadurch die Empfindung des Reizes der atmosph. Luft in den Lungen und im Kehlkopfe aufgehoben wird. Ich habe diess beim Kaninchen gethan, ich habe den Nervus vagus auf beiden Seiten durchschnitten, und nachdem ich eine Oeffnung in die Luftröhre zur Unterhaltung des Athmens gemacht, auch den Nervus laryngeus superior durchschnitten, ja hernach den ganzen Kehlkopf ausgeschnitten, aber der Rhythmus der Athembewegungen dauerte unverändert fort, so wie er nach der Durchschneidung der Nervi vagi zu seyn pflegt. In dem Fötuszustande ist aber allerdings die Luftröhre und der Kehlkopf in einem unempfindlichen Zustande, da

Digitized by Google

der Liquor amnii nach Scheel's Untersuchungen in beide eindringt, während beim Erwachsenen die geringste Flüssigkeit an der Stimmritze heftige Bewegungen erzeugt.

Die Ursache des ersten Athmens nach der Geburt scheint mir allein in dem Reize zu liegen, welchen das in den Lungen sogleich sich oxydirende Blut auf das Gehirn, und vorzüglich die Medulla oblongata als Quelle der Athembewegungen ausübt, während diese Organe bisher in einem mehr schlummernden Zustande sich befanden. Das Blut des neugebornen Kindes wird, sobald es geboren ist, in den Lungen schon hellroth, das hellrothe Blut gelangt in wenigen Augenblicken ins Gehirn, und auf der Stelle beginnen die Athembewegungen. Bei dem Athmen der Frösche in Wasserstoffgas oder in Stickgas hören die Athembewegungen allmählig nach einigen Stunden auf, weil der dazu nöthige Reiz, das hellrothe Blut fehlt. Werden die Frösche in die atmosphärische Luft gebracht, so kehren sie, wenn nur ihr Herz, wenn gleich in noch so grossen Pausen, schlägt, ins Leben zurück, indem ihre Athembewegungen allmählig wieder anfangen. Vergl. oben meine und Bergemann's Versuche pag. 332. 333.

Bartels (*die Respiration als vom Gehirne abhängige Bewegung und als chemischer Process. Breslau* 1813. 99.) behauptete, die Anhäufung des venösen Blutes im Gehirne beim Ausathmen habe Einfluss auf die Hirnwirkung beim Athmen. Allein Treviranus sah die Athembewegungen der Frösche nach Unterbindung der Blutgefässe fortdauern (*Biol.* 5. *p.* 260.) und Legallois sah enthauptete Kaninchen den Mund wiederholt wie zum Athmen öffnen und schliessen. *l. c. p.* 29.

Die Zerschneidung des Nervus recurrens auf beiden Seiten ist bei jungen Thieren oft tödtlich, wie Legallois fand; bei erwachsenen Thieren ist sie nicht tödtlich. Die Zerschneidung eines Nervus vagus ist nicht tödtlich, aber die gleichzeitige Zerschneidung beider Nervi vagi ist immer tödtlich, der Tod erfolgt innerhalb mehrerer Tage. Die Ursachen des Todes nach dieser Operation haben die Physiologen seit Rufus Ephesius und Galenus beschäftigt, in der neuern Zeit hat man diese Untersuchungen gründlicher angestellt, aber man kann immer noch nicht sagen, durch welche Entziehung zunächst diese Verletzung tödtet. Die Athembewegungen sind davon grösstentheils unabhängig. Der Nervus recurrens wird zwar dabei und also die Muskeln des Kehlkopfes halb gelähmt; allein man weiss, dass die Durchscheidung der Nervi recurrentes keinen tödtlichen Erfolg hat. Dupuytren (*Biblioth. méd.* 17.) fand, dass ein Pferd, dessen beide Nervi vagi durchschnitten waren, innerhalb einer Stunde, ein Hund innerhalb 2 — 3 Tagen stirbt, und dass der Tod mit mit immer zunehmenden Beschwerden der Respiration erfolgt. Das Blut in den Carotiden war allmählig dunkler geworden. Hieraus schloss man, dass der chemische Process des Athmens durch jene Verletzung aufgehoben werde. Diese Ansicht war indess schon darum verdächtig, weil das Blut schon ausser dem thierischen Körper die beim Athmen gewöhnliche Veränderung erleidet. In Hinsicht der Kritik dieser Beobachtungen verweise

Digitized by Google

ich auf die unten angeführten vortrefflichen Abhandlungen von Emmert, welche die vollständigste Zusammenstellung der früheren Versuche enthalten.

Bald zeigte auch Blainville (*Nouv. bullet. de la soc. philom.* 1808.) durch Versuche an Vögeln, dass diese nach Durchschneidung der Nervi vagi eben so viel Sauerstoffgas verzehren und Kohlensäure absondern, als im gesunden Zustande, dass die Farbe des Bluts sich eben so noch in den Lungen verändert. Die Vögel leben nach dieser Operation noch ziemlich lange, 6—7 Tage, Kaninchen sterben schon nach circa 7 Stunden. Die Vögel sollen nach völliger Abzehrung sterben. Daher Blainville die Ursache des Todes in der Störung der Verdauung sucht, was jedenfalls schon nicht auf die Kaninchen und Säugethiere überhaupt passt. (Ich konnte keine Abmagerung bei Gänsen wahrnehmen, denen der Vagus auf beiden Seiten durchschnitten war.) Dumas (*Journ. gén. d. médec. T.* 33. 1808. *Dec.*) fand, dass atmosphärische Luft oder Sauerstoffgas in die Lungen eingeblasen dem Arterienblute wieder eine hellrothe Farbe mittheilt. Nach Emmerts Versuchen an Kaninchen (Reil's *Archiv* 9. 380; 11. 117.) wird das Athmen nach jener Operation seltener, langsamer, beschwerlicher. Diese Erscheinung ist ganz constant und es ist in der That sehr interessant, wie ich bei Kaninchen und Vögeln beobachtete, dass von dem Moment an, wo beide Nerven durchschnitten sind, die Athemzüge tief und langsamer werden. Emmert fand die Umwandlung des Blutes in den Lungen nicht sehr verändert, er leitet den Tod der Thiere zum Theil von der Lähmung der eigenthümlichen Bewegung der Bronchien ab. Emmert hat zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass der sympathische Nerve und der N. vagus unter den Säugethieren nur bei den Kaninchen am Halse getrennt sind, dass sich aber bei den meisten Säugethieren der N. sympathicus bald nach dem Austritt aus dem Ganglion cervicale supremum mit dem N. vagus verbindet, und dass man daher den N. vagus nicht ohne den N. sympathicus unterbinden oder durchschneiden kann. (Nach Bischof hängt der N. sympathicus nur beim Schwein, Kaninchen, Maulwurf, Waldmaus nicht mit dem Vagus fest zusammen. *Nervi accessorii anatomia et physiologia. Heidelb.* 1832.; auch nicht beim Stachelschweine nach meiner Beobachtung.) Emmert erklärte nun den verschiedenen Erfolg der Versuche von Dupuytren, Blainville und Andern von der Durchschneidung beider Nerven oder des einen nach den verschiedenen Thieren, welche angewandt wurden. Von Dupuytren waren beim Pferde beide Nerven, in Emmert's Versuchen an Kaninchen, und Blainville's Versuchen an Kaninchen und Vögeln war dagegen bloss der N. vagus durchschnitten worden. Dass indess diess keinen besondern Einfluss haben kann, geht aus v. Pommer's Versuchen hervor, nach welchen die Durchschneidung des Nervus sympathicus auf beiden Seiten bei Thieren am Halse ganz ohne wichtige Folgen ist. Diese Versuche wurden bei Kaninchen und Hunden, bei letzteren so gemacht, dass die Scheide, welche den Sympathicus und Vagus einschliesst, geöffnet, und der Sympathicus allein durch-

Digitized by Google

schnitten wurde. Die Thiere zeigten bis zur 7. und 8. Woche, so lange sie beobachtet wurden, keine wichtige Veränderung. Vergl. pag. 198. Nach Arnemann sterben Hunde nicht immer nach Durchschneidung der Nervi vagi.

Nach Provençal (*J. gén. de méd.* 37. 1810. *Janv.*) hört der chemische Process des Athmens nach jener Operation nicht auf, wird aber vermindert. Es fand, dass die Thiere weniger Sauerstoffgas verzehren und weniger Kohlensäure bilden, und dass die thierische Wärme abnimmt. Legallois, der bereits gefunden hatte, dass ein Thier um so kürzere Zeit ohne Respiration ausdauert, je älter es wird, fand auch, dass nach der Durchschneidung der Nervi vagi der entgegengesetzte Fall eintritt. Ein neugeborner Hund stirbt nach jener Operation schon in $\frac{1}{2}$ Stunde, während sie ein erwachsener Hund 1—2 Tage überlebt, wie denn bei jungen Thieren selbst die Durchschneidung der Nervi recurrentes in $\frac{1}{2}$ Stunde tödtet, so dass bei jungen Thieren die Ursache des schnellen Todes nach der Durchschneidung der Nervi vagi die gleichzeitige Lähmung der von ihnen abgehenden Nervi laryngei inferiores und die Paralyse der Muskeln des Kehlkopfes zu seyn scheint. Daher auch die Tracheotomie das Leben etwas verlängert. Legallois überzeugte sich auch, dass die Stimmritze, die sich beim Einathmen erweitert, bei jungen Thieren nach dieser Operation sich fast gänzlich schliesst. Legallois fand nach der Durchschneidung der Nervi vagi eine Ergiessung einer blutig serösen schäumigen Flüssigkeit in den Lungen, welche die von der Lähmung der Muskeln zur Erweiterung der Stimmritze herrührende Athembeschwerde vergrössert. Beide Ursachen, welche sich bei der Durchschneidung der Nervi vagi vereinen, scheinen hier die endliche Suffocation und den Tod zu bewirken, der nach der blossen Durchschneidung der Nervi recurrentes bei erwachsenen Thieren nicht erfolgt. Nach Dupuy sterben Pferde und Schafe nach der Durchschneidung der Nervi vagi in einer Stunde, wenn aber die Tracheotomie gemacht worden, nach mehreren Tagen. Hier ist gleichsam die Wirkung der Lähmung der Nervi recurrentes getrennt von der Wirkung der Lähmung der Pulmonalzweige der Nervi vagi. Indess glaubt Dupuy, dass die Lähmung der Lungen nicht allein durch die Ergiessung von Flüssigkeiten, sondern auch durch verändertes Athmen Suffocation bewirke. Die Ursache der Ergiessung von Flüssigkeiten aus den Lungengefässen in die Lungenzellen und die Bronchien ist übrigens leicht aus den pag. 252. angestellten Betrachtungen einzusehen.

Nach Krimer soll nach der Durchschneidung der Nervi vagi eine Ergiessung von Faserstoff in die Lungenzellen erfolgen, was, wenn es richtig ist, eine Thatsache von Wichtigkeit wäre.

Mayer (Tiedem. *Zeitschr. für Physiol.* 2. 74.) beobachtete als eine constante Erscheinung nach zahlreichen Versuchen über die Unterbindung und Durchschneidung des N. vagus, dass, wenn der Tod längere Zeit nach der Operation erfolgt, in dem Blute der Lungen und des Herzens sich feste weisse Coagulationen vorfinden, welche die Arterien und Venen der Lungen, so wie auch die Höhlen des Herzens ganz ausfüllen. Diese Coagulationen sind

Digitized by Google

noch weich und bestehen aus schwarzem Gerinnsel, wenn der Tod bald nach der Unterbindung oder Durchschneidung des N. vagus eintritt; aber wenn der Tod erst nach 48 Stunden oder später eintritt; so sind diese Coagulationen weiss. Diese Beobachtungen sind sehr interessant. In 4 Versuchen, bei 2 Hunden und 2 Kaninchen, die unter meiner Leitung angestellt wurden, fanden sich nach *Durchschneidung* der Nervi vagi, als die Thiere ganz unmittelbar nach dem erfolgten Tode untersucht worden, nur 2 Mal im linken Herzen ein erbsengrosses Coagulum, keines in den Lungengefässen. Eine zweite Erscheinung und Ursache des Todes, die zwar nicht immer nach dieser Operation, aber doch häufig eintritt, ist nach Mayer das Hineintreten von aus dem Magen regurgitirtem Futter durch die ohnehin mehr erschlaffte und unempfindliche Glottis in die Luftröhre und Bronchien. Nach Mayer wird nach der Operation der Herzschlag viel schneller, die Respiration immer langsamer.

Reiht man Alles zusammen, was die verschiedenen Beobachtungen ermittelt, so tödtet die Unterbindung oder Durchschneidung des Nervus vagus durch den Zusammenfluss verschiedener, zuletzt Suffocation herbeiführender Umstände. Diese sind:

1. Die unvollkommene Lähmung der Bewegungen zur Veränderung der Stimmritze.
2. Die Exsudationen in den Lungen.
3. Der veränderte chemische Process in den Lungen.
4. Die von Mayer beobachtete Gerinnung des Blutes in den Gefässen. Vergl. über diesen Gegenstand Lund *Vivisectionen p.* 222 — 243.

II. Abschnitt. Von der Ernährung, vom Wachsthum und von der Wiedererzeugung.

II. Capitel. Von der Ernährung.

a. Process der Ernährung.

Die Ernährung ist kein Gegenstand mikroskopischer Beobachtung. Doellinger und Dutrochet wollen zwar bemerkt haben, dass Blutkörperchen in den Capillargefässen ihre Beweglich-

Digitized by Google

keit verlieren und sich mit der Substanz verbinden. Ich habe auch öfter ein Stocken der Blutkörperchen beobachtet; allein fortgesetzte Beobachtungen haben mich immer gelehrt, dass im Zustande der kräftigen Gesundheit eines Thiers die Blutkörperchen in den mikroskopisch untersuchten Theilen immer aus den Arterien in die Venen übergehen, und ich halte die Theorie der Ernährung durch Aggregation der Blutkörperchen oder der Kerne der Blutkörperchen für entschieden falsch. So weit ist die Mikrometrie und der Gebrauch guter Instrumente in der Physik der organischen Körper schon gekommen, dass sich aus der blossen genauen Vergleichung der Grossen jene Theorie widerlegen lässt. Was zu einer solchen Genauigkeit gehört, habe ich in der Vorrede zur ersten Auflage dieses Werkes auseinandergesetzt, und bemerkt, dass mikrometrische Messungen, um als Basis für wissenschaftliche Untersuchungen und Vergleichungen zu dienen, nicht bloss direct gemacht seyn müssen, sondern dass das Wichtigste und Unerlässlichste für diesen Zweck ist die Vergleichung eines Körperchens, dass als Einheit oder Maassstab gebraucht werden kann, mit einem andern zu messenden Theile, neben einander unter dem Mikroskop, wie zum Beispiel die mikroskopische Vergleichung der Blutkörperchen des Menschen mit Primitivfasern der Nerven, der Muskeln, die zu gleicher Zeit observirt werden. Da nun die Blutkörperchen des Menschen, nach nahe übereinstimmenden zuverlässigeren Beobachtungen von Kater, Wollaston, Prevost und Dumas, Weber, Wagner und von mir sehr sicher zu 0,00020 P. Z. angenommen werden können (vergl. pag. 106.), so hat man einen sichern Maassstab. Ich bediene mich zur Vergleichung als Maassstab der Blutkörperchen des Menschen, die man sogleich durch einen Hautritz an sich selbst haben kann, und der Blutkörperchen des Frosches, die im Durchmesser circa 4 Mal grösser sind, so wie der durch Essigsäure dargestellten Kerne der Blutkörperchen der Frösche, die im Durchmesser $\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$ so gross als die ganzen Blutkörperchen sind.

Die Blutkörperchen sind offenbar zusammengesetzte Körper, sie enthalten bei den Fischen, Amphibien, Vögeln, Säugethieren und Menschen Kerne. Die Form der Blutkörperchen ist eigenthümlich und stimmt nicht mit den Elementen der Organe überein, was man auch darüber zu voreilig gesagt hat. Die Muskelfasern und Nervenfasern sollten zwar aus aggregirten Kügelchen bestehen. Allein die Blutkörperchen sind bei keinem Wirbelthiere Kügelchen, sondern Scheiben. Prevost und Dumas und Edwards halten die Kerne der Blutkörperchen für die Elemente der Fasern. Allein so gross auch meine Hochachtung für diese Naturforscher ist, so kann ich doch einen Widerspruch ihrer Ansichten mit meinen Beobachtungen nicht unberücksichtigt lassen. Ich habe mich niemals deutlich überzeugen können, dass die Primitivfasern der Muskeln und Nerven aus Kügelchen bestehen, ich sehe nur Fasern mit dicht folgenden Anschwellungen in den Muskeln, wie denn auch C. A. Schultze (*vergl. Anat.* 123.) die Kügelchen in den Muskelfasern nicht finden konnte. Ich finde

Digitized by Google

sie noch weniger in den grösstentheils ganz gleichförmigen Nervenfasern, sondern nur Unebenheiten der Oberfläche und ebenso wenig in den Zellgewebefasern und sehnigen Fasern. Nur wenn man bei dem Schimmer des Sonnenlichtes oder mit schlechten Instrumenten, oder bei der Stellung des Objectes ausser dem Focus bei gleichzeitiger Beschattung observirt, sieht man, in allen Geweben leicht Kügelchen, die man aber nicht von Unebenheiten der Oberfläche unterscheiden kann. Mikroskopische Abbildungen können durch Aufnahme dieser Zufälligkeiten nur fehlerhaft werden.

Die Blutkörperchen des Frosches sind nach meinen Untersuchungen 5 — 8 Mal grösser als die Primitivfasern seiner Muskeln. Die Blutkörperchen des Kaninchens sind 5—6 Mal grösser als die Primitivfasern der Muskeln, die perlschnurartig aussehen, wenn sie nach 14tägiger Maceration in der Kälte sichtbar geworden sind. Die Primitivfasern der Nerven, welche dicker sind, als die der Muskelfasern, stimmen auch nicht mit den Verhältnissen der Blutkörper und ihrer Kerne überein. Zudem sind die Kerne der Blutkörperchen, wie ich gezeigt habe, gar keine Kügelchen bei den Amphibien, sondern elliptisch und beim Salamander sogar platt; wie können daraus die Primitivfasern der Muskeln und Nerven entstehen?

Die Capillargefässe verbreiten sich zuletzt nicht mehr auf den Primitivfasern der Muskeln, des Zellgewebes u. s. w., dazu sind diese zu klein, sie sind ja dünner als die Capillargefässe von 0,00020 — 0,00050 P. Z. Durchmesser. Der Stoffwechsel kann daher nur durch die Capillargefässwände hindurch geschehen. Diese Ernährung durch die Capillargefässwände hindurch geschieht aus aufgelösten Theilen des Blutes, während die unaufgelösten Blutkörperchen sichtbar aus den Arterien in die Venen übergehen. Die wichtigsten Materiale der Ernährung sind offenbar das Eiweiss und der aufgelöste Faserstoff. Ein Theil derselben kann die Wände der Capillargefässe durchdringen, sie tränken die Partikeln der Gewebe, und die Lymphgefässe führen die zur Ernährung überflüssigen Theile des in die Partikeln der Organe eindringenden aufgelösten Faserstoffs und Eiweisses aus den Geweben wieder ab, ins Blut. Hier ist nun von Wichtigkeit, zu wissen, dass die Capillargefässe selbst noch Wandungen haben, was pag. 216. bewiesen worden. Nichts kann zu den Organtheilen aus dem Blute und von jenen ins Blut, ohne im aufgelösten Zustande die Capillargefässe zu durchdringen. Die auf den ersten Blick zur Erklärung der Ernährung leichtere Vorstellung, dass das Blut in den Capillargefässen nur in Aushöhlungen der Substanz fliesse, zeigt sich bei näherer Untersuchung unstatthaft. Dagegen sind die für Aufgelöstes durchdringlichen Wände der Capillargefässe auch kein Hinderniss für die Anziehung der aufgelösten Theile des Blutes. Die Ernährung geschieht nun, indem die kleinen Partikeln der Organe in den Maschen der Capillargefässnetze die aufgelösten Theile des Blutes anziehen und auch wohl Stoffe an das Blut abgeben. Wilbrand's Ideen von der Metamorphose des Blutes in den klei-

Digitized by Google

nen Gefässen sind gewiss ohne den Gebrauch des Mikroskops entstanden.

Ob der rothe Farbestoff der Blutkörperchen auch an Organe, die Farbestoff zu enthalten scheinen, wie die Muskeln, etwas abgebe, indem davon etwas aufgelöst wird, oder ob die Muskeln den Stoff, der sich an der Luft stärker röthet, selbst bilden, ist ungewiss. Jedenfalls sind die Blutkörperchen selbst als ganze Körperchen keine Materiale der Ernährung durch Aggregation derselben. Sie gehen beständig aus den Arterien in die Venen über. Ihre Wirkung in der thierischen Oekonomie ist gewiss äusserst wichtig, sie erleiden die beim Athmen stattfindende Veränderung, sie werden beim Durchgange durch die Capillargefässe des Körpers wieder dunkelroth. Sie sind hier in einer Wechselwirkung mit den Partikeln der Organe, welche sie dunkelroth macht, während die Blutkörperchen doch nur an den Organtheilchen vorübergehen. Sie erleiden bei jedem Circuitus innerhalb 3 Min. (p. 186.) ein Mal die hellrothe Färbung in den Lungen, ein Mal die dunkelrothe in den Capillargefässen des Körpers, sie werden in 24 Stunden circa 480 Mal hellroth und dunkelroth. Sie üben im hellrothen Zustande auf die Organe, und namentlich auf die Nerven, einen zum Leben nothwendigen Reiz aus. Dieser Reiz ist aber von der Zuführung neuen Stoffes durch die Ernährung ganz verschieden. Dutrochet glaubte, dass sie elektrische Strömungen bewirken; das 3. Capitel der Lehre vom Blute (pag. 140.) war der empirischen Untersuchung dieser Hypothese bestimmt.

In der Ernährung wiederholt sich das Grundgesetz der organischen Assimilation. Jedes Organtheilchen zieht ähnliche Theilchen aus dem Blute an, und wandelt sie so um, dass sie des Lebensprincips des Organes selbst theilhaftig werden. Der Nerve bildet Nerven-, der Muskel Muskelsubstanz, selbst die organisirten pathologischen Produkte assimiliren. Die Hautwarze vergrössert sich, das Geschwür ernährt seinen Boden, seine Ränder auf die für eine bestimmte Lebensart und Absonderung nöthige Weise, und die Umwandlung der Nahrungsmateriale in ein krankhaft producirendes Organ kann zum Ruin des Ganzen werden.

Die näheren Bestandtheile der Organe sind zum Theil schon im Blute vorhanden, das Eiweiss, das in so vielen Theilen, wie im Gehirne und in den Drüsen, in der Zusammensetzung so vieler anderen Gebilde im mehr oder weniger modificirten Zustande vorkömmt, ist in dem Blute schon vorhanden, der Faserstoff der Muskeln und muskulösen Theile ist die gerinnbare, im Blute und in der Lymphe aufgelöste Materie, das stickstofflose Fett findet sich im freien Zustande in dem Chylus, das stickstoff- und phosphorhaltige Fett des Gehirns, der Nerven, ist im Blute schon vorhanden, und mit dem Faserstoffe, Eiweiss und Cruorin gebunden. Das Eisen der Haare, des schwarzen Pigmentes und der Crystalllinse findet sich schon im Blute vor, die Kieselerde und das Mangan der Haare, das Fluorcalcium der Knochen und Zähne sind, wegen ihrer geringen Menge vielleicht, im Blute noch nicht entdeckt worden. Diese Materien werden von den Partikeln der

Digitized by Google

Organe, worin sie vorkommen, theils aus dem Blute als Aehnliches ausgezogen, theils werden die näheren Bestandtheile der Organe neu zusammengesetzt; denn unmöglich lässt sich die Ansicht durchführen, dass alle Bestandtheile der Organe schon als solche im Blute vorhanden sind, vielmehr zeigen die organischen Substanzen der meisten Theile theils viele Modificationen von Eiweiss, Faserstoff, Fett, Osmazom, theils ganz eigenthümliche Materien, wie der Leim der Knochen, der Sehnen, der Knorpel, wovon sich im Blute kein Analogon zeigt. Auch die Substanz des Gewebes der Gefässe, die verschiedenen Drüsensubstanzen lassen sich nicht ganz auf jene einfachen Bestandtheile des Blutes zurückführen. Selbst die Vergleichung des Faserstoffs der Muskeln mit dem Faserstoff des Blutes ist nicht strenge. Denn geronnener Faserstoff, geronnenes Eiweiss, zeigen bis auf das Verhalten zum Wasserstoffsuperoxyd fast gar keine chemischen Unterschiede, p. 134, und der wichtigste Unterschied ist nur, dass der im Blute aufgelöste Faserstoff jedesmal gerinnt, sobald er den thierischen Körper verlässt, Eiweiss aber nicht von selbst, sondern nur bei 70—75° C., oder durch Säuren, concentrirte Auflösung von fixem Alkali, Metallsalze gerinnt. Der Faserstoff der Muskeln verhält sich chemisch kaum ähnlicher dem geronnenen Faserstoff, als dem geronnenen Eiweiss. In Hinsicht der Lebenskräfte ist aber der Faserstoff der Muskeln von beiden verschieden. So ist auch die Vergleichung der Nervensubstanz mit Eiweiss und stickstoff- und phosphorhaltigem Fett nur durch den jetzigen Zustand der organischen Chemie zu entschuldigen. Bei der Assimilation findet, indem die Partikeln der Organe zwischen den Capillargefässströmchen aufgelöstes Eiweiss und Faserstoff u. A. anziehen, nicht allein Aneignung der ähnlichen Theile, und Umwandlung der unähnlichen in ähnliche statt, sondern die assimilirenden Theilchen der Organe theilen auch den assimilirten Theilchen des Blutes ihre Kräfte mit.

Die Organe können an Umfang zunehmen, ohne dass sie assimiliren, dann häuft sich der Eiweissstoff und Faserstoff des Blutes im rohen Zustande unassimilirt zwischen den Organtheilchen an, wie in der Entzündung; eine Bemerkung, welche hinlänglich den grossen Unterschied der Entzündung von einer vermehrten Ernährung zeigt. In der Schwangerschaft nimmt das contractile Gewebe des Uterus an wahrhaft assimilirten contractionsfähigen Theilchen zu, aber in der Entzündung des Uterus wird nichts dieser Art bemerkt; die Assimilation der Theilchen des Blutes hört in der Entzündung auf, der aufgelöste Faserstoff schwitzt durch die Häute durch, oder häuft sich in den Interstitien der Organe an; diese nun das Volum des Organes vermehrende Materie ist in den Entzündungen aller Organe dieselbe, während die verschiedenen Gewebe bei der Ernährung die Theilchen des Blutes je nach ihren verschiedenen Bedürfnissen assimilirend verändern. Die Entzündung ist also offenbar kein vermehrter plastischer Process, wofür er so oft ausgegeben wird. Es erklärt sich hieraus sehr gut, warum ein Reiz, welcher die Thätigkeit eines Organes fördert, von einem Entzündungsreize sehr verschie-

Digitized by Google

den ist. Dass verletzte Theile unter fortdauernder Entzündung neue Substanz bilden, ist hin und wieder für jene falsche Ansicht von der Entzündung angeführt worden. Die Bildung einer Substanz ist indess ein Produkt der Vis medicatrix, während der Fortdauer der Entzündung der Oberfläche, und die Entzündung der Oberfläche muss bis zur vollständigen Heilung fortdauern, weil die Oberfläche sich in beständiger Irritation befindet. Es giebt manche Stoffe, welche die Assimilation vermindern, indem sie entweder die Theilchen der Organe oder des Blutes verändern. Die Jodine z. B. beschränkt bei längerem Gebrauche auffallend die Ernährung. Die Neutralsalze, die Mercurialien, der Tartarus stibiatus und andere beschränken die Assimilation. Diese Mittel verändern zum Theil zunächst das Blut, wie es z. B. bei den kühlenden Salzen offenbar ist, welche selbst dem aus der Ader gelassenen Blute zugesetzt, seine Fähigkeit zu gerinnen aufheben, also die Natur des Faserstoffs verändern; hierdurch werden diese Mittel auch zur Beschränkung der Entzündung wichtig.

Zuweilen ist die Ausbildung der Säfte, des Chylus und des Blutes fehlerhaft, entweder durch Bildung fehlerhafter Nahrungsstoffe, oder durch die Wirkung eines eingeimpften Krankheitsstoffes, wie bei der Syphilis. In allen diesen Fällen, wenn die Säfte fehlerhaft sind, leidet auch die Assimilation. Es entstehen Ablagerungen fehlerhafter Stoffe, Entzündungen, Geschwüre, wie bei der Scrophelsucht, Arthritis, Lepra, Herpes, Scorbut, Syphilis etc. Alle diese unter sich äusserst verschiedenen Krankheiten, welche man Dyskrasien nennt, haben das gemein, dass sie sich durch Ausscheidungen krankhafter Stoffe auf der Haut, durch Ausschläge und Geschwüre der Haut, oft durch Geschwüre in Schleimhäuten, im höchsten Grade durch Degenerationen der Knochen äussern. Mehrere Arzneistoffe, welche selbst die Assimilation, verändern (Alterantien p. 60.) und bei längerm Gebrauche auch Geschwüre und Knochenkrankheiten erzeugen, wie der Merkur, das Antimom, sind zuweilen in einigen dieser Fälle hülfreich, nicht weil Similia similibus curantur, sondern weil sie die Fähigkeit haben, die Zusammensetzung der organischen Theile zu alteriren, wodurch vorher stattgefundene Affinitäten aufgehoben und neue eingeleitet werden können, worauf die beständige Wiedererzeugung aller Theile nach dem Urbilde des Ganzen von selbst (nicht der Mercur) die weitere Ausgleichung und Heilung bewirkt.

In mehreren dieser Krankheiten ist das lymphatische System, die Lymphgefässe und Lymphdrüsen, besonders mit afficirt. Von dem gewöhnlichen Gesichtspunkte, dass die Lymphgefässe bloss eben zur Aufsaugung dienen, lässt sich diess Leiden des lymphatischen Systems bei mehreren dieser Krankheiten, besonders bei der Scrophelsucht, nicht recht verstehen. Wenn man aber weiss, dass die Lymphe (ausser den Lymphkügelchen) fast ganz mit dem Liquor sanguinis (ohne die Blutkörperchen) übereinkommt, und dass man die Lymphe gleichsam Blut ohne rothe Körperhen, das Blut Lymphe mit rothen Körperchen nennen kann, indem

Digitized by Google

die Lymphe und der Liquor sanguinis aufgelöstes Eiweiss und aufgelösten gerinnbaren Faserstoff enthalten; wenn man weiss, dass die Lymphgefässe den bei der Circulation theilweise in die Partikeln der Organe eindringenden Liquor sanguinis wieder, so viel zur Ernährung überflüssig ist, abführen: so sieht man leicht ein, dass die Veränderungen in der Mischung des Liquor sanguinis nicht allein die Capillargefässe irritiren und Entzündung in den Capillargefässen erregen müssen, sondern dass eine und dieselbe Flüssigkeit auch wieder in den lymphatischen Gefässen Irritation erzeugen muss. Daher mangelhafte Bereitung des Blutes, chemische Veränderungen in der Mischung des Blutes nothwendig auch in vielen Fällen Krankheitserscheinungen in den kleinsten Blutgefässen und im lymphatischen Systeme erzeugen müssen, welches zugleich, wie wir pag. 278. gesehen haben, so vielen Antheil an der Umwandlung des Eiweisses in aufgelösten Faserstoff hat. Alle andere im Blute aufgelösten Theile, Salze, ihre fehlerhafte Mischung müssen auch wieder auf den Zustand der Lymphgefässe Einfluss haben. In denjenigen Krankheiten, in welchen die aufgelösten Theile des Blutes weniger fehlerhaft gebildet sind, als der Cruor oder die Blutkörperchen, welche nicht in die Lymphgefässe eingehen, werden auch weniger Krankheitserscheinungen in dem lymphatischen System auftreten, wie im Scorbut. Das fernere Studium der Mischungskrankheiten der Säfte wird daher in der früher angegebenen Analyse der Lymphe und des Blutes eine solidere Basis erhalten.

Die Ernährung aller Theile nach dem Urbilde des Ganzen setzt eine Fortdauer der Kraft voraus, die alle Unterschiede, alle Organe zuerst als Glieder des Ganzen oder Theile des Begriffes erzeugt, jener Kraft, welche in dem Keime vor der Erzeugung der Organe vorhanden ist, wenn der Keim noch das thierische Wesen *potentia* ist, welches *actu* bei der Entwicklung seine Organe erzeugt, erneut und erhält. Die Ernährung ist also gleichsam die fortdauernde Wiedererzeugung aller Theile durch die Kraft des Ganzen; aber diese Wiedererzeugung ist bei dem erwachsenen Menschen nur durch Assimilation, durch Verbindung der neuen Materie mit den assimilirenden Theilen möglich, während bei dem Embryo ohne organisirte Grundlage die unvertheilte Kraft des Ganzen die organisirte Grundlage vielmehr erst erzeugt. Gleichwohl sind alle Organe bis zum Zerfallen des Ganzen zum Zusammenwirken aller assimilirenden Theile von der einen organisirenden Kraft des Ganzen beherrscht, deren Wirkungen wir durch Ausgleichung feiner materieller Veränderungen in den Krankheiten als Heilkraft der Natur bewundern, während die Herstellung verlorner organisirter Theile in den meisten Fällen nach der ersten Zeugung ihr unmöglich ist. Vergl. *Prolegomena* pag. 23. In einigen Krankheiten zeigt sich eine solche fehlerhafte Bildung der thierischen Materie, dass die Assimilation zu den Gewebetheilchen der Organe in einzelnen Theilen ganz aufgehoben wird, und wegen des Vorwaltens fremdartiger Affinitäten nur Afterbildungen entstehen, wie bei dem Krebs und Markschwamme.

Digitized by Google

Mit dem Leben ist ein beständiger Wechsel der Materie verbunden. Diess zeigt das Bedürfniss der Nahrungsstoffe im Verhältniss der Ausscheidungen. Nun frägt sich aber, wechseln die Bestandtheile der Säfte, oder wechseln selbst die Materien der organisirten Theile?

1. Wechsel der Materie in den Säften. Es liegt am nächsten, den Wechsel der Materie zunächst in den Säften anzunehmen, und zu behaupten, dass dieser tägliche Umtausch von mehreren Pfunden Nahrung gegen mehrere Pfunde zersetzter Stoffe, die mit der Hautausdünstung, beim Athmen, mit dem Harnabgang u. s. w. verloren gehen, bloss innerhalb der Säfte vor sich gehe, während die organisirten Theile selbst daran wenig Antheil nehmen. Die Säfte erleiden, indem sie zur Unterhaltung des Lebens dienen, beständige Zersetzungen, und man könnte hierin die thierische Maschine mit einer andern Maschine, z. B. Dampfmaschine, vergleichen, welche eine gewisse Quantität Brennmaterial zur Erzeugung der Wasserdämpfe erfordert, durch welche sie wirksam ist. Dass der Wechsel der Säfte am grössten ist, ist auch unzweifelhaft Das Seltenwerden der Harnabsonderung bei hungernden Amphibien, z. B. Schildkröten, belehrt uns zur Genüge darüber. So könnte man annehmen, dass die Zersetzung einer gewissen Quantität der Säfte bei der Unterhaltung des Lebens die Ausscheidung der zersetzten Stoffe, und die Zufuhr der neuen Nahrungsstoffe nöthig machen.

2. Wechsel der Materie in den organisirten Theilen. Manche Phänomene scheinen mit dem Wechsel der thierischen Materie in den organisirten Theilen schwer zu vereinigen, wie z. B. die Erhaltung der Erinnerungen, welche von gewissen Eindrükken auf das Sensorium abhängig sind. Mit der organischen Veränderung des letztern wird auch der Schatz an früher gewonnenen Eindrücken verändert und vermindert, und das Gedächtniss für einzelne Reihen der Ideen, für die Architektonik der Sprachen, ja selbst, wie es scheint, oft für gewisse Theile der Sprache, Hauptwörter, Namen etc., für räumliche Anschauungen, Perioden des vergangenen Lebens, aufgehoben. Wie ist nun die Erinnerung, das geistige Leben des Menschen, als eine consequente Entwicklung aus der Vergangenheit, denkbar, wenn man einen grossen Wechsel der Materie in dem Gehirne und den Nerven annimmt? Diese Schwierigkeit würde jedoch nur für die Supposition materieller Veränderungen bei den psychischen Thätigkeiten vorhanden seyn. Auf der andern Seite haben wir wenigstens keine Beweise von einem schnellen Wechsel der Materie im Gehirn.

In den meisten Theilen ausser den Nerven sind dagegen viel unzweifelhaftere Zeichen des Wechsels der Materie vorhanden, und gerade die Knochen, welche noch am stabilsten scheinen, und doch so deutliche Spuren des Wechsels der Materie zeigen, scheinen zu beweisen, dass der Wechsel der Materie sich nicht auf die Säfte beschränkt, sondern ein ausgedehntes Phänomen auch in den organisirten Theilen ist. Hieher gehören z. B. die Entstehung der Zellen in den Knochen, die Entstehung der Stirn-

Digitized by Google

bein- und Keilbeinhöhlen in der Kindheit, die Resorption der Knochen beim Druck von Geschwülsten, die Resorption der Alveolen bei den Alten, das Dünnerwerden des Schädels bei den Alten und vieles Andere. Die Vergrösserung der Knochenhöhlen mit dem Wachsthum der ganzen Knochen, ja überhaupt das Wachsthum eines so festen Körpers von allen Partikeln aus, die Veränderungen seiner Form beim Wachsthum sind nicht denkbar, ohne eine beständige Wegnahme von Knochenatomen an gewissen Stellen, und Apposition an anderen Stellen, also nicht ohne beständigen Wechsel der Materie. Von anderen Theilen fehlen uns die Beweise des Wechsels der Materie mehr. Es gehören indessen hieher die bei der Regeneration der Schwämme wie des Blutschwamms beständige Zersetzung auf ihrer Oberfläche, das Schwinden der Theile im Hunger, in der Atrophie, bei mehreren chronischen Krankheiten, und das Wachsen, Formverändern und Schwinden der Geschwülste, Warzen, die oft schnelle Restauration nach vorheriger Abmagerung. Die wieder aufgelösten Theile müssen entweder sogleich in die Blutgefässe oder in die Lymphgefässe, wo diese vorhanden sind, übergehen.

Die Resorption der Lymphe kann indess nicht allein als Wiederaufnahme von vorher organisirten Theilchen der Organe in die Säftemasse, und die Lymphe nicht bloss als Colliquament der Organe betrachtet werden; denn die Lymphe ist, wie pag. 153. 255. gezeigt worden, ausser den Lymphkügelchen der farblose Liquor sanguinis, welcher bei der Circulation zum Theil durch die Capillargefässe in die Partikeln der Organe eindringt, zu ihrer Ernährung dient, und dessen überflüssige Theilchen wieder in den überall in den Interstitien der Organtheilchen beginnenden Lymphgefässnetzen sich sammeln. Daher auch die Lymphe durchgehends gleich ist, und überall sich als Liquor sanguinis verhält, d. h. aufgelösten Faserstoff und Eiweiss enthält.

Der Wechsel der Materie in den organisirten Theilen lässt sich schon als nothwendig zu der beständigen Veränderung ihrer Form erkennen. Die Organe verändern von Kindheit auf beständig ihre Form, und diese Veränderung im Ganzen kann nur durch Veränderung in den kleinen Partikeln der Organe zwischen den Capillargefässen bewerkstelligt werden. Hierbei lässt sich denken, dass die resorbirten Theile wieder ins Blut gelangen, und bald wieder zur Ernährung an anderen Stellen verwandt werden. Nun frägt sich aber, ob es nicht einen Wechsel der Materie in den organisirten Theilen giebt, wobei wirklich zersetzte Bestandtheile der Organe ins Blut wieder aufgenommen werden, um aus der thierischen Oekonomie ganz entfernt zu werden. Leider besitzen wir zur Entscheidung dieser Frage keine Thatsachen, als das Ende des Lebens überhaupt, die Gewissheit, dass im Alter immer mehr die Anhäufung unwirksamer Bestandtheile in den Organtheilen zunimmt, die Knochen an thierischer Materie verlieren (pag. 366.), Kalkerde in den Wänden der Arterien (zwischen mittlerer und innerer Haut) und in anderen Theilen abgelagert wird. D'Outrepont (*diss. de perpetua materiei organico-animalis vicissitudine. Hal.* 1798. Reil's *Arch.* 4. 460.)

Digitized by Google

nimmt an, dass das Leben selbst nur durch und mit einem beständigen Wechsel der Materie in den Säften und den organisirten Theilen bestehe. Dass das Leben mit einer beständigen Zersetzung der Materie verbunden ist, ist schon oben pag. 34. entwickelt worden. Jede Action verändert die Mischung des agirenden Theiles, und erfordert eine Restauration der Mischung, die mit der Erholung erst allmählig erfolgt. Es scheint daher wirklich, dass auch die organisirten Theile einer allmähligen Zersetzung ihrer Bestandtheile unterworfen sind, die von ihrer Action untrennbar ist, und die Restauration veranlasst. Schon in den Prolegomena ist pag. 53. dasjenige angeführt worden, was wir über die Statik zwischen der Zersetzung bei den Actionen und der Restauration wissen. Aber leider lassen sich alle diese zarten Verhältnisse nicht der Berechnung unterwerfen. Wir haben hier nur ganz schwache Anhaltspunkte, wie eben die Ermüdung nach den Actionen, die Nothwendigkeit einer grössern Menge kräftigerer Nahrung nach grossen geistigen und Muskel-Anstrengungen; dagegen zeigt uns die Unveränderlichkeit gewisser in die Haut eingeriebener Färbestoffe eine Grenze auf der entgegengesetzten Seite. Innerhalb dieser Grenzen zeigen sich wieder sehr verschiedene Anzeigen des Stoffwechsels in den organisirten Theilen, wie z. B. das oft schnelle Verschwinden der Hautwarzen, der rasche Stoffwechsel bei der Resorption der Knochen und der Heilung der Knochenverletzungen, die ganz allmählig erfolgende Reduction eines unförmlichen Callus in einen solchen, welcher mehr den natürlichen Formverhältnissen der Knochen entspricht, wobei nach Monaten selbst in den zusammengeheilten Knochen an der Stelle der Zusammenheilung die früher ausgefüllte Knochenhöhle sich wieder herstellt; dagegen die geringe Veränderlichkeit der Flecken in der Cornea uns wieder zeigt, wie der Stoffwechsel hier im umgekehrten Verhältnisse mit der Sparsamkeit der Blutgefässe steht. Der Stoffwechsel ist übrigens in der Jugend am grössten, und nimmt im Alter immer mehr ab.

b. Chemische Zusammensetzung der organisirten Theile.

I. Gewebe mit eiweissartiger Grundlage.

Die Gewebe mit eiweissartiger Grundlage geben beim Kochen keinen Leim und werden beim Kochen nur wenig verändert; nur das in ihre Zusammensetzung eingehende Zellgewebe kann in Leim aufgelöst werden. Die Modificationen der eiweissartigen Körper sind noch nicht genau gekannt. Bis jetzt kennt man nur das Eiweiss im engern Sinn und den Faserstoff genau, deren Eigenschaften in der Lehre vom Blut angegeben worden. Die saure Auflösung der eiweissartigen Körper wird von Kaliumeisencyanid gefällt. Dadurch unterscheiden sich diese Stoffe von den leimgebenden Körpern. Zu dem Gewebe mit eiweissartiger Grundlage gehören das Gehirn und die Nerven, die Muskeln, die Drüsen, die Schleimhäute.

1. *Gehirn, Rückenmark und Nerven.* Die Elementartheile der Nervensubstanz sind die sogenannten Primitivfasern des Gehirnes,

Digitized by Google

Rückenmarkes und der Nerven, welche in den Nerven durch Zellgewebe zu Bündeln und Plexus vereinigt sind, ohne selbst in ihrem Verlaufe jemals zusammenzuhängen. Sie bestehen aus einer Röhre und einem Inhalte, der im Gehirn und Rückenmark überaus weich ist, in den Nerven aber viel mehr Consistenz hat und sich selbst von der Röhre in einigem Zusammenhange stellenweise isoliren lässt. Die Primitivfasern des Gehirns werden von leichtem Druck leicht stellenweise angeschwollen, varicös, bei stärkerem Druck werden sie ganz zerstört und an ihrer Stelle sieht man Kugeln und Kügelchen. Die Stärke dieser Fäden ist überaus verschieden, im Gehirn und Rückenmark sind sie dünner als in den Nerven, in diesen sind sie gewöhnlich viel stärker als die Elementartheile anderer Gewebe, und haben $\frac{1}{400} - \frac{1}{200}$ Par. Lin. im Durchmesser. Die graue Masse des Gehirns und Rückenmarkes und die Masse der Ganglien besteht aus ziemlich grossen Kugeln, die in den Ganglien durch festes Zellgewebe verbunden sind, im Gehirn und Rückenmark aber überaus leicht zerstörbar sind. Sie haben einen Kern in ihrem Innern, zuweilen sogar, namentlich die Ganglienkugeln, einen Nebenkern an der Oberfläche. Eine ausführliche Darstellung der Structur der Nerven kann erst später in der Nervenphysik gegeben werden. Die Hauptbestandtheile des Gehirns und der Nerven in chemischer Hinsicht sind Eiweiss und Fett in einer noch nicht gekannten nähern Verbindung. Das Fett wird aus dem zerriebenen Gehirne durch kochenden Alcohol oder Aether ausgezogen, worauf das Eiweiss des Gehirns und die zerriebenen Blutgefässe zurückbleiben. Das Hirnfett ist ein stickstoffhaltiges Elain und Stearin. Ersteres ist ein Oel, es riecht wie frisches Gehirn, und schmeckt ranzig, es fault wie andere thierische Stoffe an der Luft. Es wird von kochendem Alkohol in grösserer Menge als von kaltem gelöst. Das Stearin besteht aus weissen atlasglänzenden Schuppen. Nach Gmelin und Kuehn enthält dieses Stearin wieder 2 besondere Stearinarten, das blätterige und das pulverförmige. Das erstere ist dem Gallenfett, Cholestrine, ähnlich, unterscheidet sich aber von ihm darin, dass es phosphorhaltig ist. Das Hirnfett unterscheidet sich von anderen Fettarten, dass es sich nach Vauquelin nicht mit Alkali vereinigen oder verseifen lässt, dass es ausserdem Phosphor enthält (auch das gebundene Fett im Blute und in der Leber enthalten nach Chevreul und Braconnot Phosphor). Die nicht einäscherbare Kohle, welche nach Verbrennung des Hirnfettes zurück bleibt, enthält nämlich so viel Phosphorsäure, dass diese den zur Verbrennung nöthigen Luftzutritt verhindert. Nach Ausziehung der Phosphorsäure durch Wasser, brannte die Kohle wieder eine Weile, und hörte wieder auf; sie war nun wieder sauer geworden; woraus folgt, dass die Kohle des Hirnfettes den Phosphor in einer nicht flüchtigen Verbindung enthält. Nach Vauquelin beträgt der Phosphor ungefähr 1 Proc. vom Gewichte des frischen Gehirns, oder $\frac{1}{3}$ von dem des Hirnfettes, was Berzelius unwahrscheinlich findet. Die übrigen Theile des Gehirns sind Eiweiss und Salze (phosphors. Salze und kohlens. Alkali?). Das Gehirn enthält nach Vauquelin:

Digitized by Google

Eiweiss		7,00
Hirnfett	Stearin 4,53 Elain 0,70	5,23
Phosphor		1,50
Osmazom		1,12
Säuren, Salze, Schwefel		5,15
Wasser		80,00
		100,00

Das Gehirn enthält ausserordentlich wenig erdige und salzige Bestandtheile. 50 Gran getrockneten Kalbsgehirns gaben John nur 2 Gran Asche; 100 Theile getrockneter Gehirnsubstanz enthalten nach Sass und Pfaff 3,36 fixe Salze, 100 Theile getrockneter Muskelsubstanz 7,5 fixe Salze. In Hinsicht der Litteratur der chemischen Untersuchungen der Hirnsubstanz verweise ich auf E. H. Weber *Anat.* 1. *p.* 257.

Verdünnte Salzsäure löst nach Reil das Neurilem der Nerven auf. Alkalische Lösung löst dagegen das Mark der Nerven auf.

2. *Muskeln* Die Muskeln bestehen aus Bündeln von Fasern, die primitiven Bündel aus einigen hundert Fasern sind durch Zellgewebe zu grösseren Bündeln, diese wieder zu noch grössern verbunden. Die Primitivfasern der Muskeln haben eine Stärke von 0,00012 — 0,00020 P. Z. An den Muskeln des animalischen Lebens, wozu alle willkührlich bewegliche Muskeln gehören, zeigen die primitiven Bündel sehr regelmässig, dicht aufeinander folgende Querstreifen, die Primitivfasern selbst sind varicös, zeigen nämlich dicht hintereinander folgende Anschwellungen, die durch kurze, engere Zwischenstellen getrennt sind. Von den organischen Muskeln, welche nur unwillkührlich beweglich sind, haben nur die des Herzens und anderer muskulösen Stellen des Gefässsystems Querstreifen der primitiven Bündel. Auch die Lymphherzen haben diesen Bau der Fasern. Siehe Valentin *Repertorium I.* 294. Alle übrigen organischen Muskeln, die des Darms, der Urinblase, des Uterus und der Iris haben einen andern Bau, den primitiven Bündeln fehlen die Querstreifen, den primitiven Fasern fehlen die Knoten; jene sind vielmehr ganz gleichformig. Eine ausführliche Darstellung des Baues der Bewegungsorgane kann erst später in dem Buche von der Bewegung gegeben werden. Die wesentliche Substanz der Muskeln ist Faserstoff. Das Muskelfleisch wird von langem Kochen härter, und giebt die farblose Fleischbrühe ab, die erkaltet gelatinirt, was von dem Leim herrührt, in den das Zellgewebe nach Berzelius durch Kochen verwandelt wird. Gegen Säuren und Alkalien verhält sich Muskelsubstanz wie Faserstoff. Beim starken Auspressen von zerhacktem Fleische fliesst eine saure rothe Flüssigkeit ab. Diese enthält 1) Eiweiss und Cruorin. 2) Milchsäure. 3) Salze, milchsaures Kali, Natron, Kalkerde und Talkerde, Spuren von milchsaurem Ammoniak, Chlorkalium und Chlornatrium (im Alkohol löslich); ferner phosphorsaures Natron, phosphorsauren Kalk (in Alkohol unlöslich). 4) Extractartige Ma-

Digitized by Google

terien, a) durch Alkohol ausziehbar, Osmazom (von Fleischgeruch), welches nach Berzelius ein Gemenge von mehreren Substanzen ist; b) durch Wasser löslich, sauer, enthält Milchsäure. Diess Extract ist wieder ein Gemenge mehrerer Wasserextracte, unter welchen das Zomidin, welches den Fleischgeschmack hat. Fleisch mit concentrirter Schwefelsäure behandelt, bildet eine Substanz, Leucine, die den Geschmack der Fleischbrühe hat. Berzel. *Thierch.* 406. 688.

Berzelius und Braconnot haben das Muskelfleisch des Ochsen analysirt:

	Berz.	Brac.
Fleischfaser, Gefässe, Nerven 15,8 Zellgewebe, im Kochen zu Leim gelöst 1,9	17,70	18,18
Lösliches Eiweiss und Faserstoff	2,20	2,70
Alkoholextract mit Salzen	1,80	1,94
Wasserextract mit Salzen	1,05	0,15
Eiweisshaltiger phosphorsaurer Kalk . . .	0,08	—
Wasser (und Verlust)	77,17	77,03
	100,00	100,00

Sass und Pfaff haben vergleichende Analysen der Muskelsubstanz und Hirnsubstanz angestellt. Meck. *Arch.* 5. 332.

	Muskelsubstanz.	Hirnsubstanz.
Kohlenstoff . .	48,30	53,48
Wasserstoff . .	10,64	16,89
Stickstoff . .	15,92	6,70
Sauerstoff . .	17,64	18,49
Fixe Salze . .	7, 5	3,36
Phosphor . .	—	1,08

Hieraus folgt also, dass die Muskelsubstanz viel mehr Stickstoff, die Hirnsubstanz mehr Wasserstoff enthält.

3. *Drüsen.* Die Substantia propria der Drüsen ist zu blind, oft zellenförmig geschlossenen Kanälen formirt, und besteht aus einem homogenen, mehr körnigen als faserigen Gewebe, über dessen Structurverhältnisse in dem Abschnitt über die Absonderung ausführliche Aufschlüsse gegeben werden. Die Hauptmasse der Drüsen ist ein eiweissartiger Stoff.

Unter den drüsigen Organen sind die Nieren und die Leber chemisch untersucht worden. Als Braconnot die Lebersubstanz des Ochsen zu Brei zerrieben und mit Wasser versetzt hatte, wurde der grösste Theil der Lebermasse aufgelöst. Die milchige Flüssigkeit gerinnt beim Erhitzen. Aus dem Coagulum lässt sich durch Terpentinöl ein fettes Oel ausziehen. Das nach Verflüchtigen des Terpentinöls bleibende fette Oel war rothbraun, halb erstarrt, und hatte Geruch und Geschmack der Ochsenleber. Das Fett war nicht sauer, und also nicht vorher verseift, war aber mit kaustischem Natron verseifbar, ohne dass sich Ammoniak entwickelte. Diess Fett ist indess phosphorhaltig, es verhält sich beim Verbrennen wie Hirnfett. Die Auflösung, woraus sich durch Erhitzen das Eiweiss abgesetzt hatte, röthete das Lackmuspapier,

Digitized by Google

und schien eine vom Osmazom etwas verschiedene Substanz zu enthalten.

100 Theile eigentlicher Lebersubstanz enthielten

Wasser	68,64
Eiweiss	20,19
Eine wenig Stickstoff haltige, in Wasser leicht, in Alkohol wenig lösliche Materie	6,07
Leberfett	3,89
Chlorkalium	0,64
Kalkerde eisenhaltig	0,47
Salz von einer brennbaren Säure mit Kali	0,10
	100,00

Bei einer Analyse der Menschenleber wollen Frommherz und Gugert auch Käsestoff, Speichelstoff gefunden haben. In der Leber des Rochen fand Vauquelin ein Oel, das mehr als die Hälfte vom Gewichte der Leber betrug. Berzelius schliesst aus diesen Untersuchungen, dass die Leber eine emulsionsartige Verbindung von Eiweiss mit einem fetten Körper enthalte, gemischt mit mehreren anderen Thierstoffen, wie Osmazom und einem oder 2 anderen in Alkohol unlöslichen, in Wasser löslichen Stoffen. Berzel. *Thierch.* 164 — 170.

Berzelius hat die Pferdenieren chemisch untersucht. Die zerriebene Masse wurde in Wasser fast ganz zu einer milchigen Flüssigkeit. Die geringe zurückbleibende faserige Masse bestand wahrscheinlich aus Blutgefässen. Die flüssige Masse gerann durch Hitze. Das Coagulum enthielt viel Fett, und bestand aus Eiweiss. Die Flüssigkeit, worin sich das Coagulum gebildet hatte, war sauer, von Milchsäure, und enthielt thierische Materie, die nach dem Abdampfen theils in Alkohol (Osmazom), theils in Wasser löslich war.

4. *Schleimhäute.* Sie bestehen aus durcheinander gewirkten Fasern, auf welchen eine Schicht von perpendiculären sehr kleinen Cylinderchen aufgesetzt ist und vielen eingestreuten Schleimfollikeln. Siehe das Nähere in dem Abschnitt von der Absonderung. In chemischer Hinsicht scheinen sich die Schleimhäute von dem Gewebe der äussern Haut ganz zu entfernen. Denn die Schleimhäute geben nach Berzelius beim Kochen keinen Leim; sie sind in Wasser ganz unlöslich und werden selbst bei langem Kochen nur hart und spröde. Ihre Grundlage scheint daher den eiweissartigen Körpern anzugehören.

II. Leimgebende Gewebe.

Hieher gehören das Zellgewebe, seröse Gewebe, Sehnengewebe, die äussere Haut, das leimgebende contractile Gewebe, Knorpelgewebe, Knochengewebe, elastische Gewebe. Ihre thierische Grundlage löst sich bei längerem Kochen entweder ganz in Leim auf, oder man erhält bei längerem Kochen mehr und mehr Leim. Einige geben schon in mehreren Stunden viel Leim, wie Zellgewebe, seröses Gewebe, Knochen; andere erst nach 15 — 18 stündigem Kochen, wie die Knorpel, die äussere Haut, andere,

Digitized by Google

wie das elastische Gewebe, geben erst nach mehrtägigem Kochen nur wenig Leim. Die saure Auflösung der leimgebenden Körper wird von Kaliumeisencyanid nicht gefällt.

1. *Zellgewebe.* Es besteht aus durcheinander gewirkten Bündeln von Fasern, welche Lücken zwischen sich lassen. Die Bündel bestehen aus parallelen durchsichtigen Fasern von 0,0007 engl. Lin. Durchmesser. Die Primitivfasern haben durchaus geradlinigte Begrenzung und zeichnen sich durch ihre geschwungene Form aus, welche an die des lockigen Haars erinnert. Diess Gewebe löst sich beim Kochen ganz in Leim auf.

2. *Das leimgebende contractile Gewebe* der Tunica dartos gleicht mikroskopisch ganz dem Zellgewebe, aber es ist blassröthlich und seine Faserbündel bilden weniger Maschen, und folgen mehr derselben Direction. Es wird durch Kochen ganz in Leim aufgelöst.

3. *Gewebe der serösen Häute*, es besteht ebenfalls aus durcheinander gewirkten Fasern, die weniger Lücken oder Maschen bilden, und deren Bündel inniger aneinander liegen. Sein Leim stimmt ganz mit dem Leim der vorhergehenden Gebilde überein.

4. *Sehniges oder fibröses Gewebe.* Es besteht aus Fasern, die ohne Maschen zu Bündeln vereinigt sind, die bald in gleicher bald in kreuzenden Richtungen verlaufen. Seine Primitivfasern gleichen den Zellgewebefasern in Form und Dicke. Grössere Massen oder Häute dieses Gewebes haben ein atlasglänzendes Ansehen, und auch die Bündel zeigen wegen der welligen Lage der Fasern abwechselnde helle und dunklere Stellen. Schon innerhalb 3 Stunden erhält man durch Kochen sehr viel Leim aus Sehnengewebe.

5. *Gewebe der äussern Haut.* Das Substrat der Haut, in welches vielerlei Organe wie die Haarbälge, Talgbälge, Schweissdrüsen eingesenkt sind, besteht aus durcheinander gewirkten Fasern. Die Oberfläche der Haut bildet kleine Erhöhungen, die Papillen, welche von dem Rete malpighii und der Epidermis überzogen werden. Letztere gehören den später zu beschreibenden Hornbildungen an. Die Haut löst sich beim langen (20 stündigen) Kochen ganz oder grösstentheils in Leim auf. Auf der Fähigkeit des Leims sich mit dem Gerbestoff zu einer der Fäulniss widerstehenden Verbindung zu vereinigen, beruht das Gerben der Häute. Die Structur mehrerer der hier erwähnten Gewebe wird später ausführlicher erläutert. Ueber die Structur des Zellgewebes siehe den Abschnitt von der Absonderung, über die Tunica dartos den Abschnitt von den Bewegungen, über die äussere Haut die Folge des gegenwärtigen Abschnitts.

Der Leim aus allen vorhergenannten Geweben ist der gewöhnliche oder Tischlerleim, Colla, welcher von Gerbestoff, Chlor, Sublimat, Weingeist gefällt wird, von Alaun, Essigsäure, essigsaurem Bleioxyd und schwefelsaurer Thonerde aber nicht gefällt wird. Der von Weingeist gefällte Leim löst sich in heissem Wasser wieder auf. Die von mir beschriebene eigenthümliche Leimart der permanenten Knorpel stimmt in vielen Punkten mit dem gewöhnlichen Leim überein, unterscheidet sich aber davon

Digitized by Google

durch folgende Punkte. Er wird von Alaun, schwefelsaurer Thonerde, Essigsäure, essigsaurem Bleioxyd gefällt. Die Fällung von Alaun wird von überschüssigem Alaun wieder aufgelöst, die Fällung von Essigsäure durch überschüssige Essigsäure nicht aufgelöst. Käsestoff wird zwar von den Reagentien des Knorpelleims oder Chondrins auch gefällt, unterscheidet sich aber vom Chondrin durch den Mangel des Gelatinirens, durch sein Verhalten zum Kaliumeisencyanid und durch das Verhalten zum Alaun und zur Essigsäure. Die Fällung des Käsestoffs von Alaun wird von überschüssigem Alaun nicht aufgelöst, die Fällung von Essigsäure wird von überschüssiger Essigsäure aufgelöst.

6. *Knorpel.* Ueber die Structur der Knorpel siehe Purkinje und Deutsch *de penitiori ossium structura. Vratisl.* 1834. Arnold in Tiedemann's *Zeitschrift. V.* 2. Miescher *de inflammatione ossium eorumque anatomia generali Berol.* 1836. J. Mueller *über die Structur und die chemischen Eigenschaften der Knorpel und Knochen.* Poggend. *Ann. XXXVIII.* Purkinje und Meckbauer *de penitiori cartilaginum structura. Vratisl.* 1836. Die Knorpel zerfallen in 4 Klassen:

a. Knorpel mit Knorpelkörperchen. Die meisten permanenten Knorpel und auch der Knochenknorpel vor der Ossification bestehen aus einer trüb durchscheinenden, undeutlich faserigen Substanz, worin ovale, meist platte mikroskopische Körperchen eingestreut sind, die von Purkinje zuerst beobachteten Knorpelkörperchen, diese selbst enthalten oft noch einen durchsichtigen Kern oder mehrere Körnchen in ihrem Innern. Alle diese Knorpel geben beim Kochen nach meinen Beobachtungen Chondrin, keinen gewöhnlichen Leim, Rippenknorpel, Kehlkopfknorpel grösstentheils Luftröhrenknorpel, Nasenknorpel, Knorpel der Eustach. Trompete, Knochenknorpel vor der Ossification, Gelenkknorpel.

b. Chondrinhaltige Faserknorpel. Die Cornea ausser einem feinen Ueberzug von Epithelium, von der gewöhnlichen später zu beschreibenden Structur des Epitheliums, 3 Schichten, die erste feine Schicht wird in heissem Wasser sogleich in einem Augenblick schneeweiss, die innerste feine Schicht ist die Membrana Desmoursii, die sich an die Lamina fusca der Sclerotica anschliesst; die mittlere Schicht oder Hauptsubstanz der Cornea besteht aus sich durchkreuzenden Bündeln von hellen Fasern ohne Knorpelkörperchen. Sie löst sich nach meinen Beobachtungen beim Kochen ganz in Chondrin auf.

c. Spongiöse Knorpel. Sie sind von Miescher entdeckt. Es gehören hieher die gelblichen Knorpel des äussern Ohres, der Kehldeckel, die Santorinischen und Wrisbergschen Knorpel des Kehlkopfes. Sie sind gelb und enthalten keine Knorpelkörperchen, sondern sind durch und durch schwammig, grosszellig, geben nach mehrtägigem Kochen nur äusserst weniges nicht gelatinirendes Extract, dessen chemische Eigenschaften mit dem Chondrin übereinstimmen, während die übrigen chondrinhaltigen Knorpel in 15 — 20 Stunden sich in gelatinirendes Chondrin auflösen.

Digitized by Google

d. Ligamentöse Knorpel, welche beim Kochen kein Chondrin, sondern nur gewöhnlichen Leim geben. Hieher gehören die Zwischengelenkknorpel, die Ligamenta intervertebralia, Symphysen. Der aus ihnen von mir gewonnene Leim stimmt durchaus mit dem Leim der Sehnen und ist kein Chondrin. Sie enthalten auch keine Knorpelkörperchen, sondern bestehen ganz aus Fasern. Die auch faserige Substanz der Augenliedknorpel ist in chemischer Hinsicht noch nicht untersucht. Die Knorpel der Knorpelfische sind nicht wesentlich vom Knorpel der übrigen Thiere verschieden, wie meine Untersuchungen zeigen. Nach tagelangem Kochen lösen sie sich in Leim auf, der nicht gelatinirt aber mit Chondrin sehr nahe übereinstimmt. Sie enthalten meist aber wenig Knorpelkörperchen. Bei den Cyclostomen fand ich ausser dem gewöhnlichen Knorpel, auch viele spongiöse Knorpel vom Bau des Ohrknorpels des Menschen. Bei den wirbellosen Thieren entfernt sich die Knorpel genannte Materie chemisch ganz vom Knorpel, und ist in heissem Wasser selbst nach dem längsten Kochen ganz unlöslich.

Die mineralischen Bestandtheile der Knorpel ergeben sich aus einer Analyse von Frommherz und Gugert. Die Rippenknorpel eines 20jährigen Mannes gaben Gugert nach dem Verbrennen eine Asche, aus welcher sich die Kohle nicht vollständig wegbrennen liess. Vom Knorpel enthielten 100 Theile Asche

Kohlensaures Natron	35,06
Schwefelsaures Natron . . .	24,24
Chlornatrium	8,23
Phosphorsaures Natron . . .	0,92
Schwefelsaures Kali	1,20
Kohlensauren Kalk	18,37
Phosphorsauren Kalk	4,05
Phosphorsaure Kalkerde . . .	6,90
Eisenoxyd und Verlust . . .	0,99

Bei einer 63jährigen Frau waren dieselben löslichen Bestandtheile in geringerer Menge, der phosphorsaure Kalk in grösserer Menge als der kohlensaure Kalk enthalten. Die Knorpel enthalten $\frac{2}{3}$ ihres Gewichtes Wasser.

7. *Knochen.* Knochen mit verdünnter Salzsäure behandelt, lassen den Knorpel zurück, während die Knochenerde von der Säure aufgelöst wird. Der Knorpel verwandelt sich beim Kochen ganz in Leim. Die Knochenerde der höheren Thiere besteht fast grösstentheils aus phosphorsaurer Kalkerde mit kohlensaurer Kalkerde, und mit geringen Quantitäten phosphorsaurer Talkerde und Fluorcalcium. Die phosphorsaure Kalkerde der Knochen ist basisch in einer eigenthümlichen Verbindung, die man sonst immer durch Niederschlagung der phosphorsauren Kalkerde mit überschüssigem Ammoniak erhält. Im Urin ist die phosphorsaure Kalkerde sauer und aufgelöst, in der Knochenerweichung scheint mehr dieses aufgelösten Salzes durch den Urin ausgeschieden zu werden.

Digitized by Google

Berzelius Analyse vom Knochen des Menschen und des Rindes.

	Mensch.	Ochse.
Knorpel in Wasser völlig löslich	32,17	33,30
Gefässe	1,13	
Basische phosphorsaure Kalkerde	51,04	55,45
Kohlensaure Kalkerde	11,30	3,85
Fluorcalcium	2,00	2,90
Phosphorsaure Talkerde	1,16	2,05
Natron mit sehr wenig Kochsalz	1,20	2,45
	100,00	100,00

Die Knochen eines Kindes enthalten nach Schreger $\frac{1}{2}$, des Erwachsenen $\frac{4}{5}$, des Greises $\frac{7}{8}$ erdige Bestandtheile. E. H. Weber *Anat.* 1. 316. Ueber kranke Knochen Bostock, *Med. chir. Transact. Vol.* 4.

Dass die phosphorsaure Kalkerde als solche in den Knochen vorkömmt, beweist die Affinität der Rubia tinctorum zu den Knochen lebender Theile, welche sie roth färbt.

Ueber die Structur der Knochen siehe Deutsch, Miescher und J. Mueller a. a. O.

Der Knochenknorpel hat im Allgemeinen die Structur der permanenten Knorpel, und stimmt vor der Ossification ganz damit überein. Wird der von der Kalkerde befreite Knorpel längere Zeit in verdünnten Säuren macerirt, so zerfällt er in Schichten, die sich wie die Schalen einer Zwiebel ablösen lassen. Auch an frischem Knochenknorpel kann man die Schichten erkennen, sie laufen in der Richtung der Fläche der platten Knochen, concentrisch an den Röhrenknochen, ausserdem giebt es auch secundäre concentrische Schichten, deren Systeme von denjenigen Schichten umfasst werden, welche von der Oberfläche der Röhrenknochen concentrisch verlaufen. Im Centrum der secundären Schichten verlaufen die Knochenkanälchen, welche Fett und Gefässe enthalten und überall auf Durchschnitten der Knochen bemerkt werden. Sie sind im Kleinen, was die Markhöhle der Röhrenknochen im Grossen ist. Die Markkanälchen oder Fettkanälchen laufen in den Röhrenknochen der Länge nach und anastomosiren hier und da; in den spongiösen Knochen werden sie durch die Markzellen oder Fettzellen ersetzt. Mehreres vom feineren Bau der Knochen kann am Knochenknorpel selbst nicht, wohl aber an fein geschliffenen Knochenplättchen erkannt werden. In solchen feinen Plättchen erkennt man mit dem Mikroskop ovale Körperchen von der Gestalt der Knorpelkörperchen, die sogenannten Knochenkörperchen. Von jedem derselben gehen radiale zum Theil etwas verzweigte sehr feine Kanälchen aus. Der Durchmesser dieser radialen Kanälchen ist, 0,0002 — 0,0003 Lin. Sie sind dunkel bei durchscheinendem Lichte, wie auch die Knochenkörperchen, während die Zwischensubstanz der Körperchen und Kanälchen an feinen Plättchen ganz durchsichtig ist. Bei auffallendem Lichte erscheinen die Körperchen und Kanälchen weiss. Nach der Behandlung mit Säuren werden diese ganz durchsichtig, woraus sich schliessen lässt, dass unor-

Digitized by Google

ganische Deposita in den Wänden oder im Innern dieser Theilchen enthalten seyn mögen. Die Hauptmasse der Kalksalze ist übrigens in der durchsichtigen Zwischenmasse, dem hauptsächlichen Theil der Knochen enthalten. Diess sieht man, wenn man die Knochenplättchen mit Pottasche kocht, welche den Knorpel ganz oder grösstentheils löst, während die Kalksalze weiss, zwischen den radialen Figuren zurückbleiben. Ob die Kalksalze an diesen Theil des Knochens chemisch gebunden oder sehr fein darin abgesetzt sind, ist noch unbekannt.

Der thierische Bestandtheil des Knochens oder sein Knorpel besteht aus Leim. Sehr merkwürdig ist, wie meine Beobachtungen gezeigt haben, dass der Leim des Knochenknorpels vor der Ossification Chondrin, nach der Ossification aber gewöhnlicher Leim ist. Auch wenn permanente Knorpel krankhaft ossificiren, wie die Kehlkopfknorpel, enthält das Ossificirte statt Chondrin nun gewöhnlichen Leim. Die von Osteomalacie erweichten Knochen geben nicht einmal mehr Leim beim Kochen und enthalten ausserordentlich viel Fett.

Das knorpelige Skelet der Haifische und Rochen besitzt eine ossificirte Rinde, die aus lauter mosaikartig zusammengefügten kleinen Knochenplättchen oder Säulchen zusammengesetzt ist. Die sogenannten Hautknochen der Thiere dürfen nicht mit den Hornbildungen auf der Haut verwechselt werden. Die Hautknochen der Gürtelthiere, Schildkröten, Störe u. a., so wie die knöchernen Hautschilder der Crocodile und knöchernen Schuppenkerne der Eidechsen sind organisirt wie andere Knochen, das Horn ist dagegen gefässlos und entsteht durch Absonderung. Auf den organisirten Hautknochen liegt noch Horn, so die Epidermis auf den Hautschildern der Gürtelthiere, Crocodile, das Schildpatt auf der Schale der Schildkröten, das Horn auf den Knochenschildern der Crocodile und die Epidermis auf den Schuppenkernen der Eidechsen.

8. *Elastisches Gewebe.* Diesem Gewebe ist es eigen, dass, seine Fasern sowohl an Stärke sehr ungleich sind, als auch untereinander anastomosiren, welches letztere von keinen anderen Fasern bekannt ist. So verhält sich das elastische Gewebe überall, in der mittlern Haut der Arterien, in den elastischen Fasern der Luftröhre, in den Kehlkopfbändern, in den gelben Bändern der Wirbelsäule, wie im Ligamentum nuchae der Thiere. Das elastische Gewebe ist gelb, behält seine Elasticität unverändert, wenn es auch noch so lange in Weingeist aufbewahrt und selbst, wenn es viele Tage gekocht wird. Es giebt beim Kochen äusserst schwer und erst nach mehreren Tagen sehr wenig Leim; aber dieser Leim ist eigenthümlich und kann daher nicht von dem Zellgewebe in elastischen Theilen herrühren. Er nähert sich sehr dem Chondrin an, dem er jedoch nicht ganz gleicht. Er wird von essigsaurem Blei, von Essigsäure stark getrübt, von Alaun und schwefelsaurer Thonerde gefällt, aber schwefelsaures Eisenoxyd fällt ihn nicht und macht ihn nur opalisirend. Siehe Eulenberg *de tela elastica. Berol.* 1836. und J. Mueller in Poggend. *Ann. XXXVIII.*

Digitized by Google

c. Einfluss der Nerven.

Ueber die Nothwendigkeit des Nerveneinflusses auf die Ernährung ist man noch sehr im Dunkeln. Lähmungen des Gehirns und Rückenmarkes zeigen zuweilen gar keinen Einfluss auf die Ernährung. In vielen Fällen sind die gelähmten Theile abgezehrt, welker, und was besonders den Einfluss der Nerven auf die Ernährung erweist, die gelähmten Theile sind leicht nach Verletzungen dem Brande unterworfen. Schröder v. d. Kolk hat beobachtet, dass in gelähmten Gliedern zuweilen Umwandlung der Muskelsubstanz in Fett und Verknöcherung der Arterien erfolgt.

Bei dem Embryo zeigt sich die Ernährung von dem Gehirne sehr unabhängig, indem z. B. hirnlose Missgeburten vollkommen ernährt, bis zur Geburt ausgebildet werden. Dagegen hat man bei dem Mangel gewisser Nerven meist auch einen entsprechenden Mangel des Organes gefunden, und bei dem Mangel der Organe entsprechenden Mangel der Nerven. Tiedemann beobachtete in 3 Fällen Mangel der Riechnerven mit undurchlöcherter Siebplatte und Gaumenspalte. Der Mangel der Augen ist mit Mangel ihrer Nerven verbunden. Tiedemann's *Zeitschr. f. Physiol. I.* 76. Mayer hat eine Missgeburt beschrieben, an welcher die unteren Extremitäten bis auf den Defect von 2 Zehen an der linken vorhanden waren, aber mit dem Mangel des Urinsystems und sehr mangelhafter Entwicklung der Genitalien auch die Cauda equina sehr mangelhaft entwickelt war, indem das Rückenmark in der Gegend des 12. Rückenwirbels stumpf endigte; die Nerven der unteren Extremitäten waren vorhanden. Tiedemann's *Zeitschr. für Physiol.* 2. 41. Bei mehreren defecten Missgeburten sollen zwar die Nerven ganz gefehlt haben, diess kann man aber ziemlich sicher auf die Schwierigkeit und Ungenauigkeit der Untersuchung schieben. Vergl. Mayer a. a. O. Bei den acephalen Missgeburten, die bloss aus einer Extremität bestanden, (siehe oben p. 196.) ist doch noch eine knotige Nervenmasse gefunden worden, von welcher die Nerven der Extremität abgehen, und welche als Rudiment des Rückenmarks zu betrachten ist. Die gegenseitige Bedingung der Organe und der Nerven lässt sich sehr gut bei der Verwandlung der Insekten und Amphibien beobachten. So wandelt sich das Nervensystem der Insekten bei der Verwandlung nach den späteren Organtheilen um; bei der Raupe sind die Knoten des Nervenstranges gleich den Abtheilungen des Körpers mehr gleichartig, bei der Verwandlung, wenn sich einzelne Abtheilungen des Körpers weiter ausbilden, Extremitäten und Flügel entstehen, verschmelzen mehrere Knoten zu grösseren Massen, den Stellen entsprechend, welche neue Organe erhalten haben. Herold *Entwicklungsgeschichte des Schmetterlings. Cassel* 1815. Bei der Verwandlung der Froschlarven schwindet mit dem Schwanze das Endtheil des Rückenmarks, während mit den Extremitäten ihre Nerven sich bilden.

Man muss sich übrigens wohl hüten, die gegenseitige Bedin-

gung von Nerven und Organ so zu verstehen, dass die Erzeugung der Organe von der Praeexistenz der Nerven abhänge. In der Keimsubstanz, in welcher noch die ganze organisirende Kraft ruht, werden Nerven und Organ durch eine und dieselbe Kraft erzeugt. Wenn aber einmal die Organe erzeugt sind, scheint ihre beständige Restauration von dem Einflusse der Nerven zugleich mit abzuhängen. Mehrere Thiere bilden, selbst im spätern Leben, verlorne Theile wieder. Die Salamanderlarven erzeugen abgeschnittene Extremitäten, Kiemen, Unterkiefer, Auge wieder. Hier ist es zweifelhaft, ob die in dem Ganzen verbreitete organisirende Kraft, wie bei der ersten Entwicklung, diese Theile nach erzeugt, oder ob die noch unversehrt vorhandenen Centraltheile des Nervensystems die Wiedererzeugung der Theile, zu welchen sie Nerven ausschicken, einleiten. Der Salamander soll die Extremität nicht wieder erzeugen, wenn der Nerve über dem Stumpfe abermals durchschnitten worden (?).

Gegen den Einfluss der Nerven auf die Ernährung könnte man anführen, dass die Knochen sich regeneriren, ohne Nerven zu besitzen, indessen doch auch die ernährenden Gefässe der Knochen so gut wie andere Theile mit feinen Zweigelchen von Nerven, die dem N. sympathicus angehören, versehen seyn können.

Wir besitzen wenig directe Erfahrungen über den Einfluss der Nerven bei den Actionen in den kleinsten Gefässen. Magendie sah, dass Brechmittel in die Venen eingespritzt, Lungen- und Magenentzündung bewirken, dass diese aber viel geringer war, wenn die Nervi vagi vorher durchschnitten waren. Magendie beobachtete, dass auch nach Durchschneidung des N. trigeminus starke Reize an dem Auge keine Augenentzündung erregten, dass aber nach einigen Tagen an dem Auge sich eine Entzündung mit Exsudation im Innern einstellte, auch wenn das Auge nicht gereizt worden. *Journ. d. physiol.* 4. 176. 304. Dupuy hat nach Ausschneidung des Ganglion cervicale supremum nervi sympathici eine Augenentzündung entstehen gesehen, was Mayer bei Unterbindung des N. sympathicus bestätigt hat. Graefe und Walther's *Journ.* 10. 3. Schröder durchschnitt bei einem Hunde an dem einen Beine den N. ischiadicus und cruralis, und verwundete beide Füsse. Am folgenden Tage war die Wunde des paralytischen Beines trockner als die des gesunden; innerhalb 3 Wochen entwickelte die Wunde des gesunden Fusses viel stärkere Entzündungsphänomene; es entstand Eiterung und Granulation, an dem paralytischen Fusse fehlte fast die Entzündung der Wunde, eine weisse Materie wurde ausgeschieden, welche verschorfte. Die Wunde war blass. *Observ. anat. pathol.* 1826. 14. Ich habe nach Durchschneidung des N. ischiadicus, die ich wegen Reproduction der Nerven vornahm, unter mehreren Fällen beim Kaninchen einmal beobachtet, dass das Thier an dem paralytischen Beine an der Ferse sich aufging, wo ein Decubitus entstand. Es gehören hieher auch die plötzlichen Veränderungen des Zustandes der Wunden nach Gemüthsbewegungen, worauf Wunden oft schnell ihr gutes Ansehen verändern, wie Vering und Langenbeck berichten. Siehe Schröder v. d. Kolk a. a. O. *p.* 28.

Digitized by Google

Ueber den vorzugsweisen Antheil des sympathischen Nerven an der Ernährung im Gegensatze der Cerebro-Spinal-Nerven weiss man nichts, als dass die Ernährung eines Theiles nach Durchschneidung seiner vom Gehirne oder Rückenmarke kommenden Nerven nicht aufhört.

II. Capitel. Vom Wachsthum.

Das Wachsthum der Theile organischer Wesen geschieht auf zweifache Art. Entweder geschieht es von allen kleinen Partikeln zwischen den Capillargefässen aus, indem sich zugleich die Anzahl der Gefässe vermehrt, und so wachsen die organisirten, mit Blutgefässen versehenen Theile, oder das Wachsthum geschieht durch schichtweise Apposition von Bildungsstoff, der von einer organisirten Matrix abgeschieden wird, während die durch Apposition wachsenden Theile keine Gefässe besitzen.

a. Von dem Wachsthum der organisirten Theile durch Intussusceptio.

Die Erzeugung von Gefässen scheint fast überall zu den ersten Acten der organisirenden Kraft zu gehören. So entstehen sie in dem bei der Entzündung und nach der Conception im Uterus ausgeschwitzten Faserstoff, durch Wechselwirkung der ausgeschwitzten Materie mit der exsudirenden organisirten Oberfläche. Von allen organischen Materien ist es der im Blute aufgelöste Faserstoff, der diess Princip des Lebens in sich enthält, dass er selbst im ausgeschwitzten Zustande noch organisirt wird, sobald er mit organisirten Theilen in Berührung ist. Die erste Entstehung und Vervielfältigung der Gefässe lässt sich in der Keimhaut des Eies beobachten. Die Keimscheibe vergrössert sich zur Keimhaut; diese zeigt bald eine obere dünnere Schichte (seröses Blatt) und eine untere dickere Schichte (Schleimblatt). Um die in der Mitte der Keimhaut sich zeigende Spur des Embryo erscheint ein durchsichtiger Hof, *Area pellucida*, während der äussere Theil der Keimhaut undurchsichtig bleibt, und dieser undurchsichtige Theil der Keimhaut wird bald wieder durch eine Abgrenzung in ein äusseres und inneres ringförmiges Feld abgetheilt, beim Vogel in der 16. — 20. Stunde. Diese Abgrenzung schliesst zunächst den einen Theil des undurchsichtigen Stückes der Keimhaut ein, welches den innersten oder durchsichtigen Hof der Keimhaut umgiebt, und *Area vasculosa* genannt wird, weil sich innerhalb dieses Hofes das Blut und die Gefässe bilden. So weit die Area vasculosa reicht, zeigt sich zwischen den Blättern der Keimhaut eine körnige Lage, welche sich bald in körnige dichte Inseln und rinnenförmige Zwischenräume zertheilt, in denen sich zuerst eine gelbliche, hernach rothe Flüssigkeit, das Blut, sammelt. Zuerst sieht man das Blut in der Peripherie der Area vasculosa. Allmählig theilt sich die körnige Lage zwischen beiden Blättern überall in solche Substanzinseln und Rinnen. Das Herz

Digitized by Google

selbst entsteht, wie die grossen Gefässstämme, auch zwischen beiden Blättern. C. F. Wolff (*Theorie der Generation. Berl.* 1764.) hat nun auf eine bewundernswürdige Weise gezeigt, wie an den Rinnen erst die Gefässwände allmählig entstehen, indem die Substanzinseln zuerst in der Mitte durchsichtiger werden, und allmählig sich der dichtere und undurchsichtigere Theil der Substanzinseln gegen die Strömchen hin verschmälert, in gleichem Grade, als die Durchsichtigkeit der Substanzinseln von der Mitte sich ausdehnt. Bei ganz jungen Thieren, z. B. jungen Fischchen, lässt sich, wie Döllinger (*Denkschriften der Academie zu München.* 7.) that, das Entstehen neuer Strömchen während des Wachsthums des Schwanzes beobachten. Bei ganz jungen Fischchen kehrt anfangs das arterielle Strömchen am Schwanzende ohne Weiteres in einem venösen Strömchen um, mit dem Wachsthum des Fischschwänzchens vermehren sich die Gefässschlingen. Am einfachsten wäre nun, sich vorzustellen, dass die organische Substanz um die Strömchen her die flüssigen Theile des Blutes, aufgelöstes Eiweiss und Faserstoff anziehen, und indem sie sich damit tränken, sich wie beim ersten Entstehen der Gefässe in der Keimhaut in Rinnen und feste Zwischenstellen theile. So lässt sich auch die Entstehung der neuen Gefässe in dem ausgeschwitzten Faserstoffe bei den Entzündungen am leichtesten denken, indem nämlich der exsudirte Liquor sanguinis sich allmählig verdichtet, aber auch durch die permeabeln Capillargefässwändchen hindurch wieder Liquor sanguinis anzieht, der sich in den entstehenden Rinnen der Substanzinseln vertheilt, worauf später auch Blutkörperchen in die erweiterten neuen Gefässchen aufgenommen werden. Denn dass sich die Gefässenden in die neue Materie verlängern sollen, ist eine ungereimte Vorstellung, zumal da es keine Gefässenden, sondern nur Capillargefässübergänge zwischen arteriösen und venösen Strömchen giebt.

Eine genaue Zusammenstellung aller Beobachtungen hat All. Thomson, Froriep's *Not. N.* 783. gegeben.

Mit dieser Vorstellung von der Entstehung der neuen Gefässe sind aber die Beobachtungen von Döllinger nicht übereinstimmend. Döllinger hat eine doppelte Entstehung neuer Strömchen beschrieben. 1) Die arteriellen Strömchen bahnen sich neue Seitenwege in die wachsende Substanz. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Blutkörperchen sich solche neue Wege zuerst bahnen und zufälligerweise ein venöses Strömchen wieder antreffen. Die Einmündung der neuen Strömchen in ein venöses Strömchen wäre neuerdings zu erklären, worin ja überhaupt die ganze Schwierigkeit liegt. So lange nicht durch Tränkung der Substanz mit Liquor sanguinis und Theilung der Partikeln zwischen arteriösen und venösen Strömchen neue Rinnen entstehen, ist die Einmündung der neuen Strömchen in venöse Strömchen sehr schwierig einzusehen. 2) Eine zweite Art der Entstehung neuer Strömchen hat Döllinger folgendermassen dargestellt: In der Nähe des fliessenden Blutstroms geräth ein Streifen des unbeweglichen Thierstoffes in Bewegung; es bildet sich gleichsam ein bewegliches Säulchen aus dem, was Döllinger Schleimkörner

Digitized by Google

nennt, ein Säulchen, das mit einem Ende fast an den Blutstrom unter einem rechten Winkel anstösst, mit dem andern von ihm abgekehrt ist. Dieser Streifen schiebt sich nun hin und wieder dem Blutstrome zu, vom Blutstrom ab, alles pulsirend; die Körnchen, aus welchen der oscillirende Streifen besteht, legen sich in Ordnung an einander, und nehmen allmählig eine bestimmtere, weniger verflossene Gestalt an, indem sie deutlich oval werden; endlich theilt sich die oscillirende Masse in 2 Strömchen, deren eines in arteriöser das andere in venöser Richtung läuft. Ich gestehe gern, dass ich diese Erscheinung nicht leicht für den gewöhnlichen Vorgang bei der Entstehung neuer Strömchen halten möchte. Entweder geht die Oscillation von dem arteriellen Strömchen aus oder nicht. Geht sie nicht davon aus, so ist die Verbindung dieser Oscillation eben so schwer einzusehen, als die Verbindung von 2 Strömchen selbst, warum es sich überhaupt handelt. Geht die Oscillation von dem arteriellen Strömchen aus, und kehrt das Strömchen, wie in Döllinger's Beobachtung, gegen den Ausgang zurück, so hat man einen schlingenförmigen Anhang einer Arterie, nicht aber eine neue Schlinge zwischen Arterie und Vene. Ersteres ist aber nur in dem Falle möglich, den Döllinger auch hervorgehoben hat, nämlich am Ende der Hauptarterie, wo diese im Schwanze der jungen Fischchen gerade zur Hauptvene umkehrt. Dieser Fall wäre auch an der Spitze der Kiemenblättchen denkbar, wo arterielle Strömchen in venöse umkehren. Meyen (*Isis* 1828. *Tab. VI. fig.* 3.) hat indess wirklich an der Kieme der jungen Salamanderlarve die Beobachtung gemacht, dass das arterielle Strömchen ein Aestchen an der Seitensprosse eines Kiemenblättchens ausschickte, und die Blutkörperchen daraus auch wieder aufnahm. Späterhin ist es freilich anders, indem die Arterie eines Kiemenblättchens von der Arterie des Kiemenstämmchens ausgeht, die Vene des Kiemenblättchens nicht zu der Arterie, sondern zur Vene des Kiemenstämmchens zurückkehrt. Auch sonst bei den Thieren sind die Schlingen der kleinsten Gefässe nicht zugleich Anhänge von einerlei Gefässart, z. B. der Arterien, sondern nur zwischen Arterien und Venen. Weitere Beobachtungen müssen noch über die Erzeugung neuer Capillargefässströmchen an Salamanderkiemen und anderen Theilen angestellt werden, um ins Klare zu kommen, ob nicht die oben von mir aufgestellte Ansicht, für welche vor der Hand noch keine hinreichenden Beobachtungen vorhanden sind, in vielen Fällen der Natur entspricht.

Beobachtungen über das Wachsthum verschiedener Theile sind noch wenig vorhanden. Wahrscheinlich findet es überall in der Weise statt, dass sich sowohl die Elementartheilchen der Gewebe zwischen den Strömchen bald an Zahl, z. B. Fasern der Muskeln und Nerven, vermehren, bald an Grösse zunehmen, indem die Partikeln zwischen den Strömchen mehr Stoff apponiren, als auch, indem die Zahl der Capillargefässe in gleichem Verhältnisse mit den wachsenden Partikeln zunimmt.

Die Capillargefässe haben an der Ernährung nur in so weit Antheil, als sie den Stoff zur Bildung des Elements der Gewebe

Digitized by Google

hergeben. Bedenkt man wie klein die Elemente der Gewebe, die Muskelfasern, Zellgewebefasern u. s. w. gegen die Capillargefässe sind, und dass bei den Insecten das Gefässsystem sehr einfach ist und aus wenig verästelten Strömen besteht, so wird man von der einseitigen und mechanischen Vorstellung befreit, dass die Capillargefässe wesentlich ausser der Zufuhr der Substanz bei der Ernährung und Bildung der Elemente der Gewebe eine Hauptrolle spielen sollen. Man bedenke nur, dass das Mikroskop an dem Flügelstaub der Insekten noch Configurationen nachweist, welche nur durch die stärksten Vergrösserungen sichtbar gemacht werden können, und dass hinwieder die Saftbewegung bei diesen Thieren so einfach ist. Die Bildungen der Elementartheile der Gewebe gehen in dem durch die Gefässwände durchgehenden, und die Gewebe tränkenden von ihnen angezogenen Liquor sanguinis vor sich und die angeführten Thatsachen beweisen, dass diese Organisation weit von dem Einfluss der Gefässe entfernt in dem bildsamen Stoffe vor sich gehen kann. Der Liquor sanguinis selbst strebt zur Organisation. In der Entzündung und im Uterus nach der Conception ergossen, ist er anfangs homogen, aber später untersucht zeigt das ältere Exsudat schon deutliche Spuren von Faserbildung. Bei der Ernährung erhält diess Streben eine bestimmte Richtung durch die schon vorhandenen Elementartheile der Gewebe, und durch die noch vorhandene organisirende Kraft, welche im Keim alle nur potentia vorhandenen Elemente des Ganzen actu zur Erscheinung brachte, und im Erwachsenen auf die Produkte fixirt, ihre Thätigkeit fortsetzt.

Was man vom Wachsthum einzelner Theile kennt, ist Folgendes: man weiss, dass die Knochen vorzugsweise auf der Oberfläche und am Ende der Diaphysen wachsen, indem hier neue Knorpelschichten entstehen, die organisirt sind und ossificiren. Diess sieht man, weil die Knochen nach aussen hin sich vergrössern, während das Innere der Knochen, was früher Knochen gewesen, wieder resorbirt und Knochenhöhle wird. Die hieher gehörenden Thatsachen findet man in E. H. Weber's classischem Werke über die Anatomie des Menschen im ersten Theile desselben und im *Dictionnaire des sciences médicales, art. osteogenie. T.* 38. *p.* 445. zusammengestellt. Nach Duhamel umschliesst ein um einen Röhrenknochen eines jungen Thieres gelegter Ring nach einiger Zeit nicht mehr den Knochen, sondern das Knochenmark. Die Knochen verändern sich bis in das höchste Alter, wie denn z. B. im hohen Alter die Hirnschale dünner wird, indem die schwammige Diploe zum Theil verschwindet. Die Färberröthe, Rubia tinctorum, welche eine chemische Verwandtschaft zur phosphorsauren Kalkerde hat, und bei der Fütterung von allen Theilen vorzugsweise nur die Knochen und die Zähne roth färbt, färbt bei den Knochen das ganze Gewebe roth. Bei den jungen Tauben hat diese durchgängige rothe Färbung der Knochen nach Morand und Gibson schon in 4 Tage statt, während die Knochen erwachsener Tauben erst nach 14 Tage langer Fütterung rosenroth werden. Indessen scheinen doch die Oberfläche und die Enden der Knochen vorzugsweise zu wach-

Digitized by Google

sen, wie die von Weber citirten Beobachtungen beweisen. Duhamel fand, als er die Thiere abwechselnd mit Färberröthe fütterte, und wieder nicht fütterte, abwechselnde Schichten weisser und rother Substanz, was sich aber selten bei jungen Thieren zeigt. Zur Zeit der Fütterung mit Färberröthe wurde die äusserste Schichte roth gefunden. Hiernach räumte Duhamel zwar die Intussusception der Knochen ein, behauptete aber doch mit Grew, dass die Knochensubstanz vorzugsweise an der Oberfläche schichtweise sich bilde, wie die Lagen des Holzes an den Bäumen. Diess Alles ist nichts weniger als gewiss; denn in Morand's Versuchen wurden die Knochen erwachsener Tauben durchweg roth, und Duhamel sah selbst, dass die Knochen eines Hahns in 16, die einer Taube in 3 Tagen in ihrer Dicke roth wurden. Gibson, Meck. *Archiv* 4. 482. *). Die Röhrenknochen wachsen vorzugsweise auch an der Grenze zwischen den schon verknöcherten Stücken der Knochen und dem noch knorpelig gebliebenen Theile, welcher das Mittelstück von den Epiphysen in der Kindheit trennt. Diess scheint der Versuch von J. Hunter zu zeigen, nach welchem Löcher in die beiden Enden des Mittelstücks eines Röhrenknochens beim jungen Schweine gebohrt, nach einigen Monaten sich nicht von einander entfernt hatten, so dass die über den Löchern befindlichen Strecken des Knochens vorzugsweise gewachsen seyn mussten. Das Wachsthum der Röhrenknochen dauert daher auch nur so lange in die Länge fort, als die Epiphysen und das Mittelstück noch durch eine Lage Knorpel getrennt werden. Siehe Meckel, *Handb. d. menschl. Anat.* 1. 378. E. H. Weber *Anat.* 1. 339., wo man auch die Nachweisungen über die Litteratur findet.

Die Knochen sind anfangs beim Fötus knorpelig, und enthalten zu allererst keine Zellen und Markhöhlen. Die Zellen der Knochen fehlen lange, sie entstehen zum Theil schon, ehe die Knorpelsubstanz des Knochens durch Vergrösserung des Gehaltes an phosphorsaurer Kalkerde verknöchert. Die Verknöcherung findet von einzelnen Knochenkernen aus statt, von welchen aus die Knochenlamellen und Fasern (an den platten Schädelknochen radiatim) ausgehen. Der Anfang der Verknöcherung geschieht schon im 2. Monat der Schwangerschaft. Steissbein, Kniescheibe, die meisten Hand- und Fusswurzelknochen verknöchern erst nach der Geburt. Dass die Natur des Leims bei der Verknöcherung umgeändert wird, ist schon oben erwähnt; der Knochenknorpel besteht vor der Ossification aus dem eigenthümlichen Leim der permanenten Knorpel, Chondrin; nach der Ossification findet sich dieser nicht mehr vor, der Knochenleim ist übereinstimmend mit dem Leim der Sehnen des Zellgewebes und der äussern Haut. So verhält sich dieser Leim sowohl, wenn er durch Kochen ge-

*) Aber überhaupt lässt sich aus diesen Versuchen mit Färberröthe wenig schliessen; denn die Färbung der Knochen von Färberröthe lehrt nichts über die Ernährung der Knochen, sondern ist eine blosse Folge davon, dass die Knochen von Blutgefässen durchzogen sind, von welchen aus die Färberröthe sich mit den Kalksalzen der Knochen verbindet.

Digitized by Google

raspelter Knochen, als wenn er durch Kochen von Knochenknorpel nach Extraction der Kalksalze erhalten wird. Die Entwicklungsgeschichte der Knochen wird übrigens im 8. Buche dieses Werkes abgehandelt.

Es ist eine ganz irrige Vorstellung, wenn man glaubt, ein organisirter Theil könne das Ernährungsorgan eines andern organisirten Theiles seyn, z. B. die Knochensubstanz werde von der Beinhaut gebildet, der Knochen von der Beinhaut ernährt. Die Knochensubstanz muss, weil sie selbst organisirt ist, auch selbst assimiliren. Nur unorganisirte Theile, welche keine Gefässe enthalten, wie die Haare, Nägel, Zähne, Crystalllinse, werden von einer organisirten Matrix erzeugt, und durch Apposition neuen Stoffes erhalten. Dass die Knochensubstanz durch die Beinhaut gebildet werde, diese Vorstellung halte ich für eine des jetzigen Zustandes der Physiologie unwürdige Barbarei. Die Knochen erhalten von der Beinhaut und von der Markhaut aus Gefässe, sie sterben daher ab, wenn Beinhaut oder Markhaut in einer Strecke zerstört sind; die äusseren Schichten sterben ab bei der Zerstörung der Beinhaut, die inneren bei der Zerstörung der Markhaut der Knochen. Allein daraus folgt nicht, dass diese Häute die phosphorsaure Kalkerde im Knochen absetzen. Die Beinhaut ist das Vehikel der Gefässe, welche in den Knochen eindringen, darum stirbt er ab, wenn seine Gefässe an dieser Stelle zerrissen sind.

Ueber das Wachsthum der Primitivfasern der Muskeln und der Nerven ist man völlig im Dunkeln. Man weiss nicht, ob die Zahl der Muskel- und Nervenfasern von der ersten Erzeugung an constant bleibt, und sich nur ihre Länge und Stärke vergrössert, oder ob ihre Zahl bei dem Wachsthume und bei der Uebung zunimmt. Genaue mikrometrische Messungen über den Durchmesser der Muskel- und Nervenfasern in verschiedenen Altern, über den Durchmesser der Nervenfasern in der Atrophie der Nerven, z. B. in der Cauda equina bei der Tabes dorsualis, müssen angestellt werden. Durch die interessante Schrift von Valentin, *historiae evolutionis syst. muscularis prolusio. Vratisl.* 1832, ist der Anfang in diesem Theile der Untersuchungen gemacht. Nach ihm bestehen die Muskeln anfangs bei dem ganz jungen Embryo aus deutlichen Kügelchen, welche hernach verschwinden, so dass an die Stelle eines perlschnurähnlichen Fadens ein gleichförmig walzenförmiger tritt. Die Fasern sind nach ihm bei jungen Embryonen der Säugethiere und Vögel immer dicker als bei älteren. Die ersten perlschnurartigen Fasern sollen 3 und mehrere Mal dicker als die Muskelfasern älterer Embryonen seyn, so dass also aus den ersten Fäden hernach mehrere dünnere sich zu bilden scheinen. Da die Primitivfasern der Nerven und Muskeln so klein sind, dass sie selbst keine Capillargefässe besitzen, und diese nur in ihren Zwischenräumen verlaufen (vergl. pag. 211.), so muss das Wachsthum durch Anziehung der aufgelösten Theile des Blutes geschehen.

Ueber die Entstehung und das Wachsthum der Drüsenbläschen beim Fötus habe ich einige nähere Aufschlüsse gegeben,

Digitized by Google

obwohl die Beobachtungen über die Entstehung der Leber, des Pankreas, der Speicheldrüsen, der Nieren nicht ein ganz gleiches Verhalten zeigen. Rolando, Baer und ich haben gezeigt, dass die Leber als ein kleiner Auswuchs der Darmwände entsteht, der zuerst im Innern hohl ist. Indem die Substanz in der Dicke der Wände dieses Auswuchses sich vergrössert, entstehen darin Träubchen von Kanälen, von welchen es ungewiss ist, ob sie gleich anfangs hohl sind; die Höhle in der Basis des Auswuchses wird aber verzweigt. Die Nieren des Vogelembryo bilden nach meinen Beobachtungen anfangs einen gallertartigen Keimstoff, Blastema, welcher auf der Oberfläche ein gewundenes Ansehen hat. Der Saum dieser Windungen enthält hernach die (anfangs) blasigen Enden der parallel aus der Tiefe heraufsteigenden Harnkanälchen, welche durch den Keimstoff verbunden sind. Erst allmählig bilden sich die blasigen Enden der Harnkanälchen (auf Kosten des Blastema) aus, und werden gefiedert; am vollständigsten habe ich die Ausbildung der Speichelkanälchen in der Parotis und die Entwicklung der Thränendrüse bei Säugethieren beobachtet. Nach E. H. Weber's und meinen Beobachtungen ist die erste Spur der Speichelkanälchen der Parotis der in einer gallertartigen Materie liegende Ausführungsgang, der mehrere blinde Zweigelchen ausschickt. Nach meinen Beobachtungen zeigt sich hier in der Folge ein sehr merkwürdiges Verhältniss zwischen dem Keimstoff der Drüse, Blastema und den Kanälchen. Bei einem Schaafembryo von 4 Zoll Länge ist das Blastema nicht mehr gallertartig, sondern eine grauliche gelappte Materie, innerhalb welcher die Speichelkanälchen ganz weiss verlaufen, und Sprossen mit blinden Enden ausschicken. Das Blastema umgiebt diese ganze Verzweigung, so dass die Zweigelchen nicht bis an den Rand der Läppchen des Blastema fortschreiten. *De glandularum structura penitiori tab.* 6. *fig.* 11. Bei älteren Embryonen, wie z. B. bei einem Schaaffötus (*fig.* 11.), war das Blastema schon viel mehr aufgezehrt, und umgab die viel mehr ausgebildeten Sprossen der Speichelkanälchen und ihre Enden nur sehr sparsam, gleichsam als wenn es zuletzt in den Bindestoff oder das Interstitial-Zellgewebe zwischen den Kanälchen einer Drüse verwandelt würde. Bei der Thränendrüse *tab.* 5. *fig.* 8. haben sich mir diese Beobachtungen über das Verhältniss des Blastema zu den Drüsenkanälchen bestätigt.

Die Frage, bis auf welche Theile sich das Wachsthum durch Intussusceptio von den kleinsten Partikeln aus ausdehnt, ist identisch mit der Frage, welche Theile organisirt sind oder Blutgefässe enthalten. In den Sehnen, Bändern, Knorpeln sind Blutgefässe, wenn auch sehr sparsam, enthalten. Im Museum von Fremery zu Utrecht sah ich eine sehr schöne Injection der Rippenknorpel, der Knorpel des Kehlkopfs, der Luftröhre von einem, wenn ich mich recht erinnere, jungen Fuchs. Von den Gefässen der Cornea, des Glaskörpers, der serösen Häute ist pag. 215. gehandelt worden. Zweifelhaft sind die Gefässe noch von der innern Haut der Blutgefässe

Digitized by Google

b. Von dem Wachsthume der gefässlosen Theile durch schichtweise Apposition.

Die gefässlosen Theile werden durch eine organisirte Matrix erzeugt, und vergrössern sich durch fortgesetzte Apposition von einer Seite. Ihre Matrix ist bald eine ebene Oberfläche, bald vorspringend, bald sackförmig geschlossen. Es gehören hieher 1) das Horngewebe, 2) das Zahngewebe, 3) das Gewebe der Krystalllinse. Alle diese Gewebe sind, wenn sie gleich nicht ernährt werden und ihre erste Bildung von einem gefässreichen Keim ausgeht, doch deswegen nicht structurlos, man sieht vielmehr an der bestimmten Structur dieser Gewebe wieder, was wir schon über die Ernährung der gefässhaltigen Gewebe äusserten, bestätigt, dass nämlich die Gefässe nur zur Ausscheidung der Materie bestimmt sind, und dass die Organisation der Gewebetheilchen nach dem Gesetz der Gestaltung für jedes Gewebe unabhängig von den Gefässen in der ausgeschiedenen Materie entsteht. Zwischen den Capillargefässnetzen liegen erst die sehr viel feineren Muskelfasern, Zellgewebefasern. Die Formation der gefässlosen Gewebe wiederholt diese Genesis, aber die neu formirten Theilchen vergrössern die alten immer nur von einer Seite aus, während bei den gefässhaltigen Geweben die Formation zwischen den Netzen der Capillargefässe in dem Anfangs formlosen Keimstoff, Blastema, geschieht.

Die so durch Apposition entstehenden Theile haben entweder eine bestimmte organische Structur, oder haben keine. Im erstern Fall befinden sich die durch Apposition wachsenden Gewebe der höheren Thiere und auch die Schale der Crustaceen. Im zweiten Fall befindet sich die Schale der Mollusken, welche grösstentheils aus unorganischer Materie, Kalksalzen besteht und in welcher ausser der Crystallisation der unorganischen Theilchen, und ausser der Schichtbildung keine weitere Structur vorkömmt.

Die Form der Schale der Mollusken hängt ganz von der Form ihres Körpers und der Oberfläche ab, welche die kohlensaure Kalkerde, vermischt mit einer thierischen Materie absondert. Die kleinen äussersten Lamellen der Schalen der Muscheln sind zuletzt gebildet. Bournon hat gefunden, dass die kohlensaure Kalkerde in diesen Schichten ein mikroskopisch erkennbares krystallinisches Gefüge hat, und bei der Auster ist es sehr deutlich.

I. Vom Horngewebe. Zum Horngewebe gehören die Epidermis der Haut, und das Epithelium der Schleimhäute, die Haare, die Stacheln, die Nägel, Klauen, Hufe, die Hörner, die Federn.

a. Epidermis, Epithelium.

Das Epithelium der Schleimhäute ist im Munde am deutlichsten, undeutlicher in der Speiseröhre, deutlich im Muskelmagen der körnerfressenden Vögel, wo es zu Hornplatten anschwillt, deutlich auch in der obern Hälfte des Magens der Pferde; im Darmkanal scheint es ganz überaus zart zu werden, und ist nur in dem zerreiblichen, unorganisirten Ueberzuge der Darmzotten

Digitized by Google

zu erkennen, den ich pag. 265. beschrieben habe; es steht hier dem Schleime sehr nahe. Auf der schleimabsondernden äussern Haut der nackten Amphibien ist auch ein Epithelium vorhanden. Wagler erwähnt das Häuten derselben; und ich habe wenigstens die Oberhauthülle einer Wassersalamanderlarve gesehen, die dieser abgeworfen hatte. Wie die Schleimhäute Epithelium und zugleich Schleim absondern, ist schwer sich vorzustellen, wenn man nicht annimmt, dass die Schleimabsonderung von den in den Schleimhäuten zerstreuten Folliculi, die Bildung des Epithelium von den Zwischenstellen geschehe. An der Conjunction, wo das Epithelium nicht fehlt, ist der Schleim durch die Thränen ersetzt und nach Valentin fehlen die Follikeln, die Andere bemerkt haben wollten.

Die Oberhaut, Epidermis, besteht aus Schichten von Blättern, die man wenigstens deutlich an der Oberhaut der Hohlhand und Fusssohle, besonders durch Kochen, nachweisen kann. Die innerste Lage der Epidermis ist noch weich, und wird gewöhnlich Malpighisches Netz genannt. Die Oberhaut des Negers ist schwärzlich, noch mehr aber die innerste Schichte derselben, oder das Rete Malpighii. Die organisirte Matrix der Epidermis ist selbst bei dem Neger weiss. E. H. Weber *Anat.* 1. 187. Vergl. Seiler, Pierer's *med. Realworterbuch. Integumente.* An der abgezogenen Oberhaut haben die Meisten keine Poren bemerkt, die man aber auch, wenn sie vorhanden sind, so wenig wie Einstiche in Gummi elasticum bemerken könnte. Nach Eichhorn und Lauth setzt sie sich in die Haarbälge fort, bis zur Stelle, wo das Haar gebildet wird, und beim Abziehen der Epidermis werden solche Scheiden oft sichtbar. Nach Eichhorn soll man an abgezogener Epidermis bei schiefer Richtung die Löcher, durch welche die Haare gehen, allerdings sehen können. Ueber die sogenannten Schweissporen S. den Art. äussere Haut, im 3. Abschn. dieses Buchs.

Die feinere Structur der Epidermis und des Epitheliums ist durch die Beobachtungen von Leeuwenhoek, Raspail, Purkinje, Valentin und Henle aufgeklärt worden. Die Epidermis besteht aus pflasterförmigen mikroskopischen platten Stückchen, wovon jedes einen Kern enthält. Das Rete Malpighii enthält die Pigmenta, wenn solche vorhanden sind, als eingestreute, gefärbte, bläschenartige Körperchen. Seine innere Fläche ist mit vielen den Papillen der Haut entsprechenden Vertiefungen versehen, wodurch die Zwischenstellen netzförmig werden, daher der Name. Das Epithelium der Schleimhäute ist auch pflasterförmig, und jedes Stückchen enthält einen Kern; diese Stückchen stossen sich beständig ab, daher man gewöhnlich welche im Speichel und Schleim des Mundes mit dem Mikroskop auffindet. Die Epitheliumstückchen sind entweder dünn, plättchenartig, wie im Munde, an der Conjunctiva, hier liegen sie mehrfach auf einander. Im Darmkanal sind sie dagegen höher und stellen basaltartig nebeneinanderstehende Cylinder dar, wovon jeder einen Kern enthält, wie Henle gezeigt hat. Selbst die Zotten sind noch von diesen Körpern bedeckt. Von dem Durchscheinen der Kerne der Cylinder ist die falsche Ansicht von Oeffnungen entstanden.

Digitized by Google

Die Oberhaut und das Epithelium werden also schichtweise von ihrer Matrix, abgesondert. Wird die Oberhaut bei der Hautentzündung, wie sie durch das Legen eines Blasenpflasters oder bei der Verbrennung entsteht, durch das unter ihr abgesonderte Serum aufgehoben, so erzeugt sie sich wieder; eben so geht sie bei der Hautentzündung durch Exantheme in Lappen verloren, und erzeugt sich wieder. Beim Menschen und bei den Säugethieren wird sie von Zeit zu Zeit in kleinen Läppchen abgestossen, bei den Amphibien zusammenhängend bei dem Häuten, eben so bei den Insekten vor ihrer Verwandlung, und bei den Spinnen. Bei den Schlangen, welche eine von der Cutis gebildete Capsel über das Auge besitzen, hinter welcher sich das Auge frei bewegt, und welche an der innern Seite von der Conjunctiva überzogen ist, sondert diese Capsel äusserlich auch Epidermis ab, die beim Häuten mit abgeworfen wird. Bei den Schildkröten und Crocodilen wird die Epidermis an mehreren Stellen in stärkern, aus Lamellen bestehenden Hornplatten abgesondert. Unter den Schildern der Crocodile liegen auf dem Rücken Knochenkerne, Hautknochen. Diese sind aber organisirt, auch die Schuppen der Eidechsen, die oft ganz hart sind, sind keine blossen Hornplatten, sondern enthalten, wie z. B. bei den Leguanen, Blindschleichen, härtere organisirte Schuppenkörper, welche die Hornsubstanz bloss in dünnen Lamellen als Epidermis absondern.

Bei den Hautschwielen des Menschen wird die Oberhaut zu dicken Schichten gebildet; bei der Ichthyosis werden die pflasterartigen Stückchen der Epidermis zu langen Cylindern und palisadenartigen Hornfasern.

Vom Wasser quillt die Oberhaut selbst am lebenden Körper auf, durch Kochen wird sie nicht weiter verändert. Von concentrirter Schwefelsäure wird sie allmählig, von Alkalien leicht aufgelöst; von salpetersaurem Silber wird sie grau, zuletzt schwärzlich, auch beim langen innern Gebrauche des salpetersauren Silbers, wobei das Silber sich mit dem Schwefel der thierischen Theile zu Schwefelsilber verbindet. Mit Gerbestoff, welcher sich mit dem Corium beim Gerben verbindet, verbindet sich die Epidermis nicht. Die Epidermis bildet sich nach Meckel bei dem Embryo schon im 2. Monat.

b. Nägel, Klauen, Hufe.

Die Art, wie der Nagel erzeugt wird, ist noch immer nicht so klar aufgehellt, wie es gewünscht werden kann. Die Nägel stecken bekanntlich mit ihrem hintern Theile oder mit der Nagelwurzel in einer Vertiefung des Coriums. Diese Vertiefung ist mit Papillen besetzt, auch der Theil des Coriums, worauf der Nagel aufliegt, ist mit in Längsreihen gestellten Papillen besetzt. So weit der Nagel hinten weiss ist, ist das Corium weisslich, so weit er röthlich ist, ist es röthlich, so dass diese Farbe bloss durchscheint. Nach M. Weber (*Zergliederungskunst* 1.) und Lauth (*mémoire sur divers points d'anatomie*) läuft die Epidermis unter dem Nagel bis zum hintern Ende des Nagels weg, und schliesst sich auch oben an das hintere Ende des Nagels an. Nach Lauth wird die Nagelsubstanz schichtweise theils von dem Corium, wor-

Digitized by Google

auf der Nagel liegt, theils noch mehr hinten von dem Boden der Furche abgesondert, so dass er theils in der Dicke wächst, theils durch Apposition von hinten vorgeschoben wird. Man begreift indess hier nicht das Fortlaufen der Epidermis unter dem Nagel, welche Epidermislamelle Lauth für die tiefe Schichte des Nagels nimmt. Weitere Untersuchungen müssen lehren, ob nicht die untere Seite des Nagels mit der unter ihm frisch abgesonderten Epidermislamelle bloss conglutinirt ist. Krankhaft gebildete gekrümmte Nägel bestehen deutlich aus dachziegelförmig aufeinander und hintereinander liegenden Schichten, so dass die Schichten schief von oben und hinten nach unten und vorn gerichtet sind. Bei den Hufen wird die Hornsubstanz nicht von einer Furche, sondern von einem bestimmten Theile der Oberfläche des Fingergliedes abgeschieden. Ueber den Bau der Hufe und Klauen siehe Heusinger *Syst. d. Histologie. I.* Gurlt in Muell. *Arch.* 1836. 263. Die Nägel entstehen nach J. Fr. Meckel erst im 5. Monate des Fötuslebens.

c. Haare.

Die Bildungsstätte der Haare ist der Haarbalg, ein längliches Säckchen, auf dessen Boden das Haar, durch den noch weichen Theil, die Haarzwiebel, befestigt ist. Mehrere Beobachter, wie Heusinger (*Syst. d. Histolog. Eisenach.* 2. 1823.), Eble (*die Lehre von den Haaren. Wien* 1831.) und Gurlt (a. a. O.) beschreiben 2 Substanzen der Haare, eine feste gleichartige Rindensubstanz, und eine innere, mehr zellige Substanz. Heusinger stützte sich hierbei vorzüglich auf den zelligen Bau der Marksubstanz der Rehhaare. In den von den Haaren verschiedenen Stacheln der Igel und Stachelschweine bemerkt man ganz deutlich beide Substanzen. Die innere, lockere ist auf dem Querdurchschnitte strahlig. Die Borstenhaare des Schweins bestehen nach Eble und Gurlt aus einer zelligen Marksubstanz und aus einer Rinde, die aus mehreren Fasern besteht, welche sich leicht zersplittern. Nach E. H. Weber's Untersuchungen der Menschenhaare bestehen diese aus einer ganz gleichartigen Substanz, ohne Unterschied von Mark und Rinde. Nach Weber sind die Menschenhaare meist platt, auf dem Durchschnitte nach einer Seite oft etwas ausgehöhlt, nierenförmig; so finde ich wenigstens auch die Form meiner Kopfhaare. Die Haare der Fledermäuse sind knotig, die der grauen Thiere, wie Mäuse, schwarz und weiss gefleckt. In Hinsicht der vielen Mannigfaltigkeiten in dem Baue der Haare, verweise ich auf Heusinger's, Eble's und Gurlt's vorzügliche Schriften und deren Kupfer. Am meisten kennt man den Ursprung der Tasthaare. Der Haarschaft fängt auf dem Boden des Haarbalges mit einer Anschwellung an, die Wurzel oder Zwiebel des Haares; sie ist weicher als das Haar, und zeichnet sich durch die stets gleichbleibende weisse Farbe vor den übrigen Theilen des Haares aus; sie ist hohl, und enthält in sich den eigentlichen Haarkeim, Pulpa pili, eine wahrscheinlich gefässreiche Verlängerung des Bodens des Haarbalges. Ausserdem wird das Tasthaar in dem Haarbalge noch von einer röthlichen weichen gallertartigen Scheide umgeben, welche mit der innern Wand des Haar-

Digitized by Google

balges organisch zusammenhängt. Eble hat bei der Katze durch feine Injection erwiesen, dass die Scheide des Tasthaars in dem Haarbalge gefässreich ist, und die Injectionsmasse färbte selbst den Haarkeim roth, ohne dass sich deutliche Gefässe nachweisen liessen. A. a. O. fig. 121. 122. Vergl. Gurlt a. a. O. Im Haarbalg des Menschen ist es Eble nicht gelungen, die weiche Scheide nachzuweisen. Die Haarzwiebel besteht hier aus dem weichern Theile des Haars und dem darin eintretenden Keime. Die Zwiebel ist keulenförmig und dicker als die Fortsetzung des Haars. Die pulpöse Substanz oder der Haarkeim verliert sich nach oben in die Marksubstanz des Haars. Fasst man Alles zusammen, so scheint sich die Haarsubstanz durch Absonderung von Hornmasse auf der Oberfläche des conischen organisirten Haarkeims zu bilden. Das Wachsthum der Haare geschieht übrigens durch immer weitere Apposition von Bildungstheilchen am Insertionspunkte des Haares. An keiner andern Stelle wächst das Haar; die äussersten Theile des Haares sind daher die zuerst gebildeten. Uebrigens hat auch der Keim des Haares seine Entwicklungszustände, und von diesen hängt natürlich die verschiedene Form des Haares an verschiedenen Theilen seiner Länge, und die bei Thieren oft vorkommende Farbenverschiedenheit an verschiedenen Theilen seiner Länge ab. So ist auch der Anfang der Stacheln spitz, der mittlere Theil ist der breiteste, und das Insertionsende ist wieder dünner. Da diese Theile successiv hintereinander gebildet werden, so kann die verschiedene Dicke der ebengebildeten Theilchen nur von verschiedenen Entwicklungszuständen der Matrix abhängen. Dass etwas Aehnliches bei den Haaren stattfindet, zeigt das nicht seltene Vorkommen von Haaren, deren Insertionsende dünner ist. Diese Entwicklungszustände des Keims sind am deutlichsten und merkwürdigsten bei der Entstehung der Federn.

Eble bestreitet die Behauptung von Lauth, dass die Epidermis sich im Haarbalge bis zur Insertion des Haares fortsetze, was dieser sehr bestimmt an den Tasthaaren des Fuchses und der Fischotter gesehen haben will. Nach Lauth geht die Epidermis im Innern des Haarbalges continuo in die Basis des Haares über, so dass das Haar statt Epidermis durch die starke Absonderung des conischen Haarkeims entstehe, auf welchem die Basis des Haares aufsitze. Siehe Lauth, *Mémoire sur divers points d'anatomie fig.* 9.

Die Talgdrüsen der Haut münden in der Regel in die Haarbälge; sie liegen in der obersten Schichte der Cutis und sind traubenförmig, wie Gurlt (Muell. *Arch.* 1835. 399.) gezeigt hat. Sie bestehen aus kleinen Bläschen, deren Ausführungsgänge zu einem oder mehreren Gängen vereinigt in den Haarbalg ausmünden. An Stellen, wo keine Haare sind, mündet ein gemeinschaftlicher Ausführungsgang unmittelbar nach aussen. Die Haare des Weichselzopfes sind nicht von anderen Haaren verschieden, als dass sie sich unter einander verwirren. Bei den im Zellgewebe unter der Haut in eigenen Säcken eingeschlossenen Haaren, stellt der einschliessende Sack ein Analogon der Cutis dar; die Haare

Digitized by Google

stecken in Haarbälgen, in welche nach Gurlt viele Talgdrüsen münden, und die im Sacke mit den Haaren enthaltene Masse scheint Hauttalg zu seyn.

Die Haare werden durch Reiben elektrisch; wenn ich mit der Collectorplatte eines gewöhnlichen Condensators nur ganz leise einmal über meine Kopfhaare streiche, so bewirkt die dem Bohnenberg. Elektrometer genäherte Platte schon eine starke Abweichung des Goldblättchens. So verhalten sich aber die Haare im todten wie im lebenden Zustande. In Hinsicht der chemischen Zusammensetzung der Haare folge ich Berzelius Thierchemie. Die Haare bestehen aus Hornstoff, ihre verschiedene Farbe rührt nach Vauquelin von einem gefärbten Fett her; beim schwarzen Haare zugleich von Eisen, Schwefeleisen? Nach Ausziehen des Fettes, vermittelst Alkohol oder Aether, wird das Haar graugelb, so dass im Alter die graue Farbe der Haare von einem solchen Fehler in der Absonderung der Bildungstheile des Haares herrührt; dass das gefärbte Fett fehlt. Alkohol zieht auch Osmazom mit den begleitenden Salzen, Chlornatrium, Chlorkalium und etwas Chlorammonium aus, welche nach Berzelius bloss von der den Haaren anklebenden Ausdünstungsmaterie herrühren. Der Hornstoff des Haares verhält sich wie der Hornstoff des Horns. Der Hornstoff wird weder von Wasser, noch von Alkohol, noch von Aether aufgelöst. Concentrirte Schwefelsäure löst ihn nicht auf. Das von kalter Salpetersäure aufgeweichte Horn löst sich hernach beim Kochen mit Wasser zu einer Flüssigkeit, die nach dem Abdampfen beim Erkalten gelatinirt. Diese Gallerte wird indess von kaltem Wasser wieder aufgelöst, die Auflösung durch Gerbestoff gefällt. Kaustische fixe Alkalien lösen den Hornstoff leicht, kaust. Ammonium gar nicht auf, wodurch sich der Hornstoff sehr von coagulirtem Faserstoff und Eiweiss unterscheidet. Von letzterem unterscheidet er sich auch durch seine Unauflöslichkeit in Essigsäure, und dass sich der Hornstoff mit Kali zu einem seifenartigen Körper, Hornkali, vereinigt. Vergl. pag. 131. Im papinschen Digestor gekocht, lösen sich die Haare nach Vauquelin in Wasser auf. Die Auflösung enthält Schwefelwasserstoff. Chlor entfärbt die Haare, und vereinigt sich hernach damit zu einer klebrigen bittern Materie. Epidermis und Haare vereinigen sich mit Metalloxyden; sie werden schwarz von salpetersaurem Silberoxyd, wobei der Schwefel des Haares mit dem Silber sich zu Schwefelsilber verbindet. Berzelius *Thierch.* 299. Beim Erhitzen schmilzt das Haar, und verbrennt leuchtend mit Horngeruch; bei der trocknen Destillation entwickelt es Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Die Asche des Haares macht nach Vauquelin $1\frac{1}{2}$ proc. vom Gewichte des Haars. Sie enthält Eisenoxyd, eine Spur von Manganoxyd, schwefelsauren, phosphorsauren, kohlensauren Kalk und eine Spur von Kieselerde; die schwarzen Haare enthalten am meisten, die hellen am wenigsten Eisen; letztere dagegen phosphorsaure Talkerde. Die Haare bestehen sonst aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Aber das Verhältniss ihrer Vereinigung kennt man noch nicht.

d. Stacheln. Ueber den Bau und das Wachsthum der Sta-

Digitized by Google

cheln siehe dieses Handb. 1. Aufl. p. 368. (Boeckh *de spinis histricum. Berol.* 1834. und Mueller's *Archiv* 1835. *p.* 236.

e. Hörner. Mit den Hörnern muss man nicht die Geweihe verwechseln. Letztere sind zu einer gewissen Zeit organisirt, die Hörner nie; die Matrix der Hörner ist die Oberfläche knöcherner Fortsätze; die Stirnhörner der wiederkäuenden Thiere bilden sich durch schichtförmige Absonderung der Hornsubstanz auf der Oberfläche der knöchernen Matrix des Horns oder des Stirnbeinfortsatzes, welcher die Form des Horns bestimmt; diese Schichten verhalten sich also so, dass eine gleichsam in der andern steckt, und dass die jüngeren zugleich die unteren und inneren sind, und immer eine grössere Basis erlangen. Das Horn des Nashornes hat keine innere Matrix wie die Stirnhörner der Wiederkäuer, sondern geht von der Nasenhaut aus. Diese Hörner sind also solid, und haben das Eigenthümliche, dass sie aus lauter Fasern, gleichsam aus verklebten Haaren, bestehen.

f. Federn. Die Federn bestehen 1) aus dem hohlen Kiel, der in seiner Höhle ein vertrocknetes, früher organisirtes Gewebe, die Federseele, einschliesst; 2) aus dem Schafte, der Fortsetzung des Kiels; 3) aus der Fahne mit ihren Strahlen, die wieder feine Nebenstrahlen ausschicken. Die Dunen besitzen nach Nitsch's Beobachtung knotige Nebenstrahlen. Die Entstehung der Federn haben Alb. Meckel (Reil's *Arch.* 12. 37.), Dutrochet (*J. de physiol.* 88. 333.) und Fr. Cuvier (Froriep's *Not.* 317.) beobachtet.

Die Feder steckt in dem Federbalge, der nach Meckel von der Oberhaut bekleidet ist. Auf dem Boden des Balges ist die Feder mit ihrem untern Ende oder dem Nabel der Feder befestigt; wird sie ausgerissen, so blutet die hier blossgelegte Haut des Balges. Wenn die Feder entsteht, erhebt sich nach A. Meckel aus dem Boden des Balges ein conischer Körper, der auf der Oberfläche hornig wird, und sich zu einem Cylinder entwickelt. Das Innere dieser hornigen Scheide ist mit gallertartiger organisirter Masse, dem Federkeim, angefüllt, während die hornige Scheide des Keims zur Bildung der Feder zunächst nichts beiträgt. Mit dieser Scheide wächst der Federkeim aus dem Balge hervor, die Scheide wächst anfangs mit der jungen Feder gleich fort, erhält bald oben eine Oeffnung, aus welcher der Anfang der Federfahne oder vielmehr das zuerst gebildete Ende der Federfahne mit dem Ende des Schaftes hervortritt. Wenn die Feder successiv bis zu dem zuletzt entwickelten Kiele gebildet ist, verklebt die Scheide mit dem Horne des Kiels, von welchem man die Scheide an ausgewachsenen Federn in Form von Fetzen abziehen kann. Ueber die Entstehung der Federfahne und des Schaftes scheinen die Untersuchungen von Fr. Cuvier das meiste Licht zu verbreiten. Schneidet man die Scheide, worin der Pulpus der Feder liegt, auf, so trifft man nach Fr. Cuvier auf eine äussere gestreifte Haut des Pulpus, unter dieser trifft man die Bärtchen der Fahne so gelagert, dass sie den Stamm des Pulpus schief aufsteigend umfassen, während sie nach 2 Richtungen von dem Stamme des Federkeims ausgehen. Unter den Federbärt-

Digitized by Google

chen liegt die innere gestreifte Haut, welche zunächst den Stamm des Pulpus umgiebt. Zwischen der äussern und innern gestreiften Haut liegen häutige Scheidewändchen zwischen den Bärtchen der Federfahne. Die Bärtchen der Federfahne bestehen anfangs aus einer breiigen Substanz, welche von der Stelle des Stammes, von welcher hernach die Bärtchen der Federfahne ausgehen, gebildet zu werden scheint. Man weiss nicht, ob zuerst die Enden der Bärtchen entstehen, und durch immer weitere Apposition von Bildungstheilchen wachsen. Es bildet sich das Ende der Federfahne mit dem Ende des Schaftes zuerst, und mit dem Wachsthume werden die unteren Theile der Federfahne und des Schaftes nacherzeugt. Wenn die Federfahne aus der Scheide der Feder in die Luft hervortritt, zerstieben die innere und äussere Membran, welche zwischen den Scheidewändchen früher die Bärtchen der Federfahne eingeschlossen haben. Da der Schaft und die Fahne der Feder sich zuerst entwickeln, so zeigt sich auch derjenige Theil des Pulpus, aus welchem jene entstehen, zuerst; allein sobald der am meisten vorgeschobene Theil des Pulpus seine Bestimmung erfüllt hat, verliert er seine Organisation; sobald er das Mark des Federschaftes erzeugt hat, verliert er seine Gefässe, und trocknet aus. Hierauf verändert der weiter sich entwickelnde untere Theil des Pulpus seine Bestimmung. Er sondert auf seiner Oberfläche die Hornsubstanz des Kiels ab, mit dem sich zugleich die früher erwähnte hornige Scheide der Feder verbindet. Wenn der Pulpus in dem Kiele zu vertrocknen anfängt, zeigt er Abtheilungen in Zellen durch trichterförmige Septa, wovon ein Trichterchen in dem andern steckt; früher sind die Zwischenräume dieser Trichter mit Mark ausgefüllt, später schwindet dieses, die Scheidewändchen und das häutige Wesen des Pulpus trocknen aus, und der Rest davon bildet hernach die sogenannte Federseele. Diess hat schon A. Meckel sehr gut beobachtet.

2) *Vom Zahngewebe.* Die Bewaffnung der Kinnladen geschieht theils durch Hornlamellen, wie am Schnabel der Vögel, der Schildkröten, an den Barten der Wallfische, an den Hornzähnen des Schnabelthiers; theils durch Knochenzähne. Beide Arten der Organe sind gefässlos und werden durch eine organisirte Matrix erzeugt. Aber der Knochenzahn oder eigentliche Zahn ist kein Horn mit abgesetzten Kalksalzen, sondern enthält als thierische Materie leimgebenden Knorpel, der Hornzahn wahres Horn. Ich erhielt nach der Extraction der Kalkerde aus den Zähnen des Pferdes wahren, sehr gut gelatinirenden Leim durch nicht sehr langes Kochen; Fischbein hingegen lieferte keinen Leim und ist Horn, wie schon John angiebt. Der Leim der Zähne ist nicht Chondrin, sondern wie in den ossificirten Knorpeln gemeiner Leim. Das Horn ersetzt den Zahnknorpel nur dann, wenn die Zähne keine abgesetzte Kalkerde enthalten, Knorpel oder Leim sind aber durchaus nöthig, wenn die Zähne Knochenzähne sind. In Hinsicht des Baues der Zähne im Allgemeinen verweise ich auf Cuvier's *vergl. Anatomie*, auf sein Werk *recherches sur les oss. foss.* Heusinger's *Histologie.* Rousseau

Digitized by Google

anat. comp. du syst. dent. Paris 1827. Der feinere Bau der Zähne ist von Leeuwenhoek, Purkinje, Retzius und mir untersucht. Die Zähne des Menschen bestehen aus drei Substanzen: 1. Der röhrigen Zahnsubstanz, welche die Hauptmasse bildet. 2. Dem Schmelz der Krone. 3. Der Rindensubstanz der Wurzel. Die röhrige Zahnsubstanz ist von vielen röhrigen Fasern durchzogen, welche von der Zahnhöhle ausgehen und ihre Richtung gegen die äussere Oberfläche des Zahns nehmen. Sie sind hygroskopisch und nehmen zum Theil beim Pferd ziemlich leicht Dinte von der Zahnhöhle auf. Diese Fasern sind undurchsichtiger als die feste Zwischensubstanz, die zwischen 2 Rohren ohngefähr das sechsfache des Durchmessers einer Faser oder Röhre beträgt. Bei reflectirtem Licht erscheinen die Fasern weiss, von Säuren verlieren sie ihre weisse Farbe, daher ihre Wände unorganische Deposita zu enthalten scheinen, welche man auch hier und da mit dem Mikroskop wahrzunehmen glaubt. Die Röhren lassen sich durch Zerreissen des von der Kalkerde befreiten Knorpels isoliren. Die Kalksalze sind grösstentheils in der Zwischenmasse gebunden. Durch Kochen geschliffener Zahnplättchen in Potasche konnte ich sie sichtbar machen, dadurch wird nämlich der Knorpel extrahirt. Der Schmelz der Zähne besteht aus aufrecht stehenden Fasern. Wenn der Schmelz noch weich ist, konnte ich ihre primitive Bildung wahrnehmen. So liess sich der Schmelz an dem letzten Backzahn des Kalbes weich und breiartig abschaben; diese Materie bestand ganz aus schon formirten Nadeln, die an beiden Enden zugespitzt waren. Die Rindensubstanz der Wurzel, welche von Purkinje und Retzius beobachtet wurde, hat ganz den Bau der Knochen und enthält Knochenkörperchen mit radialen Kanälchen. Sie kömmt an der äussern und innern dem Zahnkanal zugewandten Fläche der Wurzel vor und entsteht wohl durch Ossification anliegender organisirter Theile. Der Kitt an den Zähnen der Wiederkäuer hat dieselbe Structur. Siehe Purkinje in Fraenkel *de dentium hum. structura. Vratisl.* 1835. und J. Mueller in Poggend. *Ann. XXXVIII.* Die Matrix des Zahnes ist das Zahnsäckchen. Diese liegen in der Alveolarfurche der Kiefer des Fötus, von dem Zahnfleische bedeckt. Sie entstehen zum Theile schon im 3. Monat des Embryo. Die Säckchen der Zähne, welche die Milchzähne später ersetzen, entstehen zum Theil vor, zum Theil nach der Geburt. Das Zahnsäckchen wird durch 2 gefässreiche Häute gebildet. Die innere Haut ahmt die Form der Krone des Zahns nach, obgleich das Bildungsorgan der Krone der Zahnkeim ist. Vom Boden des Zahnsäckchens erhebt sich der weiche Zahnkeim, Pulpus dentis, in welchen von unten Gefässe und Nerven treten, und dessen Oberfläche die Form der spätern Krone annimmt. Er ist nach Purkinje und Raschkow (*meletemata circa mammalium dentium evolutionem. Vratisl.* 1835.) von einem Häutchen bedeckt. Zwischen diesem Häutchen und der Substanz des Zahnkeims bildet sich die rohrige Zahnsubstanz. Der Schmelz dagegen wird auf die äussere Oberfläche des Häutchens aufgesetzt. Die Bildung des Schmelzes geschieht von der an die innere Fläche des Zahn-

Digitized by Google

balges angewachsenen Schmelzmembran, welche aus senkrechten Fasern besteht. Der Kitt an den Zähnen der Wiederkäuer und des Elephanten, welcher die Vertiefungen zwischen den Falten der Krone ausfüllt, entsteht wahrscheinlich durch Ossification des Zahnbalges. In der Mitte des Embryolebens beginnt die schichtweise Absonderung von Zahnsubstanz auf der Oberfläche der weichen Krone des Zahnkeims, in Form von Scherbchen, an den Spitzen der Krone. Diese Scherbchen der verschiedenen Kronenspitzen hängen anfangs noch nicht zusammen, allmählig vereinigen sie sich und die weiche Krone wird nun von einer Schaale von Zahnsubstanz oben und an den Seiten umgeben. Diese Schale, welche die äusserste Schicht der Knochensubstanz der Zahnkrone wird, und denselben Umfang hat wie die Krone späterhin, hängt nicht organisch mit ihrer Matrix zusammen, sie entsteht durch blosse Absetzung von den mineralischen Bestandtheilen der Zähne, vermischt mit thierischer Substanz; man kann die Schalen von ihrer Matrix aufheben. Die einmal gebildete Schale wächst nur nach innen durch Apposition von neuen Schichten, während in gleichem Maasse der Zahnkeim verkleinert wird, je mehr er Zahnsubstanz an die Wände der Zahnhöhle von innen absetzt. Zur Zeit des Ausbruchs der Zähne, vergrössert sich der Zahn nach unten hin mehr, womit natürlich eine entsprechende Vergrösserung des Keims von unten gleichläuft. Der untere Theil des Keims nimmt die Form der spätern Wurzeln der Zähne an, sondert von oben nach unten fortschreitend immer mehr Zahnsubstanz auf der Oberfläche ab, so dass die Wurzeln der Zahnsubstanz die Wurzeln des Keims wie hohle Scheiden umgeben, die anfangs ganz kurz sind, allmählig sich aber mit den Keimwurzeln unten durch Apposition verlängern. Der Anwuchs der Wurzeln ist zugleich die Ursache des Durchbruchs der Zähne durch das Zahnfleisch. Anfangs sind die Wurzeln der Zahnsubstanz nur dünne Scheiden mit weitem Eingange, allmählig wird durch Ansatz der Materie die Zahnsubstanz auch hier dicker, während der Keim dünner wird, und nach unten wird die Wurzel des Zahns zuletzt zur Spitze, gerade so wie bei den Stacheln, deren Wurzel sich nacherzeugt, und ebenfalls dünner ist als der mittlere Theil des Stachels. Zuletzt bleiben an den Wurzeln der Zähne nur Oeffnungen und Kanäle übrig, wodurch die Gefässe und Nerven zu dem Reste des Zahnkeims in der Krone eindringen. Blake Reil's *Arch.* 4. 314. Vergl. Meck. *Handb. d. menschl. Anat.* 4. 212.

Die sich an der Krone abreibenden Zähne der Wiederkäuer und Pferde, die Nagezähne der Nager, können von unten noch lange auch im spätern Leben nachwachsen. Wenn die Krone der Zähne der Wiederkäuer noch nicht angegriffen ist, haben sie noch keine Wurzeln, und wenn diese sich gebildet haben, ist die Krone abgenutzt. Cuvier *vergl. Anat.* 3. 117. Die Stosszähne des Elephanten und die Schneidezähne der Nager bleiben an der Wurzel immer hohl, und wachsen durch immer weitere Apposition von Zahnsubstanz an die inneren Wände der Höhle durch den conischen Zahnkeim fort. Beim Füttern von Thieren mit

Digitized by Google

Färberröthe fand Hunter (*Geschichte der Zähne* 1778.), dass die schon gebildete Zahnsubstanz nicht von Färberröthe durchdrungen wurde, wohl aber die innerste Schicht des Zahnes, welche eben gebildet wurde.

Gegen das Wachsthum der Zähne durch blosse Apposition scheint auf den ersten Blick der Umstand zu sprechen, dass man in den Stosszähnen von Elephanten öfter bleierne Kugeln gefunden hat, die von allen Seiten von Knochensubstanz umgeben waren. Dieser Einwurf widerlegt sich indess durch die Supposition, dass diese Kugeln in denjenigen Theil des Zahnes eingedrungen waren, der eben in der Bildung begriffen war.

Wenn die Zähne schmerzen, so ist bloss der Zahnkeim empfindlich, ebenso bei dem Empfindlichwerden der Zähne von Säuren, wobei wahrscheinlich die Säure in die Zahnröhren vermöge der Risse oder Poren des Schmelzes eindringt, und den Zahnkeim selbst afficirt. Die sogenannte Caries der Zähne ist von der Caries der organisirten Knochen wohl zu unterscheiden. Diess ist eine blosse chemische Zersetzung der Zähne bei fehlerhafter Zusammensetzung, eine allmählige Zersetzung durch die Mundflüssigkeiten. Die weissen Zahnröhren unter einer cariösen Stelle der Oberfläche des Zahns verlieren meist bis zu einiger Tiefe ihr weisses Ansehen.

Der sogenannte Weinstein an den Zähnen des Menschen und des Pferdes besteht bloss aus angesetzten Speichelsalzen.

Ueber das Wachsthum der verschiedenen Thierzähne findet man herrliche Beobachtungen von Cuvier und Meckel in Cuvier's *vergl. Anat. übers.* von Meckel, 3. Nach Rosa sind die Keime der durchbohrten Giftzähne der Schlangen Platten, die sich umlegen, um zuletzt zu einem Kanale sich zu verbinden. Siehe Cuvier *vergl. Anat.* 3. 127. Auch nach Knox ist das Mark oder der Keim der Zähne ein umgerollter Körper, welcher aussen und innen gegen den Giftkanal Zahnsubstanz abzusondern scheint. Doch sah er keine offene Furche, sondern einen durchsetzenden festen Streifen an der konvexen Seite des Zahns. Auch der Giftkanal enthielt anfangs eine Art Mark. Froriep's *Not.* 406. Jeder Zahnkeim entsteht in einer besondern Capsel, die gleichsam seine Eihaut ist, und diese Capseln sind wieder von einer gemeinsamen Haut vereinigt.

So wahrscheinlich es ist dass die Zähne der meisten Thiere durch Apposition wachsen, so giebt es doch offenbare Ausnahmen davon bei einigen Knorpelfischen. Ich finde z. B. dass die dicken Zahnplatten der Myliobates und Rhinoptera unter den Rochen, ehe sie ossificiren, schon ihre ganze Grösse erreichen, während sie doch dann bloss aus häutigen Theilen bestehen. Sie enthalten im weichen Zustande viele weite Röhren, die später indem ihre Wände ossificiren, erstarren, mehr und mehr sich verdicken, während die Kanäle enger werden. Man sieht diesen Bau an den hintersten immer sich nachbildenden Zahnplatten.

Was die chemische Zusammensetzung der Zähne betrifft, so unterscheidet sich der Schmelz von der Knochensubstanz des

Digitized by Google

Zahnes dadurch, dass Letztere viel mehr thierische Substanz (Knorpel) enthält.

Die Verschiedenheit zwischen beiden Substanzen ergiebt sich aus Berzelius Analyse derselben vom Menschen.

	Schmelz.	Zahnknochen.
Thierische Substanz	—	28,0
Phosphorsaurer Kalk mit Fluorcalcium	88,5	64,3
Kohlensaurer Kalk	8,0	5,3
Phosphorsaure Talkerde	1,5	1,0
Natron mit etwas Kochsalz	—	1,4
Alkali, Wasser, thier. Substanz. . .	2,0	—
	100,0	100,0

Der Kitt an den Zähnen des Rindes besteht nach Lassaigne aus 42,18 thierischer Materie, 53,84 phosphors. Kalk, 3,98 kohlens. Kalk.

Die Hornzähne des Schnabelthiers stehen mit einer breiten Fläche auf dem Zahnfleische, und bestehen aus hohlen Hornfasern. Heusinger a. a. O. 197. Die Zähne des Orycteropus bestehen auch aus senkrecht stehenden conglutinirten Röhrchen, zu denen nach Cuvier Blutgefässe gehen. Diese Zähne sind nicht hornartig; aber die Zähne des Schnabelthiers enthalten nach Lassaigne 99,5 hornartige Masse, und 0,3 Knochenerde.

Diese Zähne bilden offenbar den Uebergang zu den Barten der Wallfische, welche hier die Zähne ersetzen. Hierüber haben Heusinger und Rosenthal (*Abhandlungen der Akademie zu Berlin* 1829.) Untersuchungen angestellt. Nach Rosenthal bestehen die Barten aus vielen grösseren und kleineren, etwas gekrümmten Hornplatten, welche mit ihren schwach konkaven Flächen nach vorn, mit ihren konvexen nach hinten, mit ihren scharfen Rändern nach aussen und innen gerichtet sind; sie stehen also quer parallel, und sind $\frac{1}{2}$ Zoll von einander entfernt. An ihrer Basis, mit der sie auf dem Oberkiefer aufsitzen, werden sie durch ein 2 Zoll breites Hornband, welches alle Blätter wie ein Kranz umfasst, vereinigt. Jede einzelne Platte besteht aus einer äussern und innern Substanz; die Marksubstanz bildet parallele Röhren, die am untern Rande der Platte in borstenartige Fasern übergehen. Im untersten Theile jeder Platte weichen die Lamellen der Rinde von einander, und hier entsteht eine Höhle, in welche die Keimhaut der Barten hineinreicht. Jede Barte ruht auf einer über 1 Zoll dicken gefässreichen Haut. Diese bildet unten jeder Platte einen hervorragenden Fortsatz, welcher in den hohlen Raum an der Basis der Platten dringt, und in fadenartige Verlängerungen übergeht, mit denen sie in die Röhrensubstanz bis zu den Borsten der Barten dringt. Die Gefässe der Keimhaut der Barten dringen bis in die Röhren der Barten nach Rosenthal ein. Zwischen den Fortsätzen der Keimhaut, die in die untere Höhle einer Barte eindringen, liegt eine weisse hornige Masse, welche sich in die Rindensubstanz der Barten fortsetzt. Siehe die schönen Abbildungen Rosenthal's a. a. O. *tab.* 1—3.

3. *Vom Gewebe der Crystalllinse.* Die Linse des Auges, be-

Digitized by Google

steht aus concentrischen Blättern, die übereinander liegen. Man hat bemerkt, dass diese Blätter oder Capseln wieder aus Fasern bestehen, die die Dicke der Blätter bestimmen. Die Fasern in den Schichten der Crystalllinse sind folgendermaassen angeordnet: Man denke sich vom Mittelpunkte der vorderen Fläche oder vom Pole der Linse 3 Linien so gegen den Rand der Linse gezogen, dass sie die Fläche in 3 Felder theilen. Die Fasern gehen nun parallel vom Rande der Linse durch die Schichten, schief gegen diese 3 Linien, wodurch 3 gefaserte Felder jeder Schicht entstehen. Die 3 Linien bilden eine ungefaserte Figur, welche die Fasern der 3 Felder aufnehmen. Ich bemerke hier, dass die Linse der Schweine regelmässig in solche 3 Felder getheilt ist, wie man schon äusserlich an den meisten Schweinsaugen sieht. Brewster hat gezeigt, dass die Fasern der Linse durch ihre zakkigen Ränder an den Seiten ineinander greifen. Die zahnartigen Zacken sind bei den Fischen am deutlichsten.

Die Matrix der Crystalllinse ist die Linsenkapsel, welche von ihrer innern Fläche die Schichten der Crystalllinse abzusondern scheint. Diese Art der Bildung ist indess nicht gewiss, und man weiss nicht genau, ob die Linse nicht in einem engen organischen Zusammenhange mit ihrer Capsel steht. Nach Werneck (*Zeitschr. f. Ophthalmol.* 4. *p.* 28.) soll die innere Fläche der Linsenkapsel mit der Linse durch ein Gewebe von sehr kurzen Zellen zusammenhängen, die beim vorsichtigen Abreissen unter Wasser an der Linsenkapsel sitzen bleiben. Die Blutgefässe der Linsenkapsel sind schon pag. 215 beschrieben worden. Sie erhält beim Fötus und Erwachsenen Blut von dem durch den Glaskörper gehenden Ramus capsularis arteriae centralis retinae, beim Fötus stehen diese Gefässe aber auch durch die gefässreiche, von mir gefundene Membrana capsulo-pupillaris mit den Gefässen der Pupillar-Membran und Iris in Verbindung, so wie die Gefässe der Linsenkapsel wieder mit den Gefässen der Zonula Zinni in Zusammenhange stehen, was Henle gezeigt. Henle *de membrana pupillari. Bonnae* 1832. Henle hat auch beim Fötus der Säugethiere an Injektionen beobachtet, dass die Gefässe des Corpus ciliare wieder mit den Gefässen der Zonula zusammenhängen.

Die chemische Zusammensetzung der Linse ist von Berzelius untersucht. Die Materie der Crystalllinse ist grösstentheils in Wasser löslich. Diese Materie coagulirt von Hitze, und anderen Einflüssen, wie Eiweiss und Farbestoff des Blutes. Die nach dem Coaguliren übrig bleibende Flüssigkeit ist schwach sauer, und enthält Osmazom mit den dasselbe begleitenden Salzen.

Eiweissartige Materie	35,9
Alkoholextrakt mit Salzen	2,4
Wasserextrakt mit Spuren von Salzen . .	1,3
In Wasser unlösliches thierisches Wesen	2,4
Wasser	58,0

Die Asche der Crystalllinse soll etwas eisenhaltig seyn. Die Menge Alkali und Kochsalz mit etwas phosphorsaurem Kalke beträgt 0,005 vom Gewichte der frischen Crystalllinse. Eine un-

Digitized by Google

durchsichtig gewordene Linse fand John (Meck. *Arch.* 3. 361.) alkalisch reagirend.

Leichte Verwundungen der Linsenkapsel haben nach Dietrich (*über die Verwundungen des Linsensystems. Tüb.* 1824.) keine Folge. Bei stärkeren Verwundungen mit Zerrung und Einschneidung der Linse ging das Undurchsichtigwerden der Linse bis in den Kern vor, und verbreitete sich von da bis zur Peripherie der Linse. Aus der Cataracta lenticularis, wo häufig zuerst der dichtere Kern der Linse undurchsichtig wird, kann man nicht schliessen, dass die Linsensubstanz selbst Gefässe enthalte. Denn von der Beschaffenheit der Absonderung auf der innern Fläche der Linsenkapsel kann es abhängen, dass die innersten Schichten der Linse, die ohnehin dichter sind, und vielleicht in chemischer Hinsicht von den oberflächlichen sich unterscheiden, sich selbst noch lange nach ihrer Erzeugung chemisch verändern.

Wahrscheinlich hängt die Entstehung der grauen Staare von der Beschaffenheit der Capsel ab. Obgleich die Entzündung der Capsel gewiss nicht allein die Ursache der grauen Staare ist, so ist sie es doch nach v. Walther oft; was besonders durch ein Präparat von Schröder v. d. Kolk wahrscheinlich wird, an welchem die Linsenkapsel einer kataraktösen Linse sehr schön injicirt ist, was sonst bekanntlich bei Erwachsenen sehr schwer gelingt.

So viel von dem Wachsthume der gefässlosen Gewebe.

Ueber die Gesetze, welche bei dem Wachsthume der organischen Körper statt finden, hat G. R. Treviranus mit seinem gewohnten philosophischen Scharfsinn (*Biologie* 3. 463—544.) sehr lehrreiche Betrachtungen angestellt.

Das Wachsthum der organischen Körper hat eine bestimmte Grenze; bei den meisten höheren Thieren wird diese lange vor dem Ende des Lebens, beim Menschen z. B. mit der Mannbarkeit erreicht, während die Formveränderungen des Ganzen und der Theile fortdauern. Bei manchen Pflanzen und bei den Fischen und mehreren Amphibien fällt die Grenze des Wachsthums fast mit der Grenze des Lebens überhaupt zusammen. Aber nicht alle Theile wachsen gleichförmig, manche verschwinden, während andere entstehen oder sich ausbilden, kurz das Wachsthum ist mit beständigen Veränderungen der Form verbunden. Bei den meisten Thieren fallen die merkwürdigsten Phänomene der Metamorphose in die Periode des Embryolebens, wie bei den Menschen, den Säugethieren, den Vögeln, den Fischen, während die nackten Amphibien und die Insekten und mehrere niederen Crustaceen auch nach der Entwicklung des Eies gleichsam den Embryonenzustand verlängern, indem sie ihre Form verändern, neue Organe erzeugen, und andere ablegen. Bei den Säugethieren und dem Menschen sind diese Umwandlungen wohl am seltensten. Es gehören hieher das anfängliche Wachsthum der Thymus in der Kindheit und ihr späteres Schwinden bis zum 12. Jahre, die Entwicklungsperioden des Zahnwechsels, der Pubertät, mit den Formveränderungen des Kehlkopfes, der Entwicklung der Haarkeime des Bartes und der Schaamhaare, der Brüste. Aber

Digitized by Google

bei den nackten Amphibien erzeugen sich die Nieren selbst erst im Anfange des Larvenlebens, während die Wolffschen Körper (pag. 161.) decrepid werden. Das Verschwinden der äusseren Kiemen bei den Froschlarven, die Entwicklung der inneren Kiemen für die längere Zeit des Larvenlebens, die Entwicklung der Extremitäten am Ende des Larvenlebens, die Ablegung des Schwanzes, und der endliche Verlust der Kiemen sind schon erwähnt worden. Erst gegen das Ende des Larvenlebens entstehen ihre Genitalien. So habe ich bei Froschlarven die erste Spur der Hoden und Eierstöcke erst bemerken können, wenn sie sich schon zum Theil verwandelt haben, nämlich schon 4 Beine haben, aber noch den Schwanz und die Kiemen besitzen. Bei den Salamanderlarven, welche in der längsten Zeit des Larvenlebens schon mit Extremitäten versehen sind, entstehen die Genitalien auch erst in der spätern Zeit des Larvenlebens, ehe die Kiemen eingehen *).

Der Darmkanal bei den Froschlarven für Pflanzennahrung bestimmt, war ausserordentlich gross, er erleidet während der Metamorphose die Reduction in den Darmkanal des fleischfressenden Thiers. Auch die Wirbel während des Larvenlebens durch conisch ausgehöhlte Facetten wie bei den Fischen verbunden, nehmen an der Umwandlung Antheil.

Die Metamorphose der Thiere während der Entwicklung und des Wachsthums beruht zum Theil auf Entwicklung und Reduction ähnlicher Theile. Man hatte früher bemerkt, dass der Embryo während der Entwicklung die Stufen niederer Thiere durchlaufe, und diese an sich unrichtige Idee bis ins Abenteuerliche ausgesponnen. In dieser Ansicht liegt aber die Ahnung des wahren Verhältnisses, welche den Gegnern dieser Ansicht entging. v. Baer hat das Verdienst, das Gesetz dieser Metamorphose zuerst erkannt zu haben; er zeigte, dass die Wirbelthiere, vom Menschen bis zu den Fischen, einen gewissen gemeinsamen Typus ihrer Bildung, eine gewisse Summe gleicher Theile besitzen, die man im Embryonenzustande bei allen in vollkommener Aehnlichkeit noch antrifft, welche sich aber bei verschiedenen Klassen zu verschiedenen Formen ausbilden, oder selbst reducirt werden; wie z. B. die rippenförmigen Anhänge des Zungenbeins allen Wirbelthieren im Embryonenzustande gemeinsam sind, aber bei den höheren Thieren reducirt werden, bei den Fischen und Amphibienlarven sich zu Kiemen ausbilden, pag. 298. Alle Wirbelthiere gleichen sich, und zeigen eine Reihe von Wirbelkörpern mit hinteren Bogen für die Deckung der Centraltheile des Nervensystems, und einer Anzahl rippenförmiger vorderer Anhänge zur Umschliessung der Eingeweide, welche zum Theil knorpeligen oder knöchernen Brustbeinrippen entgegen kommen, um ei-

*) In meiner Abhandlung, Beiträge zur Anatomie und Naturgeschichte der Amphibien, Tiedemann's *Zeitschrift für Physiol.* 4. 2., habe ich mich in dieser Hinsicht nicht ganz richtig ausgedrückt, wenn ich sagte, dass die Larven, so lange sie nicht die Kiemen ablegen, keine entfernte Spur der Genitalien besitzen.

Digitized by Google

nen Korb zu bilden, während die Halsrippen und Bauchrippen bei vielen Wirbelthieren fehlen, oder bei einigen (Crocodilen und Eidechsen) nur als rudimentäre Anhänge der Halswirbel erscheinen.

Bei allen Wirbelthieren verkümmert diess System nach abwärts in den Steisswirbeln, entwickelt sich aufwärts in den 3 Wirbeln des Schädels (denn mehr kann ich nicht finden, die Bezeichnung Gehörwirbel und Aehnliches scheint mir eine Uebertreibung, Entstellung jener ganz richtigen Analogie). Bei allen Embryonen fehlen anfangs die Extremitäten; sie erscheinen bei den Embryonen zuerst als Hügelchen, welche sich bei verschiedenen Klassen zu verschiedenen Formen umwandeln. Man sieht also, wie die Formen der ausgebildeten Wirbelthiere auf Umwandlungen und Reductionen eines gemeinsamen Typus beruhen. Einige Thiere entfernen sich beim Wachsthum sehr, andere wenig vom gemeinsamen Typus, wie er sich im Embryonen- und Larvenzustande ausspricht.

Wendet man sich zu der Abtheilung der Gliederthiere, in welchen das Gehirn zwar oben liegt, aber ein Schlundring den Schlund umfasst, und die Fortsetzung dieses und des Gehirns an dem Bauche liegt, so findet man leicht wieder einen nur diesen Thieren eigenthümlichen Typus in ihrem Skelet aus successiv verbundenen Leibesringen. Man findet Maxillen, Mandibeln, welche mit den Füssen nach Savigny's Untersuchungen zu einem und demselben Organsystem gehören. Das Insekt hat als Larve 13 Leibesringe, nur im Larvenzustande wächst es, indem es sich 3—4 Mal häutet, in der Metamorphose während des Puppenzustandes zu einem neuen Geschöpfe wird. Zur Aeusserung des organisirenden Princips, welches die Form verändert, ist es nöthig, dass die ähnlichen Theile eine gewisse Grösse erreicht haben; die fortdauernde Ernährung dieser Theile durch Aufnahme von Nahrungsstoffen scheint das organisirende Princip von der Einleitung der Metamorphose abzuhalten; denn die Insekten wandeln sich früher um, wenn sie hungern, so wie eine Pflanze früher Blüthen treibt in magerm Boden. Je mehr aber die ähnlichen Theile an Umfang zugenommen haben, um so grösser scheint das Streben zu werden, aus den quantitativ ausgebildeten Massen qualitative Unterschiede durch Reduction und Entwicklung ähnlicher Theile zu bilden. Bei dem letzten Häuten erscheint das eingesponnene Insekt als Puppe, deren anfangs weiche Oberhaut, wie aller Hornstoff, erhärtet. In der äussern Form vieler Puppen lassen sich schon die Rudimente der äusseren Formen des Insektes erkennen, wobei die Glieder eng an den Leib angeschmiegt sind. Die Grundzüge zur Verwandlung der ausseren Formen sind schon mit der Umwandlung der Larve in die Puppe gegeben. Die Puppe zeigt schon die Abtheilungen des Thieres in 3 Abschnitte, indem die 3 Ringe, welche in der Larve auf den ersten oder Kopfring folgen, zum Thorax umgewandelt werden, in dem man hernach Prothorax, Mesothorax, Metathorax erkennt, während die 9 letzten der 13 Ringe des Larvenkörpers in die 9 Ringe des Hinterleibs des vollkommnen Insektes sich umwandeln, und sich

Digitized by Google

verkürzen; die Rudimente der Flügel am 2. und 3. Ring des Brustkastens, die Rudimente der Füsse an den 3 Ringen des Brustkastens, die Antennen und Palpen am Kopfe sich bilden. Der Sinn für das Licht entsteht bei vielen Larven erst durch die Verwandlung, bei anderen entwickeln sich statt der einfachen Larvenaugen zusammengesetzte. Von 13 Ganglien des Nervenstranges beim Kohlschmetterling vereint sich das 3. mit dem 4., das 5. mit dem 6., das 7. und 8. verschwinden ganz. Mit diesen Umwandlungen laufen die der Eingeweide gleichen Schritt. Der Schmetterling erlangt auch statt der bisherigen Kiefer den Saugrüssel; seine Spinngefässe verschwinden. Der Darmkanal, die Athemorgane wandeln sich um. Vergl. pag. 295. Vom Beginn der Entwicklung ist der Fettkörper fast verflüssigt, er wird grösstentheils auf die Bildung der neuen Organe verwandt. Siehe das Nähere in dem classischen Werk: Herold *Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Cassel* 1815. Während bei den Amphibienlarven die Genitalien anfangs fehlen, hat Herold bei den selbst sehr jungen Larven die äusserst zarten Rudimente der Hoden und Eierstöcke entdeckt. Viele Insekten beharren auf dem Larventypus.

Unter den Crustaceen beobachtet man nicht allein, dass die höheren Crustaceen im Embryonenzustande noch ein deutlich gegliedertes Bruststück haben, und dadurch niederen Crustaceen gleichen; die jungen Crustaceen sind auch oft viel einfacher, wie z. B. die jungen Cyclops nur 2 Fühler und 2 Fusspaare haben. Einige Crustaceen erleiden sogar eine gänzliche Umgestaltung ihrer Form, wie die Lernaeen nach den Entdeckungen von Nordmann. *Micrograph. Beitr.* 2. Die Stelle dieser sonderbaren parasitischen Thiere war lange im Systeme zweifelhaft, weil sie im ausgewachsenen Zustande fast alle Spuren ihrer früheren Gliederung abgelegt haben, daher sie Einige unpassend mit den Eingeweidewürmern vereinigt hatten. Nordmann hat entdeckt, dass diese Thiere im Embryonen- und Larvenzustande als vollkommene Crustaceen erscheinen. Der Embryo des Achteres percarum hat z. B. 4 Pinselfüsse. Nachdem er das Ei verlassen, hat er 2 Antennen, 3 Paar vordere Krallenfüsse, und 2 Paar Büschelfüsse, und ist den Fischläusen ähnlich. Die Jungen von Ancorella haben in der Eihülle selbst ein rothes Auge.

Die Ringelwürmer vermehren bei dem Wachsthume ihre Ringe, die Arenicolen auch die Zahl ihrer büschelförmigen Kiemen, wie ich aus Vergleichung verschiedener Exemplare von Arenicola carbonaria sehe.

III. Capitel. Von der Wiedererzeugung.

Dadurch, dass die schaffende organisirende Kraft, welche im Keim des Embryo alle Theile des Thiers gleichsam als nothwendige Glieder seines Begriffes erzeugt, in der Ernährung fortwirkt, ist Erholung, Genesung und Wiedererzeugung eines Verlustes in einer gewissen Grenze möglich. Die Regenerationskraft

Digitized by Google

ist um so grösser, je jünger ein zusammengesetztes Thier, und je einfacher überhaupt ein Thier gebildet ist. Die Larve der nackten Amphibien, welche selbst noch erst manche Theile erzeugt, die bei anderen Thieren im Embryozustande entstehen, wie die Genitalien, ist auch fähiger einen Verlust wieder zu erzeugen als das erwachsene Thier; die Insekten-Larven erzeugen oft verlorne Theile wieder, die Insekten nach der Verwandlung nicht. Bei den niederen Thieren, wie Polypen, Würmern, erzeugen sich selbst Theile des Ganzen wieder zu einem neuen Ganzen. Man kann sich die allmählige Abnahme der Regenerationskraft mit der Entwicklung und mit der Zusammensetzung eines Thieres nicht anders verständlich vorstellen, als dass die organisirende Kraft durch die Entwicklung und durch die Erzeugung der Organe gleichsam mehr vertheilt wird, und sich zum Theil an die einzelnen Organe mehr bindet.

Schon in den Prolegomena sind einige der allgemeinen Gesetze, die für die Wiedererzeugung gelten, angeführt. Wenn sehr einfache Thiere und Pflanzen eine gewisse Summe gleichartig gebildeter Theile besitzen, und wenn das Ganze durch Vermehrung dieser gleichartigen Theile wächst, kann das Ganze sich theilen, und die getrennten Stücke, welche nun noch die wesentlichen Theile des Ganzen, aber von geringerer Anzahl enthalten, leben fort und ergänzen sich, wie z. B. abgeschnittene Zweige von Pflanzen eingepflanzt wieder zu neuen productiven Individuen werden. Die verschiedenen Theile einer Pflanze sind sich noch so ähnlich, dass sich die Zweige in Wurzeln, die Staubfäden in Blumenblätter umwandeln können. Von diesem Gesichtspunkte lässt sich auch die Regeneration der Süsswasserpolypen, Hydra und verwandter Thiere betrachten, obgleich die Polypen, nach den Infusorien zu schliessen, gewiss zusammengesetzter sind als man früher glaubte. Trembley *Abhandlung zur Geschichte der Armpolypen, übersetzt von* Goeze. *Quedlinb.* 1791. Schaeffer *Abhandl. von den Armpolypen.* Roesel *Insektenbelust.* 3. Bonnet *contempl. de la nature.* Die Arme der Hydren können sich durch freiwillige Ablösung zu neuen Polypen ausbilden. Es darf uns daher nicht wundern, dass sie es abgeschnitten thun. Aber Polypen, die in transverseller oder longitudineller Richtung durchschnitten sind, erzeugen sich wieder, ja selbst kleinere Stücke des Polypen werden wieder zu ganzen Thieren. Stellt man sich den ganzen Polypen als ein System von an Kraft ähnlichen Theilchen vor, die nur so lange dem organisirenden individuellen Princip unterworfen sind, als sie eine gewisse Verwandschaft haben, und denkt man sich die individuelle organisirende Kraft als das Resultat des Zusammerwirkens der Molecule, so werden abgeschnittene Stücke wieder Systeme ähnlicher Molecule enthalten. Das organisirende Princip wirkt hier wieder durch die Verwandtschaft der Theilchen zu einander, dass das Stück zu der Organisation eines neuen Polypen umgewandelt wird. Erreicht der Polyp eine gewisse Grösse, ist dann das System von an Kraft ähnlichen Theilchen gross geworden, so scheint in kleineren Theilen des Polypen eine grössere Verwandtschaft der Mo-

Digitized by Google

lecule zu einander zu entstehen, als die Theile zum Ganzen behalten, und so tritt ein Streben ein, einzelne Polypensprossen zu bilden, die sich abstossen und selbstständig werden. Deswegen werden auch die Fetzen eines Polypen individualisirt, sie trennen sich bald von dem Mutterpolyp als neue Individuen. Nach Goeze, Schaeffer und Roesel soll man Polypen auch umkehren können und sie dennoch fortwachsen. Wendet man diese Facta auf die Keime der höheren Thiere an, so werden diese nur so lange theilbar und regenerationsfähig seyn, als sie noch aus einer homogenen Substanz bestehen, welche die Kraft zur individuellen Organisation noch in allen Theilen gleich enthält. Denkt man sich, dass die Keimscheibe eines höheren Thieres, entweder wo später der Kopf, oder wo später der Schwanz entsteht, durch irgend eine unbekannte Ursache bis auf eine gewisse Strecke sich theile, oder auch ohne Spaltung nach einer Richtung der Achse doppelte Theile entwickele, so werden, so fern jene oben angedeuteten Gesetze richtig sind, so gut wie bei einer in 2 noch zusammenhängende Fetzen getheilten Planarie, 2 Köpfe oder 2 Schwanztheile entstehen müssen und eine Doppelmissgeburt wird entstehen. J. Mueller, Meck. *Arch.* 1828. 1. Die Doppelmissgeburten sind weder ganz durch Theilung eines Keims noch durch Verwachsung zweier Keime erklärlich. Ein grosser Theil der Doppelmissgeburten wird besser durch Verwachsung zweier Keime oder durch Entstehung zweier Embryonen in einer Keimhaut, die hernach verwachsen, erklärt, besonders wenn die getrennten Theile gross sind. Dass diese Verwachsung von Embryonen existirt, geht als gewiss aus den Fällen hervor, wo die Embryonen nur durch einen kleinen Theil, wie z. B. durch den Hinterkopf in Barkow's Fall, verwachsen sind. (Barkow *de monstris duplicibus certicibus inter se junctis. Berol.* 1821.) Embryonen, welche bloss durch das Gesicht zusammenhängen und in der Schnauze einfach sind, sonst aber doppelt oder Doppelmissgeburten mit einem Kopfe und getrennten ganzen Rümpfen kann man nicht wohl aus Theilung erklären, sie entstehen wohl durch Verwachsung und Verschmelzung der Keime mit denjenigen Stellen, wo gleichnamige Theile entstehen sollten, Schnauze mit Schnauze oder auf andere Art, wo die gleichnamigen Theile eine gewisse Anziehung auf einander auszuüben scheinen. Dagegen wäre es eben so schwer, eine Missgeburt mit einem überzähligen Theil, mit einem überzähligen Finger, einen ganz einfachen Körper mit einer doppelten Schnauze aus der Verwachsung zweier Keime zu erklären. Die Gesetze, welche bei der Reproduction der Polypen gelten, werden ohne Zweifel auch für die einfachen Keimstoffe der höheren Thiere gelten müssen. Man besitzt übrigens nur 2 Beobachtungen von Doppelmissgeburten des Hühnchens aus so früher Zeit, wo die Keimhaut noch vorhanden war. Die eine ist von C. Fr. Wolff, *Nov. comment. acad. Petrop.* 14. 456., die andere von Baer, Meck. *Arch.* 1827. 576. In Wolff's Fall hingen beide vollständige Embryonen nur durch denjenigen Theil der gemeinschaftlichen Keimhaut, der sich am Nabel in den Darm fortsetzt, zusammen. In Baer's Fall war die Area pellucida der

Digitized by Google

Keimhaut, statt wie gewöhnlich biscuitförmig, vielmehr kreuzförmig. Die Embryonen hatten einen gemeinsamen Kopf, ihre Leiber divergirten in den 2 längeren Schenkeln des Kreuzes. Wir werden übrigens auf diesen Gegenstand im 8. Buche, das von der Entwicklungsgeschichte der organischen Wesen handelt, zurückkommen.

Die Planarien haben, wie Dugès gezeigt hat, einen grossen Grad von Productionvermögen. Froriep's *Not.* 501. Jeder 8. oder 10. Theil des Thiers kann ein vollständiges Individuum reproduciren. Jedes abgeschnittene Stück reproducirte sich im Winter in 12 — 14, im Sommer in 4 Tagen vollkommen. Zuweilen theilen sich die Planarien in 2 Individuen durch Quertheilung. Dugès fand ein Individuum in Wasser mit zwei Schwanztheilen, und wenn er die Planarien vorn der Länge nach theilte, entstand eine Doppelmissgeburt mit 2 vollkommenen Köpfen.

Bei den Ringelwürmern erstrecken sich die Stämme der Gefässe, das knotige Nervensystem, der Darmkanal auf eine ziemlich gleichförmige Art durch die ganze Länge des Thiers, durch die ringelförmigen Abtheilungen des Wurmes. Man kann sich aus der Structur dieser Thiere, dass sie aus einer reihenförmigen Succession gleichförmiger Theile bestehen, schon erklären, dass trotz ihrer grösseren Zusammensetzung doch auch die Theilung des Wurms in die Quere die Regeneration des Wurms nicht aufhebt. O. Fr. Mueller (*von den Würmern des süssen und salzigen Wassers*) hatte die Regeneration der Stücke der durchschnittenen Nereïden, Bonnet die Regeneration von 4, 5, 6 Stücken der Naïs variegata, und die Regeneration der zwei Theile eines quer durchschnittenen Regenwurms beobachtet, was Dugès nicht gelang, obgleich die Regenwürmer die abgeschnittenen vordersten Ringe und den Kopftheil ersetzen. Froriep's *Not.* 513. Alle diese Thiere regeneriren sich bei longitudinalen Durchschnitten nicht, wahrscheinlich weil die Stücke nun nicht mehr die qualitativ verschiedenen Glieder des Ganzen enthalten. Man findet die älteren Beobachtungen in den grösseren Werken. Treviranus *Biologie.* Burdach's *Physiologie* 1., und in einer kleinen Schrift von Eggers *von der Wiedererzeugung. Würzb.* 1821. zusammengestellt.

Die Mollusken, Insekten, Crustaceen, Spinnen regeneriren nur einzelne Theile nach, die ihnen abgeschnitten worden, und es ist gewiss, dass die Schnecken nur einen Theil des Kopfes und die Fühlhörner regeneriren, wenn das Gehirn, das auf dem Schlunde liegt, nicht verletzt wird. Diese Regeneration erfolgt nur bei gemässigter Temperatur, nicht in der Kälte. Schweigger *Naturgeschichte der skelettosen ungegliederten Thiere.* Die Naïden theilen sich von selbst, wie O. Fr. Mueller, Gruithuisen, Dugès beobachtet haben. Gruithuisen *Nov. act. nat. cur. T.* 11. *tab.* 35. Die Hirudineen besitzen nach Moquin Tandon wenig oder kein Reproductionsvermögen.

Nach Heineken hört die Reproduction der Beine bei den Spinnen auf, sobald sie aufhören sich zu häuten oder ganz erwachsen sind. Die Larven der Insekten reproduciren ihre Fühler, nicht die vollkommenen Insekten. Froriep *Not.* 606. 607. Die

Digitized by Google

Phasmen erzeugen verlorne Beine wieder in ihrem unvollkommenen Larvenzustande. *Nov. act. nat. cur. T.* 12. 563. Die Regeneration der Füsse bei den Krebsen ist bekannt. Von den Fischen kennt man nur die Reproduction der Flossen nach Broussonet. Eggers *a. a. O.* 51.

Unter den beschuppten Amphibien kennt man die Reproduction des Schwanzes bei den Eidechsen, worin sich jedoch keine vollkommenen Wirbel, sondern nur eine knorpelige Säule bildet. Auch die Salamander erzeugen nach Spallanzani ihren Schwanz wieder. *Physic. mathem. Abh.* Wir haben hier ein Beispiel von Reproduction des hintersten Theils des Rückenmarks. Ueber die Reproduction der Salamander haben Spallanzani, Bonnet, Blumenbach (*Spec. physiol. comp. inter animantia calidi et frigidi sanguinis*), Steinbuch (*Analecten*), und Rudolphi Versuche angestellt.

Bei den Salamandern, jungen sowohl als alten, erzeugen sich die Beine wieder. Rudolphi hat beobachtet, dass in dem neuerzeugten Beine des Salamanders keine Grenze an dem reproducirten Nerven zu bemerken war. Bei den Salamandern erfolgt auch eine Reproduction der Unterkinnlade, und nach Blumenbach bei Tritonen selbst des Auges mit Hornhaut, Iris, Linse etc. innerhalb eines Jahres. Die Bedingung zu einer Reproduction ist aber, dass der Sehnerve und ein Theil der Augenhäute im Grunde des Auges unverletzt geblieben. Das Blastema, aus welchem sich hier nach und nach die einzelnen Theile eines verlornen Organs bilden, ist zuerst gallertartig durchsichtig; so erscheint es als ein gallertartiger Kegel an dem Stumpfe der verschnittenen Beine und der Kieme der Tritonlarve. Nach Steinbuch bemerkt man schon am 2.—3. Tage am Stumpfe der Kieme dieses wasserhelle, anfangs gefässlose Blastema. Diess vergrössert sich zur Form eines Cylinders, aber schon nach einigen Tagen ist diese Materie organisirt und vom Blute durchflossen. Vergl. pag. 372. Bei eigenem Versuche wollte mir diess lange nicht so schnell gelingen. Nach einer Mittheilung von Dieffenbach lösst sich nach einer Verwundung der Haut, Muskeln und der Beinhaut bei Salamandern öfter das ganze Glied, Extremität oder Schwanz ab, welche nachwachsen.

Die Frage, welches Princip die Wiedererzeugung so zusammengesetzter Theile bei einem erwachsenen Thiere bedingt, ist schon oben berührt worden; ob jenes organisirende Princip, welches selbst die Nerven beherrscht, und bei der ersten Entstehung die Nerven erzeugt, oder die Nerven. Bei der letztern Ansicht ist es interessant, dass alle Nervenfasern, die sich in den Theilen des abgeschnittenen Gliedes von den Nervenstämmen aus verbreitet hatten, schon in den noch vorhandenen Nervenstämmen des Stumpfes vereinigt neben einander vorhanden sind, wie in der Physik der Nerven im 3. Buche bewiesen wird, und dass die Nervenstämme in der Regel nur die Summe aller in den Aesten und Zweigelchen der Nerven sich entwickelnden Primitivfasern sind. Die zweite Durchschneidung der Nerven an einem Stumpfe beim Salamander soll die Reproduction des Stumpfes hindern.

Digitized by Google

Todd *Quarterly J. of sciences Vol.* 16. *p.* 91. Treviranus *Erscheinungen und Gesetze* 2. 7. Wahrscheinlich wird indess selbst die Erzeugung der Nerven von einem höhern Princip aus bestimmt, da sich die Nerven gleich anderen Theilen bei der Metamorphose der Thiere umwandeln. Alle bisher betrachteten Reproductionsphänomene geschehen ohne Entzündungsprocess, sondern durch eine Bildung von Blastema und Organisation desselben, ähnlich wie bei der ersten Zeugung. Bei den niederen Thieren gehen die Phänomene der Entzündung höchstens jenen Reproductionserscheinungen vorher, als nächste Folgen der Verwundung. Bei den Fröschen beobachtet man wirklich in seltenen Fällen Eiterung, wie ich selbst gesehen. Bei Schlangen verschorften mir schnell die Wunden. Bei den höheren Thieren giebt es keine Reproduction zusammengesetzter Theile, wie der Extremitäten, des Auges, mehr, sondern nur Wiedererzeugung einzelner Gewebe.

Wiedererzeugung der Gewebe.

Die Wiedererzeugung der Gewebe erscheint in zweifacher Form, 1) als Regeneration der Gewebe ohne Entzündung; 2) als Regeneration mit begleitender Entzündung. Die Entzündung darf in keinem Falle als die alleinige Ursache einer Regeneration angesehen werden. Bei dem Menschen und den Säugethieren bestehen Regeneration und Entzündung oft gleichzeitig nebeneinander, und die Regeneration wird oft durch die Entzündung hervorgerufen. Allein der Regenerationsprozess ist noch wesentlich von der Entzündung verschieden; jener ist die Aeusserung der Vis medicatrix naturae; diese ist die krankhafte Folge der Verletzung und tendirt je nach den Umständen ebenso zum Schlimmen als zum Guten. Die Unabhängigkeit der Heilung von der Entzündung zeigt sich schon sehr deutlich bei den Amphibien; denn bei den Schlangen heilen sogar grosse Wunden mit Substanzverlust ohne Eiterung, indem die Oberfläche verschorft wird, unter dem Schorf die neue Substanz sich bildet, diess habe ich selbst beobachtet, und ebenso soll es sich nicht selten bei Vögeln ereignen. Bei den Salamandern und bei den niederen Thieren ersetzen sich sogar ganze Glieder ohne jenen pathologischen Process und wer wird hier an die Nothwendigkeit der Enzündung zur Regeneration denken. Beim Menschen und bei den Säugethieren sind dagegen wenigstens nach Verletzungen Entzündung und Regeneration mit einander gleichzeitig, und die Entzündung dauert so lange bis die verletzte Stelle nicht mehr leidet. Daraus hat man den falschen Schluss gezogen, dass die Entzündung ein vermehrter Lebensprocess sei. Bei den höheren Thieren giebt es übrigens auch einzelne Fälle von Regeneration ohne alle Spur einer begleitenden Entzündung, wie die Wiedererzeugung der Geweihe, Haare, Nägel u. s. w.

1) *Regenerotion ohne Entzündung.*

a. Organisirte Gewebe, welche wiedererzeugt werden, nachdem sie ihre Organisation verloren haben.

Hierher gehört die Regeneration der Schale der Krebse, der

Digitized by Google

Geweihe der Hirsche, der organisirten Keime der Federn und Stacheln, welche später ihre Organisation verlieren. Die Schale der Krebse wird jährlich erneut, wenn die Entwicklung der inneren Theile dem Umfange der Schale nicht mehr entspricht. Die Schale spaltet sich und wird im August abgeworfen, unter ihr hat sich schon eine neue gebildet, die anfangs weich, empfindlich ist, und selbst Gefässe enthält, aber durch Aufnahme von kohlensauren Kalktheilchen bald hart wird. Cuv. *vergl. Anat.* 1. 101. Zur Zeit des Schalenwechsels erzeugen sich an beiden Seiten des Magens, der auch sein Epithelium erneuern soll, kalkige Concretionen, Lapides cancrorum; sobald die neue Schale härter wird, verschwinden diese Concretionen wieder.

Das Geweihe des Hirsches und verwandter Thiere ist mehr der organisirten Matrix der Hörner der wiederkäuenden Thiere als den Hörnern selbst zu vergleichen. Die Basis des Geweihes sitzt auf dem Stirnbeinhöcker, ein knöcherner zackiger Wulst bezeichnet die Grenze dieses Höckers und des Geweihes. Nicht zur Begattungszeit (Herbst), sondern im Frühling werfen die Männchen das Geweihe ab, und es entsteht das neue Geweihe. Die Trennung geschieht durch eine Art Erweichung der organisirten Knochensubstanz des Stirnbeinhöckers an der Grenze zwischen diesem und dem Geweihe. Der neue rauhe Stirnbeinfortsatz wird von der Haut bald wieder überzogen. Nun wächst das neue Geweihe aus dem Stirnbeinfortsatze hervor, von einer Fortsetzung der Haut und unter dieser von Beinhaut bedeckt, weich und knorpelig von unzähligen Gefässen durchdrungen. Indem die Knorpelmasse verknöchert und hierbei durchaus die Entwicklung der Knochen des Fötus und Kindes wiederholt, verlieren das Periosteum und die Haut des Geweihes ihre Organisation und lösen sich ab. Nach der Castration erzeugen die jungen Hirsche keine Geweihe und die älteren wechseln ihre Geweihe nicht mehr. Cuvier *vergl. Anat.* 1. 97. Bertnold *Beiträge zur Anatomie, Zoologie und Physiologie.*

Auf eine gleiche Art haben die organisirten Keime der Haare und Stacheln bei den Säugethieren und die Keime der Federn bei den Vögeln ihre Zustände der Abnahme und der Turgescenz, bei dem Haren und Mausern. Diess wird die Ursache zum Ausfallen und zur Wiedererzeugung der Haare und Federn. Die Wiedererzeugung der Haare und Federn ist jedoch insofern von der Wiedererzeugung der Geweihe verschieden, als nur die Matrix der Haare dem organisirten Geweihe gleicht, und das abgestorbene Mark der Federn dem verhärteten Geweihe gleicht, während die Hornsubstanz der Federn bloss durch die Matrix abgesondert wird, wovon an dem Geweihe als Aehnliches nur die Oberhaut des noch weichen Geweihes vorkömmt. Wir werden daher die Regeneration dieser Theile von der der Geweihe trennen.

b. Gefässlose Gewebe, welche durch Regeneration ihrer Keime wiedererzeugt werden. Es gehört hierher die Wiedererzeugung der Horngewebebildungen, des Zahngewebes und des Gewebes der Crystalllinse.

Digitized by Google

1. Horngewebe.

Die Nägel erzeugen sich bekanntlich wieder, so lange ihre Matrix noch vorhanden ist; aber man hat selbst an den Mittelgliedern amputirter Finger eine anfangende Nagelbildung beobachtet. Blumenbach *instit. physiol. p.* 511.

Ueber das Haren der Säugethiere hat Heusinger Aufschluss gegeben (Meck. *Arch.* 558). 5 Tage nach dem Ausrupfen eines Tasthaares des Hundes war ein mehr als 2 Millim. langes Haar entstanden. Bei den Haren wird die Zwiebel des alten Haares blass und es bildet sich neben ihr ein schwarzes Kügelchen, welches sich in den neuen Haarcylinder verwandelt. Diess ist sehr interessant, dass die Matrix des neuen Haares gleichsam ein neuer Auswuchs des productiven Bodens des Balges, und nicht der alte Keim ist. Es soll ebenso bei den Stacheln seyn. Bei dem Mausern der Vögel wird die Oberhaut am Schnabel und anderen Stellen in Form von Platten oder von Kleie abgestossen. Beim Abfallen der alten Federn sind die Keime der neuen Federn schon vorhanden. Siehe das Nähere bei A. Meckel., Reil's *Arch.* 12. Eble *a. a. O.* 1. 83. Burdach's *Physiologie* 3. 524.

Verschiedene Schriftsteller nehmen nach ihren Beobachtungen an, dass ausgerissene und in Einstiche der Haut verpflanzte Haare wieder anwachsen. Dzondi *Beiträge zur Vervollkommnung der Heilkunde. Halle* 1816. Dieffenbach *de regeneratione et transplantatione. Herbip.* 1822. Wiesemann *de coalitu partium a reliquo corpore prorsus disjunctarum. Lips.* 1824. Diess Anwachsen ausgerissener Haare nach der Transplantation und das Weiterwachsen derselben scheint mir noch nicht constatirt. Insofern die Zwiebel der Haare im Innern organisirt ist, lässt sich wohl ein Coalitus selbst mit anderen Theilen der Haut als dem Boden eines Haarbalges denken. Aber wie leicht kann hierbei Täuschung stattfinden.

2. Zahngewebe.

Die Zähne regeneriren sich für den Zweck des Zahnwechsels, da sie an der Krone nicht wachsen können und neue Zähne dem Umfange der vergrösserten Kiefer entsprechend entstehen müssen. Während das Hervorbrechen der neuen oder Wechselzähne gegen das 6. — 7. Jahr eintritt, hatten sich die Kronen dieser Zähne schon sehr frühzeitig gebildet. Unter den Milchzähnen sind bekanntlich nur 8 Backenzähne, unter den bleibenden 20 Backenzähne. Die Milchbackenzähne sind 4spitzig. Von den bleibenden Backenzähnen sind die 2 vorderen jeder Kieferhälfte 2spitzig, die hinteren 4spitzig. Die Milchzähne beginnen ihre Entwicklung im dritten Monat des Embryolebens und fangen vom 6. Monat nach der Geburt an hervorzubrechen.

Die bleibenden Zähne haben ein eigenthümliches Ortsverhältniss zu den Milchzähnen. Die späteren 3 hintersten Backzähne liegen in einer Reihe mit den Milchzähnen und schliessen sich nach Aussen an die Milchbackzähne an, mit denen diese hinteren Backenzähne auch in der Form der Krone übereinkommen, während die 2 vorderen Backenzähne des Erwachsenen als bi-

Digitized by Google

cuspidati den Milchbackzähnen nicht entsprechen. Die vorderen bleibenden Backenzähne, die bleibenden Eck- und Schneidezähne liegen anfangs hinter den Milchbackzähnen, Eckzähnen, Schneidezähnen. Von den Säckchen der bleibenden Zähne entsteht nach J. Fr. Meckel das des dritten (oder des ersten grossen) Backzahns schon am Ende des 4. Monats der Schwangerschaft. *Handb. der Anat.* 4. 214. Die Säckchen der bleibenden Schneidezähne bilden sich nach Meckel im Anfange des 8. Monats der Schwangerschaft, dann das Säckchen des Eckzahns, darauf das Säckchen des mittlern grossen Backzahns, die Säckchen der vorderen kleinen Backzähne erst einige Monate nach der Geburt, das Säckchen des hintersten grossen Backzahns erst im 4. Jahr. Meckel *a. a. O. p.* 226. Nach Blake und Meckel sind die Säckchen der bleibenden Zähne Auswüchse der Säckchen der Milchzähne. Indessen findet nach Meckel nur zwischen den äusseren Blättern der Zahnsäcke jener Zusammenhang statt; der neue innere Zahnsack entwickelt sich vielmehr an dem alten, zwischen diesem und dem äussern Säckchen. Meckel *a. a. O. p.* 227. Vergl. Meckel *im Archiv für Physiol.* 3. 556. Unter den bleibenden Zähnen fängt der dritte Backzahn oder erste grosse Backzahn gegen Ende der Schwangerschaft an zu verknöchern. Allmählig werden die Alveolen der neuen Zähne von den alten geschieden. Doch hangen beide Zahnhöhlen noch immer durch eine ansehnliche Oeffnung zusammen, wodurch der gemeinschaftliche Theil des äussern Zahnsäckchens tritt. Meckel *a. a. O. p.* 227. Der Zahnwechsel beginnt im 6.—7. Jahre. Zuerst erscheinen die vorderen grossen Backzähne; dann die Schneidezähne und Eckzähne; die mittleren grossen Backzähne erscheinen erst im 13.—14., die hintersten Backzähne vom 16.—20. Jahre. Vor dem Ausfallen verlieren die Milchzähne ihre Wurzeln.

Dass die Zähne eines Thieres ausgerissen und wieder eingesetzt, wieder fest wachsen, wird verschiedentlich behauptet. Ich bezweifle diess entschieden. Wäre es ein wahres Anwachsen, so müssten sich die zerrissenen Gefässe des Zahnkeims wieder mit den Gefässen des Bodens der Alveole vereinigen. Gerade dieser interessante Gegenstand ist nicht so constatirt, wie er es seyn muss. Eine sehr sichere Art, zur Entscheidung dieser Frage beizutragen wäre, Thiere mit frisch versetzten Zähnen mit Färberröthe zu füttern. Hat eine Verwachsung statt gefunden, so muss sich die innerste Schichte des Zahnes an der Zahnhöhle roth färben. Geborstene Zähne können sich natürlich nicht regeneriren, da sie nicht organisirt sind, sondern die Risse höchstens sich mit Kitt oder Weinstein aus den Speichelsalzen füllen. Bei den Schlangen währt die Bildung neuer Giftzähne beständig fort. Die neuen Zähne der Crocodile dringen in die conischen Höhlen der alten Zähne vor.

3. Crystalllinse.

Die Crystalllinse scheint sich in gewissen Fällen, nachdem sie aus der Capsel entfernt worden, durch ihre Matrix, die Capsel, wieder zu erzeugen. Leroy d'Etiole hat diess beobachtet. Magend. *J. de Physiol.* 1827. 30. Im ersten Falle waren 13 Tage,

Digitized by Google

im zweiten Falle 33 Tage, im dritten Falle 39 Tage, im vierten Falle 31 Tage, im fünften Falle 46 Tage, im sechsten Falle 165 Tage nach der Extraction der Crystalllinse bei Kaninchen, Katzen und Hunden verflossen, als das Auge untersucht wurde. Der Inhalt der hergestellten Capsel war entweder eine grümmliche Masse wie im zweiten Falle, oder ein kleiner linsenförmiger Körper wie in den meisten übrigen Fällen, im 6. Falle war aber eine ganz voluminöse Crystalllinse gebildet. Vergl. Mayer, Graefe und Walther's *Journ.* 17. 1. Vrolik *ebend.* 18. 4. W. Soemmerring *Beobachtungen über die organischen Veränderungen im Auge, nach Staaroperationen. Frankfurt* 1828.

2) *Regeneration mit begleitender Entzündung.*

Fast alle Fälle von Regeneration bleibend organisirter Theile bei dem Menschen gehören hieher, wenn man die Fälle ausnimmt, dass sich die Keime für Haar- und Zahnbildung nacherzeugen können, und dass diese Keime zuweilen selbst pathologisch z. B. im Eierstocke und anderen Theilen entstehen, so dass sich Haare, Zähne hier wie an anderen Orten erzeugen. Diese Erzeugung scheint nach denselben Gesetzen zu erfolgen. Die Zähne haben auch ihren Schmelz, und entstehen in Säckchen. Meck. *im Arch.* 1. 519.

a. Regeneration bei exsudativer Entzündung.

Die Entzündung hat in einem verwundeten oder nicht verwundeten Theil, wenn er freie Oberflächen darbietet, eine Exsudation von coagulabler Flüssigkeit, Liquor sanguinis, zur Folge. Fehlen freie Oberflächen, so häuft sich die coagulable Materie in den Capillargefässen und in dem Gewebe an und verdichtet dasselbe. Die in Wunden und auf Oberflächen entzündeter Theile exsudirende Materie ist anfangs flüssig, sie erscheint auf entzündeten Häuten zuerst tropfenweise, anfangs durchscheinend wird sie allmählig weisslich und consistent. Es ist der im Blute aufgelöste Faserstoff. Zur Zeit, wo die exsudirte Materie noch weich ist, scheint sie durch ein dem coagulablen Faserstoffe einwohnendes Lebensprincip zur Organisation zu streben, die durch Affinität und Wechselwirkung derselben mit den entzündeten Oberflächen auch erfolgt. Vergl. pag. 371. Es entstehen neue Gefässe in der exsudirten Materie, indem sie anfangs wahrscheinlich wieder Liquor sanguinis in die entstehenden Rinnen, hernach auch rothe Körperchen aufnimmt, ohne dass an eine Verlängerung von Gefässenden, die ja nicht existiren, gedacht werden kann. So muss man sich auch die Entstehung der neuen Gefässe in den Wunden und dem die Wundränder verklebenden Liquor sanguinis vorstellen. Eine Verlängerung der durchschnittenen Gefässe kann man hier nicht wohl annehmen. Alle durchschnittenen Gefässe schliessen sich ohnehin durch Gerinnsel, Trombus. Die durch Exsudation entstandenen Pseudomembranen organisiren sich nicht immer, in den Schleimmembranen erfolgt diess in der Regel nicht, wie im Croup, in den serösen Membranen erfolgt es in der Regel. Dass die Exsudate in sehr vielen Fällen organisirt werden, daran ist nicht zu zweifeln, wenn man einmal die schönen Injectionen dieser neuen Gefässe in Schröder van der Kolk's

Digitized by Google

Sammlung zu Utrecht und von Pockels in Braunschweig gesehen hat, wo Arterien und Venen von Pseudomembranen verschiedener Theile vom Darme und von der Leber, von Pseudomembranen zwischen Pleura costalis und pulmonalis verschieden gefärbt injicirt sind. In diesen Pseudomembranen entstehen auch neue Lymphgefässe, wie ich an mehreren Präparaten von Schröder gesehen habe, wo neben Arterien und Venen die Lymphgefässe mit Quecksilber gefüllt waren. In Hepatitide vero chronica hepate pseudomembranis diaphragmati accreto mihi contigit, mercurium in vasa lymphatica impulsum in ipsas pseudomembranas propellere, ita ut vasa lymphatica nova in conspectum venirent; in his valvulae vel noduli iam conspici poterant, licet minores quam in aliis vasis lymphaticis; cum arteriis et venis cursum magis rectum servabant, aliquando tamen paulatim convolutum, aliquando quaedam vasa lymphatica ad pseudomembranae originem sursum tollebantur, sed postquam in pseudomembranam transire inceperant, arcu facto ad hepatis superficiem redibant, in illo arcu plura vasa lymphatica ex hepate terminabantur; an arcus talis prima vasorum lymphaticorum novorum origo? Schröder *observ. anat. path.* 43.

Merkwürdig ist die neue Gefässbildung zwischen den Stümpfen einer unterbundenen und durchschnittenen Arterie. Maunoir, Parry, Mayer haben solche Beobachtungen gemacht, welche sehr übereinstimmend sind. Besonders ist seit Ebel's wiederholten, mit guten Abbildungen begleiteten Beobachtungen an der Thatsache nicht zu zweifeln. Ebel *de natura medicatrice, sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Giessen* 1826. Die neue Verbindung geschieht durch mehrere zuweilen gewundene Gefässe von einem zum andern Stumpfe, wie z. B. zwischen beiden Stümpfen der Carotis communis. Bei der Erklärung dieser Erscheinung hat man übersehen, dass bei den Thieren auch die Carotis communis mehrere ganz kleine Zweigelchen in die Halsmuskeln abgiebt, daher auch diese sogenannten neuen Gefässe wahrscheinlich nur Umbildungen von anliegenden Capillargefässnetzen sind.

Was die Aneinanderheilung getrennter Theile betrifft, so heilt Alles zusammen, was organisirt ist und im exsudativen Stadium der Entzündung sich berührt; getrennte Nervenstücke können unter sich, aber auch mit Muskelsubstanz, Beinhaut, Aponeurosen zusammenheilen. Ja selbst ganz abgeschnittene Theile heilen an, wenn sie frisch in innige Berührung mit homogenen oder heterogenen frischen Wundflächen gebracht werden, deren Entzündung aber auch über das Stadium exsudativum nicht hinaus seyn darf. Die Wiederanheilung vollkommen getrennter organisirter Theile ist zwar äusserst selten, aber doch nicht zu bezweifeln. Es gehört z. B. hierher der merkwürdige Buenger'sche Fall von Anheilung einer aus einem ganz getrennten Hautstücke des Schenkels künstlich gebildeten Nase. Froriep's *Not.* 4. 255. Nicht alle Fälle dieser Art ertragen indess eine scharfe Kritik. Hunter wollte den Zahn eines Hundes in den Kamm eines Hahnes verpflanzt haben, wo er fest wurde. Diess wird wohl schwerlich Anheilung gewesen seyn. Er verpflanzte eine Drüse vom Unter-

Digitized by Google

leib eines Hahnes auf eine Henne (he next transplanted a gland taken from the abdomen of the cock to a similar situation of a hen). Er verpflanzte den Sporn eines Hahnes. Diese sollen gewachsen seyn. Abernethy hat diese und andere Fälle beschrieben. Abernethy *physiol. lect.* 253. Aehnliche Versuche hatte Baronio angestellt. Vergl. oben von den Zähnen und Haaren. Nach Merrem und v. Walther, meinem grossen Lehrer, heilt sogar das austrepanirte Knochenstück wieder ein.

Die Anheilung von Hauttheilen, die noch mit dem Stamme zusammenhängen, mit anderen Theilen desselben Körpers geschieht bekanntlich leicht. Ein Process, worauf die Bildung der Nase aus der Stirnhaut und viele andere Fortschritte der Chirurgie beruhen, um welche sich Dieffenbach grosse Verdienste erworben hat. Das einmal angeheilte Hautstück kann hernach an der Brücke, durch die es während der Anheilung mit dem Stamme verbunden seyn musste, durchschnitten werden. Die Verwachsung zweier in Entzündung gesetzter Theile, deren sich die Chirurgie mit so grossem Vortheile zur Aufhebung der Discontinuitäten und Aufhebung gewisser Absonderungen bedient, ist eine ganz allgemeine Erscheinung bei organisirten Theilen. Der Fötus kann hierdurch an Theilen seines Körpers mit den Eihüllen verwachsen, aber selbst verschiedene Individuen können auf diese Art mit einander verwachsen. Bei der Verwachsung der Embryonen zeigt sich hier ein äusserst merkwürdiges Gesetz, dass mit seltenen Ausnahmen immer die gleichartigen Theile beider Embryonen nicht bloss verwachsen, sondern ganz zusammenstossen; ja es entfernen sich sogar die symmetrischen Theile des einen Embryo an der Verwachsungsstelle von einander und verwachsen mit den entsprechenden Theilen des andern Embryo's; wodurch die Janus-Missgeburten entstehen. Dieser Process ist ohne eine gewisse Affinität gleicher Theile nicht denkbar. Diese Verwachsungen mit Verschmelzung müssen ganz ausserordentlich früh eintreten. Denn später findet sich beim Verwachsen nur Verbindung.

Rathke hat einen Fall beobachtet, dass ein Embryo mit dem Kopfe eines andern durch seine Nabelschnur verbunden war. Meck. *Arch.* 1830. 4.

Was die Regeneration der verschiedenen Gewebe betrifft, so verwachsen zwar die getrennten Theile eines Gewebes bei der Berührung im Stadium exsudativum der Entzündung in der Regel, aber die neuerzeugte Substanz, welche die organisirten Theile verbindet, und welche anfangs Faserstoff ist, hat bei den der Empfindung und Muskelbewegung bestimmten Theilen nicht vollkommen die Eigenschaften, welche diese Gewebe sonst darbieten. Bei den meisten anderen Geweben ist die Regeneration vollständig, auch in Hinsicht der organischen Qualitäten, besonders bei denjenigen Geweben, welche weniger durch ihre Lebenseigenschaften als durch die vermöge des Lebens erhaltenen physikalischen Eigenschaften wichtig werden, wie die Knochen. Die Gewebe der letztern Art regeneriren aber nicht alle gleich leicht.

Digitized by Google

Die Sehnen, Bänder, Knorpel regeneriren überhaupt ungemein schwer, die Knochen dagegen sehr leicht.

Die Thatsachen über die Heilung verletzter Knorpel hat E. H. Weber in seinem trefflichen Werk *Anat.* 1. 306. zusammengestellt. Nach Brodie heilen verletzte Gelenkknorpel höchstens doch nur so, dass die zerstörten Theile nicht wieder ersetzt werden. Nach Beclard entsteht zwischen den Bruchflächen der Rippenknorpel eine aus Zellgewebe gebildete Platte, während die Knorpelstücke auch noch durch einen knöchernen Ring verbunden werden. Als Dörner aus dem Schildknorpel einer Katze ein kleines 4eckiges Stück herausgeschnitten hatte, war das Loch in 28 Tagen nur durch eine feste Haut angefüllt. Knorpel, welche durch einen Schnitt getrennt werden, wachsen nach Dörner nicht unmittelbar, sondern durch Vereinigung des Perichondriums zusammen.

Ueber die Regeneration des fibrösen Gewebes haben Arnemann, Murray, Moore, Köhler Versuche angestellt, welche in Weber's Werke citirt sind. Bei der Heilung der Sehnen soll die neue Substanz mehr knorpelig als faserig und glänzend seyn. Nach Arnemann soll sich die Dura mater nie wieder erzeugen (?).

Ausgezeichnet ist die Regeneration der Knochen. Die mehr schwammigen Knochen, wie Schädel, Becken und Epiphysen der Röhrenknochen, heilen schwieriger als die Röhrenknochen und dichteren Knochen. Manche Brüche heilen oft nur durch eine faserige biegsame Bandmasse, wie die zerbrochene Kniescheibe. Der Bruch des Oberschenkelbeinhalses innerhalb des Capselbandes heilt in der Regel nicht durch Callus, sondern durch eine ligamentöse Masse. Otto *path. Anat. pag.* 225. Das austrepanirte Stück des Schädels wird selten, selbst nach langer Zeit nicht, durch einen vollständigen Ersatz von neuerzeugter Knochenmaterie regenerirt. Doch kömmt zuweilen eine vollständige Ausfüllung durch neue Knochensubstanz vor, was Scarpa sah.

Der Process der Heilung gebrochener Knochen beruht auf exsudativer Entzündung und Umwandlung des Exsudates in Knochenmaterie, die anfangs die Knochenstücke ziemlich unförmlich verbindet und später allmählig umgewandelt wird. Die Exsudation erfolgt von allen Theilen, welche bei dem Knochenbruche verletzt worden waren, vom Knochen sowohl als von der Beinhaut, von dieser sowohl als von dem umherliegenden Zellgewebe und anderen verletzten in Entzündung gerathenden Theilen. Dieses erste Exsudat ist wie überall in der Entzündung der aufgelöste Faserstoff des Blutes; das Exsudat erreicht bald die Consistenz der Gallerte, welche sich organisirt, während die Entzündung fortdauert, die Beinhaut aufschwillt. Von dem ursprünglichen Exsudat muss man wohl den eigenthümlichen Callus unterscheiden; das erste Exsudat ist das gleichförmige Entzündungsprodukt aller verletzten Theile. Der Callus ist die Grundlage der neuen Knochensubstanz, dieser entsteht zunächst von den Knochen aus. Der ganze Vorgang der Callusbildung ist neuerlich durch Miescher's Untersuchungen wesentlich aufgeklärt worden. Miescher *de inflammatione ossium eorumque anatom. ge-*

Digitized by Google

neráli. Berol. 1836. Er ist hiernach folgender. Die Entzündung tritt zuerst nach einem Bruch am lebhaftesten in den weichen Theilen, Periostium, Zellgewebe, Muskeln auf, welche alle aufschwellen, sich verdichten, verwachsen und so eine feste Capsel um die Fractur bilden. Auf der innern Fläche dieser Capsel wird durch die Entzündung eine halbflüssige nach und nach fester werdende Substanz gebildet, in der Gefässe entstehen. Eine gleiche Substanz geht aus dem Markgewebe des gebrochenen Knochens hervor. Die von der Capsel gebildete Masse und die letztere verschmelzen. Diess ist die in der Capsel liegende, die Fractur umhüllende Substantia intermedia. Diese nimmt eine fibröse Beschaffenheit an, und füllt alle Zwischenräume zwischen den Knochen aus, während Muskeln, Zellgewebe, Periostium in ihren frühern Zustand zurückkehren. Später als die Weichtheile wird auch der Knochen von der Entzündung ergriffen, und zwar zuerst in einiger Entfernung von den Bruchenden, wo der Knochen noch von dem Periostium bedeckt ist und ebenso im Innern des Knochens. Auch die Knochen exsudiren eine gallertarige Masse, worin sich Gefässe bilden, während diese Substanz wächst, wandelt sie sich, von der Seite, wo sie mit dem Knochen zusammenhängt, in Knorpel und Knochen um. Diese neue Masse, der eigentliche Callus, füllt auch die Höhle der Knochen mehr oder weniger aus. Aussen schreitet die Substanz über die Knochenenden weg und die Productionen beider Knochen verbinden sich. So geschieht die Bildung des primitiven Callus. Unterdess verwachsen die Oberflächen der Knochen mit der von den weichen Theilen und dem primitiven Callus selbst gebildeten Capsel, die Ränder der Fractur verwachsen hinwieder mit der Substantia intermedia. Auch bildet sich nun ebenfalls Callus, welcher sich auf Kosten der unterdess ligamentös gewordenen Substantia intermedia ausbildet. Auf der äussern unebenen Fläche des Callus bildet sich wieder Periostium aus. Die erste Erscheinung des primitiven Callus findet an demjenigen Theile des Knochens statt, wo das Periostium noch mit dem Knochen zusammenhängt, es ist die zwischen Periostium und Knochen sich bildende, anfangs halbflüssige Materie, worin schon nach dem dritten Tage Gefässe sichtbar werden. Der Callus geht daher nach Mitscher's Untersuchungen immer vom Knochen selbst aus. Wurden zuweilen Knochenkerne in dem Callus beobachtet, welche von jenem Theil des Knochens, von welchem die Callusbildung ausgeht, auf dem Durchschnitt isolirt schienen, so zeigte sich bei weiterer Untersuchung, dass sie doch an anderen Stellen als an der Durchschnittsfläche mit jener productiven Stelle zusammenhingen. Die weiteren Veränderungen des Callus nach der Verwachsung der Knochenenden bestehen in der Herstellung der Märkhöhle in dem Callus selbst und in der Veränderung seiner Form. Die Umwandlungen des Gewebes des Callus geschehen übrigens ganz so wie bei der ersten Knochenbildung. So lange der Callus knorpelig ist, enthält er die mikroskopischen Knorpelkörperchen, zur Zeit der Ossification entsteht auch das zellige Gefüge in der Knochensubstanz.

Digitized by Google

Die Litteratur über diesen Process ist ausserordentlich gross, und kann hier nicht ganz angeführt werden; man findet sowohl diese als eine vollständige Exposition der Ansichten über die Bildung des Callus im *Dict. des sc. méd.* in A. L. Richter *Handb. d. Lehre von d. Brüchen und Verrenkungen der Knochen. Berlin* 1828. *p.* 89—117. und in Mitscher's angeführtem Werke. Die vorzüglichsten Schriftsteller über diesen Gegenstand sind Haller *element. physiol.* 8. 345. Detlef in Halleri *op. min.* 2. 463. Troja *de novorum ossium regeneratione exp. Paris* 1775. Köhler *exp. circa regenerat. ossium. Gött.* 1786. Van Heekeren *de osteogenesi praeternaturali. Lugd. Bat.* 1798. Macdonald *de necrosi et callo. Edinb.* 1799. Dupuytren *Dict. des sc. méd.* 38. 434. Howship *Beob. über den gesunden und kranken Bau der Knochen.* Kortum *exp. circa regenerat. ossium. Berol.* 1824. Meding *diss. de regeneratione ossium. Lips.* 1823. M. J. Weber *Nov. act. acad. nat. cur.* 12. 2. Breschet *Recherches experiment. sur la formation du cal. Paris* 1819.

Der Hauptpunkt der Controverse war vorzüglich die Frage, welchen Antheil die Beinhaut an der Callusbildung habe. Duhamel, Schwenke, Bordenave, Blumenbach, Köhler, Dupuytren und Boyer schrieben ihr einen wesentlichen Antheil zu. Schon Detlef zeigte, dass die Beinhaut zu der Bildung des Callus nichts beitrage, und sich erst später bilde. Haller, Sömmering, Scarpa, Richerand und Cruveilhier liessen den Callus durch Exsudation von den Knochenenden selbst entstehen. Von der unphysiologischen Vorstellung Duhamel's, dass die Beinhaut das Bildungsorgan des Knochens sey, ist schon früher die Rede gewesen. So wenig sie zuerst den Knochen bildet, so wenig wird sie allein das Bildungsorgan des Callus seyn können. Nur an der ursprünglichen Exsudation nach dem Knochenbruche hat die Beinhaut, wie alle anderen verletzten weichen Theile, den nächsten Antheil. Allerdings wirkt das Periostium zur Entstehung des eigentlichen Callus zwischen ihm und dem Knochen mit, aber nur in wie weit es überhaupt zum Bildungs- und Ernährungsprozess in dem unter ihm liegenden Knochen nothwendig ist, insofern von ihm aus die ernährenden Gefässe in den Knochen eindringen. Dass es aber bei der Bildung specifischer Gewebe noch auf etwas ganz Anderes als auf die Existenz der mit dem Material zur Ernährung gefüllten Gefässe ankommt, ist schon oben erinnert worden.

Die Entstehung der ersten Ossificationen im Callus dicht am Knochen und das weitere Fortschreiten zeigen, dass die Gegenwart des Knochens hier zur neuen Knochenbildung nothwendig ist.

Die serösen Häute sind von allen Theilen am meisten zur Exsudation von Liquor sanguinis geneigt, vielleicht weil sie am wenigsten eigenes assimilirendes Gewebe besitzen. Die Verwachsung ist daher bei ihnen am häufigsten. Ob sich bei veralteten Luxationen in den neu entstandenen Gelenken neue Synovialhäute bilden, ist noch nicht ganz gewiss, obgleich es Meckel vielleicht zu bestimmt annimmt. Die Synovia eines neuen Gelenkes kann allerdings von dem Reste der Synovialhaut herrühren, der dem Knochen noch anhängt.

Digitized by Google

Die Narbe der im Stadium der exsudativen Entzündung geheilten Hautwunden ist dichter als die Häut selbst, empfindlich, anfangs röther, später weisser; sie hat eine feinere Epidermis. Grössere Narben entstehen von Heilung mit eiternder Entzündung bei Substanzverlust der Haut. In diesem Falle ist die Hautnarbe haarlos, und bei den Negern mehrentheils anfangs farblos, worauf aber doch häufig in der Folge die schwarze Hautfarbe sich wieder erzeugt.

Die Schleimhäute heilen schwer zusammen, worauf zum Theil die Schwierigkeiten bei der Ausführung der Gaumennath und Darmnath beruhen. Nach der Durchschneidung der Ausführungsgänge der Drüsen, entsteht, wenn die getrennten Stücke in Berührung bleiben, zuweilen eine Regeneration des Ganges, so dass keine Verschliessung erfolgt. Dies hat zuerst Mueller *de vulneribus duct. excret. Tüb.* 1819. in 3 Fällen am Ductus Whartonianus der Submaxillardrüse, und einmal am Ductus pancreaticus, in 2 Fällen am Ductus deferens des Hundes und der Katze beobachtet. Brodie, Tiedemann, Gmelin, Levret und Lassaigne haben nach Unterbindung des Ductus choledochus in einigen Fällen eine Wiederherstellung des Ganges gesehen. Die Gelbsucht verschwand in Tiedemann's Versuchen in einigen Fällen wieder nach 10—15 Tagen. Die Ligatur hatte hier entweder durchgeschnitten, und war abgefallen, ehe die Durchschnittsflächen verheilten, oder die coagulable Materie wurde um die Ligatur ergossen, und letztere hatte sich vielleicht im Innern des äusserlich hergestellten Ganges abgestossen, und ist durch den Kanal selbst ausgetreten. In 13—26 Tagen war der Gang wieder hergestellt gefunden worden. Tiedemann und Gmelin *die Verdauung nach Versuchen.* 2.

Die Drüsen vernarben zwar, aber die Narbensubstanz erhält nicht die Eigenschaften der Drüsensubstanz. Eben so verhält es sich mit den Muskeln. Die Narbensubstanz der Muskeln ist nach P. Fr. Meckel, Richerand, Parry, Huhn, Murray und Autenrieth dem verdichteten Zellgewebe ähnlich, und zeigt keine Contractilität gegen galvanischen Reiz. Kleemann *diss. circa reprod. partium. Hal.* 1786. Huhn *de regen. partium mollium. Gott.* 1787. Murray *de redintegratione partium etc. Gott.* 1787. Autenrieth et Schnell *diss. de nat. unionis musculorum vulneratorum. Tüb.* 1804. Die Wunden des schwangern Uterus vernarben sehr leicht, die Wunde wird durch die Zusammenziehung des Uterus schnell überaus klein. Es scheint, dass vorzugsweise die äussere seröse Haut des Uterus vernarbe. Vergl. Mayer, Graefe und Walther's *Journ.* 11. 4. Eine neue Erzeugung von wahrer Muskelsubstanz, wie sie in Wolff *tract. de formatione fibrarum muscularium in pericardio atque in pleura. Heidelb.* 1832. beschrieben wird, ist gewiss nicht annehmbar. Diese faserigen Schichten auf Pleura und Herzbeutel, die ich im Museum zu Heidelberg gesehen habe, können nur Faserstoffexsudate seyn. Wir kennen keinen Beweis für die Existenz von Muskelsubstanz, als ihre Zusammenziehung und ihr mikroskopisches Verhalten. Vergl. Wutzer in Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 451.

Digitized by Google

Ueber die Regeneration der Nerven haben Arnemann, Haighton, Prevost, Meyer, Fontana, Michaelis, Swan, Breschet, Tiedemann Untersuchungen angestellt; gleichwohl ist dieser Gegenstand noch ziemlich im Unklaren, indem mehrere Beobachter die Frage, ob die getrennten Stücke zusammenheilen, mit der Frage verwechselten, ob die Narbenmasse die Eigenschaften des Nervengewebes hat, was sowohl in anatomischer als physiologischer Hinsicht eine Prüfung von ganz ausserordentlicher Schwierigkeit ist. Bekanntlich ziehen sich die Nervenstücke nach der Durchschneidung durch die Elasticität ihrer Scheide etwas zurück. Dass aber die Nervenstücke, wenn sie nahe an einander liegen, sich wieder vereinigen, daran ist freilich nicht zu zweifeln. Soll nun die Nervensubstanz die Eigenschaften der Nerven haben, so muss sie Primitivfasern enthalten. Arnemann (*Versuche über die Regeneration. Gött.* 1797.) fand, dass die Narbensubstanz von der eigenthümlichen Substanz der Nerven verschieden sey, und eine harte Anschwellung bilde. Dagegen Fontana (*Versuche über das Viperngift*) die Aehnlichkeit der Substanz nach Versuchen am N. vagus der Kaninchen annimmt. Allein 29 Tage nach der Durchschneidung konnten sich unmöglich die Primitivfasern in jener Narbe erzeugen, die man nach meinen Beobachtungen selbst nach 7 Wochen noch nicht deutlich darin findet, indem die Narbenmasse dann noch wie dichtes Zellgewebe ist. Prevost (Frorief's *Not.* 360.), der den N. vagus an Katzen durchschnitt und wieder heilen liess, fand nach 4 Monaten eine Fortsetzung der Nervenfäden durch die Narbe. Sehr unwahrscheinlich ist Michaelis Angabe (*über die Regen. der Nerven. Cassel* 1785.), dass nach Ausschneidung von 9—12 Lin. langen Nervenstücken nach mehreren Wochen eine Vereinigung durch Nervenfäden statt fand. Meyer (Reil's *Arch.* 2. 449.) und Tiedemann prüften die neu erzeugten Substanzen durch Salpetersäure, welche die Hüllen der Nerven auflöst, aber die Nervensubstanz zurücklässt. Diess Prüfungsmittel ist aber wohl trüglich. Nach keinerlei Art chemischer Behandlung kann man, so viel mich meine Beobachtungen lehren, die feinsten Primitivfasern der Nerven studiren, der Nerve muss ganz frisch mikroskopisch untersucht werden. Als ich auf diese sichere und in der That nicht sehr schwierige Art die Narbe des vor 7 Wochen zerschnittenen und wieder verheilten N. ischiadicus eines Kaninchens untersuchte, so konnte ich mich nicht hinreichend von der Existenz der parallelen Primitivfasern in der noch harten Narbenmasse überzeugen, die aus dichtem Zellstoffe zu bestehen schien; Schwann hat indess beim Frosch in der regenerirten Nervensubstanz wirkliche Primitivfasern beobachtet; in diesem Fall hatte sich auch die Leitungsfähigkeit der Nerven hergestellt.

Von grossem Gewichte sind nun physiologische Versuche über die Wiederherstellung der Empfindung und Bewegung in den Theilen, deren Nerven vorher durchschnitten worden. Man kann aber auch wieder von den meisten der bisher angestellten Versuche dieser Art behaupten, dass sie nicht mit hinreichender Kritik angestellt sind.

Digitized by Google

Eine Wiederherstellung der Empfindung fand der Gegner der Reproduction, Arnemann, in einem seiner Versuche an einem vorher durchschnittenen Hautnerven des Vorderfusses eines Hundes, ferner Descot (*über die örtl. Krankh. der Nerven. Leipz.* 1826.) bei einem Manne, der sich den N. ulnaris verletzt hatte, und bei dem anfangs im 4. und 5. Finger das Gefühl ganz mangelte, während die ersten Tage nach der Verletzung das Gefühl undeutlich war und sich nach und nach wiederherstellte. Descot's Fall beweist nichts, da der Nerve wohl nicht ganz durchschnitten war. Bei einem jungen Manne sah ich Prof. Wutzer ein Neuroma des N. ulnaris am Oberarme exstirpiren, wo dieser Nerve ober und unter der Geschwulst durchschnitten und mit der Geschwulst ein $2\frac{1}{2}$ Zoll langes Stück des Nerven ausgeschnitten wurde. Hier konnte sich unmöglich die Nervensubstanz reproduciren, dennoch stellte sich nach 3—4 Wochen die Empfindung in der Ulnarseite des 4. Fingers (nicht im 5. Finger) allmählig wieder ein, offenbar weil der Ramus volaris ulnaris digiti 4. mit einem Aestchen des N. medianus verbunden ist. Nach 8 Monaten fand ich den 4. Finger auf beiden Seiten vollkommen empfindlich. Eine allmählige, aber unvollkommene Wiederkehr der Empfindung nach Durchschneidung eines N. dorsalis pollicis hat Gruithuisen an sich selbst beobachtet. In einem Falle, den Earle (*med. chir. Trans.* 7.) erzählt, wo ein Theil des N. ulnaris ausgeschnitten wurde, konnte der kleine Finger 5 Jahre nachher noch nicht gebraucht werden und hatte nur unvollkommene Empfindungen. In der grossen Anzahl von Arnemann's Versuchen war das untere Stück eines durchschnittenen Nerven 100—160 Tage nachher ganz unempfindlich. Unter die merkwürdigsten Versuche über die Reproduction der Nerven gehören die von Haigthon, Prevost und Tiedemann. Haigthon (Reil's *Arch.* 2. 80.) durchschnitt bei einem Hunde den N. vagus am Halse auf der einen Seite; als er 3 Tage nachher den andern Nerven durchschnitt, starb das Thier, wie immer, wenn beide Nerven zugleich durchschnitten sind. Er durchschnitt bei einem Hunde zuerst den einen, 9 Tage darauf den andern Vagus. Der Hund lebte 13 Tage. An einem andern Hunde wurde der Vagus der einen Seite 6 Wochen nach dem Vagus der andern Seite durchschnitten. Der Hund war zwar darauf 6 Monate ungesund, aber er blieb am Leben. Die Stimme war nach 6 Monaten wiedergekehrt und die Töne waren höher geworden. An dem Hunde, dem Haigthon 19 Monate vorher beide N. vagi durchschnitten, durchschnitt er nun wieder beide Vagi nach einander, das Thier starb am 2. Tage. Richerand hat die Versuche von Haigthon ohne Erfolg wiederholt. Auch Brzschet und Delpech leugnen die Regeneration der Nervensubstanz. Lund *Vivisectionen* 218. Dagegen hat Prevost Haigthon's Versuche bestätigt, Froriep's *Not.* 360. Als 2 neugebornen Katzen der eine N. vagus 1 und 2 Monate nach der Durchschneidung des andern durchschnitten wurde, starben die Thiere (im ersten Falle in 15, im zweiten Falle in 36 Stunden). Dagegen lebten 2 junge Katzen fort, als er den zweiten Vagus 4 Monate nach dem ersten durchschnitt, sie lebten noch 14 Tage nachher allein

Digitized by Google

als nun der zuerst operirte und wieder vertheilte Nerve nochmals durchschnitten wurde, starben sie in 30 Stunden.

Die Beweiskraft einer andern Reihe von Versuchen beruht auf der Wiederherstellung der Bewegung in Gliedern, deren Nerven vorher durchschnitten worden. Die meisten Versuche dieser Art beweisen gar nichts, wenn man nicht, wie in Tiedemann's Fall, alle Nerven eines Gliedes durchschneidet. Swan hatte viele Versuche über den Erfolg der Durchschneidung des Nervus ischiadicus bei Kaninchen angestellt, aus denen sich jedoch kein entscheidendes Resultat ergiebt. J. Swan *über die Behandlung der Localkrankheiten der Nerven, übers.* v. Francke. *Leipzig* 1824. Die Thiere lernen nach der Durchschneidung des Nervus ischiadicus bald wieder gehen, aber erlangen den vollkommnen Gebrauch des Fusses niemals wieder. Dass diese Thiere selbst einige Tage nach der Durchschneidung des Nervus ischiadicus am Oberschenkel den Fuss wieder gebrauchen, darf uns nicht wundern. Denn da die Aeste der Oberschenkelmuskeln ganz hoch oben aus dem Plexus ischiadicus und dem N. ischiadicus abgehen, so werden sie in der Regel durch die Verletzung des Nervus ischiadicus am Oberschenkel gar nicht betheiligt. Dazu kommt, dass die Oberschenkelmuskeln auch von dem N. cruralis und obturatorius versehen werden. Die Durchschneidung des N. ischiadicus in der Mitte des Oberschenkels und selbst höher lähmt nur den Nervus peronaeus und tibialis, also die Muskeln des Unterschenkels und Fusses. Ohne dass die Thiere vollkommen auftreten können, werden dieselben nach jener Operation doch das Bein beim Gehen durch die vollkommene Wirkung der Oberschenkelmuskeln gebrauchen.

Ich habe einige Versuche über die Regeneration der Nervensubstanz nach einem veränderten Plane angestellt, dessen Anwendung in der Folge gewiss sichere Resultate verspricht; aber leider sind die Versuche, die ich anstellte, nicht ganz entscheidend. Ich erzähle sie, damit sie neue Versuche dieser Art veranlassen. 1) Ich hatte bei einem Kaninchen den N. ischiadicus am 13. Januar 1832 in der Mitte des Oberschenkels durchschnitten. Das Thier erhielt nach 2 Monaten den Gebrauch seines Fusses nicht, es hinkte und die Ferse war aufgetreten. Am 7. April wurde das Thier wieder vorgenommen. Der N. ischiadicus wurde an dem lebenden Thiere blossgelegt. Der Nerve war schön geheilt und zeigte eine lange Anschwellung. Der Nerve über der Narbe mit der Nadel gezerrt, bewirkte keine Zuckungen in den Muskeln des Unterschenkels und Fusses, die Zerrung des obern Theils der Narbe eben so wenig. Dagegen bewirkte Zerrung des mittlern Theiles und untern Theiles der Narbe, so wie des Nerven unter der Narbe jedesmal eine Zuckung in den Muskeln des Unterschenkels, namentlich in den Musc. peronaeis, welche blossgelegt waren. Die Haut des Fusses war unempfindlich von der Ferse bis zu den Zehen, am Unterschenkel war sie empfindlich, offenbar, weil die Nervi cutanei des Unterschenkels von dem durchschnittenen Theil des Nervus ischiadicus zum Theil unabhängig sind. 2) Bei einem Kaninchen, bei dem ich den

Digitized by Google

Nervus ischiadicus über der Mitte des Oberschenkels durchschnitten hatte, legte ich nach 1 Monat 20 Tagen darauf, als das Thier noch ebenso mit dem Fusse hinkte, wie anfangs nach der Operation, (bei dem lebenden Thiere) den Nerven wieder bloss. Die mechanische Reizung des Nerven mit einer Nadel erregte keine Zuckungen in den entblössten Muskeln des Unterschenkels, während sie unter der Narbe auf den Nerven angewandt Zuckungen, besonders in den blossgelegten Musc. peronaei, bewirkte. Der galvanische Reiz eines einfachen Plattenpaars auf den Nerven über der Narbe angewandt, wobei beide Platten über der Narbe applicirt wurden, erregte keine Zuckungen in den von dem Nervenstücke unter der Narbe abhängigen Muskeln. Der Assistent, Herr Schwann, liess nun die Pole einer aus 100 Plattenpaaren bestehenden Säule von ausserordentlicher Kraft auf den Nerven über der Narbe, dem hier eine Glasplatte untergeschoben war, wirken. Hier entstanden freilich starke Zuckungen in allen Muskeln des Unterschenkels. Allein es zeigte sich, dass der so sehr kräftige galvanische Strom durch den Nerven als blossen nassen thierischen Leiter fortgeleitet wurde. Ein so starker Strom ist, wie wir zu spät ersahen, zu keiner Art physiologischer Versuche brauchbar, weil er nicht wohl zu isoliren ist, und, wie wir hernach sahen, auch schon durch einen ganz zermalmten Nerven und 2 ganz getrennte Nervenstücke, die durch eine feuchte Oberfläche des Körpers, worauf sie liegen, verbunden sind, überspringt. 3) Am 10. Juli 1832 wurde einem Kaninchen der Nervus ischiadicus über der Mitte des Oberschenkels durchschnitten. Nach 6 Monaten, als das Thier immer noch beim Gehen den Fuss etwas schleppte, wurde bei diesem lebenden Thiere der Nervus ischiadicus wieder blossgelegt. Der einfache galvanische Reiz und der in diesem Falle sehr schwache Reiz einer galvanischen Säule von 30 Plattenpaaren bewirkte keine Zuckungen in den Muskeln des Unterschenkels, als beide Pole oberhalb der länglichen Narbe applicirt wurden. Wir erstaunten aber sehr, als wir unterhalb der Narbe den galvanischen Reiz auf den Nerven, oder auf den Nervus peronaeus applicirten, und nun auch nur äusserst geringe Spuren von Zuckungen in den Unterschenkelmuskeln und namentlich den blossgelegten Musc. peronaeis entstehen sahen. Spätere mit Dr. Sticker angestellte Versuche (Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 202.) haben die Resultate dieser Versuche noch mehr aufgeklärt. Man hatte zu viel Werth auf Nysten's Erfahrungen gelegt, dass die Muskeln derer, die einige Tage nach einem Schlagflusse gestorben waren, trotz der Hirnlähmung noch contractil gegen galvanischen Reiz waren. Nysten *a. a. O. p.* 369. Es fand sich nämlich bei jenen Versuchen, dass das vom Hirneinfluss getrennte untere Stück eines durchschnittenen Nerven in der ersten Zeit allerdings seine Reizbarkeit behält, dass sie aber, wenn die Aneinanderheilung der Nervenstücke verhindert wird, später verloren geht, so dass man nach 2 Monaten durch den auf das untere Nervenstück applicirten galvanischen Reiz eines einfachen Plattenpaars keine Zuckungen mehr in den Muskeln erregen kann. Selbst die Muskeln hatten ihre Reizbarkeit für das galvanische

Digitized by Google

Fluidum in mehreren Fällen verloren. Hiernach sprechen die vorhin erwähnten Versuche doch mehr für als gegen die Herstellung der Nervenleitung. Im dritten Falle allein fehlte die Reizbarkeit im untern Nervenstücke fast ganz, und in diesem Falle scheint daher zwar eine Vernarbung der Nerven, aber keine Herstellung der Leitung statt gefunden zu haben. Da der Einfluss des Gehirns und Rückenmarks auf die Nerven zur längern Erhaltung der Reizbarkeit eines Nerven, nach Sticker's Versuchen, nöthig ist, so giebt die blosse Reizbarkeit des untern Stückes eines durchschnittenen Nerven nach mehreren Monaten den Beweis ab, dass die Heilung mit Herstellung der Leitung verbunden war. Schwann hat neulich einen Versuch über die Reproduction der Nerven bei einem Frosche angestellt. Er durchschnitt in der Mitte beider Oberschenkel den N. ischiadicus. In der ersten Zeit nach der Operation hüpfte der Frosch nur selten, sondern bewegte sich meistens durch Kriechen fort. Nach Verlauf eines Monates hüpfte er schon häufiger, und nach 3 Monaten ging diese Bewegung fast eben so gut von Statten, wie bei einem gesunden Frosch. Auch die Anfangs aufgehobene Empfindlichkeit in den Füssen war nach dieser Zeit grösstentheils zurückgekehrt. Wurden die blossgelegten Nerven hoch oben oder dicht über der Narbe mit einer Nadel gereizt, so entstanden starke Zuckungen an den entsprechenden Muskeln. Dasselbe zeigte sich, wenn die Nerven unter der Narbe und wenn die Muskeln selbst gereizt wurden. Bei der Untersuchung des Nerven fand Schwann Folgendes: Nachdem der Nerv (die Untersuchung konnte nur an Einem gemacht werden) von den umgebenden Theilen, womit er an der verletzten Stelle zusammenhing, getrennt war, bemerkte man ein Stück von ungefähr 1‴ Länge, welches nicht die glänzende Weisse zeigte, wie der übrige Nerv, sondern etwas mehr durchscheinend war. Es schien dadurch die Grenze angedeutet, wie weit sich die durchschnittenen Nerven, wenigstens das Neurilem derselben zurückgezogen hatte. Das mehr durchscheinende Stück musste also theils aus der aus dem durchschnittenen Nerven hervorquellenden Nervensubstanz, theils aus neu erzeugter Masse bestehn. Das ganze Stück liess sich aber nicht für hervorgepresste Nervenmasse erklären, weil es dafür zu lang war. Unter dem Microscop zeigte die fragliche Stelle aber an ihrer ganzen Länge dicht an einander liegende Nervenfäden, und das mehr durchscheinende Ansehn schien nur durch ein weniger vollständig reproducirtes Neurilem zu entstehn. Diese Fäden gingen continuirlich in die Nervenfäden der beiden Nervenstumpfe über, und wenn an einzelnen Stellen die Nervencylinder nur durch ganz dünne Fäden zusammenhingen, so liess sich diess durch die behufs der mikroskopischen Untersuchung vorgenommene Zerrung erklären. Der obere Nervenstumpf war übrigens eben so angeschwollen, wie es an den Nerven in Amputationsstümpfen zu seyn pflegt; beim unteren Nervenstumpf war diess nicht der Fall. Der Versuch von Schwann beweist die Reproduction der Nerven deutlich. Die Versuche von Haighton, von Prevost und von Tiedemann sind ohnehin platterdings nicht erklärlich, wenn man nicht eine Re-

Digitized by Google

production der Nerven annimmt. TIEDEMANN, der bei einem Hunde in der Achselhöhle die Nervenstämme des Vorderbeins, namentlich den N. ulnaris, radialis, medianus, cutaneus ext. durchschnitten, beobachtete nach 8 Monaten und noch mehr nach 21 Monaten eine Herstellung der Empfindung und Bewegung, so dass der Hund zuletzt den vollständigen Gebrauch des Fusses wieder erlangt hatte. Diess ist einer der überzeugendsten Versuche für die Regeneration der Nerven. Für die Regeneration der Nerven bei kleinen durchschnittenen Nervenfasern spricht auch die Wiederkehr einiger Empfindung in transplantirten Hautlappen, die nach der Transplantation und Anwachsung von der Hautbrücke, mit der sie früher noch zusammenhingen, getrennt werden, wie z. B. der aus der Stirn gebildete Hautlappen für die neue Nase nach dem Anwachsen an der Stelle des Zusammenhanges mit der Stirnhaut getrennt wird. Wenn hier keine Regeneration der feinen Nervenfäden an den Verwachsungsstellen einträte, so müsste ein solches Hautstück zuletzt ganz unempfindlich seyn. Nach den Erkundigungen, die ich in dieser Hinsicht bei dem Erfahrensten in diesen Dingen DIEFFENBACH, eingezogen, bleibt die Empfindlichkeit in diesen Theilen zwar immer sehr gering, aber sie ist doch nicht ganz zu läugnen.

Ein Umstand, der es besonders schwierig macht, sich eine deutliche Vorstellung von dem Hergange bei der Regeneration der Nerven zu machen, ist das Vorhandenseyn von Bündeln verschiedener Nervenfasern in manchen Nerven, motorischer und sensibler Fasern, wovon die ersteren, wie später gezeigt wird, allein die Fähigkeit haben, Muskelbewegungen zu erzeugen. Bei der Regeneration solcher Nerven müssten daher die motorischen Fasern mit den motorischen, die sensiblen mit den sensiblen verwachsen, was wieder schwer ist sich vorzustellen, wenn man die Feinheit dieser Fasern bedenkt. SCHWANN bezweckte bei seinem oben erwähnten Versuch hauptsächlich zu ermitteln, ob das Zusammenheilen von Empfindungs- und Bewegungsfasern an durchschnittenen Nerven dadurch bewiesen werden könne, dass, wenn die hinteren (Empfindungs-) Wurzeln solcher Nerven im Rückenmarkskanale gereizt werden, vielleicht Zuckungen entständen. Er legte daher an dem Frosche, an dem die N. ischiadici auf beiden Seiten durchschnitten und wieder zusammengeheilt waren, das Rückenmark bloss und durchschnitt die hinteren Wurzeln beider Seiten; allein es zeigte sich keine Bewegung in den Schenkeln, dagegen entstanden starke Zuckungen in den Muskeln des Unterschenkels, als die vorderen Wurzeln durchshnitten wurden. Aus diesem negativen Resultat aber liess sich kein Schluss gegen das Zusammenheilen von Empfindungs- und Bewegungsnerven ziehen, weil der Erfolg dadurch erklärt werden kann, dass die Empfindungsnerven vielleicht nicht das Vermögen besitzen, eine Reizung vom Centrum nach der Peripherie zu leiten.

Die von den Neuralgien hergenommenen Gründe für die Reproduction der Nerven sind wohl die schwächsten. Nach der Durchschneidung eines schmerzhaften Nerven kehren die Schmerzen oft wieder. Diess würde sich allein schon aus dem Umstande

Digitized by Google

erklären, dass das Nervenleiden seinen Sitz selbst über die Stelle der Durchschneidung nach dem Stamme hinauf ausdehne, und dass die Narbe des Nerven Schmerzen an dem Stamme errege. Dass diese später wieder erscheinenden Schmerzen in den äusseren Theilen empfunden zu werden scheinen, darf uns nicht wundern. Denn die Stämme der Nerven enthalten noch die Summe der Fasern, die sich in den Zweigen daraus entwickeln, und da die örtlichen Empfindungen durch die Verbindungen dieser Fasern mit dem Gehirne entstehen, so kann ein Nervenstumpf noch Empfindungen erzeugen, die in den äussern Theilen zu seyn scheinen. Diess kommt noch vor, wenn die äusseren Stücke gar nicht mehr vorhanden sind. Bei allen Amputirten, die ich untersucht, gehen die Empfindungen, als wenn die amputirten Theile noch vorhanden wären, nie ganz verloren; ich habe Amputirte 12 und mehr Jahre nach der Operation untersucht. Wenn die Nerven in dem Amputationsstumpf lange gedrückt werden, so haben sie die deutlichen Empfindungen, als wenn das Bein oder der Arm, die grösstentheils gar nicht mehr vorhanden sind, einschliefen. Dass diese Empfindungen einige Zeit nach der Amputation sich verlieren sollen, ist ein Irrthum der Aerzte und Chirurgen, welche die Kranken gewöhnlich nur einige Monate sehen.

Von besonderem Interesse sind Gruithuisen's Beobachtungen an sich selbst, nachdem er sich den Nervus dorsalis radialis pollicis am hintern Theile des 2. Gliedes durch eine bis auf den Knochen gehende grosse Querwunde durch Zufall zerschnitten hatte. Die linke Seite des Daumrückens war bis unter den Nagel ganz unempfindlich. Zur Zeit der Entzündung wurde diese Hautstelle schmerzhaft und litt an einem dauernden, stechenden und brennenden Schmerz. (Diess war wohl durch die Entzündung des Nervenstumpfes vom obern Theile des Nerven verursacht, und wurde nur scheinbar, wie nach Amputationen, in der unempfindlichen Haut gefühlt.) Diese Schmerzen verschwanden nach 8 Tagen mit der Heilung, worauf der unempfindliche Zustand wieder eintrat. Später trat einige Empfindung, aber eine nur höchst unbestimmte, ein. Gruithuisen konnte, wenn er die Augen schloss, auf einer Strecke von 2 Zoll Länge und $\frac{3}{4}$ Zoll Breite nicht bestimmen, wo er berührt wurde, und machte Fehler von 3—5 Linien. Wenn er auf die Narbe klopfte, hatte er die Empfindung von Prickeln unter dem Nagel. 8 Monate, nachdem er diese Beobachtungen angestellt, war die Empfindung durchaus noch eben so undeutlich wie früher. Gruithuisen schliesst mit der Bemerkung, dass die Empfindungseindrücke zwar durch die Nervennarbe geleitet werden können, allein sie werden nach ihm in dieser Narbe zu sehr ausgebreitet, als dass sie durch bestimmte Nervenfasern dem Sensorium wie von einem bestimmten Orte kommend erscheinen könnten. *Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie.*

Was die Reproduction des Gehirns und Rückenmarks betrifft, so liegen keine Thatsachen vor, welche beweisen, dass jemals die Folgen der Zerstörung der Gehirnmasse und des Rückenmarkes durch die Reproduction der neuen Substanz ganz hergestellt wer-

Digitized by Google

den. Arnemann sah zwar bei Hunden nach Verlust von 26—54 Gran Gehirn 7 Wochen später die Wunde von neuer gallertartiger gelblicher Substanz ausgefüllt, die sich leichter, als die Hirnsubstanz in Wasser löste. Es fragt sich aber, ob diese neue Materie wirklich Hirnsubstanz ist. Zerstörungen des grossen Gehirns an der Oberfläche haben oft keine auffallenden Folgen, wenn sie nicht mit Druck oder Irritation verbunden sind. Verletzungen des Rückenmarkes sind bekanntlich leider unheilbar. Das Gehirn vernarbt nach Flourens (*Versuche über die Eigensch. und Verricht. des Nervensystems*) zwar leicht, aber eine eigentliche Reproduction der Hirnsubstanz, die Arnemann angenommen, findet nach ihm nicht statt, indem die verwundeten Theile anfangs zwar aufschwellen, aber später wieder collabiren und einfach vernarben. Die Funktionen des Gehirns stellen sich zwar oft wieder her; allein diess geschieht, wenn es geschieht, öfter schon nach einigen Tagen, und die Reproduction hat wohl nicht allen Antheil daran. Indess soll doch die Wandung eines Hirnventrikels, wenn sie in einer Strecke weggenommen worden, durch Verlängerung der Rinde sich wieder herstellen.

b. *Regeneration bei suppurativer Entzündung.*

Die eiternde oder suppurative Entzündung bildet sich immer aus, wenn eine Wunde im exsudativen Stadium der Entzündung nicht heilen kann. Während der Heilung einer Wunde bei suppurativer Entzündung wird keine plastische Materie (aufgelöster Faserstoff), welche organisirbar ist, ausgeschieden, der Eiter ist nicht organisationsfähig. Home's Ideen über die Umbildung von Eiter in Fleischwärzchen, sind wohl ein gänzliches Missverständniss der Natur. Der Eiter entsteht durch eine Absonderung auf der Oberfläche oder im Innern des entzündeten Theiles, wobei der Eiter im Moment der Secretion nach Brugmans und Autenrieth flüssiger und klarer zu seyn scheint. Diese Absonderung scheint auf Kosten von durch die Entzündung zersetzter Materie zu geschehen. Die Eiterkügelchen sind ungleich, meist grösser als Blutkörperchen, mit denen sie keine Aehnlichkeit der Gestalt haben; sie sind entweder abgestossene Theilchen der eiternden Oberfläche, oder entstehen erst wie andere Kügelchen der Secrete in dem flüssigen Secretum im Moment der Secretion, auf ähnliche Art wie die Kügelchen im aufgelösten Eiweiss bei beginnender Coagulation entstehen.

Bei der Heilung der Wunden per primam intentionem im Stadio exsudationis der Entzündung, verwachsen die Wundränder mit Hülfe der organisirbaren aufgelösten Materie des Blutes. Bei der Heilung eiternder Wunden entstehen keine neuen Gefässe in vorher von der Oberfläche exsudirter Materie, sondern die eiternden Ränder und der Boden werden durch Wachsthum der organisirten Partikeln vorgeschoben. Die Meinungen der Schriftsteller über diesen einfachen Process waren zum Theil sehr sonderbar. Mehrere glauben, bei der Granulation einer eiternden Wunde finde zugleich Eiterung und Exsudation von coagulabler Materie statt, die sich organisire. Allein Eiterung und Exsudation von organisirbarer Materie schliessen sich immer aus, und können

Digitized by Google

nicht zugleich auf einer und derselben Stelle einer Wunde statt finden. Langenbeck urtheilte, dass die Heilung dann erst eintrete, wenn die eiterabsondernden kleinen gefässreichen Erhabenheiten oder Granulationen diese Absonderung einstellen, und plastische Materie absondern. Diess lässt sich jedoch nicht behaupten. Eine Wunde von guter Eiterabsonderung bildet neue Substanz durch Wachsthum und wird kleiner, während zu gleicher Zeit auf ihrer Oberfläche die Eiterung, fortdauert, wie man so oft sieht, und wie auch Pauli immer fand. Da nun die Granulationen nicht vorher exsudirt sind, so kann man nach meiner Ansicht bloss annehmen, dass die schon organisirte Substanz des Wundbeckens am Rande und in der Tiefe sich wachsend ausdehne durch Intussusceptio, ähnlich dem gewöhnlichen Wachsthume aller organisirten Theile, nur viel rascher. Bei dieser Art der Substanzbildung organisirt sich nicht der auf der Oberfläche ergossene liquor sanguinis, vielmehr wird diese Materie zwischen den Partikeln der äussersten Wundschicht organisirt, während die neue Substanz der Oberfläche zu eitern fortfährt. Die eiternde Wunde wächst daher in allen Dimensionen vom Rande wie von der Tiefe gleichförmig zu ihrer eigenen Verkleinerung vor. Diese Productionen des Beckens der Wunde von körniger Oberfläche werden Granulationen genannt. Sie enthalten nicht die Enden der Gefässe, welche etwa den Eiter absondern, denn Enden der Blutgefässe giebt es an keinem Orte, sondern sie enthalten Capillargefässnetze. Der Eiter wird also nicht von Blutgefässenden abgesondert, sondern von der exponirten Oberfläche der Granulationen. Da nun das Vordringen der organisirten Theile von allen Seiten, vom Rande wie von der Tiefe aus, gleichförmig geschieht, so wird die Circumferenz der Wunde und das Becken immer kleiner, und zuletzt punktförmig, oder auf Null reducirt, wodurch die Eiterung von selbst aufhört. Nur wenn der Boden stärker als die Ränder wächst, erhebt sich der granulirende Boden über die Ränder empor; in diesem Zustande kann die eiternde Wunde nicht reducirt werden, und das rechte Verhältniss der wachsenden Ränder zum wachsenden Boden wird durch Cauterisation hergestellt. Im entgegengesetzten Falle, wenn der Boden im Wachsthume zurück bleibt, wird die Wunde sinuös, und die Ränder müssen aufgeschlitzt werden. Bei ganz oberflächlicher Eiterung hört zuletzt die Eiterung mit der Entzündung auf, ohne dass es der Reduction bedarf. Von den Capillargefässen einer eiternden Wunde hat Pauli *de vulneribus sanandis comment. physiol. chirurg. praemio ornata. Gott.* 1825. eine mikroskopische Abbildung gegeben. Ueber die im Eiter aufgelösten Stoffe liefert die Untersuchung von Gueterbock Aufschluss. Der Eiter enthält Eiweis und eine eigene Materie, die der Verf. Pyin nennt. Letztere gehört mit dem Käsestoff und Chondrin in die Reihe der Substanzen die von einem Minimum von Essigsäure gefällt werden; sie unterscheidet sich von beiden aber bestimmt. Sie wird von Essigsäure gefällt und wie das Chondrin von überschüssiger Essigsäure nicht aufgelöst; von Alaun wird sie gefällt, aber wie der Käsestoff von überschüssigem Alaun nicht aufgelöst,

Digitized by Google

während Chondrin wieder ausgelöst wird und Käsestoff hinwieder von überschüssiger Essigsäure aufgelöst wird. Salzsäure fällt; überschüssig löst sie wieder auf. Die saure Auflösung wird von Kaliumeisencyanid nicht gefällt. Die Materie ist in Wasser löslich, wird von Weingeist gefällt und von Wasser wieder aufgelöst. Im Schleim ist dieser Stoff auch enthalten, aber der Schleim enthällt nicht das Osmazom und das Eiweis des Eiters. Eiter und Tuberkel sind sehr verschieden.

Bei grossen Substanzverlusten der Haut wird diese theils durch Production der Ränder, theils durch Verdichtung des Zellgewebes ersetzt, was man z. B. in hohem Grade bei Verlust von grossen Theilen des Hodensackes beobachtet hat. Bei grossem Substanzverluste der Haut mit Nekrose der Knochen, wo das nekrotische Knochenstück abgestossen wird, und die weichwerdende granulirende Oberfläche des Knochens empor wächst (wie wir z. B. bei einem grossen Substanzverlust der Schädeldecken und Nekrose eines grossen Theils der äussern Lamelle des Schädels nach Verbrennung gesehen haben), scheint die Narbensubstanz zum Theil von Verlängerung der Hautränder, zum Theil selbst durch Zellgewebe-Production der Oberfläche des granulirenden Knochens, der sich auch wieder seine Beinhaut bildet, zu entstehen.

Der Process, welcher auf die Nekrose der Knochen erfolgt, bietet ein grosses physiologisches Interesse dar.

Ein Knochen wird nekrotisch oder stirbt ab, entweder in Folge eines übeln Ausganges der (dyskrasischen) Knochenentzündung, oder in Folge von Zerstörung seiner Gefässe durch Zerstörung der Beinhaut oder des Markgewebes. Wird die Beinhaut, die durch ihre Gefässe in dem innigsten Zusammenhange mit den Gefässen des Knochens steht, in beträchtlicher Strecke zerstört, so stirbt die äussere Schichte des Knochens (nicht die ganze Dicke des Knochens) ab, weil die Gefässe der äussern Schichte durch Zerstörung der Beinhaut ausser Thätigkeit gesetzt sind. Wird das Markgewebe eines Knochens durch Entzündung oder künstlich in einem durchsägten Röhrenknochen eines Thieres zerstört, so sterben die inneren Schichten des Knochens (nicht die ganze Dicke des Knochens) ab, weil die Gefässe der inneren Schichten des Knochens mit den Gefässen des Markgewebes im innigsten Zusammenhange stehen. Merkwürdig ist nun der Process, welcher bei der innern Nekrose in den äusseren noch lebenden Theilen des Knochens, bei der äusseren Nekrose in den inneren noch lebenden Theilen des Knochens entsteht. Dieser Theil des Knochens entzündet sich, die Folge dieser Entzündung ist im Stadium exsudativum Ausschwitzung, wie beim entzündeten gebrochenen Knochen, worauf später die ausgeschwitzte Masse wie bei den Knochenbrüchen organisirt und ossificirt wird. Hat man den Knochen äusserlich verletzt, und eine äussere Nekrose bewirkt, so erfolgt die Exsudation auf der innern Fläche der Höhle der Röhrenknochen, wodurch die Markhöhle verkleinert wird. Dieser Callus auf der innern Fläche der Röhrenknochen verstärkt nun die Dicke des Knochens, dessen äussere Schicht abgestorben ist. Bewirkt man dagegen eine Zerstörung

Digitized by Google

des Markes an einem durchsägten Röhrenknochen eines Thieres, worauf die innere Schichte abstirbt, so erfolgt die Exsudation auf der äusseren Fläche von den äussern noch lebenden Schichten des Knochens. Diese Exsudationen sieht man am deutlichsten bei Thieren, in deren hohle Knochen man einen heissen Stab bringt, oder deren Knochen man mit Wolle ausstopft.

Die Aufschwellung dauert während des ganzen Verlaufes der Knochenentzündung fort, und erscheint erst recht deutlich, wenn der Knochen sich gegen das nekrotische Stück hin erweicht, und hier überaus gefässreich wird; dieses Wachsthum des entzündeten und erweichten Knochens hat bei den Säugethieren den grössten Antheil an der Regeneration des nekrotischen Knochentheils. An der Stelle, wo die gesunde äussere Schichte die innere nekrotische oder die gesunde innere Schichte die äussere nekrotische berührt, wird die noch lebende entzündete Knochenschichte ganz weich, roth, granulirend, und wächst bei der innern Nekrose nach aussen vor, wodurch um die nekrotische innere Schichte (Sequester) nicht eine neue Röhre, sondern eine Verstärkung der äussern Schichte entsteht, oder unterhalb der äussern abgestossenen nekrotischen Schicht eine Verstärkung der innern Schicht nach aussen sowohl als gegen die Markhöhle hin erfolgt. Diese Aufschwellung dauert fort, während die Oberfläche des entzündeten und erweichten Knochens entweder nach innen gegen die innere Nekrose, oder nach aussen hin gegen die äussere Nekrose Eiter abzusondern fortfährt.

Ist die ganze Dicke eines Knochens abgestorben, so kann kein Knochen regenerirt werden; die Beinhaut hat nichts damit zu schaffen; dagegen erfolgt die Regeneration in der Regel, wenn bloss die äussere oder innere Schicht abgestorben ist; es wird aber hier kein neuer Knochen gebildet, sondern das bei der innern Nekrose abgestorbene Röhrenstück ist nur eben die innere Schicht des Röhrenknochens, und die neue Röhre um die abgestorbene ist auch eben nur die verstärkte und aufgeschwollene äussere Schichte des Röhrenknochens.

Man hat sich viel gestritten, ob die Reproduction der neuen Knochenmasse, welche den Sequester bei der innern Nekrose einschliesst, von der Aufschwellung der äussern Schichten des Knochens oder von der überkleidenden Beinhaut ausgehe. Weidmann (*de necrosi ossium*) nimmt beide Fälle an. Troja behauptet nach seinen neueren Versuchen das Erstere, und Scarpa hat es neuerdings als richtig erwiesen. Meding dagegen vertheidigt die Reproduction des Knochens durch die Beinhaut. Es ist für's Erste nicht begreiflich, dass eine Haut, wie die Beinhaut, welche nur Träger der von ihr in den Knochen eindringenden Gefässe und Hülle desselben ist, organisirte Knochenmasse bilden soll. Gegen diese Vorstellung habe ich mich schon pag. 376. erklärt, Allein es lässt sich bestimmt durch Versuche an Säugethieren (die hierzu besser geeignet als die Vögel sind) zeigen, dass die Bildung der neuen Röhre theils durch Exsudation (im Stadio exsudativo) auf der Oberfläche des Knochens geschieht, welche man auch für Exsudation des entzündeten Knochens und nicht

Digitized by Google

der Beinhaut anzusehen hat, dass aber der grösste Theil der Knochenmasse nur durch das während der ganzen Eiterung fortdauernde Wachsthum der äussern Schichte (bei der innern Nekrose) gebildet wird. Ich berufe mich hier auf die trefflichen Beobachtungen meines Collegen M. J. Weber, die Bannerth in seiner interessanten Dissertation zugleich bekannt gemacht, und wozu er die Abbildungen der Präparate gegeben hat. Miescher hat übrigens bewiesen, dass die Vorstellung von Scarpa von einer Expansion des alten Knochens nicht ganz richtig ist, indem die Anschwellung der noch vorhandenen äussern gesunden Schichte durch Exsudation geschieht.

Alles, was ich hier über die Reproduction der Knochen bemerkt habe, beruht theils auf Untersuchung der Weberschen Präparate, theils auf Miescher's Beobachtungen. Versuche von Pockel's über die Regeneration nach innerer Nekrose an mehreren Thieren, die wir gemeinschaftlich in Braunschweig secirten, lieferten übereinstimmende Resultate. Vergl. Troja, *neue Beob. u. Vers. über d. Knochen.* übers. von Schoenberg *Erlang.* 1828. Koehler *exp. circa regenerationem ossium. Gott.* 1786. Kortum *diss. exp. et observ. circa regenerationem ossium. Berol.* 1824. Meding *diss. de regeneratione ossium. Lips.* 1823. Scarpa *über die Expansion der Knochen und den Callus. Weimar* 1828. Bannerth, *Naturae conaminum in ossibus laesis sanandis indagatio anatomica physiologica. Bonnae* 1831.

Die reichhaltigste Zusammenstellung der Litteratur über die Reproduction der verschiedensten Theile liefert die vorher erwähnte Preisschrift von Pauli.

Digitized by Google

Berlin, gedruckt bei den Gebrüdern Unger.

Digitized by Google

HANDBUCH

der

PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN

für Vorlesungen.

Von

Dr. Johannes Müller,

ordentl. öffentl. Professor der Anatomie und Physiologie an der Königl. Friedrich Wilhelms-Universität und an der Königl. medicin.-chirurg. Militär-Academie in Berlin, Director des Königl. anatom. Museums und anatom. Theaters; Ritter des Rothen Adlerordens 4. Classe; Mitglied der Königl. Academieen der Wissenschaften zu Berlin und zu Stockholm, Correspondent der Kaiserl. Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg, der Königl. Academie der Wissenschaften zu Turin, Mitglied der Königl. Soc. d. Wissensch. zu Göttingen und Upsala.

Ersten Bandes zweite Abtheilung.

Dritte verbesserte Auflage.

Mit Königlich Würtembergischen Privilegien.

Coblenz,

Verlag von J. Hölscher.

1838.

Digitized by Google

Digitized by Google

III. Abschnitt. Von der Absonderung.

I. Capitel. Von den Absonderungen im Allgemeinen.

Während das Blut aus den feinsten Zweigen der Arterien durch die Capillargefässnetze in die Anfänge der Venen übergeht, dringen die flüssigen, d. h. aufgelösten Theile des Bluts nach den pag. 242 dargestellten Gesetzen durch Tränkung zum Theil in das Gewebe der Organe ein. Diese erleiden durch die Einwirkung des Gewebes eine chemische Veränderung: gewisse Bestandtheile werden angezogen, andere werden von den Organtheilen selbst an das Blut abgegeben. Man kann diese Veränderungen der aus dem Kreislaufe des Blutes abgehenden Theile desselben im Allgemeinen Metamorphose nennen. Die Metamorphose der Substanz auf diesem Wege ist aber überhaupt eine dreifache: 1. Verwandlung von Bestandtheilen des Bluts in die organisirte Substanz verschiedener Organe — *Intussusceptio*, Ernährung. Diese ist im vorhergehenden Abschnitt pag. 350 abgehandelt. 2. Verwandlung von Bestandtheilen des Bluts auf der flächenhaften Grenze eines Organes in feste, nicht organisirte Substanz, wodurch die nicht organisirten Theile wachsen — *Appositio*. Davon ist pag. 378 gehandelt. 3. Verwandlung von Bestandtheilen des Blutes auf der flächenhaften Grenze eines Organes in eine auszuscheidende flüssige Materie — *Secretio*, Absonderung. Diese ist der Gegenstand der gegenwärtigen Untersuchung. Materien, welche durch diesen chemischen Process zwischen dem Blute und einem absondernden Apparat ausgeschieden werden, sind theils: 1. Bestandtheile, welche als solche bereits in dem Blute vorhanden waren und bloss aus demselben entfernt werden, wie die Ausscheidung des Harnstoffs durch die Nieren, die Ausscheidung der Milchsäure und milchsauren Salze durch den Urin und durch den Schweiss — *Excretio*, *Excreta*. Bei dem Menschen sind die in der Thierwelt allgemeinsten *Excreta*, Harn und Schweiss, sauer; indessen ist es nicht constant, dass die Excretionsstoffe sämmtlich sauer reagiren, wie Berzelius einst die Absonderungen ordnete: denn der Harn einiger pflanzenfressenden Thiere reagirt alkalisch und die eigenthümlichen *Excreta* mehrerer Thiere sind zuweilen alkalisch, wie ich z. B. den scharfen Excretionsstoff der Haut der Kröten gefunden habe. 2. Absonderungen von Materien, welche nicht unmittelbar aus dem Blut abgeschieden werden können, indem sie darin nicht vorhanden sind; die vielmehr aus näheren Bestandtheilen des Bluts erst durch einen chemischen Prozess erzeugt werden, wie die Galle, der

Digitized by Google

Samen, die Milch, der Schleim u. s. w. *Secretio.* Die *Secreta* dieser Art sind zum Theil auch wieder bloss Ausscheidungen, welche weiter keinen Zweck in der thierischen Oekonomie mehr erfüllen, sondern höchstens zum Schaden für andere thierische Wesen und zur Vertheidigung derjenigen, welche sie bilden, dienen oder durch Verbreitung eigenthümlicher Gerüche andere thierische Wesen anziehen oder abstossen u. s. w., und dadurch in weiteren Kreisen in den Plan der thierischen Oekonomie der Natur eingreifen. Dergleichen Excretionsstoffe werden an fast allen Theilen der Körperoberfläche in der Thierwelt abgesondert. Es gehören z. B. hierher die scharfen Absonderungen vieler Käfer, der Wespen, der Bienen, des Scorpions, die Spinnmaterie der Spinnen, Insekten, Muscheln, der Tintenbeutel der Cephalopoden, die Submaxillar-Moschusdrüse des Crocodils, die Folliculi lacrymales der Wiederkäuer, die Gesichtsdrüsen der Fledermäuse, die Schläfendrüse des Elephanten, die mit unzähligen Oeffnungen (und nicht mit einer Längenspalte, wie Geoffr. St. Hilaire angab) sich öffnenden Drüsen im Hypochondrium der Spitzmäuse, die Rückendrüse des Tajassu, die Oeldrüsen über dem Steiss der Vögel, die Moschusdrüse am Schwanz des Sorex moschatus, die Afterdrüsen der Fischotter, des Maulwurfs, des Bibers, der Hyäne, des Zibetthiers u. s. w., die Vorhautdrüsensäcke der Hamster und Ratten, des Bibers, worin das Bibergeil enthalten, die Folliculi inguinales der Hasen, der Moschusbeutel des Moschusthiers unter der Haut des Unterleibs, über dem *Penis* gelegen und vor der Vorhaut sich öffnend; die Schenkeldrüsen mehrerer Eidechsen, die Giftschenkeldrüse des Schnabelthiers, die Klauendrüse mehrerer Wiederkäuer. Siehe das Nähere in J. Mueller *de glandularum secernentium structura penitiori. Lipsiae* 1830. Diese Excretionsstoffe können Wirkungen ausser dem Thiere hervorbringen, aber auch für die thierische Oekonomie desjenigen Organismus, welcher sie ausscheidet, in sofern wichtig werden, als die Bildung dieser Stoffe auf Kosten gewisser näherer Bestandtheile des Bluts geschehen muss, das Blut also durch die beständige Ausscheidung gewisser, zu dieser Zusammensetzung nöthiger Elemente selbst chemisch verändert wird. Die Unterdrückung dieser Absonderungen würde zum Theil vielleicht eben so nachtheilig wirken, wie die Unterdrückung gewisser krankhafter Ausscheidungen bei dem Menschen, welche gleichsam als Apparate für die Erhaltung der gesunden Mischung des Blutes zu betrachten sind. Wenn sich eine organische Verbindung ausser dem thierischen Körper in eine andere umwandelt, so werden gewisse Bestandtheile, die zu dieser zweiten Verbindung überflüssig sind, ausgeschieden, wie bei der Umwandlung des Zuckers in Weingeist Kohlensäure entweichen muss. Unter demselben Gesichtspunkt kann man nicht bloss die Ausscheidung des Schweisses und Harnes, sondern auch die der eigenthümlichen Excretionsstoffe mancher Thiere betrachten. Die Bildung und Ausscheidung des Harnstoffes ist für die Erzeugung einer edlern organischen Verbindung dasselbe, was die Ausscheidung der Kohlensäure bei Bildung des Weingeistes aus Zucker. Wendet man diess auf die Ausscheidung krank-

Digitized by Google

hafter Stoffe an, so muss man wohl zweierlei krankhafte Absonderungen unterscheiden: bei der einen Art ist ein krankhaftes Secretionsprodukt dermalen zur Erhaltung der gesunden Mischung des Bluts nöthig und so lange der Mischungsprocess des Blutes überhaupt nicht günstig verändert worden, lässt sich eine solche krankhafte Secretion ohne Schaden nicht aufheben. Ganz anders ist es mit den krankhaften Secretionen, welche bloss örtliche Bedingungen haben. Nach der Amputation, die bei einer grossen, aber nicht dyskrasischen Eiterung angestellt wird, ist es daher aus physiologischen Gründen nicht zu rechtfertigen, wenn die Chirurgie zuweilen aus Missverständniss der physiologischen Vorgänge vicarirende Absonderungen einrichten will und die Heilung per primam intentionem fürchtet.

Andere Secrete der zweiten Art erfüllen in der thierischen Oekonomie des Organismus noch weitere Zwecke, wie die Milch, die Galle, der Samen, der Schleim. Die wahren Secreta sind häufig alkalischer Natur, aber keineswegs immer und oft verändert sich ein und dasselbe Secretum unter leichten Bedingungen aus der alkalischen in die saure, und aus der sauren in die alkalische Beschaffenheit, wie der Speichel und pankreatische Saft. Eine vollständige Zusammenstellung über die sauere oder alkalische Reaction der thierischen Flüssigkeiten hat Schultze in seiner vergleichenden Anatomie gegeben. Die Bildung solcher eigenthümlichen Secreta, die im Blut schon enthalten sind, setzt einen specifisch wirksamen chemischen Apparat, sey es eine Haut oder eine Drüse, voraus. Mit der Zerstörung dieses Apparats hört jene Absonderung für immer auf, wie die des Samens nach Entfernung des Hodens, der Milch nach Entfernung der Brustdrüse, und es ist nicht richtig, was Haller einst behauptete (*Elem. Physiol. II.* 369), dass fast alle Secreta von jedem Secretionsorgane krankhafter Weise abgesondert werden könnten. Man muss nämlich hiermit nicht die ganz verschiedenen Fälle verwechseln, wo das natürliche Organ abzusondern fortfährt, aber der Ausfluss des Secrets durch die natürlichen Wege gehemmt, dasselbe durch Resorption ins Blut aufgenommen wird, und von diesem aus in anderen Wegen schlechthin exsudirt. Nur die Excretionsstoffe der ersten Art können sich nach Zerstörung ihres Ausscheideorgans aus den Wegen des Kreislaufs allenthalben durch Exsudation absetzen, weil sie, wie z. B. der Harnstoff, im Blute selbst schon enthalten sind. Siehe oben pag. 159.

Die chemischen Apparate der thierischen Secretionen sind theils Zellen, wie die Fettzellen, theils ebene Häute, wie die Synovialhäute und serösen Membranen, theils Organe von eigenthümlicher, zusammengesetzter Structur — Drüsen.

1) *Absondernde Zellen.* Hierher gehören die Zellen des Eierstocks (*Vesiculae Graafianae*) mit einer eiweissstoffhaltigen Flüssigkeit gefüllt, in welchen sich das viel kleinere Ovulum bildet; ferner die Zellen des Hodens einiger Fische, wie des Aals, der Pricke und einiger anderer, bei welchen nämlich der Hoden keine Samenkanälchen und keinen Ausgang besitzt, wie Rathke zuerst beobachtet, und der Same durch Zerplatzen der Zellen in die

Digitized by Google

Bauchhöhle gelangt, von wo er durch eine einfache Oeffnung ausgeführt wird. Am ausgebreitetsten ist die Absonderung durch Zellen in dem Fettzellgewebe. Hier ist der Ort, einige Bemerkungen über Zellgewebe überhaupt mitzutheilen.

Das Zellgewebe, welches durch seine Eigenschaft, andere Gewebe mit einander zu vereinigen, auch Bindegewebe genannt werden könnte, ist in der neuern Zeit einer der räthselhaftesten Körper geworden, indem man nämlich nach Bordeu, Wolff und Meckel angefangen hat, dessen Structur zu läugnen und als einen zwischen die Organtheile gelegten Schleim zu betrachten, dessen häutige und zellige Beschaffenheit erst durch Einfluss von Luft oder durch ein Auseinanderziehen desselben oder durch infiltrirte Flüssigkeit entstehe. Diese Vorstellungen sind durch die weichere Beschaffenheit dieses Stoffs bei dem Embryo bestärkt worden. Man ist selbst zu der ganz fabelhaften Vorstellung gekommen, dass sich beim Embryo alle Organe aus Zellgewebe erzeugen, da doch der Keimstoff eines Organes, den wir *Blastema* genannt haben, etwas viel edleres, mit productiven Kräften begabtes und vom Zellgewebe ganz verschiedenes ist. Die Beschaffenheit dieses Keimstoffes lässt sich ganz besonders deutlich bei der Entstehung der Drüsen erkennen: er ist bei den Drüsen eine gelatinöse, halbdurchsichtige Materie, in welcher die Verzweigung der Drüsenkanälchen baumartig entsteht und durch Aestetreiben fortschreitet, so dass dieser Stoff eine Art Atmosphäre um die Drüsenkanälchen bildet, welche anfangs sehr ausgebreitet ist, und im Maasse mit dem Wachsen des Drüsensystems gleichsam von ihm absorbirt wird. Bei den gelappten Drüsen, der Thränen- und den Speicheldrüsen ist dieser Keimstoff in der Folge auch lappig. Siehe J. Mueller *de glandularum structura penitiori. Tab. VI. Fig.* 11. 12. *Tab. V. Fig.* 8.

Die unrichtige Vorstellung von der Bildung des Zellgewebes rührt davon her, dass man die mikroskopische Untersuchung desselben vernachlässigt hat, oder zu unvollkommene Instrumente hierzu anwenden konnte. Alles Zellgewebe besteht aus ganz überaus feinen Fasern, die Treviranus und Krause kannten, und aus nichts Anderem, weder Kügelchen noch Blättchen. Diese Fasern gehören unter die feinsten Theile des menschlichen Körpers und sind ohngefähr so stark, wie die Primitivfasern des Sehnengewebes. Selbst die Häute der Fettzellen entstehen erst durch Aneinanderlegen dieser Fasern, welche man erst bei einer 400maligen Vergrösserung ihres Durchmessers sieht. Diese Primitivfasern des Zellgewebes sehen fast so wie Primitivfasern des Sehnengewebes aus, mit welchen das Zellgewebe auch dadurch übereinstimmt, dass es beim Kochen Leim giebt. Die Fasern des Zellgewebes sind zu Lamellen und kleinen Häutchen verbunden, und diese Lamellen oder Bündel von Zellgewebefasern liegen nun in den mannigfaltigsten Richtungen durcheinander, so dass sie ein unregelmässiges Spinngewebe von kleinen Bündeln und Lamellen erzeugen, dessen Interstitien untereinander communiciren, wie man durch das leichte Aufblasen derselben ermittelt. Durch diesen letzten Umstand und durch seine Structur überhaupt unterscheidet sich das thie-

Digitized by Google

rische Zellgewebe von dem Pflanzenzellgewebe, welches meist eckige geschlossene Zellen bildet. Die Primitivfasern in der *Fascia superficialis* stimmen durchaus mit denen des Zellgewebes überein. Diese dünneren Faserhäute scheinen bloss durch die Dichtigkeit des Strickwerks des Zellgewebes zu entstehen. In den eigentlichen Fascien und Sehnen liegen die Fasern schichtweise in gewissen Richtungen, und bilden Faserbündelchen, welche, wie die Fasern des fibrösen Gewebes überhaupt, wohl nicht aus dichten Ordnungen von Primitivfasern des Zellgewebes, sondern aus eigenthümlichen Fasern bestehen. Das Zellgewebe wird nun in seröses und Fettzellgewebe eingetheilt. Die Vorstellung von der Zusammensetzung des Zellgewebes aus Lymphgefässnetzen wird durch das mikroskopische Verhalten und durch den unmittelbaren Uebergang in die Fascia superficialis unwahrscheinlich. Diese Bemerkungen über den Bau des Zellgewebes sind aus einer kleinen Arbeit von Jordan über die *Tunica dartos* und die verwandten Gewebe (Mueller's *Archiv.* 1834. *p.* 410.) entnommen. Ich bemerke, dass ich die Beobachtungen des Verf. selbst verificirt habe.

Das Fett ist ein blosses Depositum in den Zellen des Zellgewebes, theils unter der Haut im *Panniculus adiposus*, theils im *Omentum*, in der Umgegend der Nieren und in dem Mark der Knochen und stellenweise an vielen anderen Theilen. Die Fettzellen des Menschen sind rundlich, die des Schafes und der Thiere mit Talgfett polyedrisch. Eine besondere Structur scheint zu dieser Absetzung aus dem Blute nicht nöthig, weil eben in allen Theilen Fett sich abscheiden kann. Diese Materie ist übrigens ohne alle Organisation und bei der Temperatur des menschlichen Körpers selbst flüssig oder weich. Die verschiedenen Fettarten in der Thierwelt unterscheiden sich vorzüglich durch den Temperaturgrad, bei welchem sie weich und flüssig werden, und durch einen verschiedenen Gehalt an Stearin und Elain, in der Schmelzbarkeit verschiedenen Fettarten. Das Menschenfett gehört zu den weicheren Fettarten. Das Fett der kaltblütigen Thiere ist bei gewöhnlicher Temperatur noch flüssig. Die Zusammensetzung des Fettes ist schon pag. 136 angegeben. Dieses freie Fett ist stickstofflos, während andere Fettarten, wie das gebundene Fett im Blut und im Gehirn, stickstoff- und phosphorhaltig sind. Stearin und Elain sind übrigens in Aether und heissem Weingeist löslich, Elain bleibt in dem erkalteten Weingeist gelöst. Der Nutzen des Fettes besteht offenbar theils in seiner Verwendung zur Ausgleichung der Formenverhältnisse, theils dient dasselbe als schlechter Wärmeleiter zum Schutz der inneren Theile. Das Fett kann aber auch als ein deponirter Nahrungsstoff betrachtet werden, der bei Hungernden und auch bei dem Schwinden der Theile durch Bindung mit anderen Thierstoffen oder verseift ungemein leicht wieder aufgelöst und in die Blutmasse wieder aufgenommen, zu organischen Combinationen weiter verwandt wird.

2) *Absondernde Häute.* Unter die absondernden Häute gehören vorzüglich die serösen Häute, die Schleimhaut und die äussere Haut.

a. Seröse Häute. Die serösen Häute scheinen aus ähnlichen Fa-

Digitized by Google

sern wie das Zellgewebe zu bestehen, die auf dieselbe Weise zu Bündelchen verbunden und durch einander gewirkt sind. Sie bilden drei Ordnungen: 1. *Bursae synoviales*, sowohl *subcutaneae*, als die *Bursae synoviales tendinum*, welche den durch sie hindurchgehenden, oder an ihnen vorbeigehenden Sehnen einen Ueberzug geben. 2. Synovialhäute der Gelenke. Wenn Sehnen oder Bänder durch Gelenke hindurch gehen, so erhalten auch diese einen Ueberzug. Die Synovia ist eine alkalische eiweisshaltige Flüssigkeit, welche durch Kochen coagulirt. 3. Seröse Häute der Eingeweide. Sie sind sackförmig geschlossen und entstehen als häutige Grenzen, wo Eingeweide frei einander berühren oder in Höhlen liegend von anderen Theilen abgesondert sind. Die durch eine seröse Haut begrenzten Eingeweide sind von aussen so in den serösen Sack eingedrückt, dass sie selbst davon wieder einen Ueberzug erhalten. Von dem Gesetz, dass die serösen Häute geschlossene Säcke sind, giebt es nur selten Ausnahmen, wie z. B. die Oeffnung der Eierröhren des Menschen und aller übrigen Wirbelthiere (bis auf einige Fische) in die Bauchhöhle, ferner die Oeffnungen, welche doppelt bei den Haifischen und Rochen, einfach beim Aal und bei den Pricken von aussen in die Bauchhöhle führen. Bei den Stören, Haifischen und Rochen hängt der Herzbeutel selbst mit der Bauchhöhle zusammen, und bei den Ammocoetes und Myxinoiden ist dieser Zusammenhang am grössten *).

Man stellt sich häufig vor, dass die serösen Höhlen während des Lebens mit einem Gas angefüllt seyen, ohne zu fragen, was diess für ein Gas seyn könnte. Diess ist eine unrichtige Vorstellung. Die serösen Säcke sind während des Lebens so von ihren Eingeweiden angefüllt, dass gar keine Zwischenräume innerhalb derselben vorhanden sind, und es wird von den Oberflächen der serösen Häute während des Lebens nur so viel Flüssigkeit abgesondert, um die einander berührenden Wände schlüpfrig zu erhalten und vor Verwachsungen zu schützen. So sind die Bauch-eingeweide unter dem beständigen Druck der Bauchmuskeln zusammengepresst; nur im Innern des Darmkanals erleidet der Raum der Bauchhöhle nach oben und abwärts Veränderungen. Zwischen Pleura costalis und pulmonalis ist während des Lebens nicht der geringste Zwischenraum, indem die Oberflächen der Lungen durchaus immer den Bewegungen des Thorax folgen, wodurch allein das Athmen möglich ist. Auch zwischen Herzbeutel und Herz braucht man keine gasförmigen Stoffe und keine Flüs-

*) Bei den Vögeln sollen nach der gewöhnlichen Annahme die aus den Bronchien der Lungen durch Oeffnungen auf der Oberfläche derselben sich verlängernden Luftsäcke auch in die Bauchhöhle herabsteigen und in diesen Luftzellen die Baucheingeweide alle liegen. Diess ist aber ein Versehen, denn nach meinen Beobachtungen an Hühnern liegen die beiden Hälften der Leber und der grösste Theil des Darmkanals zwischen den auf beiden Seiten herabsteigenden Luftzellen in besondern mit den Luftzellen gar nicht communicirenden Abtheilungen der Bauchhöhle, in welche bei einer Injection der Luftzellen durch die Luftröhre nichts eindringt.

Digitized by Google

sigkeit während des Lebens anzunehmen; denn immer ist ein Theil des Herzens vom Blut ausgedehnt, während der andere Theil des Herzens zusammengezogen ist. Durch die Anhäufung des Blutes in dem eben erweiterten Theil des Herzens, sey es Vorhof oder Kammer, wird also die Hohle des Herzbeutels in jedem Augenblick ausgefüllt, und wenn auch durch die Zusammenziehung eines Theils des Herzens im Herzbeutel ein luftleerer Raum entstehen könnte, so würden die anliegenden Lungen vermöge des Luftdrucks von aussen durch die Bronchien, den Herzbeutel verdrängend, diesen leeren Raum einzunehmen suchen.

Die serösen Säcke stehen unter sich in sympathischer Verbindung, und theilen sich einander leicht Entzündungen mit. Eine diesen Säcken eigenthümliche Krankheit ist die Ergiessung von Blutwasser in dieselben, welche leicht durch organische Krankheiten der ihnen anliegenden Eingeweide entsteht. Ueber die Gefässe der serösen Häute siehe oben pag. 213.

b. Schleimhäute. Ueber den feinern Bau siehe oben den Artikel von der Ernährung. Die Schleimhäute kommen überall vor als innere häutige Begrenzungen, wo innere Theile mit der Aussenwelt in offener Verbindung stehen, überall wo etwas ausgeschieden oder aufgenommen wird. Sie sind weich und sammetartig, überaus gefässreich, im Mund und in der Speiseröhre von Epithelium bedeckt, ihr Gewebe giebt beim Kochen keinen Leim und zeichnet sich durch die leichte Maceration in Wasser und durch die Auflöslichkeit in Säuren aus. Ihre äussere Fläche liegt an anderen Geweben an, an der Zunge auf Muskeln, an den knorligen Theilen der Nase auf Perichondrium, in den Siebbeinzellen, Keilbeinhöhlen, Kieferhöhlen, Stirnhöhlen, gleichwie in der Trommelhöhle auf Periostium; im Darmkanal liegt die äussere Oberfläche dieser Haut an einer Art fester Fascia an (*Tunica propria* des Darmkanals), welche eben so auch wieder den Muskelfasern der dritten Haut des Darmkanals zur Befestigung dient. Man kann mehrere Hauptausbreitungen der Schleimhäute unterscheiden: 1. die Schleimhaut der Nase. Diese sendet Fortsetzungen in die 3 Nebenhöhlen der Nase, und durch den Thränenkanal und die Thränenröhrchen communicirt sie continuirlich mit der Conjuntiva palpebrarum et oculi, welche letzte so sicher, wie jede andere Schleimhaut, hierher gehört, da sie die Krankheiten der Schleimhäute, nämlich sowohl die chronischen Blennorrhoeen als die catarrhalischen Affectionen dieser Häute theilt, ja bei jedem heftigen Schnupfen im trocknen, wie im fliessenden Stadium mit afficirt wird, und weder in der serösen Absonderung, die am Auge von den Thränen, nicht von ihr kommt, noch in Hinsicht der sackartigen Bildung der serösen Häute mit diesen etwas gemein hat.

Die Schleimhaut des Mundes hängt im Rachen mit jener der Nase zusammen, schickt eine Fortsetzung in die Eustachische Trompete, welche als innere Haut der Trommelhöhle und des Trommelfells endigt. Sie schickt im Munde Fortsetzungen in die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen; im Rachen theilt sie sich in zwei grosse Zweige als innere Haut der Luftwege und des Darmkanals. Jene dringt bis in die Luftzellen als das Häutchen der-

Digitized by Google

selben vor und endigt blind; diese kleidet den ganzen Darmkanal aus, und schickt Fortsätze in die Ausführungsgänge der Leber und des Pankreas. Bei den Vögeln hängt sie in der Kloake mit der Schleimhaut der Genitalien und Harnwerkzeuge zusammen. Die Schleimhaut der letzteren überzieht den ganzen Verlauf der Harnwerkzeuge von ihrer Mündung bis in die Calyces renales, dringt in die Geschlechtstheile als innere Haut bis in die Ausführungsgänge der Genitalien ein, bei dem Weibe grenzt sie merkwürdiger Weise an den Fimbrien der Trompeten an die seröse Haut der Unterleibshöhle. Bei den Fischen stehen alle Schleimhäute durch die schleimabsondernde Oberfläche der Haut in Verbindung. Alle diese Häute stehen in grosser sympathischer Verbindung unter sich, indem sich die Krankheiten dieser Häute, namentlich die Schleimflüsse und catarrhalischen Affectionen, leicht innerhalb dieses Gewebes ausbreiten. Durch diesen Consensus erkennt man an einem Theil dieser Häute die Beschaffenheit eines andern: aus der Beschaffenheit der Schleimhaut der Zunge die Beschaffenheit der Schleimhaut des Magens und Darmkanals. Vgl. den pag. 343 erläuterten, merkwürdigen sympathischen Zusammenhang aller Schleimhäute mit den Athembewegungen. Die Leichtigkeit, mit welcher durch Vermittelung der Nervensympathieen aus Reizungen der Schleimhäute convulsivische Bewegungen der zum respiratorischen System gehörigen Muskeln entstehen, wie sie beim Husten, Niesen, Erbrechen, unwillkührlichen Trieb zum Stuhlgang und Harnlassen stattfinden, will ich hier nicht weiter untersuchen.

Die eigenthümlichen Krankheiten dieser Häute sind die Blennorrhoeen oder Schleimflüsse und die catarrhalischen Affectionen, welche sich von den ersteren dadurch unterscheiden, dass sie acut, heftig, d. h. schnell steigend und abnehmend sind, und dass sie ein congestives, erstes und blennorrhoisches, zweites Stadium besitzen.

Die Absonderung des Schleims geschieht sowohl auf den der Schleimbälge ermangelnden Schleimhäuten der Kieferhöhle, Stirnbeinhöhle, Keilbeinhohle und Trommelhöhle, als auf den mit Folliculis mucosis versehenen Schleimhäuten; daher die letzteren nicht die einzigen Quellen der Schleimabsonderung seyn können.

Die Schleimdrüsen sind übrigens blosse säckchenförmige Vertiefungen der Schleimhäute. In denjenigen Schleimhäuten, welche mit Epithelium bedeckt sind, wo also ausser dem Schleime noch eine andere Absonderung stattfindet, scheint die Schleimabsonderung auf die Schleimdrüsen beschränkt zu seyn. Vgl. über das Epithelium pag. 379.

Der Schleim (*Mucus*) wird nur von Schleimhäuten gebildet und kömmt in anderen thierischen Theilen nicht vor. Dieser zum Schutz aller mit der Aussenwelt in Wechselwirkung stehenden inneren Theile bestimmte Stoff quillt im Wasser auf, ist aber im Wasser nicht löslich; in der Wärme gerinnt er nicht, vom Weingeist wird er aus seiner Zertheilung in Wasser niedergeschlagen, erhält aber ausgewaschen seine vorige Zertheilbarkeit im Wasser wieder. Uebrigens ist der Schleim nicht auf allen Schleimhäuten

Digitized by Google

von gleicher Beschaffenheit; denn wie Berzelius fand, ist der Schleim der Gallenblase in Säuren ganz unlöslich, während der Schleim der Harnblase einigermaassen von verdünnten Säuren sowohl, als von verdünntem Alkali gelöst wird. Säuren lösen überhaupt sehr wenig vom Schleim auf. Nach Gmelin gerinnt der Darmschleim durch Säuren, selbst durch Essigsäure. Die Säure zieht nur sehr wenig aus und er wird selbst im Kochen von ihr nicht aufgelöst. Das Wenige, was von Säure aufgelöst worden oder was Wasser nach dem Abgiessen der Säure in der Digestion aus ihm auszog, wird von Galläpfelinfusion, aber nur selten von Cyaneisenkalium gefällt. Berzelius *Thierchemie* 138. Im Schleim kömmt auch eine in Wasser lösliche thierische Materie vor, das Pyin, welches nach Gueterbock dem Eiter und Schleim gemein ist. Seine Auflösung in Wasser wird von Weingeist gefällt. Die Fällung wird durch Wasser wieder aufgelöst. Salzsäure fällt, überschüssig löst sie wieder auf. Die saure Auflösung wird von Kaliumeisencyanid nicht gefällt. Essigsäure und Alaun fällen das Pyin, und im Ueberschuss lösen sie es nicht wieder auf. Der Schleim des Magens enthält auch Verdauungsprincip, Pepsin, Laab.

c. Aeussere Haut. Auf der äussern Haut finden sehr mannigfaltige Absonderungen statt, wovon jede von besondern Stellen des Hautorganes gebildet wird. Am allgemeinsten ist die Absonderung der Epidermis. Die Absonderung der Epidermis geschieht schichtweise von der obersten Schicht der Haut. Vgl. oben pag. 379. Die Epidermis ist selbst nach übereinstimmenden Beobachtungen nicht organisirt. Schultze fand zwar, dass nach Injection der Blutgefässe mit blossem Terpentinöl nicht allein die feinsten, sonst nicht sichtbaren Gefässe angefüllt werden, sondern dass auch die abgezogene Epidermis an ihrer innern Seite ein mit dem Mikroskop erkennbares deutliches Gefässnetz zeigt. Um die Injection auf das Weiteste zu treiben, hat Schultze den Stumpf des injicirten unterbundenen Arms in heisses Wasser gethan. Dieser Gelehrte hatte die Güte, mir nicht allein das Gefässnetz der innern Seite der Epidermis an abgezogenen und getrockneten Stücken unter dem Mikroskop zu zeigen, sondern auch ein Stückchen dieser Epidermis mir mitzutheilen, woran ich den deutlichen Beweis dieser Gefässe in Händen habe. Es lässt sich aus dieser Beobachtung indess freilich nicht schliessen, dass die Epidermis selbst Gefässe enthalte; denn diese Schicht von Gefässen, an der innern Seite der Epidermis, kann sehr wohl mechanisch beim Ablösen der Epidermis von dem Stratum Malpighianum subepidermicum mit abgelöset seyn. Auch liesse sich erst an senkrechten Durchschnitten der Epidermis unter dem Mikroskop der Beweis führen: ob diese Gefässe bloss eine innere Schicht an der gefässlosen Epidermis selbst bilden, oder ob die Gefässe wirklich bis zu einiger Tiefe in die Substanz der Epidermis eindringen. Sie verhalten sich übrigens bei ihrer Verzweigung und netzförmigen Endigung gerade so wie Blutgefässe. Von den rothes Blut führenden Gefässen unterscheiden sie sich nach Schultze nur, dass sie einigemal dünner sind, als menschliche Blutkörperchen. Wäre diese Messung an nicht getrockneter

Digitized by Google

Epidermis angestellt, so könnte sie den noch fehlenden Beweis leisten, dass es wirklich Ramuli serosi der Blutgefässe gebe. Siehe Mueller's *Archiv für Anat. und Physiol.* 1834. *p.* 30.

Die Absonderung der Haare findet in den Haarbälgen von den Haarkeimen statt. Die Bildung der die Haut einölenden Hautschmiere geschieht durch jene unzähligen, über die ganze Haut zerstreuten Folliculi sebacei, kleine, in der Dicke der Haut liegende ästige Säckchen mit engerem Halse. Diese Drüschen münden meist in die Haarbälge aus. Gurlt in Muell. *Archiv.* 1835. 399. Endlich findet die Absonderung des Schweisses wieder in eigenthümlichen kleinen, über die ganze Körperoberfläche verbreiteten Schläuchen statt, welche ihr Secretum durch feine Poren an der Epidermis ergiessen. Wendt *de epidermide humana. Diss. inaug. Vratisl.* 1833. Mueller's *Archiv für Anat. u. Physiol.* 1834. Heft 3. pag. 280. Breschet *ann. d. sc. nat. Sept. Oct. Dec.* 1834. Gurlt a. a. O. Diese Organe wurden von Purkinje und Breschet entdeckt.

Die kleinen Poren auf den erhabenen Linien der Vola und Planta sind bekannt. Diese Oeffnungen führen zu fadenförmigen Organen, welche durch das Stratum Malpighianum in die Haut selbst übergehen, einen spiralförmigen Verlauf haben und zuletzt in der Tiefe der Haut in eine aus einem gewundenen Schlauche bestehende Drüse endigen. An den Hautstellen mit dünner Epidermis sind diese Kanäle dünner und weniger gewunden. Zu dieser Untersuchung wird ein Stück der Haut, am besten aus der Vola manus, durch Liquor kali carbonici erhärtet und in senkrechten Lamellen, die mit den Furchen der Vola parallel laufen, mit einem sehr scharfen Messer zerschnitten, darauf diese Durchschnitte mikroskopisch untersucht.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung der in der Haut stattfindenden Absonderungen, dass für jedes auch nur punktförmige Vordringen eines Secretes in der Haut ein bestimmter, durch sackartige oder schlauchförmige Structur ausgezeichneter, Apparat nöthig ist und wenn sich die Vorstellungen der Alten über das Hervordringen des Schweisses aus den Schweissporen bestätigt haben, so darf man sich darunter keineswegs, wie jene sich dachten, ein Ergiessen des Schweisses aus offenen Fortsetzungen der Blutgefässe denken; vielmehr ist jeder Schweisspore nur das Ende eines blinden und in sich geschlossenen Schlauches, welcher sein Secretum, wie jede andere Drüse, auf seiner innern Oberfläche bildet. Ueber die chemische Zusammensetzung der Hautabsonderung siehe den folgenden Abschnitt IV. Cap. VIII. bei den Ausscheidungen.

3) *Drüsen.* Die Organe, welche man bisher Drüsen genannt hat, sind theils ohne Ausführungsgänge, theils absondernde und mit Ausführungsgängen begabte.

Die erste Reihe dieser Organe oder der Drüsen ohne Ausführungsgänge, üben ihren plastischen Einfluss auf die in ihnen und durch sie circulirenden und in den allgemeinen Kreislauf zurückkehrenden Säfte aus, sie haben keine Beziehung auf ein Aeusseres, wie die absondernden Drüsen. Diese Organe bestehen

Digitized by Google

daher auch fast nur aus Gefässbildung, sie sind Gefässknäuel, *Gefässknoten*, indem die in ihre Bildung eingehenden Gefässe des Kreislaufs sich im Parenchym derselben ins Unendliche zertheilen und aus dieser Zertheilung wieder in ausführende oder rückführende Gefässe des Kreislaufs sich sammeln.

Alle Drüsen dieser Art oder die Gefässknoten sind aber zweierlei:

I. *Blutgefässknoten, ganglia sanguineo-vasculosa.* Hierher gehören im Systema chylopoeticum die Milz, im Systema uropoeticum et genitale die Nebennieren, im Systema respiratorium die Schilddrüse und die Thymusdrüse, im Auge die glandula chorioidalis der Fische, endlich die Placenta des Foetus.

Alle diese Organe sind blosse Blutgefässkuchen, sie können in ihrem Parenchym bloss die Beziehung und Einwirkung auf das sie in einer grossen Zertheilung durchkreisende Blut haben.

Sie sind aber bald

1. *vereinigte Ganglia sanguineo-vasculosa*, wie die Placenta, die Milz;

2. *vereinzelte*, wie die Cotyledonen und die mehrfachen Milzen.

II. *Lymphgefässknoten, Ganglia lymphatico-vasculosa.* Diese bestehen aus Verzweigungen der in sie eingehenden und aus ihnen herausführenden Lymphgefässe, deren innere Zertheilung zuletzt in lauter Netze und Zellen endigt. Siehe oben pag. 267.

Hieher gehören die Lymphdrüsen und Mesenterialdrüsen.

Auch diese können in ihrem Innern bloss die Beziehung auf die sie durchkreisende Lymphe oder den Chylus haben.

Sie sind ebenfalls bald

1. *vereinzelt*, wie gewöhnlich die Mesenterialdrüsen in grosser Anzahl;

2. *vereinigt*, wie das sogenannte Pancreas Asellii der Hunde, als eine Masse von Mesenterialdrüsen.

Alle diese Drüsen, die Blutgefässknoten und Lymphgefässknoten, sind nicht der Gegenstand gegenwärtiger Untersuchung; sie sind von derselben gänzlich ausgeschlossen.

Eine zweite Klasse der Drüsen hat nicht bloss die Beziehung auf das sie durchkreisende Fluidum, sondern auf ein Aeusseres, das die Produkte der Metamorphose durch *Ausführungsgänge* aus der Sphäre des Kreislaufes in sich aufnimmt. Alle Drüsen dieser Ordnung müssen in Hinsicht ihrer innern Bildung vollständig zergliedert werden.

II. Capitel. Von dem innern Bau der Drüsen.

Die Untersuchungen über den innern Bau der Drüsen sind durch des Malpighius *exercitationes de structura viscerum* 1665 eröffnet worden, welcher lehrte, dass die Elementartheile aller Drüsen, die sogenannten Acini desselben Baues seyen als die einfachen Bälge und conglomerirten Balgdrüsen, dass sie nämlich aus rundlichen Säckchen bestehen, welche von den feinsten Blutgefässen ihre Säfte erhalten, und diese in ihre Ausführungsgänge abgeben,

Digitized by Google

wobei er sich auf den blinddarmähnlichen Bau einiger einfacher Drüsen, wie des Pankreas des Schwertfisches, der Leber der Krebse und auf die Bildungsgeschichte der Leber bei dem Embryo stützte. Obgleich dieser Ansicht gute Anschauungen zum Grunde lagen, so hat sich doch Malpighi im Einzelnen geirrt, denn die eigentlichen Elementartheile der zusammengesetzten Drüsen blieben ihm unbekannt, und was derselbe als Folliculi der Leber und anderer zusammengesetzter Drüsen beschrieb, sind nur Anhäufungen der zahlreichen, ihm unbekannt gebliebenen Elementartheile. Die Erschütterung, welche diese Lehre durch Ruysch seit 1696 erlitt, war daher unausbleiblich; denn durch die Ausbildung der feinern Injection der Blutgefässe wurde es Ruysch nicht schwer zu zeigen, dass in den Folliculis der zusammengesetzten Drüsen noch eine ungemein zahlreiche Zertheilung der feineren Blutgefässe stattfindet. Indessen ist Ruysch durch Ueberschätzung der anatomischen Hülfsmittel und dessen, was ihm die Injection der Blutgefässe leistete, ohne hinreichende Gründe zu dem Schluss verleitet worden, dass die eigentliche Drüsensubstanz aus nichts als Blutgefässen bestehe, und dass die feineren Blutgefässe unmittelbar in die Anfänge der Ausführungsgänge der Drüsen übergehen. Ruysch's Lehre über den Bau der Drüsen bekam ein grosses Uebergewicht dadurch, dass Haller sich auf seine Seite neigte. Haller hat die alte Hypothese von den aushauchenden offenen Enden der Arterien erst recht befestigt. Er führt (*Element. Physiol. Lib. II.* §. 23.) fünf Arten dieser Endigung an: in einen Ausführungsgang, ins Zellgewebe, in Höhlen, durch die Haut, in lymphatische Gefässe; in Wahrheit aber existiren alle diese Uebergänge nicht, denn wie die an so vielen durchsichtigen Theilen angestellten Untersuchungen über die Circulation, über die Bewegung des Bluts in den Capillargefässen, und die Beobachtungen an den fein injicirten Geweben aus allen Theilen des menschlichen Körpers lehren, giebt es in keinem Organe, in keiner Haut einen andern Uebergang der Arterien, als den netzförmigen Uebergang ihrer feinsten Zweige in die Venen. Haller und mehrere seiner Nachfolger haben für Ruysch's Hypothese auch den Uebernang der in die Blutgefässe injicirten Flüssigkeiten in die Ausführungsgänge der Drüsen und die Blutungen aus den absondernden Geweben angeführt. Was den ersten Grund betrifft, so lässt es sich zwar nicht läugnen, dass bei starken Injectionen der Pfortader zuweilen, wenn gleich selten, etwas in den Ductus hepaticus übergeht, und dass in seltenen Fällen nach heftiger Injection der Nierenarterien etwas von der injicirten Flüssigkeit in dem Nierenbecken sich vorfindet. Allein die Untersuchung nach solchen Uebergängen zeigt gerade, dass eine Zerreissung statt gefunden haben muss; denn die feineren Zweige der ausführenden Kanäle finden sich in diesen Fällen nicht injicirt, was seyn müsste, wenn der Uebergang auf natürlichen Wegen durch die feinsten Zweige der Arterien in die feinsten Zweige der Ausführungsgänge geschehen wäre. So füllen sich auch, wie meine Untersuchungen bewiesen haben, nach Injection der Ausführungsgänge, z. B. der Leber, der Niere nur dann durch

Digitized by Google

Extravasation die Blutgefässe, wenn die feineren Zweige der Ausführungsgänge nicht angefüllt sind. Dergleichen Uebergänge sehen sich daher ganz wie das Austreten feiner Injectionsmassen aus Schleimhäuten an, in welchen es doch erwiesener Maassen keine offenen Enden der Blutgefässe, sondern nur Capillargefässnetze giebt. Dasselbe gilt von den Blutungen, welche durch Extravasation erfolgen und die überdiess in den Drüsen ganz ausserordentlich selten sind. Am auffallendsten schien der Uebergang feiner Injectionen aus den Nierenarterien in die Bellini'schen Harnkanälchen; ja es wurden sogar die aus den Arterien injicirten gestreckten Gefässe der Marksubstanz der Nieren bei dem Vortrag der Anatomie zur Demonstration der Bellini'schen Röhren benutzt. Die genauere Untersuchung solcher Injectionen durch Huschke und mich hat indessen diesen Irrthum aufgedeckt und gezeigt, dass diese sogenannten Bellini'schen Röhren gar nicht die wahren Bellini'schen Röhren, vielmehr nichts anders als langgestreckte, zwischen den bellini'schen Rohren verlaufende Arterien sind, welche gegen die Papille der Nieren hin, statt sich zu öffnen, wie die Bellini'schen Röhren, vielmehr feiner werden und Capillargefässnetze um die Oeffnung der Harnkanälchen bilden.

Die Controverse über den Bau der Drüsen konnte auf den bisherigen Wegen, welche meist in Injectionen der Blutgefässe bestanden, nicht entschieden werden. Hierzu gehörten glückliche Injectionen der Absonderungskanälchen selbst von ihren Ausführungsgängen und eine durch alle Drüsen durchgeführte Untersuchung der Drüsen, über den feinsten Bau und die Wurzeln dieser Kanälchen. Die erste genauere Untersuchung dieser Art war von Ferrein über den Bau der Drüsen (*Mém. de l'Acad. royale des Sc. de Paris* 1749), welcher die gewundenen Harnkanälchen der Rindensubstanz als die eigentliche Quelle der Harnabsonderung entdeckte, wovon weder Malpighi noch Ruysch eine Ahnung gehabt haben. Die Entdeckung dieser Kanäle, deren Anhäufung und Feinheit erst den Schein von festem Parenchym hervorbringt, liess eine grosse Aehnlichkeit zwischen diesen Kanälen der Rindensubstanz der Nieren und den Samenknälchen einsehen, die sich von ihnen nur unterscheiden, dass sie mit blossen Augen sichtbar sind, die Samenkanälchen aber mussten immer für die Lehre von dem Bau der Drüsen von grosser Wichtigkeit seyn, weil sie uns eine entschiedene Selbstständigkeit der absondernden Kanäle zeigen, auf deren Wänden sich bloss die feinsten Blutgefässe verzweigen und in Capillargefässübergängen von den Arterien in die Venen übergehen. Schumlansky (*de structura renum. Argentorat.* 1788) hat diese Untersuchungen vervollkommnet; indessen hat er doch einen bedeutenden Irrthum in die feinere Anatomie der Nieren gebracht, dadurch, dass er die noch mit blossen Augen sichtbaren Malpighi'schen Körperchen in der Rindensubstanz der Nieren für die Quelle der Harnabsonderung hielt, und den Anfang der gewundenen, überall gleichförmig dicken und unverzweigten Rindenkanälchen der Nieren in diese Malpighi'schen Körperchen setzte und in seiner

Digitized by Google

schematischen Abbildung sehr anschaulich machte, während doch nach neueren Untersuchungen diese runden Malpighi'schen Körperchen aus blossen kleinen Geflechten der Arterien bestehen, von ihnen überaus leicht sich füllen, niemals aber bei Injection der Harnkanälchen angefüllt werden, und überhaupt in keinem Zusammenhange mit ihnen stehen. Mascagny und Cruikshank zeigten ferner, dass die Anfänge der absondernden Kanälchen in den Milchdrüsen zellenförmig sind; dasselbe hat E. H. Weber (Meckel's *Archiv.* 1827) von den Speicheldrüsen der Vögel und Säugethiere und von dem Pankreas der Vögel gezeigt. Durch diese schönen Untersuchungen von Weber und durch die eben so trefflichen Beobachtungen von Huschke über den Bau der Nieren (*Isis* 1828, Heft 5 und 6) ist nun in der neuern Zeit der Anfang einer Arbeit gemacht worden, deren ganzem Umfang ich mich selbst weiter unterzogen habe, indem ich den Bau der feineren Drüsenkanälchen in allen Arten der absondernden Drüsen studirte. J. Mueller *De glandularum structura penitiori. Lips.* 1830. Hierdurch ist nun zur Evidenz gebracht, dass die absondernden Kanälchen in allen Drüsen selbstständig sind, und dass, mögen sie nun gewunden, wie in der Rindensubstanz der Nieren und in den Hoden sich ausbreiten oder sich baumförmig verzweigen, wie in der Leber und den Speicheldrüsen, mögen sie reiserförmig blind wie in der Leber, oder in traubenförmigen Zellen blind wie in den Speicheldrüsen, in dem Pankreas und in den Milchdrüsen endigen, die Capillargefässe nur netzförmig auf ihren Wänden, und zwischen den Kanälchen sich ausbreiten, indem auch die feinsten Drüsenkanälchen, wie in der Leber, in den Nieren immer noch einigemal stärker sind, als die zartesten Verästelungen der Arterien und Venen. So mannigfaltig nun die einzelnen Formen in der Anlage der Drüsenkanälchen sind, so haben doch alle absondernden Drüsen mit einander gemein, dass sie eine grosse absondernde Fläche in dem Innern der Schläuche, der gewundenen oder verzweigten Kanäle darstellen, und dass auf der innern Fläche der Kanäle dasselbe, nur complicirter realisirt ist, was auf einer ebenen absondernden Haut stattfindet, so dass die Natur in den drüsigen Organen durch die eigenthümliche Anordnung der zur chemischen Veränderung der Materie bestimmten Substanz überall nur eine grosse Fläche im kleinen Raum erzielt hat, ein Zweck, den die Natur, wie man aus der folgenden Zusammenstellung der Thatsachen sieht, auf sehr mannigfache Weise erreicht hat.

Die einfachsten Drüsen sind grössere oder kleinere Vertiefungen einer Haut; zuweilen sind diese Vertiefungen sehr flach und entstehen durch blosse Einsenkungen, wie die einfachen Crypten der Schleimhäute, wie sie in fast allen Schleimhäuten vorkommen, in andern Fällen sind die Vertiefungen deutlicher und bilden Säckchen mit einem Hals (*Folliculi*), gleich wie die Folliculi der Schleimhäute. (Die Peyer'schen Drüsen des Ileums dürfen nicht hieher gerechnet werden, wie in dem Abschnitte von der Verdauung gezeigt wird.) In andern Fällen dagegen bildet sich die Vertiefung oder Ausstülpung zu

Digitized by Google

einer Röhre aus, wie die Schleimkanäle unter der Haut der Fische. Im Allgemeinen kann man den Balg (*Folliculus*) und die Röhre (*Tubulus*) als die Elemente der Hauptmodificationen im Baue der Drüsen betrachten. Aber selbst die scheinbar einfachsten Bälge sind in ihrem Innern schon zusammengesetzt, indem entweder die innere Fläche des Balges zellenförmige Vorsprünge hat, oder das Säckchen traubig ist, wie an den kleinsten Lieberkühn'schen Drüsen der Darmschleimhaut und an den Meibomischen Drüsen, oder die Wände des Follikels selbst wieder in ihrer Dicke blinde Rohrchen enthalten, wie die Magendrüsen der Vögel und anderer Thiere. Boehm *de glandularum intestinalium structura penitiori. Berol.* 1835. Boyd *Edinb. med. surg. Journ.* 1836. *Oct.* 382. Bei der weitern Ausbildung dieser einfachen Drüsen durch Flächenvermehrung kann man folgende Formen unterscheiden. Dergleichen Säckchen und Röhren stehen oft in einer geselligen Verbindung dicht neben einander (*Folliculi aggregati*), bald reihenförmig oder linear, wie die Meibomi'schen Drüsen der Augenlieder, oder haufenweise, wie in der Drüsenschicht im Drüsenmagen der Vögel. Bei dieser Aggregation bleiben die Oeffnungen der einzelnen Drüsen getrennt; die Natur erreicht aber denselben Zweck durch Zusammensetzung der Folliculi zu einem Ganzen mit einfacher Ausmündung (*Folliculi compositi, conglomerati*) wie die Mandeln, die Glandulae labiales, buccales, die aus zusammengesetzten Blinddarmen bestehenden prostatischen Drüsen mehrerer Saugethiere. (J. Mueller a. a. O. Tab. 3.), die Milchdrüse des Schnabelthiers, das Pankreas des Schwertfisches und Thunfisches. Denkt man sich diese Zusammensetzung weiter fortschreitend, so treiben die Bälge des Balgs kleinere Folliculi hervor. Es entsteht eine hohle Verzweigung mit blinden, entweder reiserförmigen oder zellenförmigen Enden. Auch diese Folliculi compositi konnen sich durch Aggregation neben einander zu einer grössern Drüsenmasse von mehreren oder vielen Ausführungsgängen verbinden, wovon man ein Beispiel in der Prostata des Menschen hat, die aus einer Aggregation von einzelnen Drüschen besteht, deren jede gleichsam ein hohles Strauchwerk mit zellenförmigen Enden der Kanalchen darstellt. Durch fortgesetzte Vermehrung dieser Art entsteht nun eine zusammengesetzte Drüse; indessen bildet diese Art der Flächenvermehrung nur die eine Hauptform zusammengesetzter Drüsen; die zweite Hauptform bildet die zusammengesetzten Drusen von röhriger Structur, in welchen die Verzweigung entweder fehlt oder sehr untergeordnet ist, die Vermehrung der Fläche vielmehr durch die Länge und die Windungen einfacher, in ihrem Durchmesser ziemlich gleichförmiger Kanale erreicht wird.

1) *Zusammengesetzte Drüsen mit verzweigter Grundlage.* Es gehören hierher vorzüglich die Thränendrüse, die Milchdrüse, die Speicheldrüsen, das Pankreas und die Leber. Diese Drüsenart zerfällt wieder in zwei Gruppen, je nachdem die Verzweigung eine gewisse Regelmässigkeit beobachtet, wodurch der Hauptstamm von Stelle zu Stelle Seitenkanäle, die Seitenkanäle von Stelle zu Stelle Seitenkanäle zweiter Ordnung, und diese wieder

Digitized by Google

Seitenkanäle der dritten Ordnung, wie bei den gelappten Drüsen ausschicken. Hierdurch entstehen Lappen der ersten, zweiten, dritten, vierten Ordnung, welche bloss locker durch Zellgewebe mit einander verbunden sind. Unter diese gelappten Drüsen mit regelmässiger Anordnung der Verzweigung gehören die Thränendrüse, die Milchdrüse, die Speicheldrüse und das Pankreas. Die kleinsten mit blossen Augen sichtbaren Theile dieser Drüsen sehen entweder körnig aus (*Acini*). Sie sind nichts Anderes als traubenförmige Aggregate von sehr kleinen, nur mikroskopisch im angefüllten Zustande sich offenbarenden Zellen, die auf den feinsten Zweigelchen der Absonderungskanälchen traubenförmig aufsitzen, umwoben von Capillargefässnetzen. In anderen Fällen sind die feinen Kanäle als überaus feine blinde Röhrchen, wie die Blättchen der Moose um die Zweige des Ausführungsganges in der ganzen Länge desselben gestellt, wie in der Leber der Krebse und in der Thränendrüse der Schildkröten, wodurch auch wieder Lappen entstehen; oder die Endröhrchen eines kleinsten Lappens bilden, ohne ebenfalls in Bläschen überzugehen nur Büschel reiserförmiger Röhren, wie in den Cowper'schen Drüsen des Igels; a. a. O. Tab. 3., Fig. 8. 9.

Die zweite Gruppe hierher gehöriger Drüsen bilden diejenigen, bei welchen die Verzweigung unregelmässig baumförmig ist, und keine durchgreifende Lappenbildung entsteht. Es gehört hierher die Leber; die Büschel der feinsten Zweige der Gallenkanälchen bilden zwar auch Acini zusammen, allein diese Acini sind ohne durchgreifende Unterabtheilung von Läppchen, zu einem oder zu mehrern gemeinsamen Lappen verbunden.

Diese Verzweigung und auch das Eigenthümliche, dass die Kanälchen zuletzt nicht in Zellen, sondern in vielfach verzweigte Reiserchen von mikroskopischer Feinheit endigen, die, in eine grosse Anzahl vereinigt, erst das ausmachen, was, mit nackten Augen angesehen, Acinus genannt wird, characterisirt die Leber der Wirbelthiere. Die Leber der Wirbellosen gehört häufig unter die erstere Gruppe der hier beschriebenen Drüsen. Wir werden den Bau der vorzüglichsten Drüsen dieser Klasse, welche beim Menschen vorkommen, hier abhandeln.

A. *Thränendrüse.* Die Thränendrüse zeigt nach meinen Untersuchungen im Allgemeinen zwei Hauptformen in der Anordnung der Drüsenkanälchen: *a.* die bei den Schildkröten von mir gefundene; *b.* die bei den übrigen Wirbelthieren, Vögeln und Säugethieren stattfindende Structur. Bei den Schildkröten bildet die Drüse lauter keulenförmige Lappen, welche wie Aeste mit einander durch die in ihrem Inneren verlaufenden Ausführungsgänge verbunden sind. Im Innern dieser Keulen verläuft ein ziemlich gleichförmiger Kanal, in welchen unzählige, senkrecht auf ihn gestellte mikroskopische Büschel von Blinddärmchen (wie das Laub der Moose zu ihren Stengeln sich verhaltend) von 0,00194 p. Z. Dicke einmünden, so dass man sich diese scheinbar soliden Massen in einer federbuschartigen Zusammenstellung von Blinddärmchen denken muss, die mit den Enden sämmtlich gegen die Oberfläche gerichtet sind. J. Mueller *de glandularum structura.*

Digitized by Google

Tab. V. Fig. 4. Bei den Vögeln und den Säugethieren sind die Drüsenkanälchen der Thränendrüse regelmässig verzweigt und endigen in jedem Acinus in einen Haufen von kleinen Zellen. Bei den Vögeln sind diese Zellen sehr gross, nämlich 0,00327 p. Z. Auch beim Pferde lassen sich, so wie bei den Vögeln, diese Zellen von den Ausführungsgängen mit Quecksilber füllen.

B. *Milchdrüse.* Die Milchdrüsen zeigen im Allgemeinen eine doppelte Structur; sie sind entweder aus Blinddärmen zusammengesetzt, wie die Milchdrüsen des Schnabelthiers, oder aus verzweigten Kanälen (*Ductus lactiferi*), deren feinste Büschel traubenförmige, mikroskopisch sichtbare Cellulae lactiferae bilden. Die erste Structur kennt man mit Sicherheit nur beim Schnabelthiere nach Meckel's Entdeckung. Diese verzweigten Blinddärme, welche sich in einer ebenen Stelle neben einander in grosser Anzahl öffnen, enthalten indess in ihrem Innern, wie Owen (*Phils. Transact.* 1832) gezeigt hat, eine etwas complicirtere Follicularstructur. Nach von Baer (Meckel's *Archiv.* 1827. p. 559.) besteht auch die Milchdrüse der Cetaceen, die sich nicht mehrfach, sondern nur einfach ausmündet, aus Blinddärmen. Die Untersuchung einer Milchdrüse von Delphinus Phocaena macht mich indessen glauben, dass die von Baer gesehenen Blinddärme nur die stärkeren Ductus lactiferi waren, und dass die Milchdrüse der Cetaceen vielleicht nicht viel weniger complicirt als bei den übrigen Säugethieren ist. Bei diesen öffnet sich die Milchdrüse bald einfach, wie bei den Wiederkäuern, bald durch mehrere Oeffnungen, wie bei den reissenden Thieren und dem Menschen, in die Warze, wo dann im letzteren Fall eigentlich eben so viel Drüsen zu einer gemeinsamen Milchdrüse verbunden sind. Die Structur dieser Drüsen lässt sich sehr schön durch die Anfüllung der Cellulae lactiferae mit Quecksilber zeigen. Siehe Mueller a. a. O. Tab. VI. Fig. 1—8. Beim säugenden Igel betragen die Cellulae lactiparae 0,00712—0,00928 p. Z.; beim säugenden Hunde betragen sie 0,00260 p. Z. Sie sind also 10 bis 35 Mal so stark als die feinsten Capillargefässe des Menschen von 0,00025 p. Z.

C. *Speicheldrüsen.* Die Speicheldrüsen der Insekten sind, wie die Drüsen dieser Thiere überhaupt, lange röhrenförmige Schläuche mit blinden Enden. Bei den Mollusken habe ich sie von schwammiger und deutlich zelliger Structur gefunden. Siehe die Abbild. von Murex Tritonis Tab. XVII. Fig. 6. Bei den Fischen giebt es keine Speicheldrüsen; bei den Schlangen muss man die einfachen Speicheldrüsen von den ganz davon verschiedenen Giftdrüsen unterscheiden. Die einfachen Speicheldrüsen, welche theils an der Ober- und Unterlippe, theils unter der Zunge, theils wie die von mir gefundenen, neben der Nase liegen, sehen körnig aus und bestehen in ihrem Innern aus einer zelligen Structur (J. Mueller a. a. O. Tab. VI. Fig. 5.), so zwar, dass die Ober- und Unterlippendrüsen eigentlich aus einer linearen Aggregation vieler Drüsen mit vielen Oeffnungen bestehen. Die Giftdrüsen sind ganz anders gebaut. Sie bestehen in der Regel aus einer Reihe von Blättern, die auf dem Ausführungsgang aufsitzen, indem jedes wieder aus verzweigten Blinddärm-

Digitized by Google

chen besteht. (J. Mueller a. a. O. Tab. VI. Fig. 1.) Die Giftschlangen bilden übrigens drei Ordnungen: 1. Coluberartige (*Amphibola Müll.*) mit vorderen einfachen Zähnen im Oberkiefer und hinteren gefurchten Giftzähnen, wie Dipsas, Homalopsis, Dryophis. 2. Giftschlangen mit vorderen durchbohrten Giftzähnen, mit hinteren einfachen Zähnen im Oberkiefer (Trimeresurus, Bunjarus Naja(?), Platurus, Hydrophis, Pelamis). 3. Giftschlangen mit blossen Giftzähnen im Oberkiefer, wie Trigonocephalus, Cophias, Vipera, Pelias, Crotalus. Bei den Vögeln sind die Submaxillardrüsen in Hinsicht ihres Baues von E. H. Weber und mir untersucht worden. Sie sind eine Aggregation von mehreren zusammengesetzten Drüsen mit einzelnen Oeffnungen, wie bei den hühnerartigen Vögeln und Gänsen, grössere einfache Drüsen sind die Unterzungendrüsen der Spechte. Im erstern Falle besteht jede scheinbar körnige Drüse aus einem verzweigten Folliculus, dessen Wände mit Zellen besetzt sind; im letzteren Falle findet derselbe Bau, nur complicirter statt. J. Mueller a. a. O. Tab. VI. Fig. 6—8. Bei den Säugethieren zeigt sich eine Speicheldrüse bei ihrer ersten Entstehung nach Weber's und meinen Beobachtungen als ein einfacher, vom Mund ausgehender Kanal mit knospenförmigen Auswüchsen innerhalb eines gallertigen Keimstoffes, Blastema; a. a. O. Tab. VI. Fig. 9 und 10. Bei der weitern Ausbildung der Kanäle verzweigen sich die Kanäle auf Kosten des Keimstoffes immer weiter und in denselben hinein. Dieser Keimstoff zeigt sich bei diesen gelappten Drüsen bald lappig, und wird von der fortschreitenden Verzweigung zuletzt ganz absorbirt; a. a. O. Tab. VI. Fig. 11. 12. Schon bei dieser ersten Entstehung der Drüse zeigen sich also die Speichelkanäle als ein in sich geschlossenes und blind endigendes System; allein auch im erwachsenen Zustande lassen sich die Bläschen an den mikroskopischen Enden der feinsten Speichelkanälchen vom Ausführungsgang der Drüse aus mit Quecksilber anfüllen, wie E. H. Weber beim Menschen und ich bei dem Hunde gethan. Die kleinsten Zellen in der Parotis des Menschen messen mit Quecksilber gefüllt 0,0082 p. Z. Diese Zellchen verbinden sich zu Träubchen, welche 4 bis 7 Mal grösser sind. Die Zellchen sind also ungefähr 3 Mal und die Träubchen 12 Mal grösser als die feinsten Blutgefässchen. Die kleinsten Lungenzellchen sind 5 bis 16 Mal grösser als die Zellchen der Parotis. Beim Hunde fand ich die mit Quecksilber gefüllten Zellchen der Parotis 0,00176 p. Z. dick.

D. *Pankreas.* Gleichwie die erste Erscheinung der Milchdrüsen bei den Cetaceen in der Form von Blinddärmchen auftritt, so erscheint das Pankreas bei den Fischen zuerst in derselben Gestalt, als Appendices pyloricae, welche übrigens bei vielen Fischen fehlen. Diese Blinddärme sind bald einfach, bald mehrfach, und in seltneren Fällen verzweigt. Der Anfang dieser Verzweigung zeigt sich sehr einfach noch bei Polyodon folium, wo die Blinddärme sehr stark und kurz sind. In der Familie der Scomberoiden erreicht die Verzweigung in einigen Gattungen eine grosse Complication, wie z. B. bei Scomber Thynnus, wo 4 grosse Stämme der Blinddärme vom Dünndarm ausgehen, sich

Digitized by Google

verzweigen und jeder Zweig zuletzt in ein quastförmiges Büschel von dünnen röhrenförmigen Blinddärmen übergeht. (J. Mueller, a. a. O. Tab. VII. Fig. 4. 5.) Beim Schwertfisch findet derselbe Bau statt, nur sind die Blinddärme nicht röhrenförmig, sondern kurz und dick. Beim Stör stellen die Blinddärme, indem sie untereinander durch Zellgewebe verbunden sind, eine grosse schwammig-zellige Masse dar; a. a. O. Tab. VII. Fig. 6 Die Entwikkelungsgeschichte des Pankreas zeigt bei Froschlarven einen ähnlichen Fortschritt, wie bei der Entwickelung der Speicheldrüsen der Säugethiere. Bei den Vögeln lässt sich indess, selbst im erwachsenen Zustande, das Pankreas ganz bis in die zellenförmigen Enden der Ductuli pancreatici mit Quecksilber injiciren, wie E. H. Weber und ich gethan. J. Mueller a. a. O. Tab. XVII. Fig. 3—5. Diese Zellchen messen 0,00137 bis 0,00297 p. Z., sind also 6—12 Mal grösser als die feinsten Blutgefässe.

E. *Leber.* Ohne mich hier über die von Einigen angenommene Aehnlichkeit der Malpighi'schen Gefässe der Insekten mit Gallenorganen zu verbreiten, wovon im IV. Capitel bei der Verdauung und Gallenabsonderung das Nähere, will ich bloss erwähnen, dass die Gallenorgane der Spinnen Träubchen von Bläschen darstellen, welche durch Ausführungsgänge in den Darmkanal ausmünden. Dieser Gänge sind beim Scorpion 5 Paar. J. Mueller a. a. O. Tab. VIII. Fig. 8. Bei den Crustaceen, namentlich bei den eigentlichen Krebsen, besteht die Leber aus grossen Büscheln fingerförmig-verbundener Blinddärmchen, deren Hauptausführungsgang auf jeder Seite in den Darmkanal ausmündet; a. a. O. Tab. VIII. Fig. 11. vom Flusskrebs. Fig. 12. vom Pagurus striatus. Dagegen andere Krebse, wie die Gattungen Palaemon, Penaeus und Crangon, eine traubenförmige Bildung der Leber besitzen und die Leberlappen der Squillen schwammigzellige Massen bilden; a. a. O. Tab. IX. Rathke hat gezeigt, dass die aus Blinddärmchen zusammengesetzte Leber des Flusskrebses beim Embryo als eine Ausstülpung der Darmwände nach aussen entsteht. Bei den Mollusken gleicht die Leber schon sehr ihrem Ansehen bei höheren Thieren. Mit Galle angefüllt scheint sie auf den ersten Blick von körniger Structur zu seyn; sie lässt sich aber, wie ich gezeigt habe, durch Aufblasen der Ausführungsgänge leicht als eine hohle Traube darstellen. Bei einigen grössern Schnecken, wie Murex Tritonis, ist die zellige Bildung so auffallend und die Zellen sind so gross, dass die Leber beim Durchschnitt dem blossen Auge als eine durchaus schwammige Masse erscheint; a. a. O. Tab. X. Fig. 4. Die Untersuchung der Leber der Wirbelthiere bietet ausserordentlich viele Schwierigkeiten dar und nur die Entwickelungsgeschichte giebt vollständige Aufschlüsse über den Bau der feinsten Elementartheile dieses Organes. Eine gute Injection der Gallenkanälchen ist ungemein schwierig, während die Injection der Blutgefässe der Leber durchgängig sehr leicht gelingt.

Rolando's, Baer's und meine eigenen Beobachtungen haben es ausser Zweifel gesetzt, dass die Leber zuerst als eine Ausstülpung der Darmwände bei dem Vogelembryo entsteht, eine

Digitized by Google

Bildung, welche die Leber in der ersten Entstehung mit der Lunge und dem Pankreas gemein hat. Nach v. Baer erscheint die Leber bei dem Vogelembryo um die Mitte des dritten Tages der Bebrütung als zwei kegelförmige hohle Schenkel des Speisekanals, welche den gemeinschaftlichen Venenstamm umfassen. Bald verlängern sich diese Kegel, indem sie Gefässverzweigungen vor sich hertreiben, während sich die Basis allmählig verengt und die Gestalt eines cylinderförmigen Ausführungsganges annimmt. Die Leber entsteht also zuerst als eine doppelte hohle Ausstülpung der Darmwand in die Gefässschicht nach Aussen. Diese hohlen Kegel verzweigen sich im Innern, vereinigen sich aber an der Basis, indem die beiden hohlen Kegel bei ihrer Verlängerung von der Darmwand immer mehr an sich ziehen, bis sie den zwischen sich befindlichen Theil ganz in sich aufgenommen haben, so dass nun diese beiden Mündungen in eine einzige zusammengeflossen sind. v. Baer in Burdach's *Physiologie, Bd. II.* pag. 504. Die Gallenblase bildet sich als ein Divertikel des Ausführungsganges. Nach meinen Beobachtungen hat der ausgestülpte hohle Theil der Darmwand anfangs, nämlich am 4. Tage, fast dieselbe Dicke als die übrige Darmwand; bald aber wird dieser Theil viel dicker, während er im Innern immer noch eine Höhle enthält. Diese Höhle nimmt bei der weitern Ausbildung der Gallenkanäle ab, während sich in der Dicke der Lebersubstanz verzweigte Figuren und blinddarmförmige Körnchen ausbilden, welche letztere indessen nicht deutlich hohl scheinen. Die Ductus biliferi bilden sich daher durch fortgesetzte Ausstülpung nicht, sondern durch weitere Organisation des hervorgetriebenen Theils der Darmwände. Siehe die Abbild. bei J. Mueller a. a. O. Tab. IX. Fig. 1—3., Tab. XI. Fig. 1—4. Was die spätere Ausbildung und Verzweigung der Gallengänge betrifft, so haben darüber schon Harvey und Malpighi Aufschlüsse gegeben. Harvey *Exercitt. de generatione animalium.* 19.; Malpighi *de format. pulli.* 61. Der Erstere sah die Lebersubstanz als einen sprossenförmigen Auswuchs der Blutgefässe; Malpighi sah die Leber am 6., 7. und 9. Tage aus Blinddärmchen bestehend. Dieser anfängliche Bau der Leber ist von mir durch fortgesetzte mikroskopische Untersuchungen weiter verfolgt worden. Es zeigen sich nämlich auf der Oberfläche der Leber bei mikroskopischer Untersuchung lauter Blinddärmchen oder kurze Reiserchen von gelblich weisser Farbe, die aus der sonst blutrothen Substanz in unzähliger Menge dicht neben einander hervorsehen. Bei älteren Embryonen sieht man diese Reiserchen auf der Oberfläche der blutrothen Leber noch weiter zerästelt, so dass die Büschel der Reiserchen die Form von Federchen annehmen, oder auch wohl kleine Sträuschen bilden. J. Mueller a. a. O. Tab. XI. Fig. 4—9. Diese Elementartheilchen betragen gegen 0,00172 p. Z. Beim Kaninchen ist mir die feinere Injection der Gallenkanälchen aus dem Ductus hepaticus mit Leim und Zinnober einigemal gelungen, wobei die Leber über und über roth wurde. Die kleinen Acini der Leber zeigten sich hierbei als vielfach zerästelte Zertheilungen der Gallenkanälchen, so zwar, dass die Kanälchen in dichten Haufen,

Digitized by Google

welche die Acini bildeten, aus der Tiefe kommend, nach der Peripherie aus einander fuhren, sich auch noch reiserförmig theilten, ohne weiter dünner zu werden. Diese Zweigelchen, welche man nur mühsam bei mikroskopischen Untersuchungen der injicirten Leber erkennt, liegen so dicht, dass dadurch ein Anschein von Verbindung entsteht; die Kanälchen haben einen Durchmesser von 0,00108—0,00117 p. Z., sie sind also stärker als die Capillargefässe. Merkwürdig ist, was die Leber von den Speicheldrüsen unterscheidet, dass die Enden der Gallenkanälchen beim Embryo reiserförmig blind aufhören, wie die Entwickelungsgeschichte erweist, ohne dass man in der spätern Zeit der Entwickelung knopf- oder bläschenförmige Anschwellungen an diesen Reiserchen sieht. (Durch Anfüllung mit Luft nahmen dagegen in Krause's Untersuchungen (Muell. *Arch.* 1837.) die Enden der Gallenkanälchen wirklich ein bläschenförmiges Ansehen an, und Krause schliesst aus seinen Versuchen, dass auch die Acini der Leber aus bläschenförmigen Enden der Gallenkanälchen von $\frac{1}{46}$—$\frac{1}{46}'''$ gebildet sind.) In seltenen Fällen gelingt die Maceration der Leber in schlechtem Weingeist so, dass sie ganz in ihre Acini zerfällt, welche dann bloss noch unter sich ästig zusammenhängen. So besitzt das anatomische Museum zu Berlin eine durch die Maceration in lauter Büschel von Acini analysirte Leber eines Eisbären. Die feineren Stämmchen der Gallenkanälchen sind nicht mehr erkennbar, oder liegen vielleicht im Innern der Büschel der Lebersubstanz. Die Büschel der Lebersubstanz hängen aber an den Zweigen der Lebervenen, welche in das Innere von jedem Aestchen der Lebersubstanz ein Zweigelchen hineinschicken. Die an den Zweigelchen der Lebervenen sitzenden Stämmchen der verzweigten Lebersubstanz von $\frac{1}{4}$ Lin. Dicke, verzweigen sich, ohne an Dicke zu verlieren, weiter, und endigen zuletzt unmerklich in dickere, nämlich $\frac{1}{2}$ Linie dicke, 2—3 Linien lange Körperchen, welche hier und da stumpfe Fortsätze ausschicken. Die zarten Gallenkanälchen an dieser Substanz lassen sich nicht mehr erkennen. Merkwürdig ist, dass nicht die Pfortaderzweige, sondern die Lebervenenzweige von der acinösen Substanz, wie der Stengel vom Laub der Moose, bekleidet sind. An denjenigen Theilen der Leber, wo die Theile noch durch Zellgewebe verbunden sind, sieht man, dass die Enden dieser ästigen Lebersubstanz eigentlich das sind, was man auf der Oberfläche der Leber die Acini nennt. Diese ästigen Cylinderchen bestehen also selbst wieder aus den vorher nach Injectionen und nach der Entwickelungsgeschichte beschriebenen viel feineren Gallenkanälchen. Was die von mehreren Schriftstellern, wie Autenrieth, Bichat, Cloquet, Mappes und Meckel, angenommene doppelte Substanz in der Leber betrifft, welche sich wie Mark und Rinde an den Acinis durch die ganze Leber vertheilen soll, so reducirt sich diess nach meinen Untersuchungen auf das Factum, dass die ästigen Zertheilungen der Lebersubstanz und der Acini überall von einem oft dunkeln gefässreichen Zellgewebe unter einander verbunden sind, wogegen die gelblichen Anhäufungen der Gallenkanälchen abstechen, ein Verhältniss,

Digitized by Google

was durch die Entwickelungsgeschichte evident wird, indem man beim Vogelembryo die gelblichen Reiserchen der Gallenkanälchen auf der Oberfläche der Leber aus einem röthlichen Gefässgewebe hervorkommen sieht.

Was die Vertheilung der Blutgefässe in der Leber betrifft, so ist es bekannt, dass sich von Injection der Leberarterie und der Pfortader dieselben Capillargefässnetze anfüllen, mit welchen wieder die Anfänge der Lebervenen in Verbindung stehen. In den Capillargefässnetzen der Leber scheint daher eine Vermischung des hellrothen Blutes der Leberarterie und des dunkelrothen Blutes der Pfortader statt zu finden, und aus beiden geschieht vielleicht die Absonderung der Galle. Die feinsten Capillargefässe sind, wie ich schon bemerkt habe, feiner als die mikroskopischen Reiserchen der Gallenkanälchen. Diese Netze verlaufen überall zwischen den Reiserchen der Kanälchen, umspinnen sie, stehen aber mit ihnen in keinem unmittelbaren Zusammenhange; denn bei dem Vogelembryo sieht man mit Hülfe des Mikroskops auf der Oberfläche der Leber die reiserförmigen Endigungen der Gallenkanälchen, und dasselbe lässt sich mit Erfolg an der Leber der Froschlarven beobachten. Siehe J. Mueller a. a. O. Tab. X. Fig. 12. Bei der Salamanderlarve lässt sich sogar die Bewegung des Bluts zwischen den Acinis der Leber mit dem Mikroskop beobachten (a. a. O. Tab. X. Fig. 10.), wo die Blutkörperchen sich zwischen den Theilchen der Lebersubstanz deutlich durchwinden, um aus den zuführenden Gefässen in die abführenden zu gelangen. Ueber das Pfortadersystem der Thiere siehe oben pag. 185.

Durch Kiernan's sehr schätzbare Untersuchungen hat die Anatomie der Leber weitere Fortschritte gemacht. *Philosoph. Transact.* 1833. *p.* 2. *pag.* 711. Kiernan beschreibt die kleinen Körnchen (*Lobules*) der Leber, welche Andere Acini nennen, als blattförmige, aber nicht platte Körper, welche mehrere stumpfe Fortsätze ausschicken, ähnlich denjenigen, die wir oben von der macerirten Leber des Eisbären beschrieben haben. Im Inneren eines jeden kleinen Läppchens läuft ein Centralkanälchen (*Venula intralobularis*), ein Zweig der Lebervene, welche das Blut aus dem Capillargefässnetz des Läppchens zurückführt; die Venulae intralobulares gehen von den Aesten der Lebervenen aus, welche an diesen Stellen in ihren Wänden wie durchlöchert sind, indem die Läppchen auf der Oberfläche der Wände der Lebervenenzweige aufsitzen, so dass diese so gruppirten Läppchen einen Kanal bilden, in welchem der Lebervenenzweig liegt. Diese Kanäle sind also durch die Basen aller Läppchen gebildet. Die äussere Oberfläche jedes Läppchens dagegen ist von einer Zellgewebescheide, Capsel, Fortsetzung der Capsula Glissonii umgeben, und in diesem Zellgewebe, welches wieder die Läppchen von einander sondert, verbreiten sich die Zweigelchen der Arterie und die Zweigelchen der Pfortader, welche (Venae interlobulares) durch die Capillargefässnetze des Läppchens in die Vena intralobularis, oder den Anfang eines Lebervenenzweiges übergehen. Je nachdem entweder in den Venis interlobular. von der Pfortader her eine Blutanhäufung, oder in den Venis intralobular. von den Leber-

Digitized by Google

venen her eine Blutanhäufung stattfindet, scheint entweder die Mitte der gelben Läppchen blässer, oder der Umfang blässer, und daher der Irrthum von zwei Substanzen an den Läppchen, welche Kiernan so wie ich aus einer einfachen Substanz gebildet fand.

Das Zellgewebe der Capsula Glissonii geht von der Leberpforte als gemeinschaftliche Scheide der Leberarterie, der Pfortader und des Gallenganges weiter ins Innere der Leber ein, umfasst immer wieder die neben einander liegenden Zweige dieser Gefässe und endigt zuletzt in dem Interlobularzellgewebe. Der Verzweigung der Lebervenen bleiben diese Scheiden ganz fremd.

Die Leberarterie verzweigt sich nach Kiernan vorzugsweise und grösstentheils auf den Wänden der Gallenblase, der Gallengänge und der andern Blutgefässe, indem sie die Vasa vasorum derselben bildet. Aus den Netzen der Arterienzweigelchen geht das Blut nach Kiernan in Zweige der Pfortader über und von dort aus in die Lebervenen; denn durch feine Injectionen der Leberarterie wurde die Pfortader wohl, nicht aber die Lebervenen gefüllt. Als er mit blauer Masse zuerst die Pfortader und dann mit rother die Leberarterie gefüllt hatte, wurden Zweige von beiden Gefässen in den Häuten der Gefässe, der Gallengänge und der Gallenblase gefunden; die Läppchen der Leber waren blau gefärbt und die rothe Masse erschien nur punktweise im Umfang derselben. Kiernan nimmt daher an, dass diejenigen Zweige der Leberarterie, welche bis zu den Läppchen gelangen, in die venösen Plexus der Pfortader übergehen und dass das Blut von dort erst in die Anfänge der Lebervenen gelangt. Diese Ansicht, welche jener widerspricht, dass alles Blut der Leberarterie sowohl als der Pfortader in dieselben Capillargefässe gelange, ist indess noch nicht hinreichend erwiesen und die Lieberkuehn'schen Injectionen widersprechen ihr, indem hier die Capillargefässnetze öfter so leicht von dem einen als von dem andern Gefäss aus sich injicirt zeigen.

Von der letzten Verzweigung der Gallenkanälchen sagt Kiernan Folgendes. Da wo die feineren Zweige zwischen den Läppchen liegen, theilen sie sich durch Verzweigung, diese Zweige anastomosiren endlich mit einander und bilden zuletzt einen von den Blutgefässen unabhängigen Plexus, welcher die eigentliche Substanz des Läppchens ausmacht. *Philos. Transact.* 1833. *p.* 2. *Tab.* 23. *Fig.* 3. An den von mir injicirten Gallenkanälchen habe ich über die Existenz dieser Verbindungen nicht sicher werden können. Die Kanälchen sahen mehr wie in den mannigfaltigsten Richtungen durch einander liegende kurze Rispen aus, und die Entwickelungsgeschichte widerspricht dieser Ansicht, indem man beim Hühnchen und bei den Froschlarven auf der Oberfläche der Leber mit dem Mikroskop offenbar Reiserchen sieht. Kiernar erklärt sich diess Ansehen beim Fötus auf eine andere Art, nämlich als gelbe Zwischenstellen zwischen den Radiationen der Venen. Diese Erklärung würde dieser treffliche Forscher indess wohl nicht aufgestellt haben, wenn er selbst mikroskopische Untersuchungen über die Gallenkanälchen bei Vogelembryonen und Froschembryonen angestellt hätte. Dass die Gallenka-

Digitized by Google

nälchem beim Embryo reiserförmige kurze Endigungen an der Oberfläche der Leber bei mikroskopischer Untersuchung sehen lassen, ist nach meinen zahlreichen Beobachtungen nicht zu bezweifeln; ob die Acini beim Erwachsenen auch aus einer Anhäufung nicht anastomosirender Körper oder aus Plexus von Kanälchen bestehen, wie Kiernan behauptet, ist noch nicht entschieden und schwer zu entscheiden, da auch die gut injicirten Kanälchen der Acini, wenn ihre durch einander fahrenden Zweigelchen dicht gehäuft sind, den Anschein von Plexus annehmen können, zuweilen aber auch Plexus für Gallenkanälchen gehalten werden können, welche nichts anders sind, als durch Extravasation aus den Gallengängen angefüllte Venennetze oder Capillargefässnetze.

2. *Drüsen mit röhrigem Baue.* Hierher gehören die Nieren und die Hoden. Bei dieser Art drüsiger Organe wird die Vergrösserung der Fläche durch Kanäle von ausserordentlicher Länge realisirt, welche mehrentheils gewunden sind, während die Verzweigung entweder fehlt, oder ganz untergeordnet ist, und die Kanäle in dem grössten Theile ihres Verlaufs einen gleichen Durchmesser behalten.

F. *Nieren.* Die Nieren der niederen Wirbelthiere, wie der Fische und Amphibien, zeigen noch keinen deutlichen Unterschied von Substantia medullaris und corticalis. Das ganze Gewebe der Nieren der Fische besteht aus lauter gewundenen Kanälchen (*Ductus uriniferi*), welche durchgängig denselben Durchmesser behalten und sich zuletzt wahrscheinlich blind endigen, während sich ihre anderen Enden in den Harnleiter ergiessen. J. Mueller a. a. O. Tab. XII. Fig. 1—4.

Die Harnkanälchen in der Niere der Frösche geben, wie die Federfahne von dem Federschaft, nach einer Seite hin ab. Sie sind in ihrem Verlaufe theils gerade, theils gewunden, verändern ihren Durchmesser nicht und endigen zuletzt blind an dem entgegengesetzten Rande der Niere. J. Mueller a. a. O. Tab. XII. Fig. 11. Bei den Schlangen, wo die Nieren an dem, am äussern Rande derselben verlaufenden, Harnleiter, eine Reihe von Lappen bilden, schickt der Harnleiter von Stelle zu Stelle ein Stämmchen in die Concavität der Lappen ab, welches sich alsbald büschelförmig verzweigt. Diese Büschel gehen dann in die eigentlichen Harnkanälchen über, welche in mannigfaltigen Windungen das eigentliche Parenchym der Nieren ausmachen. Am Ende scheinen die Harnkanälchen etwas angeschwollen und blind. Mit Quecksilber gefüllt haben diese Harnkanälchen einen Durchmesser von 0,00322 p. Z. Die Nieren der Schildkröten gleichen in der Bildung der Harnkanälchen, deren Enden gefiedert sind, ganz denen der Vögel. Ueber das eigenthümliche System von zuführenden Venen in den Nieren der Frösche und Amphibien, siehe pag. 185 dieses Handbuchs.

Die Nieren der Vögel, welche aus mehreren ganz getrennten, nur durch die Aeste des Harnleiters verbundenen Lappen bestehen, gleichen schon den Nieren der Säugethiere darin, dass in ihnen Pyramiden enthalten sind, welche die Harnkanälchen in kleine Warzen sammeln, wovon jede in einen Ast des Harn-

Digitized by Google

leiters eingesenkt ist. Auf der Oberfläche der Nieren bemerkt man kleine Windungen, wie auf der Oberfläche des Gehirns oder wie die an einander liegenden Ränder eines sehr gekräuselten Blattes. Diese Windungen entstehen durch die schichtweise Ausbreitung der zur Oberfläche auftauchenden Harnkanälchen. In diesen Windungen liegen die Harnkanälchen parallel neben einander; man kann sich diese Anordnung so vorstellen, wie wenn ein Tuch nach einer Seite hin in die Spitze einer Pyramide zusammengefasst wird, während das andere Ende des Tuchs wie eine Gardine oder eine Halskrause in gekräuselte Falten gelegt ist. Bei der ersten Entstehung der Niere sieht man diese Bildung noch deutlicher, indem die aus der Tiefe aufstrebenden Schichten der Harnkanälchen sich in gekräuselten Figuren auf der Oberfläche der Niere neben einander legen und den Falten einer Krause in der That sehr ähnlich sehen; a. a. O. Tab. XIII. Fig. 4. 5. 6. Beim erwachsenen Vogel, wo sich die Harnkanälchen mit Hülfe der Luftpumpe durch Leim und Zinnober injiciren lassen, liegen die Enden der Harnkanälchen auf der Oberfläche der Nieren in wunderschöner Anordnung neben einander. Jedes dieser Kanälchen treibt federförmig kleine Zweige nach den Seiten aus, so dass jedes Harnkanälchen einem Federchen, oder auch der Verzweigung des Hirschgeweihes ähnlich sieht. Siehe Tab. XIII. Fig. 7. 9. 13.

Huschke's und meine Beobachtungen haben dieses Verhalten ermittelt. Nach neuen Beobachtungen, die ich an ausserordentlich schönen Injectionen vom Prof. Retzius in Stockholm angestellt habe, setzen sich die Seitenzweigelchen noch weiter in die Tiefe fort, wo sie keine Aeste weiter abgeben und allmählig kaum etwas feiner werden. Wie sie zuletzt endigen, weiss ich nicht gewiss; wie es scheint, bilden sie Schlingen. Die Harnkanälchen haben auf der Oberfläche der Nieren der Eule einen Durchmesser von 0,00174 p. Z. Vergleiche über den Bau der Vogelnieren Huschke, *Isis* 1828. pag. 565.

Bei dem Embryo der Säugethiere und des Menschen besteht die Niere aus mehreren ganz abgesonderten Lappen (*Renculi*), welche bloss durch die Zweige des Nierenbeckens zusammenhängen. Dieser Renculi sind so viele, als die Niere später Pyramiden hat. Bekanntlich bleiben diese Renculi in grosser Anzahl bei mehreren Thieren durchs ganze Leber getrennt, wie beim Bären, der Fischotter und den Cetaceen. Sowohl bei diesen Thieren, als bei dem Fötus der übrigen Säugethiere und des Menschen besteht jeder Renculus aus der pyramidalischen Marksubstanz und der wie eine Mütze um die abgerundete Basis derselben herumgeschlagenen Corticalsubstanz, welche die Medullarsubstanz, also bis auf die Papille des Renculus umgiebt. Nachdem diese Renculi unter einander verwachsen sind, setzt sich also nothwendig die Corticalsubstanz der Nieren zwischen die Pyramiden bis gegen die Papillen hin fort. In der Marksubstanz verlaufen die Harnkanälchen bekanntlich gestreckt; von der Basis bis gegen die Papille hin verbinden sie sich von Stelle zu Stelle, je zwei mit einander, wie die Zinken einer Gabel. Sie werden

Digitized by Google

gegen die Papille hin beim Pferde unbedeutend, beim Menschen, nach Weber, nicht einmal weiter und öffnen sich in den Löcherchen der Papillen. Gegen die Corticalsubstanz hin fahren die Harnkanälchen aus den Bündeln (*Ferrein'sche Pyramiden*), welche die Malpighi'schen Pyramiden zusammensetzen, nach allen Richtungen auseinander. Nur eine kleine Strecke setzen sich die Büschel der gestreckten Kanälchen in die Corticalsubstanz fort, indem diese Büschel von Harnkanälchen von aussen nach innen immer mehr Harnkanälchen, gewunden in die Rindensubstanz, abweichen lassen. Siehe J. Mueller a. a. O. Tab. XIV. Fig. 4. vom Eichhörnchen. Die ganze Rindensubstanz besteht aus lauter Windungen von Harnkanälchen, die ihren Durchmesser nun nicht weiter verändern. Bei dem Pferde ist die Rindensubstanz dünn und die Zahl der gewundenen Kanäle daher viel geringer. Die Enden der gewundenen Harnkanälchen aufzufinden ist ungemein schwierig. Nach meinen Beobachtungen an den Nieren des Eichhörnchens theilen sich zuletzt die Kanälchen mehrfach, und hören mit nicht oder kaum angeschwollenen Enden auf. Weber fand beim Menschen bei mikroskopischen Untersuchungen keine Enden der Harnkanälchen, sondern nur Schleifen. Beim Pferde habe ich durch Injectionen der Harnkanälchen vom Ureter aus mittelst der Luftpumpe ganz deutlich ermittelt, dass diese Kanäle vielfach unter einander anastomosiren. Tab. XV. Fig. 2. Nach Krause's Untersuchungen kommen blinde Enden der Harnkanälchen und Anastomosen zugleich vor, wie es auch bei den Samenkanälchen der Fall ist. Hiernach verhalten sich also die gewundenen Harnkanälchen durch ihre Anastomosen gerade so, wie die gewundenen Samenkanälchen. Um diese Kanälchen der Rinde zu injiciren, muss man sich der Hülfe der Luftpumpe bedienen, indem die äussere Oberfläche der Niere dem luftleeren Raum ausgesetzt ist, und die Injectionsmasse durch den Druck der äussern Luft aus dem Ureter in die Harnkanälchen bis auf die Oberfläche der Nieren hineingetrieben wird. Diese Injectionsart, welche zu diesem Zweck Huschke zuerst angewendet hat, gelingt nur bei dem Pferde vorzüglich. Was den Durchmesser der Harnkanälchen betrifft, so betragen sie in der Rinde der Nieren des Eichhörnchens 0,00149 p. Z.; sind also ungefähr 3 bis 6 Mal so dick, als die feinsten Blutgefässe. Auf der Oberfläche der Nieren des Pferdes betragen die Harnkanälchen im injicirten Zustand 0,00137 bis 0,00182; in der Medullarsubstanz betragen sie gegen die Mitte derselben schon beträchtlich mehr, nämlich 0,00189 und gegen die Papillen hin 0,01305 p. Z. Nach E. H. Weber nehmen diese Kanäle von ihren Windungen in der Rinde gegen das Mark und von dort bis an die Papillen beim Menschen gar nicht einmal an Umfang zu. In der Rindensubstanz betragen sie nach ihm 0,00180 p. Z. Durchmesser, in den Pyramiden 0,00160 p. Z., an der Papille 0,00100 p. Z.

Von ganz besonderem Interesse ist das Verhältniss der Blutgefässe zu der Nierensubstanz. In der Rinde der Nieren bilden die Blutgefässe die gewöhnlichen Capillargefässnetze, welche ausserordentlich dicht sind, so dass der Durchmesser nur einige Mal kleiner ist,

Digitized by Google

als ihre Zwischenräume; sie betragen hier nach meinen Ausmessungen 0,00037 bis 0,00058 p. Z. Durchmesser. In der Rinde zwischen den Harnkanälchen liegen die Malpighi'schen Körperchen, grösser als die Harnkanälchen und eben noch mit blossen Augen erkennbar; sie sind von Schumlansky viel zu klein abgebildet. Sie messen nach meinen Beobachtungen 0,00700; nach E. H. Weber 0,00666 bis 0,00883 p. Z. Diese Körperchen liegen in bläschenförmigen Aushöhlungen des Zellgewebes zwischen den Harnkanälchen und bestehen ganz aus Windungen von Blutgefässen. Siehe Tab. XIV. Fig. 8. 9. Merkwürdiger Weise kommen sie auch in den Nieren der mehrsten, vielleicht aller Wirbelthiere vor; sie sind bei den Fröschen, Kröten, Salamandern, Schildkröten, Vögeln, Säugethieren und Menschen aufgefunden. Schumlansky hatte die Hypothese eingeführt, dass diese Glomeruli die Quelle der Harnabsonderung seyen, indem aus ihnen die Harnkanälchen entsprängen. Diess hat sich bei näherer Untersuchung als unrichtig gezeigt, wie sich aus Huschke's und meinen Beobachtungen ergiebt. Denn die Glomeruli seu corpora Malpighiana lassen sich nur von den Arterien aus injiciren, werden aber nie nach Injectionen der Harnkanälchen angefüllt. Huschke hat überdiess beim Salamander beobachtet, dass das Blutgefässchen, welches in sie hineintritt, nach vielen Windungen wieder aus denselben herausgeht. Tiedemann *Zeitschrift für Physiol.* 4. Tab. 6. Fig. 8. Sie werden übrigens eben so leicht von den Arterien als von den Venen aus angefüllt, und sind überhaupt blosse Receptacula des Bluts.

Die Quelle der Harnabsonderung sind die gewundenen Harnkanälchen selbst, welche nicht bloss an ihren Enden, sondern an der ganzen ungeheuren Oberfläche, welche ihre Windungen darbieten, die in Harn verwandelten Theile des Bluts ausscheiden. Sie sind überall von den feinsten Blutströmchen umgeben, indem die Netze der Capillargefässe in ihren Zwischenräumen überall hingehen und sie umweben. Die aufgelösten Theile des Blutes können durch die zarten Wände der Harnkanälchen durchdringen, und bei diesem Durchdringen eine chemische Veränderung erleiden, oder die zersetzten Theile desselben angezogen und ausgeschieden werden.

In der Marksubstanz verlaufen die Blutgefässe zwischen den Härnkanälchen gestreckt gegen die Papillen hin, indem sie von der Rinde kommen. Diese von den Arterien und Venen aus leicht zu injicirenden Gefässe der Marksubstanz sind in früherer Zeit von den Anatomen fälschlich für die von den Arterien aus injicirten Bellini'schen Harnkanälchen gehalten worden, in welche die in die Arterien injicirten Flüssigkeiten nicht übergehen. Jene gestreckten Arterien und Venen werden gegen die Papillen der Nieren hin, statt sich wie die Harnkanälchen zu erweitern, vielmehr fein und bilden die gewöhnlichen Capillargefässnetze um die Oeffnungen der Harnkanälchen. Beim Hunde betragen diese gestreckten Arterien der Pyramiden 0,00175—0,00068 p. Z. im Durchmesser, in der Nähe der Papillen, wo sie Netze bilden, 0,00042 p. Z.

Digitized by Google

Vergleicht man die Harnkanälchen mit den Samenkanälchen des Hodens, so zeigt sich die grösste Aehnlichkeit; auch jene sind gewunden und bilden Anastomosen, unterscheiden sich von diesen nur durch ihre grössere Feinheit, indem sie beim Menschen einige Mal dünner sind als die Samenkanälchen, und daher mit blossen Augen nicht mehr gesehen werden. Bei den Schlangen sind sie dagegen schon so gross, dass man sie mit blossen Augen sieht, und eben so bei den Rochen und Haien. Erst durch ihre Feinheit und Anhäufung bilden sie den Anschein von fester Masse, wie ihn die Rinde dem nackten Auge darbietet.

G. *Hoden.* Bei den Insekten ist die Bildung des Hoden unendlich mannigfaltig. Der Grundtypus ist Vermehrung der Fläche, welche absondert, im kleinen Raume. Die Formen sind hier so überaus reich, als die Ausbildung einer grossen Fläche im kleinen Raume mannigfaltig ist. Siehe Leon Dufour *Ann. des sc. nat. Tom. VI. Septbr. u. Octbr.*; Succow in Heusinger's *Zeitschrift für organ. Physik. Tom. II.* Man findet daher bald einfache, unverzweigte, mehr oder minder gewundene Röhren, bald knäuelförmig aufgewickelte Röhren; in anderen Fällen endigen die Röhren verzweigt in Bläschen oder wirtelförmig, oder in sternförmige Anhäufungen von Blinddärmchen. Zuweilen stellt der Hoden einen Haufen bürstenförmig verbundener Blinddärmchen vor; zuweilen ahmen die Röhrchen einem Pferdeschweif nach; auch kommt es vor, dass die Röhrchen schlingenförmig sich mit einander verbinden, wie ich es an den Hoden der Scorpione gefunden habe. Die Absonderung geschieht also nothwendig hier nur auf der innern Fläche dieser Röhrchen, Blinddärme, Kapseln und die Natur erreicht denselben Zweck in einem einfachen, sehr langen Kanale, wie in kürzern verzweigten Röhrchen oder Anhäufungen von Blinddärmchen. Unter den Mollusken ist der Hoden ebenfalls sehr mannigfaltig, doch lässt er sich grösstentheils auf die Traubenform und die büschelförmigen Anhäufungen von Blinddärmchen reduciren.

Bei den Fischen finden sich zwei Modificationen der Bildung der Hoden vor; entweder bestehen sie nämlich aus verzweigten Röhren, wie beim grössten Theil der Fische (siehe Tab. XV. Fig. 7. von Clupea alosa), oder sie sind körnig. Im letztern Fall giebt es keinen Ausführungsgang des Hodens. Der Same wird im Innern dieser Körner gebildet, gelangt durch Zerplatzen dieser Körner wahrscheinlich in die Bauchhöhle, wie auch die Eier einiger Fische in die Bauchhöhle fallen, und aus der Bauchhöhle durch eine oder zwei, in diesem Fall vorkommende Oeffnungen nach aussen. So z. B. verhält es sich beim Aal und bei der Pricke nach Rathke's Beobachtungen, welche eine einfache Oeffnung der Bauchhöhle haben und bei welchen eben so die Eier nach aussen gelangen. Derselbe Bau findet sich nach meinen Beobachtungen in Hinsicht der Hoden bei den Haifischen und Rochen, welche zwei Oeffnungen der Bauchhöhle haben. Was man früher für Nebenhoden und Ausführungsgang des Hoden gehalten hatte, jenes aus gewundenen Kanälen und einem starken Ausführungsgang bestehende Organ, steht nämlich in keinem Zusammenhange

Digitized by Google

mit dem körnigen Hoden und ist eine Drüse eigener Art. Siehe J. Mueller in Tiedemann's *Zeitschrift für Physiol. IV. de glandul. penit. structura.* Tab. XV. Fig. 8. Auch beim Stör sind die Hoden körnig. Die Weibchen der Rochen und Haifische besitzen übrigens die Oeffnungen der Bauchhöhle, obgleich die Eier bei ihnen nicht in die Bauchhöhle fallen, sondern durch den Eierleiter nach aussen gelangen.

Die Hoden der nackten Amphibien sind noch ohne Nebenhoden, indem die Vasa efferentia sich ohne Weiteres zu dem Ductus deferens verbinden; sie bestehen übrigens aus kurzen blinden Röhrchen; bei den beschuppten Amphibien beginnt der Nebenhode aus den Windungen der Vasa efferentia und des Samenkanals selbst. Ueber den Bau des Hoden bei dem Menschen haben in neuerer Zeit die Untersuchungen von Astley Cooper (*Ueber die Bildung des Hoden. Weimar* 1832.) und besonders von A. Lauth (*Mém. de la Société de l'hist. nat. de Strasbourg. Liv. II.*) und Krause (Muell. *Arch.* 1837. 20.) weitere Aufschlüsse gegeben. Nach Cooper werden die Läppchen des Hoden nicht bloss durch die von der Albuginea ausgehenden Scheidewand-artigen Fortsätze geschieden, sondern auch noch einzeln durch ein überaus feines Häutchen eingeschlossen. Die Samenkanälchen haben sämmtlich die Richtung gegen das Rete testis. Man kann sie gleichsam als einen Kegel vorstellen, dessen Spitze an dem genannten Orte liegt; auch ist jedes Samenkanälchen so gelagert, dass es durch die Abnahme seiner Windungen gegen das Rete testis gleichsam einen Kegel bildet. Krause fand zwischen 404 und 484 Läppchen im Hoden. Die Samenkanälchen haben alle denselben Durchmesser. Er beträgt nach Lauth $\frac{1}{150}$ bis $\frac{1}{220}$ Zoll, im Durchnitt $\frac{1}{145}$ Zoll; ich habe ihren Durchmesser auf 0,00470 p. Z. angegeben. Injicirt betragen sie nach Lauth im Durchschnitt $\frac{1}{147}$ Zoll, nach mir 0,00945 p. Z. Mit Samen gefüllt haben sie nach Krause 0,00666, leer und bei Greisen 0,00521 Zoll im Durchmesser. Die Läppchen bestehen nach Lauth bald aus einem, bald aus zwei, bald aus mehreren Samenkanälchen. Lauth berechnet die Zahl der Samenkanälchen auf 840, und die Länge von einem auf 2 Fuss 1 Zoll. Ich hatte schon Enden der Samenkanälchen bei Säugethieren aufgefunden, wo diess bei den Nagethieren, wegen der Grösse der Samenkanälchen, weniger schwer ist. Lauth hat nur einmal ein geschlossenes Ende eines Samenkanälchens im Hoden des Menschen bemerkt. Krause hat die blinden Enden öfter beobachtet, und sowohl diess Verhalten als die Anastomosen constatirt. Dieses seltene Erscheinen der blinden Enden kommt nach Lauth davon her, dass die Samenkanälchen zuletzt sich schlingenförmig mit einander verbinden. Die Theilungen und Vereinigungen der Samenkanälchen sind nach Lauth so häufig, dass er auf einer entwickelten Portion, deren Kanälchen circa 45 Zoll zusammen an Länge betrugen, gegen 15 Anastomosen auffand; diese Anastomosen finden jedoch nur gegen das Ende der Samenkanälchen statt. Die Beobachtung dieser Anastomosen ist ganz neu. Da diese Kanälchen übrigens überall einen gleichen Durchmes er behalten,

Digitized by Google

da sie theils durch ihre blinden Enden, theils durch ihre Anastomosen geschlossen sind, so darf man sich die Absonderung des Samens nicht an den Enden desselben, sondern in ihrer ganzen Ausdehnung denken. An eine Communication der feinen Arterien mit Enden der Samenkanälchen ist ohnehin nicht zu denken. Die Samenkanälchen sind 15 Mal dicker als die feinsten Arterien, und die feinsten Blutgefässe verzweigen sich nur auf den Wänden der Samenkanälchen. Wenn die Vasa seminifera bis auf eine oder zwei Linien Entfernung zum Rete testis gelangt sind, so hören ihre Windungen auf; mehrere vereinigen sich in ein Kanälchen, und so gehen die Ductuli recti in das Rete testis über. Dieser geraden Kanälchen sind nach Lauth jedenfalls mehr als 20, wie Haller annahm; ihr Durchmesser ist stärker, wie der der Samengefässe, im Durchschnitt $\frac{1}{108}$ Zoll. Das Rete testis nimmt einen grossen Theil des obern Randes des Hodens ein; es fängt dort ein wenig nach aussen von der Extremitas interna an und dehnt sich bis zum äussern Dritttheile des obern Randes aus; es liegt in der Dicke der Albuginea, 6 bis 11 Linien lang, und bildet nach innen einen weissen Vorsprung der Albuginea. Die Höhe dieses Vorsprungs oder des Corpus Highmori beträgt 2 bis 4 Linien, seine Basis 3 bis 5 Linien. Das Rete testis besteht aus 7 bis 13 Gefässen, welche wellenförmig verlaufen, sich unter sich vereinigen und wieder theilen und alle unter sich zusammenhängen. Diese Gefässe haben $\frac{1}{150}$ bis $\frac{1}{180}$ Zoll Durchmesser. Die Vasa efferentia, welche aus dem Rete testis in den Kopf des Nebenhoden treten, sind anfangs grade, fangen aber bald an sich zu winden, so dass jedes der Kanälchen die Figur eines Conus annimmt, dessen Spitze mit dem Rete testis und dessen Basis mit dem Kopf der Epididymis zusammenhangen. Nach Lauth wird dieser Kanal gegen die Epididymis zu enger; anfangs haben sie $\frac{1}{164}$, zuletzt $\frac{1}{156}$ Zoll Dicke; die Zahl der Vasa efferentia ist 9 bis 30, sie haben 7 Zoll 4 Linien Länge. Der Kanal des Nebenhoden nimmt diese Gänge nach einander auf, nach Lauth's Berechnung in einer Entfernung von 3 Zoll zwischen je zweien. Die mittlere Länge des Kanals des Nebenhoden beträgt nach Lauth's Berechnung 19 Fuss 4 Zoll 8 Linien. Das Vasculum aberrans findet sich gewöhnlich an dem Winkel, welchen der Ductus deferens bildet, indem er sich gegen den Nebenhoden anlehnt. Meistens verbindet es sich mit dem Ende des Kanals des Nebenhoden, seltener mit dem Anfange des Ductus deferens. Selten finden sich mehrere Vasa aberrantia. Dieser Appendix hat eine gelbliche Farbe. Die Länge des entwickelten Kanals beträgt $1\frac{1}{2}$ bis 13 Zoll. Die Verbindungsstelle des Kanals mit dem Nebenhoden ist immer dünner als der übrige Theil und viel dünner als der Kanal des Nebenhoden. Gegen sein blindes Ende zu wird er allmählig dicker, zuweilen, nachdem er sich erweitert hat, zuletzt ausserordentlich fein; offenbar ist dieses Gefäss zur Absonderung eines Saftes in den Nebenhoden bestimmt. Ob dieser Kanal mit dem Wolff'schen Körper des Fötus in einer Beziehung steht, ist unbekannt. Sehr selten ist dieser Kanal verzweigt.

Digitized by Google

Nachdem nun der Bau der absondernden Organe im Einzelnen dargestellt worden, lassen sich allgemeine Resultate über den Bau der Drüsen zusammenfassen.

I. Die vorhergehenden Untersuchungen über den innern Bau sämmtlicher Drüsen, welche in der Thierwelt und bei dem Menschen auftreten, zeigen, dass, so mannigfaltig die Bildung ihrer Elementartheile ist, alle doch sammt und sonders dasselbe Bildungsgesetz verfolgen und von dem einfachsten unverzweigten Folliculus bis zu den zusammengesetzten Drüsen eine ununterbrochene Bildungsreihe darstellen.

II. Es lässt sich zwischen den Absonderungsorganen der wirbellosen Thiere und der Wirbelthiere keine Grenze ziehen, und die einfachsten Schläuche und röhrenförmigen Secretionsorgane der Insekten wiederholen sich nicht allein bei den höheren Thieren, sondern gehen durch die Thierwelt offenbar in die Drüsen der höheren Thiere über. Die Milchdrüsen des Schnabelthiers, die einfachsten Speicheldrüsen der Vögel, die prostatischen Drüsen vieler Säugethiere, das Pankreas der meisten Fische, sind so einfach wie die Absonderungsorgane der Crustaceen.

III. Alle Drüsen bieten im Inneren nur eine grosse Fläche der Absonderung dar und es giebt gar viele Arten innerer Bildung, durch welche die absondernde Fläche im kleinsten Raume vermehrt wird. Die Natur zeigt hierin, wie überall, einen unendlichen Reichthum der mannigfaltigsten Bildungen, ohne die einfachen Gesetze der Entwickelung zu verlassen. Wunderbar sind die Formen, durch welche sie bei den Insekten die samenabsondernden Röhren in fast vegetabilischem Character verändert, aber noch viel wunderbarer ist ihre Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der zusammengesetztesten Drüsen bei den höheren Thieren; allein alle Drüsen haben das gemein, dass sie nur auf Entwickelung des Ausführungsganges zu inneren Höhlen oder Kanälen mit geschlossenen Enden beruhen. Die Malpighi'sche Ansicht von dem Bau der Drüsen ist daher allerdings die richtigere, und diese Wahrheit ist durch die neueren Untersuchungen über allen Zweifel erwiesen; aber Malpighi kannte die Elementartheile der Drüsen nicht; nicht, was er für Folliculi in den zusammengesetzten Drüsen hielt, sind diese Elementartheile, sondern diese problematischen Folliculi bestehen aus einer grossen Anzahl viel kleinerer Theile, welche den Verzweigungen der Ausführungsgänge aufsitzen; auch sind Folliculi nicht immer die letzten hohlen Enden der Drüsen, sondern diese sind bald langgezogene Blinddärmchen, bald ästige und fiederförmig vereinigte Kanäle mit geschlossenen Enden, bald hohle Träubchen, bald grosse gewundene Röhren, welche ihren Durchmesser durchgängig beibehalten, und in mannigfachen Verbindungen zusammentreten; aber das ist richtig, was die Hauptsache der Malpighi'schen Ansicht war, dass alle letzten Verzweigungen der Ausführungsgänge geschlossen sind. Diess hatten bereits Mascagni und Cruikshank durch Quecksilberinjection von den Milchdrüsen des Menschen, E. H. Weber von den Speicheldrüsen des Menschen und der Vögel und dem Pankreas der letzteren

Digitized by Google

ebenfalls durch Quecksilberinjectionen, Rathke von den Harnkanälen der niederen, Huschke von den Harnkanälen der höheren Wirbelthiere gezeigt. Wir haben diesen Beweis durch alle Formen der Drüsen durchgeführt, von den einfachen Hautbälgen an, von den Intestinaldrüsen, von den aussondernden Drüsen, von den prostatischen und Cowper'schen Drüsen, welche entweder aus Blinddärmchen oder aus blinden Röhrchen oder aus Bläschen bestehen. Wir haben die Läppchen der Milchdrüsen des Kaninchens von den Milchgängen aus bis in die bläschenförmigen Enden der Ductus lactiferi vollständig aufgeblasen und dieselben beim Igel und Hunde mit Quecksilber gefüllt, was Mascagni und Cruikshank schon beim Menschen gethan hatten. Wir haben die Thränendrüse der Gans und des Pferdes vollkommen bis in die bläschenförmigen Enden der Kanäle mit Quecksilber gefüllt, wir haben die büschelförmigen Röhrchen in der Thränendrüse der Riesenschildkröte erwiesen.

Wir zeigten die zellige Substanz in den Speicheldrüsen von Murex tritonis, die blinden Enden der Kanäle in den Giftdrüsen der Schlangen, den zelligen Bau in den Speicheldrüsen der Schlangen. Die Speicheldrüsen der Vögel haben E. H. Weber und ich mit Quecksilber gefüllt. Wir haben die fortschreitende Entwickelung der Speichelkanäle in den Speicheldrüsen des Säugethierembryo durch eine Reihe von Beobachtungen verfolgt und überall die blinden und zuletzt bläschenförmigen Enden der Kanäle beobachtet. Weber hat die Zellchen der Parotis des Menschen, und ich die des Hundes mit Quecksilber gefüllt. Wir haben den Uebergang der pankreatischen Blinddärme der Fische in ein zelliges Pankreas durch eine ganze Reihe von Mittelstufen dargestellt. Beim Embryo der Amphibien, Vögel und Säugethiere lassen sich die freien blinden Enden der Ductuli pancreatici beobachten, und bei der Gans gelingt die Quecksilberinjection der zelligen Enden und somit des ganzen Pankreas.

Die Leber der Krebse besteht meist aus Blinddärmchen oder Zellen. Wir haben gezeigt, dass man die traubenförmige oder spongiöse Leber der Mollusken, bis in die letzten Bläschen und Zellen, wie eine Lunge aufblasen kann. Wir bestätigten, was schon Harvey und Malpighi angedeutet hatten, dass die Enden der Gallenkanäle bei den Embryonen freie, stumpf und blind geendigte, mikroskopische Reiserchen bilden.

Die Beobachtungen von Huschke und mir erweisen die unabhängige Existenz der Harnkanäle bei allen Wirbelthieren. Diese Kanäle verzweigen sich nicht baumförmig, sondern behalten ihren Durchmesser in ihrem Verlauf bis in ihre blinden, nicht angeschwollenen, auch nicht verdünnten Enden, mögen sie nun gerade verlaufen oder sich durcheinander schlängeln und der Hodensubstanz ähnlich seyn. Diess beweisen unsere Beobachtungen an Fischen, Salamandern, Fröschen, Schlangen, Vögeln, Säugethieren, diess beweist der Augenschein mittelst einer einfachen Loupe, an den Nieren der Rochen und Schlangen, wo diese Kanäle ungemein stark sind und bei gleicher Grösse die grösste Aehnlichkeit mit den Samenkanälen darbieten. Diess

Digitized by Google

beweisen unsere Injectionen der Harnkanäle bei Vögeln und Säugethieren.

Die übereinstimmende Bildung des Hoden aus selbstständigen Kanälen war längst bekannt, und die Lungen können endlich, mit ihren blind geschlossenen Zellen, für eine ganze Reihe von drüsigen Organen den Prototypus abgeben.

IV. Acini, als *Drüsenkörner*, in dem hypothetischen Sinne der Schriftsteller giebt es eigentlich nicht; es giebt keine Verknäuelungen der Blutgefässe, aus welchen auf eine geheimnissvolle Art absondernde Kanäle entspringen sollen, welche Vorstellung man auch dabei habe; es giebt keinen unmittelbaren Uebergang der feinsten Blutgefässe in die Anfänge der absondernden Kanäle. Das System der absondernden Kanäle ist ganz eigenthümlich und in sich geschlossen, wie es von allen Formen der Drüsen erwiesen worden ist.

V. Was man als Drüsenkörner beschreibt, diese Acini sind nur die Haufen der Enden der absondernden Kanäle, selbst oft Aggregate und Träubchen kleiner mikroskopischer Bläschen, die sich mit Quecksilber füllen und häufig sogar aufblasen lassen. Wirkliche solide Körner giebt es nur in den Hoden einiger weniger Fische, deren Hoden keinen Ausführungsgang haben und wo die Samenkörner in die Bauchhöhle platzen und von hier aus durch eine Oeffnung ausgeführt werden.

VI. In vielen Drüsen, denen man fälschlich Drüsenkörner zugeschrieben hat, giebt es nicht einmal hohle oder bläschenartige Acini, sondern vielmehr bloss lange gewundene Kanäle von überall gleichem Durchmesser, wie in den Nieren, eben so wie in den Hoden und vielen anderen Drüsen; oder gerade Röhrchen, wie in der Thränendrüse der Riesenschildkröte, in den Cowper'schen Drüsen des Igels, in dem Hoden der Sepie, der Fische und der Frösche, in den Steissdrüsen der Vögel, in den Drüsen der Eierleiter bei den Rochen und Haien; oder Blinddärmchen, wie in der Leber der Krebse, in den Drüsen, welche die Cloake bei den männlichen Urodelen besetzen, in den prostatischen Drüsen vieler Säugethiere. Hohle Endbläschen (*Substantia acinosa*) giebt es allerdings in gewissen Drüsen von traubenförmiger Bildung der Elementartheile, wie in den Speicheldrüsen, im Pankreas, in den Milchdrüsen der meisten Säugethiere, in der Thränendrüse der Vögel und Säugethiere, in der Harder'schen Drüse, in der Leber der Mollusken u. s. w. Die Ausdrücke: *Substantia acinosa, acini* u. dgl. passen daher allerdings für eine gewisse Klasse von Drüsen, insofern *Acinus* ursprünglich *Träubchen* bedeutet. Allein diese Bedeutung ist durch die mannigfaltigen Hypothesen nach und nach in die falsche Bedeutung *Drüsenkorn*, körniges Wesen übergegangen; und da die Bezeichnung Acini nur für einige Drüsen, auch im richtigen Sinne des Wortes, passt, so ist es räthlich, bei dem Gebrauch dieses Wortes, dem sich so viele falsche Erklärungen und Hypothesen angehängt haben, sehr vorsichtig zu seyn.

VII. Es ist von allen Drüsen erwiesen, dass die Blutgefässe nicht in diese Elementartheile übergehen, dass die feinsten Blutgefässchen sich zu den Wänden jener hohlen Kanäle und ihren

Digitized by Google

Enden verhalten, wie zu jeder andern feinen absondernden Haut, z. B. der Schleimhaut der Lungenzellen. Sie öffnen sich nicht mit freien offenen Endigungen in den Anfängen der absondernden Kanäle und Höhlungen der Drüsen, sondern die Arterien gehen auf den Elementartheilen der Drüsen durch unendliche netzförmige feine Anastomosen in Venen über, wie wir an dem Bau der mehrsten Drüsen gezeigt haben.

VIII. So wie die absondernden Kanäle der Drüsen mit ihren blinden Wurzeln eigenthümlich und selbstständig sind, so bildet auch das Blutgefässsystem in jeder Drüse ein vollkommen in sich geschlossenes Ganze, durch den vollkommen geschlossenen netzförmigen Zusammenhang der baumförmigen Verzweigungen der Arterien und Venen.

IX. Man hat von einigen Drüsen früher einen Zusammenhang der lymphatischen Gefässe mit den Ausführungsgängen behauptet. Cruikshank u. A. füllten aus den Milchgängen der Milchdrüsen lymphatische Gefässe. Diess geschieht in der Regel nicht; die Milchdrüsen füllen sich, wie Mascagni zuerst zeigte, mit Quecksilber bis in ihre Endbläschen ohne allen Uebergang in die Lymphgefässe. Walter behauptete aus gewaltsamen Injectionen einen Zusammenhang zwischen Lymphgefässen und Gallenkanälen. Allein diese Gründe sind so wenig haltbar, als so mancher andere von gelegentlichen Uebergängen einer Injectionsmaterie aus einer Ordnung von Gefässen in eine andere, nach gewaltsamen Injectionen. Ueberhaupt könnte ein Zusammenhang der Lymphgefässe nur mit den stärkeren ausführenden Kanälen möglicher Weise stattfinden; denn die Lymphgefässe sind ja ausserordentlich stärker als die feinsten Elementartheile der Drüsen.

X. Das System der absondernden Kanäle, mit blinden hohlen Wurzeln selbstständig und geschlossen, ist als eine Efflorescenz des Ausführungsganges zu betrachten und bildet sich auch beim Embryo augenscheinlich aus einem zuerst astlosen Gang.

XI. Die baumförmigen Verzweigungen der Blutgefässe begleiten die aufkeimenden absondernden Gänge und legen sich mit ihrer peripherischen netzförmigen Auflösung über alle diese blinden Elementartheile hin, welche sie mit Blut tränken. So wie sich die innere Flächenbildung auf der einfachen ebenen Wand zum Blinddarm und verzweigten Blinddärmchen fortsetzt, so erhebt sich hinter und über dieser Efflorescenz die Gefässschicht der einfachen Wand, ein Process, der beim Hühnchen beobachtet werden kann. So entwickeln sich beide Systeme an einander aufsteigend, je mehr sich die einfache Wand in eine innere Flächenbildung complicirter ausbildet.

XII. Dadurch, dass die verzweigten Kanäle und Röhren, welche bei einfacherer Bildung unter den Insekten und Crustaceen und selbst bei höheren Thieren frei liegen, immer mehr durch neue Efflorescenz aneinanderrücken und sich decken, entsteht Parenchym. Dieser Entwickelungsgang ist bei den Embryonen augenscheinlich gemacht worden.

XIII. Die feinsten netzförmigen Blutgefässchen sind meist

Digitized by Google

viel dünner als die dünnsten Aeste der Ausführungsgänge oder Drüsenkanäle und ihre blinden Enden, selbst in den zusammengesetztesten drüsigen Eingeweiden. Die Elementartheile der Drüsen sind immer noch so gross, dass sie erst von den feinsten Blutgefässnetzen umspannt und umwebt werden können. Die Rindenkanäle der Nieren sind viel stärker als die feinsten Blutgefässe, wie durch alle Klassen der Thiere erwiesen worden ist. Bei den Speicheldrüsen der Menschen und der Säugethiere sind die feinsten Blutgefässe immer noch mehrmal dünner als die traubenförmig verbundenen, mit Quecksilber zu füllenden Endbläschen der Speichelkanäle. Eben so beim Pankreas, wie ebenfalls durch Injectionen erwiesen ist. Auf den Zellen der Harder'schen Drüse, der Thränendrüse und Speicheldrüsen der Vögel, die alle mit Quecksilber auf das Artigste injicirt werden können, verbreiten sich erst die feinsten Blutgefässchen, wie auf anderen zarten Häutchen, wie auf den Lungenzellen. Auf den Samenkanälen des Hodens verbreiten sich erst die Netze der feineren Blutgefässchen. Die Harnkanäle in den Nieren der Rochen sind aber nicht dünner als die Samenkanäle im Hoden des Menschen. Endlich zeigt die Entwickelungsgeschichte aller zusammengesetzten Drüsen diesen Unterschied an den noch frei liegenden Drüsenkanälen zur Evidenz.

XIV. Die Ausbildung der Drüsen in der Entwickelungsgeschichte des Embryo ist eine Wiederholung ihrer Ausbildung in der Thierwelt. Die vollkommensten und zusammengesetztesten Drüsen der höheren Thiere bestehen bei den Embryonen dieser Thiere zuerst nur aus den freien Ausführungsgängen, ganz ohne alle Zweige; aus diesen Kanälen, welche dann ganz mit den Absonderungsorganen der niederen Thiere übereinkommen, efflorescirt die Verzweigung immer weiter.

XV. Es giebt sehr viele Modificationen im innern Bau einer Drüse, wodurch sie die absondernde Fläche vermehrt; aber keine ist einer Drüse ganz eigenthümlich durch alle Thiere. Ganz verschiedene Drüsen können einen gleichen innern Bau haben, wie die Hoden und die Rindensubstanz der Nieren; gleiche Drüsen haben oft einen ganz und gar verschiedenen Bau bei verschiedenen Thieren, wie die Thränendrüse der Schildkröte, Vögel und Säugethiere. Die Speicheldrüsen sind bei den Vögeln nur verzweigte Gänge mit zelligen Vorsprüngen; bei den Säugethieren sind es Träubchen von Zellen, zu denen eine complicirte Verzweigung der Kanäle führt. Wie verschieden ist die innere Bildung der Leber in der Thierwelt, bald einfach blinddarmförmig, bald büschelförmig, bald traubenförmig, bald schwammig, bald aus verzweigten Kanälen, mit gefiederten Elementarreiserchen endigend! Wie unendlich mannigfaltig die Bildungen der Samenkanälchen im Hoden! Nur die Nieren behaupten in ihrer Bildung durch alle Klassen das Constante, dass sie aus unverästelten, nicht baumförmig vertheilten Kanälen, sondern durchgängig aus langen neben- oder durcheinander liegenden Röhrchen bestehen, obgleich in der Ordnung dieser Röhrchen die grösste Verschiedenheit herrscht.

Digitized by Google

XVI. Die Drüsenbildung vervollkommnet sich nicht in der Thierwelt absolut, sondern in jeder Klasse der Thiere treffen wir rudimentäre Drüsen mit höchst einfacher Bildung, wenn diese Drüsen der Klasse zuerst zukommen; so einfach sind die Speicheldrüsen bei den Vögeln und Schlangen, und so erscheinen die Milchdrüsen des Schnabelthiers, die prostatischen Drüsen der Nager, das Pankreas der Fische, die Leber der niederen Thiere, selbst blinddarmförmig.

XVII. Die Substanz der Elementartheile der Drüsen ist durchgängig weiss, oder weissgraulich, oder weissgelblich, bei allen Drüsen, so verschieden die Secrete der Drüsen sind. Eine Uebereinkunft der Drüsensubstanz mit ihrem Secretum besteht nicht.

Mikroskopische Messungen.

	Par. Zoll.
Feinste Blutgefässchen oder Capillargefässe (nach E. H. Weber) $= \frac{1}{4000} - \frac{1}{2000}$ Z. =	0,00025 — 0,00050
Dieselben in den Nieren nach meinen Messungen	0,00037 — 0,00058
Dieselben in der Iris des Menschen	0,00037 — 0,00047
Dieselben in den Processus ciliares	0,00053
Kleinste Lungenzellchen beim Menschen (nach E. H. Weber) = 0,053 — 0,160 Lin. =	0,00441 — 0,01333
Cylinderförmige Blinddärmchen an den Lungen des Vogelembryo	0,00474
Elementarbläschen der Milchdrüsen des säugenden Igels	0,00712 — 0,00928
Dieselben vom Hunde mit Quecksilber gefüllt	0,00260
Zellen in den Speicheldrüsen der Gans, nach meinen Injectionen	0,00260
Zellen der Parotis des Neugebornen (nach E. H. Weber's Injectionen)	0,00082
Dieselben vom Hunde, nach meinen Injectionen	0,00187
Zellen der Thränendrüse von der Gans, nach meinen Injectionen	0,00327
Zellen des Pankreas der Gans, mit Quecksilber gefüllt	0,00137 — 0,00297
Elementartheile der Thränendrüse der Riesenschildkröte	0,00194
Zellen der Harder'schen Drüse vom Hasen, nach meinen Injectionen	0,00776
Elementarbläschen der Leber von Helix pomatia	0,00565
Elementarreiserchen der Leber eines Hehrembryo von 1 Z. Länge	0,00172
Endreiserchen der Gallenkanälchen, auf der Oberfläche der Leber des Kaninchens, injicirt	0,00108 — 0,00117
Blinddärmchen der Wolff'schen Körper eines Vogelembryo	0,00377
Dieselben von einem andern Embryo	0,00300
Harnkanäle von Petromyzon marinus	0,00324
Harnkanäle der Nieren vom Zitterrochen	0,00469
Harnkanäle der Schlangen, mit Quecksilber gefüllt	0,00232
Enden derselben	0,00423
Harnkanäle von der Eule, vom Ureter aus injicirt, an ihren Enden	0,00174
Harnkanäle des Eichhörnchens (Rindenkanäle)	0,00149
Rindenkanäle der Pferdenieren (vom Ureter aus injicirt) auf der Oberfläche der Nieren	0,00137 — 0,00182
Bellini'sche Röhren der Marksubstanz von Pferdenieren, vom Ureter aus injicirt, an den Papillen am stärksten	0,01305
Dieselben von mittlerer Stärke (injicirt)	0,00489
Dieselben auf Durchschnitten der Rinde am feinsten (injic.)	0,00140 — 0,00188

Digitized by Google

Dieselben in der Rinde der Nieren des Menschen, nach Weber	0,00180
Dieselben in den Pyramiden	0,00160
Malpighi'sche Körperchen der menschlichen Nieren	0,00700
Dieselben (nach E. H. Weber)	0,00666 — 0,00883
Gestreckte Arterien der Pyramiden des Hundes	0,00068 — 0,00175
Dieselben in der Nähe der Papillen, wo sie Netze bilden	0,00042
Samenkanäle eines jungen Hahnen	0,00528
Samenkanäle des Eichhörnchens	0,01453
Samenkanäle des Igels	0,00970
Samenkanäle des Menschen	0,00470
Dieselben mit Quecksilber gefüllt	0,00945
Röhren in den Steissdrüsen der Gans	0,00990
Reiserförmige Blinddärmchen oder Röhren von den Cowper'schen Drüsen des Igels	0,01022
Zellchen an den Meibomi'schen Drüsen des Menschen (nach E. H. Weber)	0,00258 — 0,00633
Zellen der Harder'schen Drüse der Gans, mit Quecksilber gefüllt $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5}$ Lin.	
Zellen in den Speicheldrüsen von Murex tritonis $\frac{1}{8} - \frac{1}{5}$ Lin.	
Zellen der spongiösen Leber von Murex tritonis $\frac{1}{6} - \frac{1}{4}$ Lin.	

Man vergleiche die Messungen von Krause a. a. O.

III. Capitel. Ueber den Secretions-Process.

1. Von den Ursachen der Absonderung.

Die Absonderung ist nur eine besondere Art der Verwandlung oder Metamorphose, welche die thierischen Säfte, das Blut bei dem Durchkreisen der Organe erleiden. Das Blut kreist in allen Organen in einem überaus feinen Netzwerk von Blutgefässchen aus den Arterien nach den Venen. Diese Netze sind allenthalben geschlossen, nirgends giebt es Enden der Gefässe, sondern allenthalben nur netzförmige Uebergänge der Arterien in Venen. Die feinsten netzförmigen Blutströmchen haben nur eine äusserst dünne, leicht durchdringliche Wand. Siehe oben pag. 216. Wo ein Strömchen entsteht (und neue Strömchen bilden sich immer wieder, wie Beobachtung beim Embryo und bei jungen Thieren lehrt), da entsteht eine Rinne in dem Bildungsstoffe, die mit den übrigen netzförmigen Strömchen in Communication tritt, und wenn sie im Anfang ohne dichtere Begrenzung ist, doch bald eine solche erhalten mag. Die Capillargefässwände aber, dem Auge ohnehin meist unerkennbar, sind so fein, dass eine freie Wechselwirkung der Substanz mit den Blutströmchen stattfinden kann. Die Substanz tränkt sich mit dem Blute, eignet sich dessen Bestandtheile an und verwendet sie auf die jedem Organe eigenthümliche Art.

Alle Absonderung aber geschieht auf Flächen, seyen es nun einfache Häute, wie die serösen Membranen und die Schleimhäute, oder sey es complicirte innere Flächenbildung in zellenhaften oder kanalförmigen Aushöhlungen der Drüsen.

Digitized by Google

Innerhalb der absondernden Häute gehen die Arterien wie überall durch ein Netzwerk der feinsten Blutgefässchen in Venen über; diess geschieht hier in der Fläche unzähliger netzförmiger Verbindungen. Die häutigen Wände tränken sich während des Durchgangs des Blutes durch die feinsten Gefässnetze mit den aufgelösten Theilen des Blutes, verwandeln es und lassen das Verwandelte, als Secret, auf der häutigen Fläche abfliessen.

Die complicirteste Drüse ist auch nur eine im kleinsten Raum construirte grosse Fläche, sie ist mit allen ihren inneren Gängen, Kanälen, jenen Röhren, oder Zellen, oder Blinddärmchen immer nur eine ungeheure flächenhafte thierische Grenze, auf welcher die Metamorphose des Blutes stattfindet.

Die Elementarröhren der Nieren, die Elementartheile der Leber, wie anderer zusammengesetzten Drüsen, sind in ihrem ganzen Verlauf von den feinsten Blutgefässnetzen umsponnen, haben zwischen sich nur dünnes Bindegewebe, welches die Drüsenkanäle verbindet und innerhalb welchem die feinsten Strömchen des Blutes stattfinden. Die Elementarkanäle, jene Träubchen, Röhrchen etc., werden also überall äusserlich von feinen Blutströmchen umspült, sie tränken sich mit diesem Blute, verwandeln es auf eigenthümliche Art, und lassen auch das Verwandelte nach innen gegen die Ausführungsgänge abfliessen. Diess ist der einfache Process der Absonderung, der sich von der Ernährung nur unterscheidet, dass das Verwandelte von häutigen Grenzen abfliesst.

Man hat früher die Absonderung in den Drüsen gegen alle Analogie auf die Enden der Drüsenkanäle oder auf jene hypothetisch so geheimnissvollen Acini verwiesen. Diess ist sehr unrecht, wie bereits E. H. Weber bemerkt; denn die Acini, in dem naturgemässen Sinne, dass es hohle Bläschen sind, existiren in den wenigsten zusammengesetzten Drüsen; die Elementartheile der Leber sind Reiserchen, die Elementartheile der Hoden und Nieren blosse Röhren von überall gleichem Durchmesser. Viele andere Drüsen haben büschelförmige Blinddärmchen am Ende der Kanäle ohne alle Endanschwellung. Unsinnig wäre es, hier zu sagen, der Samen, der Harn u. s. w. wird nur in den blinden Enden der Röhren abgesondert, die Galle nur am Ende der hohlen Reiserchen.

Einige zusammengesetzte Drüsen zeigen überdiess im Verlauf des Ausführungsganges überall dieselben Elementartheile, als Zellen wie die Speicheldrüsen der Vögel, die Thränendrüse derselben, die Meibomischen Drüsen des Menschen; oder Blinddärmchen, wie die Leber der Krebse und die Thränendrüse der Schildkröten.

In den Drüsen, welche aus zusammengesetzten Blinddärmchen bestehen, kann man endlich die Grenze der Elementartheile und der Ausführungsgänge gar nicht angeben.

Es ist also höchst wahrscheinlich, ja gewiss, dass die Absonderung auf der ganzen Continuität der Drüsenkanäle, also auf einer zusammenhangenden Fläche, geschieht.

Digitized by Google

Das Blut wird in den Drüsen wie in allen Organen durch die feinsten Verzweigungen der Arterien in ein überaus feines Netzwerk von Strömchen vertheilt, aus welchen es wieder in die Anfänge der Venen übergeht. Die Vasa exhalantia sind von den älteren Physiologen bloss desswegen erfunden worden, weil man die pag. 237 und 252 erläuterte Beschaffenheit der thierischen Gewebe nicht kannte, mit allem Aufgelösten sich zu tränken, und die Flüssigkeiten eben so leicht durch ihre porösen Wände an andere Theile abzugeben. Man muss sich also eine absondernde Fläche nur von den dichtesten Netzen der Capillargefässe durchzogen denken. Man weiss schon wie nahe diese Netze der Oberfläche einer von Epidermis unbedeckten Haut liegen; man weiss, dass ein Häutchen von der Dicke der Urinblase eines Frosches schon innerhalb einer Sekunde einen aufgelösten Stoff durch sich hindurch lässt, und da das zarte Häutchen der Darmzotten vom Kalb und Ochsen von 0,00174 p. Z. Dicke noch blutführende Capillargefässe enthält (siehe pag. 244), so kann man sich nach dieser Dicke einen Begriff von der Tiefe machen, welche aufgelöste Stoffe des Bluts zu durchdringen haben, um aus den oberflächlichsten Netzen der Capillargefässe hervorzudringen. Aus diesen Netzen der Capillargefässe dringen nun die aufgelösten Theile des Bluts mit Leichtigkeit in die Partikeln des specifischen Gewebes der absondernden Haut ein; hier werden sie chemisch verändert und dringen gegen die Oberfläche der absondernden Haut hervor. Die Kraft, durch welche das chemisch veränderte Secretum von der secernirenden Fläche abgestossen wird, ist hiermit noch nicht, sondern bloss die Möglichkeit des Durchdringens erklärt. Man kann diese bei manchen Secretionen so profuse Ergiessung wie so vieles Andere, nicht im Ernst von der Kraft des Herzens und dem Impuls des Blutes abhängig machen; diese mechanische Erklärung würde durchaus nicht ausreichen; ausserdem dass sie ohnehin bei den Absonderungen der Pflanzen wegfällt, wäre auch nicht einzusehen, wie die Absonderung sich unabhängig vom Herzen durch specifische örtliche Reize vermehrt. Nun fragt sich ferner, warum das specifisch veränderte Fluidum bloss nach einer Seite hin vordringt, und warum der Schleim nicht eben so leicht zwischen den Häuten des Darmkanals, als auf der innern Haut desselben abgeschieden wird? warum die Galle aus den Gallenkanälchen nicht eben so leicht durch die Oberfläche der Leber, als nach innen im Verlauf der Gallenkanälchen vordringen kann? warum der Samen nur auf der innern Fläche der Samenkanälchen und nicht auf der äussern Fläche derselben in die Zwischenräume dieser austritt? Diese Abscheidung des Secretums nach einer Seite der secernirenden Wände, nämlich ins Innere der secernirenden Kanäle und nicht nach aussen ist eines der grössten physiologischen Räthsel; man kann sich dasselbe auf zweifache Art hypothetisch lösen:

1. Indem man annimmt, dass jene die secernirenden Flächen durchziehenden Capillargefässnetze durch besonders construirte organische und gleichsam aushauchende Poren bloss nach der innern Fläche der secernirenden Kanäle offen stehen. Das

Digitized by Google

Schwierige dieser Ansicht liegt darin, dass man hierbei etwas nicht zu Erweisendes annehmen muss, und dass man dann wieder andere Poren an den zartesten Blutgefässen annehmen müsste, durch welche die zur Ernährung der absondernden Kanäle bestimmten Flüssigkeiten eindringen müssten.

2. indem man wahrscheinlicher annimmt, dass zwar durch blosse Imbibition oder allgemeine Porosität (sogenannte unorganische Poren) die flüssigen Stoffe aus den Capillargefässen in das Gewebe des secernirenden Organes sich verbreiten, dass aber die Oberfläche der secernirenden Kanäle die Elemente, die sie zu neuen Stoffen zu verbinden strebt, chemisch anzieht, und auf eine freilich unerklärliche Weise gegen die innere Fläche der secernirenden Haut oder der Drüsenkanälchen verändert abstösst. Vgl. Mascagni *Nova per poros inorganicos secretionum theoria vasorumque lymphaticorum historia iterum vulgata et parte altera aucta, in qua vasorum minimorum vindicatio et secretionum per poros inorganicos refutatio continetur. Auct. P. Lupi. Romae* 1793. Dass es hier nicht bloss auf Durchschwitzung, sondern auf Action der absondernden Wände ankommt, sieht man leicht ein, wenn man die Menge der durch eine gereizte Speicheldrüse abgesonderten Flüssigkeiten, die Plötzlichkeit und Menge der Thränen auf augenblickliche Wirkungen bedenkt.

So entblösst von Thatsachen eine solche Annahme von Anziehung und Abstossung auch ist, so ist sie doch nicht ohne Analogie in den physikalischen Erscheinungen, und es scheint, dass bei der Absonderung eine ganz ähnliche Kraft die Ausscheidung bewirkt, wie jene, welche bei der Resorption die Aufnahme in die Lymphgefässnetze oder Anfänge der Lymphgefässe bewirkt. Wunderbar, dass in verschiedenen Gewebetheilen einer und derselben Membran oft beiderlei Kräfte neben einander wirken, indem z. B. die Schleimbälge der Schleimhäute, welche absondern, von den anziehenden und aufsaugenden Lymphgefässnetzen dicht umher umgeben sind. Vergl. oben pag. 271.

Wollaston nimmt an, dass bei den Secretionen ein elektrischer Process stattfinde. Er nahm eine zwei Zoll lange, $\frac{3}{4}$ Zoll dicke Glasröhre, und verband das eine Ende derselben mit Blase; dann goss er Wasser in die Röhre, worin $\frac{1}{240}$ Kochsalz. Die Blase wurde äusserlich befeuchtet und auf ein Stück Silber gesetzt; nun wurde ein Zinkdraht durch das eine Ende mit dem Silber, durch das andere mit der Flüssigkeit in Berührung gebracht. Es erschien reines Natron an der äussern Fläche der Blase. Eberle gelang dieser Versuch nur bei einer stärkern galvanischen Action. Eberle, *Physiologie der Verdauung.* p. 137.

Die Eigenthümlichkeit und Verschiedenheit der Absonderungen hängt von keinem äusserlichen und mechanischen Grunde ab. Man hat sie in der verschiedenen Schnelligkeit des Blutlaufs in verschiedenen Organen gesucht, und diese verschiedene Schnelligkeit wäre selbst wieder zu beweisen. Man hat sie in dem verschiedenen Zustande der Blutgefässe, und ihren Theilungswinkeln gesehen. Aber die Blutgefässe verhalten sich in den Nieren fast wie in den Hoden, in den Speicheldrüsen nicht viel anders als

Digitized by Google

in der Leber, wie an Lieberkühn'schen Präparaten zu sehen; sie bilden allenthalben netzförmige Anastomosen zwischen den feinsten Arterien und Venen. Man hat die Ursachen in der Verschiedenheit der Enden der Arterien gesucht, aber diese Enden existiren nicht; in dem verschiedenen Durchmesser der aufnehmenden Kanäle, und dennoch geschehen die verschiedensten und eigenthümlichsten Absonderungen auf ebenen Häuten. Alle diese Dinge, womit Haller sich viel zu lange aufgehalten hat, geben keine Erklärung, wenn sie auch stattfänden; sie sind unzureichende und unerwiesene Beweismittel. Und wie leicht waren alle diese mechanischen Difficultäten abzufertigen durch die einzige Frage: warum wird hier Gehirn, dort Muskel, dort Knochen gebildet; entsteht etwa das Gehirn auch durch veschiedene Winkel der Gefässvertheilung?

Die Eigenthümlichkeit der Absonderungen hängt auch nicht von dem innern Bau der Drüsen ab; denn jedes Secret wird in der Thierwelt bei dem verschiedensten Bau abgesondert, wie ich wohl zur Genüge erwiesen habe. Man denke an die Speicheldrüsen der Vögel und der Säugethiere, an die Leber der Krebse, Mollusken, Wirbelthiere, an die ausserordentliche Verschiedenheit in dem Bau der Hoden, in dem Bau der Thränendrüse bei den Schildkröten, Vögeln und Säugethieren. Ueberdiess haben die verschiedensten Absonderungen bei gleichem Bau der Drüsen statt. Die Rindenkanäle der Nieren unterscheiden sich von den Samenkanälen nur durch ihre grössere Feinheit. Milchdrüsen, Speicheldrüsen, Thränendrüsen haben eine durchaus gleiche Beschaffenheit.

Die Natur der Absonderung hängt daher allein von der eigenthümlichen specifisch belebten organischen Substanz ab, welche die inneren absondernden Kanäle der Drüsen bildet, und welche sich gleich bleiben kann bei der verschiedensten Architektonik der Drüsenkanäle, und ausserordentlich verschieden ist bei gleichem Bau der letztern. Die Verschiedenheit der Absonderung beruht daher auf demselben Grunde, wie die Verschiedenheit der Bildung und des Lebens in den Organen überhaupt. Der einzige Unterschied liegt nur darin, dass das verwandelte Blut in dem einen Fall dem Organe einverleibt wird, in dem zweiten aber über die Grenze desselben als Secret hinaustritt.

In der neuern Zeit hat sich von Seiten mehrerer Chemiker, namentlich durch Chevreul, die Ansicht geltend gemacht, dass alle Absonderungen ohne Umwandlung geschehen und dass das Blut alle Stoffe, welche sich in den Secreten vorfinden, bereits enthalte, dass dagegen den Secretionsorganen das Vermögen zukomme, vorzugsweise bald den einen, bald den andern aus dem Blute auszuziehen und in ihr Secret zu übertragen. Hierfür spricht, nach Gmelin, dass die Salze des Blutes und der Secrete ungefähr dieselben sind, dass in beiden Osmazöm und speichelstoffartige Materie (?) vorkommt, und dass man im Blute bereits auch viele von denjenigen Stoffen gefunden hat, von welchen man früher glaubte, dass sie nur in den Secreten vorkommen, wie Käsestoff, Gallenfett, Talg, Oel, Oelsäure. In der That ist neuer-

Digitized by Google

lich die Existenz von Cholesterin im Blute von Boudet (*essai critique et experimental sur le sang. Paris* 1833) wieder bestätigt worden. Dennoch aber scheint mir jene Ansicht ein grosser Fehlgriff. Fürs Erste, weder Hornstoff, noch Schleim, noch Gallenstoff, noch Picromel, noch Samen, noch wirklicher Käsestoff, noch wahrer Speichelstoff und die giftigen Secreta finden sich im Blute; zweitens können Bestandtheile der Secreta durch Imbibition zufällig ins Blut gelangen, ohne dass diess ein Beweis von der Existenz derselben als Constituentia des Blutes wäre. Endlich wäre die Existenz aller Secrete im Blute gar keine Erklärung; denn es entsteht nun die viel schwierigere Frage, wie sie z. B. von pflanzenfressenden Thieren erzeugt werden. Es erleidet gar keinen Zweifel, dass die wahren Secreta durch die Secretionsorgane selbst eben so aus einfacheren Bestandtheilen des Blutes gebildet werden, wie es von den festen Theilen gewiss ist.

Der chemische Process der Absonderung ist gänzlich unbekannt. Die einfache zu erklärende Aufgabe ist, wie es kommt, dass die secernirenden Wände sich aus demselben Blute zugleich ernähren, das heisst ähnliche Theile anziehen und in sich verwandeln und auch wieder unähnliche Theile abstossen oder absondern. Denn das Secretum ist durchgängig von dem secernirenden Organe chemisch verschieden. Die Drüsensubstanz besteht in der Regel nur in einem ungeronnenen, nach der Zerkleinerung leicht von Wasser löslichen, Eiweiss. Ich fand die Elementartheile der Secretionsorgane immer grau, oder weissgrau, oder weissgelb; so sind sie selbst in der Leber beim Embryo weissgelbe Rispen und nur durch die blutigen Capillargefässnetze, welche dazwischen verlaufen, ist bei unbewaffnetem Auge das Ansehen braun. Gleichwohl ist das Secretum der Leber grün. Der Harn ist bei den eierlegenden Thieren weiss, dennoch ist die Substanz der Nieren ganz verschieden, und man erkennt den grossen Unterschied in den Nieren ganz junger, eben ausgekrochener Vögel, wo der weisse Harn die feinsten Harnkanälchen bis auf die Oberfläche der Nieren anfüllt und gleichsam injicirt. Berzelius fand bei Untersuchung der Nierensubstanz nicht die charakteristischen Bestandtheile des Harns; *Thierchemie* 319. Die Substanz der Leber enthält zwar nach den Untersuchungen fette, auch in der Galle vorkommende Bestandtheile, und verwandelt sich leicht krankhaft in Fett, aber die wesentlichen Bestandtheile der Galle hat man darin noch nicht gefunden. Braconnot (*Ann. de chim. et phys.* 10. 189) fand in 81 Proc. löslichen Theilen der Leber 6 stickstoffarme Materie, 20 Eiweiss, 4 eigenthümliches ölartiges, sehr phosphorhaltiges Fett. Kuehn (Kastner's *Archiv* 13. 337) hat aus der Leber ein Fett ausgezogen, das sich bestimmt von Cholesterin unterschied. Dann ist auch noch zu bemerken, dass es fast unmöglich ist, eine von Galle reine Lebersubstanz zu untersuchen. Bleiben wir indess bei den absondernden Häuten stehen; die äussere Haut enthält keinen Hornstoff, den sie doch absondert, das Gewebe der Chorioidea ist gereinigt ohne schwarzes Pigment.

Digitized by Google

Es ist also gewiss, dass das Secretum von dem Secernens chemisch verschieden ist, und dass die Secretion durch eine blosse Verflüssigung der schon vorhandenen Organtheile der Secretionsorgane nicht erklärt werden kann, dass vielmehr die secernirenden Wände, indem sie durch Ernährung Aehnliches anziehen, zugleich auch ein Verschiedenes abscheiden.

Bei der Ernährung anderer, nicht secernirender Organe, werden aus einem Theilchen Blut a durch das Organ die ähnlichen Bestandtheile angezogen, die unähnlichen in den Kreislauf zurückgegeben; bei der Secretion werden unähnliche nach aussen abgestossen.

Man könnte sich nun vorstellen, dass bei der Zerlegung eines Bluttheilchens a durch ein Secretionsorgan, die Zerlegung so vollständig und rein wäre, dass das, was an das Organ zur Ernährung übergeht, und das, was abgesondert wird, zusammengedacht, wieder Blut ausmachte? Drückt man ein Molecul Blut durch a, ein Molecul der Materie des Secretionsorganes durch x aus, so wäre das Secret nach dieser Vorstellung $a - x$.

Ob diess richtig oder unrichtig ist, lässt sich jetzt gar nicht einmal untersuchen, daher ich mich denn auch durchaus nicht für jene Ansicht erklären, sondern sie als eine berücksichtigungswerthe Andeutung für fernere Untersuchungen hinstellen will. Jedenfalls passt diese an sich so einfache und deswegen blendende Ansicht schon nicht auf diejenigen Absonderungen, wodurch aus dem Blute etwas entfernt wird, was anderswo gebildet worden, wie die Absonderung des Harnstoffs.

Dass das Secret in dem Laufe durch die feinen, und oft sehr langen, Drüsenkanälchen noch weiter ausgebildet werde, lässt sich eher vermuthen als beweisen. Diess war man immer geneigt vom Hoden anzunehmen. Da indess die Länge der Harnkanäle nicht minder ist, der Harn aber bloss Excret ist und keiner Veredlung bedarf, so sieht man hieraus schon, dass man bei der Länge der Kanäle mehr die Grösse der absondernden Fläche, als die Veredlung des einmal Abgesonderten im Auge haben muss.

Die chemische Zusammensetzung der einzelnen Absonderungsflüssigkeiten ist bis jetzt für die Physiologie der Absonderung im Allgemeinen von wenig Interesse und nur für die Lehre von den Functionen, in welche die Secreta eingreifen, von Wichtigkeit; daher die Secreta unter den verschiedenen Abschnitten nachzusehen sind. Die allgemeiner vorkommenden Secreta sind bei den absondernden Häuten abgehandelt; als: Fett, Schleim, Serosität, Synovia; dagegen werden Galle, Speichel, Succus gastricus, pancreaticus bei der Verdauung, Harn und Schweiss bei den Ausscheidungen, Samen, Milch u. s. w. bei der Zeugung abgehandelt.

Ein wichtiger Gegenstand sind die mikroskopischen Kügelchen in gewissen Absonderungsflüssigkeiten, wie im Samen, in der Milch. In der Galle der Frösche fand ich überaus sparsame Körnchen, von ungleicher Form und Grösse, die grössten ohngefähr 5 Mal kleiner als die Blutkörperchen des Frosches, andere noch kleiner; der grüne Theil ist aufgelöst. Weber beschreibt auch Körnchen der Galle. Im Speichel fand ich überaus sparsame Körnchen;

Digitized by Google

Weber findet sie grösser als Blutkörperchen und durchsichtig; der grösste Theil der Speichelmaterie ist offenbar aufgelöst. So enthält auch der ganz durchsichtige Theil des Schleims nach Weber keine Körnchen, wohl aber die im Schleim vorhandenen Flokken. Meines Erachtens kann man den bei weitem grössten Theil der Materie des Speichels, der Galle, des Schleims so gut wie des Harns, als aufgelöst betrachten. Dagegen enthalten Samen, Milch, schwarzes Pigment und Eiter so viele Körnchen, dass dieselben zu den wesentlichsten Theilen derselben gehören müssen. Die Körnchen des schwarzen Pigments sind nach E. H. Weber ungleich und haben im Mittel 0,0015 p. Lin. oder $\frac{1}{666}$ p. Z., sie sind daher ohngefähr halb so gross als die Blutkörperchen. In der Milch sind sie nach Weber sehr durchsichtig, rund, aber ungleich, im Mittel $\frac{1}{3}$—$\frac{1}{2}$ Mal kleiner als die Blutkörperchen. Treviranus hält sie für Fettkügelchen, da sie nicht zu Boden sinken und das Licht stark brechen. Weber hält sie für zusammengesetzt aus Käse und Fett. Die Eiterkügelchen sind nach Weber rund und von $\frac{1}{3000}$—$\frac{1}{1500}$ p. Z., die meisten $\frac{1}{2400}$ p. Z., sie sind daher grösser und ohngefähr noch ein Mal so gross als Blutkörperchen. Alle diese Umstände beweisen, dass die in einigen Absonderungsflüssigkeiten vorkommenden Körnchen keine veränderten Blutkörperchen sind; die der Milch sind zu klein, die des Eiters zu gross dazu; letztere können nicht aus den Capillargefässen kommen, da sie selbst etwas grösser als die feinsten Capillargefässe sind. Ueberdiess ist eine Ausscheidung von Blutkörnchen im veränderten Zustande auch schon darum nicht möglich, weil damit die Zurückhaltung wirklicher Blutkörperchen unvereinbar wäre. Nach meiner Ansicht entstehen die Kügelchen der Milch, des schwarzen Pigments und des Eiters, indem der aufgelöste Thierstoff des Secretums, nach der Secretion, wie bei der Gerinnung des Eiweisses, zum Theil in Kügelchen sich formirt. Authenrieth erzählt folgende merkwürdige Beobachtung (*Physiol.* 2. 119.). Lässt man die wässrige Feuchtigkeit, welche nach abgewischtem Eiter aus der Oberfläche eines entzündeten Theils dringt, zwischen zwei durchsichtigen, feinen Talgblättchen in der Wunde liegen, so sieht man in ihr nach und nach feine, immer sich vergrössernde und undurchsichtig werdende Kügelchen sich bilden, aber diese nicht, wenn die Feuchtigkeit gänzlich aus der Atmosphäre lebender Theile entfernt wird. Auch Brugmans (*Diss. de pyogenia.* 114, Schroeder van der Kolk *observ. anat. path.* 21.) giebt an: dass, wenn eine eiternde Stelle abgespühlt worden, nun der Eiter als eine klare Flüssigkeit abgesondert und erst später dicker werde. Vgl. über diesen Abschnitt Wedemeyer, *über den Kreislauf des Blutes*; Doellinger, *was ist Absonderung? Würzburg* 1819.

2. Vom Einfluss der Nerven auf die Absonderung.

Ueber den Einfluss der Nerven auf die Absonderungen ist man noch sehr im Dunkeln. Es ist hier zuerst der bekannte, von A. v. Humboldt an sich selbst angestellte, Versuch zu erwähnen, wo

Digitized by Google

er nämlich zwei Blasenpflaster auf die Schultergegend sich applicirte, die eine Wundstelle mit einer Silberplatte bedecken liess und mit einem Leiter von Zink die Kette schloss, worauf unter schmerzhaftem Brennen eine Flüssigkeit aus der Wunde floss, welche nicht mild und ungefärbt wie vorher, sondern roth gefärbt war und, wo sie herablief, den Rücken in blaurothen Striemen entzündete. (*Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. I.* 324.) Auch Most (*Ueber die grossen Heilkräfte des Galvanismus.* 1823) will in der galvanischen Kette, wenn er mit dem positiven Pol an der Ohrspeicheldrüse, mit dem negativen in der Hand, 10 Minuten lang schloss, verstärkte Absonderung von Speichel gesehen haben, der weder alkalisch noch sauer reagirte. Directe Versuche über den Einfluss der Nerven auf die Absonderung sind noch wenige angestellt worden; doch weiss man, dass nach Durchschneidung des Nervus vagus die Absonderung des Magensafts aufhört. Tiedemann und Gmelin, *die Verdauung. I.* 340. Brodie (*Biblioth. de med. britt. Paris* 1814) zeigte durch eine Reihe von Versuchen, dass Arsenik nach Durchschneidung des Nervus vagus und sympathicus nicht die reichliche Absonderung im Magen und Darmkanal hervorbringt, welche man sonst findet. Die Absonderung der Schleimhaut in den Lungen wird ferner nach der Durchschneidung jenes Nerven verändert und daher sind jene schäumig-blutigen Exsudationen abzuleiten.

Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Urinabsonderung, welcher im Allgemeinen durch das den Nervenzufällen gewöhnliche Phänomen des wasserhellen, an den gewöhnlichen Bestandtheilen armen Urins erhellt wird, hat Krimer (*Physiol. Untersuchungen*) Versuche angestellt. Derselbe will die Nerven der Nieren durchschnitten und darauf die Absonderung des Urins untersucht haben, in welchem sich der Eiweiss- und Blutfärbestoff in demselben Grade vermehren sollen, wie die eigenthümlichen Bestandtheile des Urins sich vermindern. Nach Durchschneidung des Nervus vagus soll die Urinabsonderung fortgedauert haben; aber Rhabarber und blausaures Kali sollen nicht in den Urin übergehen, der ausserdem durch das in den Urin übergehende Blutserum specifisch schwerer werde, durch die Verbindung der durchschnittenen Nervenenden mit der Säule aber seine normale Beschaffenheit wieder erlange, und den Uebergang jener Substanzen zulasse. Nach der Durchschneidung des Rückenmarks in der Rücken- und Lendengegend werde der Urin wasserhell. Die Durchschneidung des sympathischen Nerven am Halse mache den Urin alkalisch und eiweisshaltig; die Wirkung der voltaischen Säule stelle aber seine normale Beschaffenheit wieder her. Siehe Lund (*Physiologische Resultate der Vivisectionen neuerer Zeit. Kopenhagen* 1825 *pag.* 204), wo die Versuche von Krimer ausgezogen sind. Aehnliche Beobachtungen hat Bracket (*Récherches expériment. sur les fonctions du système nerveux ganglionaire. Paris* 1830. *pag.* 269.) durch Unterbrechung des Nerveneinflusses in den Nierennerven gemacht. Er durchschnitt die Nierenarterie eines Hundes, nachdem er sie vorher vor und hinter der Durchschnittsstelle zwei Mal unterbunden, und verband die

Digitized by Google

beiden Stücke der Nierenarterie durch eine eingebundene Kanüle, so dass die Nierennerven durchschnitten waren, ohne dass den Nieren der Zufluss des Blutes abgeschnitten war. Die hierauf innerhalb mehrerer Stunden aus dem Ureter aufgefangene Flüssigkeit war roth und theilte sich in fibröses Gerinnsel und Serum. Die Wiederholung dieses Versuchs gab dieselben Resultate. Dagegen hat die Durchschneidung der Nervi vagi keinen Einfluss auf die Urinsecretion.

Ich habe neulich mit Dr. Peipers über diesen Gegenstand eine Reihe von Versuchen angestellt. Wir unterbanden die Nierengefässe mit Ausschluss des Harnleiters bei Thieren (Schafen und Hunden) so fest, dass die damit einbegriffenen Nierennerven (wie die Nerven gewöhnlich durch die Ligatur) mortificirt werden mussten. Darauf lösten wir die Ligatur wieder, so dass die Circulation des Blutes wieder durch die Nieren stattfand. Der Harnleiter wurde nach aussen geleitet und ihm ein Röhrchen angebunden. In den meisten Fällen wurde darauf gar kein Harn mehr abgesondert, selbst in dem Fall nicht, nachdem dieselbe Operation auch an der zweiten Niere eines Schafes gemacht worden, wo man aber die Ligatur, um die Absonderung auf dieser Seite unmöglich zu machen, liegen liess. Nur in einem einzigen Falle (Schaf) dauerte die Absonderung fort, wurde blutig und Hr. Wittstock fand in dem Secret, ausser den Bestandtheilen des Blutes, Hippursäure (Harnbenzoesäure). Merkwürdig war die in diesen oft wiederholten Versuchen sich immer einstellende Erweichung des Gewebes der Nieren nach jener Mortification der Nerven. Siehe Peipers *de nervorum in secretiones actione. Berol.* 1834.

Der Einfluss der Nerven kann nun bei jeder Drüse entweder verschieden und eigenthümlich seyn, oder er ist, was wahrscheinlicher ist, bei allen Drüsen gleich, und es bedarf zur Belebung durch ihn bloss, dass die specifische Drüsensubstanz chemisch wirksam wird. Auch die täglichen Lebenserfahrungen geben vielfältige Beweise von dem Einflusse der Nerven auf die Absonderung. Man weiss, dass Minderung des Nerveneinflusses in dem Froststadium der Fieber alle Absonderungen nicht bloss vermindert, sondern sie auch arm an ihren natürlichen Bestandtheilen macht, und dass sich diese mit dem Wiedereintritt des Turgors auch wieder einstellen. Man weiss, dass die Trockenheit der Schleimhäute und der Haut oft Zeichen eines verminderten Einflusses der Nerven in den akuten Krankheiten sind. Hierzu kommen die häufigen Erfahrungen über den Einfluss der Leidenschaften auf die Absonderung, z. B. der Thränen, der Galle, der Milch, ja selbst der Gemüthsbewegungen auf die Beschaffenheit der Secretion und des Zustandes der Wunden. Vgl. oben pag. 370. Man hat sogar behauptet, dass die Gegenwart des Füllens auf die Milchsecretion der Mutter Einfluss habe. Ohne auf die Erzählungen von der giftigen Wirkung des Speichels nach Bissen von gereizten Thieren irgend einen Werth zu legen, da die Erscheinungen im Allgemeinen vielleicht nur die der Bisswunden überhaupt sind, so ist doch die Thatsache bekannt genug und unzweifelhaft, dass

Digitized by Google

nicht allein durch die Gegenwart der Speisen im Munde die Secretion des Speichels vermehrt wird, sondern dass auch die Vorstellung leckerer Speisen die Secretion des Speichels bethätigt. Wäre es möglich, den Einfluss der Nerven eines absondernden Organes ganz aufzuheben, so würde man vielleicht wie nach Durchschneidung des Nervus vagus in Hinsicht des Magensaftes, immer finden, dass die Bildung der specifischen Secrete durch den mangelnden Nerveneinfluss gänzlich aufgehoben wird. Ich bin weit entfernt zu glauben, dass die von dem Leben abhängende chemische Wirksamkeit der Drüsensubstanz nicht einen eben so grossen Einfluss auf die Secretion der Drüsen habe; aber diese chemische Wirksamkeit der Drüsensubstanz, welche in verschiedenen Drüsen verschieden ist, kann sich wahrscheinlich nur unter dem Einflusse der Nerven unterhalten.

Auf den ersten Blick scheinen sowohl Cerebrospinalnerven als sympathische Nerven zur Regulation der Absonderung fähig zu seyn. Bekannt ist die Verzweigung des Lingualis in der Submaxillardrüse und Sublingualdrüse, des Nervus glossopharyngeus in den Tonsillen, eines Zweiges des Nervus tibialis in der Kapsel des Kniegelenks. Am merkwürdigsten ist das Factum, dass die Milchdrüse des Weibes ihre Nerven nicht vom Sympathicus direct sondern, wie ich sehe, nur vom dritten und vierten Brustnerven erhält. Indessen werden auch die Cerebrospinalnerven höchst wahrscheinlich von Fasern des Sympathicus begleitet, wie wenigstens Retzius vom zweiten Aste des N. trigeminus bei Thieren gezeigt hat, und wie bei den Thieren an den vielen grauen Nerven zu sehen ist, welche vom Ganglion oticum über den Nervus buccinatorius hingehen. Nach halbseitigen Lähmungen des Gehirns und Rückenmarks ist die Absonderung der Haut auf der leidenden Seite bald verändert, bald nicht verändert.

3. Von den Veränderungen der Absonderung.

Die Absonderung kann von örtlichen sowohl als allgemeinen Ursachen verändert werden.

Der Zustand eines absondernden Organes modificirt nicht bloss die Quantität, sondern auch die Qualität der Absonderung; der Harn ist nach Nervenzufällen wässrig und arm an den näheren Bestandtheilen; der Schleim ist in den verschiedenen Stadien des Schnupfens verschieden, anfangs wässrig und salzig, später consistent; endlich hebt die Entzündung in der Regel in jedem Absonderungsorgane die specifische Absonderung, wie in jedem Organe die Function auf. In Beziehung auf Reiz verhalten sich die Absonderungsorgane eigenthümlich; derselbe vermehrt anfangs die Absonderung. Dieser Zustand vermindert sich in demselben Grade, als die Reizung in Entzündung übergeht. Im erschlafften Zustande der Absonderungsorgane mit Auflockerung, vermehren die Absonderungen sich in der Regel, wo jedoch das Secret an Consistenz verliert. Im erschlafften Zustande mit Verdichtung des Gewebes des Absonderungsorgans wird die Absonderung vermindert. Diess wiederholt sich in allen Absonderungsorganen,

Digitized by Google

in den Schleimhäuten der Nase, der Conjunctiva, auf der äussern Haut. Alles dieses beobachtet man an den natürlichen wie krankhaften Absonderungen auf gleiche Art; das gereizte Geschwür sondert reichlichen Eiter ab; die Verstärkung des entzündeten Zustandes hebt die Absonderung auf; das erschlaffte Geschwür mit aufgelockerten Wänden sondert reichliche wässrige Secrete ab, das erschlaffte Geschwür mit verdichtetem Gewebe von Entzündungsprodukten sondert sparsam ab.

Der aufgehobene Nerveneinfluss vermindert die natürlichen Bestandtheile eines Absonderungsorganes; der Harn wird in Nervenzufällen wasserhell, die Haut in Fiebern mit geschwächtem Einfluss des Nervensystems trocken, die Haut ist im Froststadium des Fiebers trocken. Aber räthselhaft ist, dass eine viel stärkere Entziehung des Nerveneinflusses, wie in der Ohnmacht die Absonderung so ungemein vermehren kann, wie beim kalten Schweiss, bei der Diarrhoe von Schrecken, Angst. Die qualitativen Veränderungen der Secreta durch veränderten Nerveneinfluss, kennt man mehr aus den schädlichen Wirkungen dieser Secreta, wie der Milch, der Galle nach Leidenschaften, als aus chemischen Untersuchungen.

Dadurch, dass alle Absonderungen durch die Entziehung gewisser Bestandtheile des Bluts auf die Mischung desselben wirken, kann eine Absonderung aus demselben nicht verändert werden, ohne dass das Gleichgewicht, welches die verschiedenen Absonderungen gegen einander in Hinsicht ihrer Wirkung auf das Blut hatten, gestört wird; daher die Vermehrung einer Absonderung die Verminderung einer anderen zur Folge hat, was man den Antagonismus der Secretionen nennt. Auf dem Princip dieses Antagonismus beruht die Hervorrufung mancher künstlichen Secretionen um andere krankhafte aufzuheben. Hierbei finden folgende Gesetze statt:

1. Die Vermehrung einer Absonderung in einem Gewebe *A*, welches weniger reizbar als das Organ *B* ist, kann in dem Organe *B* die Absonderung nicht antagonistisch vermindern, daher z. B. künstlich erregte Absonderungen in der Haut, wie durch Blasenpflaster, in der Nähe des Auges, bei Augenentzündungen, fruchtlos sind, weil das Auge reizbarer als die Haut selbst ist.

2. Die Vermehrung einer Absonderung in einem gewissen Gewebe *A* kann nicht vermindert werden durch Hervorrufung derselben Absonderung in einem anderen Theile des Gewebes *A*, im Gegentheil wird die Absonderung in allen Theilen desselben Gewebes eher verstärkt als vermindert, weil die verschiedenen Theile eines Gewebes nicht in einem antagonistischen, sondern in einem sympathischen Verhältnisse stehen. Man kann also eine Blennorrhoe der Genitalien oder Harnwerkzeuge durch eine künstlich erregte Diarrhoe nicht antagonistisch heilen.

3. Dagegen stehen diejenigen Gewebe oft in einem antagonistischen Verhältnisse der Absonderung, welche nicht zu derselben Klasse der Gewebe gehören. So bewirkt die Vermehrung der Absonderung durch die Haut eine Verminderung der wässrigen Absonderung durch die Nieren. Im Sommer ist die Hautausdünstung stärker und die Nierenabsonderung verhältnissmässig

Digitized by Google

geringer; im Winter findet das umgekehrte Verhältniss statt. Bei der Ablagerung wässriger Flüssigkeiten im Zellgewebe und in den serösen Häuten ist die äussere Haut trocken und der Urin sparsam, und der Fluss des Urins steht in geradem Verhältnisse mit der Abnahme der wassersüchtigen Anschwellung. Durch Unterdrückung der Hautausdünstung, durch Erkältung, entstehen Blennorrhoeen der Schleimhäute, in den Lungen und im Darmkanal.

4. Nur am Ende der colliquativen Krankheiten beschränken sich die Absonderungen nicht gegenseitig mehr, sondern alle werden zuletzt durch Erschlaffung der Gewebe vermehrt, wie denn durch den sogenannten colliquativen Zustand, z. B. colliquative Diarrhoeen, Schweisse und Wasserergiessungen vor dem Tode bei den Phthisikern entstehen.

5. Gewebe, welche gegen einander in Antagonismus treten, werden bestimmt theils dadurch, dass sie einigermassen ähnliche Flüssigkeiten im natürlichen Zustande absondern, gleichwie die Verminderung der Wasserausscheidung durch die Nieren auf die Vermehrung der Wasserausscheidung durch die Haut wirken muss; oder das antagonistisch erregte Absonderungsorgan war ohnehin schon zu krankhafter Thätigkeit prädisponirt. So bewirkt die Erkältung bei demjenigen eine Affection der Schleimhaut der Lungen, welcher zu dieser schon vorher disponirt war, bei Anderen aber aus denselben Gründen leichter eine Veränderung der Schleimabsonderung im Darmkanal. Vgl. Heusinger, *über den Antagonismus der Excretionen;* desselben *Zeitschrift für organ. Physik. Bd. I.*

Zuweilen bewirkt die Unterdrückung der Absonderung an einem Orte das Erscheinen desselben Fluidums an einem anderen Orte. Dieses geschieht vorzüglich leicht bei denjenigen Absonderungsflüssigkeiten, welche als solche schon im Blute vorhanden sind. Vicarirende Blutungen für die Menstruation lassen sich nicht läugnen, und die Unmöglichkeit, den im Blute bereits vorhandenen Harnstoff (siehe pag. 159) durch gänzlich zerstörte Nieren mit dem Harne abzusondern, muss mit Harnstoff geschwängerte Ausscheidungen in allen übrigen Theilen des Körpers zur Folge haben können. Nysten (*Recherches de chimie et de physiologie pathol. Paris* 1811. *pag.* 263—293) hat die Existenz von Harnstoff in bei gänzlicher Harnverhaltung ausgebrochenen Flüssigkeiten constatirt, und an der Ablagerung harnsauren Natrons in den Gichtknoten ist kein Zweifel.

Ist aber ein Absonderungsstoff als solcher nicht schon im Blute vorhanden, so kann die Unterdrückung dieser Absonderung in dem dazu bestimmten Apparat nicht dieselbe Absonderung in anderen Theilen metastatisch verursachen, und was man auch hiefür angeführt hat, beruht auf schlechten Gründen.

Nach verhaltener Aussonderung der Galle kann zwar die schon einmal abgesonderte Galle resorbirt ins Blut gelangen und von dort aus in anderen Theilen sich ablagern. Diess ist aber ein ganz anderer Fall, der keine Aehnlichkeit mit demjenigen hat, wo ein Absonderungsorgan ganz entfernt wird; hier ist kein Apparat mehr dazu vorhanden, wie nach Exstirpation des Hoden

Digitized by Google

die Bildung des Samens unmöglich wird. Die oft wiederholte Lehre von der Möglichkeit, dass alle specifischen Absonderungen selbst nach Zerstörung ihrer Absonderungsorgane aus dem Blute sich wiedererzeugen können, hat gar keine thatsächliche Basis; denn alle dafür angeführten Gründe sind bloss von denjenigen Fällen hergenommen, wo die Absonderung in dem ursprünglichen Organ nicht aufgehoben, sondern die Weiterförderung des Secretes durch mechanische Hindernisse gehemmt war, oder wo der Absonderungsstoff als solcher im Blute schon vorhanden war, wie es vom Harnstoff nach Prevost und Dumas Untersuchungen bekannt ist. Die einzige Absonderung, deren Bestandtheile im Blut nicht als solche vorhanden sind, welche sich aber immer und an allen Orten wiedererzeugen kann, indem sich mit der Entzündung das Organ dazu von neuem bildet, ist die Eiterung.

In allen Fällen, wo nach gänzlicher Unterdrückung einer Absonderung eine antagonistische entsteht, zu der der Stoff nicht als solcher aus dem Blut genommen werden kann, ist die antagonistische Absonderung auch durchaus von der ursprünglichen verschieden, und hat nur so viel Aehnlichkeit mit der ersten, als die näheren Bestandtheile der Absonderung des zweiten Organes es zulassen. Wahre Milchversetzungen giebt es z. B. nicht; Autenrieth bemerkte schon, dass dergleichen Versetzungen durch Mangel an den wesentlichen Bestandtheilen der Milch, nämlich des Milchzuckers und der Butter sich unterscheiden. Diese Ausscheidungen bestehen vielmehr nur aus den näheren Bestandtheilen des Bluts, welche zur Umwandlung von Blut in Milch hätten verwandt werden können, z. B. Eiweiss. Ueber die Unstatthaftigkeit der Eitermetastasen und die Missverständnisse, welche durch Unkenntniss der hierbei stattfindenden pathologischen Vorgänge entstehen, habe ich schon pag. 272. gehandelt.

Die Drüsenkanälchen scheiden das Secret immer nach innen ab (vergl. p. 461.), nur in seltenen Fällen scheint die neugebildete Materie sogleich auch weiter und ins Blut zu gelangen, wie bei der nach Gemüthsbewegungen entstehenden Form der Gelbsucht.

4. Von der Ausführung der Secreta.

Die Ausführungsgänge der Drüsen enthalten in ihrem Innern eine Schleimhaut, welche äusserlich mit einer äusserst dünnen Schicht von muskulösem Gewebe umlagert ist. Die Existenz von Muskelfasern lässt sich hier zwar anatomisch nicht nachweisen, aber aus physiologischen Gründen lässt sich daran nicht zweifeln; denn von den meisten Ausführungsgängen weiss man, dass sie auf Reize sich zusammenziehen können. So hat Rudolphi schon die Zusammenziehungsfähigkeit des Ductus choledochus der Vögel beobachtet. Ich habe dieses Phänomen öfter gesehen, wenn ich bei einem eben getödteten Vogel den Ductus choledochus mechanisch oder galvanisch reizte; die darauf erfolgende Zusammenziehung des Ganges ist ungemein stark und dauert Minuten lang, worauf sich der Gang wieder, wie vorher, erweitert. Auf gleiche Art habe ich

Digitized by Google

bei Kaninchen sowohl als bei Vögeln an den Ureteren auf starken galvanischen Reiz örtliche starke Zusammenziehungen eintreten gesehen. So hat TIEDEMANN Bewegungen an dem Ductus deferens des Pferdes auf angebrachten Reiz beobachtet. TIEDEMANN, *über die Wege, auf welchen u. s. w. p.* 22. Es scheint sogar, dass periodische wurmförmige Bewegungen an diesen Ausführungsgängen stattfinden, wenigstens gilt dieses von dem Ductus choledochus der Vögel; denn an diesem habe ich bei einem eben getödteten Vogel regelmässig in Pausen von mehreren Minuten Zusammenziehungen beobachtet, worauf jedesmal der Gang sich wieder erweiterte. Diese Zusammenziehungen fanden in jenem Fall merkwürdiger Weise aufsteigend statt, nämlich vom Darmkanal gegen die Leber hin, und werfen ein Licht auf die Art, wie die Galle zu gewissen Zeiten, statt durch den D. choledochus auszufliessen, vielmehr zurückgehalten und in das Divertikel des Gallengangs, nämlich die Gallenblase, getrieben wird, wozu denn auch noch die vollkommne Verschliessung der Mündung des Ductus choledochus beitragen mag. Zur Zeit der Verdauung, wo die Galle der Gallenblase ausgeleert wird, erfolgt diese Ausleerung wahrscheinlich bloss durch die Oeffnung des Ductus choledochus unter dem Druck der umliegenden Theile und der Bauchmuskeln; denn die Gallenblase kann sich höchst wahrscheinlich nicht zusammenziehen, wenigstens konnte ich an der Gallenblase der Säugethiere und der Vogel, selbst bei dem heftigsten Reiz durch eine galvanische Säule, keine Zusammenziehung bewirken, und es unterscheidet sich dieses Divertikel von den im Ganzen ähnlichen Divertikeln anderer Ausführungsgänge, nämlich der Urinblase und den Samenbläschen.

Die Beschaffenheit der inneren Haut der Ausführungsgänge und die Contractilität ihrer mittlern Haut beweist offenbar, dass diese Gänge blosse Ausstülpungen der Schläuche sind, in welche sie führen, wie der Ductus choledochus und pancreaticus aus denselben Schichten bestehend, Fortsetzungen der Häute des Duodenums sind.

Welchen Antheil die Contractilität der Ausführungsgänge an der oft plötzlichen Ausscheidung des Speichels und der Thränen habe, will ich hier nur fraglich andeuten. Auch will ich hier noch bemerken, dass, da die Contractilität der Ausführungsgänge der Drüsen factisch erwiesen ist, der Krampf dieser Theile keine blosse Einbildung der Aerzte ist.

Digitized by Google

IV. Abschnitt. Von der Verdauung, Chylification und Ausscheidung der zersetzten Stoffe*).

I. Capitel. Von der Verdauung im Allgemeinen.

Die Nahrung der Thiere sind thierische Substanzen und Vegetabilien; einige leben nur von diesen, andere nur von jenen, andere von beiden zugleich, wie auch der Mensch, der bei bloss animalischer Nahrung so gut wie bei bloss vegetabilischer Nahrung ausdauert, und nach diätetischen Erfahrungen, auch nach seinem gemischten Zahnbau der gemischten Kost bestimmt scheint. Sowohl in der Pflanzennahrung als in der thierischen Kost sind die gewöhnlichen Salze enthalten, welche als nothwendige Bestandtheile des Organismus auch als Nahrungsstoff im relativen Sinne betrachtet werden können. Von blossen mineralischen Stoffen lebt kein Thier; aus Noth oder Vorurtheil, um den Bauch zu füllen, wird zuweilen von Menschen Erde theils allein, theils mit organischen Substanzen genossen, wie von den Otomaken und Guamos am Oronoco und von den Bewohnern von Neuschottland bekannt. In dem von den Neuschottländern genossenen Steatit hat Vauquelin keine Nahrungsstoffe gefunden. Siehe v. Humboldt's *Reise*. 4. 557. Rudolphi's *Physiol.* 2. 18. Die im Jahr 1832 im Kirchspiel Degernä, an den Grenzen Lapplands wegen Misswachses mit Mehl und Baumrinde vermischte und zu Brot verbackene Erde bestand aus mit organischen Bestandtheilen vermischter Kieselerde. Poggend. *Ann. B.* 29. p. 261. Dieses Bergmehl erkannte Retzius aus 19 verschiedenen Formen von Infusorien, d. h. ihren fossilen Resten bestehend.

Im Thier- und Pflanzenreich scheinen alle Stoffe nahrhaft zu seyn, welche einer leichten Auflösung durch thierische Flüssigkeiten fähig sind, welche keine dem Thierstoff eines Thieres zu heterogene Combination der Elemente enthalten, oder welche keine hervorstechenden chemischen Eigenschaften und keine Tendenz haben, sich auf Kosten der lebendigen Verbindungen binär chemisch zu combiniren. Was die letzten Eigenschaften hat, entweder heterogen oder von chemisch eigenthümlichen Affinitäten ist, ist entweder Arzneikörper oder (im relativen Sinne) Gift. Dass auch die narkotischen Gifte, welche keine sichtbaren Veränderungen im Organismus und nicht wesentlich Entzündungen bewirken, durch feinere Umwandlung der Materie vergiften, indem sie durch heterogene und chemisch eigenthümliche Stoffe Zersetzungen und

*) Die hier zu untersuchenden Processe sind zusammengeseteter als die vorhergehenden; die Kenntniss der Bewegung der Säfte, der Resorption, der Thätigkeit der lymphatischen Gefässe, der Absonderungen wird zu ihrer Untersuchung vorausgesetzt, daher diese Materien sämmtlich vor dem nun zu betrachtenden Gegenstande abgehandelt werden mussten. Dagegen werden nun bei der Darstellung der Vorgänge der Verdauung weitläufige Erklärungen über diese Functionen, die auch ausser den Verdauungsorganen in vielen andern Theilen wirksam sind, vermieden werden können.

Digitized by Google

binäre Combinationen verursachen, ist mir sehr wahrscheinlich, theils durch ihren Gehalt an vegetabilischen Alkaloiden, theils durch Fontana's Beobachtungen, dass die wirksamsten narkotischen Gifte, Viperngift und Ticunasgift, materielle Umwandlungen bewirken, indem beide zu frischem Blut ausser der Ader gemischt, dessen Gerinnbarkeit verhindern, Viperngift aber, in Wunden lebender Thiere gebracht, das Blut schnell gerinnen macht. Ueber vegetabilische Gifte siehe die toxikologischen Werke, über thierische Gifte Rudolphi l. c. Der Begriff von Gift ist sehr relativ. Schlangengift zersetzt die thierischen Säfte, wenn es ins Blut gebracht wird, scheint dagegen im Darmkanale zersetzt und unschädlich gemacht zu werden. Viperngift wirkt auch in den Wunden der niederen Wirbelthiere, namentlich der Amphibien, bei Fröschen, Blindschleichen nur sehr langsam und bei Schlangen, wie es scheint, oft gar nicht. Doch sind die meisten Narcotica in grösseren Gaben auch für die niederen Thiere tödtlich. Die Blausäure tödtet den Blutegel so gut wie den Menschen, Opium, Nux vomica scheint fast für alle giftig (mit Ausnahme des Vogels Buceros Rhinoceros, der von Krähenaugen leben soll).

Die einfachsten Nahrungsstoffe sind aus dem Pflanzenreich:

1. Die säuerlichen Säfte vieler Pflanzen und Früchte.

2. Das Stärkmehl (*Amylum*) in den Samen der Gräser, der Hülsenfrüchte, in den Knollen der Kartoffeln, in der Sagopalme, im Lichen island.

3. Der Schleim (*Mucilago*) in Wurzeln und Samen und als Gummi (verschieden vom thierischen Schleim, in Wasser löslich).

4. Der Zucker im Safte vieler Pflanzen, auch ihrer Früchte.

5. Das fette Pflanzenöl im Samen und einigen Wurzelknollen.

6. Das Pflanzeneiweiss (*Albumen*) in der Pflanzenmilch, in der Milch des Milchbaums, in emulsiven Samen.

7. Der Kleber (*Gluten*), meist mit Eiweiss verbunden, in den Getreidearten und anderen Samen, auch in süssen Früchten.

8. Fungin in den Schwämmen.

Viele andere Stoffe, wie weingeistige und aromatische, sind mehr Reizmittel der Verdauungsorgane als Nahrungsmittel. Unverdaulich sind die Pflanzenfaser, die Hülsen der Samen, die meisten Harze, Farbstoffe, Extractivstoffe, die Haare, Federn, Horn, Klauen, Schuppen, Insektenschalen und überhaupt aller Hornstoff.

Die Hauptnahrungsstoffe des Thierreichs sind:

1. Gelatina in den Sehnen, Knochen, Knorpeln, in der äussern Haut, dem Zellgewebe und vorzüglich in sehr jungen Thieren (Eigenschaften siehe oben p. 138.).

2. Eiweiss (*Albumen*) vorzüglich in den Eiern, Gehirn und Nerven, im Blute etc. (Eigenschaften s. oben p. 134.).

3. Faserstoff (*Fibrina*) im Fleisch und Blut der Thiere (Eigenschaften s. oben p. 130.).

4. Das thierische Oel und Fett (Eigensch. s. oben p. 136, 427.).

5. Der Käsestoff in der Milch mit thierischem Fett (Butter) und im Käse (Eigenschaften s. unten im 8. Buche bei dem Artikel Milch).

Ausführliche Belehrungen über die Nahrungsmittel finden sich in Tiedemann, *Physiologie*. 3. *Bd. Darmstadt* 1836.

Digitized by Google

Der letzte Zweck der Verdauung ist 1. die Auflösung der Nahrung, weil nur Aufgelöstes fähig ist zur Aufnahme in resorbirende Gefässe, und 2. eine Reduction dieser verschiedenen Bestandtheile in das einfachste Material der thierischen Processe, in Eiweiss, welches sich in dem verdauten Speisesafte theils aufgelöst, theils in Kügelchen enthalten zeigt. Die Verdauung hat also zum Wesen, dass sie nicht allein die Stoffe auflöst, sondern dass sie alle eigenthümlichen Qualitäten, welche den organischen Stoffen von ihren Quellen noch zukommen, tilgt, dass sie die Nahrungsstoffe auflöst und Alles in Eiweiss verwandelt. Hierzu sind ausser der mechanischen Zertrümmerung chemische Einflüsse, Verdauungssäfte nöthig. Diejenigen Substanzen sind nun am leichtverdaulichsten und nahrhaftesten, welche am löslichsten und bei welchen die Reduction in Eiweiss am leichtesten, oder welche selbst eiweisshaltig sind; und so ist der Dotter als eine concentrirte Auflösung von Eiweiss (mit Dotteröl) der Nahrungsstoff selbst, aus welchem der Embryo unmittelbar assimilirt und der keiner vorbereitenden Verdauung bedarf. Alles wird aber unverdaulich seyn, welches wegen seiner unauflöslichen Beschaffenheit (wie Holzfasern, Hülsen) keinen Nahrungsstoff abgeben kann, oder selbst eine chemische Qualität geltend macht, welche die im Organismus von der organischen Kraft im Gleichgewicht gehaltene Tendenz der Elemente, binäre Verbindungen einzugehen, entfesselt. Man muss übrigens zwischen leicht verdaulichen und nährenden Stoffen unterscheiden. Ein Stoff kann durch seine leichte Auflöslichkeit in einer Hinsicht leicht verdaulich, aber doch wenig nährend seyn, weil er durch seine Zusammensetzung weniger leicht in Eiweiss verwandelt werden kann. Andere Stoffe, die an sich, einmal aufgelöst, wohl nährend sind, können durch ihre schwere Auflöslichkeit für schwache Verdauungskräfte schwer verdaulich seyn. Zu einer guten Nahrung gehört also nicht allein leichte Auflöslichkeit, sondern auch nährende Beschaffenheit. Je entfernter eine Substanz in Hinsicht ihrer Zusammensetzung von dem Eiweiss ist, um so weniger ist sie nährend, und um so grössern Aufwand der Verdauungskräfte nimmt sie zu ihrer Verwandlung in Anspruch.

Käme es bei der Verdauung bloss auf die Auflösung an und enthielten alle Nahrungsstoffe eine gewisse Menge eines und desselben Nutrimentes, das keiner weitern chemischen Veränderung bedarf, so könnte die Verdaulichkeit darnach bestimmt werden, wie leicht ein Stoff auflöslich ist, wie viel Nutriment von dem Darmkanal aus ihm ausgezogen werden kann und wie leicht diese Ausziehung des Nutrimentes aus den übrigen Beimischungen ist. Dieser unrichtige Begriff von Nahrungsstoff liegt dem Hippokratischen Satz zu Grunde, dass es verschiedene Arten der Alimente, aber nur ein Alimentum gebe. Die in Eiweiss zu verwandelnden Stoffe enthalten aber zum Theil kein präformirtes Eiweiss in sich, wie die vegetabilischen Nahrungsmittel. Das Alimentum in jenem Hippokratischen Sinne entsteht daher erst durch die Verdauung, indem die in Hinsicht ihrer Zusammensetzung von dem

Digitized by Google

Eiweiss verschiedenen Nahrungsstoffe erst in die Zusammensetzung des Alimentum umgewandelt werden müssen.

Auf eine wichtige Unterscheidung der Nahrungsmittel in stickstoffreiche, stickstoffarme und stickstofflose hat Magendie aufmerksam gemacht. *Physiol. ed.* 2. *t.* 2. 486. Meckel's *Archiv.* 3. 311. Nahrungsmittel, welche wenig oder keinen Stickstoff enthalten, sind die zuckerhaltigen und säuerlichen Früchte, die Oele, Fette, die Butter, die schleimigen Vegetabilien, der raffinirte Zucker, die Stärke, das Gummi, der Pflanzenschleim, die vegetabilische Gallerte. Hierher gehören die Getreidearten, der Reis, die Kartoffel. Stickstoffhaltig dagegen sind Pflanzeneiweiss, Kleber, Fungin der Schwämme und einige in verschiedenen Pflanzen vorkommende, dem Fleischextract ähnliche Stoffe. Sie finden sich vorzüglich in den Samen der Gräser, in den Stengeln und Blättern der Gräser und Kräuter. Auch die Leguminosen (Linsen, Erbsen, Bohnen), die Mandeln, die Nüsse gehören hierher. Aus dem Thierreiche sind zu nennen: die Gelatina, das Eiweiss, der Faserstoff, der Käsestoff. Ausser dem Fett enthalten die meisten thierischen Theile vorzüglich mehr oder weniger Stickstoff. Einige Schriftsteller haben für eine Quelle des Stickstoffs in den thierischen Körpern das Athmen aus der Atmosphäre gehalten, andere haben angenommen, dass sich Stickstoff in Thieren aus anderen Elementen erzeuge. Hierbei stützte man sich auf das Beispiel der pflanzenfressenden Thiere, die sich von stickstofflosen oder stickstoffarmen Stoffen nähren sollen, auf das Beispiel der Neger, welche lange Zeit bloss von Zucker sich nähren. Magendie bemerkt hiergegen, dass fast alle Vegetabilien, von denen sich Thiere und Menschen nähren, mehr oder weniger Stickstoff enthalten, dass der unreine Zucker ziemlich viel Stickstoff enthalte, dass die Völker, die sich mit Reis, Mais, Kartoffeln nähren, Milch oder Käse hinzufügen. Magendie hat sehr dankenswerthe Versuche über die Nahrung von Thieren (Hunden) aus blossen stickstofflosen Mitteln, wie raffinirtem Zucker, mit destillirtem Wasser, gemacht. Die ersten 7—8 Tage waren die Thiere munter, frassen und tranken wie gewöhnlich, in der zweiten Woche fingen sie an abzumagern, obgleich der Appetit immer gut war und täglich 6—8 Unzen Zucker verzehrt wurden. Die Abmagerung steigerte sich in der dritten Woche, die Kräfte nahmen ab, die Thiere verloren die Munterkeit und den Appetit. Zu dieser Zeit entwickelte sich auf beiden Augen eine Exulceration der Cornea mit Ausfluss der Augenfeuchtigkeiten — ein Phänomen, was sich bei wiederholten Versuchen bestätigte. Obgleich die Thiere noch täglich 3—4 Unzen Zucker frassen, so wurden sie doch zuletzt so schwach, dass sie zu aller Bewegung unfähig waren, und der Tod erfolgte am 31—34. Tage. (Man muss hierbei erwägen, dass Hunde ohne alle Nahrung fast eben so lange aushalten.) Bei der Section fand sich alles Fett verzehrt, die Muskeln waren sehr an Volumen vermindert, Magen und Darmkanal sehr zusammengezogen, Gallenblase und Urinblase ausgedehnt. Chevreul fand den Urin, wie bei den Pflanzenfressern, nicht saner, sondern alkalisch, aber auch ohne Spur von Harnsäure und Phos-

Digitized by Google

phaten. Die Galle enthielt viel Pikromel, woran die Galle der Herbivoren reich ist, das man aber seitdem auch in der Galle von Fleischfressern entdeckt hat. Die Excremente enthielten sehr wenig Stickstoff, dessen sie sonst viel enthalten. Um auszumitteln, ob diese Wirkungen dem Zucker eigenthümlich sind, oder nur von seinem Stickstoffmangel herrührt, fütterte Magendie Hunde mit Olivenöl und Wasser. Während 15 Tagen befanden sie sich wohl. Darauf traten mit Ausnahme der Ulceration der Cornea dieselben Phänomene, wie bei den mit Zucker gefütterten ein, und der Tod erfolgte am 36. Tage. Urin, Galle verhielten sich gleichwie in den vorhergehenden Versuchen. Hunde mit Gummi gefüttert, was mit anderen Mitteln zusammen sehr nahrhaft ist, aber keinen Stickstoff enthält, zeigen dieselben Phänomene. Eine blosse Nahrung von Butter ertrug ein Hund sehr wohl 14 Tage lang, darauf wurde er mager und schwach, und starb am 36. Tage, obgleich er am 32. Tage Fleisch erhalten hatte. Das eine Auge ulcerirte, Urin und Galle verhielten sich wie in den früheren Versuchen. Magendie überzeugte sich durch andere Versuche, dass gleichwohl Zucker, Gummi und Oel verdaut wurden und Chylus bildeten, dass also der Chylus nur keine nährenden Eigenschaften hatte. Diesen Versuchen kann man die Bemerkung hinzufügen, dass in Dänemark Verurtheilung zu Brot und Wasser auf 4 Wochen mit der Todesstrafe gleichgesetzt wird, und dass Stark's Versuche an sich selbst mit Monate langer Zuckerkost seinen Tod bewirkten, nachdem er äusserst schwach und gedunsen, rothe Flecke im Gesicht bekommen hatte, welche drohten in Geschwüre aufzubrechen. Durch diese Versuche hat Magendie auch einiges Licht auf die Ursachen und die Behandlung der Gicht und des Harngrieses geworfen. Die von diesen Krankheiten befallenen Personen sind meist wohllebende Fleischesser; die meisten Harnsteine, der Harngries, die Gichtknoten und der Schweiss der Gichtischen enthalten Harnsäure, eine Substanz, die sehr reich an Stickstoff ist. Durch Verminderung der stickstoffhaltigen Nahrungsmittel kann man daher wohl der Gicht und der Bildung des Harngrieses zuvorkommen und sie mit Erfolg behandeln.

Tiedemann und Gmelin haben Magendie's Versuche bestätigt. Sie fütterten verschiedene Gänse, die eine mit Zucker, die andere mit Gummi, die dritte mit Stärke; alle erhielten zugleich Wasser. Die Gänse nahmen hierbei beständig an Gewicht ab. Die mit Gummi gefütterte starb den 16., die mit Zucker den 22. und die mit Stärke den 24., eine andere den 27. Tag, nachdem sie $\frac{1}{6}$ bis $\frac{1}{2}$ ihres Gewichts verloren hatten. Indessen starb eine Gans, die mit gekochtem und zerhacktem Eiweiss gefüttert wurde, trotz der stickstoffreichen Nahrung und des Appetits der Gans, ausgehungert am 46. Tage, nachdem sie fast $\frac{1}{2}$ des Gewichts verloren hatte.

Diese Versuche würden wie die von Magendie sehr beweisend seyn, wenn man bei demselben Thiere mit verschiedenen stickstofflosen Substanzen in der Nahrung abgewechselt hätte. Denn da, wie sich auch aus den folgenden Versuchen von Magendie

Digitized by Google

ergiebt, das unausgesetzte Darreichen einer stickstoffhaltigen Substanz ohne Abwechselung mit anderen stickstoffhaltigen Mitteln die Theire in manchen Fällen auch nicht erhalten hat, so sind jene Versuche noch nicht ganz conclusiv. Vergl. Londe, Froriep's *Not.* B. 13. Nr. 10.

Ueber die Fähigkeit verschiedener Substanzen, zu nähren, hat Magendie noch folgende Versuche angestellt: 1. Ein Hund, welcher Weissbrot, Weitzen und Wasser zur Nahrung erhielt, lebte nicht über 50 Tage. 2. Ein anderer Hund, der dagegen bloss Kommissbrot bekam, erhielt seine Gesundheit sehr wohl. 3. Kaninchen und Meerschweinchen mit einer von folgenden Substanzen: Weitzen, Hafer, Gerste, Kohl, gelbe Rüben, gefüttert, starben mit vollkommener Inanition nach 15 Tagen ab. Mit denselben Substanzen zugleich oder nach einander gefüttert, lebten sie ganz ohne Nachtheil. 4. Ein Esel, der mit trocknem und später mit gekochtem Reis gefüttert wurde, lebte nur 15 Tage. Ein Hahn dagegen lebte von gekochtem Reis, ohne Nachtheil, mehrere Monate. 5. Hunde, bloss mit Käse oder bloss mit harten Eiern gefüttert, lebten lange, aber sie wurden schwach und mager, verloren die Haare. 6. Muskelfleisch vertragen die Nagethiere sehr lange. 7. Wenn man ein Thier eine Zeit lang mit einer Nahrung füttert, von der allein es zuletzt umkommen müsste, so wird es durch Herstellung seiner gewöhnlichen Nahrung nicht mehr gerettet. Das Thier frisst zwar mit Begierde, doch sein Tod erfolgt zur selben Zeit, als wenn es mit der ersten Nahrung fortgefüttert worden wäre. Nach Allem diesem scheint die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Nahrungsmittel eine Hauptregel zur Erhaltung der Gesundheit zu seyn.

Prout reducirt alle Nahrungsmittel der höheren Thiere auf 3 Klassen: Saccharina (Zucker, Stärke, Gummi u. s. w.), Oleosa (Oel und Fett), Albuminosa (animalische Materien und vegetabilischer Gluten). Das Folgende enthält einen Auszug der Ansichten von Prout, welchen Elliotson in seiner Uebersetzung von Blumenbach's Physiologie aus einem ungedruckten Werke von Prout über die Verdauung, und daraus H. Mayo in *Outlines of human physiology*. 3. *ed. London* 1833. pag. 152, mitgetheilt haben.

„Durch die Beobachtung, dass die Milch als der einzige Stoff, der fertig gebildet und von der Natur als Nahrung bestimmt, im Wesentlichen aus drei Substanzen zusammengesetzt ist, nämlich aus Zuckerstoff, Oelstoff und Käsestoff oder einer dem Eiweiss verwandten Materie, ward ich nach und nach zu dem Schluss veranlasst, dass alle Nahrungsstoffe bei dem Menschen und den höheren Thieren auf diese drei allgemeinen Quellen reducirt werden könnten. Desshalb beschloss ich, sie zuerst einer strengen Prüfung zu unterwerfen, und, wo möglich, ihre allgemeinen Beziehungen und Analogieen zu erforschen. Die charakteristische Eigenthümlichkeit von zuckerhaltigen Körpern besteht darin, dass sie einfach aus Kohlenstoff, mit Sauerstoff und Wasserstoff in dem Verhältniss, worin diese Wasser bilden, zusammengesetzt sind; die Proportionen von Kohlenstoff wechseln in verschiedenen Beispielen von ungefähr 30 bis 50 Proc. Die beiden anderen Klassen bestehen aus zusam-

Digitized by Google

mengesetzten Basen (wovon der Kohlenstoff den Hauptbestandtheil bildet), gleichfalls gemischt und modificirt mit Wasser. Die Proportion von Kohlenstoff in ölhaltigen Körpern, die in dieser Rücksicht die oberste Stelle einnehmen, schwankt von ungefähr 60—80 Proc.; desshalb können die Oele, wenn man den Kohlenstoff als Maass der Ernährungsfähigkeit betrachtet, was in gewisser Hinsicht auch gethan werden kann, im Allgemeinen als die Klasse der nährendsten Körper betrachtet werden. Der allgemeine Schluss von dem Ganzen ist, dass Körper, die von Natur weniger als 30 oder mehr als 80 Proc. Kohle enthalten, nicht gut als alleinige Nahrung passen.

Es ist noch übrig, zu erforschen, ob Thiere von einer einzigen dieser Klassen ausschliesslich leben können; aber bis jetzt sind die Versuche durchaus gegen diese Annahme, und die annehmlichste Ansicht ist, dass eine Mischung, zum wenigsten aus 2 Klassen dieser Nahrungsstoffe, wo nicht aus allen dreien, dazu nothwendig ist. Milch ist demnach, wie bewiesen wurde, eine solche Zusammensetzung, und zumeist alle Gräser und Kräuter, die für die Thiere zum Futter dienen, enthalten wenigstens zwei von jenen drei Stoffen. Dasselbe ist ausgemacht von animalischen Nahrungsmitteln, welche zum wenigsten aus Eiweiss und Oel bestehen; kurz, es ist vielleicht unmöglich, eine Substanz namhaft zu machen, die von höheren Thieren zur Nahrung benutzt wird, welche nicht wesentlich eine natürliche Composition von wenigstens zweien, wo nicht von allen dreien, der obigen drei grossen Klassen von Nahrungsstoffen darstellt.

Aber in der künstlichen Nahrung des Menschen sehen wir diess wichtige Princip von Mischung am strengsten erwiesen. Er, nicht mit den Productionen, die die Natur freiwillig schafft, sich begnügend, sucht aus jeder Quelle und bildet durch die Kraft seines Verstandes oder vielmehr seines Triebes auf jede mögliche Weise und mit jeder Erkünstelung dieselbe wichtige Nahrungsmischung. Diess ist, mit aller seiner Kochkunst, wie wenig er auch es zu glauben geneigt seyn mag, der einzige Endzweck seiner Arbeit, und je mehr seine Erfolge sich dem nähern, um so näher kommen sie der Vollendung. So hat schon in den frühesten Zeiten der Trieb ihn gelehrt, Oel oder Butter zu mehligen Substanzen zu mischen, wie zum Brot und zu denen, welchen von Natur dieser Stoff mangelte. Derselbe Naturtrieb hat ihn gelehrt, Thiere zu mästen, um sich ölhaltige Substanzen mit Eiweiss verbunden zu verschaffen, welche Verbindung er endlich meist zugleich mit zuckerhaltigen Stoffen in Form von Brot oder Vegetabilien geniesst. Sogar in seinem ausgewähltesten Luxus und in seinen angenehmsten Leckerbissen ist dasselbe wichtige Princip im Auge behalten, und sein Zucker und Kraftmehl, seine Eier und Butter, in all ihren verschiedenen Formen und Verbindungen, sind nichts mehr und nichts weniger als versteckte Nachahmungen des Hauptnahrungstypus, der Milch, wie sie ihm von der Natur geboten wird."

Die Empfindungen des Appetits und der Sättigung sind theils selbst Geschmack, theils dem Geschmack analoge Empfindungen,

Digitized by Google

gleichwie die Empfindungen, welche Speisen in der Appetitlosigkeit erregen. Die Empfindung des Appetits wird erhöht im Winter und Frühling, durch kalte Bäder, durch Friction der Haut, des Unterleibes und dessen Erschütterung beim Reiten, so wie durch Anstrengung.

Die Verdauung erregt bei Gesunden ein wohlthätiges Gemeingefühl mit Wärmeempfindung verbunden; diese Gefühle erstrecken sich aber nicht bloss auf die Verdauungsorgane allein, deren Hauptsensationsnerve der Nervus vagus ist, sondern auch auf fast alle übrigen Theile: daher es wahrscheinlich ist, dass die Erregung der sympathischen Nerven, die, wie später bewiesen wird, eine grosse Communicationsfähigkeit ihrer Zustände haben, hieran Antheil habe.

Mangel der Verdauungskraft ist ein Zustand der Verdauungsorgane, wo sie theils nicht die zur Auflösung bestimmten Flüssigkeiten absondern, theils in einem Zustande von Reizbarkeit oder Atonie sind und durch die Nahrungsstoffe mehr mechanisch zu unangenehmen Empfindungen und unangemessenen Bewegungen afficirt werden. Die örtlichen unangenehmen Empfindungen der Verdauungswege scheinen vorzugsweise in dem Nerv. vagus ihren Sitz zu haben, dessen stärkere Reizungen wenigstens schon in der Speiseröhre und im Schlunde dieselben Empfindungen von Ekel, wie die Reizung des Magens selbst, welche dem Erbrechen vorhergeht, bewirken. Allein die Veränderung in der Stimmung des gesammten Nervensystems ist in diesen Fällen eben so auffallend und scheint auch hier von dem Nervus sympathicus abhängig zu seyn.

Bei den Phänomenen des Hungers und Durstes sind beiderlei, örtliche und allgemeine, Empfindungen vorhanden, allein die weiteren Erscheinungen werden später noch unmittelbar aus dem absoluten Mangel an Nahrungsstoffen und Wasser abhängig.

Die ersten Phänomene des Durstes sind Trockenheit der Wege, welche am meisten verdünnsten (der Luftwege), später Fieber, Entzündung der Luftwege.

Was man indessen Durst nennt, ist zuweilen mehr ein Bedürfniss nach Abkühlung durch kühle Getränke, wie bei dem, in Fiebern durch vermehrte Wärme und durch verminderten Turgor bewirkten, trocknen, heissen Zustande der Luftwege, des Mundes und der Haut. Die Ausdünstung ist hier oft eher vermindert und die Trockenheit entsteht dadurch, dass, wenngleich Blut in die Capillargefässe fliesst, die Wechselwirkung zwischen Blut und den von der organisirenden Kraft belebten Theilen, was man *Turgor vitalis* nennt, vermindert ist. Ohne dass die Wärmeproduction in den inneren Theilen vermehrt zu seyn braucht, erscheint die Haut heisser, weil die Ausdünstung fehlt und die mit dem Uebergang der tropfbaren Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand verbundene Abkühlung wegfällt.

Die letzten Folgen des unbefriedigten Durstes sind: ein fieberhafter Zustand, der von dem eines nervösen Fiebers nicht verschieden scheint und mit Entzündung der Luftwege verbunden ist.

Die örtlichen Empfindungen des Hungers, welche sich auf

Digitized by Google

die Verdauungswege beschränken und im N. vagus ihren Sitz zu haben scheinen, sind Gefühle von Druck, Bewegung, Zusammenziehung, von Uebelkeit mit Kollern, später Schmerzen. Als Ursache dieser Empfindungen hat man den Speichel, die Galle, eine Reibung der Magenwände, den scharfen Magensaft angesehen. Dumas erklärt den Hunger daraus, dass die einsaugenden Gefässe des Darms sich gegen die Magen- und Darmwände selbst wenden.

An alles diess ist wohl nicht zu denken. Die Nahrungsmittel sind adäquate oder homogene Reizmittel der Verdauungsorgane; wenn diese fehlen, bringen die Nerven den Zustand des Organes zum Bewusstseyn. Die örtlichen Empfindungen des Hungers, wie des Appetites und der Sättigung, können nach der Durchschneidung des N. vagus vielleicht fehlen, wie Bragbet (*Recherch. sur les fonct. du syst. ganglionaire. Paris* 1830.) aus Versuchen schliesst; die Empfindung des Hungers wird durch Veränderung der Nerven des Magens, vermöge der Ingesta, durch stärkere Empfindungen und Thätigkeiten, die das Sensorium in Leidenschaften, Meditationen beschäftigen, durch die Aenderung des Sensoriums selbst von Opium etc. aufgehoben. Darum die häufige Erscheinung des Fastens bei Irren, weil sie durch die Alteration des Sensoriums vielleicht die örtliche Sensation des Hungers, die uns zur Nahrung mahnt, nicht haben. Nur die allgemeinen Folgen des Fastens sind unter ungleichen Zuständen der Verdauungsorgane meist gleich.

Dahin gehören die Empfindungen von allgemeiner Hinfälligkeit, die wirklich immer mehr zunehmende Kraftlosigkeit, Abmagerung, Fieber, Irrereden, die heftigsten Leidenschaften abwechselnd mit tiefster Niedergeschlagenheit. Die Wärme soll um mehrere Grade sinken, dem von Currie (*Wirkungen des kalten und warmen Wassers p.* 267.) bei einem von Verschliessung des Schlundes Hungernden widersprochen wird. Der Athem wird stinkend, der Harn scharf und feurig, die Lymphgefässe werden nach Magendie und Collard blutig. Der Inhalt dieser Gefässe soll in der ersten Zeit des Fastens grösser seyn (?), später immer geringer, auch die Lymphgefässe des Darms sollen indess gegen die mittlere Zeit der Abstinenz noch etwas weniges Lymphe führen. Collard de Martigny. Zusammenziehung des Magens tritt ein, Die Absonderungen hören auf, obgleich bei angefüllter Gallenblase doch auch immer noch Galle in den Darm fliesst (in den Magen fliesst sie nach Magendie nicht). Der Schleim der Schleimhäute vermindert sich wie alle der Resorption fähige Substanzen. Eiter der Wunden, Milch, Speichel, Gift der Schlangen werden nicht mehr abgesondert. Der Urin enthält noch Harnstoff, wie Lassaigne (*Journ. de chim. med.* 1825. *avr.*) bei einem Irren nach einem Hungern von 18 Tagen fand; die Harnwege sind nicht nothwendig entzündet, die Schleimhäute blass. Nach Collard de Martigny vermindert sich während des Hungers die relative Quantität der Fibrine im Blute, während die relative Quantität der festen Theile der Blutkörperchen steigt. Magendie *Journ. de Physiol. T.* 8. *p.* 171. Nach dem Tode erscheint der Magen sehr zusammengezogen.

Digitized by Google

Aus den über die Lebensdauer der Thiere und des Menschen angestellten Versuchen geht hervor, dass warmblütige Thiere am wenigsten ausdauern. Niedere Thiere mit harten Schalen hungern ausserordentlich lange, wie ich aus brieflichen Mittheilungen selbst die Beobachtung habe, dass ein afrikanischer Scorpion auf einer Reise nach Holland und dort in den Händen des Dr. De-Haan noch neun Monate ohne etwas zu fressen erhalten wurde. Rudolphi erhielt einen Proteus anguinus 5, Zoys 10 Jahre lang in erneuertem Brunnenwasser. Auch Wassersalamander, Schildkröten und Goldfische kann man Jahre lang ohne Nahrung erhalten. Von Schlangen ist es bekannt, dass sie oft halbe Jahre lang hungern. Vögel lebten in Redi's Versuchen 5 bis 28 Tage; ein Seehund ausser Wasser und ohne Nahrung 4 Wochen, Hunde 25 bis 36 Tage ohne Speise und Trank. Menschen ertragen Hunger und Durst in der Regel nicht viel länger als eine Woche, selten mehr als 2 Wochen, den blossen Hunger viel länger, in Krankheiten noch länger, besonders Irre. Siehe Tiedemann a. a. O. Tiedemann führt Fälle an, in welchen Hungernde, denen vergönnt war, den Durst zu stillen, 50 und mehr Tage ausdauerten. Monate oder wohl gar Jahre langes Fasten gehört, wie Rudolphi mit Recht bemerkt, zum Betrug. Ueber alle in diesem Capitel abgehandelten Gegenstände finden sich ausführlichere Untersuchungen in Tiedemann's *Physiologie.* 3. *Bd.* Tiedemann, *Untersuchungen über das Nahrungsbedürfniss, den Nahrungstrieb und die Nahrungsmittel des Menschen. Darmstadt* 1836.

II. Capitel. Von den Verdauungsorganen.

a. Darmkanal im Allgemeinen.

Es scheint ein allgemeiner Charakter der Thiere zu seyn, dass sie eine innere Höhle zur Verwandlung der Nahrungsstoffe, zur Verdauung besitzen. Diese Höhle wird Darm genannt, welcher in den mehrsten Fällen schlauchförmig, und an seinem obern und an seinem untern Ende geöffnet ist, zuweilen jedoch nur eine Mundöffnung besitzt, indem die Reste der Nahrungsstoffe durch dieselbe Oeffnung ausgeworfen werden, durch welche sie eindringen. Ueber Agastrica s. Meyen *act. nat. cur. T. XVI. Suppl.*

Bei den Infusorien giebt es nach Ehrenberg's grossen Entdeckungen nicht nur durchgängig einen mit Wimpern umgebenen Mund, sondern Ehrenberg hat auch durch Fütterung mit farbigen Stoffen die Form der Verdauungsorgane dieser Thiere ermitteln, und die Eintheilung der Hauptgruppen dieser Thierlassen auf den Bau der Verdauungsorgane gründen können. Sie sind theils darmlose, mit mehreren dem Munde angehängten Magen versehene Thiere, denen eigentlicher Darm und After fehlt, wie die Monaden u. a; theils mit einem vollständigen Darm und mit Mund und After ausgestattete. Der Darm ist mit vielen blinddarmförmigen, gestielten Magen besetzt, und ist bald kreisförmig zum Munde zurückkehrend, wo dann After und Mund

Digitized by Google

neben einander an dem gewimperten Umfange des oberen Endes sich befinden, wie bei den Vorticellen; theils gegenmündig, indem Mund und After sich an entgegengesetzten Enden befinden; theils wechselmündig, indem entweder Mund, oder After am Ende des Körpers sind; theils bauchmündig, indem sich beide Oeffnungen am Bauche befinden. Bei einem Infusorium mit Darmkanal, *Loxodes cucullulus*, sind von Ehrenberg nun auch bereits Zähne am Schlundkopf entdeckt worden.

Die Räderthiere, welche durch die mit Wimpern besetzten Räderorgane am Kopfe einen Strudel im Wasser erregen, besitzen einen einfachen, vom Munde zum After gehenden Darm, der selten mit Blinddärmen besetzt ist, und sind zum Theil mit einem von Ehrenberg entdeckten Zahnsystem versehen. Die meisten sind am Anfange des Darms mit zwei drüsenartigen Korpern versehen. Ehrenberg. *Physikal. Abhandl. der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin* 1830 *und* 1831.

Bei den Acalephen oder Quallen fehlt der After mit dem Darm, es werden die Nahrungsstoffe entweder durch den Mund in den Magen aufgenommen, der sich gefässartig im Innern des Thieres verzweigt, wie bei den Medusen; oder die Nahrungsstoffe gelangen durch Saugröhren der Fangarme in den centralen Magen, wie bei den Rhizostomen; oder die Nahrungsstoffe scheinen in einigen Fällen durch Saugröhren aufgenommen, ohne Magenhöhle durch gefässartig verzweigte Verdauungskanäle verbreitet zu werden, wie bei den Berenicen und anderen. Auch in den Fällen, wo sich ein Magen vorfindet, gehen von diesem gefässartige Zweige aus, im Innern des Thieres sich verbreitend. Bei den Polypen, welche theils frei, theils festgeheftet sind, und theils wieder einfach, theils auf einem Polypenstock vereinigt leben, sind die Verdauungsorgane bald einfach, und aus einem blinden sackförmigen Magen bestehend, wie bei den Actinien, Funginen, Madreporinen, Tubiporinen, Corallinen, Pennatulinen, Alcyoninen, Milleporinen, Sertularien, Hydrinen; bald aus einem kurzen Darmkanal gebildet, dessen After sich neben dem Munde öffnet, wie bei den Alcyonellinen. Siehe Hempricu et Ehrenberg *Symbolae physicae. Animalia vertebrata et evertebrata exclusis insectis percensuit Ehrenberg. Berolini* 1831. Vergl. Meyen, *Isis* 1828. *Nov. act. nat. cur. T. XVI. Suppl.*

Bei den Eingeweidewürmern ist der Bau der Verdauungsorgane ungemein verschieden. Bei den Blasenwürmern scheint die blasenformige Körperhöhle die Verdauungsorgane zu vertreten. So scheint es wenigstens beim Cysticercus und Coenurus zu seyn. Bei den Bandwürmern, Cestoidea, ist der Darm nach Mehlis einfach beginnend und sehr bald gabelig getheilt. Bei den Trematoden oder Saugwürmern fehlt der After, und der Darmkanal ist gefässartig verzweigt, obgleich bei den Trematoden, wie z. B. bei Dystoma, noch ein zweites Gefässsystem vorhanden ist, welches am hintern Ende ausmündet, und welches vielleicht mit den feinsten Zweigen des Darmkanals in Verbindung steht. Mehlis *de distomate hepatico et lanceolato. Göttingae* 1825. Laurer *disquis. anatom. de amphistomo conico. Gryphiae* 1830. Bei den

Digitized by Google

Hakenwürmern, Acanthocephala, fehlt der After und der zweischenklige Darm endet blind. Die Nematoidea, Rundwürmer, besitzen einen schlauchförmigen Darm mit entgegengesetztem Mund und After. Bei den der Gruppe der Eingeweidewürmer, namentlich den Trematoden, so verwandten weisssaftigen Würmern des süssen und salzigen Wassers (Planaria, Prostoma, Derostoma u. a.) zeigen sich auch wieder auffallende systematische Unterschiede, indem Mund und After bei Prostoma und Derostoma vorhanden, und der Darm einfach ist, während die Planarien einen verzweigten Darm (Mund an der untern Fläche des Körpers) ohne deutlichen After besitzen. Ehrenberg *symb. phys.*

Bei den Radiarien ist der Darm zuweilen vollständig mit Mund und After, wie bei den Holothurien und Seeigeln, indem sich Mund und After bei den ersteren an den entgegengesetzten Enden; bei den Seeigeln der Mund in der Mitte der unteren Fläche, der After bald am Scheitel, wie bei Echinus, bald am Rande, wie bei Spatangus, befinden. Bei den Asteriden oder Seesternen fehlen dagegen der After und Darm, und letzterer ist durch blinddarmförmige Anhänge des Magens ersetzt, während bei den Haarsternen, Crinoidea, der Darm und After wieder vorhanden sind, wie bei den Comatulen, wo der After mit dem Munde auf der untern Fläche des Körpers liegt.

Der Darmkanal der Annularien, Crustaceen, Spinnen und Insekten ist immer vollständig mit entgegengesetztem Mund und After; in seiner Organisation bietet er sehr viele Mannigfaltigkeiten dar. Wir führen hier nur als besonders merkwürdig auf: die Art, wie der ungemein kurze Darm bei den Phalangien durch blinddarmförmige Auswüchse vergrössert wird, das Zahngerüst in dem Magen der Krebse und mehrerer Insekten (Orthoptera), und die Zusammensetzung des Magens bei einigen fleischfressenden Insekten. Im Allgemeinen besteht der Darmkanal der Insekten aus der Speiseröhre, aus dem Saugmagen, der jedoch nur einigen der Hymenopteren, den Schmetterlingen und Zweiflüglern zukommt, dem Muskelmagen im Innern mit Zähnen oder Hornleisten besetzt, welcher den fleischfressenden Käfern und den meisten Orthopteren zukommt; dem Chylus bildenden Theil des Darms bis zur Insertion der Malpighi'schen oder sogenannten Gallengefässe, und dem Afterdarm von der Insertion jener Gefässe bis zum After.

Bei den Wirbelthieren zeigt sich der Magen gewöhnlich als eine einfache Erweiterung des Darms. Die Länge des Darms, der bei den Fischen gewöhnlich kurz ist, wird zuweilen durch Vorsprünge der Schleimhaut compensirt, indem z. B. bei den Rochen und Haifischen die innere Wand des Darms eine spiralförmige Klappe vom Magen bis zum After bildet. Der After liegt bei den Fischen meist vor der Harn- und Geschlechtsmündung.

Der Magen der Vögel zeigt eine Zusammensetzung, welche man bei den Fischen und Amphibien noch nicht vorfindet. Ausserdem, dass der Kropf als sackförmiger Anhang der Speiseröhre ein ziemlich allgemeines Organ unter den Vögeln, zur vorläufigen Erweichung der Nahrungsmittel bestimmt, vorkommt, und nur

Digitized by Google

bei den Klettervögeln, Sumpf- und Wasservögeln, den Insekten fressenden und straussartigen Vögeln fehlt, zerfällt der Magen selbst in zwei Theile: in den sogenannten Vormagen oder Drüsenmagen (Proventriculus), eine Erweiterung der Cardia, deren Wände zwischen Schleimhaut und Muskelhaut mit einer ganzen Schicht von gesonderten Drüsensäckchen besetzt sind, und in den Muskelmagen, welcher unmittelbar auf den erstern folgt. Bei den fleischfressenden Vögeln sind die Wände des Muskelmagens dünner, sehr stark dagegen bei den Pflanzenfressern, wo die Muskelschicht zwei ungeheure muskulöse Schalen bildet, die an der innern Fläche der Schleimhaut mit einer schwieligen, dicken Schicht des Epitheliums bedeckt sind. Der Dickdarm kurz und eng, besitzt an seinem Anfange zwei Blinddärme, die vorzüglich bei den von Vegetabilien lebenden Vögeln lang sind. Der Mastdarm öffnet sich wie bei den Amphibien mit den Ausführungsgängen der Harnwerkzeuge und Geschlechtstheile in die Kloake.

Bei den Säugethieren wird vorzüglich der Unterschied der Pflanzenfresser und Fleischfresser wichtig. Der bei den Vögeln vorkommende Drüsenmagen kommt unter den Säugethieren als gesonderte Abtheilung nicht vor, wiederholt sich bloss in der Anhäufung mehrerer Drüsen an der Cardia einiger Säugethiere, wie beim Biber und Phascolomys u. a. Siehe Home *Lectures on comparative Anatomy. Vol. II.* Mueller *de gland. secernentium penitiori structura. Tab. I. Fig. 9. 10.*

Bei mehreren Nagethieren, wie beim Hamster und der Wasserratte, zerfällt der Magen bereits in zwei Hälften. Bei dem Riesen-Känguruh unterscheidet man 3 und bei den Faulthieren selbst 4 Abtheilungen; unter den Affen haben die Semnopitheci einen zusammengesetzten Magen, welcher aus 3 Theilen, einer Portio cardiaca mit glatten, einfachen Wänden, einer sehr weiten sackförmigen Portion, und einem langen, dickdarmähnlichen Kanal besteht. Bei den wiederkäuenden Thieren zeigt der Magen constant 4 Abtheilungen. Die Zusammensetzung des Magens ist jedoch im Allgemeinen kein Charakter der pflanzenfressenden Säugethiere; denn bei den Einhufern ist der Magen einfach, und die verschiedenen Regionen unterscheiden sich nur, dass die Portio cardiaca noch mit dem Epithelium der Speiseröhre überzogen ist. Unter den dickhäutigen Thieren ist der Magen im Allgemeinen bis auf die dem Pecari und Nilpferde eigenthümlichen Anhänge oder sackförmigen Erweiterungen des Magens von einfacherer Structur. Bei den wiederkäuenden Thieren unter den Pflanzenfressern und bei den Delphinen unter den Fleischfressern hat der Magen eine auffallend zusammengesetzte Structur. Bei den Wiederkäuern, wo sich 4 Magen vorfinden, gleicht nur der letzte durch die saure Beschaffenheit seiner Absonderung dem Magen der übrigen Säugethiere. Die drei ersten Abtheilungen, welche noch mit Epithelium bedeckt sind, können als Abtheilungen der Portio cardiaca betrachtet werden, welche zur vorläufigen Erweichung der vegetabilischen Nahrung bestimmt sind. Unter diesen Abtheilungen zeichnet sich die erste grosse (Wanst,

Digitized by Google

Pansen) durch die vielen platten Warzen seiner innern Fläche aus; in ihm sind die Nahrungsmittel noch wenig verändert und werden der Einwirkung des Speichels überlassen. Die zweite kleinere Abtheilung, welche mit der ersten in einem weiten Zusammenhange steht, ist der Netzmagen, durch die zellenförmigen, gezähnelten Falten einer innern Haut ausgezeichnet. Im dritten Magen, dem Blättermagen, bildet die Schleimhaut eine grosse Anzahl hoher Längenfalten, die wie Blätter eines Buchs nebeneinander stehen. Das in dem ersten und zweiten Magen erweichte Futter gelangt in einer gewissen Zeit wieder nach der Speiseröhre und in den Mund zurück; erst im wiedergekäuten, verdauten Zustande gelangt es aus der Speiseröhre in den dritten Magen, und erst von hier aus durch eine engere Oeffnung in den vierten Magen, Labmagen, welcher eine weichere Beschaffenheit seiner Schleimhaut und eine längliche, fast darmartige Form besitzt. Man kann den ersten und zweiten Magen als Erweiterungen des Cardiatheils der Speiseröhre und des Magens betrachten. Durch Schliessung der Rinne, durch welche sie mit der Speiseröhre zusammenhängen, kann die Speiseröhre an dem ersten und zweiten Magen vorbei, den Bissen in den dritten gelangen lassen. Unter den Cetaceen kommt die zusammengesetzte Structur sowohl bei den grasfressenden als fleischfressenden vor. Die grasfressenden Monati's haben mehrere Säcke an ihrem Magen, und die fleischfressenden Wallfische haben sogar fünf und mehr Abtheilungen desselben.

Der Darmkanal ist bei den fleischfressenden Säugethieren in der Regel viel kürzer, und der Unterschied der dünnen und dicken Gedärme weniger ausgeprägt; dagegen ist der Grimmdarm bei den meisten Grasfressern sehr weit und sehr lang. Merkwürdige Unterschiede zeigen sich auch am Blinddarm fast durchgängig nach der Art der Nahrung. Dieses Darmstück ist in der Regel bei reissenden Thieren äusserst klein, dagegen bei den Einhufern, Wiederkäuern und den meisten Nagern ungemein lang, z. B. beim Pferd 2½ Fuss lang, beim Biber 2 Fuss lang. Beispiele vom Uebergang der thierischen Nahrung in vegetabilische bilden in gewissen Lebensabschnitten die pflanzenfressenden Säugethiere, indem sie nach der Geburt von Muttermilch ernährt werden; der erste Magen der Wiederkäuer ist, so lange sie noch von Milch leben, klein. Grösser sind die Veränderungen, welche der Darm des Frosches durch die Verwandlung erfährt. Die Larven dieser nackten Amphibien scheinen bei einem ausserordentlich langen Darmkanal vorzüglich von Vegetabilien zu leben.

Das allgemeinste Resultat dieser Vergleichung, auf deren Detail die vergleichende Anatomie einzugehen hat, ist, dass die Verdauung der Vegetabilien ungleich grössern Aufwand thierischer Apparate erfordert, als die Verdauung des Fleisches. Der innige Zusammenhang, in welchem die gesammte Organisation eines Thiers zu seiner Nahrung steht, ist von Cuvier auf eine so bewundernswürdige Weise geschildert worden, dass ich mich nicht enthalten kann, diese Darstellung in seinen eigenen Worten, *Umwälz. d. Erdrinde, übersetzt von* Noeggerath. *Bonn* 1830

Digitized by Google

p. 87, wiederzugeben. Cuvier sagt: Jedes lebende Wesen bildet ein Ganzes, ein einziges und geschlossenes System, in welchem alle Theile gegenseitig einander entsprechen, und zu derselben endlichen Action durch wechselseitige Gegenwirkung beitragen. Keiner dieser Theile kann sich verändern ohne die Veränderung der übrigen, und folglich bezeichnet und giebt jeder Theil einzeln genommen alle übrigen. Wenn daher die Eingeweide eines Thiers so organisirt sind, dass sie nur Fleisch und zwar bloss frisches verdauen können, so müssen auch seine Kiefer zum Fressen, seine Klauen zum Festhalten und zum Zerreissen, seine Zähne zum Zerschneiden und zur Verkleinerung der Beute, das ganze System seiner Bewegungsorgane zur Verfolgung und Einholung, seine Sinnesorgane zur Wahrnehmung derselben in der Ferne eingerichtet seyn. Es muss selbst in seinem Gehirne der nöthige Instinkt liegen, sich verbergen und seinen Schlachtopfern hinterlistig auflauern zu können. Es bedarf der Kiefer, damit es fassen könne, einer bestimmten Form des Gelenkkopfes, eines bestimmten Verhältnisses zwischen der Stelle des Widerstandes und der Kraft zum Unterstützungspunkte, eines bestimmten Umfanges des Schlafmuskels, und letzterer wiederum einer bestimmten Weite der Grube, welche ihn aufnimmt, und einer bestimmten Convexität des Jochbogens, unter welchem er hinläuft, und dieser Bogen muss wieder eine bestimmte Stärke haben, um den Kaumuskel zu unterstützen. Damit das Thier seine Beute forttragen könne, ist ihm eine Kraft der Muskeln nöthig, durch welche der Kopf aufgerichtet wird; dieses setzt eine bestimmte Form der Wirbel, wo die Muskeln entspringen, und des Hinterkopfes, wo sie sich ansetzen, voraus. Die Zähne müssen, um das Fleisch verkleinern zu können, scharf seyn. Ihre Wurzel wird um so fester seyn müssen, je mehrere und stärkere Knochen sie zu zerbrechen bestimmt sind, was wieder auf die Entwickelung der Theile, die zur Bewegung der Kiefer dienen, Einfluss hat. Damit die Klauen die Beute ergreifen können, bedarf es einer gewissen Beweglichkeit der Zehen, einer gewissen Kraft der Nägel, wodurch bestimmte Formen aller Fussglieder und die nöthige Vertheilung der Muskeln und Sehnen bedingt werden; dem Vorderarm wird eine gewisse Leichtigkeit, sich zu drehen, zukommen müssen, welche bestimmte Formen der Knochen, woraus er besteht, voraussetzt; die Vorderarmknochen können aber ihre Form nicht ändern, ohne auch im Oberarm Veränderungen zu bedingen. Kurz, die Form des Zahns bringt die des Condylus mit sich, diejenige des Schulterblattes die der Klauen, gerade so, wie die Gleichung einer Curve alle ihre Eigenschaften mit sich bringt; und so wie man, wenn man jede Eigenschaft derselben für sich zur Grundlage einer besondern Gleichung nähme, sowohl die erste Gleichung als alle ihre andern Eigenschaften wiederfinden würde, so könnte man, wenn eines der Glieder des Thiers als Anfang gegeben ist, bei gründlicher Kenntniss der Lebensökonomie das ganze Thier darstellen. Man sieht ferner ein, dass die Thiere mit Hufen sämmtlich pflanzenfressende seyn müssen, dass sie, indem sie ihre Vorderfüsse nur zur Stüt-

Digitized by Google

zung ihres Körpers gebrauchen, keiner so kräftig gebauten Schulter bedürfen, woraus denn auch der Mangel des Schlüsselbeins und des Acromium und die Schmalheit des Schulterblattes sich erklärt; da sie auch keine Drehung ihres Vorderarms nöthig haben, so kann die Speiche bei ihnen mit der Ellenbogenröhre verwachsen, oder doch an dem Oberarm durch einen Ginglymus und nicht durch eine Arthrodie eingelenkt seyn; ihr Bedürfniss zur Pflanzennahrung erfordert Zähne mit platter Krone, um die Samen und Kräuter zu zermalmen; diese Krone wird ungleich seyn, und zu diesem Ende der Schmelz mit Knochensubstanz abwechseln müssen. Da bei dieser Art von Krone zur Reibung auch horizontale Bewegung (*musc. pteryg.*) nöthig ist, so wird hier der Condylus des Kiefers nicht eine so zusammengedrückte Erhabenheit bilden, wie bei den Fleischfressern, er wird abgeplattet seyn und zugleich einer mehr oder weniger platten Fläche am Schläfenbein entsprechen; die Schläfengrube, welche nur einen kleinen Muskel aufzunehmen hat, wird von geringer Weite und Tiefe seyn.

b. Häute des Darmkanals.

Der Darm besteht aus einem serösen Ueberzug vom Peritoneum, aus einer darunter liegenden Muskelhaut, aus einer Tunica propria, welche eine Art Fascie oder festes Gerüste bildet, an welchem nach aussen die Muskelfasern anliegen, und nach Innen die Schleimhaut befestigt ist.

Bei vielen Fischen setzt sich die Schleimhaut der Speiseröhre durch den Luftgang der Schwimmblase in die innere Haut der Schwimmblase fort, welche also die Natur einer Schleimhaut hat. Bei vielen Fischen fehlt jene Verbindung der Schwimmblase mit dem Schlund. (Vergl. oben pag. 310.) Hier scheint es sonderbar, dass die innere Haut der Schwimmblase, obgleich mucöser Natur, doch gegen das Gesetz der mucösen Häute einen geschlossenen Sack bildet. Diese Sonderbarkeit verschwindet indess durch die von Baer gefundene Thatsache der Entwickelungsgeschichte (Froriep's *Notizen.* 848.), indem nämlich die Schwimmblase als eine Ausstülpung des Schlundes sich ursprünglich bildet, bei jenen Fischen also eine Abschnürung einer ursprünglich stattfindenden Communication eintreten muss.

Ueber den Bau der Darmzotten, jener Verlängerungen des Schleimhäutchens im Dünndarm, und ihr Verhältniss zur Resorption ist bereits früher in dem Capitel vom Ursprung und Bau der Lymphgefässe p. 260 gehandelt worden. Hier sind noch die innerhalb des Dünndarms in der Schleimhaut vorkommenden Drüsen zu erwähnen. Man hat dreierlei Formen davon unterschieden: 1. die Lieberkühn'schen Drüsen. Diess sind wohl jene unzähligen, mit dem einfachen Mikroskop erst erkennbaren Löcherchen oder Vertiefungen, welche im ganzen Laufe des Dünndarms in der Mucosa dicht neben einander vorkommen, und bei hinreichender Vergrösserung ihr das Ansehn eines Siebes geben. Von diesen Vertiefungen ist bereits oben pag. 266 gehandelt.

Digitized by Google

2. die Brunner'schen Drüsen. Sie sind besonders im obern Theile des Dünndarms häufig, und sind mit blossen Augen erkennbare, vereinzelt stehende Folliculi. 3. die sogenannten Peier'schen Drüsen. Diese Organe, welche jedesmal die der Insertion des Mesenterium entgegengesetzte Stelle des Darms einnehmen, sind bis auf den heutigen Tag räthselhaft geblieben, Aus Rudolphi's Abhandlung über die Peier'schen Drüsen (*Anatom. physiol. Abhandlungen. Berlin* 1802.) hat man nur das Allgemeinste von den Formverschiedenheiten dieser meistens ovalen, verdickten Stellen der Schleimhaut kennen gelernt. Da nun aber diese Organe, welche dem Ileum angehören, in der neuern Zeit durch ihre krankhaften Veränderungen, namentlich die in ihnen sich ausbildenden Pusteln und Geschwüre, im Typhus abdominalis, von grosser Wichtigkeit geworden sind, so war eine genaue Kenntniss von der Structur dieser Theile dringend nothwendig geworden, um endlich zu wissen, was sich in jenen Fällen krankhaft verändert und worin diese Veränderung besteht. Was ich hier mittheile, ist das Resultat der hier von Bozum über diesen Gegenstand angestellten Beobachtungen. Es ist bei der Genauigkeit dieser Untersuchungen überflüssig zu bemerken, dass ich die Beobachtungen des Verf. selbst verificirt habe. Um die Peyer'schen Drüsen zu untersuchen, darf man nur den Darmkanal ganz gesunder Menschen zum Gegenstande der Beobachtung wählen. Es ist daher besonders die Schleimhaut des Darmkanals der durch plötzliche Todesart Gestorbenen dazu geeignet. In vielen chronischen Krankheiten, namentlich in den Krankheiten des Darmkanals selbst, werden diese Theile sehr verändert, und man erhält aus der Beobachtung in jenen Fällen ein durchaus falsches Bild von dem Bau dieser Theile im gesunden Zustande. In allen Fällen, wo die Peier'schen Drüsen wie neben einander stehende seichte Zellen aussehen, ist der gesunde Zustand verloren; denn im gesunden Zustande haben jene Organe nichts mit offenen Zellen oder Follikeln gemein. Untersucht man die Peier'schen Drüsen von einem gesunden und durchaus frischen Darmkanal, nachdem man die Schleimhaut sanft abgewaschen und die Drüsen mit einem weichen Pinsel vorsichtig abgepinselt hat, mit dem Mikroskop, so gewahrt man am leichtesten, dass das dichtere Ansehn der Schleimhaut an den Stellen, wo Peier'sche Drüsen sind, zum Theil von der Grösse und Stärke der hier befindlichen Darmzotten herrührt, welche hier im Ganzen breiter und vorzüglich an ihrer Wurzel breiter ausgezogen sind. Die grössere Dichtigkeit der Schleimhaut an jenen Stellen rührt aber nicht bloss von der Stärke der Flocken her, sondern liegt auch in dem Gewebe der Mucosa selbst. Untersucht man den Boden der Schleimhaut der Peier'schen Drüsen zwischen den auf ihr sitzenden Zotten, so bemerkt man, dass die in der ganzen Schleimhaut des Dünndarms vorkommenden Löcherchen oder Grübchen (Lieberkühn'sche Drüsen?) auch hier zwischen den Zotten in grosser Anzahl vorhanden sind, ohne sich von ihrem Verhalten im übrigen Theil des Darmkanals zu unterscheiden. Man sieht aber auch zwischen den Zotten grössere, gegen

Digitized by Google

1 Linie breite, rundumschriebene weisse Stellen der Schleimhaut, welche beim Menschen ziemlich flach und wenig erhaben, bei den Thieren und namentlich bei dem Hund, der Katze, dem Kaninchen ziemlich hervorragend sind, und beim Hund wie weisse Papillen aussehen, in anderen Fällen einige Aehnlichkeit mit den Papillae vallatae der Zunge in ihrer Form haben, indem sie, wie bei dem Kaninchen und bei der Katze, von einer kreisförmigen Furche umzogen sind und eine mehr platte Oberfläche darbieten. Beim Menschen sind diese runden Stellen fast gar nicht erhaben, sondern flach und ohne sie umgrenzende Furchen. In allen Fällen, sowohl bei Menschen als beim Hund, bei der Katze und dem Kaninchen, sind diese runden weissen Stellen von einem Kranz von Oeffnungen umgeben, und diese Oeffnungen sehen gerade so aus wie die Löcherchen zwischen den Zotten auf den Peier'schen Drüsen in der übrigen Mucosa, oder wie die Lieberkühn'schen mikroskopischen Drüschen. Sie unterscheiden sich von jenen nur dadurch, dass die Oeffnungen zuweilen weniger rundlich als länglich sind, so zwar, dass der Längendurchmesser dieser Oeffnungen in der Richtung der Radien jener runden weissen Stellen liegt. Dieser Kranz von Oeffnungen, deren bei Menschen um eine solche Stelle gegen zehn und mehr sind, ist meistens kreisförmig, selten etwas unregelmässig. Auf den runden weissen Stellen, die bei den Thieren Papillen sind, sieht man in den meisten Fällen keine Spur von Oeffnungen, nur bei den Vögeln gelingt es, eine kleine Oeffnung zu sehen. Ich habe diess Verhalten bei der Katze schon in meiner Schrift (*De penitiori gland. structura*) dargestellt, und Tab. I. Fig. 11. abgebildet, wo noch das Eigenthümliche vorkommt, dass um jeden Kranz der Oeffnungen herum eine scheidenförmige, überaus feine Falte verläuft. Herr Boehm hat den Bau bei vielen anderen Thieren und dem Menschen untersucht. Die runden weissen Stellen, auf welchen keine Oeffnungen vorkommen, sind in der Regel von Zotten entblösst; nur selten und ausnahmsweise bemerkt man bei Menschen auf einer oder der andern dieser runden, gegen 1 Linie grossen weissen Stellen Spuren von kurzen Zotten, oder auch zuweilen eine ganz kurze pyramidale, weissere Zuspitzung der flachen Erhabenheit; in der Regel sind diese Stellen ganz eben. Alle Versuche bei Menschen und bei Säugethieren, aus diesen Stellen ein Secret herauszudrücken und ihre Follicularstructur zu erweisen, sind missglückt; auch dringt beim Druck auf diese Stellen nichts aus den rundum stehenden Oeffnungen hervor. Um so auffallender ist es, dass, wenn man die Oberfläche dieser Stellen aufritzt, man zu einer Aushöhlung gelangt, welche den Umfang der weissen Stelle besitzt und ziemlich tief, aber nicht so tief als breit ist; dass in dieser Aushöhlung ein graulichweisser, schleimiger Stoff enthalten ist, der von der ungemein dünnen Decke dieser Stellen eingeschlossen wird. Die Körnchen dieses Stoffes sind feiner als die gewöhnlichen Schleimkörner. Es geht hieraus hervor, dass weit offene Folliculi und Zellen in den Peier'schen Drüsen gar nicht vorkommen; was jene Säckchen sind, bleibt unbekannt. Bei den Thieren sieht man

Digitized by Google

nach dem Abziehen der Mucosa Vertiefungen in der Tunica propria, welche dem Fundus jener Stellen entsprechen. Erst durch Zerstörung der Oberfläche der weissen, porenlosen Stellen entstehen Zellen oder weit offene Folliculi, wie man sie an krankhaft veränderten oder sogenannten Peier'schen Drüsen so häufig und leicht sieht.

Die dritte Schicht der Verdauungswege bildet das contractile Fasergewebe oder die Muskelhaut, die ohne Unterbrechung vom Schlund bis zum After sich fortsetzt und Verlängerungen in die Ausführungsgänge der grossen Drüsen schickt, indem, wie pag. 472. gezeigt worden ist, die Ausführungsgänge dieser Drüsen irritabel sind, und auf Reize und ohne Reize sich zusammenziehen.

Die seröse Haut des Darmkanals gehört dem in der Bauchhöhle gelegenen Theile desselben an und entsteht dadurch, dass der Darmschlauch von aussen so in den Peritonealsack hineingeschoben ist, dass er, wie die Leber und die Milz, zugleich einen Ueberzug von dem Peritoneum erhält, der sich hinter dem Darm von beiden Seiten an einander legt und dadurch das Gekröse oder Aufhängeband des Darms bildet. Das Gekröse kommt an dem grössten Theile des Darmkanals vor, nur das Duodenum hat kein Gekröse. In der frühesten Zeit des Embryolebens hat auch der Magen ein Gekröse, wie ich (Meckel's *Arch.* 1830. *pag.* 395.) gezeigt habe. Durch merkwürdige Veränderungen wird dieses Gekröse des Magens (Mesogastrium) später zum grossen Netz, indem es sich beutelförmig herabsenkt; aber erst im 3—4. Monat des Embryolebens verwächst das grosse Netz mit dem Colon und dem Gekröse desselben (Mesocolon transversum), so dass hierdurch erst jene merkwürdige, sonst unerklärliche Verbindung des Magens mit dem Colon durch das grosse Netz entsteht. Eine Verbindung, die schon bei vielen Säugethieren (Hund, Katze, Igel, Kaninchen, Pferd) fehlt, indem bei diesen das grosse Netz oder Mesogastrium sich in der hintern Unterleibswand inserirt, und von dem Mesocolon transversum ganz verschieden ist. Im Anfange, und zwar in der 4. und 5. Woche des Embryolebens des Menschen, hat der Magen noch eine fast senkrechte Lage, indem die kleine Curvatur nach rechts, die grosse nach links liegt, und der Pylorus nach abwärts gerichtet ist; so ist auch die Befestigung des Magens an die hintere Bauchwand noch eine senkrechte Falte, welche von der Mittellinie der Wirbelsäule ausgeht, sich nach links gegen die grosse Curvatur des senkrechten Magens wendet und sich hier ansetzt, um mit ihren zwei Blättern den Magen zwischen sich zu nehmen, so dass sich das linke Blatt dieser Falte über die vordere, das rechte über die hintere Fläche des Magens umbiegend fortsetzt. An dem obern Theile der kleinen Curvatur treten die Blätter wieder zusammen und bilden vereinigt eine Falte zur Leber.

Diese von der Mittellinie hinten ausgehende doppeltblättrige Falte des Bauchfells, welche sich links wendend die grosse Curvatur des senkrechten Magens erreicht, und diesen zwischen sich

Digitized by Google

nimmt, ist jetzt noch ein wahres Magengekröse, welches ich, so lange es als solches besteht, Mesogastrium nenne.

Da nun der Ausgang dieses Magengekröses jetzt noch in der Mittellinie der hintern Bauchwand ist, das Mesogastrium aber, um die grosse Curvatur des Magens zu erreichen, sich nach links wendet, so entsteht durch dieses Mesogastrium hinter dem Magen ein Beutel von halbmondförmiger Form, und zwar ein Sack, dessen Eingang an dem untern Theil der kleinen Curvatur rechts ist, dessen vordere Wand der Magen selbst, dessen hintere Wand das Mesogastrium ist.

Der Eingang in diesen Beutel des Mesogastrium rechts unter der Leber, unter der Falte, welche von der kleinen Curvatur an die Leber geht, ist noch sehr gross; er ist das spätere Foramen Winslowii. Nach oben wird dieser Eingang etwas bedeckt, dadurch eben, dass das Peritoneum von der spätern Fossa hepatis transversa faltenförmig, als Ligamentum gastrohepaticum zur kleinen Curvatur des Magens tritt, um sich über den Magen in die Blätter des Mesogastrium fortzusetzen.

Indem aber der Magen sehr früh sich platt legt, wird die Richtung des Mesogastrium von der des Mesenterium verschieden; denn das Mesenterium, so lange es noch senkrecht ist, trennt die Bauchhöhle zu seinen Seiten hinten in einen gleichen rechten und linken Theil; das Mesogastrium aber geht zwar auch senkrecht von der Mittellinie aus, tritt aber nach links an die grosse Curvatur des Magens, und bildet, statt auf beiden Seiten des Magens gleiche Räume, vielmehr zu seiner Rechten hinter dem Magen einen blinden Beutel mit rechter Oeffnung, während die der linken Seite des Darms entsprechende Seite des Magens zur vordern geworden ist.

Der hinter dem Magen befindliche Beutel behält seine Form, nur wird der Eingang in diesen Beutel auf der rechten Seite unter der Leber kleiner, je mehr die von der Leber zur kleinen Curvatur gehende Falte des Peritoneum sich herabzieht, der Pylorus aber sich mehr gegen die Leber aufrichtet, und der Magen überhaupt aus seiner senkrechten Lage in eine schiefe übergeht. So lange der Magen senkrecht steht, ist die Ausgangsstelle oder Insertion des Mesogastrium hinten auch senkrecht in der Mittellinie vor der Wirbelsäule, indem es von hier links nach der grossen Curvatur des Magens sich wendet und rechts den beschriebenen Peritonealbeutel lässt. Indem aber die grosse Curvatur allmählig mehr zur untern, die kleinere Curvatur zur obern wird, verändert auch das Mesogastrium allmählig seine Insertion an die hintere Bauchwand, und rückt aus der mittlern senkrechten mehr in eine schiefe Richtung nach links. Zugleich wird der durch das Mesogastrium gebildete Beutel da, wo er mit seinen Lamellen an die grosse Curvatur des Magens tritt, unten etwas verlängert und dieser von dem Magen aus sich verlängernde Theil des Beutels wird etwas runzlig.

Wenn sich nun endlich in der Lagenveränderung des Magens die Insertion des Mesogastrium aus der senkrechten Richtung schief nach links gewendet hat und zuletzt zum Theil quer

Digitized by Google

wird, so rückt der in dem Peritonealbeutel des Mesogastrium und Netzes eingeschlossene Raum ebenfalls immer mehr nach der linken Seite und in die Quere, und es entsteht vollends der obere hintere Peritonealraum hinter dem Magen, während dieser Raum früher ganz zur rechten Seite des beutelförmigen Mesogastrium war.

Noch sind das Mesogastrium oder grosse Netz, und das Mesocolon transversum in keiner Communication als mittelbar durch die hintere Peritonealwand, in welche die Blätter des Mesogastrium und Mesocolon übergehen. Allein je mehr das Colon sich bogenförmig aufstellt und höher gegen den Magen hinaufrückt, der Peritonealbeutel des grossen Netzes oder Mesogastrium aber sich tiefer aussackt, und seine schiefe Insertion in die hintere Peritonealwand herabrückt, kommen sich die Insertion des Mesogastrium oder grossen Netzes und die Insertion des Mesocolon transversum immer näher. Auf diese Art wird das zwischen der Insertion des Mesogastrium oder Netzes und Mesocolon transversum liegende Stück der hintern Peritonealwand immer kleiner und mehr und mehr als Fortsetzung der äussern Lamelle des Netzbeutels herabgezogen, bis der Zwischenraum zwischen der Insertion des Mesogastrium oder grossen Netzes und des Mesocolon transversum gleich Null wird. Diese Annäherung schreitet von rechts nach links vor, weil die Insertion des Mesogastrium eine nach links aufsteigende schiefe Linie ist.

Diese Verwachsung ist zuerst von Meckel entdeckt und von mir bestätigt worden. Zuletzt scheint nun das Netz hinten an das Colon transversum selbst sich zu inseriren. Dann geht die innere Lamelle des Netzbeutels über die obere Seite des Colon transversum in die obere Platte des Mesocolon transversum, und sofort in die hintere obere Peritonealwand über; die äussere Lamelle des Netzbeutels, welche von der vordern Fläche des Magens kommt, scheint dann über die untere Seite des Colon transversum in die untere Platte des Mesocolon überzugehen, obgleich sie nur am Colon transversum verwachsen ist.

Die Bedeutung des Netzes für die Function der Verdauungsorgane kann auf keinen Fall gross seyn, da es schon bei mehrern Säugethieren seine anatomischen Verbindungen aufgiebt und sich als ein blosses schlaffes Band des Magens beweist.

III. Capitel. Von den Bewegungen des Darmkanales.

Die Muskelhaut des Darmkanals gehört zu den von dem Nervus sympathicus abhängigen, unwillkührlich beweglichen Theilen, auf welche das Nervensystem der willkührlichen Bewegungen keinen unmittelbaren, sondern limitirten Einfluss hat, wie er sich in den mannigfaltigen Sympathieen dieses Apparates mit dem Gehirn und Rückenmarke äussert. Nur am Anfange und Ende dieses unwillkührlich beweglichen Apparates ist er mit Muskeln versehen, die dem Cerebrospinalnervensystem unterworfen und willkührlich beweglich sind. Diess sind die Muskeln des Mundes, die Kau- und Schlundmuskeln einerseits und die Aftermuskeln andrerseits. Der

Digitized by Google

Schlund ist noch willkührlich beweglich, die Speiseröhre nicht mehr, obgleich der Nervus vagus beide versieht. Diess sonderbare Factum lässt sich auf doppelte Art erklären, entweder 1. dadurch, dass man annimmt, dass der untere Theil des Nerv. vagus, welcher die Plexus oesophagi bildet, durch die Verbindungen mit dem Nervus sympathicus seinen willkührlichen Einfluss verliert, oder 2. dass man nach der Hypothese von Arnold, Scarpa und Bischoff (*Nervi accessorii anatomia et physiologia. Heidelb.*) annimmt, die motorische Kraft des N. vagus sey diesem überhaupt nicht original eigen, sondern komme ihm von dem Nervus accessorius, während der N. vagus selbst bloss Empfindungsnerve sey, wonach dann die Bewegungsäste des N. vagus, nämlich Nervus pharyngeus und Nervi laryngei von dem N. accessorius ihre motorische Kraft erhielten, der untere Theil des N. vagus aber keine motorische Kraft besässe, womit denn allerdings die Thatsache übereinstimmen würde, dass man nach Magendie's und meinen Versuchen durch auf den N. vagus applicirte Reize durchaus keine Bewegungen des Magens hervorbringen kann. Tiedemann und Gmelin wollen auf mechanische Reize des N. vagus zwar solche beobachtet haben. Ich habe indess diese Versuche zu oft an Säugethieren (Kaninchen, Hunden) und Vögeln angestellt, und muss annehmen, dass in dem Tiedemann'schen Falle ein Beobachtungsfehler stattgefunden habe. Welche jener beiden Hypothesen, von dem verschiedenen Verhalten des N. vagus am Schlunde und an der Speiseröhre, richtig ist, lässt sich bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse noch nicht sicher entscheiden. Man sehe das Nähere über die Physiologie des N. vagus im 3. Buch.

Den Mechanismus des Saugens, Ergreifens und Kauens setze ich als bekannt voraus. Vergl. Treviranus *Biologie. T.* 4. Räthselhaft müssen die inneren Gründe solcher instinktmässigen Handlungen, wie das unmittelbare Saugen der Neugebornen seyn. Es ist hier schwer, sich vorläufig mit Cuvier's Antwort über Instinkt zufrieden zu stellen, dass diese auch noch so jungen Thiere durch einen in ihrem Gehirn sich mit Nothwendigkeit wiederholenden Traum von Bildern zu solchen Handlungen genöthigt sind, eine gleichsam angeborne Idee, welche von ihrer Organisation und ihren Bedürfnissen ausgeht, wie die Gleichung einer Curve alle Eigenschaften der letztern mit sich bringt. Man kann sich indess vorläufig auch mit der Antwort begnügen, dass in dem Sensorium des Säuglings ein unwiderstehlicher Trieb zur Ausführung möglicher Saugbewegungen ist, so dass Säuglinge auch an ihren eigenen Lippen saugen und abgeschnittene Köpfe ganz junger Thiere noch die dargebotenen Finger umfassen, wie Mayer gesehen.

Ausführlicher werden hier nun die Schlingbewegungen, die Bewegungen des Magens, des Wiederkäuens, das Erbrechen und Aufstossen, die Bewegungen der Gedärme und die Ausleerung der Speisereste abgehandelt.

1) *Schlingen.*

Das Schlingen hat drei Akte; in dem ersten passiren die von der Zunge zu einem Bissen gesammelten Theile zwischen der

Oberfläche der Zunge und dem Gaumengewölbe bis hinter die vorderen Bogen des Gaumens, im zweiten Acte gelangt der Bissen bis über die Constrictoren des Schlundes hinaus, im dritten passirt er die Speiseröhre. Diese drei Acte erfolgen überaus schnell hinter einander; der erste wird von den der willkührlichen Bewegung fähigen Muskeln der Zunge unter dem Einflusse der Nervi hypoglossus und glossopharyngeus mit Willkühr ausgeübt, der zweite Act erfolgt zwar unter Mitwirkung von Muskeln, die zum Theil auch der willkührlichen Bewegung fähig sind, wie der oberen und unteren Gaumenmuskeln, ist aber doch eine unwillkührliche Bewegung; denn die Bewegungen zum zweiten Acte des Schlingens erfolgen unwiderstehlich, sobald man durch die Zunge einen Bissen oder Getränk oder Speichel bis an eine gewisse Stelle der Zunge gebracht.

Der dritte Act wird unwillkührlich von Bewegungen ausgeführt, welche auch sonst nicht willkührlich seyn können.

Die Ausführung des zweiten Actes ist eine sehr zusammengesetzte Operation, worüber die Schriftsteller der verschiedensten Meinung sind. Zur Einsicht desselben ist vorzüglich eine richtige Ansicht von den Stellungen der Bogen des Gaumensegels in den verschiedenen Bewegungen desselben nöthig. Der Gaumen hat bekanntlich zwei untere Muskelbogen, den vorderen durch die aus den Musc. glossopalatini gebildeten Schenkel, den hintern durch die aus den Musc. pharyngopalatini gebildeten Schenkel. Die Schenkel des vordern und hintern Bogens weichen jederseits von einander und haben die Mandeln zwischen sich, indem der Schenkel des vordern Bogens sich an die Zunge, der Schenkel des hintern Bogens sich nach hinten und abwärts an den Schlund anschliesst; im Gaumen selbst convergiren jederseits die Schenkel des vordern und hintern Bogens, und daher kann man sich die Uvula als im Mittelpunkt der Convergenz oder als im Mittelpunkt eines von jenen Muskelbogen ausgeführten Kreuzgewölbes denken. Ueber die Wirkung dieser Muskeln hat neuerlich Dzondi (*die Functionen des weichen Gaumens. Halle* 1831.) mehr Licht verbreitet. Die Wirkung des vordern Bogens ist, in Verbindung mit der Zunge, die eines Schliessmuskels, und der vordere Bogen führt mit Recht den Namen Constrictor isthmi faucium. Dieselbe Wirkung äussert auch der hintere Muskelbogen, wenn seine oberen und unteren Insertionspunkte fest sind. Wenn aber das Gaumensegel durch den Musc. tens. veli palatini fixirt ist, wenn die unteren Schenkel sich durch Zusammenziehung des Schlundes selbst einander nähern, so muss die Contraction der Musc. pharyngopalatini bewirken, dass sich die hinteren Bogen des Gaumensegels wie zwei Vorhänge von den Seiten einander nähern und den Durchgang zwischen den hinteren Gaumenbogen zu einem ritzähnlichen Schlitze machen; welcher unten sich erweitert. Dzondi hat nun bewiesen, dass diese Annäherung der Seiten des hintern Gaumenbogens oder des hintern Gaumenvorhangs im Schlingen fast bis zur Berührung erfolgt, und in der That kann man sich überzeugen, wenn man bei untersuchendem Finger zu schlingen versucht, oder wenn man am Spiegel, bei herabgedrückter Zunge Schling-

Digitized by Google

versuche macht, dass diese Annäherung wirklich erfolgt und dass die Musculi pharyngopalatini, durch diese Annäherung, den Weg des Bissens von dem obersten Theil des Rachens und den Choanen mit einem herabhängenden und schief nach hinten und unten geneigten Planum inclinatum absperren. Das Zäpfchen ist hierbei erschlafft und liegt bei der Annäherung der Schenkel des hintern Gaumenvorhangs vor der übrigbleibenden Ritze. Ich habe diese Versuche wiederholt und sie bestätigt gefunden. Es ist also unrichtig, wenn die meisten Schriftsteller behaupten, die Abschliessung der Choanen von dem Schlund geschehe beim Schlingen durch Hinaufziehen des Gaumensegels, eine Bewegung, wodurch überhaupt beide nicht vollkommen von einander abgeschlossen werden können. Bei allen Bewegungen, wo der Nasenkanal von dem Mundkanal excludirt wird, geschieht diess durch die schon beschriebene Bewegung der Annäherung der Schenkel des hintern Gaumenbogens, oder, wie Dzondi sagt, des hintern Gaumenvorhangs.

Der Mechanismus des Schlingens ist demnach, nach Dzondi, folgender. Im ersten Act wird der Bissen durch Anpressen der Zunge an den Gaumen bis hinter die Gegend des vorderen Gaumenbogens gebracht. Im zweiten Act bewirkt die Zunge, indem sie sich nach hinten zurückzieht, und der sich hinter dem Bissen zusammenziehende Muskel des vordern Gaumenbogens oder des Constrictor isthmi faucium, die weitere Bewegung. Die Direction der Bewegung wird bestimmt durch die Wände des Rachens in diesem Moment. Durch die Zurückbiegung der Zungenwurzel wird der Kehldeckel auf den Eingang des Kehlkopfs, der gehoben und nach vorn unter die Wurzel der Zunge geschoben wird, gedrückt, und der Bissen gleitet ohne Gefahr der Stimmritze weiter. Da nun im zweiten Act auch die Annäherung der Schenkel des hintern Gaumenbogens eintritt, so ist der Weg in die Choanen und den obern Theil des Rachens abgesperrt, und der Bissen gleitet von dem Planum inclinatum des hintern Gaumenvorhanges in den ihm angenäherten Schlund, durch dessen Contraction er in die Speiseröhre weiter gelangt. Bei dieser Bewegung sind die Zunge, die Muskeln des vordern und hintern Gaumenbogens und die oberen Muskeln des Gaumensegels (durch Anspannung und Fixation des Gaumensegels) und die Constrictores pharyngis zugleich thätig, während das Gaumensegel weder herabgezogen, noch hinten aufgezogen, sondern nur angespannt und ein wenig gehoben ist. Siehe Dzondi *l. c. Tab. IV.*

In der Speiseröhre, welche keiner willkührlichen Bewegung fähig ist, wird jede erweiterte, den Bissen aufnehmende Stelle von dem Bissen zur Contraction gereizt; diese wellenförmig fortschreitende Contraction erfolgt, wie man namentlich bei Pferden beim Trinken sieht, überaus schnell; nur bei grossen Bissen und zu häufigem Schlingen ist die Bewegung langsam, und man fühlt das schmerzhafte Fortrücken. Der Bissen und das Getränk sind hierbei in jedem Moment von contractilen Wänden eingeschlossen, die sich an den Bissen anlegen. Diess fällt weg, wenn die

Digitized by Google

Speiseröhre bei Sterbenden bereits gelähmt ist, wo das Getränk mit Kollern hindurchfällt.

Die Bewegungen des dritten Actes sind rein unwillkührlich, und werden von Muskelfasern der Speiseröhse ausgeführt, welche keiner Spur willkührlicher Bewegungen fähig sind. Die im zweiten Act thätigen Muskeln sind willkührlicher Bewegungen fähig, wie die Muskeln der Zunge und des Gaumens und Schlundes, und in der That kann man auch ohne Bissen, wenn der Rachen nur feucht ist, willkührlich schlingen (obgleich nicht oft hinter einander). Man kann ferner einen Theil dieser Bewegungen, wie z. B. das Annähern der Schenkel des hintern Gaumenbogens, willkührlich veranlassen, ohne dass es zum Schlingen kommt. Man kann sogar am Spiegel sich überzeugen, dass wir einigen willkührlichen Einfluss auf die Muskeln des Schlundkopfes ausser dem Schlingen haben. Allein wenn mehrere dieser Bewegungen (z. B. die der Zunge und des hintern Gaumenbogens) zu gleicher Zeit willkührlich oder durch Reiz vorgenommen werden, so folgen die Bewegungen der ganzen zum Schlingen gehörigen Muskelgruppe mit den Constrictoren von selbst, und jeder bis an eine gewisse Grenze im Munde gekommene Theil von Getränk, Bissen, Speichel muss unwiderstehlich verschlungen werden.

Das Verschlingen der wahren Schlangen, welche ihre Oberkiefer einigermassen, wie die Hälften des Unterkiefers von einander entfernen können und durch ihre langen, an beweglichen Ossa temporalia aufgehängten Gelenkbeine für den Unterkiefer den Rachen ungeheuer erweitern können, ist, wie Rudolphi richtig bemerkt, ein Herüberziehen der Schlingwerkzeuge über die grosse Beute.

Magendie (*Mémoires sur l'usage de l'épiglotte dans la déglutition. Paris* 1813.) hat bestätigt, was schon Galenus berichtet, dass sich die Stimmritze selbst beim Schlucken schliesst. Er ist aber wohl zu weit gegangen, wenn er glaubt, aus Versuchen an Thieren, die Entfernung des Kehldeckels hebe das Schlingen nicht auf. Wenn man diess auch zugäbe, so ist es eben so gewiss aus den zahlreichen Beobachtungen über Verlust des Kehldeckels durch Kehlkopfschwindsucht und Reichel's Versuche, *de usu epiglottidis. Berol.* 1816., dass das Schlingen hierdurch sehr beschwert wird. Vergl. Rudolphi, *Physiol.* 2. *p.* 378. Lund, *Vivisectionen. Kopenhagen* 1825. *p.* 9. Bei den wallfischartigen Thieren ist der obere, hier schnabelförmige Theil des Kehlkopfs gegen die Nasenhöhlen heraufgezogen. Die Speisen gelangen hier durch den Druck der Zunge zu den Seiten des Kehlkopfes in den Schlundkopf. Den übrigen Thieren, ausser den Säugethieren, fehlt das Gaumensegel und in der Regel auch der Kehldeckel.

2. *Bewegungen der Speiseröhre.*

Magendie hat eine eigenthümliche Beobachtung über die rhythmischen Zusammenziehungen des untersten Theils der Speiseröhre ausser dem Schlingen gemacht, welche ich bestätigt habe. Diese Zusammenziehungen geschehen von oben nach der Cardia hinab und schnell, dauern ungefähr 30 Secunden und nach Ma-

Digitized by Google

GENDIE um so länger (bis 10 Minuten), je voller der Magen ist. Die Zusammenziehung geht, nach meiner Beobachtung, allmählig in Erschlaffung über, worauf wieder die Zusammenziehung folgt. MAGENDIE konnte zur Zeit der letztern nichts vom Contentum des Magens in die Speiseröhre treiben, während bei der Erweiterung die Flüssigkeiten durch ihre blosse Schwere hineinglitten. Was auf diese Art in die Speiseröhre gelangte, wurde entweder (obgleich nur selten) ausgeworfen oder (gewöhnlich) durch die Zusammenziehungen der Speiseröhre in den Magen wieder zurückgetrieben. Man darf sich daher die Cardia nicht jederzeit gleich stark geschlossen denken; bei Dyspepsie scheint die Erschlaffung noch häufiger zu seyn, und es ist hieraus die Eructation, das Aufstossen von Luft und Speisen erklärlich, sey es, dass die Zusammenziehungen des Magens im Moment der Oeffnung der Cardia den Inhalt hervortreiben oder die mit der Zusammenziehung des Zwerchfells erfolgte Verkleinerung der Bauchhöhle einen Druck auf den Magen anbringt.

MAGENDIE's, LEGALLOIS's und BECLARD's Versuche haben gezeigt, dass die Speiseröhre beim Erbrechen in einer dem Schlingen entgegengesetzten antiperistaltischen Bewegung ist. Bei dem Erbrechen, welches durch Einspritzen von Brechweinstein in die Venen erfolgt, sahen sie die Bewegungen der Speiseröhre, auch nachdem sie vom Magen getrennt worden. LUND l. c. p. 15.

3) *Bewegungen des Magens.*

So energisch die Zusammenziehungen der starken Magenmuskeln bei den körnerfressenden Vögeln seyn müssen, so gewiss die mechanische Gewalt in dem mit Zähnen bewaffneten Magen vieler Crustaceen und Orthopteren unter den Insekten wirkt, so schwach sind die Bewegungen des membranösen Magens im gesunden Zustande. Man sieht zwar bei Vivisectionen von Hunden, Kaninchen, dass die Magenwände nicht schlaff den Mageninhalt umschliessen, aber der Magen zeigt den auffallendsten Contrast gegen die unaufhörlichen peristaltischen Bewegungen der Gedärme, die sie besonders auf den Reiz der atmosphärischen Luft annehmen. Bei den Wiederkäuern, wo sich öfter aus verschluckten Haaren Haarbälle bilden, welche deutliche Spuren einer drehenden oder Cirkelbewegung zeigen, muss die Bewegung des Magens stärker seyn.

Die Reizung des N. vagus durch Galvanismus, bei Kaninchen, Hunden und fleischfressenden Vögeln, scheint gar keinen Einfluss auf den Magen zu äussern, eben so wenig, wie die Reize des Ganglion coeliacum bei Kaninchen. Nur Reize auf den Magen selbst angewendet, bewirken sogleich Zusammenziehung.

Es geht hieraus hervor, wie sehr sich diejenigen täuschen, welche bei der Zerkleinerung der Speisen auf die Bewegungen des Magens viel rechnen. Die peristaltischen Bewegungen des Magens habe ich nie deutlich gesehen, ich beschreibe sie daher nach MAGENDIE, *Préc. élément. de physiol.* 2. *ed.* 2. *p.* 87. In der ersten Zeit der Verdauung bleibt der Magen gleichförmig ausgedehnt, später zieht sich die Portio pylorica in ihrer ganzen Ausdehnung zusammen, wo sich die in Speisebrei verwandelten Nahrungsmittel

Digitized by Google

anhäufen, während die weniger alterirten Stoffe in der Portio splenica sich befinden. Die peristaltischen Bewegungen, die sich nach Magendie auch nach Durchschneidung der N. vagi fortsetzen, sind folgende. Nachdem der Magen einige Zeit unbeweglich gewesen, zieht sich der Anfang des Duodenums zusammen, ebenso der Pylorus und die Portio pylorica; diese Bewegung treibt den Chymus gegen den Fundus. Darauf dehnt sich der Magen wieder aus und nun contrahirt sich die Portio pylorica von der linken zur rechten und treibt den Chymus gegen das Duodenum, wo er durch den Pylorus durchgeht, wenn die Speisen die gehörige Auflösung im Magen erlitten haben. Diese Bewegungen wiederholen sich einige Mal, darauf hören sie auf, um sich nach einer bestimmten Zeit zu wiederholen. Ist der Magen voll, so beschränkt sich die Bewegung auf die dem Pylorus zunächst gelegene Partie, in dem Maass als er sich entleert, dehnt sich die Bewegung aus und zeigt sich auch in der Portio splenica, wenn der Magen fast leer ist.

Schultz (*de alimentorum concoctione. Berol.* 1834.) nimmt an, dass die Bewegung des Magens bei Thieren mit stärkerem Fundus so stattfinde, dass die Speisen innerhalb der beiden Curvaturen Cirkel beschreiben, wie beim Kaninchen und beim Pferd, während bei den reissenden Thieren mit geringerm Fundus die Speisen abwechselnd gegen den Pylorus hin und wieder zurückgetrieben werden; daher sollen die ersteren Thiere schwer, die letzteren leichter brechen.

Beaumont hat die Bewegungen des Magens an einem Menschen beobachtet, der von einer Schusswunde ein ansehnliches Loch im Magen behielt, dessen Ränder mit den Bauchwänden verwachsen waren. W. Beaumont *experiments and observations on the gastric juice and the physiology of digestion. Boston* 1834.

Ausser der Verdauung ist der Magen zusammengezogen. Sobald die Speisen in den Magen getreten, bewegen sie sich aus dem Fundus von links nach rechts entlang der grossen Curvatur, dann entlang der kleinen Curvatur von rechts nach links. Diese Bewegungen sah er auch an den Ortsveränderungen, welche die Kugel des in den Magen gebrachten Thermometers erlitt. Die Umwälzungen sind in 1—3 Minuten vollendet. Sie nehmen mit dem Fortschritt der Chymification an Schnelligkeit zu.

Nach Beaumont finden in der Portio pylorica am Anfang des conischen Theils derselben 3—4 Zoll von dem dünnen Ende eigenthümliche Contractionen und Relaxationen statt; der an diese Stelle gebrachte Bulbus des Thermometers wurde von Zeit zu Zeit festgehalten und 3—4 Zoll weit gegen den Pylorus hingezogen. A. a. O. p. 113.

Im Anfang der Verdauung scheint der Pylorus ganz verschlossen. Die Verschliessung des Pylorus kann so stark seyn, dass nach Wepfer, Tiedemann und Gmelin selbst aus dem ausgeschnittenen Magen nichts entweicht. Nach Abernethy gehen beim Menschen anfangs nicht einmal leicht Getränke durch den Pylorus, er fand bei einer Person, die sich durch Opium vergiftet und der man während des Lebens viel Flüssigkeit einge-

Digitized by Google

flösst hatte, alle Flüssigkeit nach dem Tode noch im Magen. Nach Magendie wird durch den Magen schon der grösste Theil der Flüssigkeit aufgesogen; doch soll beim Pferde das Wasser schnell durch den Pylorus durchgehen und bis in das geraumige Coecum gelangen, so wie auch das Futter zum Theil unaufgelöst schon durch den Pylorus durchgeht. Coleman liess ein Pferd viel Wasser trinken; nach 6 Minuten fand man das Wasser schon durch den Pylorus und die dünnen Gedärme bis in das Coecum gelangt. Abernethy *physiol. Lect.* 180. Gegen das Ende der Verdauung scheint der Pylorus dem Andrängen eine schwächere Resistenz entgegenzusetzen; dann bekanntlich öffnet er sich auch für unverdaute Dinge, wie Kirschkerne und andere grössere Körper. Home's Meinung von einer mittlern Einschnürung des Magens während der Verdauung ist nicht bewiesen. Tiedemann hat nichts davon bei Hunden gesehen, ich auch nicht.

4) *Wiederkäuen.*

Bei den wiederkäuenden Thieren führt die Speiseröhre unmittelbar zugleich in den ersten (Pansen) und zweiten Magen (Haube). Die Speiseröhre setzt sich aber durch einen Halbkanal in den dritten Magen fort. Nach Flourens neuen Beobachtungen am Schafe (*Revue encyclopédique Paris, Nov.* 1831. *pag.* 542.) gelangt das Futter beim ersten Verschlingen, gleichviel ob Gras, Hafer, Rüben, in den ersten und zweiten Magen zugleich. Als man einem Schaf einen Brei von gekäuten Rüben gab, drang diese feinere Masse in die beiden ersten Magen, und ein kleiner Theil auch in den dritten Magen. Aus dem ersten und zweiten Magen gelangen die vorläufig dort von dem Speichel und den Absonderungen dieser Mägen erweichten Speisen durch eine Art Eructation wieder in den Mund, und werden zum zweiten Mal gekäut, worauf sie wieder verschluckt werden. Was nach der zweiten Deglutition geschieht, hat nun Flourens so auszumitteln gesucht, dass er an verschiedenen Thieren einen Anus contra naturam an den verschiedenen Mägen anlegte. Die Oeffnung, welche er schliessen konnte, erlaubte ihm zu beobachten, was in dem Magen vorging. Beim Verschlingen nach der Rumination gelangt ein Theil des Wiedergekäuten zwar auch noch in den Pansen und in die Haube, aber ein grosser Theil folgte der Halbrinne der Speiseröhre und in den dritten Magen. Flourens erklärt den verschiedenen Weg der Speisen nach der ersten und zweiten Deglutition auf folgende Art. Bei der ersten Deglutition ist der Bissen voluminös, er erweitert die Speiseröhre (auf Kosten jenes Halbkanals), und gelangt nothwendig in den ersten Magen. Beim zweiten Schlingen sind die Speisen weich und folgen ohne Ausdehnung der Speiseröhre der ihnen sich anweisenden Rinne, wobei jedoch auch wieder ein kleiner Theil in den ersten Magen gelangen kann. Wenn die von Magendie und mir bei Thieren beobachteten rhythmischen, sich wiederholenden und eine geraume Zeit anhaltenden Zusammenziehungen des untern Theils der Speiseröhre auch bei den Wiederkäuern stattfinden, so müssen sie die Lefzen des Halbkanals, der in den dritten Magen führt, zu einem ganzen Kanal formiren, in welchen alles

Digitized by Google

fein Zertheilte eindringt, der aber von voluminösen Bissen (bei der ersten Deglutition) ausgedehnt werden muss. Vergl. Bertnold, *Beiträge zur Anat., Zootomie und Physiol. Gött.* 1831.

In Hinsicht des Erbrechens fand Flourens, dass während die beiden ersten Mägen leicht die Speisen zum Wiederkäuen austreiben, der vierte Magen, durch welche das Erbrechen stattfindet, ausserordentlich schwer zu dieser Bewegung bestimmt wird. *Mém. de l'acad. des sc. T.* 12.

5) *Erbrechen.*

Das Erbrechen ist eine mit Ekel verbundene antiperistaltische Bewegung des Magens (zuweilen auch eines Theils des Darms) und der Speiseröhre, begleitet von heftigen Zusammenziehungen der Bauchmuskeln und des Zwerchfells, welche erregt werden kann durch jede auf den Schlund, die Speiseröhre, den Magen, den Darmkanal unmittelbar, oder mittelbar durch die Nerven dieser Theile einwirkende starke Reizung, oder welche selbst erfolgt, wenn die Reize dieser Theile in den Kreislauf von andern Orten aus eingeführt werden. So entsteht das Erbrechen durch mechanische Reizung des Schlundkopfes mit einer Feder, mit dem Finger, ja selbst durch einen Bissen, der im Schlunde zu lange verweilt, durch alle Mittel, welche den Magen mechanisch oder chemisch reizen, durch Entzündung desselben und des Darmkanals, durch eingeklemmte Brüche und Intussusceptionen des Darmkanals, durch Reizung des Gehirns und Unterbrechung des Hirneinflusses nach Durchschneidung oder Unterbindung der Nervi vagi, zuweilen selbst durch die beim Husten sich associirenden Bewegungen; ferner bei Kopfverletzungen, endlich durch Einflössen von Tarturus emeticus in die Venen. Alle Reize, welche, in geringem Grade örtlich applicirt, die peristaltischen Bewegungen der gereizten Theile befördern, machen in heftigem Grade der Wirkung dieselben Bewegungen antiperistaltisch, und bewirken durch Consensus der Nerven auch die Bewegungen der übrigen zum Erbrechen concurrirenden, nicht primär gereizten Theile. Nach Dzondi ist die Stellung des hintern Gaumenbogens im Erbrechen dieselbe, wie im Schlingen, und indem die Schenkel des hintern Gaumenbogens sich einander nähern und ein Planum inclinatum vom Gaumensegel bis zur hintern Wand des Schlundes bilden, der hintere Gaumenbogen aber mehr aufgezogen wird und das Zäpfchen durch die Wirkung seines Muskels sich verkürzt, ist der Weg bezeichnet, durch welchen das Erbrochene in den Mund gelangt und die Nase vermeidet, welches letztere freilich nicht immer geschieht, da die unteren, auch bei den Annäherungen seitlich auseinander weichenden Schenkel des hintern Gaumenbogens den Eingang vom untern Theil des Schlundes in die Choannen erleichtern. Die reissenden Thiere brechen leicht, das Pferd sehr schwer.

Magendie hat den früher von Bayle, Chirac, Senac und J. Hunter angeregten, von Haller aber widerlegten Zweifel über den Antheil des Magens am Erbrechen wieder vorgebracht, und behauptet, dass der Magen dabei völlig unthätig sey, und das Erbrechen allein aus Zusammendrückung des Ma-

Digitized by Google

gens vermöge der Verkleinerung der Bauchhöhle durch die Zusammenziehung des Zwerchfells und der Bauchmuskeln entstehe. Magendie beobachtete bei Hunden, denen er Brechmittel durch Einspritzen in die Venen oder im Magen beigebracht, niemals Zusammenziehungen am Magen. Zog er denselben aus der Bauchhöhle heraus, so erfolgte kein Erbrechen, sobald er aber den Magen in die Bauchhöhle zurückbrachte, erfolgte es. Ein Druck mit der Hand ersetzte die Bauchmuskeln; zerschnitt er die letzteren, so bewirkte das Zwerchfell noch Erbrechen, in Verbindung mit der weissen Linie. Die Durchschneidung der Zwerchfellsnerven hob das Erbrechen auf. Ersetzte er den Magen durch eine an die Speiseröhre angebundene Schweinsblase, so erfolgte das Erbrechen aus denselben Ursachen, wie bei dem unverletzten Magen. Maingault's Widersprüche gegen diese Behauptungen, welcher nach Durchschneidung des Zwerchfells und der Bauchmuskeln Erbrechen sah, veranlassten weitere Untersuchungen. Das Comité der Academie fand, dass ohne äussern Druck auf den Magen kein Erbrechen stattfindet; dieser Druck kann aber sehr gering seyn, und Flüssigkeiten können nach durchschnittenen Bauchmuskeln und Lähmung des Zwerchfells durch blosse Annäherung der untersten Rippen zu der Regio epigastrica in die Speiseröhre getrieben werden; im Magen selbst entdeckten sie, ausser den vom Erbrechen unabhängigen (?) cirkelförmigen Zusammenziehungen in der Gegend des Pförtners, keine Bewegung, dahingegen Rudolphi solche Bewegung auch nach Durchschneidung der Bauchmuskeln gesehen hat. Ueber die den Gegenstand nicht wesentlich aufklärenden, weiteren Versuche von Portal, Bourdon, Beclard, Merat gegen Magendie, und Rostan, Piedagnel, Gondret für denselben, kann man das angeführte Werk von Lund nachsehen. Magendie's Versuch mit der Blase beweist wohl nicht viel, und Rudolphi bemerkt mit Recht, dass durch Einspritzung von Brechweinstein in die Venen antiperistaltische Bewegungen in der Speiseröhre entstehen müssen, welche den Inhalt der Blase, der ohnehin nur zum kleinsten Theil ausgeworfen würde, hinaufziehen konnen. Dieser Versuch verliert aber alle Beweiskraft, wenn man bedenkt, dass die Ursache, warum überhaupt der Mageninhalt nicht in die Speiseröhre auslaufen kann, die beschriebene Zusammenziehung der Speiseröhre an der Cardia, bei dem Durchschneiden der Speiseröhre an dieser Stelle aufhören musste, jede Flüssigkeit also ausfliessen konnte bei der geringsten Veranlassung. Ein wichtiger Umstand, der bisher nicht gewürdigt worden, ist eine Art von unmerklicher Zusammenziehung des ganzen Magens, wo er in seinem Volumen im Ganzen kleiner wird, ohne dass man an einzelnen Theilen Contraction sieht. Diess habe ich oft ausser dem Erbrechen beobachtet. Mir scheint die Contraction des Magens im Erbrechen unzweifelhaft, da man deutlich die Zusammenziehung des Magens dabei fühlt, obgleich man im Allgemeinen den Antheil des Magens dabei viel zu gross angeschlagen hat, der beim Erbrechen von unmittelbarem Reiz des Magens die Reizung sympathisch auf andere Muskeln, namentlich die Bauchmuskeln

Digitized by Google

und das Zwerchfell, fortpflanzen kann. Diess Letztere ist keine Vermuthung mehr; denn ich habe mehrmal die Beobachtung gemacht, dass die mit der Nadel bewirkte Zerrung des N. splanchnicus in der Bauchhöhle, wo er bei Kaninchen auf der linken Seite an der innern Seite der Nebenniere ziemlich leicht zu finden ist, Zusammenziehungen der Bauchmuskeln veranlasst. (Beim Hunde ist diess nicht gelungen.) Da nun der Nervus splanchnicus die Verbindung zwischen dem Nervus sympathicus und dem Ganglion coeliacum bewirkt, der Nervus sympathicus aber wieder mit den Spinalnerven, und durch sie mit dem Rückenmark zusammenhängt, so folgt, dass Reizung des Nervus splanchnicus mit Vermittelung des Rückenmarks die Spinalnerven der Bauchmuskeln reizen kann, und dadurch in Reizungen des Magens durch Vermittelung des G. coeliacum und des Nervus splanchnicus Zuckungen der Bauchmuskeln sympathisch entstehen müssen. Diese Beobachtung macht mir Magendie's Theorie von der Wirkung der Brechmittel unwahrscheinlich. Er nimmt nämlich an, dass die Brechmittel in den Magen eingeflösst auch erst ins Blut aufgenommen werden, und von dort aus die beim Brechen concurrirenden Organe afficiren, wie beim Erbrechen, welches durch Einspritzung von Brechweinsteinlösung in anderen Theilen und in die Venen entsteht. Wenn der Nervus splanchnicus Zukkungen der Bauchmuskeln erregen kann, so ist es fast erwiesen, dass das Erbrechen von Einnehmen des Brechmittels durch Propagation der Nervenreizung erfolgt, wie denn eine andere Erklärung auch unmöglich beim Erbrechen von mechanischer Reizung des Magens, von mechanischer Reizung des Darms, von Magen- und Darmentzündung, von mechanischer Reizung des Schlundes stattfinden kann. Siehe übrigens Magendie *memoire concernant l'influence de l'émetique etc. nouv. bull. de la soc. philom. T. 3. p.* 360.

Wenn es nun sehr wahrscheinlich ist, dass in den Magen gelangte Brechmittel schon von dort aus, und nicht indem sie ins Blut gelangen, durch Nervenconsensus die Erbrechungsbewegungen erregen, und wenn diess von dem Erbrechen, das durch mechanische Reize in den Verdauungswerkzeugen, durch Darm- und Magenentzündung erregt wird, gewiss ist, so entsteht nun die Frage, ob der Magen und Darm, indem sie Erbrechen erregen, mehr durch den Nervus vagus auf das Gehirn, oder durch den N. splanchnicus und sympathicus auf Gehirn und Rückenmark den Eindruck fortpflanzen, worauf die weiteren Hülfsbewegungen des Erbrechens durch Wirkung der Spinalnerven auf die Bauchmuskeln und das Zwerchfell vom Gehirn und Rückenmarke aus erfolgen. Die genannte Beobachtung über die Fähigkeit des Nervus splanchnicus, Zuckungen der Bauchmuskeln zu erregen, beweist den Antheil des N. splanchnicus an jener Transmission. Das Erbrechen von Reiz des Schlundes, in dem sich vorzüglich Aeste des N. vagus verzweigen, beweist den Antheil des N. vagus an jener Transmission, und so ist allerdings wahrscheinlich, dass N. splanchnicus und vagus zugleich bei der Wirkung der Brechreize im Magen und Darm die Transmission des Reizes bewirken.

Digitized by Google

Das Erbrechen von Durchschneidung und Unterbindung des N. vagus (Mayer in Tiedemann's *Zeitschrift* 2. 62.) ist auf dieselbe Art zu erklären. Die Unterbindung und auch die mit der Durchschneidung des N. vagus verbundene Quetschung wirkt auf das Gehirn, und da die Enden der durchschnittenen Nerven nothwendig in Entzündung gerathen müssen, so ist der Eindruck des Hirnstücks vom N. vagus auf das Gehirn derselbe, als ob die Endzweige des N. vagus im Magen in der Magenentzündung gereizt werden, und es erfolgt in beiden Fällen dasselbe Phänomen, Erbrechen. Auch die Durchschneidung anderer Nerven bewirkt zuweilen Erbrechen mit anderen Nervenzufällen, wie die Durchschneidung des Sehnerven bei der Exstirpatio bulbi oculi.

Dass die Transmission des Eindrucks durch den N. vagus Antheil am Erbrechen habe, macht Brachet (*Recherches sur les fonctions du système ganglionaire*) daraus wahrscheinlich: „Quelque soit le dose que vous administriez les vomitifs et les purgatifs dans les chiens, à qui vous avez fait la section des nerfs vagues, leur impression devient nulle.“ Diess steht freilich mit der Erfahrung im Widerspruch, dass Hunde nach dem Durchschneiden des N. vagus von selbst vomiren.

Bei dem Erbrechen von Gehirnaffection wirkt die Reizung theils unmittelbar auf den Magen, theils durch Mitaffection des Rückenmarks auf die Spinalnerven und Zwerchfell und Bauchmuskeln. Gewöhnlich stellt man sich vor, dass der N. vagus, von Gehirnaffection gereizt, Contraction des Magens bewirkt. Diess ist schwer zu glauben, denn wie deutlich die Zusammenziehungen der Speiseröhre sind, die man durch mechanischen und galvanischen Reiz des N. vagus bewirken kann, so ist es mir doch in den vielfältigsten Versuchen mit Kaninchen, fleischfressenden und körnerfressenden Vögeln nie gelungen, durch die stärksten mechanischen Reize, und selbst die einer sehr starken Säule auf den isolirten N. vagus auch nur eine irgend deutliche Zusammenziehung des Magens zu erregen. Selbst der dicke Muskelmagen der Hühner contrahirt sich hierbei durchaus nicht. Dagegen zieht sich der Magen sogleich bei Säugethieren und Vögeln zusammen, wenn man ihn selbst reizt. Aehnliche Beobachtungen haben Magendie und Mayo gemacht. Die Bewegungen des Magens scheinen fast allein vom N. sympathicus abhängig, wie die des Darms. Beide können sich ausgeschnitten noch peristaltisch bewegen, wie Weber vom Magen und Andere vom Darm sahen.

Nun entsteht immer noch die Frage, auf welche Art Brechmittel wirken, die ins Blut gelangen, ohne erst in den Magen eingeflösst zu seyn. Diess ist nicht ganz klar, oder vielmehr wir besitzen keine hinreichenden Thatsachen, diese Frage bestimmt zu entscheiden. Im Grunde ist es einerlei, ob ein Reiz an der äussern Fläche der Organe, oder noch unmittelbarer durch das Blut im Parenchym eines Organes wirkt, wie denn auch Arsenik von anderen Theilen aus Magenentzündung erregt. Hiernach scheint es,

Digitized by Google

dass der ins Blut gekommene Brechweinstein von den Blutgefässen aus auf die beim Erbrechen betheiligten Organe wirke. Allein es ist immer noch zweifelhaft, ob er mehr auf die organischen Excitatoren der Bewegungen, Gehirn, Rückenmark und Nerven, oder unmittelbar auf die beweglichen Organe selbst wirkt.

6) *Bewegung des Darms.*

Die wurmförmigen oder peristaltischen Bewegungen des Darms, ebenso unwillkührlich wie die des Magens, scheinen während des Lebens schwach, und sind nur in nervöser Reizung, die sich auf die Gedärme fortpflanzt, in der Dyspepsie und in krampfhaften Bewegungen, namentlich bei einer Reizung und im Durchfall schneller; bei eben geöffneten Thieren sind sie sehr unmerklich, sie verstärken sich aber schnell durch den Reiz der Luft zu einem ausserordentlichen Grade von Lebhaftigkeit; die Därme heben und senken sich, treiben ihren Inhalt weiter und im Allgemeinen immer mehr nach abwärts. Reizt man den Darm mechanisch, chemisch, galvanisch, so zieht er sich an dieser Stelle allmählig sehr eng zusammen, der höchste Grad von Zusammenziehung erfolgt, wenn der Reiz schon aufgehört hat, und lässt allmählig ebenso wieder ab. Wendet man starke galvanische Reize auf den auf einer Glasplatte isolirten Nervus splanchnicus oder auf das Ganglion coeliacum an, so verstärken sich die Bewegungen allgemein; Durchschneidung der Nervi vagi hebt diese Bewegungen so wenig als Verletzung der sympathischen Nerven auf, sie dauern an dem abgeschnittenen Darmkanal fort.

Auf dem Wege durch den Darmkanal verliert der Darminhalt durch Resorption allmählig immer mehr nahrhafte Theile, und es werden die Reste als Excremente im Dickdarm immer consistenter. Der Schliessmuskel des Afters ist zu jeder Zeit ausser den Kothausleerungen contrahirt. Einen geringen Grad beständiger Contraction scheint derselbe mit allen Muskeln gemein zu haben, die man wenigstens dann erst erkennt, wenn ihre Antagonisten durchschnitten sind. Die Contraction des Sphincters ist aber besonders durch die Ansammlung des Koths und dessen Reiz im Mastdarm vermehrt; sie dauert so lange, bis sie durch den Andrang der Excremente überwunden wird; die Contractionen des Sphincters sind der willkührlichen Verstärkung, aber nicht der willkührlichen Erschlaffung fähig. Die Expulsion der Excremente, und die den Widerstand des Sphincters überwindende Gewalt kann in seltenen Fällen bei weichen Excrementen ohne Mitwirkung der Bauchwände durch blosse (unwillkührliche) Contraction des Mastdarms erfolgen; wie Legallois und Beclard (*Bull. de la fac. et de la soc. de med.* 1813. *N.* 10.) nach Wegnahme der Bauchmuskeln gesehen haben wollen. Gewöhnlich sind indess die Zusammenziehungen des Zwerchfells und der Muskeln durch Einengung der Bauchhöhle mit Erhebung des willkührlich beweglichen Levator ani zur Kothentleerung nöthig. Alle diese Bewegungen willkührlicher Muskeln treten auch unwillkührlich und krampfhaft so gut wie beim Erbrechen ein, wenn der Reiz der Excremente auf den Mastdarm anhaltend und sehr heftig ist.

Jene Bewegungen können auch durch Verletzungen und Krank-

Digitized by Google

heiten des Rückenmarks (und Gehirns) gelähmt seyn, und es kann, je nachdem mehr der Sphincter ani erschlafft, oder der Mastdarm und die Bauchmuskeln gelähmt sind, unwillkührlicher Abgang oder beständige Verstopfung entstehen. Nach KRIMER ist die Kothentleerung nach Zerschneidung der Nervi phrenici und Lähmung des Zwerchfells nicht aufgehoben, wohl aber nach Zerschneidung der Bauchmuskeln oder des Rückenmarks bei Hunden, zwischen dem 5—6. Rückenwirbel.

IV. Capitel. Von den Verdauungssäften.

a. Speichel. Die Absonderung des Speichels scheint in der Thierwelt mit Ausnahme der Wallfische und Fische fast allgemein zu seyn. Die Insekten besitzen speichelabsondernde Schläuche, Blinddärmchen oder Röhren, die Mollusken ein oder mehrere Paar zusammengesetzte Speicheldrüsen. Viele Schlangen haben bloss einfache Speicheldrüsen. Mit der Speichelabsonderung, muss man die Giftabsonderung der Schlangen nicht verwechseln; denn die Giftschlangen haben ausser den gewöhnlichen Speicheldrüsen auch noch die besonderen Giftdrüsen. Ob die giftigen Säfte der Schlangen (auch der Spinnen) zur Auflösung der Speisen beitragen, ist noch unbekannt. Die Analogie, die man zwischen diesen Säften und dem giftigen Speichel der Hundswuthkranken gezogen hat, ist aber wohl abergläubisch; denn in der Hundswuth ist die Ansteckung durch den Speichel nur zufällig, und nach den Versuchen von HERTWIG in der Thierarzneischule zu Berlin können andere Säfte der Hundswuthkranken, wenigstens Blut, eingeimpft die Wuth erzeugen. Hiermit fällt auch die Hindeutung auf die giftige Beschaffenheit, welche der Speichel durch Leidenschaft erlangen soll, weg. Die materiellen Veränderungen in Leidenschaften sind allgemeine, und betreffen zugleich mehrere Absonderungen, wie besonders von der Milch bekannt ist. Dass Bisswunden gereizter Thiere sich von gewöhnlichen gerissenen Wunden unterscheiden, davon ist der Beweis noch zu führen *).

*) Das Schlangengift ist nach FONTANA weder alkalisch noch sauer, es ist gelblich, ohne bestimmten Geschmack, es sinkt im Wasser zu Boden und mischt sich nicht leicht mit demselben. In Wunden gebracht macht es das Blut der lebenden Thiere schnell gerinnen, aus der Ader gelassenes Blut verliert nach FONTANA durch Zusatz von Viperngift seine Gerinnbarkeit. Das Viperngift ist weder für die Vipern noch für andere Schlangen tödtlich, wenn sie gebissen werden. FONTANA *über das Viperngift. Berlin* 1787, *p.* 15. Dagegen sah RENGGER Klapperschlangen mit von Klapperschlangen vergifteten Wunden bald sterben. Viperngift tödtet nicht die gebissenen Blutegel, Blindschleichen, für die Schildkröten ist das Gift nur zuweilen tödtlich, allen warmblütigen Thieren ist es tödtlich, wenn es in Wunden gebracht wird. Ausser den Wunden scheint das Gift nicht tödtlich zu wirken, wie wenigstens REDI's, MANGILI's und POMMER's Versuche lehren. Ueber die Wirkungen des Schlangengifts auf lebende Thiere siehe FONTANA *l. c.* und RENGGER, MECK. *Archiv* 1829. *p.* 271. Die gewöhnlichsten Erscheinungen sind äusserste Kraftlosigkeit, Schwindel, Erbrechen, Durchfall, Zittern, Lähmung, die gebissenen Glieder schwellen

Digitized by Google

Ueber die Quantität des Speichels hat Dr. C. G. Mitscherlich bei einem Menschen mit einer Speichelfistel des Ductus Stenonianus Beobachtungen mitgetheilt. Die Ausscheidung hört bei vollkommener Ruhe der Kaumuskeln und der Zunge, und bei Mangel eines ungewöhnlichen Nervenreizes auf; unter den entgegengesetzten Umständen wird sie hervorgerufen. Die Menge des abgesonderten Speichels beträgt bei einem gesunden Manne in 24 Stunden aus einer Parotis 65 bis 95 Grammen, der aus dem Mund ausgeworfene Speichel von den 5 anderen Drüsen beträgt 6 Mal mehr als der Speichel einer Parotis. Mitscherlich *über den Speichel des Menschen.* Rust's *Mag.* 1832. Schultz (*de alimentorum concoctione. Berol.* 1834.) sammelte aus dem Ductus Stenonianus eines Pferdes in 24 Stunden 55 Unzen und 7 Drachmen Speichel, wovon 12 Unzen auf die innerhalb 2 Stunden erfolgte erste Fütterung, 10 Unzen 9 Drachmen auf die Zeit von 3 Stunden zwischen der ersten und zweiten Mahlzeit kommen.

Ueber die chemische Natur des Speichels von Menschen und Säugethieren besitzen wir ausgezeichnete Arbeiten von Berzelius (*Thierchemie*), Gmelin (Tiedemann und Gmelin *die Verdauung nach Versuchen. Heidelb.* 1826.) und Mitscherlich (*a. a. O.*).

Der Mundspeichel ist ein fadenziehendes Gemeng von Speichel und Schleim. In einem hohen schmalen Gefäss gesammelt, trennt er sich nach Berzelius allmählig in eine obere, klare, farblose und eine untere Schicht, welche ein Gemenge derselben Flüssigkeit und einer weissen undurchsichtigen Masse ist. Mit Wasser verdünnter und geschüttelter Speichel lässt den Schleim vollständiger zu Boden fallen. In Hinsicht der sauren oder alkalischen Reaction ist der Speichel sich nicht gleich. Tiedemann und Gmelin fanden ihn bei Menschen meist schwach alkalisch, zuweilen neutral, nie sauer. Schultze (*vergl. Anat.*) fand ihn beim Menschen sauer, wenn er lange in der Mundhöhle verweilt hatte, alkalisch immer bei Kindern. Speichel von Hunden und Schafen aus dem Stenon'schen Gang selbst aufgefangen fand Gmelin alkalisch. C. H. Schultz fand den Speichel des Menschen in der Regel alkalisch, so zwar, dass eine Drachme Speichel zur Saturation einen Tropfen Weinessig erforderte. Auch der Speichel des Pferdes war alkalisch. Nach der Saturation soll der Speichel allmählig wieder alkalisch werden. Dr. Mitscherlich fand den Speichel einer Speichelfistel während des Essens und Trinkens, und schon nach dem ersten Bissen, alkalisch, ausser dieser Zeit sauer. Die Alkalescenz des Speichels soll nach Schultz von Ammonium herrühren; nach Mitscherlich dagegen giebt der frische Speichel auch beim Erwärmen kein Ammoniak, und das freie Alkali ist fix.

Der Speichel enthält sehr sparsame Körnchen, wie Leuwenhoek,

---

häufig, aber nicht immer auf, und die Wunde wird unterlaufen. Diese Symptome treten schon nach einigen Minuten ein, der Tod erfolgt schnell oder innerhalb eines Tages, oder innerhalb 14 Tage. Bei der Section zeigen sich brandartige Flecke in verschiedenen Eingeweiden. Die Erzählungen von Bannen der Thiere durch den Blick der Schlangen sind Fabeln.

Digitized by Google

Weber, Tiedemann und ich gesehen; sie sind durchsichtig und nach Weber grösser als Blutkügelchen. Nach Berzelius enthält der Speichel des Menschen ohngefähr 1 Proc. von aufgelösten Stoffen. Der Speichel hatte in Mitscherlich's Versuchen ein specifisches Gewicht von 1,0061—1,0088; in Schultz's Versuchen hatte der Pferdespeichel ein specifisches Gewicht von 1,0125. Der Rückstand des Speichels nach dem Abtrocknen ist durchsichtig. Alkohol zieht daraus eine kleine Menge Osmazom mit etwas Chlornatrium, Chlorkalium und milchsaurem Alkali aus. Der in Alkohol ungelöste Theil ist schwach alkalisch und enthält Natron. Der ausgezogene Rückstand besteht nun aus einem Gemeng von Schleim ($\frac{1}{3}$) und einem eigenen Stoff, Speichelstoff. Die Auflösung desselben im Wasser ist etwas schleimig und wird durch Kochen nicht unklar. Beim Abdunsten erhält man den Speichelstoff, der nach Berzelius durchsichtig, farblos, nach Tiedemann und Gmelin hellbraun und undurchsichtig ist. Nach Mitscherlich ist er gelbbraun, wenn man das Alkali nicht sättigt, und zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, ist dagegen fast ganz weiss und zerfliesst nicht, wenn das freie Alkali zu Anfang der Analyse neutralisirt worden ist. Der weisse Speichelstoff löst sich nach dem vorsichtigen Eintrocknen ganz (nicht zum Theil wie der braune) im Wasser auf. Der Speichelstoff des neutralisirten Speichels reagirt nicht alkalisch, wie Mitscherlich bemerkt; ohne Neutralisation des Speichels reagirt er alkalisch. Mit Wasser begossen wird der Speichelstoff wieder aufgelöst zu einer klaren Flüssigkeit, die nach Berzelius und Mitscherlich weder von Galläpfelinfusion, Quecksilberchlorid, Eisenchlorid und basischem essigsaurem Bleioxyd (Berzelius), noch von starken Säuren gefällt wird, nach Gmelin dagegen von Galläpfelinfusion, Kalkwasser und der Auflösung von Alaun, den neutralen Oxydsalzen von Kupfer, Blei und Eisen, von Quecksilberchlorid und salpetersaurem Silberoxyd gefällt wird. Nach Mitscherlich fällt salpetersaures Silberoxyd allerdings den Speichelstoff, auch essigsaures Bleioxyd, letzteres den ohne vorherige Neutralisation des Speichels dargestellten Speichelstoff. Der nach Ausziehung des Speichelstoffes mit kaltem Wasser zurückbleibende Schleim enthält nach Berzelius viel Knochenerde, woraus sich wahrscheinlich der, aus phosphorsaurem Kalk bestehende, Weinstein der Zähne bildet. Tiedemann und Gmelin erhielten aus dem Speichel des Menschen beim Abdampfen 1,14 bis 1,19 Proc. feste Theile, die 0,25 Theile Asche gaben, wovon 0,203 in Wasser löslich, und 0,047 phosphorsaure Erdsalze waren. 100 Theile Rückstand von verdünntem Speichel gaben:

in Alkohol lösliche, nicht in Wasser lösliche Substanz (phosphorhaltiges Fett)	31,25
in Alkohol und in Wasser lösliche Stoffe: Osmazom, Chlorkalium, milchsaures Kali, Schwefelcyankalium . . .	
aus der Lösung in kochendem Alkohol beim Erkalten niedergefallene thierische Substanz mit schwefelsaurem Kali und etwas Chlorkalium	1,25
	32,50

Digitized by Google

	32,50
nur in Wasser lösliche Stoffe: Speichelstoff mit viel phosphorsaurem und etwas schwefelsaurem Alkali und Chlorkalium	20,00
weder in Wasser noch Alkohol lösliche Stoffe: Schleim, vielleicht etwas Eiweiss mit kohlensaurem und phosphorsaurem Alkali	40,00
	92,50

Nach Dr. Mitscherlich's Analyse enthält der Speichel folgende Salze:

Chlorkalium	0,18 Proc.
Kali (an Milchsäure gebunden)	0,094 —
Natron (an Milchsäure gebunden).	0,024 —
Milchsäure	
Natron (wahrscheinlich mit Speichelschleim verbunden)	0,164 —
phosphorsauren Kalk	0,017 —
Kieselerde	0,015 —

Die näheren organischen Bestandtheile des Speichels verhielten sich in Mitscherlich's Analyse ähnlich wie in der von Berzelius. Ein von Mitscherlich gefundener, in Wasser und absolutem Alkohol löslicher, gelbröthlicher Stoff giebt mit Säuren, Kali, Ammonium und Sublimat keinen, mit essigsaurem Bleioxyd und Eisenchlorid, salpetersaurem Silberoxyd einen Niederschlag.

Die Existenz der Materie, welche Tiedemann und Gmelin als Schwefelcyan erweisen, hat zuerst Treviranus im Speichel ermittelt. *Biolog.* 4. 565. Er hatte nämlich gefunden, dass Speichel, mit einer neutralen Auflösung eines Eisenoxydsalzes vermischt, tief dunkelroth werde. Tiedemann und Gmelin bestätigten diese Färbung, wobei ich jedoch bemerken muss, dass in meinen Versuchen der Speichel nur rostfarbenroth, nicht purpurfarben wurde, ich mochte nun verschiedene Eisenoxydsalze anwenden. Vergl. oben p. 129. Kuhn bezweifelt die Gegenwart von Schwefelcyan im Speichel, weil er sowohl nach Ure's als nach Gmelin's Verfahren keine Schwefelsäure entstehen sah. Wenn Speicheldestillat Eisenoxydsalz röthet, so kann es in Folge von essigsauren Salzen geschehen seyn, — eine Farbenveränderung, die wirklich essigsaure Salze mit salzsaurem Eisenoxyd bewirken. Schweigger's *J.* 59. 378. Vergl. Schultz *a. a. O.* Kastner bemerkt, dass die durch Essigsäure erzeugte Färbung doch nie vollkommen blutroth ist. Hier muss ich jedoch erinnern, dass auch die des Speichels nicht blutroth ist. Ure (*Journ. of Sc. litt. a. A. — N. S.* 7. 60.) hält das Schwefelcyan im Speichel durch seine Versuche für ganz ausser Zweifel gesetzt(?).

Von den animalischen Stoffen des Speichels, Speichelstoff, Schleim, Osmazom, fanden Tiedemann und Gmelin ersten beim Schaf, letztes beim Hund fast gänzlich fehlend.

Der an den Zähnen sich ansetzende Weinstein des Menschen besteht nach einer von Berzelius angestellten Analyse aus

Speichelstoff	1,0
Speichelschleim	12,5
phosphorsauren Erdsalzen	79,0
von Salzsäure aufgelöstem Thierstoff	7,5
	100,0

Digitized by Google

Bei den Insecten ist der Speichel nicht genau untersucht, er scheint nach Rengger (*physiol. Untersuchungen über die thierische Haushaltung der Insecten. Tüb.* 1817.) alkalisch.

b. Succus gastricus, Magensaft. Die Angaben der früheren Naturforscher, welche sich mit Untersuchung des Magensaftes beschäftigten, widersprechen sich durchaus. Spallanzani, der zu erweisen suchte, dass der Magensaft ein Auflösungsmittel für die Speisen in und ausser dem Magen sey, behauptete, dass er vollkommen neutral sey, und Montegre (*sur la digestion. Paris* 1804.) fand ihn zwar meist sauer, läugnete aber die Auflösungskraft des Magensaftes. Helm (*zwei Krankengeschichten. Wien* 1803. 8.) fand bei einer Person mit einer Oeffnung im Magen keine saure Beschaffenheit des Magensaftes. Dagegen haben Viridet, Carminati, Brugnatelli, Werner die saure Beschaffenheit desselben beobachtet. Die Verschiedenheit der Angaben wurde indess bereits durch Carminati's Erfahrungen (*über die Natur des Magensaftes. Wien* 1785. 8.) einigermassen aufgeklärt, der nämlich den Magensaft bei fastenden, fleischfressenden Thieren niemals sauer, aber diese Reaction deutlich fand, sobald sie Fleisch gefressen hatten. Derselbe fand auch den Magensaft pflanzenfressender Thiere sauer, dagegen keine vorstechende Säure im Magensaft des Menschen und der Thiere von gemischter Nahrung. Tiedemann und Gmelin haben diese Frage endlich entschieden. Sie fanden die im Magen nüchterner Pferde und Hunde vorkommende Flüssigkeit fast ganz neutral oder nur kaum sauer, dagegen eine entschieden saure Reaction, sobald den Thieren nur mechanische Reize, wie Steine oder Pfeffer, beigebracht worden. Diess haben auch Leuret und Lassaigne beobachtet. In diesen Fällen war nur der Magensaft sauer, die Eigenschaft rührte nicht von den Absonderungen in der Speiseröhre her, denn letztere reagirte in diesen Fällen nicht sauer.

Es ist interessant, den Grad der Acidität des Chymus zu kennen. Schultz hat hierüber Beobachtungen angestellt. Zieht man das Mittel aus diesen Beobachtungen, so erfordert 1 Theil Chymus etwas mehr als 1 Proc. Kali carbonicum zur Saturation.

Die Quelle der Absonderung des Succus gastricus scheinen die einfachsten mikroskopischen Drüschen der innern Fläche des Magens zu seyn, wenigstens bei den Thieren, wo keine besonderen Drüsen zu dieser Absonderung vorhanden sind. Die Schleimhaut des Magens vom Menschen ist von Sprott Boyd (*Edinb. med. surg. Journ. Oct.* 382.) untersucht. Sie zeigt hie und da mikroskopische Fältchen oder faltige Zotten, überall aber kleine regelmässige Zellen von $\frac{1}{200}$ bis $\frac{1}{450}$", am Pylorus von $\frac{1}{100}$" Durchmesser. Der Grund jeder Zelle erscheint wie von zahlreichen Oeffnungen durchbohrt, bei verticalen Schnitten der Schleimhaut zeigt sie sich aus senkrecht stehenden Fibern zusammengesetzt, die der Verfasser für Röhren hält, welche sich in den Grund der Zellen öffnen. Tiedemann und Gmelin haben die das Gerinnen der Milch bewirkende Eigenschaft des Magens nicht bloss in der Portio pylorica, sondern auch in der Portio cardiaca wahrge-

Digitized by Google

nommen. Bei mehrern Säugethieren kommen übrigens besondere Drüsen im Magen vor, wie die grosse Drüse des Bibers, deren Saft wahrscheinlich zur Auflösung der Rinden bestimmt ist; ähnliche Drüsen finden sich in der Portio cardiaca des Magens bei Myoxus, Halmaturus, Phascolomys, u. a.; und es gehört hierher ebenfalls der Proventriculus der Vögel, zwischen dessen innerer Haut und Muskelhaut sich eine ganze Schicht blindarmförmiger Drüsen mit gesonderten Mündungen befindet. Diese Drüsen sind hier einfache, aggregirte selten Haufen zusammengesetzter Blinddärmchen. Siehe darüber Home *lectures on comparative anatomy. T. II.* und J. Mueller *de penit. gland. struct.* Die erste genauere chemische Untersuchung des Magensaftes ist von Prout *philos. Transact.* 1824. *p.* 1. Er zeigte, dass sich im Magensaft des Kaninchens, Hasen, Pferdes, Kalbes, Hundes freie Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) befindet, auch hat er wie Children (*Ann. of philos. Jul.* 1824.) Salzsäure in der von Dyspeptischen erbrochenen Flüssigkeit gefunden. Auch Prevost und Le Royer (Froriep's *Not.* 9. 194.) bestätigten die Salzsäure im Magensaft. Leuret und Lassaigne haben diese geläugnet, allein Prout hat ihre Einwürfe widerlegt. *Annals of philos. N. S. Dec.* 1826. 405. Tiedemann und Gmelin fanden dagegen 3 Säuren im Magensaft: 1) Salzsäure, im Magensaft der Hunde und Pferde. 2) Essigsäure, im Magensaft derselben. Milchsäure, die der Essigsäure ganz nahe verwandt ist, haben auch Chevreuil in dem Erbrochenen eines Nüchternen, und Graves in dem Erbrochenen eines Dyspeptischen gefunden. Tiedemann und Gmelin *l. c. p.* 152. — 3) Buttersäure. Diese Säure fanden die deutschen Naturforscher zwei Mal im Magen des Pferdes. Schultz hat den Chymus mit Wasser destillirt, und gefunden, dass die Säure bei vielen Thieren zum Theil oder ganz flüchtig ist. Eine flüchtige Säure fand sich vor bei einem Pferde, das mit Hafer, bei einem Schweine, das mit Erbsen, bei einem Kalb und bei Schafen, die mit Gras gefüttert worden; dagegen war die Säure nicht flüchtig bei allen fleischfressenden Thieren, bei säugenden Schafen, bei mit Heu gefütterten Pferden und bei Kaninchen, die mit Brot, Gras und Kartoffeln gefüttert waren. Bei Schafen, welche Hafer oder frisches Gras bekommen hatten, war die Säure im ersten Magen flüchtig, im vierten Magen aber nicht flüchtig. Die Säure schien nach seinen Versuchen freie Essigsäure zu seyn, dagegen die Salzsäure nach Schultz im Chymus nicht frei, sondern mit Kali verbunden vorkommen soll.

Die im nüchternen Zustande bei den wiederkäuenden Thieren in den beiden ersten Magen sich sammelnde Flüssigkeit enthält viel kohlensaures Alkali, nach Prevost und Le Royer (Froriep's *Not.* 9. *p.* 194.); Tiedemann und Gmelin haben diess bestätigt. Nur der 3. und noch mehr der 4. Magen enthält sauren Magensaft.

Noch niemals ist der Magensaft des Menschen in so grosser Quantität, so rein und so häufig untersucht worden, als von Beaumont, welcher bei einem Manne mit Magenfistel während mehrerer

Digitized by Google

Jahre eine grosse Reihe von Versuchen über den Magensaft anstellte. Er hat es bestätigt, dass der Magen im nüchternen Zustande keinen Magensaft enthält, und dass die den Magen benetzende Feuchtigkeit in diesem Zustande nicht sauer reagirt; sobald aber Speisen in den Magen gelangen, tritt diese Absonderung ein und der Magen reagirt sauer. Schultz, welcher die Existenz des Magensaftes gänzlich läugnet und die saure Reaction des Chymus von der Zersetzung der Speisen selbst ableitet, musste einen Einwurf gegen seine Ansicht in dem Factum finden, dass, wie Tiedemann und Gmelin beobachtet haben, die Absonderung des Magensaftes bei nüchternen Thieren durch mechanische Reize, wie verschlungene Steine hervorgerufen werden kann, und erklärt den hierauf vorgefundenen sauren Magensaft für Reste des sauren Chymus. Nach den so zahlreichen Versuchen von Beaumont lässt sich indess nicht an der Existenz des Magensaftes zweifeln; er hat die Absonderung des Magensaftes durch künstlich eingebrachte, mechanisch wirkende Mittel, wie eine Kautschuckröhre oder die Kugel des Thermometers, mit welcher er den Magen reizte, erst dann hervorgebracht, nachdem er sich vorher überzeugt hatte, dass nichts in dem Magen war, und dass die Magenwände nicht sauer reagirten. Nach jener mechanischen Reizung entstand nun in allen, so oft wiederholten Versuchen eine ziemlich beträchtliche saure Absonderung, so dass er bei jenem Subjecte oft gegen 1 Unze Magensaft sammeln konnte. In diesem reinen Zustande ist der Magensaft früher noch niemals untersucht worden. Beaumont beschreibt den Magensaft folgendermassen: Der Magensaft ist ein klares Fluidum ohne Geruch, von etwas salzigem und sehr merklich saurem Geschmack; er schmeckt wie eine dünne Auflösung von Mucilago, welche von Salzsäure leicht gesäuert ist; er ist in Wasser, Wein, Weingeist auflöslich, mit Alkalien effervescirt er leicht, er schlägt das Eiweiss nieder, fault sehr schwer und hindert die Fäulniss in thierischen Stoffen. Speichel soll dem Magensaft eine blaue Färbung und ein schäumiges Ansehn mittheilen; gegen Nahrungsstoffe verhält er sich auch ausser dem thierischen Körper als ein Lösungsmittel, wie die vielen von Beaumont angestellten Versuche beweisen. Dieser Autor hat den Magensaft von Dunglison untersuchen lassen. Er enthielt freie Salzsäure und Essigsäure, phosphorsaure und salzsaure Salze aus den Basen von Kali, Natron, Magnesia und Kalk, und eine thierische Materie, welche in kaltem Wasser löslich, in heissem aber unlöslich ist. Beaumont hat auch den Magensaft von Silliman untersuchen lassen; diese Untersuchung hat aber keinen Werth, da der Magensaft mehrere Monate bis zur Analyse aufbewahrt wurde. Er verhielt sich auch jetzt noch sauer, nachdem sich bereits ein Häutchen auf ihm gebildet hatte; er enthielt Salzsäure, eine Spur von Schwefelsäure und wie Silliman vermuthet, auch etwas Phosphorsäure.

Beaumont bemerkt ausdrücklich, dass der Magensaft von kleinen hellen Punkten oder sehr feinen Papillen abgesondert zu werden scheine.

Digitized by Google

Die Flüssigkeit des Kropfs der Vögel reagirt nach Tiedemann und Gmelin gemeiniglich sauer. Die Flüssigkeit des Drüsenmagens enthielt auch im nüchternen Zustande eine freie Säure. Die Milch gerinnt durch den Magensaft der Vögel. Die Säure des Magensaftes rührt von Salzsäure und wahrscheinlich auch von Essigsäure her. Treviranus (*Biol. IV. p.* 362.) hat die Frage angeregt, ob der Magensaft der Vögel Flusssäure enthalte, da nach Brugnatelli (Crell *Annalen* 1787. *I. p.* 230.) Bergkrystall und Achat in Röhren eingeschlossen nach 10tägigem Verweilen im Magen der Hühner und Truthühner deutlich angegriffen waren, und 12 bis 14 Gran an Gewicht verloren hatten und Treviranus selbst Aehnliches an einer Porzellanschale, worin Chymus der Hühner digerirt wurde, bemerkt hatte. Tiedemann und Gmelin konnten diess nicht sicher entscheiden. Sie digerirten den Magensaft von Enten in einem Platintiegel, der mit einer mit Wachs überzogenen radirten Glasplatte bedeckt war, fanden aber nach 24 Stunden keine Spur von Aetzung am Glase. Tiedemann und Gmelin schliessen hieraus nicht, dass der Magensaft der Vögel keine Flusssäure enthalte, da Fluorcalcium wenigstens in verschiedenen thierischen Theilen, wie im Harn und in den Knochen, bereits gefunden ist, *l. c. T.* 2. *p.* 139. Der Magensaft der Amphibien reagirt meist sauer, auch der Magen der Fische enthält besonders im gefüllten Zustande auch eine freie Säure. Es war aus anderen Gründen wahrscheinlich, dass auch hier Salzsäure und Essigsäure die Lösungsmittel seyen. Leuret und Lassaigne (*recherches physiol. pour servir à l'histoire de la digestion. Paris* 1825.) halten die freie Säure des Magensaftes in allen 4 Classen für Milchsäure. Nach einer Entdeckung von Eberle besteht das auflösende Princip des Magensaftes nicht in dieser Säure, sondern es ist die Natur des Magenschleimes wie alles Schleimes, im gesäuerten Zustande eine Zersetzung, und folgende Auflösung der Nahrungsstoffe herbeizuführen. Eberle *Physiologie der Verdauung. Würzburg* 1834. Daher lässt sich mit säuerlichem Magenschleim auch ausser dem thierischen Körper eine künstliche Verdauung von Nahrungsstoffen bewirken. Siehe J. Mueller und Schwann *über die künstliche Verdauung des geronnenen Eiweisses.* Mueller's *Arch.* 1836. 66. Dass anderer Schleim als Magenschleim säuerlich gemacht zur künstlichen Verdauung hinreiche, wie Eberle angegeben, ist nicht richtig, und schon hieraus geht hervor, dass das Verdauungsprincip nicht der Schleim selbst, sondern ein eigenthümlicher, im Magenschleim enthaltener Stoff seyn muss. Es ist derselbe Stoff, welcher die Milch im Magen gerinnen macht. Die meisten Kenntnisse über das Verdauungsprincip *Pepsin* verdankt man Schwann *über das Wesen des Verdauungsprozesses.* Mueller's *Arch.* 1836. 90. Ganz rein kann er bis jetzt nicht dargestellt werden. Seine lösende Kraft äussert er nur im gesäuerten Zustande. Das nähere darüber kann erst später bei der Lehre von dem Verdauungsprozesse beigebracht werden.

Da es ausgemacht ist, dass der Magensaft auch ausser dem thierischen Körper auflösend auf thierische Theile wirkt; so finde ich es nicht wunderbar, wenn der Magen nach dem Tode zuweilen

Digitized by Google

davon angegriffen wird und schneller als andere Theile sich erweicht, wie man diess besonders bei Kaninchen und kleinen Kindern findet; ich habe es bei ersteren gesehen und ich weiss dass es nicht von der Todesart abhing. Vergl. über die widersprechenden Erklärungen Rudolphi's *Physiol. II.* 2. 119., wo das Factum ungenügend von der Fäulniss abgeleitet wird. Es ist freilich eine Zersetzung, die aber ihre localen materiellen Ursachen haben muss, und wahrscheinlich in den chemischen Eigenschaften des Magensaftes hat.

c. Die Galle. Die Absonderung der Galle ist eine in der Thierwelt so weit verbreitete, und in ihrer Bedeutung für den Verdauungsprocess doch so wichtige Secretion, dass es von dem grössten Interesse ist, zu wissen, ob sie überhaupt jemals auch bei den niedersten Thieren entbehrlich werden kann. Was man bei den Würmern als erste Anfänge der Gallenorgane ansehen könnte und angesehen hat, sind die blinden Erweiterungen oder blinddarmförmigen Anhänge des Darmkanals, welche bei dem medicinischen Blutegel in ihrem einfachsten Zustande noch blosse Seitenerweiterungen, bei den Aphroditen lange dünne Blinddärmchen, bei verschiedenen Würmern aber schon verzweigt sind, und endlich bei den Planarien und Distomen schon einen vollständig verzweigten Darmkanal (ohne After) darstellen. Die blinden Anhänge am Magen der Seesterne, welche auch keinen After besitzen, könnten auch als analoge Absonderungsorgane angesehen werden, allein es lässt sich nicht ermitteln, ob und was alle diese Organe absondern. Bei den Insecten münden bald tiefer bald höher in dem Darkanal, immer hinter dem weiten Theil des Darms, den man für den Magen hält, die sogenannten Gallengefässe, Vasa Malpighiana ein, lange, meist paarige, gewundene Röhren mit blindem Ende. Diese Gefässe enthalten indess keine Galle, sondern nach Audouin (*l'institut* 135.) und Chevreul (Straus-Duerckheim *considerations générales sur l'anatomie des anim. articul. Paris.* 1828. 4. 251.) Harnsäure. Diese Gefässe secerniren überdiess während der Entwickelung der Puppe, wo nichts verdaut wird, sehr stark. Sie sind also offenbar Ausscheidungsorgane, Vasa urinaria. Sie münden erst hinter dem Theil des Darms ein, worin der Chylus gebildet wird, und bei den Larven oft kurz vor dem After. Dagegen giebt es bei mehreren Insecten höher in den Darm einmündende Blinddärmchen oder sogar ähnliche Vasa Malpighiana superiora. Ich bin geneigt, mit Meckel (*Arch.* 1826.) letztere für die gallabsondernden Organe zu halten. Mit solchen Blinddärmchen ist der bei den fleischfressenden Käfern auf den Muskelmagen folgende häutige Magen besetzt, und ähnliche Schläuche kommen bei mehreren anderen Insecten vor. Bei vielen Orthopteren, Mantis, Gryllus, Blatta giebt es ähnliche Blinddärmchen hinter dem auch hier vorkommenden Muskelmagen, und bei Locusta, Acheta, Gryllotalpa münden die Vasa Malpighiana superiora in besondere schlauchartige Anhänge des Darms hinter dem Muskelmagen ein. Was man bei den Insecten Magen nennt, jener weitere mittlere Theil des Darms, bald allein, bald hinter einem Muskelmagen, ist etwas

Digitized by Google

ganz anderes als der Magen der höheren Thiere; die Speisen werden hier aufgelöst und dringen von hier aus in den Fettkörper, der alle Organe verhüllt; dieser Theil des Darms ist die Pars chylopoëtica, während die Excrementbildung von der Einmündungsstelle der Vasa Malpighiana oder urinaria anfängt. Diese Darlegung wird noch sicherer, wenn wir bei den Spinnen, namentlich beim Scorpion am obern Theil des Darms wahre gallenabsondernde Gefässe, am untern Theil Vasa Malpighiana antreffen. Siehe meine Schrift *de penit. gland. struct. Tab.* 8. *Fig.* 8.

Die Leber hat bei den Wirbelthieren zweierlei zuführende Gefässe, Arterien, eine zuführende Vene (Pfortader), und einerlei rückführende Gefässe, die rückführenden Venen oder Venae hepaticae. Bei dem Menschen und den Säugethieren setzen die Venen des Magens, Darms, Mesenteriums, der Gallenblase, des Pankreas die in der Leber nach Art einer Arterie sich verzweigende Pfortader zusammen, und aus den Capillargefässen der Leber, zu welchen auch die Leberarterien führen, kehrt das Blut durch die Lebervenen zurück in die Vena cava inferior. Bei den Vögeln und Amphibien geht zur Pfortader auch ein Theil des Blutes der untern Extremität, des Schwanzes, des Beckens. Jacobson, Meck. *Arch.* 1817. 147. Nicolai *Isis* 1826. 404. Die Pfortader erhält zuweilen bei Fischen auch die Venen der Genitalien und der Schwimmblase, vergl. oben p. 444.

Nach Kiernan's Untersuchungen verzweigt sich die Leberarterie vorzugsweise auf den Wänden der Gallengänge, Gallenblase und der andern Blutgefässe. Derselbe bestreitet die Annahme, dass in dasselbe Capillargefässnetz, aus welchem die Anfänge der Lebernerven entstehen, sowohl das arterielle Blut als das venöse Blut der Pfortader ergossen werde. Nach Kiernan geht das Blut der Arterie, nachdem es die Wände der Gefässe ernährt hat, aus den Netzen der Arterien in Zweige der Pfortader über, und von dort aus mit dem übrigen Pfortaderblut in die Lebervenen. Die Acini der Leber dagegen erhalten vorzugsweise venöses Blut, welches zwischen den feinsten Gallengefässen durch Capillargefässnetze in die Lebervenen übergeführt wird. Vergl. oben p. 445. Nach Kiernan würde die Absonderung der Galle mehr aus venösem Blute geschehen. In den Gallengängen kommen auch kleine Schleimfolliculi vor, welche Kiernan nachgewiesen hat; derselbe lässt diese Absonderung des Schleims hier wie in der Gallenblase von arteriellem Blute geschehen.

Dass die Gallenabsonderung indess auch aus arteriellem Blute geschehen kann, beweisen Fälle, in welchen die Pfortader, statt sich in der Leber zu verbreiten, vielmehr in die untere Hohlader überging. Dieses sah Abernethy (*Philos. Transact.* 1793.) bei einem 10monatlichen Knaben, und Lawrence (*Medico-chirurg. Transact.* 5. 174.) theilte einen Fall von einem mehrjährigen Kinde mit. Da indess in dem Falle von Abernethy die Vena umbilicalis noch durchgängig war und sich in der Leber verzweigte, so kann, wie Kiernan bemerkt, das Arterienblut, nachdem es durch die Vasa vasorum die Leber ernährt, venös geworden, in die Zweige der Umbilicalvene getreten seyn, so wie es nach

Digitized by Google

Kiernan's Vorstellung venös geworden sonst in die Aeste der Pfortader übergeht; in diesem Fall könnte also die Absonderung doch aus venösem Blute statt gefunden haben. Kiernan *Philos. Transact.* 1833. *P. II.*

Simon (*Nouv. bull. des sc. par la soc. philomat.* 1825.) und Phillipps (*Lond. med. gaz.* 1833. *Jun.*) schlossen aus Versuchen, dass die Galle vom Pfortaderblute abgesondert werde. Da indess in Phillips Versuchen auch nach Unterbindung der Pfortader die Absonderung der Galle fortfahren soll, wiewohl in geringerer Menge, so schliesst er, dass die Galle sowohl aus dem arteriellen als venösen Blute abgesondert werde. Nach Unterbindung der Arteria hepatica fand er keine Veränderung der Gallenabsonderung.

Die Gallenblase der Wirbelthiere zeigt sich in der Entwickelungsgeschichte als Divertikel oder Auswuchs des Ausführungsganges der Leber. Siehe meine Schrift *de penit. gland. struct.* Beim Menschen und bei mehreren Säugethieren kann die aus dem Lebergang dem Ductus choledochus zufliessende Galle, durch Verschliessung der Darmmündung des letztern, oder verlängerte Contraction des Ganges in den Ductus cysticus und die Gallenblase ausweichen, wie denn diess im nüchternen Zustand vorzüglich geschieht. Bei den Thieren erhält die Gallenblase aber häufig am Halse oder Grunde besondere Lebergänge, Ductus hepatico-cystici, die beim Menschen nicht vorhanden sind. Bei den Vögeln mündet der Lebergang, vom Ductus cysticus getrennt, in das Duodenum. Die Gallenblase erhält ihre Galle durch besondere Lebergänge am Halse oder Grunde. Bei den Reptilien gelangt die Galle durch Aeste des Leberganges in die Gallenblase. Bei den Fischen verbinden sich alle Leberäste mit der Gallenblase oder dem Ausführungsgange derselben. Cuvier, *vergl. Anat.* 3. *p.* 597. Wahre Ductus hepatico-cystici kennt Rudolphi *Physiol.* (*II.* 2. 153.) unter den Haussäugethieren nur vom Rinde (8—10). Mehrere Thiere haben gar keine Gallenblase. Hierher gehören unter den Säugethieren die Einhufer, ferner die Hirsche und Kameele, Elephant, Nashorn, Daman, Pekari, Hystrix dorsata, Hamster, viele Mäusearten, die Tardigraden, Rytina, der Braunfisch und Tümmler unter den Cetaceen. Unter den Vögeln fehlt sie beim Papagey, Kukuk, Straus, Taube, Holztaube, und Haselhuhn. Unter den Fischen fehlt sie bei der Lamprete (nicht bei Ammocoetes und den Myxinoideen), dem Nilbarsch, dem gestreiften Plattfisch, der Meerleier, dem Lump und einigen Sciänen. Siehe Cuvier *l. c. p.* 591. Also zeigt sich in dem Mangel derselben nichts Gesetzmässiges, obgleich diejenigen Thiere, denen sie fehlt, meist Pflanzenfresser sind und mehrentheils beständig verdauen. Allein sehr viele Pflanzenfresser besitzen eine Gallenblase. Wo sie fehlt, ist häufig der Ausführungsgang der Leber sehr erweitert, wie beim Pferde.

Die Galle ist grün, bitter schmeckend und ekelhaft riechend, die Lebergalle heller, die Gallenblasengalle wegen Resorption

Digitized by Google

flüssiger Theile consistenter und grüner, von aufgelöstem Schleim fadenziehend. Sie enthält sparsam weissliche oder graue Kügelchen; beim Frosch sind sie nach meiner Beobachtung von ungleicher Form und Grösse, und im Durchschnitt 5 Mal kleiner als die Blutkörperchen des Frosches, andere noch kleiner. Was die Galle grün macht, ist aufgelöst. Im frischen Zustande ist die Galle nach Schultz immer alkalisch. Die Galle gerinnt nicht beim Kochen und löst Oele nicht auf. Nach Werner soll die Galle die Gerinnung des Blutes verhindern, und die Auflösung des Blutroths im Blutwasser ausser den thierischen Körpern bedingen. Das Letztere ist unrichtig.

Berzelius *Analyse der Ochsengalle von* 1807. Wird Ochsengalle bis zur Consistenz von Extract abgedampft und dann mit Alkohol vermischt, so bleibt eine gelbgraue Substanz der Galle ungelöst; sie ist, da sie auch von Essigsäure aus der Galle niedergeschlagen wird, nicht Eiweiss, sie ist vielmehr der Schleim der Gallenblase. Diese durch Säure aus der Galle niedergeschlagene Materie, und der von der Gallenblase abgeschabte Schleim mit Säure behandelt, verhalten sich ganz gleich.

Die Auflösung von eingetrockneter Galle in Alkohol enthält die wesentlichen Bestandtheile der Galle. Destillirt man den Alkohol ab, löst den Rückstand mit wenig Wasser und vermischt ihn mit etwas verdünnter Schwefelsäure, so hat man in dem grüngrauen Niederschlage eine Verbindung mit dem characteristischen bittern Stoff der Galle. Denselben Stoff erhält man in gleicher Verbindung, wenn man von Gallenschleim befreite Galle mit weniger verdünnter Säure versetzt. Die Flüssigkeit, woraus der bittere Stoff niedergeschlagen wird, enthält Osmazom, Kochsalz, milchsaures Natron gleich dem Blutwasser.

Die von Schwefelsäure mit dem bittern Stoff der Galle erhaltene Verbindung ist in Alkohol wie ein Harz auflöslich, wird daraus durch Wasser niedergeschlagen, und zeigt die Charactere eines Harzes. Man erhält den bittern Stoff aus dieser Verbindung, indem die Auflösung dieser Materie in Alkohol mit kohlensaurem Baryt digerirt wird, die Schwefelsäure wird dann abgeschieden und der bittre Stoff bleibt aufgelöst. Berzelius hat diesen Stoff Gallenstoff genannt. Gmelin hält ihn für ein Gemenge von mehreren Stoffen. Der abgeschiedene Gallenstoff enthält eine gewisse Menge Fett, welches sich durch Aether daraus ausziehen lässt. Chevreul und Gmelin haben dieses Fett aus der concentrirten Galle selbst durch Aether ausgezogen. Es besteht theils aus verseiftem Fett (fetten Säuren), theils aus einem eigenen, nicht mit Alkali verbindbaren Gallenfett. Der reine Gallenstoff wird von Wasser aufgelöst, und die Auflösung besitzt Farbe und Geschmack der Galle. Der Gallenstoff ist gelbbraun grünlich, doch scheint die Farbe von einem Färbestoff herzurühren, denn der Gallenstoff lässt sich fast farblos darstellen. Beim Erhitzen schmilzt der Gallenstoff unter Aufblahen, verkohlt, raucht, entzündet sich und verbrennt mit russender leuchtender Flamme, und hinterlässt eine schwer verbrennliche aufgeschwollene Kohle. Der Gallenstoff ist in Wasser und Alkohol in allen Verhältnissen

Digitized by Google

löslich, aber unlöslich im Aether. Der Gallenstoff wird auch von Alkali aufgelöst. Berzelius glaubt, dass das in der Galle enthaltene kohlensaure Natron mit dem Gallenstoff chemisch verbunden ist. Von Galläpfelinfusion wird der Gallenstoff aus Wasser nicht gefällt, wohl aber von Metallsalzen. Nach der Analyse von Berzelius enthält die Ochsengalle:

Wasser	90,44
Gallenstoff mit Fett	8,00
Gallenblasenschleim	0,30
Osmazom, Kochsalz und milchsaures Natron	0,74
Natron, phosphorsaures Natron, phosphorsaure Kalkerde und Spuren von einer im Alkohol unlöslichen Substanz	0,41
	0,11
	100,00

Prout's Analyse stimmt im Wesentlichen mit der von Berzelius, dagegen erhielt Thenard (1806) bei einer andern Methode andere Resultate (*mém. de la soc. d'arc.* 1. 23.). Er analysirte die Galle mit essigsaurem Bleioxyd. Nachdem er nämlich eine von ihm für Eiweiss gehaltene Materie der Galle mit Salpetersäure gefällt hatte, vermischte er die filtrirte und verdünnte Flüssigkeit mit einer Auflösung von basischem essigsaurem Bleioxyd. Dasjenige, was beim Zusatz von Salpetersäure zum Niederschlag ungelöst bleibt, nannte er Gallenharz. In dem noch flüssigen Theile der mit Bleisalz versetzten Galle fällte er durch neuen Zusatz von Bleisalz eine andere Substanz, welche nach Abscheidung des Bleisalzes ganz im Wasser löslich ist, nämlich eine extractartige, süssliche, bittere Masse, die er Pikromel nannte.

Thenard's Gallenharz ist grün und bitter, beim Schmelzen wird es gelb. Es ist in geringer Menge in Wasser löslich, und wird daraus durch Schwefelsäure gefällt. Seine Auflösung im Alkohol wird durch Wasser niedergeschlagen. Im Alkali ist es löslich und wird daraus durch Säure gefällt. Pikromel ist zähe, hellgelb, im Aeussern wie Terpenthin. Es ist im Wasser und Alkohol löslich, aber nicht im Aether. Es wird von basischem essigsaurem Bleioxyd, von Eisenoxydsalzen und salpetersaurem Quecksilberoxydul gefällt. Gallenharz ist im Pikromel auflöslich und es wird hierdurch wieder Galle gebildet. Berzel. *Thierch.* 183. 1000 Theile Ochsengalle enthalten:

Wasser	875,6
Gallenharz	30,0
Pikromel	75,4
gelben Färbestoff der Galle	5,0
Natron	5,0
phosphorsaures Natron	2,5
Kochsalz	4,0
schwefelsaures Natron	1,0
schwefelsauren Kalk	1,5
Spur von Eisenoxyd	
	1000,0

Berzelius machte es wahrscheinlich, dass statt dieser beiden

Stoffe Gallenharz und Pikromel nur der einzige Gallenstoff anzunehmen sey, welcher wegen seiner Eigenschaft, durch Verbindung mit Mineralsäure ein Harz zu bilden, zur Annahme des Gallenharzes veranlasst habe. Gmelin hat dagegen Thenard's Ansicht bestätigt, dass in der Galle wirklich Pikromel nebst einem Harz enthalten ist, oder einer Materie, die durch geringe äussere Einflüsse in Gallenharz verwandelt wird. Gmelin führt in seiner Chemie das Gallenharz unter den stickstofffreien, das Pikromel unter den stickstoffhaltigen Körpern auf. Das Pikromel ist seitdem von Chevreul, Chevallier und Lassaigne auch in der menschlichen Galle gefunden worden, wie denn Orfila, Laugier und Caventou dasselbe auch in menschlichen Gallensteinen entdeckt haben. Nach Thenard wird der Gallenstoff dem Albumen um so ähnlicher, je mehr durch einen krankhaften Process die Leber sich in Fett zu verwandeln scheint. Huenefeld *physiol. Chem.* 2. 108.

Die Resultate von Gmelin's Analyse der Ochsengalle geben:

1. moschusartig riechender Stoff, wird durch Destillation der Galle erhalten, wobei er als riechendes Wasser übergeht.

2. Gallenfett Cholestrin. Bestandtheil der Gallensteine, von Chevreul in der frischen Galle nachgewiesen, auch in anderen Theilen, im Blut nach Boudet, sonst meist krankhaft vorkommend, wie in dem Wasser der localen Wassersuchten, Hydrocele, im Markschwamm. Man gewinnt das Gallenfett der Galle, indem man die abgedampfte Galle mit Aether schüttelt, welcher es auszieht. Nach dem Abdestilliren eines Theils des Aethers krystallisirt es beim Erkalten aus dem Rückstand, verunreigt mit Oelsäure, von der es sich durch Auflösen in kochendem Alkohol reinigen lässt, aus dem es beim Erkalten anschiesst. Gallenfett krystallisirt in weissen perlmutterglänzenden Blättern, ist ohne Geruch und Geschmack und schwimmt auf Wasser. Von kaustischem Kali lässt sich das Gallenfett nicht auflösen oder verseifen, worin einer seiner Hauptcharactere besteht. Hierin stimmt es mit Hirnfett überein, enthält aber keinen Phosphor; es ist das kohlenstoffhaltigste aller Fettarten. Berzelius *Thierchemie.* 185.

3. Oelsäure, ein blassgelbes, halb durchsichtiges Oel, Lacmuspapier röthend.

4. Talgsäure, krystallisirt in farblosen perlmutterglänzenden Blättchen. Die Auflösung in Weingeist röthet das Lacmuspapier.

5. Cholsäure, eine neue Substanz, krystallisirt in feinen Nadeln, von scharfsüssem Geschmack, enthält Stickstoff, und ist in kochendheissem Wasser etwas löslich; die Lösung rothet Lacmuspapier; im Alkohol ist sie leicht löslich. Von Schwefelsäure wird sie aufgelöst und daraus wieder vom Wasser gefällt. Die von Cholsäure gebildeten Salze sind löslich und zuckersüss, die Säure ist stärker als Harnsäure und zersetzt auch in der Kälte die kohlensauren Alkalien. Berzelius *Thierchemie.* 190.

6. Gallenharz, in der Kälte spröde, bei mässiger Wärme weich, von brauner Farbe, hell durchscheinend, auflöslich im Alkohol, und daraus durch Wasser fällbar. Es brennt, über 100 Grad erhitzt, mit russender Flamme und aromatischem Geruche, und hinterlässt eine schwammige, leicht verbrenn-

Digitized by Google

liche Kohle. In concentrirter Schwefelsäure löst es sich langsam auf, Wasser schlägt es daraus in Flocken nieder. Es wird weder von Salzsäure noch Essigsäure aufgelöst. Es verbindet sich leicht mit kaustischem Kali, diese Verbindung löst sich in reinem Wasser auf; es wird leicht von kaustischem und kohlensaurem Ammoniak, nicht von kohlensaurem Kali aufgelöst; alkoholfreier Aether löst fast nichts auf. Gmelin a. a. O. I. 57.

7. Taurin, ein neuer Stoff, in grossen, farblosen, durchsichtigen Krystallen, irregulären sechsseitigen Säulen mit 4- oder 6seitiger Zuspitzung. Die Krystalle knirschen zwischen den Zähnen und schmecken piquant; sie sind weder sauer noch alkalisch, verändern sich selbst bei $+100^0$ C. nicht in der Luft. Im offenen Feuer kommt das Taurin in dicken Fluss, wird braun, bläht sich auf, und hinterlässt eine leicht verbrennliche Kohle. Taurin ist löslich im Wasser, sehr wenig in kochendem Alkohol, fast gar nicht in wasserfreiem Alkohol; es enthält etwas Stickstoff. Gmelin l. c. 61.

8. Pikromel. Thenard's Pikromel ist dickflüssig und wie Terpenthin. Gmelin's Pikromel ist undurchsichtig, besteht aus krystallinischen Krümchen und ist sehr reich an Stickstoff. Es ist in kaltem Wasser leicht löslich, ebenso im Alkohol, unauflöslich im Aether; in concentrirter Schwefelsäure ist es leicht löslich mit Wärmeentwickelung, beim Erkalten gesteht es zur Hälfte zu einer krystallinischen Masse. Mässig concentrirte Salzsäure löst Pikromel auf. Pikromel wird nicht von Galläpfeltinctur gefällt, und lässt sich nicht in Gährung versetzen. Thenard's Pikromel soll eine Verbindung von Pikromel mit Gallenharz seyn.

9. Färbestoff der Galle (stickstoffhaltig). Der Färbestoff der Galle zeigt ein characteristisches Verhalten gegen Salpetersäure, und wird vermittelst derselben auch erkannt, wenn er in der Gelbsucht etc. in das Blut und den Urin aufgenommen worden. Harn, wenn er Färbestoff der Galle enthält, wird, wenn man ihn mit einem gleichen Volum Salpetersäure vermischt, zuerst grünlich, dann dunkelgrün, darauf schmutzig roth und später braun. Berzelius *Thierchem. p.* 410.

10. Osmazom. 11. Eine Materie, die beim Erhitzen Harngeruch entwickelt. 12. Eine pflanzenleimartige Materie. 13. Eiweiss. 14. Gallenblasenschleim. 15. Käsestoff. 16. Speichelstoff. 17. Zweifach kohlensaures Natron. 18. Kohlensaures Ammonium. 19. Essigsaures Natron. 20—26. Oelsaures, talgsaures, cholsaures, schwefelsaures und phosphorsaures Kali und Natron, Kochsalz und phosphorsaurer Kalk.

Gmelin hat in der Galle des Menschen Gallenfett, Gallenharz, Pikromel und Oelsäure gefunden; ausserdem haben Frommherz und Gugert (Schw. *Journ.* 50. 68.) in der Menschengalle noch Färbestoff, Speichelstoff, Käsestoff, Osmazom, ölsaures, cholsaures, talgsaures, kohlensaures, phosphorsaures und schwefelsaures Natron mit wenig Kali, und phosphorsauren, schwefelsauren und kohlensauren Kalk gefunden. Vergl. Berzelius *Thierchemie. p.* 206.

Digitized by Google

Berzelius begleitet die chemische Beschreibung der Galle mit der Bemerkung, dass die Zusammensetzung der Galle wohl einfacher sey, als die analytischen Resultate zu erkennen geben, und hält es für sehr wahrscheinlich, dass sie die eiweissartigen Bestandtheile des Blutes zwar wesentlich verändert, aber mit den im Blute vorkommenden Salzen unorganischen Ursprungs vermischt enthalte, und dass das von eiweissartigen Bestandtheilen Hervorgebrachte eine so grosse Neigung zu Veränderungen in der Zusammensetzung habe, dass es durch Einwirkung von ungleichen Reagentien, in verschiedene Verbindungen zersetzt werde, die verschieden ausfallen, nach den zu ihrer Scheidung eingeschlagenen ungleichen Methoden, gerade so wie Oele und Fette durch Einwirkung von Basen in Zucker und in fette Säuren umgewandelt werden.

Nach Berzelius Analyse der Schlangengalle enthält dieselbe einen eigenen Gallenstoff, der von Säuren und Alkalien nicht gefällt wird. Vom Gallenstoff der warmblütigen Thiere unterscheidet er sich dadurch, dass er vom essigsauren Blei nicht in Gallenharz und Gallenzucker (Pikromel) zerlegt werden kann. Er ist verbunden mit Farbestoff, ähnlich dem Färbestoff aus der Galle anderer Thiere, der für sich im Wasser wenig löslich ist, in Verbindung mit Gallenstoff aber sich reichlich darin löst. Die Verbindung dieser beiden Stoffe ist der unzersetzten Galle ganz ähnlich. Ausserdem enthält die Galle der Schlange eine geringe Quantität eines krystallisirenden, durch eine Lösung von kohlensaurem Kali fällbaren Gallenstoffs, analog demjenigen, welchen Gmelin in der Galle mehrerer Cyprinusarten (*Leuciscus*, *alburnus*, *barbus*) fand, und welcher dort das Gallenharz und Pikromel ersetzt. Nach Gmelin bewirkt der krystallinische Gallenstoff der Cyprinusarten, wenn er mit Galle vermischt wird, eine Gerinnung zu einer grünlich-weissen, körnigen Masse. Leider besitzen wir keine Untersuchungen über die Galle der Krebse und der Mollusken.

Einige Beobachtungen über die Galle hat Schultz angestellt. Beim nüchternen Ochsen fand er 12—16 Unzen Galle in der Gallenblase, nach der Verdauung noch 2—4 Unzen in derselben, bei einem grossen nüchternen Hunde 5 Drachm., bei einem Hunde mittlerer Grösse nach der Verdauung 2 Dr. 17 Gr. Die Galle des Ochsen hatte ein specifisches Gewicht von 1,026—1,030; sie war immer alkalisch; ihre Neutralisation erforderte, wenn sie dick war, 1 Dr. Weinessig auf 1 Unze Galle, dagegen, wenn sie dünn war, $\frac{1}{2}$—$\frac{1}{4}$ Drachm. Weinessig. Das in der Galle durch Weingeist entstehende Coagulum hält er nicht für Eiweiss, sondern für eine dem Speichelstoff ähnliche Materie, weil nämlich die Galle durch Hitze keine Gerinnung eingehe. Die weingeistige Auflösung der bis zur Trockne eingedickten Galle war auch noch alkalisch, daher hält Schultz die gewöhnliche Meinung, welche auch Tiedemann und Gmelin hegen, dass die Alkalescenz der Galle von kohlensaurem fixem Alkali herrühre, für unrichtig; sie rühre auch nicht von Ammonium her, weil das Destillat der Galle nicht alkalisch reagirt. Schultz nimmt ein organisches Alkali in der Galle an, ähnlich den Pflanzenalkaloiden; die in der Galle vor-

Digitized by Google

handene Oelsäure denkt er sich in einer Verbindung mit diesem alkalischen Stoffe. Das von Säuren hervorgebrachte Coagulum hält er nicht für Eiweiss, sondern für einen Niederschlag jenes Stoffes. Diesen Stoff glaubte er so darstellen zu können, dass er durch Essigsäure einen Niederschlag der Galle bewirkte, die Essigsäure durch Ammonium neutralisirte, und das essigsaure Ammonium durch Destillation bis zur Trockne abschied. Das braune bittere Residuum war nun im Wasser, Essig und Weingeist löslich, und gab alkalische Anzeigen gegen geröthetes Lacmuspapier; längere Zeit der Luft ausgesetzt, verlor diese Materie ihre Alkalescenz und war weder im Wasser, Essig, noch Weingeist ganz loslich. Offenbar war diese Materie ein Gemenge mit Gallenblasenschleim, welcher nach Berzelius von Essigsäure aus der Galle gefällt wird. Nach dem Niederschlage der Galle durch Essigsäure bleibt, wie Schultz selbst bemerkt, noch eine bitterschmeckende oder bittersüsslich schmeckende Materie in der Auflösung zurück.

d. Succus pancreaticus. Ausser Grant's Beobachtung (Froriep's *Notizen.* 11. 182.), dass bei Loligo sagittata eine dem Pankreas analoge Drüse vorhanden ist, nämlich zwei hellrothe, gelappte, mit dem Gallengang verbundene Drüsen, kennt man das Pankreas nicht bei den Wirbellosen. Selbst unter den Fischen ist es nicht allgemein, bei vielen derselben fehlt es, bei anderen sind Blinddärme in verschiedener Anzahl und Ordnung an seiner Stelle, Appendices pyloricae. Bei dem Stockfisch und Schellfisch häufen sich diese und beginnen sich zu theilen, bei Polyodon folium stellen sie einen in Abschnitte äusserlich getheilten Sack dar, beim Thunfisch sind sie sehr verzweigt und bilden eine ungeheure Anzahl Büschel blind endigender Röhrchen, beim Schwertfisch endigen die Zweige des grossen Ausführungsganges mit einem Bündel kurzer zahlreicher Blinddärmchen, während eine gemeinsame Haut das Ganze umhüllt. Beim Stör endlich ist die ganze Masse scheinbar parenchymatös, und besteht aus einem schwammigen Gewebe von kleinen und grösseren Zellen, und bei den Hayen und Rochen giebt es ein dichteres Gewebe des Pankreas wie bei den höhern Thieren. Siehe das Nähere in dem Drüsenwerk J. Mueller *de penit. gland. struct. Lib. VIII. Tab. VII.* Bei den Fischen ist der Saft der Blinddärme klebrig und reagirt, wie Swammerdam und Tiedemann und Gmelin beobachtet, nicht oder sehr wenig sauer. Hunden hat man das Pankreas ganz oder grösstentheils zerstört, ohne dass ihre Verdauung und übrige Gesundheit gelitten hätte. Man hat nur zuweilen grössere Gefrässigkeit beobachtet. Autenrieth *Physiol.* 2. 69.

In der neuern Zeit haben Mayer, Magendie, Tiedemann und Gmelin den pancreatischen Saft der höheren Thiere untersucht. Mayer (Meckel's *Archiv.* 3. 170.) fand denselben, wie er in einem blasenartigen Behälter bei der Katze sich angesammelt hatte, alkalisch, durchsichtig. Magendie (*physiol.* 2. 367.) fand den Saft des Hundes gelblich, geruchlos, salzig schmeckend, alkalisch, auch sollte er hier wie bei den Vögeln in der Warme gerinnen. Tiedemann und Gmelin sammelten den

Digitized by Google

pankreatischen Saft eines grossen Hundes durch ein in den eingeschnittenen Gang eingelegtes Röhrchen. Alle 6—7 Secunden floss ein Tropfen aus (in vier Stunden beinahe zehn Grammen). Der Saft war klar, etwas opalisirend, liess sich in Fäden ziehen und schmeckte schwach salzig. Dieselben Versuche machten sie an einem Schaf und an einem Pferde. In diesen 3 Fällen reagirte der Saft anfangs schwach sauer, nur die zuletzt abfliessende Portion des pancreatischen Saftes vom Hunde und Pferde reagirte schwach alkalisch. A. Schultze fand den pankreatischen Saft beim Hunde, bei der Katze und beim Pferde sauer, einmal beim Hunde indifferent. Die vergleichende Analyse des Saftes jener 3 Thiere von Gmelin ergab Folgendes: Der pankreatische Saft ist sehr reich an Eiweiss, er enthält kein schwefelblausaures Salz wie der Speichel enthalten soll. An festen Theilen enthält er beim Hunde 8,72, beim Schaf 4—5 Procent, die festen Theile sind:

1. Osmazom.
2. Eine durch Chlor sich röthende Materie, die bloss beim Hunde, nicht beim Schafe gefunden wurde.
3. Eine dem Käsestoff ähnliche Materie, wahrscheinlich mit Speichelstoff.
4. Viel Eiweissstoff, ohngefähr die Hälfte des trockenen Rückstandes betragend.
5. Sehr wenig freie Säure, wahrscheinlich Essigsäure. Die Asche des pankreatischen Saftes beträgt beim Hunde 8,28 Proc. vom trocknen Rückstand, beim Schafe 29,7 Proc.

Sie enthält an löslichen Salzen

a. Kohlensaures Kali (wahrscheinlich essigsaures im Safte), beim Hunde und beim Schafe.

b. Viel salzsaures Alkali.

c. Wenig phosphorsaures Alkali beim Hunde, und beim Schafe.

d. Sehr wenig schwefelsaures Alkali beim Hunde und Schafe. Das Alkali war mehr Natron als Kali. Die nicht im Wasser löslichen Salze der Asche sind wenig kohlensaurer und phosphorsaurer Kalk.

Aus diesen trefflichen Untersuchungen ergiebt sich die Verschiedenheit des pankreatischen Saftes und Speichels, denn der Speichel enthält Schleim und Speichelstoff, im pankreatischen Safte dagegen kommt viel Eiweiss und Käsestoff vor, kein Schleim und wenig oder kein eigentlicher Speichelstoff, Speichel ist alkalisch, Succus pancreat. frisch säuerlich. Der Speichel des Schafes enthält etwas schwefelblausaures Alkali (?), der pankreatische Saft nicht. Die übrigen Salze sind ohngefähr dieselben. Tiedemann und Gmelin *l. c. p.* 25—43.

Leuret und Lassaigne erhielten beim lebenden Pferde in einer halben Stunde 3 Unzen pankreatischen Saft. Er war klar, schmeckte salzig, reagirte alkalisch und enthielt nur $\frac{9}{10}$ Proc. fester Bestandtheile, die sie nach einer wie es scheint oberflächlichen Untersuchung für dieselben wie im Speichel erklärten. Wasser 99,

thierische Materie, im Alkohol auflöslich, thierische Materie, in Wasser auflöslich, Spuren von Eiweiss, Schleim, freie Soda, Chlorsodium, Chlorpotassium, phosphorsaure Kalkerde 00,9.

e. Succus entericus. Ueber den Bau der den Darmsaft absondernden Drüsen ist bereits früher gehandelt worden. Man vergleiche besonders was pag. 490. über den Bau der räthselhaften Körper, die man Peyer'sche Drüsen nennt, gesagt worden. Besondere Drüsenmassen kommen ausser jenen zweifelhaft drüsigen Körpern im Darm der Thiere nicht vor. Der Darmsaft ist von Tiedemann und Gmelin bei hungernden Thieren untersucht worden. Bei nüchternen Hunden erschien die innere Fläche der Schleimhaut wie mit einer dünnen Lage einer sehr consistenten, weisslichen und etwas gelbgefärbten Materie bedeckt, und es fand sich nur sehr wenig ergossene Galle. Wenn Kieselsteine oder Pfeffer verschluckt worden, so war eine grössere Menge eines dünnen und fadenziehenden Schleimes vorhanden, und die Galle war reichlicher ergossen. Die schleimige Masse wurde nach unten im Dünndarm consistenter und gelblich oder gelbbraun, es zeigten sich in ihr grüngelbe oder gelbbraune Flocken, aus Darmschleim, Gallenschleim, Harz, Fett und Farbestoff der Galle bestehend. Die schleimige Flüssigkeit des Dünndarms der Hunde und Pferde enthält im ersten Drittheil oder in der ersten Hälfte: 1. etwas freie Säure, im Fortgange des Dünndarms ward sie meist indifferent, und bei den Pferden enthielt sie doppelt kohlensaures Natron. Die Flüssigkeit des Dünndarms enthielt auch 2. viel Eiweissstoff, wahrscheinlich vom Succus pancreaticus; 3. bei den Pferden ferner eine dem Käsestoff ähnliche Materie und 4. eine durch salzsaures Zinn fällbare Materie beim Pferde, wahrscheinlich Speichelstoff und Osmazom; 5. eine durch Chlor und Sublimat sich röthende Materie bei Pferden. 6. wenig Gallenharz bei Pferden. 7. im obern Theil des Dünndarms der Pferde eine stickstofffreie schwachsaure Materie. Ausserdem die gewöhnlichen Salze thierischer Flüssigkeiten. Tiedemann und Gmelin *die Verdauung. I. p.* 157.

Der Schleim des Blinddarms reagirte bei allen untersuchten Hunden sauer. Im Blinddarm der Pferde dagegen fand sich statt freier Säure doppelt kohlensaures Natron. Viridet (*de prima coctione*) hatte im Blinddarm der Kaninchen gleiche saure Reaction, wie im Magen gefunden.

Ueber die saure Reaction in dem Blinddarme der Thiere hat Schultz weitere Versuche angestellt. Er fand bei den Thieren, wenn sie fasteten, leichter eine alkalische oder neutrale Beschaffenheit der Flüssigkeiten im Blinddarme, was er aus der Neutralisation durch die während des Fastens weiter bewegte Galle erklärt, sonst aber und während der Verdauung reagirte die Flüssigkeit sauer. Diese Reaction findet sich indess gewöhnlich bei den pflanzenfressenden Thieren, die mit einem längern Blinddarm ausgestattet sind, dagegen sie bei den Fleischfressern mit unvollkommenem Blinddarme meistens fehlt. Die Saturation der

Digitized by Google

Säure im Chymus eines Kaninchens, das von Kartoffeln und Gras genährt, und $2\frac{1}{2}$ Stunden nach dem Tode geöffnet worden, erforderte auf 2 Unzen Chymus des Magens $3\frac{1}{2}$ Unzen Ochsengalle; dagegen waren zur Saturation des sauren Inhaltes des Blinddarmes eines Kaninchens auf 1 Unze Darminhalt 5 Drachmen Ochsengalle nöthig. 18 Unzen Chymus aus dem Magen eines Pferdes erforderten zu ihrer Saturation 15 Gran Kali carbonicum oder 1 Unze Chymus $2\frac{1}{2}$ Unze Ochsengalle. Zur Saturation von 1 Unze Inhalt des Coecum gehörten 5 Unzen Ochsengalle. Der Chymus des Magens von einem Schwein erforderte 1,04 bis 1,11 Proc. Kali carbonicum, der Inhalt des Blinddarmes dagegen 0,78 Proc. Kali carbonicum zur Saturation.

V. Capitel. Von den Veränderungen der Speisen im Darmkanal.

Die Auflösung der Speisen setzt voraus, dass die Nahrungsstoffe ihr organisches Gefüge und ihre Cohäsion verlieren, was durch das Kauen grossentheils geschieht. Diese Zertrümmerung findet theils im Munde, theils im Schlunde bei Schlundzähnen, wie bei einigen Fischen, theils im Magen durch die knorpeligen Magenwände des Muskelmagens bei den Körner und Insecten fressenden Vögeln, oder durch einen mit Zähnen bewaffneten Magen, wie bei einigen Crustaceen, Insecten und Mollusken statt. Dieser und der folgende Act in den Verdauungsoperationen, die Auflösung, lassen sich in der That mit den gewöhnlichen chemischen Operationen vergleichen, ohne dass dem Organismus etwas vergeben wird. Der Chemiker pulvert die aufzulösenden oder zu extrahirenden Stoffe, und digerirt sie mit dem Lösungsmittel; auch diese Digestion findet in dem Kropfe der Vögel und in den Magen der Thiere statt. Nach der Extraction der löslichen Stoffe seiht der Chemiker das Gelöste von dem Unlöslichen ab. Auch im Verdauungsprocesse wird also zertrümmert, digerirt, aufgelöst und das Unlösliche abgeschieden.

a. Speichel.

Der Speichel macht die Speisen zum Verschlucken geschickt; ob er etwas zur Auflösung derselben beitrage, und wie weit seine Bestandtheile eine Rolle in der chemischen Verwandlung der Nahrungsstoffe im Magen spielen, ist unbekannt. Seine Wirkung bei der Verdauung scheint keineswegs gross zu seyn, da er den Fischen und Cetaceen fehlt. Spallanzani und Reaumur wollen gefunden haben, dass Thiere das ihnen in durchlöcherten Röhren beigebrachte Futter schneller verdauten, wenn es vorher mit Speichel, als wenn es mit Wasser durchtränkt war. Spallanzani's *Versuche über das Verdauungsgeschäft. Leipz.* 1785. Tiedemann und Gmelin glauben, dass der Speichel durch seinen Gehalt an kohlensaurem, essigsaurem und salzsaurem Kali und Natron einigermaassen, wiewohl nur schwach auflösend wirke (?).

Digitized by Google

Berzelius dagegen bemerkt, dass der Speichel an und für sich aus den Nahrungsstoffen nicht mehr als reines Wasser ausziehe, und ich muss gestehen, dass mir bei den vergleichungsweise mit Speichel und Fleisch, so wie mit Wasser und Fleisch angestellten Versuchen kaum irgend ein Unterschied bemerklich geworden ist.

Sogenannte dynamische Wirkungen des Speichels kenne ich nicht. Auch scheint der Speichel nicht durch Zerstörung der specifischen organischen Eigenthümlichkeiten der Nahrungsstoffe zu wirken. Die giftige Wirkung des Schlangengiftes und des Hundswuthgiftes könnte auf dergleichen Gedanken bringen. Allein ich habe schon bemerkt, dass die Giftdrüsen der Giftschlangen nicht ihre Speicheldrüsen, sondern Angriffsmittel sind, und dass die Giftschlangen ausserdem die gewöhnlichen Speicheldrüsen der Schlangen besitzen. Auch ist es nur zufällig, dass der Speichel der tollen Hunde vorzugsweise giftig erscheint, weil gewöhnlich durch den Biss die Ansteckung geschieht, gleich wie es eben so zufällig ist, dass das venerische Gift gewöhnlich durch die Genitalien ansteckt, indem die Bedingung der Uebertragung auf Schleimhäute hier am häufigsten stattfindet. Nach Hertwig's trefflichen Arbeiten über die Hundswuth stecken auch andere Stoffe der tollen Hunde, als Speichel an, wie z. B. Blut, wenn es eingeimpft wird. Hertwig's *Beiträge zur nähern Kenntniss der Wuthkrankheit. Berl.* 1829. p. 156. 160.

Ob der Speichel an der chemischen Veränderung der Nahrungsstoffe im Magen Antheil habe, weiss man nicht. Man hat nur eine Beobachtung dieser Art, welche von Schwann bestätigt worden ist, nämlich die Bemerkung von Leuchs (Kastner's *Arch.* 1831.), dass Speichel gekochte Stärke in Zucker verwandeln soll, was insofern interessant ist, als auch im Magen die Stärke in Stärkegummi und allmählig in Zucker verwandelt wird.

b. Magenverdauung. Magensaft.

Im Magen werden die Getränke schon grösstentheils aufgesogen, und gelangen nicht durch den Pylorus; die soliden Theile der Speisen werden in eine zum Theil ganz flüssige, zum Theil aus Kügelchen bestehende Materie, *Chymus*, bis auf die unlöslichen Theile, aufgelöst, was nach den meisten Beobachtern schichtweise von den Magenwänden aus, nach den zahlreichen Beobachtungen von Beaumont innerhalb des ganzen Magens geschieht. Ueber die Veränderungen der Speisen, die Zeit, welche zu ihrer Auflösung nöthig ist, haben wir Beobachtungen von Gosse an sich selbst, bei künstlich erregtem Erbrechen (in Spallanzani's Werke mitgetheilt), von Spallanzani, Stevens (*de aliment. concoctione. Edinb.* 1777.), von Tiedemann und Gmelin, von Schultz bei Thieren, und die bei weitem grössere Anzahl von Beobachtungen an einem Menschen mit perforirtem Magen, angestellt von Beaumont. Spallanzani brachte Katzen ein mit Brot gefülltes Röhrchen bei; das Brot war nach 5 Stunden zum Theil aufgelöst, Fleich in einem ähnlichen Versuche nach 9 Stunden. Selbst Knorpel und Knochen, in Röhrchen, Sehnen in Leinewand eingeschlossen, waren nach längerer Zeit erweicht oder aufgelöst.

Digitized by Google

Geronnenes Eiweiss haben Tiedemann und Gmelin beim Hunde nach 4 Stunden zum Theil ungelöst, zum Theil gelöst gefunden. Bei Hunden zeigte sich Faserstoff nach 4 Stunden aufgequollen, ohne faseriges Gefüge, und zum Theil in aufgelöstes Eiweiss verwandelt. Thierleim verliert im Magen die Eigenschaft zu gelatiniren und seine characteristische Reaction gegen Chlor, welches ihn sonst fadenartig fällt. Käse zeigte sich im Magen verflüssigt, ohne in Eiweiss verwandelt zu seyn. Gekochtes Stärkemehl war nach 5 Stunden in Stärkegummi und Zucker verwandelt. Kleber (in Essigsäure und Salzsäure unlöslich) war nach 5 Stunden unverändert. Die Milch gerinnt im Magen und der niedergeschlagene Käse wird wieder aufgelöst, während die Molken weiter gehen. Rohes Rindfleisch war beim Hunde nach 4 Stunden mit einer breiartigen, gallertigen, braunen Masse überzogen. Knochen und Knorpel wurden bei Hunden nach 2—4 Stunden an den Rändern, Ecken und Oberflächen etwas erweicht gefunden. Brot war beim Hunde nach $2\frac{1}{2}$ Stunden fast vollständig aufgelöst. Beim Pferde schien das Futter den Magen in weniger aufgelöstem Zustande zu verlassen.

Beaumont hat während mehrerer Jahre Gelegenheit gehabt, die Verdauung bei einem ihm untergebenen Menschen zu studiren. Dieser Mensch hatte von einer Schusswunde eine ansehnliche Oeffnung im Magen, deren Ränder mit den Rändern der Hautwunde verwachsen waren, und die durch eine vom obern hintern Rande der Wunde ausgehende Falte der Häute des Magens bedeckt war, aber durch Eindrücken der Falte weit geöffnet werden konnte. Das Loch im Magen war 2 Zoll unter der linken Brustwarze, in einer von dort zur Spina oss. il. sinistr. gezogenen Linie, also im linken obern Theile des Magens, nahe dem obern Ende der grossen Curvatur, 3 Zoll von der Cardia. Lag dieser Mann auf dem Rücken, und wurde dann die Hand auf seine Lebergegend gedrückt, und der Körper zugleich auf die linke Seite gedreht, so floss Galle durch den Pylorus und durch ein in das Magenloch eingebrachtes elastisches Rohr aus. Zuweilen, aber selten, wurde sie mit dem Magensaft auch ohne diese Operation vermischt gefunden. Der Chymus wurde aus dem Magen gewonnen, wenn man mit der Hand auf den untern Theil der Magengegend nach aufwärts drückte. Bei vollem Magen floss der Inhalt schon beim Druck auf die Klappe aus. Der leere Magen konnte bis zu einer Tiefe von 5—6 Zoll untersucht werden, wenn er durch künstliche Mittel ausgedehnt erhalten wurde. So konnte man Speise und Trank eintreten sehen. Ueber die Verdauungen dieses Mannes hat nun Beaumont ein vollständiges Journal geführt. Die folgende Tabelle giebt Aufschluss über die Zeit, welche zur Verdauung der verschiedenen Nahrungsmittel nöthig war. Die Nahrungsstoffe wurden mit Brot oder Vegetabilien, oder mit beidem genossen.

Digitized by Google

Nahrungsmittel	Zubereitung	Speisezeit	Arbeit		Ruhe	Bemerkungen
			mässig	angestrengt		
			St. Min.	St. Min.	St. Min.	
Kaldaunen	geschmort	Frühstück	1 00	—	—	
Schweinsfüsse ..	gekocht	—	1 00	—	—	
Wildpret, frisch	gebraten	—	1 35	—	—	
Stockfisch, getrocknet	gekocht	Mittag	2 00	—	—	
Brot und Milch	kalt	—	2 00	—	—	
Truthahn	geröstet	—	2 30	—	—	
Gans, wilde	—	—	2 30	—	—	
Schwein, jung ..	—	—	2 30	—	—	
Gehackt. Fleisch	warm	Frühstück	2 30	—	—	
Austern	roh	Mittag	2 45	—	—	Austern im Magen aufgehangen.
—	gedämpft	—	3 30	—	—	
—	roh	Frühstück	3 00	—	—	nur mit etwas trocknem Brot oder Zwieback.
—	—	Mittag	3 00	—	—	
—	gedämpft	—	3 30	—	—	
Rindfleisch, frisch	geröstet	—	3 30	—	—	
—	—	—	3 00	—	—	
—	—	Frühstück	2 45	—	—	
—	gebraten	—	3 00	—	—	
—	—	—	—	—	3 45	
—	—	—	—	3 30	—	Arbeit bis zur Ermüdung.
—	gekocht	—	4 00	—	—	krankh. Aussehen des Magens.
—	—	Mittag	—	3 30	—	
—	—	Frühstück	3 38	—	—	viel Fett.
—	—	Abendessen	—	—	4 00	ebenso.
—	—	Frühstück	—	—	4 30	ebenso. In liegender Stellung.
—	—	Mittag	3 30	—	—	
—	—	—	—	—	4 00	
—	—	Frühstück	—	—	4 15	
—	—	—	3 30	—	—	
—	—	—	—	—	4 15	
Rindfleisch, gesalzen	—	Mittag	5 30	—	—	
—	—	—	3 30	—	—	
Schweinefleisch, frisch, gesalzen	—	Frühstück	5 15	—	—	
—	—	—	4 30	—	—	
—	—	—	5 15	—	—	ärgerte sich während des Versuches.
—	—	—	6 00	—	—	ungewöhnlich volles Mahl.
—	—	—	4 30	—	—	
—	—	—	4 30	—	—	
—	—	—	4 30	—	—	
—	—	Mittag	4 30	—	—	
—	—	Frühstück	—	4 00	—	
—	—	Mittag	—	3 30	—	
Schweinefleisch, frisch	geröstet	—	6 30	—	—	ungewöhnlich volles Mahl.
—	gebraten	—	3 15	—	—	
—	—	Frühstück	4 30	—	—	

Digitized by Google

Nahrungsmittel	Zubereitung	Speisezeit	Arbeit		Ruhe	Bemerkungen
			mässig	angestrengt		
			St. Min.	St. Min.	St. Min.	
Hammelfleisch	geröstet	Mittag	3 15	—	—	
—	gebraten	Frühstück	—	3 00	—	
—	—	—	3 30	—	—	
—	—	—	4 30	—	—	krankh. Aussehen des Magens.
—	—	Mittag	4 00	—	—	
—	—	Frühstück	4 30	—	—	volles Mahl, grob gekäut.
Eier	hart gek.	—	3 30	—	—	Brot oder Brot und Kaffee.
—	weich gek.	—	3 00	—	—	
—	hart	Mittag	5 30	—	—	Magen krank.
—	—	Frühstück	3 30	—	—	— —
—	weich gek.	Mittag	3 00	—	—	
Wurst	gebraten	Frühstück	3 30	—	—	mit weich gekochten Eiern.
—	—	Mittag	3 00	—	—	
—	geschmort	Frühstück	4 00	—	—	in einem Mousselinbeutelchen eingehängt.
—	—	—	5 00	—	—	
—	gebraten	—	3 30	—	—	Magen krank.
—	—	—	—	4 15	—	volles Mahl. Schwere Arbeit.
Henne	gekocht	—	4 00	—	—	Mit Brot u. Kaffee.
—	—	Mittag	4 00	—	—	Mit Brot und Wasser.
—	—	—	4 00	—	—	— —
Kalbfleisch	gebraten	Frühstück	4 00	—	—	In einem Mousselinbeutelchen eingehängt.
—	—	Mittag	4 00	—	—	
—	—	Frühstück	4 00	—	—	
—	—	Mittag	4 45	—	—	Magen krank.
—	—	Frühstück	—	3 45	—	
—	—	Mittag	4 30	—	—	
—	—	Frühstück	5 30	—	—	Magen krank.
Fleischsuppe u. Vegetabilien	—	—	4 00	—	—	
Butterbrot	mit Kaffee	Frühstück	4 15	—	—	Magen krank.
Brot, trocken	— —	—	3 45	—	—	
— —	mit Kartoffelbrei	Mittag	3 45	—	—	

Es wird nicht ohne Interesse seyn, einige Fälle aus dem Journal von Beaumont noch genauer als Beispiele kennen zu lernen.

Erste Reihe. Exp. 1. Um 12 Uhr brachte Beaumont durch die Magenöffnung des St. Martin an Seidenfäden ein Stück stark gewürztes Boeuf à la mode, ein Stück gesalzenes, fettes Schweinefleisch, ein Stück rohes, gesalzenes, mageres Rindfleisch, ein Stück gekochtes, gesalzenes Rindfleisch, ein Stück Brot und einen Bausch rohen geschnittenen Kohl, von jedem gegen 2 Drachmen. Um 1 Uhr Kohl und Brot halb verdaut. Die Fleischstücke unverändert; Alles in den Magen zurück. Um 3 Uhr Kohl, Brot,

Digitized by Google

Schweinefleisch und gekochtes Rindfleisch, Alles verdaut und vom Faden gegangen, die anderen Stücke sehr wenig verändert; in den Magen zurück. Um 2 Uhr Boeuf à la mode zum Theil verdaut; das rohe Rindfleisch wenig macerirt auf der Oberfläche. Der Versuch wurde wegen Unwohlseins nicht weiter fortgesetzt. Den Tag darauf hatte St. Martin Magenbeschwerden und Kopfweh, Verstopfung, einen schwachen Puls, trockene Haut, belegte Zunge und zahlreiche weisse Flecke oder Pusteln (Aphthen) wie coagulirte Lymphe auf der innern Fläche des Magens. Ein ähnliches Aussehen beobachtete Beaumont später öfter bei Magenbeschwerden.

Zweite Reihe. Exp. 33. Um 1 Uhr ass St. Martin eine Portion geröstetes Rindfleisch, Brot und Kartoffeln; nach einer halben Stunde glich der Mageninhalt einer dicken Suppe, um 4 Uhr war die Chymification vollendet, und um 6 Uhr wurde in dem Magen nichts, als etwas mit Galle gefärbter Succus gastricus gefunden.

Exp. 42. Um 3 Uhr Frühstück von 3 hart gekochten Eiern, Pfannkuchen und Kaffee, um $10\frac{1}{2}$ Uhr waren keine Theile mehr im Magen.

Exp. 43. Um $11\frac{1}{2}$ Uhr 2 gebackene Eier und 3 reife Aepfel, nach 40 Minuten anfangende Digestion, um $12\frac{1}{2}$ Uhr Magen leer.

Exp. 44 An demselben Tage um 2 Uhr geröstetes Schweinefleisch und Vegetabilien; um 3 Uhr halbe Chymification, um 4 Uhr nichts mehr im Magen.

Exp. 45. Um 8 Uhr Gänsefleisch; um 4 Uhr waren $\frac{3}{4}$ des Mageninhaltes fortgegangen, der Rest chymificirt, um $4\frac{1}{2}$ Uhr Magen leer.

Dritte Reihe. Exp. 18. Um $8\frac{1}{2}$ Uhr hängte Beaumont 2 Drachmen frische Bratwurst in einem feinen Musselinsäckchen in dem Magen des St. Martin auf. Der letztere nahm durch den Mund auch von derselben Wurst, gebratenes Hammelfleisch und Kaffee zu sich. Um $11\frac{1}{2}$ Uhr Magen halb leer; der Inhalt des Beutels um die Hälfte vermindert; um 2 Uhr Magen leer, Beutel auch leer bis auf 15 Gran, bestehend aus dünnen Stücken von knorpeligen und häutigen Fasern, und dem Gewürz der Wurst (letzteres 6 Gran).

Während der Verdauung ist die Temperatur im Magen nicht erhöht, wie Beaumont gezeigt hat; sie beträgt im Magen constant 100° Fahrenh., und nimmt nur bei Anstrengungen wie in anderen Theilen um einige Grade zu.

Während der Verdauung ist in der Regel im Magen nur sehr wenig Gas enthalten. Magendie und Chevreul haben es bei einem Hingerichteten untersucht. Es bestand aus:

Sauerstoffgas .	11,00
Kohlensäuregas	14,00
Wasserstoffgas .	3,55
Stickgas . . .	71,45

Die Materien, welche Tiedemann und Gmelin in dem Chymus fanden, sind:

1. Eiweiss. Bei Hunden, nach Fütterung mit gekochten

Eiern, Faserstoff, Fleisch, Brot, Kleber, weniger nach Fütterung mit flüssigem Eiweiss, Käse, Leim und Knochen.

2. Käsestoffähnliche Materie bei mit flüssigem Eiweiss und mit Faserstoff gefütterten Hunden.

3. Durch salzsaures Zinn fällbare Materie nach Kleber, Käse, Milch bei Hunden, nach Stärkemehl und Hafer bei Pferden (wahrscheinlich Osmazom und Speichelstoff).

Die beiden ersten Magen der Wiederkäuer, welche eine kohlensaures Alkali haltige Flüssigkeit enthalten, können hierdurch Pflanzeneiweiss und Kleber aus den Pflanzen ausziehen. Das ausgezogene Flüssige gelangt in den dritten Magen, das Unaufgelöste wird wiedergekäuet und gelangt in den dritten Magen. Nach Tiedemann und Gmelin's, und nach Prevost und Le Royer's (Froriep's *Not.* 9. 194.) Untersuchungen enthält das Aufgelöste der Futtermasse der beiden ersten Magen Eiweiss, in alkalischer Lösung; nach dem Fressen von Hafer enthielt die Flüssigkeit des Chymus der ersten Magen so viel Eiweiss, dass sie bei + 81° C. gerann. Von weniger nährender Materie bekam sie diese Eigenschaft nicht. Prevost und Le Royer haben die Quantität Eiweiss in der ausgepressten Flüssigkeit der Futtermasse des Pansen vom Ochsen sehr gross angegeben. Bei der Verdauung in den beiden ersten Magen entwickelt sich auch Schwefelwasserstoffgas, Kohlensäuregas und Kohlenwasserstoffgas; letzteres bleibt gasförmig, während sich die ersteren in der Flüssigkeit auflösen. Das von frischem Klee sich entwickelnde Gas ist nach Lameyron und Fremy Schwefelwasserstoffgas 0,80, Kohlenwasserstoffgas 0,15, Kohlensäuregas 0,05. Berzelius *Thierchem. p.* 240. Im dritten Magen ist das abgesonderte Lösungsmittel sauer, im vierten noch saurer. Der Labmagen der Kälber enthielt in Tiedemann und Gmelin's Untersuchungen geronnene Milch. Im Labmagen des Ochsen war ein weicher gelblichbrauner Brei. Der Labmagen der Wiederkäuer enthielt 1. Eiweissstoff bei Ochsen und Kälbern, 2. durch Salzsäure sich röthende Materie bei Ochsen und Schafen, 3. durch salzsaures Zinn fällbare Materie bei Schafen.

Marcet hat gezeigt und Prout bestätigt, dass bei Hunden, von denen der eine mit thierischer Nahrung, der andere mit Brot gefüttert wurde, der Chymus bei dem erstern weit eiweissstoffhaltiger war als bei dem letztern. Thomson *Annals of philos.* 1819. Jan. und April.

Bei den Vogeln fanden Tiedemann und Gmelin in der durch Extraction der Nahrung im Kropfe gebildeten Flüssigkeit Eiweiss der Nahrungsstoffe aufgelöst, so dass diese Flüssigkeit zuweilen in der Hitze gerann, Eiweiss nach dem Genuss von Fleisch, Pflanzeneiweiss nach dem Genuss von Getreide und Erbsen. Noch mehr finden sich diese Materien im Muskelmagen.

Theorie der Magenverdauung.

Unter den ältern Lehren über das Wesen der Verdauung sind mehrere offenbar heutzutage bloss von historischem Werthe, wie z. B. diejenige von der Zerreibung der Nahrungsstoffe durch

Digitized by Google

die Magenwände. Es sind im Magen der meisten Thiere keine mechanischen Hülfsmittel dazu vorhanden (Vergl. p. 499.), und dann haben die Versuche von Reaumur und Spallanzani gezeigt, dass in durchlöcherten Röhren eingeschlossene Substanzen, auf welche gar kein Druck statt haben konnte, eben so leicht verdaut werden. Ebenso ist es kaum nöthig, zu bemerken, dass die Theorie von der Putrefaction der Speisen im Magen ungegründet, indem keine Zeichen der Fäulniss an den verdauten Stoffen wahrnehmbar sind, während doch bei 30° R. Temperatur, wenn die Speisen ihrer blossen Zersetzung überlassen wären, sehr bald Zeichen der Fäulniss eintreten müssten. Dann aber verlieren selbst anfangend faule Substanzen während der Verdauung die Putrefaction, wie Spallanzani gezeigt hat.

Bei dem heutigen Zustande der Untersuchungen frägt es sich zunächst:

1. ob die Verdauung ohne Antheil einer Verdauungsflüssigkeit das Wesen derselben in einer chemischen Veränderung der Speisen, Fermentation oder Oxydation bestehe, wodurch sie ihre Cohäsion verlieren und zerfallen. Bei dieser Ansicht giebt es keinen Magensaft als Verdauungsprincip, und was man so nennt, ist das Product, nicht die Ursache der Verdauung.

2. oder ob die Verdauung wesentlich in Auflösung und chemischer Veränderung der Speisen durch ein Lösungsmittel, den Magensaft, bestehe.

Die erstere Theorie erscheint in den Ansichten von Boerhave von der Fermentation, und ist in der neuern Zeit durch C. H. Schulz durch die Ansicht von dem Zerfallen durch Oxydation erneuert worden. Die Theorie der Fermentation schliesst übrigens die Vorstellung von einem wirksamen Magensaft nicht aus.

Bei der Fermentationstheorie dachte man sich eine chemische Wirkung der Principien der Nahrungsstoffe auf einander, welche entweder durch einen Rest der vorhergehenden Verdauung, oder durch ein von dem Magen abgesondertes Ferment entstehen soll. Hiernach wäre also die Säure im Magen ein Product der Fermentation. Diese Theorie ist niemals bewiesen, kann aber jetzt widerlegt werden. Fände in dem Magen eine Fermentation statt, so wäre sie gewiss eigener Art und würde sich von den bekannten Fermentationen unterscheiden, indem, wie sich später zeigen wird, die wesentlichen Erscheinungen der Gährung bei der künstlichen Verdauung fehlen. Die neulich von Schultz vorgetragene Theorie der Verdauung geht zwar nicht von der Fermentation aus, ist jedoch im Princip ähnlich, indem sie behauptet, dass die Speisen nicht durch einen eigenen Magensaft aufgelöst, sondern durch Oxydation umgewandelt würden und dadurch ihre Cohäsion verlören, dass aber die Säure nicht die Ursache, sondern die Folge der Bildung des Chymus sey. Schon Montègre hatte die Existenz eines eigenen Magensaftes geläugnet. Er hatte gefunden, dass, nachdem er alle Magenflüssigkeit ausgebrochen, und den etwaigen Rückstand im Magen durch Verschlingung vom Magnesia neutralisirt hatte, die darauf genommenen Nahrungsmittel nicht weniger chymificirt wurden und nicht we-

Digitized by Google

niger sauer geworden waren. Er hielt also den angeblichen Magensaft für nichts anderes, als für Speichel und Magenschleim, die durch die Chymification verändert worden. Man sieht leicht ein, dass die Chymification in diesen Fällen eben so gut durch die Absonderung einer neuen Quantität Magensaftes erfolgen konnte. Die Gründe, welche Schultz für jene Theorie anführt, sind folgende: Ein eigener Magensaft existire nicht. Was Tiedemann und Gmelin dafür genommen, seyen Reste von Chymus gewesen; ausser der Chymification finde keine Säurebildung statt, und könne auch nicht durch mechanische Reizung der Magenwände hervorgerufen werden. Diesem Satz in der Schultz'schen Theorie widersprechen wenigstens übereinstimmende directe Beobachtungen, sowohl die von Spallanzani, Tiedemann und Gmelin, als die viel entscheidenderen von Beaumont. Dann stützt sich Schultz ferner auf die Analogie der Pflanzen, indem die Nahrungsstoffe der Pflanzen auf eine ähnliche Art vorbereitet würden, und der Nahrungsstoff in dem keimenden Samen durch eine Art Oxydation in Säure und Zucker umgewandelt und löslich werde. Diese Gründe sind sehr gut, es frägt sich hier indess wieder, ob es bei den Thieren ein eigenes Lösungsmittel, einen Magensaft gäbe, der selbst ausser dem Körper Nahrungsstoffe aufzulösen im Stande ist, was, wenn man auch auf die älteren unvollkommeneren Erfahrungen keine Rücksicht nehmen will, durch die zahlreichen übereinstimmenden Beobachtungen von Beaumont, Eberle u. A. bejahend zur Evidenz gebracht wird. Endlich stützt sich Schultz auf die Erfahrung von der Gerinnung der Milch durch den Magen, indem das Sauerwerden der Milch ein Beispiel für die Umwandlung einer nicht sauren Nahrung in sauren Chymus darbiete. Die Milch werde auch durch eine Infusion des trocknen Kalbsmagens geronnen, nachdem alle Säure desselben durch Kali carbonicum abgestumpft worden. Ausserdem mache auch eine Infusion vom frischen Magen eines durch 40 Stunden hungernden Hundes, obgleich sie deutliche Zeichen von Alkalescenz darbiete, die Milch gerinnen; endlich gerinne auch die Milch im Magen saugender junger Hunde, deren Magen nach 12—16 Stunden leer sey und sich neutral und alkalisch verhalte; die Gerinnung erfolge nur langsamer, als wenn sich Säure im Magen befinde. Die Ursache der Gerinnung der Milch ist allerdings nicht allein die Säure des Magensaftes, wie bereits Berzelius zeigte, vielmehr, wie man jetzt mit Bestimmtheit weiss, ein eigenthümliches organisches Princip des Magensaftes.

So wie die Sachen standen, kam Alles darauf an, zu entscheiden: 1. ob es einen eigenen Magensaft giebt? 2. ob dieser Magensaft, gleichviel von welcher Natur, die Speisen in und ausser dem Körper aufzulösen im Stande ist? und 3. wenn diess geschieht, ob es durch die Säure dieses Saftes oder durch andere als existirend nachweisbare Principien erfolgt, und 4. ob mit dieser Auflösung eine chemische Veränderung verbunden ist.

Erste Frage. Giebt es einen Magensaft? Diese Frage ist bereits in dem vorhergehenden Capitel beantwortet, wo die zahlreichen Versuche von Tiedemann und Gmelin, namentlich aber die

Digitized by Google

entscheidend gewordenen von Beaumont aufgeführt sind, welcher den Magensaft des St. Martin im nüchternen Zustande durch mechanische Reizung in merklicher Quantität zur Absonderung brachte, und aus dem Magen durch die krankhafte Oeffnung desselben herausnahm.

Zweite Frage. Ist der Magensaft ein lösendes Mittel der Speisen innerhalb und ausserhalb des thierischen Körpers? Hier kommt Alles auf die Möglichkeit einer künstlichen Auflösung der Speisen ausser dem Magen durch Vermischung derselben mit dem Magensafte an. Die künstlichen Verdauungen sind zuerst durch Spallanzani berühmt geworden. Spallanzani verschaffte sich Magensaft der Vögel, indem er kleine Schwämme an Fäden durch den Mund bis in den Magen brachte, nach einiger Zeit wieder herauszog und mit der hierdurch gewonnenen Flüssigkeit gekaute Nahrungsmittel vermischte, und nun dieses Gemeng in kleinen Glasgefässen in seiner Achselhöhle erwärmte; nach 15 Stunden oder zwei Tagen schienen die Nahrungsmittel in Chymus verwandelt zu seyn. Diese Versuche schienen durch die von Montègre im Jahre 1812 dem französischen Institut vorgelegten Beobachtungen widerlegt zu werden. Montègre konnte willkührlich erbrechen; er verschaffte sich nüchtern dadurch den vorgeblichen Magensaft, den er in den meisten Fällen merklich sauer fand. Nachdem Stevens bei einer künstlichen Verdauung ein ähnliches Resultat wie Spallanzani gefunden hatte, haben Tiedemann und Gmelin ebenfalls mit dem Magensafte zweier Hunde eine künstliche Verdauung versucht. Im ersten Versuche wurden 10 Grammen mit 3 Grammen gekochtem Rindfleisch, und 10 Grammen mit einem Würfel von der Rinde befreiten Brotes gemengt und in einem dritten Gefässe gleichviel Fleisch mit der innern Wand des Magens in Berührung in denselben eingewickelt. Ebenso verfuhren sie mit Brot und Magenhaut, endlich stellten sie ein gleiches Stück Fleisch mit Wasser, und ein gleiches Stück Brot mit Wasser zusammen. Sämmtliche Gefässe wurden einer Temperatur von 30—40° Cent. 8 Stunden lang ausgesetzt. Das Fleisch im Magensafte war auf der Oberfläche zu einem röthlichweissen, sehr weichen, leicht abzuschabenden Brei erweicht. Das Fleisch in der Magenhaut hatte keinen solchen Ueberzug, war höchstens ein wenig weicher, als das mit reinem Wasser zusammengebrachte Fleisch, welches ganz hart und zähe war, ohne dass sich etwas Bemerkliches abschaben liess. Das Brot im Magensafte war in eine weiche, leicht abzuschabende, weissliche Masse verwandelt; fast eben so weich war das Brot in der Magenhaut geworden, während das Brot im Wasser weniger weich als das im Magensafte geworden war. In dem zweiten Versuche mit 62 Grammen Magensaft stellten sie in verschiedenen Gefässen Magensaft und rohes Rindfleisch, Magensaft und gekochtes Eiweiss, Wasser und Rindfleisch, Wasser und Eiweiss, Wasser mit 10 Tropfen destillirten Essig und Rindfleisch, Wasser mit eben so viel Essig und Eiweiss zusammen. Die Temperatur war wie in dem vorigen Versuche, die Dauer 10 Stunden. Das Fleisch im Magensafte war oberflächlich sehr erweicht, so dass sich eine

Digitized by Google

breiartige Materie abschaben liess, das Eiweiss im Magensafte war ebenfalls oberflächlich erweicht, und verhielt sich ungefähr eben so, wie das Eiweiss in dem Magen des Hundes, der mit geronnenem Eiweiss gefüttert war. Das Fleisch im Wasser war weisslich und ganz fest, während das im Magensafte blassroth geworden war; auch das Eiweiss im Wasser war ganz fest. Die andern Stoffe im Essigwasser hatten gar keine Erweichung erlitten. Tiedemann und Gmelin a. a. O. p: 209. 210.

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind nun die künstlichen Verdauungen von Beaumont, welche wir hier im Auszuge mittheilen.

Erste Reihe. Exp. 2. August 7. 1825. Beaumont gewann von dem Magensafte des St. Martin, nachdem derselbe 17 Stunden gefastet hatte, auf die früher beschriebene Weise 1 Unze. Darein legte er ein ganzes Stück gekochtes, frisch gesalzenes Rindfleisch von 3 Drachm., und setzte das Gefäss im Wasserbade einer Temperatur von 100° F. aus. In 40 Minuten hatte die Digestion deutlich auf der Oberfläche des Fleisches begonnen, nach 50 Minuten war die Flüssigkeit trüb geworden, die äussere Oberfläche begann sich zu zertheilen und lose zu werden; nach 2 Stunden war das Zellgewebe zerstört und die Muskelfasern lose und unzusammenhängend geworden; nach 6 Stunden waren sie fast alle gänzlich verdaut und nur wenige Fasern übrig geblieben, nach 10 Stunden war Alles verdaut. Der im Anfange des Versuchs klare Magensaft setzte beim Stehen ein feines Sediment zu Boden. Zu gleicher Zeit mit diesem Versuche hatte Beaumont in dem Magen des St. Martin ein kleines Stück Rindfleisch aufgehängt, welches nach 1 Stunde so wie in der künstlichen Verdauung verändert, nach 2 Stunden aber ganz verdaut war.

Zweite Reihe. Exp. 24. December 14. 1829. Beaumont gewann $1\frac{1}{2}$ Unzen Magensaft durch die äussere Oeffnung des Magens von St. Martin nach einem Fasten von 18 Stunden, und brachte diesen mit 12 Drachm. frisch gesalzenen, gekochten Rindfleisches zusammen, im Wasserbad von 100° F. Nach 6 Stunden war das Fleisch halb aufgelöst; nach 24 Stunden wog der trocken gequetschte Rest 5 Drachm. 2 Scrup. 8 Gr.

Exp. 25. 20 Minuten, nachdem St. Martin eine gewöhnliche Mahlzeit von gekochtem, gesalzenem Rindfleisch, Brot, Kartoffeln und Rüben mit einem Glas Wasser zu sich genommen hatte, gewann Beaumont durch die äussere Oeffnung ein Gefäss voll des Mageninhaltes, und setzte es einer Temperatur von 90—100° F. aus. Nach 5 Stunden fand sich nur ein geringer Unterschied zwischen der künstlichen und natürlichen Verdauung. Von ähnlichem Erfolge ist das Exp. 26.

Hier hatte St. Martin eine Mahlzeit von Brot, 8 Unzen frisch gesalzenen, magern Rindfleisches, 4 Unzen Kartoffeln und 4 Unzen gekochter Rüben zu sich genommen. Nach 45 Minuten nahm Beaumont einen Theil des Mageninhaltes heraus. Die Textur des Fleisches war in kleine weiche und pulpöse Fetzen aufgelöst, das Fluidum trüb und leimig; diese Materie wurde wie gewöhnlich erwärmt. Nach 2 Stunden vom Anfange des Versuchs nahm Beau-

Digitized by Google

MONT eine neue Portion Nahrung heraus. Diese verhielt sich in Hinsicht der fortgeschrittenen Verdauung fast eben so wie bei der künstlich fortgesetzten Verdauung: Bei der letztern waren fast alle Partikeln von Fleisch verschwunden und in ein röthlichbraunes Sediment verwandelt, während lockere, weisse Coagula an der Oberfläche der Flüssigkeit schwammen. Bei der zuletzt herausgenommenen Portion wurde die künstliche Verdauung fortgesetzt. Nach 3 Stunden vom Anfange des Versuchs hatte die Verdauung in beiden Gefässen gleiche Fortschritte gemacht; am andern Morgen (der Versuch war um 3 Uhr Nachmittags begonnen) war Alles verdaut bis auf einige Ueberbleibsel von Vegetabilien. Die Contenta der Gläser waren in dieser Zeit von der Consistenz einer dünnen Gallerte, von einer hellbraunen Farbe, salzigem und saurem Geschmack.

Exp. 31. März 9. 1831. BEAUMONT gewann aus dem leeren Magen des ST. MARTIN 2 Unzen Magensaft, theilte diesen in zwei gleiche Theile, und legte in jeden eine gleiche Quantität Roastbeef: Den einen Theil erwärmte er im Wasserbade bei 99° F., den andern liess er an der offenen Luft bei 34° stehen. Dieselbe Quantität Fleisch that er in eine gleiche Quantität Wasser und liess sie unerwärmt stehen. 1 Stunde darauf hatte ST. MARTIN sein Frühstück aus demselben Fleisch mit Zwieback, Butter und Kaffee geendet. Um 10 Uhr nahm BEAUMONT eine Portion theilweise verdauter Nahrung aus dem Magen und erwärmte sie wie gewöhnlich. Das Fleisch der künstlichen Verdauung und Wärme war in demselben Zustande wie das des Magens, das Fleisch des kalten Magensaftes war weniger verdaut, das Fleisch in dem blossen Wasser war nur macerirt, noch eben so wie nach dem Kauen. 2 Stunden 45 Minuten nach Anfang des Versuchs war in dem Magen Alles verdaut und weggegangen. Da 6 Stunden nach dem Anfange des Versuches die Fleischstückchen in dem Magensafte halb verdaut, nicht weiter aufgelöst waren, so nahm BEAUMONT 12 Drachm. Magensaft aus dem leeren Magen des ST. MARTIN, und setzte sie zu den künstlichen Verdauungen mit Magensaft, auch zu der Masse, die aus dem Magen genommen war. Darauf begann die Verdauung wieder und schritt regelmässig fort, aber schneller in der aus dem Magen genommenen Portion; in letzterer blieb indess ein solides Stück Fleisch, welches wahrscheinlich ungekaut verschlungen war, unaufgelöst. Die Gefässe mit kaltem Wasser und kaltem Magensafte waren 8 Stunden nach Anfang des Versuchs wenig verändert. Nach 24 Stunden zeigten die Portionen folgende Erscheinungen: Die eine Stunde nach dem Essen aus dem Magen genommene Portion war vollständig verdaut, und in eine dickliche, breiige Masse von röthlichbrauner Farbe verwandelt, mit Ausnahme des ungekauten Stücks Fleisch. Diese Portion hatte einen scharfen, ranzigen Geruch, und war etwas bitter. Die Portion Magensaft mit Fleisch war sehr ähnlich der erstern, obgleich weniger vollkommen verdaut; sie war nicht so consistent, aber von demselben scharfen Geruch und bitterem Geschmack, zugleich empyreumatisch und schwach faulig riechend. Die kalten Portionen Fleisch und Magensaft, Fleisch

Digitized by Google

und Wasser, glichen einander sehr, beide waren macerirt, aber nicht verdaut; kaum hatte der Magensaft etwas mehr als das Wasser eingewirkt. Dieser hatte übrigens einen eigenthümlichen Geschmack erhalten; seine Farbe war dunkelbraun, die wässrige Portion röthlichgrau. Ungefähr zur selben Zeit des andern Tages, nämlich eine Stunde später, als der Versuch am ersten Tage begonnen hatte, setzte Beaumont diese beiden Portionen dem Wasserbade aus, und behandelte sie so 24 Stunden. In der Portion im Magensafte schritt die Verdauung nun deutlich vor: das Fleisch verminderte sich, und eine dünne, kleisterartige Flüssigkeit bildete sich. Die wässrige Portion zeigte keine anderen Erscheinungen als die einer einfachen Maceration; gegen das Ende der letzten 24 Stunden begann die faule Fermentation.

Dritte Reihe. Exp. 15. December 15. 1832. Frühstück von Beefsteak, Brot und Kaffee; zur selben Zeit kaute St. Martin 4 Drachm. Beefsteak, welches in Magensaft, der vorher aus dem Magen genommen wurde, gelegt wurde. Zu einer andern gleichen Quantität Magensaft legte Beaumont ein gleiches Stück Fleisch, aber ungekaut: beide wurden wie gewöhnlich erwärmt, eben so eine gleiche Portion Fleisch mit einer Unze Wasser. Nach $2\frac{1}{2}$ Stunden war die Mahlzeit in dem Magen beinahe verdaut und mehr als die Hälfte schon fortgegangen; verglichen mit den künstlichen Verdauungen glich dieser Chymus beinahe dem gekauten Fleische und dem Magensafte, war aber mehr verdaut und dünner, und enthielt Oeltheilchen und Brot. Das ungekaute Fleisch war nicht so dick und gelatinös, von dunklerer Farbe; das Stück Fleisch war nicht sehr verkleinert, die Oberfläche nur ein wenig zerstört, erweicht und mit einer grauen Haut bedeckt. Die wässerige Portion hatte keine oder wenig Veränderung erfahren. Die künstlichen Verdauungen wurden 24 Stunden fortgesetzt: die aus dem Magen genommene Portion blieb fast in demselben Zustande. Der Magensaft mit gekautem Fleische stellte eine dicke, breiige, halbflüssige Masse mit einigen deutlichen Fleischfibern dar, welche auf den Boden einer gelblich-molkigen Flüssigkeit sanken. Das Fleisch im Wasser hatte keine andere Veränderung als anfangende Fäulniss erfahren. Das ungekaute Fleisch im Magensafte war ungefähr um die Hälfte vermindert, der Rückstand locker und weich, das Fluidum war trübe mit einem feinen braunen Sediment wie in der gekauten Portion. Vergl. *Exp.* 23. 28. 33.

Exp. 48. Am 8. Januar 1833. $\frac{1}{2}$ Unze Magensaft wurde ohne Schwierigkeit herausgenommen. In zwei gleiche Theile getheilt, brachte sie Beaumont in besondere Gläser; in ein drittes goss er 2 Drachm. einfaches Wasser. Zu jedem der 3 Gläser that er ein einzelnes Stück Schöpsenherz von 11 Gr. Ein Glas mit Magensaft und Herz brachte er in die Achselhöhle, das andere zugleich mit dem Wasserglase stellte er unter ziemlich häufigem Umschütteln an einen kühlen Ort von ungefähr 46° Fahr. Um 7 Uhr Nachmittags war das Stück im warmen Magensafte halb verdaut; die Flüssigkeit undurchsichtig röthlichbraun; das Herz im kalten Magensafte sehr wenig angegriffen, an der Oberfläche mit einer dün-

Digitized by Google

nen, glutinösen Schicht bedeckt und die Flüssigkeit ein wenig trübe. Das Stück im Wasser war nicht im Mindesten afficirt, und das Wasser war vollkommen durchsichtig, als wäre es eben eingegossen. Am 9. Januar 9 Uhr Vormittags zeigten die drei Muskelstückchen folgende Resultate: das im warmen Magensafte, als es herausgenommen und eben so trocken gemacht war, wie beim ersten Hineinlegen, wog $7\frac{1}{2}$ Gr.; das im kalten Magensafte, eben so behandelt, wog $12\frac{1}{2}$ Gr., indem es durch Einsaugung des Magensaftes $1\frac{1}{2}$ Gr. gewonnen hatte; das im einfachen Wasser wog 11 Gr., hatte also weder etwas verloren, noch etwas gewonnen. Die im ersten Glase zurückgebliebenen $3\frac{1}{2}$ Gran waren in einem ganzen Stücke von derselben Form, wie es zuerst hineingelegt war, aber sehr zart und weich und kaum im Stande, den hinreichenden Druck beim Aufheben mit den Fingern zu ertragen; sie waren ein vollständiger Brei. Das Muskelstück im zweiten Glase hatte im Umfange ein wenig zugenommen, erschien geschwollen, zart, schleimig und weich, hatte aber noch hinreichende Stärke des Gewebes, um einem beträchtlichen Druck beim Aufheben zu widerstehen. Es war nicht aufgelöst. Das Stück im Wasser behielt seine Festigkeit und war unverändert, wenn man einige Blässe der Oberfläche durch die Maceration abrechnet. Am 10. Januar Morgens 8 Uhr zeigten sich folgende Erscheinungen: Das erste Stück in dem warmen Magensafte wog $1\frac{1}{2}$ Gr., indem es in 23 Stunden nur 2 Gr. verloren hatte; es hatte dieselbe Form und ungefähr dieselbe Consistenz wie gestern. Ein röthlichbraunes Sediment war auf dem Boden der molkenfarbigen Flüssigkeit. Das zweite Stück im kalten Magensafte wog etwas über 9 Gran, hatte also etwa $3\frac{1}{2}$ Gran verloren; das im Wasser war unverändert und wog immer noch 11 Gran. Am 10. goss Beaumont in das Glas mit dem warmen Magensafte und Muskelfleische $\frac{1}{4}$ Drachme frischen, eben herausgenommenen Magensaft, nahm es wieder in die Achselhöhle auf, und in 5 Stunden war der Inhalt bis zu einer kaum bemerkbaren Spur aufgelöst.

Das Muskelstück im kalten Magensafte, in der Temperatur zwischen 50—60° F. bis zum 11. Morgens 9 Uhr erhalten, wog 7 Gr., hatte dieselbe Form, wie gestern, und dieselbe Textur. Die Flüssigkeit war mehr undurchsichtig und milchicht geworden, und der Bodensatz vermehrt.

Das Stück im Wasser hatte sich nicht verändert und wog genau noch 11 Gran. Um 9 Uhr Vormittags diese zwei Gläser in die Achselhöhle. Abends 9 Uhr war der Rest des Muskelstückes in dem am Morgen in die Achselhöhle gebrachten Glase mit Magensaft fast ganz gelöst, indem nur 1 Gr. als zarter Brei zurückblieb.

Das Muskelstück im Wasser blieb unverändert, und wog gerade so viel als zuerst; aber es begann einen heftig stinkenden Geruch zu verbreiten, und in wenig Tagen wurde es sehr faulig. Es wurde jedoch seine erste Beschaffenheit durch 3 Drachm. frischen Magensaftes, den er am 21. hinzugoss, fast ganz wieder hergestellt. Als es ins Wasserbad gestellt, zu digeriren und bald dar-

Digitized by Google

auf zu chymificiren begann, verlor es seinen stinkenden Geruch und erlangte einen stark sauren, oder vielmehr scharfen Geschmack.

Auf diese Art sind von Beaumont noch eine Menge künstlicher Verdauungen angestellt, wie in den Exp. 58. 66. 78. 84. 85. 86. 95. (Magensaft und Kartoffeln) 96. 101. 104. 105. 106. 109. 110. 111. 112. 115. Im Allgemeinen fand immer derselbe Erfolg statt. Der Magensaft zeigte sich als Lösungsmittel für die verschiedensten Speisen. Was die Glaubwürdigkeit des Verfassers betrifft, so ist zu erwähnen, dass derselbe zufällige Erscheinungen bei den Versuchen immer mit grosser Gewissenhaftigkeit angiebt, und dass er sich auf das Interesse mehrerer Gelehrten, Silliman, Knight, Yves, Hubbard, Dunglisson, Sewall, Jones, Henderson an diesen Versuchen bezieht. Es ist also nach diesen Versuchen nicht entfernterweise zweifelhaft, dass der Magensaft wirklich in und ausser dem Körper ein Lösungsmittel organischer Substanzen ist.

Dritte Frage. Sind die lösenden Principien im Magensafte Säuren oder andere unbekannte Stoffe?

Tiedemann und Gmelin neigten sich zu der Theorie, dass die Auflösung der Speisen durch die im Magensafte vorgefundenen Säuren, also durch Essigsäure und Salzsäure geschehe.

Um die auflösende Wirkung der im Magen vorkommenden Säuren auf einige nicht im Wasser lösliche organische Stoffe kennen zu lernen, stellten sie diese Säuren mit thierischen Substanzen bei ungefähr 10° C. einige Wochen zusammen.

Die aufzulösenden Stoffe waren:

1. Faserstoff aus dem Blute der Kälber.
2. Faserstoff aus dem Blute der Ochsen.
3. Faserstoff aus dem Blute der Pferde.
4. Die Haut dicker Venenstämme von einem Pferde.
5. Die Haut dicker Arterienstämme von einem Pferde.
6. Hart gekochtes Hühnereiweiss.
7. Darmschleim aus dem Dünndarm eines Hundes.
8. Darmschleim aus dem Dünndarm eines Pferdes.

Ueberall waren die Gewichtsverhältnisse, wobei diese Materien in feuchtem Zustande bestimmt wurden, die Temperatur und die Zeit dieselben.

Essigsäure.

1., 2. und 4. absorbirte sämmtliche Essigsäure und schwoll damit zu einer durchscheinenden Masse auf, die sich beim Erwärmen mit einer neuen Menge von Säure völlig löste.

Bei 3., 5. und 6. blieb wenig flüssige Säure, welche durch Galläpfeltinctur und blausaures Eisenkali stark gefällt wurde. Der aufgequollene Rückstand von 3. und 5., mit mehr Säure erwärmt, wurde noch gallertartiger und löste sich grösstentheils auf; der von 6. war minder aufgequollen und veränderte sich auch in der Wärme weniger.

Der Schleim 7. und 8. blieb in der kalten Essigsäure ziemlich unverändert, so dass sich diese mit Galläpfeltinctur nicht deutlich trübte; doch löste er sich beim Erhitzen mit frischer Essigsäure grösstentheils auf.

Digitized by Google

Salzsäure.

Die kalte Salzsäure hatte, nach der Wirkung der Galläpfeltinctur zu urtheilen, von den Materien 1. bis 6. sehr viel, vom Schleim 7. und 8. nur wenig gelöst. Tiedemann und Gmelin a. a. O. p. 332.

Beaumont hat auch mehrere Versuche über künstliche Auflösung der Nahrungsmittel durch Säuren, und zwar im Vergleich mit gleichzeitigen Versuchen mit Magensaft, angestellt.

Vierte Reihe. Exp. 46. Beaumont nahm 3 Gläser, goss in das erste 2 Drachm. Magensaft, in das zweite 2 Drachm. gewöhnlichen Weinessig, und in das dritte 2 Drachmen Wasser, und fügte jedem einzelnen 10 Gr. frisches Eiweiss hinzu.

Diese drei Gläser in die Achselhöhle genommen und 2 Stunden lang geschüttelt, zeigten Folgendes: Die Gerinnsel im Magensafte waren halb gelöst und die Flüssigkeit milchicht; die im Weinessig und Wasser blieben dieselben, und ihre Flüssigkeit unverändert. In 5 Stunden war das Eiweiss im Magensafte vollständig aufgelöst und die Flüssigkeit mehr undurchsichtig und weiss; in den beiden anderen Gläsern zeigte sich dasselbe, wie bei der letzten Besichtigung; die Gerinnsel im Weinessig wogen herausgenommen 9 Gr., die im Wasser waren zu lose und schäumig, als dass sie hätten herausgenommen und gewogen werden können.

Dritte Reihe. Exp. 115. Beaumont machte verdünnte Salzsäure in Stärke und Geschmack dem Magensafte so ähnlich als möglich, und nahm davon 3 Drachm., vermischte sie mit 1 Drachm. bis zu fast demselben Geschmack verdünnter Essigsäure, und goss das Gemisch auf 1 Scrup. fein geschnittenes, gebratenes Rindfleisch. Dieselbe Quantität eben so zubereitetes Fleisch legte er in 4 Drachm. Magensaft. Nachdem beide Gefässe $6\frac{3}{4}$ Stunden im Bade gestanden, dann herausgenommen und filtrirt worden, wog das im Magensafte gewesene Fleisch nur 2 Gr., wogegen das in den Säuren digerirte sich nicht aufgelöst, sondern nur sein fibröses Gefüge verloren hatte, indem es eine zitternde, gallertartige Masse bildete, die zu zäh war, um durchs Filtrum zu gehen, und mehr als beim Hineinlegen in die Säuren wog. Zugleich erschien es nicht dem Chymus ähnlich, noch dem im Magensafte digerirten Fleische. Nach abermaliger achtstündiger Digestion im Bade war das Fleisch in den Säuren fast ganz aufgelöst, und liess, wenn es durchs Filtrum lief, nur eine sehr geringe Menge der gallertartigen Substanz zurück, die bei der ersten Untersuchung so häufig war. Die Flüssigkeit war nun der durch Digestion des Fleisches mit dem Magensafte erzeugten ähnlicher, obgleich nicht durchaus gleichartig, indem letztere, undurchsichtig und von weisslichgrauer Farbe, ein dunkelbraunes Sediment beim Stehen zeigte, während die der sauren Digestion ebenfalls undurchsichtig, aber von röthlichbrauner Farbe war und kein Sediment absetzte.

Zwei Drachmen Galläpfelinfusion bewirkten in der Digestion mit Magensaft einen feinen, röthlichbraunen Niederschlag, indem die Flüssigkeit dieselbe Farbe annahm. In der Digestion mit den Säuren brachten die 2 Drachm. Galläpfelinfusion einen viel

Digitized by Google

copiöseren Niederschlag hervor, worüber eine klarere und dünnere Flüssigkeit von weisslicher, fast durchsichtiger Farbe stand.

Exp. 104. Um 9 Uhr Vormittags nahm Beaumont 40 Gr. gekautes, gekochtes Rindfleisch, theilte es in 2 gleiche Theile, legte den einen in 4 Drachm. Magensaft und den andern in 4 Drachm. einer Mischung aus 3 Theilen verdünnter Salzsäure, und 1 Theil verdünnter Essigsäure, die durch zugesetztes Wasser dem Magensafte an Geschmack so ähnlich als möglich gemacht war, und stellte beide Gläser ins Bad. Um 6 Uhr des Abends war im Magensafte Alles aufgelöst; die Digestion mit den Säuren liess bei dem Durchseihen 9 Gr. Rückstand von gallertartiger Consistenz. Die Flüssigkeit der Digestion mit Magensaft war undurchsichtig hellgrau, und liess beim Stehen ein braunes Sediment fallen; die andere war ebenfalls undurchsichtig, aber röthlichbraun, und zeigte kein Sediment.

Exp. 105. Früh 9 Uhr nahm Beaumont 40 Gr. reine trockne Ichthyocolla, theilte sie in 2 gleiche Theile, legte den einen in 4 Drachmen einer Mischung von Essigsäure und Salzsaure, in derselben Art wie im Experiment 104 bereitet, den andern in 4 Drachmen Magensaft, und stellte beide ins Bad. Um 6 Uhr Abends war die Ichthyocolla im Magensafte ganz aufgelöst, die in den verdünnten Säuren liess 3 Gran Rückstand von gallertartiger Consistenz auf dem Filtrum. Die Flüssigkeit in der Mischung von Magensaft war undurchsichtig weisslich, mit wenigem feinem Sediment von brauner Farbe, die von den Säuren ebenfalls undurchsichtig, aber von röthlichbrauner Farbe, dünner, schleimiger Consistenz und ohne Sediment. Als er zu letzterer 1 Drachm. Galläpfelinfusum zugoss, entstand sogleich eine reichliche rahmähnliche Flüssigkeit, und langsam fiel ein zartes compactes Sediment zu Boden. Als eben so viel Galläpfelinfusum zu den Säuren gesetzt war, bildete unmittelbar darauf die ganze Masse ein grobes, braunes Coagulum, das nach einigem Ruhigstehen ein häufiges, loses, bräunliches Sediment, und eine hellgefärbte, durch Stehen weiss und milchig werdende Flüssigkeit sich abscheiden liess; das Sediment wurde compact und blieb so.

Die Präcipitate, nach Hinzufügen des Galläpfelinfusum herausgenommen und filtrirt, wogen: das aus dem Magensaft 18 Gr., das aus den Säuren 40 Gr., indem der Gewichtsunterschied ungefähr gleich war der hineingelegten Gelatina.

Exp. 106. Am folgenden Tage früh 9 Uhr wurde ganz dasselbe Experiment (105) wiederholt. Nachmittags 15 Minuten nach 3 Uhr war im Magensafte alles bis auf eine Kleinigkeit aufgelöst, in den Säuren fast eben so, nur blieben 6 Gr. gallertartige Substanz auf dem Filtrum zurück. Die Flüssigkeit im Magensafte hatte eine blaulichweisse Farbe, und die andere eine gelbliche wie trockene Gelatina. Um 6 Uhr war in den Säuren die Gelatina aufgelöst, und die überstehende Flüssigkeit in beiden Gefässen sehr ähnlich.

Eine Drachme Galläpfelinfusum, beiden Mischungen hinzugefügt, bildete sogleich lose hellgefärbte Coagula in beiden. Aus dem Magensaftgemische fiel ein compactes Sediment zu Boden,

Digitized by Google

worüber eine undurchsichtige, milchichte Flüssigkeit stand. Die groben Coagula in dem Säuregemische blieben lange Zeit durch die ganze Flüssigkeit suspendirt und fielen allmählig nieder. Nach 48 Stunden waren beide Niederschläge am Boden zu einer compacten Masse geworden, und zeigten deutliche Theilchen von ganz ungelöster Gelatina, mit einer schmutzigweiss gefärbten, quarkähnlichen Substanz vermischt.

Exp. 96. Nachmittags 3 Uhr nahm Beaumont 2 gleiche Theile, jeden zu 2 Drachm., Speichel, machte sie säuerlich, den einen mit Essigsäure, den andern mit Salzsäure, bis sie ungefähr den Geschmack des Magensaftes angenommen hatten, und legte darauf in jedes Glas 2 Stückchen Pastinake und 2 Stückchen Moorrübe, von beiden je eins gekocht und das andere roh; jedes wog 10 Gr. Nun wurden beide Gefässe ins Bad gebracht. Den folgenden Tag 3 Uhr Nachmittags hatte die Moorrübe im Speichel mit Salzsäure nichts an Gewicht verloren; die Pastinake nur 2 Gr. In der Essigsäure waren beiderlei Wurzeln unverändert. Beide Flüssigkeiten waren in ihren bemerkbaren Eigenschaften und Erscheinungen dieselben geblieben. Nachdem sie noch 24 Stunden unter häufigen Bewegungen im Bade gehalten worden, hatte die Pastinake 4 Gr. und die Moorrübe nichts an Gewicht verloren in der Salzsäuremischung. Die Pastinake in der Essigsäure hatte 6 Gr. und die Moorrübe 4 Gr. verloren, aber es schien mehr durch Maceration als durch Auflösung wie bei der Verdauung geschehen zu seyn.

Er mischte nun Alles zusammen und hielt es noch 24 Stunden im Bade, wo dann das ganze vegetabilische Ueberbleibsel 12 Gr. wog. Die Flüssigkeit erschien jetzt ein wenig chymusartiger und mehr trübe.

Um die Richtigkeit der Theorie, dass das auflösende Princip des Magensaftes die Säure desselben sey, zu prüfen, habe ich auch schon längst einige Versuche gemacht. Ich legte Stückchen Fleisch von einigen Gran und kleine Würfel von geronnenem Eiweiss in gleiche Quantitäten sehr verdünnter Salzsäure, Essigsäure, Milchsäure, Weinsteinsäure und Kleesäure. Obgleich sich nun bald aus der Flüssigkeit ein Theil des aufgelösten Stoffes mit den gewöhnlichen Reagentien niederschlagen liess, indem eine Trübung entstand, so zeigte sich doch die Hauptmasse Fleisch und Eiweiss von einigen Gran selbst nach mehreren Tagen durchaus nicht merklich verändert, ja es behielten sogar die kleinen Würfelchen von Eiweiss Wochen lang ihre Ecken und Kanten. In der Digestionswärme wird auch nicht viel mehr auf diese Art aufgelöst. Unter jenen Säuren schien die Kleesäure, die für den menschlichen Körper schon in kleinen Quantitäten bekanntlich ein Gift ist, am stärksten zu wirken. Das Menstruum wurde nach einiger Zeit trübe und es setzte sich auch ein weisslicher Satz sparsam zu Boden; aber an dem Fleischstückchen und dem Eiweiss zeigte sich doch keine merkliche Veränderung. Zur selbigen Zeit setzte ich ein Gläschen mit verdünnter Essigsäure und kleinen Fleischstückchen 24 Stunden dem Strom einer starken galv. Säule aus; dasselbe wurde mit Kochsalzauflösung versucht;

Digitized by Google

aber auch jetzt zeigte sich keine irgend merklich verstärkte Auflösung. So gross die Auflösungskraft der Säuren für mineralische Substanzen ist, so gering ist sie für organische Substanzen, und bedenkt man, dass verdünnte oder selbst concentrirte Säuren ein kleines Stückchen Fleisch oder Eiweiss von einigen Granen in vielen Tagen nicht ganz aufzulösen vermögen, so verliert die scheinbar so einfache Theorie von der Auflösung der Nahrungsmittel durch die Säure des Magensaftes alle Wahrscheinlichkeit, die sie ohnehin für diejenigen nicht haben konnte, welche die so häufige Gleichzeitigkeit von Indigestion mit verstärkter Säurebildung erwogen haben. Man musste daher anerkennen, dass die Untersuchungen bis dahin über das wirksame, auflösende Princip im Magensafte keinen Aufschluss gegeben haben, und dass wir dieses Princip nicht kennen. Diess ist dasselbe Glaubensbekenntniss, welches bereits Berzelius vor längerer Zeit abgegeben hat.

Alles diess führt schon zu der Ueberzeugung, dass das wirksame Princip im Magensaft ein organischer Stoff ist, der auf dieselbe Art wirkt, wie die Diastase auf das Stärkemehl, indem sie dasselbe auflöst. So war der Stand der Dinge zur Zeit der Herausgabe der ersten Auflage dieses Theils des physiologischen Lehrbuchs. Seither sind wichtige Entdeckungen in Hinsicht des wirksamen organischen Princips des Magensaftes gemacht worden.

Eberle (*Physiologie der Verdauung. Würzb.* 1834.) entdeckte nämlich, dass obgleich weder die verdünnten Säuren, noch der Schleim allein das Vermögen besitzen, organische Materien schnell aufzulösen, diese auflösende Kraft doch dem säuerlichen Schleime zukommt und dass Eiweiss und Fleisch in Digestion mit saurem Schleim oder dem säuerlichen Extracte der Schleimhäute nicht allein bald gelöst werden, sondern auch eine chemische Umwandlung erleiden, indem der Eiweissstoff seine Fähigkeit verliert, zu gerinnen und in Osmazom und Speichelstoff umgesetzt wird. Diese Entdeckung hat sich in der Hauptsache vollkommen bestätigt. Siehe J. Mueller und Schwann in Mueller's *Archiv.* 1836. 68. Man hat die Versuche von Eberle jetzt von vielen Seiten wiederholt und sie haben durchgängig ein bestätigendes Resultat gegeben. Doch hatte sich Eberle darin geirrt, dass er allem saurem Schleime jene Eigenschaft zuschrieb, welche vielmehr nur ein mit dem Magenschleime zugleich abgesondertes organisches Princip besitzt. Der Schleim aus anderen Organen als dem Magen, z. B. nach Schwann Harnblasenschleimhaut mit Salzsäure behandelt, besitzt diese Eigenschaft nicht. Man gewinnt die Flüssigkeit zur künstlichen Verdauung durch Extraction der Schleimhaut des vierten Magens des Kalbes. Die Schleimhaut desselben wird abpräparirt, mit kaltem Wasser ausgewaschen, bis sie nicht mehr sauer reagirt und dann getrocknet. So kann die Schleimhaut aufbewahrt werden, und sie ist jederzeit zu den Versuchen anwendbar. Eine Versuchsreihe, welche die Hauptphänomene auf die einfachste Art darlegt, ist folgende. Die getrocknete Schleimhaut wird in Stücke zerschnitten, und diese in 5 Probirgläser, mit destillirtem Wasser übergossen, gelegt. In 2 von diesen Gläsern werden in jedes 6—8 Tropfen Salzsäure zugesetzt, in 2 an-

Digitized by Google

dern in jedes 12—14 Tropfen Essigsäure. Zur Vergleichung enthält ein Gläschen Schleimhautstücke und blosses Wasser, und ein sechstes Gläschen so viel Wasser als die übrigen mit 8 Tropfen Salzsäure ohne Schleimhautstücke. In alle diese Gläser werden Würfel von geronnenem Eiweiss und gekochtem Fleisch von gleicher Grösse und mehreren Gran Gewicht gelegt. Nach einer Digestion von 12 Stunden bei 30° R. zeigen die herausgenommenen Fleisch- und Eiweisstücke folgende Beschaffenheit. Die mit blosser Säure behandelten Stücke zeigen sich unverändert, ebenso die mit blossen Schleimhautstücken und Wasser ohne Säure digerirten Nahrungsstoffe, welche später einen fauligen Geruch zu entwickeln beginnen. Die Stücke in dem säuerlichen Extracte von Schleimhaut sind erweicht. Das Eiweiss durchscheinend, in der Mitte käseartig, leicht zerdrückbar. Wird die Digestion noch länger bis 24 Stunden fortgesetzt, so lösen sich die Nahrungsstoffe in dem säuerlichen Extract von Schleimhaut ganz oder grösstentheils auf. Die Digestionsflüssigkeit erhält einen eigenthümlichen, durchaus nicht fauligen Geruch, welcher dem Geruche des Commissbrotes einigermassen vergleichbar ist; der Geschmack ist säuerlich, nicht angenehm. Sehr schnell löst sich Faserstoff des Blutes auf, die Auflösung geht auch bei der gewöhnlichen Temperatur der warmen Jahreszeit vor sich und schon nach einigen Stunden werden geronnene Eiweissstücke im Umfang durchsichtig und sind von einer Wolke grösstentheils aufgelöster Eiweisstheilchen umgeben. Das aufgelöste Eiweiss hat seine vorigen Eigenschaften ganz verloren, es ist nicht mehr gerinnbar, und die Untersuchung der Lösung zeigt Osmazom und Speichelstoff und nach Schwann noch einen dritten eiweissähnlichen Stoff, der von kohlensaurem Natron niedergeschlagen wird, in Wasser und Weingeist unlöslich, in verdünnter Salzsäure und Essigsäure löslich ist. Er wird nicht durch Siedhitze, weder durch essigsaures Blei, noch durch Weingeist, wohl aber durch Salpetersäure und Sublimat stark und durch Kaliumeisencyanür und Galläpfeltinctur schwächer niedergeschlagen. Wir stellten Versuche an, um zu entscheiden, ob bei der künstlichen Verdauung wie bei der Gährung Kohlensäure entwickelt und Sauerstoffgas absorbirt wird. Weder das eine noch das andere findet dabei statt.

Ueber die Natur des Verdauungsprincips und des bei der Verdauung stattfindenden Processes hat Schwann weitere Aufschlüsse gegeben. Schwann *über das Wesen des Verdauungsprocesses.* Mueller's *Arch.* 1836. 90. In den vorhergehenden Versuchen bleibt es unklar, ob das Verdauungsprincip durch Contact wirkt, oder ob es selbst im aufgelösten Zustande sofort die Nahrungsstoffe auflöst. Schwann erkannte nun, dass das klare Filtrat der Verdauungsflüssigkeit die künstliche Verdauung eben so gut als vorher bewirkt. Das Verdauungsprincip war also vollkommen aufgelöst, und die Meinung, dass es durch Contact wirke, verlor ihre Basis. Das klare Filtrat, welches die Verdauungsflüssigkeit enthält, ist an Farbe saturirtem Urin ähnlich, es behält die Fähigkeit zur künstlichen Verdauung Monate lang. Um gute Verdauungsflüssigkeit zu bereiten, empfiehlt Schwann so viel Säure

Digitized by Google

zu nehmen, dass auf ½ Loth Magenschleimhaut und Wasser zusammengerechnet 3,3 Gran Salzsäure kommt. Die Quantität des Wassers, wenn nur die Menge der Säure nach dem angegebenen Verhältnisse verändert wird, ist ziemlich gleichgültig, und kann das Gewicht der Schleimhaut im feuchten Zustande um das Ein- bis Fünffache übertreffen. Schwann stellte sich die Frage, in wie weit die Säure zur Verdauung mitwirke. Sie ist nothwendig, wie aus den angeführten Versuchen hervorgeht, aber die Säure könnte zur Bildung irgend eines anderen wesentlich verdauenden Stoffes dienen, der einmal gebildet, selbstständig die Verdauung bewirkt. Um diess zu prüfen, neutralisirte er Verdauungsflüssigkeit mit kohlensaurem Kali und digerirte sie dann mit Eiweiss. Das Eiweiss wurde aber gar nicht verändert. Setzte er nun wieder die angemessene Menge Salzsäure zu, so wurde das Eiweiss vollständig verdaut. Freie Säure ist demnach wesentlich bei der Verdauung wirksam. Um die Frage zu lösen, ob die Säure als blosses Lösungsmittel des Verdauungsprincips diene, wurde ein Theil der Verdauungsflüssigkeit mit soviel kohlensaurem Kali versetzt, dass mehr als die Hälfte der Säure darin neutralisirt wurde, die Flüssigkeit also noch sauer reagirte und keine Trübung entstand. Obgleich nun nichts von dem Verdauungsprincip niedergeschlagen seyn konnte, ging doch die Verdauung nicht vor sich. Die Säure wirkt also nicht als blosses Lösungsmittel des Verdauungsprincips. Es entstand ferner die Frage, ob die Säure mit dem Verdauungsprincipe vielleicht eine chemische Verbindung analog den sauren Salzen bilde. In diesem Falle muss die Menge der Säure in einem Verhältniss zur Menge der andern verdauenden Materie stehen. Aus Schwann's Versuchen folgte, dass ein Gehalt von 3,3 Gran bis 6,6 Gran Salzsäure in einem halben Lothe Verdauungsflüssigkeit sich am besten zur Verdauung, wenigstens von Eiweiss eignet, dass ein höherer Säuregehalt die verdauende Kraft schwächt oder ganz aufhebt, indem er das verdauende Princip zerstört, dass ein zu geringer Säuregehalt aber nur wegen Mangels der wesentlich wirksamen Säure die Verdauung nicht bewirkt. Sollte nun die vorher aufgestellte Ansicht richtig seyn, so müsste die Menge der Säure nicht zu der der ganzen Flüssigkeit, sondern zu der Menge des darin enthaltenen organischen Verdauungsprincips in einem bestimmten Verhältnisse stehen. Aus den in dieser Beziehung von Schwann angestellten Versuchen folgt, dass die nothwendige Menge von Säure sich nicht nach der Quantität des organischen Verdauungsprincips richtet, so dass die fragliche Ansicht nicht richtig seyn kann. Die dritte Hypothese, dass die Säure vielleicht zur Auflösung von Producten diene, die sich bei der Verdauung bilden und etwa bloss in Säuren löslich sind, wurde ebenfalls widerlegt. Das bei der künstlichen Verdauung gebildete Product ist zwar in Säure und selbst in sehr verdünnter Säure löslich, aber eine Quantität Verdauungsflüssigkeit, welche zur Auflösung einer bestimmten Menge Eiweiss hinreicht, verdaut nicht, wenn sie mit Wasser verdünnt ist. Sollte endlich die Säure in die Zusammensetzung der sich bei der Verdauung bildenden Producte

Digitized by Google

eingehen, so müsste die Menge der freien Säure sich bei der Verdauung ändern. Indess bleibt der Gehalt an freier Säure bei der künstlichen Verdauung unverändert. Aus allem diesem schliesst Schwann, dass die Säure durch ihre Gegenwart, ohne selbst verändert zu werden, zur Zersetzung der organischen Substanzen bei der Verdauung mitwirkt, ebenso wie dies bei der Umwandlung der Stärke in Zucker durch Kochen mit verdünnten Säuren der Fall ist.

Der Gährung und den Contactwirkungen gleicht die künstliche Verdauung darin, dass selbst eine sehr geringe Quantität des zersetzenden Körpers die Wirkung hervorbringt. Eine sehr bedeutende Verdünnung von normaler Verdauungsflüssigkeit durch saures Wasser wirkte noch auf das Eiweiss. Es wurden 4,8 Gran Verdauungsflüssigkeit mit 1 Drachme geronnenen zerriebenen Eiweisses (im feuchten Zustande gewogen) und $\frac{1}{2}$ Loth sauren Wassers vermischt. Dieselbe Quantität Eiweiss wurde in $\frac{1}{2}$ Loth unverdünnter Verdauungsflüssigkeit gebracht. Nach 24 Stunden war das Eiweiss in beiden bis auf einige wenige Reste aufgelöst. Es hatten 4,8 Gr. Verdauungsflüssigkeit oder 0,11 trockne verdauende Substanz 60 Gr. feuchtes Eiweiss (ungefähr 10 Gr. feste Substanz) aufgelöst, oder 1 Theil hatte die Zerlegung von ungefähr 100 bewirkt, was sich den Contactwirkungen und der Gährung vergleichen lässt. Aus Schwann's Versuchen ergiebt sich ferner, dass die Verdauungsflüssigkeit durch die Verdauung einen Theil ihrer Kraft verliert, und dass sich bei der künstlichen Verdauung nicht neues Verdauungsprincip aus dem Eiweiss bildet, wie es doch mit dem Ferment bei der Gährung der Fall ist. Von der Gährung unterscheidet sich übrigens der Verdauungsprocess, dass keine Kohlensäure dabei entwickelt wird und dass selbst nicht ein Minimum von Sauerstoff zu ihrer Einleitung nöthig ist, wie näher von Schwann bewiesen wird. Viele Mittel, welche die Weingährung stören, stören auch die Verdauung. Schwann zeigt, dass Alkohol sowohl als Siedhitze die Wirksamkeit des Verdauungsprincips aufheben. Dasselbe gilt in geringerm Grade von den Neutralsalzen, besonders von den schwefelichtsauren Salzen. Dagegen fand Schwann auch, dass arsenichtsaures Kali wohl die Weingährung, nicht aber die künstliche Verdauung stört. Beide Processe haben endlich bei aller Verschiedenheit das gemein, dass sie Processe einer freiwilligen Zersetzung sind, die durch einen schon im Minimum wirkenden Stoff hervorgerufen werden, und dass dieser Stoff bei dem dadurch bewirkten Processe selbst verändert wird.

Eine reine Darstellung des Verdauungsprincips ist deswegen fast unmöglich gemacht, weil es seine Wirksamkeit durch Reagentien so leicht verliert. Mehrere Versuche von Schwann klären sein Verhalten zu andern Stoffen auf. Das Verdauungsprincip wird durch die Neutralisation der Säure nicht niedergeschlagen, sondern ist auch in blossem Wasser löslich; es wird durch essigsaures Blei aus der neutralen Auflösung gefällt, und lässt sich aus diesem Niederschlage durch Schwefelwasserstoff wieder wirksam darstellen. Kaliumeisencyanür sowohl als Kaliumeisencyanid

Digitized by Google

bewirken in der neutralen Verdauungsflüssigkeit keinen Niederschlag, wohl aber in der sauren; das Verdauungsprincip wird aber nicht dabei gefällt, denn die Flüssigkeit behält ihre verdauende Kraft. Sublimat bewirkt sowohl in der sauern als in der neutralen Verdauungsflüssigkeit einen Niederschlag. Gerbestoff fällt, Weingeist und Siedhitze bewirken eine Trübung und heben die verdauende Kraft auf. Die Lösungsmittel des Verdauungsprincips sind Wasser, verdünnte Salzsäure und Essigsäure. Diese Reactionen und zugleich das eigenthümliche Verhalten zum Käsestoff, den das Verdauungsprincip als einen in Wasser unlöslichen Körper niederschlägt, stellen jenen Stoff als eigenthümlich dar, so dass, wenn auch noch keine reine Darstellung des Stoffes bis jetzt möglich ist, doch der Name Verdauungsprincip, *Pepsin*, auch in dieser Beziehung gerechtfertigt wird. Das Verhalten des Verdauungsprincips zum Käsestoff verdient noch eine nähere Erwähnung. Berzelius zeigte bereits, dass das Laab des Kälbermagens, auch wenn alle Spuren der Säure daraus durch Waschen entfernt sind, doch noch die Milch zum Gerinnen bringt. Man weiss ferner, dass die Gerinnung des Käsestoffs von Laab eigenthümlich ist, indem der auf diese Weise geronnene Käsestoff in Wasser unlöslich ist, während sich das Coagulum von Säure und Weingeist in Wasser wieder auflöst, das Coagulum von Säure auch schon in mehr Säure wieder auflöst. Man kennt nun diess eigenthümliche, die Milch gerinnen machende Princip des Laabs in dem Verdauungsprincipe. Setzt man nach Schwann Verdauungsflüssigkeit in äusserst geringer Quantität zur Milch und erwärmt sie ein wenig, so sondert sich bald der geronnene Käsestoff ab; derselbe Beobachter hat gezeigt, dass das Verdauungsprincip auch im neutralen Zustande den Käsestoff fällt. Zur Gerinnung der Milch in der Wärme sind mehr als 0,42 Proc. erforderlich, 0,83 Proc. bringen sie schon zur Gerinnung. Durch die Siedhitze verliert die Verdauungsflüssigkeit die Fähigkeit, die Milch zum Gerinnen zu bringen, daher die Salze der Verdauungsflüssigkeit keinen Antheil an der Wirkung haben können. Durch das Verhalten des Verdauungsprincips zur Milch wird die Milch zum Reagens für das Verdauungsprincip, wenn nämlich eine neutrale Flüssigkeit die Gerinnung der Milch bewirkt, schnell aufgekocht aber diese Fähigkeit verliert, so kann man schliessen, dass die Flüssigkeit Verdauungsprincip enthält. Schwann a. a. O. p. 130. Durch diese Reaction hat Schwann nachgewiesen, dass das hier betrachtete Verdauungsprincip auch wirklich im Magen vorkommt. Er theilte den Mageninhalt eines unmittelbar nach der Geburt gestorbenen Kaninchens in zwei Theile, kochte den einen und setzte zu beiden Milch. Bei gelindem Erwärmen gerann dieselbe in dem ungekochten, nicht aber in dem gekochten Magensaft.

Einige Nahrungsstoffe werden nicht von dem Verdauungsprincipe, sondern entweder vorzugsweise von den Sauren oder unter Mitwirkung einer andern organischen Materie aufgelöst. Die vom Verdauungsprincipe leicht löslichen sind Faserstoff, Muskelfleisch, geronnenes Eiweiss. Der geronnene Käsestoff aber und Thierleim, Kleber scheinen nach Schwann's Versuchen nicht durch

Digitized by Google

das Verdauungsprincip aufgelöst zu werden. Denn wenn dieselben einzeln mit verdünnten Säuren und mit verdünnter Verdauungsflüssigkeit digerirt wurden, so wurde kein Unterschied bemerklich. Dagegen stimmten die Reactionen der Filtrate dieser mit blossen verdünnten Säuren behandelten mit denen von Tiedemann und Gmelin bei der natürlichen Verdauung gefundenen (mit Ausnahme des Stärkemehls) überein. Leim verlor seine Gerinnbarkeit, Jodtinctur brachte in der sauren Auflösung von Kleber eine Fällung, aber keine Farbenveränderung hervor. Zur Erklärung der Verdauung des Stärkemehls reicht die Säure nicht hin. Nach Tiedemann's und Gmelin's Beobachtung wird dasselbe durch die natürliche Verdauung in Stärkegummi und Zucker verwandelt. Indessen bildet sich durch Digestion des Stärkemehls mit verdünnten Säuren kein Zucker, auch nicht, wenn Verdauungsflüssigkeit zugesetzt wird. Dagegen wird nach Leuchs das Stärkemehl durch den Speichel in Zucker verwandelt, was Schwann bestätigt fand. Wurde sauer gemachter Speichel mit gekochtem Stärkmehl 24 Stunden digerirt und dann filtrirt, so brachte Jod darin keine Farbenveränderung mehr hervor. Aus dem neutralisirten und abgedampften Filtrate liess sich durch Weingeist eine ansehnliche Quantität Zucker ausziehen, der sich sowohl durch seinen Geschmack als dadurch, dass er mit Hefe in Gährung überging, zu erkennen gab. Was der Weingeist nicht auflöste, war der Speichelstoff des Speichels theils verändertes, dem Gummi ähnliches Stärkemehl, welches nicht auf Jod reagirte.

Da die Wirksamkeit des Verdauungsprincips von der freien Säure abhängt, so ist es einsichtlich, wie eine salzhaltige neutrale Verdauungsflüssigkeit durch Zersetzung der Salze mittelst der galvanischen Elektricität wieder für die künstliche Verdauung wirksam werden könne, wie diess in der That von Purkinje beobachtet ist. Am positiven Pole erzeugt sich nämlich aus den zersetzten Salzen freie Säure.

Man hat angenommen, dass die Elektricität sogar fähig sei, die Wirkung des Nervus vagus bei der Verdauung zu ersetzen. Nach der Durchschneidung des Nervus vagus auf beiden Seiten hört die Verdauung grösstentheils auf. Vergl. oben pag. 347. Blainville sah bei Tauben, dass die Wicken, die sie genossen, nach jener Operation in ihrem Kropfe unverändert geblieben, und dass ihre Chymification ganz aufgehoben war. Diesen Erfolg haben auch Legallois, Dupuy, Wilson Philip, Clarke, Abel, Hastings gehabt. Dagegen sahen Broughton, Magendie, Leuret und Lassaigne die Verdauung nach der Durchschneidung des N. vagus fortdauern. Mayer (Tiedemann's *Zeitschrift*. 2. 1.) beobachtete auch noch einige Fortdauer der Verdauung und saure Reaction des Chymus wenigstens bei den Kaninchen. Brachet (*recherches sur les fonct. du syst. gangl. Paris* 1830.) sah die Speisen, wo sie die Magenwände berühren, in allen Versuchen durch Chymification verändert. Da sich bei Säugethieren wegen des meist bald erfolgenden Todes nicht mit voller Sicherheit über diesen Gegenstand entscheiden lässt, so habe ich mit Herrn Dr. Dieckhof mehrere Versuche an Vögeln, namentlich Gänsen, an-

Digitized by Google

gestellt. Nachdem diese Thiere 48 Stunden gefastet, wurden sie mit Hafer gefüttert. Jedesmal wurden 2 Thiere zugleich zum Experiment genommen. Nur dem einen wurde der N. vagus auf beiden Seiten durchschnitten, das andere blieb zur Vergleichung im unversehrten Zustande. Nach dem Tode des ersten, der innerhalb 5 Tagen erfolgte, wurde auch das zweite getödtet. In letzterem war der Kropf meist leer, im ersteren immer ganz voll von Hafer, im Muskelmagen fanden sich einige Körner, zum Theil zermalmt. Die Magenflüssigkeit reagirte sauer, nicht so sauer als im gesunden Thiere. Hieraus kann man schliessen, dass die Verdauung nach jener Operation grosstentheils, aber doch nicht ganz aufhört. Tiedemann sah zwar nach der Durchschneidung der beiden N. vagi bei einem Hunde, dass das Erbrochene so wenig sauer als der Magenschleim reagirte, und auch in Mayer's Versuchen reagirte der Chymus bei Katzen und Hunden nicht sauer, aber diese Reaction sahe Mayer bei den Kaninchen nach der Operation, und ich habe sie in den mit Dieckhof angestellten Versuchen niemals fehlen gesehen, obgleich sie weniger stark als im gesunden Zustande ist. Nun hat Wilson behauptet, dass man die Verdauung vermittelst eines elektrischen Stromes durch den Nervus vagus wiederherstellen könne, so zwar, dass man den einen Pol der Säure auf den Nervus vagus, den andern auf die mit Zinnfolie belegte Regio epigastrica applicire. Breschet und Vavasseur haben diese Versuche wiederholt. Sie fanden: die einfache Durchschneidung der Nervi vagi ohne Substanzverlust hebe den Verdauungsprocess nicht ganz auf, wohl aber die Durchschneidung mit Substanzverlust. Froriep's *Not.* 6. 264. Indess immer ist ein Nerve gelähmt und bleibt es für eine sehr lange Zeit, mag man ihn mit oder ohne Substanzverlust durchschnitten haben. Nun behaupten sie ferner, dass man mittelst der Elektricität, indem ein elektrischer Strom durch die getrennten Stücke geleitet werde, die Verdauung ganz wiederherstellen könne. Sie rechnen hierbei auf die verstärkten Bewegungen des Magens. Später haben Breschet und Edwards (*Archiv. gén. de med. Févr.* 1828) jene Ansicht reformirt; sie haben als Resultate neuer Versuche angegeben, dass die Durchschneidung der N. vagi die Chymification verlangsame, ohne sie ganz aufzuheben, dass die Verlangsamung von der Lähmung der Speiserohre abhänge, dass diese auch die Ursache des in jenen Fällen stattfindenden Erbrechens sey, dass die Wiederherstellung der Chymification durch elektrischen Strom nicht von der Elektricität, sondern von der dadurch bewirkten Reizung der N. vagi abhänge, indem mechanische Reizung des untern Endes des Nerven dieselbe vollkommene Wiederherstellung der Verdauung wie die Elektricität bewirke, insofern die Bewegung des Magens dadurch wiederhergestellt werde. Aber durch Reizung des N. vagus kann man, wie ich schon öfter aus Erfahrung anführte, die Bewegung des Magens nicht im geringsten verändern. Vergl. p. 505. Würden die trefflichen Beobachter ihre Versuche länger fortgesetzt haben, so würden sie vielleicht gesehen haben, dass weder der mechanische noch der elektrische Reiz an den N. vagi irgend eine be-

Digitized by Google

merkenswerthe Veränderung der Verdauung bewirkt, dass sich die Thiere ziemlich gleich verhalten, mag man diese Reize anbringen oder nicht anbringen, wie wir es in unseren Versuchen gesehen haben. Ich habe mit Dr. Dieckhof eine ganze Reihe von Versuchen an Kaninchen angestellt. Jedesmal wurden 3 Kaninchen zu gleicher Zeit zum Versuch gezogen. Alle 3 wurden 48 Stunden hungern gelassen, sie wurden dann mit Kohl gefüttert. Das erste wurde hierauf unversehrt gelassen, dem zweiten wurden beide N. vagi einfach durchschnitten; bei dem dritten geschah nicht allein das Letztere, sondern es wurde auch 7 bis 8 Stunden lang ein galvanischer Strom durch die Nerven auf die von Wilson angegebene Art geleitet. Nach dem Tode des galvanisirten Kaninchens oder des zweiten mit durchschnittenem N. vagus wurden auch die anderen getödtet. Das unversehrte Kaninchen hatte jedesmal ganz chymificirt; das Futter war bis auf den unauflöslichen, ziemlich trockenen Rückstand extrahirt; bei den beiden andern war das Futter fast ganz in demselben Zustande: einmal war das Futter des galvanisirten Kaninchens etwas weniger verdaut, mehrere Mal waren beide ganz gleich, und mehrere Mal war das nicht galvanisirte vielleicht, aber kaum etwas weniger verändert als das galvanisirte. Dieckhoff *de actione, quam nervus vagus in digestionem ciborum exerceat. Berol.* 1835. Matteucci will eine künstliche Verdauung aus Fleisch mit Kochsalz, unter Einwirkung der Elektricität, bewirkt haben. Froriep's *Not.* 867. Sich stützend auf die Versuche von Wilson stellt sich Matteucci die saure Reaction des Magens als durch einen positiv-elektrischen Zustand dieses Eingeweides hervorgebracht, vor. Er nahm ein Stück gekochtes Fleisch, that Wasser, Kochsalz und kohlensäuerliches Natron hinzu, erhielt diese Mischung lange Zeit in einer gehörigen Wärme, indem er sie dabei immerfort zerrieb, bis sie in eine breiige Masse verwandelt war, der ähnlich, welche man durch das Kauen erhält. Diesen Brei brachte er in eine mit einer Auflösung von Kochsalz befeuchtete Blase, und setzte mit dieser die Pole einer aus 18—20 Plattenpaaren bestehenden Säule in Verbindung. Längs den Wänden der Blase, besonders um den positiven Draht, habe sich eine weissliche, dichte, saure, von Blasen von Oxygengas ausgedehnte Schicht gebildet. Diese Substanz sey flockig gewesen, und sey nach der Auflösung in Wasser erhitzt geronnen. Nachdem ich schon längst mich vergeblich bemüht hatte, Fleischstückchen in Säure oder Kochsalz mit Hülfe eines elektrischen Stroms aufzulösen, mussten mir diese Resultate sehr unwahrscheinlich vorkommen. Ich habe den Versuch von Matteucci mit Dr. Dieckhof wiederholt; wir brachten von demselben Brei von Fleischstückchen mit Kochsalz und kohlensäuerlichem Natron 2 Portionen in verschiedene Blasen; nur die eine wurde galvanisirt, die andere wurde sich selbst überlassen. Nach Beendigung des Versuchs zeigte sich kein irgend bemerklicher Unterschied in beiden Flüssigkeiten.

c. Veränderung des Speisebreies im Dünndarm.

Wir greifen hier den Faden der klassischen Untersuchungen

Digitized by Google

von Tiedemann und Gmelin wieder auf; denn sie enthalten auch hier das einzige Sichere, was wir über die Veränderungen des Chymus wissen. Der Chymus des Duodenums reagirt sauer. Sein Reiz auf die Darmwände, der sich auf den Ductus choledochus und die Gallenwege überhaupt fortpflanzt, hat Ergiessung von Galle und Succus pancreaticus zur Folge; wenigstens hat Tiedemann die Gallenblase, bei Thieren, während der Verdauung fast leer gefunden. In den Contentis des Dünndarms liess sich nach Fütterung mit Leim dieser nicht mehr erkennen, nach Fütterung mit Butter wurde das Fett wieder erkannt, nach Fütterung mit Käse undeutlich der Käsestoff, nach Stärkemehl Reste des letztern, aber nicht immer, statt Stärke wurde Stärkezucker gefunden. Von Milch zeigten sich in der ersten Hälfte des Dünndarms Klümpchen von Käse. Nach Fütterung eines Hundes mit Knochen fanden sich kleine Knochenstücke in der ersten Hälfte des Dünndarms, in der zweiten Hälfte viel phosphorsaurer und wenig kohlensaurer Kalk. Bei Pferden war nach Fütterung mit Hafer, in der ersten Hälfte des Dünndarms noch Stärkemehl vorhanden, was seine Eigenschaft im mittlern und untern Theile verlor.

Die Contenta des Dünndarms reagirten in der ersten Hälfte desselben immer sauer, aber schwächer als die des Magens. Die Säure nahm in der zweiten Hälfte ab und verschwand gewöhnlich in dem Endstücke des Dünndarms. Tiedemann's und Gmelin's Untersuchungen lassen es unentschieden, ob das Verschwinden der Säure des Chymus von der Neutralisation derselben durch das kohlensaure Alkali der Galle herrührt, wie Boerhave, Werner, Prout glauben, oder ob der untere Theil des Dünndarms alkalische Absonderung hat, ob sich durch anfangende Fäulniss Ammoniak entwickelt, welches die Säure sättigt, oder ob der Chymus im sauren Zustande resorbirt wird und die Säure in den Wegen durch die Lymphgefässe und Lymphdrüsen verliert, da der Chylus allerdings alkalisch ist. Die im Chymus des Dünndarms enthaltenen thierischen Materien sind vorzugsweise:

1. Eiweiss; seine Menge nimmt in der letzten Hälfte des Dünndarms wegen der Resorption des Chymus ab.

2. Käsestoff; er nimmt auf gleiche Art ab. Von beiden lässt sich nicht angeben, wie viel der Verdauung, wie viel den Verdauungssäften, z. B. dem pankreatischen Safte, angehöre. Tiedemann und Gmelin finden es möglich, dass der Käsestoff des pancreatischen Saftes, als sehr stickstoffreiche Materie, einen Theil seines Stickstoffs an weniger stickstoffhaltige Nahrungsstoffe abgebe und sich damit in Gleichgewicht setze, wodurch solcher Nahrungsstoff in Eiweiss verwandelt werden könnte.

3. Durch salzsaures Zinn fällbare stickstoffhaltige Materie (Speichelstoff und Osmazom). Sie nimmt nach unten ab.

4. Durch Chlor sich röthende Materie, wahrscheinlich vom pankreatischen Safte, da sie sich nicht im Magen zeigt, nicht von der Galle, da sie auch nach Unterbindung des Gallenganges noch vorkommt. Sie findet sich nicht in Excrementen wieder.

5. Im Weingeist, nicht im Wasser, lösliche Materien: Fett,

Digitized by Google

Talg, Farbestoff und Harz der Galle. In qualitativer Hinsicht unterscheiden sich jedoch die aufgeführten Stoffe nicht von denjenigen, welche Tiedemann und Gmelin in dem Darmkanale von nüchternen Thieren fanden. Sie sind daher ausser der von den Nahrungsmitteln herrührenden Menge von Eiweiss wahrscheinlich den Verdauungssäften, namentlich dem Succus pancreaticus, angehörend, der Eiweiss, Käsestoff, durch Chlor sich röthende Materie enthält.

Hier wäre nun der Ort, den Einfluss der Galle auf den Chymus zu untersuchen. Beaumont hat einige Versuche über das Verhalten von Galle zum Chymus ausser dem lebenden Körper angestellt. Wurde Ochsengalle mit Chymus aus dem Magen des St. Martin versetzt, so bildete sich ein trübes, gelblich-weisses Fluidum oder vielmehr feine, weisse Coagula, die sich, einige Zeit gestanden, in hellgelbe, zu Boden sinkende Coagula und ein trübes, milchfarbenes Fluidum sonderten. Vermischte Beaumont zur Vergleichung Galle und verdünnte Salzsäure, von beiden 1 Drachme mit 2 Unzen Wasser, so entstand eine ähnliche Trübung, aber es bildete sich ein tief grüner, gallertartiger Bodensatz in einer bläulichgrünen Flüssigkeit ohne milchiges Ansehen, wie in der Mixtur von Chymus. Nach einer Beobachtung von Purkinje unterbricht wenig Galle schon die künstliche Verdauung ausser dem thierischen Körper durch Verdauungsprincip. Ueber den Antheil der Galle an der Chymification haben auch Tiedemann's und Gmelin's Untersuchungen keine vollen Aufschlüsse gegeben. Durch die Säure des Chymus wird aus der Galle der Schleim derselben geronnen mit einem grossen Theil des Farbestoffs der Galle gefällt. Ausserdem wird Gallenfett niedergeschlagen, welches beim Ausziehen des im Wasser unauflöslichen Theils der Contenta des Darms mit Weingeist erhalten wurde. Die von Tiedemann und Gmelin im Darmkanal gefundene Talgsäure erklären sie als aus der Galle abgeschieden. Der nicht im Wasser lösliche Theil der Contenta enthielt Gallenharz, welches ein excrementieller Stoff zu seyn schien, ohne Einfluss auf die Umwandlung der Nahrungsstoffe, ein Hauptbestandtheil der Excremente. Tiedemann und Gmelin fanden die von Werner (*exp. circa modum, quo chymus in chylum mutatur, diss. inaug. praes.* Autenrieth. *Tüb.* 1800.) eingeführte Ansicht, dass der Chylus von der Galle in Form von Flocken niedergeschlagen werde, ungegründet. Bei Vermischung von Galle mit dem flüssigen Mageninhalte erfolgen nur diejenigen Niederschläge aus der Galle, wie sie beim Vermischen einer Säure mit der Galle entstehen. Die sogenannten Chylusflocken im Dünndarme sind nur Schleimflocken, welche sich auch nach Unterbindung des gemeinschaftlichen Gallenganges zeigten. Der resorptionsfähige Chymus ist flüssig. Nach Autenrieth und A. Cooper wäre der Chylus im Dünndarme eine ziemlich consistente, zwischen den Zotten haftende, an der Luft gerinnbare Materie. Vergl. Abernethy *physiol. lect. p.* 189. Nach Tiedemann und Gmelin ist diess aber Schleim, und dann muss die Gerinnung ein Missverständniss seyn. Die aus der Galle zur Umwandlung des Chymus anwendbaren Flüssigkeiten, sind wahrscheinlich das Pikromel, das

Digitized by Google

Osmazom, die dem Gliadin ähnliche Materie und die Cholsäure, weil sie nach Tiedemann's und Gmelin's Untersuchungen nicht in den Excrementen vorkommen, l. c. 1. 362., 2. 65. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der blosse Zweck der Galle, ausser der Ausscheidung des excrementiellen Gallenharzes und Farbestoffs, ist, die Säure des Chymus abzustumpfen und ihn zu der Umwandlung vorzubereiten, die er in den Lymphgefässen erfährt, wo er als Chylus alkalisch wird. Entweder tragen ihre wesentlichen, nicht in den Excrementen vorkommenden Bestandtheile dazu bei, die fernere Auflösung des Chymus zu vollenden, wie Haller glaubt, oder diese Bestandtheile müssen zur Umwandlung des Chymus in den Inhalt der Lymphgefässe verwandt werden, so wie Prout vermuthet, dass die Beimischung der Galle zur Erzeugung des Eiweissstoffes aus den Nahrungsmitteln beitrage. Der Chylus der Lymphgefässe enthält ausser dem Eiweiss weder die von Tiedemann und Gmelin im Darmkanal noch gefundenen anderen thierischen Materien, noch jene aufgelösten Bestandtheile der Galle, welche nicht in die Excremente übergehen, sondern statt alles dessen Eiweiss.

Um den Antheil der Galle an der Umwandlung der Nahrungsmittel zu ermessen, hat Brodie (*Quarterly J. of. sc. and arts* 1823. *Jan.*, Magendie *J. d. physiol.* 3. 93.) den Ductus choledochus bei Katzen unterbunden, worauf Gelbsucht eintrat, die indessen zuweilen wieder verschwand; dann war an der Unterbindungsstelle eine Exsudation von gerinnbarem Faserstoff eingetreten, welche die getrennten Stücke wieder verband.

Brodie hat gefunden, dass durch Unterbindung des Gallenganges die Verdauung im Magen nicht gestört, dass aber kein Chylus mehr aus dem Chymus gebildet wurde, und dass weder die Saugadern des Darms, noch der Ductus thoracicus einen weissen Chylus enthielten. Tiedemann und Gmelin haben sich durch Prüfung dieser Erfahrung in zehn Versuchen ein neues Verdienst erworben. Am 2—3. Tage nach der Operation trat Gelbsucht ein; diese verschwand zuweilen wieder nach 10—15 Tagen. In diesen Fällen hatte der Gang sich wieder hergestellt, und die Ligatur hatte hier entweder durchgeschnitten und war abgefallen, ehe die Durchschnittsfläche verheilte, oder die coagulable Materie wurde um die Ligatur ergossen, und letztere hatte sich im Innern des äusserlich hergestellten Ganges abgestossen, und war durch den Kanal selbst ausgetreten. In 13—26 Tagen war der Gang wiederhergestellt gefunden worden. In anderen Fällen trat der Tod ein nach 3—7 Tagen (Versuch 1. 4. 8.). Ein Hund, bei dem die Gelbsucht blieb, aber der Gang später offen gefunden wurde, hatte 26 Tage gelebt, als er getödtet wurde. In einem Fall (Versuch 1.), wo ein Hund nach 7 Tagen starb, war grosse Magerkeit und eine solche Mattigkeit eingetreten, dass das Thier kaum stehen konnte. Das Bauchfell zeigte sich nach dem Tode entzündet, oder Spuren der stattgefundenen Entzündung. In diesen Fällen wurde Gallenfärbestoff im Blut und Urin gefunden, und die Lymphgefässe der Leber waren gelb. Tiedemann und Gmelin bestätigen Brodie's Erfah-

Digitized by Google

rung, dass die Verdauung im Magen nach Unterbindung des Ductus choledochus fortdauere. Auch die Contenta des Dünndarms waren nicht wesentlich von den gewöhnlichen verschieden; Eiweissstoff war in grosser Menge vorhanden. Es fand sich die durch Chlor sich röthende Materie; dagegen war die Erkennung des etwa vorhandenen Käsestoffs, so wie der durch salzsaures Zinn fällbaren Materie verhindert. Die Contenta des Dickdarms rochen in allen Fällen viel übeler und fauliger als sonst (nach Leuret und Lassaigne rochen sie fade), die Excremente waren weiss. (Von gleichen Stücken Milz, wovon das eine mit Ochsengalle, das andere mit gleichviel Wasser von mir infundirt wurde, faulte das letztere etwas schneller.) Der Ductus thoracicus enthielt bei Hunden mit unterbundenem Gallengange, die nüchtern getödtet wurden, eine helle durchscheinende, gelb gefärbte, bald wenig, bald vollständig gerinnende Flüssigkeit. Bei Hunden, die nach dieser Operation gefüttert worden, kam in den Saugadern des Dünndarms eine helle durchsichtige, nicht weisse Flüssigkeit vor, wie bei Hunden, die unter gleichen Umständen nicht gefüttert wurden, während die Flüssigkeit des Dünndarms bei Hunden mit nicht unterbundenem Gallengange weisslich ist. Der Inhalt des Ductus thoracicus gerinnt sowohl nach jener Operation, als ohne dieselbe, und es bildet sich im ersten Falle ein noch grösserer und mehr gerötheter Kuchen, als beim Hunde, dem der Gallengang nicht unterbunden worden ist. Das Serum des ersten war trüb, das des letzten weisslich. Der Chylus in dem Ductus thoracicus war gewöhnlich nach dieser Operation röther als sonst. Die Beschaffenheit des Chylus im Ductus thoracicus beweist indess hier nicht viel, da auch die von anderen Theilen kommende Lymphe gerinnt, und bei hungernden Thieren sehr lange immer noch Lymphe im Ductus thoracicus enthalten ist, wie Collard de Martigny gezeigt hat, wie denn auch die Lymphgefässe des Darms bei hungernden Thieren Lymphe führen. Es bleibt immer sehr wichtig, dass der Chylus im gefütterten Hunde mit unterbundenem Gallengang durchsichtig ist, während er beim Hunde im naturgemässen Zustande weiss ist. Tiedemann und Gmelin legen zwar auf diesen Umstand nicht viel Gewicht, indem sie die Bildung von Chylus auch ohne Galle für erwiesen halten. Denn, sagen sie, es sey bekannt, dass die weisse, milchige Farbe von Fetttheilchen im Chylus abhänge. Indessen verdient doch dieser Unterschied noch fernere Berücksichtigung, und der Antheil der Galle an der fernern Ausbildung des Chylus scheint durch jene Versuche nicht geradezu widerlegt zu werden. Tiedemann und Gmelin führen weiter an, dass die Hunde lange nach jener Operation noch gelebt hatten (3—7 Tage), in einem Fall, wo trotz der Wiederherstellung des Ganges die Gelbsucht blieb, 26 Tage bis zur Tödtung. Indessen leben Hunde ja selbst ohne alle Nahrungsmittel gegen 36 Tage.

Leuret und Lassaigne, welche ebenfalls behaupten, dass nach Unterbindung des Ductus choledochus noch die Verdauung und Bildung des Chylus fortdaure, führen an, dass die Galle die Eigenschaft habe, das Fett aufzulösen, dasselbe zu zersetzen und

Digitized by Google

damit eine Art von Seife zu bilden, und hierdurch die Verdauung des Fettes zu bewirken. Nach Tiedemann's und Gmelin's Versuchen (1. 78. 2. 263.) ist die Galle dagegen nicht im Stande, die kleinste Menge Fett aufzulösen, und sie kann deshalb bloss auf mechanische Weise durch Suspension des Fettes in Partikeln, zu dessen Vertheilung und Resorption beitragen. Die Galle scheint als Reiz für die peristaltischen Bewegungen des Darms nöthig zu seyn; denn bei verhindertem Ausflusse derselben findet Verstopfung statt.

Das Gemisch von Chymus, Schleim, Galle und pankreatischem Safte nimmt an Consistenz im untern Theil des Dünndarms zu und wird dunkler gefärbt. Die flüssigen Theile desselben werden von den Lymphgefässnetzen der Darmwände aufgenommen. Alles Festere, der Darmschleim, die Hülsen, die Holzfasern, der Hornstoff und diejenigen Stoffe der Galle, welche excrementiell sind, als Schleim, Färbestoff, Fett und Harz, bilden im Endtheil des Dünndarms den Anfang der Excremente, aus welchen jedoch im Dickdarm auch noch flüssige Bestandtheile aufgesogen werden. Tiedemann und Gmelin halten den sauren abgesonderten Saft des Blinddarms für ein ferneres Lösungsmittel von Thierstoff. Bei den pflanzenfressenden Thieren mit vorzugsweise grossem Blinddarme scheint besonders hierauf gerechnet zu seyn, und es ist sehr wahrscheinlich, dass beim Pferd, wo die Nahrungsstoffe in einem weit weniger aufgelösten Zustande den Pylorus passiren, auch in dem ungeheuren Dickdarm der Verdauungsprocess fortdauern muss. Schultz folgt Tiedemann und Gmelin in der Annahme einer erneuerten Verdauung im Blinddarm wegen der sich dort vorfindenden Säure, nimmt aber auch einen gewissen Antagonismus der Magenverdauung und Blinddarmverdauung an; bei den Wiederkäuern falle die erstere in die Tageszeit, die letztere in die Nachtzeit, und die erstere beginne dann, wenn die letztere aufhöre. In diesem Fall müsste eine Mahlzeit innerhalb 24 Stunden regelmässig den ganzen Darm durchlaufen haben; dies ist aber nicht regelmässig der Fall. In Tiedemann's Versuchen an Hunden, denen der Ductus choledochus unterbunden worden, zeigten sich die Excremente erst 2 Tage nach der Operation weiss; die Wiederkäuer behalten zumal den Wanst ganze Tage voll Futter. Schultz nimmt ferner an, dass bei der Dickdarmverdauung der Dickdarm geschlossen sey, und dass während der Chymification und Säurebildung im Dickdarm keine Galle in denselben fliesse, sondern im untern Theile des Dünndarms sich anhäufe, und nach beendigter Chymification erst in das Coecum eintrete, um den Chymus zu neutralisiren.

Während der Verdauung entwickelt sich, ausser der verschluckten, im Magen sich zum Theil in Kohlensäure verwandelnden Luft, im Verlauf des ganzen Darmkanals Gas. Seine Beschaffenheit hängt eines Theils von den Speisen, andern Theils aber von dem Zustande der Verdauungsorgane ab. In Affectionen des Nervensystems ist diese Entwickelung oft sehr reichlich, es ist zuweilen geruchlos, riecht meistens nach Schwefelwasserstoffgas und ist oft entzündlich. Es kann Wasserstoffgas, Kohlenwasserstoffgas, Schwefelwasserstoffgas

Digitized by Google

seyn. Nach den Beobachtungen, welche Magendie und Chevreul von diesen Gasen im Darmkanal von Hingerichteten machten, bestanden sie in 3 Fällen im Dünndarme aus:

Kohlensäuregas	24,39	40,00	25,00
Wasserstoffgas	55,53	51,15	8,40
Stickgas	20,08	8,85	66,60
	im Dickdarm,		Rectum.
Kohlensäuregas	43,50	70,00	42,86
Kohlenwasserstoffg. u. Spuren von Schwefelwasserstoffgas	5,47		
Wasserstoffgas und Kohlenwasserstoffgas		11,60	
reines Kohlenwasserstoffgas			11,18
Stickstoffgas	51,03	18,40	45,96

Ueber die Zusammensetzung der Excremente siehe Berzelius *Thierchem.* 254. Nach seiner Analyse der zusammenhängenden Excremente vom Menschen bestanden dieselben

aus Wasser			75,3
im Wasser löslich	Galle	0,9	5,7
	Eiweiss	0,9	
	eigener Extractivstoff	2,7	
	Salze	1,2	
extrahirter unlöslicher Rückstand von den Speisen			7,0
im Darmkanal hinzugekommene unlösliche Stoffe, Schleim, Gallenharz, Fett, eigene thierische Materie			14,0
			102,0

In der Cloake der Vögel und Amphibien kommen Harn und Excremente zusammen.

VI. Capitel. Von der Chylification.

Die verdauten Theile des Chymus werden während des Durchgangs durch den ganzen Darmkanal von den lymphatischen Gefässen aufgesogen. Wie die Resorption in allen lymphatischen Gefässen, sowohl denen des Darmkanals als denen anderer Theile, geschieht, ist in dem I. Buch, 3. Abschnitt vom Lymphsystem auseinandergesetzt worden. An den Zotten, in welchen die Lymphgefässnetze der Tunica villosa zum Theil entspringen, erkennt man keine mit dem Mikroskop deutlich sichtbare Oeffnungen auf ihrer Oberfläche, daher konnen auch alle leicht sichtbaren Theilchen des Chymus nicht in die Anfänge der Lymphgefässe aufgenommen werden, sondern nur das Aufgelöste kann leicht durch die unsichtbaren Poren der zartesten Lymphgefässe in dieselben eindringen. Wo die Kügelchen des Chylus sich bilden, ob aus den aufgelösten Theilen des Chylus innerhalb der Anfänge der Lymphgefässe des Darms, wo man den Chylus schon trüb und weiss und Kügelchen enthaltend antrifft, oder ob sie sich durch eine Abstossung von Theilchen der Lymphgefässe bilden, wie Doellinger annimmt, ist nicht gewiss; doch ist letztere Annahme un-

Digitized by Google

wahrscheinlich, da die weisse Farbe des Chylus nach der Natur der Nahrungsmittel variirt, und im geraden Verhältnisse mit der Menge des genossenen Fettes zunehmen soll. Eine schon p. 260. angeführte Beobachtung von dem zuweilen ganz weissen Serum des Blutes bei jungen Kätzchen, die noch an der Mutter saugen, könnte es wahrscheinlich machen, dass hier doch Kügelchen der Milch in die Lymphgefässe eindringen. Indessen ist jene Erscheinung bei jungen Kätzchen nicht constant, und könnte auch eins mit derselben, zuweilen bei Erwachsenen vorkommenden Erscheinung seyn, wenn der Chylus im Blute noch nicht verarbeitet ist, oder der Chylus viele Fetttheilchen enthalten hatte. Vergl. p. 260. und p. 154. Unsichtbare Poren müssen offenbar in den Wänden der Lymphgefässanfänge vorhanden seyn, weil sie Aufgelöstes aufnehmen; aber jedenfalls können diese Poren, selbst wenn sie Kügelchen hindurchlassen, nicht wohl grösser als die Chyluskügelchen selbst seyn, die nach Prevost und Dumas $\frac{1}{7799}$ Par. Zoll Durchmesser haben, und nach mir in der Mehrzahl (Kalb, Ziege, Hund) $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{3}$ Mal so gross sind als die Blutkörperchen eines Säugethiers. Denn wären jene Poren grösser, so würden auch grössere Theilchen des Chymus in die Lymphgefässe übergehen. Diese finden sich aber darin nicht vor; nur einmal, nämlich beim Kaninchen, sah ich die wenigsten der Chyluskügelchen grösser als die Blutkörperchen, und nur einmal fand ich sie gleich den Blutkörperchen, wie bei der Katze, die meisten kleiner. Indessen können jene grösseren Körperchen des Kaninchens wohl kaum durch die Wände der Darmzotten eingedrungen seyn, weil man so grosse Oeffnungen an ihnen müsste erkennen können. Die zwischen den Zotten deutlich sichtbaren, zahlreichen Oeffnungen, welche gegen 12mal grösser sind als die Blutkörperchen, sind blosse Crypten (Lieberkuehn'sche Drüsen) und scheinen mit der Resorption nicht in Beziehung zu stehen.

Chylus.

Der Chylus ist die vom Darmkanal während der Verdauung in die Lymphgefässe aufgenommene Materie, welche sich von der ausser der Verdauungszeit in diesen Gefässen enthaltenen Lymphe, und der Lymphe anderer Theile durch ihre weisse Farbe unterscheidet. Obgleich der Chylus bei den Vögeln in der Regel nicht weiss, sondern klar ist, und bei den pflanzenfressenden Thieren meist ebenfalls nicht so trüb ist, so ist er doch bei den Fleischfressern (selbst bei den Pflanzenfressern, so lange sie jung noch von Milch leben) immer mehr oder weniger trüb und weisslich. Die Farbe rührt von Kügelchen her, deren Grösse ich oben angegeben habe. Röthlich ist der Chylus nur ausnahmsweise und in seltenen Fällen, wie z. B. im Ductus thoracicus der Pferde; ich habe ihn bei den von mir untersuchten Thieren (Kalb, Ziege, Hund, Katze, Kaninchen), auch im Ductus thoracicus nie anders als weisslich gesehen. Der Chylus reagirt alkalisch, seinen Geruch haben Einige mit dem des männlichen Samens verglichen.

Der Chylus gerinnt freiwillig, einige Zeit nachdem er die Gefässe verlassen hat. Reuss und Emmert, so wie Tiedemann und

Digitized by Google

Gmelin, haben gefunden, dass diese Gerinnbarkeit zunimmt, je weiter der Chylus im lymphatischen System fortschreitet; so dass Chylus aus den Lymphgefässen des Darmkanals nicht gerinnt, selbst dann selten gerinnt, wenn er durch die Mesenterialdrüsen durchgegangen ist. Bei dem Gerinnen (10 Minuten, nachdem er aus dem Gefäss genommen ist, wie bei der Lymphe) sondert sich der Chylus des Ductus thoracicus in Coagula und Serum. Das Geronnene ist der Faserstoff des Chylus, vermengt mit einem Antheil der Kügelchen des Chylus. Das flüssige Serum ist eine Auflosung von Eiweiss, worin ein Theil der Kügelchen des Chylus suspendirt bleibt. Zugleich sondert sich auf der Oberfläche des Chylus eine rahmartige Masse ab, welche aus Fettkügelchen besteht. Nach der Coagulation wird das Coagulum vom Chylus des Ductus thoracicus in freier Luft häufig auffallend röther, als der Chylus vorher war. Emmert fand bei Vergleichung des Chylus der Lymphgefässe aus der Cysterna chyli, aus dem mittlern Theil und obern Theil des Ductus thoracicus des Pferdes, dass die Einwirkung der Luft den milchweissen Chylus der Lymphgefässe nur wenig veränderte, während der Cysternenchylus etwas röthlich wurde; letzterer coagulirte auch zum kleinern Theil. Der Chylus aus dem obern Theil des Ductus thoracicus erhielt an der Luft eine der Farbe des arteriösen Blutes ziemlich nahe kommende Farbe, auch trennte er sich in Serum und eine Art von Blutkuchen, welcher fester und grösser als in dem andern Chylus war. Das Serum von dem Chylus der Cysterne und der grossen Milchgefässstämme war dicklicher, trübe und enthielt eine Menge weissgelber Kügelchen. Das Serum vom Chylus des Brustganges war klar und zeigte dem blossen Auge keine Kügelchen. In Emmert's Versuchen enthielt der Chylus aus dem mittlern Theil des Ductus thoracicus etwas mehr thierischen Stoff, als der aus dem obern Theil, wahrscheinlich, weil letzterer ausser dem Chylus eine relativ grössere Quantität der viel dünneren Lymphe aus den übrigen Lymphgefässen des Körpers aufgenommen hat. Emmert in Scherer's *Journ. der Chemie.* 5. *p.* 164. 691. Vergl. Reil's *Arch.* 8. 146. Magendie sagt, wenn der Chylus von Nahrungsstoffen herrührt, welche kein oder wenig Fett enthalten, so ist der Chylus weniger weiss, sondern mehr opalartig; er trennt sich in Coagulum und Serum, und auf seiner Oberfläche sondert sich wenig oder keine rahmartige Materie ab. Kömmt der Chylus aber von animalischen oder vegetabilischen, fetten Substanzen, so ist der Chylus weiss, und theilt sich in dreierlei Bestandtheile, in Coagulum vom Faserstoff, in Serum und in eine rahmartige Schicht auf der Oberfläche der Flüssigkeit, welche die fettigen Bestandtheile enthält. Nach Marcet (*medico-chirurg. transact.* 1815. Meck. *Arch.* 2. 268.) geht der Chylus von Pflanzenkost auch langsamer in Fäulniss über, als der von thierischer Kost, und enthält mehr Kohle; ersterer soll immer milchig seyn und mehr Rahm absetzen, letzterer mehr durchsichtig seyn und keinen Rahm absetzen.

Tiedemann und Gmelin haben durch die grosse Anzahl ihrer Versuche über den Chylus, durch die Genauigkeit und die gleichzeitige anatomisch-physiologische und chemische Um-

Digitized by Google

sicht ihrer Versuche das entschiedenste Uebergewicht. Siehe B. 2. p. 66—95. Diese Naturforscher sagen, alle ihre Versuche beweisen auf das Bestimmteste, dass die weisse Trübung des Chylus von einem fein zertheilten, darin schwebenden Fette herrührt. Beim Gerinnen des Chylus trete es dem geringern Theil nach in die Placenta, dem grössern Theil nach bleibe es im Serum vertheilt, aus dem es sich zuweilen nach oben gleich einem Rahm erhebe. Tiedemann und Gmelin haben aus Chylusplacenta öfter ein gelblichbraunes Fett durch kochenden Weingeist ausgezogen. Beim Schütteln des milchichen Serums mit weingeistfreiem Aether erfolgte allmählige Klärung des Serums, und beim Abdampfen des Aethers erhielten sie um so mehr Fett (Gemenge von Elain und Stearin), theils in öliger, theils in talgartiger Form, je mehr das Serum getrübt gewesen war. Tiedemann und Gmelin schliessen daraus, was auch durch die Resultate verschiedener Fütterung bestätigt wird, dass das in dem thierischen Körper enthaltene Fett aus den Speisen in denselben übergehe, und dass es (wenigstens im Chylus) nicht in einem auflöslichen Zustande, sondern nur fein zertheilt vorhanden sey. Schafe mit Gras oder Stroh gefüttert, lieferten einen wenig getrübten, fast klaren Chylus. Sehr gering war auch die Trübung bei den mit flüssigem Eiweiss, mit Faserstoff, Leim, Käse, Stärkemehl, Kleber gefütterten Hunden, und dem mit Stärkemehl gefütterten Pferde. Mässig trüb war der Chylus des mit Hafer gefütterten Schafes. Starke milchige Trübung zeigte sich dagegen bei Hunden nach dem Genuss von geronnenem Eiweiss, Milch, Knochen, Rindfleisch, bei Pferden nach Hafer. Am stärksten getrübt war der Chylus des mit Butter gefütterten Hundes. Nach Unterbindung des Gallenganges zeigte sich der Chylus weniger milchig als sonst. Vielleicht rührt diess nach Tiedemann und Gmelin daher, dass die Galle das Vermögen hat, das Fett der Speisen mit der wässrigen Flüssigkeit in einer sehr zarten Suspension mikroskopischer Partikelchen zu vertheilen.

Eine reine Auflösung von Thierstoff, in welcher keine anderen als Fettkügelchen schweben, scheint übrigens der Chylus nicht zu seyn. Als ich milchiges Serum vom Chylus der Katze in einem Uhrglas mit weingeistfreiem Aether versetzte, schien sich zwar anfangs allmählig das Serum etwas aufzuklären; aber es blieb doch, selbst nach langer Fortsetzung des Versuchs unter immer neuem Zugiessen von Aether, unten ein trübes Wesen zurück, und als ich dieses unter dem Mikroskop untersuchte, bemerkte ich darin ganz unveränderte Kügelchen. Ich fütterte einen Hund mit Brot, Milch und etwas Butter, und tödtete ihn 5 Stunden darauf. Der Chylus des Ductus thoracicus wie der Lymphgefässe war weiss; diesen Chylus untersuchte ich tropfenweise unter dem Mikroskop. Hier sah ich, dass er viele an Grösse sehr ungleiche Oelkügelchen enthielt, welche ganz durchscheinend waren. Der weit grössere Theil der Chyluskügelchen war aber ganz anderer Art, nämlich weisslich und nicht durchscheinend, sehr klein und ohngefähr $\frac{1}{2}$ bis $\frac{2}{3}$ so gross als die Blutkörperchen dieses Hundes, wie ich früher auch am Kalbe diesen Unterschied

Digitized by Google

bemerkt hatte. Die kleinen Kügelchen sind in ungeheurer Menge vorhanden und sind offenbar die Ursache der weissen Farbe; ihre Gestalt ist nicht so regelmässig wie die der Blutkörperchen. Fettkügelchen sind diess wohl nicht; sie sind kleiner als die von mir und Dr. Nasse in der Lymphe des Menschen gefundenen Kügelchen. Ich habe auch die Gerinnung des Chylus unter dem Mikroskop an grossen Tropfen beobachtet, die ich mit etwas Wasser vermischte, um die Kügelchen mehr von einander zu entfernen und zu sehen, ob das Gerinnsel durch blosse Aggregation der Kügelchen entsteht, oder durch Gerinnung eines vorher aufgelösten Stoffes, welcher beim Gerinnen die Kügelchen in sich aufnimmt. Die überaus zarten Häutchen, welche entstanden, bestanden nicht bloss aus aggregirten Kügelchen, sondern es war noch ein durchsichtiger Stoff dazwischen, welcher die Kügelchen zusammen verband, auch wenn sie nicht dicht aneinander lagen. Es ist also gerade so, wie bei der Lymphe und dem Blute. Auf den auf einer Glasplatte ausgebreiteten Chylustropfen entstanden aber nicht bloss Häutchen, welche die schwebenden Kügelchen verbanden, sondern auch an einzelnen Stellen kleine Fettinselchen, welche fast ganz durchsichtig waren, und wovon ich nicht weiss, ob sie durch das Aneinanderfügen und Erkalten der Oelkügelchen entstehen. Die mikroskopischen Untersuchungen über den Chylus sind noch in der Kindheit. Vor allem wäre das Verhältniss der kleinen Chyluskügelchen zu den Blutkörperchen auszumitteln, ob die Blutkörperchen aus den Chyluskügelchen entstehen, ob die von mir im Blute der Frösche und Vögel, von Home im Blute des Menschen beschriebenen kleineren Kügelchen Chyluskügelchen sind. Dann wäre sehr wünschenswerth, zu wissen, ob die Chyluskügelchen bei den Thieren, welche elliptische und grosse Blutkörperchen haben, wie Amphibien und Vögel, im Ductus thoracicus vielleicht auch schon elliptisch sind, oder nicht, um zu erfahren, wo die Form der Blutkörperchen entsteht. Diess liesse sich nur bei grösseren Amphibien, wo der Ductus thoracicus leichter zu finden ist, oder bei Fischen ermitteln. Rudolphi führt zwar aus Leuret und Lassaigne an, dass die Chyluskügelchen der Vögel rund seyen, während doch ihre Blutkörperchen oval sind. Indess sprechen Leuret und Lassaigne hier nicht von Chyluskügelchen, sondern Chymuskügelchen aus dem Darm der Vögel.

Tiedemann und Gmelin haben weitere, sehr ausgebreitete Untersuchungen über die Veränderungen des Chylus nach den Nahrungsmitteln angestellt. Nach ihnen ist der Chylus röther bei den Pferden als bei den Hunden, bei diesen röther als bei den Schafen. Bei dem Hunde röthete sich die Placenta des Chylus lebhafter nach der Fütterung mit flüssigem Eiweiss, Butter, Milch, Knochen, und mit Fleisch, Brot und Milch. Der Chylus war weiss und die Placenta wenig roth nach Fütterung mit Faserstoff, Leim, Käsematte, Stärkemehl und Butter, und mit Kleber. Nach der Fütterung mit Eiweiss zeigte weder der ganze Chylus noch die Placenta eine rothe Färbung, wie ich auch beim Hunde nach Fütterung mit Brot, Milch und Butter bemerkte. Bei den im nüchternen Zu-

Digitized by Google

stande getödteten Hunden, so wie bei den Hunden, welche Stärkemehl, Milch, rohes oder gekochtes Rindfleisch, Rindfleisch und Semmel, flüssiges Eiweiss und Spelzbrot, und bei den Katzen, die Brot und Milch, oder gekochtes Rindfleisch erhalten hatten, war der Chylus ebenfalls nicht roth (Tiedemann und Gmelin). Pferde im nüchternen Zustande hatten eine mehr dunkelrothe Flüssigkeit des Ductus thoracicus, als diejenigen, welche Hafer genossen. Der Chylus der Schafe, die nur wenig Heu oder Stroh erhalten hatten, gab ein röthlichweisses Coagulum, der Chylus der mit Hafer gefütterten ein weisses. Aus den letzten Erfahrungen schliessen Tiedemann und Gmelin, dass der Chylus um so weniger rothen Färbestoff enthält, je besser die Thiere gefüttert worden sind, und dass das Blutroth sich nicht unmittelbar mittelst der Verdauung erzeugt; die namentlich von der Milz kommende röthliche Lymphe, welche Hewson, Tiedemann und Gmelin und Fohmann beobachtet, und die auch ich bei Ochsen theilweise gesehen habe, wird um so mehr in dem Chylus bemerkbar seyn, je weniger Nahrungsstoffe vom Darmkanal aus er enthält.

Der Chylus eines mit Hafer gefütterten Pferdes, aus den Saugadern erhalten, ehe sie durch eine Drüsenreihe gegangen waren, war weiss, röthete sich nicht an der Luft und gab auch eine weisse Placenta. Der Chylus aus den Saugadern des Mesenteriums, welche durch Drüsen gegangen waren, und der Chylus des Ductus thoracicus zeigten sich hellroth, die Lymphe aus den Saugadern des Dickdarms war blassgelb und lieferte ein weisses Coagulum; die der Saugadern des Beckens war roth, und gab noch ein dunkleres Coagulum als der Chylus des Ductus thoracicus. Tiedemann und Gmelin schliessen aus diesen mit Emmert's Erfahrungen übereinstimmenden Resultaten, dass der rothe Stoff dem Chylus erst durch die Mesenterialdrüsen und durch die Lymphe der anderen Lymphdrüsen, so wie durch die Lymphe der Milz aus dem Blute mitgetheilt wird, welches die Capillargefässe dieser Theile durchströmt. Was die Lymphe der Milz betrifft, so hat zuerst Hewson (*Op. posth. ed. Lugd. Batav.* 1785.) gefunden, dass dieselbe röthlich wie verdünnter rother Wein ist und rothe Kügelchen enthält. Tiedemann und Gmelin haben dieseFarbe bei gefütterten wie nüchternen Thieren gesehen. Fohmann (*Saugadersyst. der Fische. p.* 45.) hat es bei Vivisectionen der Rochen gesehen und behauptet, in der Verdauungszeit sey die Lymphe der Milz bei diesen Thieren röthlicher, nach längerer Abstinenz von Nahrungsstoffen werde sie indess auch röthlicher, eben so wie die Lymphe der Leber. Rudolphi sagt, die Lymphgefässe der Milz seyen in der Regel so weiss als die der Leber und anderer Organe, und führen auch an anderen Organen mitunter eine blutige Flüssigkeit. Hier muss ich jedoch bemerken, dass die Lymphe anderer Organe als des Darms nie weiss ist, und dass ich in einigen Fällen, wo ich im Schlachthause gleich nach dem Tode die Milzlymphe der Ochsen untersuchte, sie in einigen dickeren Lymphgefässen wie verdünnten rothen Wein sah. Seiler sah sie bei Pferden einige

Digitized by Google

Mal in einzelnen Lymphgefässen der Milz röthlich, bei den meisten Pferden farblos, bei Rindern, Eseln, Schafen, Schweinen, Hunden niemals gefärbt.

Ueber das Verhältniss des Faserstoffs zum Serum des Chylus haben Tiedemann und Gmelin folgende Resultate erhalten. Der Chylus der Pferde gerann am stärksten; er enthielt in 100 Theilen 1,06—5,65 frische Placenta, und 0,19—1,75 trocknen Faserstoff. Der Chylus der Hunde gerann schwächer; die Menge des Gerinnsels betrug in 100 Theilen 1,36—5,75, und des trocknen Gerinnsels 0,17—0,56. Der Chylus der Schafe war am wenigsten gerinnbar; 100 Theile enthielten 2,56—4,75 frischen, und 0,24—0,82 trocknen Kuchen. Das Contentum des Ductus thoracicus von nüchternen Thieren gerann vollständiger, und enthielt mehr frischen und trocknen Kuchen als der Chylus von gefütterten Thieren; er betrug getrocknet bei nüchternen Pferden 1,00—1,75, jener der gefütterten Pferde 0,19—0,78 Proc. des Chylus. Hieraus schliessen Tiedemann und Gmelin, dass der Faserstoff des Chylus nicht von den Nahrungsmitteln, sondern von der Lymphe herrührt und seinen Ursprung dem Blut verdankt, worin sie dessen Erzeugung annehmen; sie glauben nicht, dass aus den Nahrungsstoffen selbst in den Chylificationswegen Faserstoff gebildet werde. Wenn man diess zugiebt, so muss man auch annehmen, dass die blasse Lymphe der nicht chylusführenden Lymphgefässe, wenn sie wirklich beim Weiterfortschreiten an Faserstoff zunimmt, keine Umwandlung ihres Eiweisses in Faserstoff erfährt, sondern nur durch Zumischung von aufgelöstem Faserstoff des Blutes auf dem Wege ihres Fortganges gerinnbarer wird. Indessen ist diese Meinung über die materielle Zumischung von Faserstoff zum Chylus in den Chylificationswegen jetzt eben so wenig zu beweisen, als die entgegengesetzte Ansicht, dass der Eiweissstoff des Chylus selbst zum Theil in Faserstoff umgewandelt wird. Um hierüber ins Reine zu kommen, wäre eine noch grössere Reihe von Beobachtungen nöthig über die Menge der festen Theile, besonders des Eiweisses, die sich im Serum des Chylus aufgelöst finden in verschiedenen Theilen des Lymphsystems. Wenn z. B. das Serum nach Abscheidung des Faserstoffs vom Chylus des Ductus thoracicus weniger Eiweiss enthielte, als das Serum von der Lymphe der Extremitäten und der Chylus der Saugadern des Darms, und wenn diess constant wäre, so wäre es ausgemacht, dass Eiweiss in dem lymphatischen System in Faserstoff umgewandelt würde, indem dann die Menge des Eiweisses abnimmt, während die des Faserstoffs zunimmt. Tiedemann's und Gmelin's Versuche haben hierin, wie unten ersehen wird, keine constanten, sondern vielmehr widersprechende Resultate gehabt.

Aus beiden Hypothesen lässt sich die Zunahme des Faserstoffgehaltes im Chylus bis zum Ductus thoracicus erklären. Ueber die letzte schon von Emmert beobachtete Thatsache haben Tiedemann und Gmelin noch folgende Erfahrungen gemacht. Bei einem mit Hafer gefütterten Pferde gerann der Chylus der Saugadern vor dem Durchgang durch Drüsen nicht. 100 Theile Chylus von Saugadern, der durch Mesenterialdrüsen hindurchgegan-

Digitized by Google

gen, gaben 0,37 trockne Placenta, der Chylus des Ductus thoracicus 0,19, die Lymphe des Beckens 0,13. Bei dem nüchternen Pferde enthielt die Lymphe des Ductus thoracicus 0,42, die des Plexus lumbalis 0,25 trockne Placenta. Das Contentum des Ductus thoracicus, in welchem Chylus der Darmsaugadern und Lymphe von den übrigen Theilen des Körpers zusammenkommen, stand in Hinsicht des Gehaltes an trocknem Faserstoff in der Mitte zwischen dem Chylus der Chylusführenden Saugadern, und der Lymphe der Saugadern des Beckens.

Die Menge der festen im Serum aufgelösten Stoffe wechselte in Tiedemann's und Gmelin's Versuchen von 2,4—8,7 Proc. Bei dem mit Hafer gefütterten Pferde erhielten Tiedemann und Gmelin 4,9 Proc. feste Theile des Serums vom Chylus der Saugadern des Gekröses, 3,04 von dem des Ductus thoracicus, 3,1 Proc. aus dem Serum der Lymphe des Beckens; das Serum der Lymphe aus den Saugadern des Dickdarms enthielt gegen 4 Proc. Bei dem nüchternen Pferde dagegen enthielt das Serum von der Lymphe des Ductus thoracicus 4,7, von der Lymphe des Plexus lumbalis nur 3,7 Proc. feste Theile. Im Serum des Chylus waren enthalten Eiweissstoff, eine im Wasser und nicht im Weingeist lösliche Materie, dem Speichelstoff verwandt, ferner im Wasser und Weingeist lösliche Materie, Osmazom, essigsaures Natron, kohlensaures Natron, phosphorsaures Natron, schwefelsaures Natron, Kochsalz (die grösste Menge), kohlensaurer und phosphorsaurer Kalk. Hieraus geht hervor, dass dieselben Salze, welche im Darmkanal sich befinden, auch im Chylus vorkommen. Bei nüchternen Thieren enthielt das trockne Serum mehr Eiweiss und speichelstoffartige Materie, dagegen weniger osmazomartige Materie, und weniger Fett als das Serum gefütterter Thiere.

Analyse des Chylusserum des Pferdes von Gmelin.

Braunes Fett	15,47
Gelbes Fett	6,35
Osmazom, essigsaures Natron und Kochsalz in Octaëdern krystallisirt, wahrscheinlich in Folge einer thierischen Materie	16,02
Im Wasser lösliche, im Alcohol unlösliche, extractartige Materie mit kohlens. und sehr wenig phosphors. Natron	2,76
Eiweiss	55,25
Kohlensaurer und etwas phosphorsaurer Kalk, beim Verbrennen des Eiweisses erhalten	2,76
	98,61

Von den Nahrungsstoffen der Thiere liessen sich in der Regel keine unveränderten Spuren mehr im Chylus erkennen, nur dass nach dem Genuss der Butter der Chylus überaus reich an Fett war, und nach dem Genuss von Stärkemehl im Chylus eines Hundes sich Zucker zeigte.

Die Veränderungen des Chylus im lymphatischen Systeme, mögen sie nun in der Beimischung von Materie, oder in der Umwandlung des Chylus selbst liegen, geschehen offenbar von den

Digitized by Google

Wänden der Lymphgefässe in und ausserhalb der Lymphdrüsen; dass in den letztern auch der Einfluss der Wände der Lymphgefässnetze die Hauptsache ist, beweisen die Vögel, Amphibien und Fische, welche keine Mesenterialdrüsen besitzen. Man muss sich daher auch die Mesenterialdrüsen selbst nur als aus den Lymphgefässnetzen der eintretenden und austretenden Lymphgefässe zusammengesetzt denken, worin der Contact des Inhaltes mit den Gefassen durch Flächenvermehrung vervielfältigt ist. Da diese Lymphgefässnetze, wie Injectionen von Quecksilber zeigen, nicht sehr klein sind, so müssen die Lymphgefässe in jenen Netzen ihre Wände behalten, und diese Wände müssen wie in den einfachen Lymphgefässen von den sehr feinen Capillargefässnetzen durchzogen seyn, so dass das Blut nur mittelbar durch die Capillargefässnetze in den Wänden der Lymphgefässe mit dem Chylus der Lymphdrüsen in Berührung kömmt, wobei allerdings aufgeloste Theile des Blutes, vielleicht der Faserstoff, durchdringen können, vielleicht auch Färbestoff des Blutes, der sonst an den Blutkörnchen haftet, in den Zustand der Auflösung tritt und in den Chylus übergeht. Blutkörperchen selbst können hierbei nicht in den Chylus übergehen. Ueber die sehr zweifelhafte Aufnahme von Chylus in feinen Venen der Lymphdrüsen, so wie über den problematischen Zusammenhang von Venen und Lymphgefässen siehe oben p. 268.

Was die Aehnlichkeit und den Unterschied von Chylus und Lymphe betrifft, so stimmen beide darin überein, dass sie Kügelchen enthalten, allein die der Lymphe sind überaus sparsam, die Kügelchen des Chylus machen diese weisslich, die Lymphe ist klar und meistens farblos; sie stimmen ferner überein, dass sie Faserstoff aufgelöst enthalten, doch scheint letzterer in geringer Quantität in der Lymphe enthalten; denn in Tiedemann's und Gmelin's Beobachtungen von einem mit Hafer gefütterten Pferde gaben 100 Theile Chylus aus den Saugadern des Mesenterium 0,37 trockne Placenta, die Lymphe des Beckens nur 0,13. Dieser Unterschied kann indess auch scheinbar seyn und von der grossen Menge der im Chylus enthaltenen und vom Coagulum des Faserstoffs zum Theil mit eingeschlossenen Kügelchen herrühren. Lymphe und Chylus unterscheiden sich aber auch sehr durch den Gehalt von Fett in dem letztern, welches in der Lymphe nicht bemerkt wird, ein Unterschied, welcher verursacht, dass der Chylus ausser dem Gerinnsel, auch eine rahmartige Masse an der Oberfläche häufig absetzt. Die Salze des Chylus und der Lymphe scheinen ohngefahr dieselben, auch die Lymphe enthält sehr viel Kochsalz, und reagirt alkalisch. Dass die häufig röthliche Farbe des Chylus vom Färbestoff des Blutes herrührt, wird durch Tiedemann's und Gmelin's Versuche bewiesen, welche gezeigt haben, dass diess Roth von Hydrothionsäure grün gefärbt wird. Dass dieses Blutroth aus den Nahrungsmitteln ausgebildet werde, ist gar nicht wahrscheinlich, weil auch besonders die Lymphe der Milz oft röthlich ist. Eine andere Frage ist, ob das Blutroth des Chylus und der Milzlymphe den Kügelchen derselben anhaftet, wie das Blutroth den Blutkörperchen, oder ob

Digitized by Google

es aufgelöst ist. In Tiedemann's und Gmelin's Versuchen war nicht allein die Placenta von röthlichem Chylus röthlich, sondern häufig auch das Serum noch röthlich; indess ist das Serum von Chylus selten klar und enthält immer noch Kügelchen, und Emmert will sogar nach Auswaschen des röthlichen Chyluskuchens in dem Wasser rothe Kügelchen bemerkt haben. Hewson sah in der rothen Milzlymphe rothe Körperchen. Schultz (*Syst. d. Circulation*) und Gurlt (vergl. *Physiol. d. Haussäugethiere*) fanden im Chylus ausser den Chyluskügelchen auch einzelne Blutkörperchen und schliessen daraus, dass die röthliche Farbe des Chylus von ihnen herrühre und dass sich solche Körperchen schon im Chylus zu bilden beginnen. Vom Blut unterscheidet sich der Chylus, wie er sich im Ductus thoracicus befindet:

1. Durch die Unauflöslichkeit der Chyluskügelchen im Wasser, während die Blutkörperchen bis auf ihren unlöslichen Kern im Wasser sich leicht auflösen.

2. Durch den Mangel der Substanz des Blutrothes. (Nicht constant.)

3. Durch die Form der Kügelchen und ihre Grösse.

4. Der Chylus reagirt zwar alkalisch, wie Emmert, Vauquelin und Brande fanden, aber nach Tiedemann und Gmelin schwächer als Blut, und zuweilen gar nicht.

5. Die Quantität der festen Stoffe ist im Chylus geringer als im Blute. 1000 Theile Chylus enthalten nach Vauquelin nur 50—90 Theile feste Substanz, während nach Prevost und Dumas 1000 Theile Blut 216 und nach Lecanu 185 feste trockne Theile enthalten. Nach Reuss und Emmert enthielten 1000 Blutserum 225, dagegen 1000 Chylusserum nur 50 feste Theile.

6. Im Serum des Chylus sind nach Tiedemann und Gmelin bei den Schafen, Hunden, Pferden 2,4—8,7 Proc. feste Theile enthalten, nach Prevost und Dumas im Serum des Blutes dieser Thiere aber 7,4 bis 9,9 feste Theile.

7. Die Quantität des Faserstoffs ist im Chylus ausserordentlich viel geringer. 100 Theile Chylus von Pferden, Hunden, Schafen enthielten nach Tiedemann und Gmelin 0,17—1,75 trocknen Faserstoff. In Reuss's und Emmert's Versuchen (Scherer's *Journal* 5. 164.) enthielten 1000 Theile Blut vom Pferde 75 (nassen?) Faserstoff, 1000 Theile Chylus nur 10.

8. Der Faserstoff des Chylus scheint auch in seiner Ausbildung einigermassen von dem Faserstoff des Blutes verschieden und dem Eiweiss näher zu stehen; denn nach Brande löst Essigsäure von dem Chyluskuchen (so wie von Eiweiss) nur einen kleinen Theil auf, da hingegen der Faserstoff sonst ziemlich auflöslich ist in Essigsäure.

9. Im Chylus ist viel freies Fett enthalten, welches den Rahm auf der Oberfläche bildet. Blut enthält kein freies, sondern gebundenes Fett, was auch ausserdem im Chyluskuchen enthalten ist.

10. Der Chylus enthält Eisen gleich dem Blute, und bringt diesen Stoff aus den Nahrungsmitteln ins Blut. Aber das Eisen scheint in dem Chylus lockerer von anderen Theilen gebunden zu seyn, und lässt sich daraus viel leichter durch Reagentien

Digitized by Google

erweisen, als im Blut. Die salpetersaure Auflösung des röthlichen Faserstoffs vom Chylus wird nach Emmert von Galläpfeltinctur schwarz, und giebt mit blausaurem Kali einen berlinerblauen Bodensatz. Der ausgewaschene Kuchen, von Salpetersäure aufgelöst, wurde von Kalilösung bräunlich und gab beim Aufgiessen von blausaurem Kali und Salzsäure ein berlinerblaues Präcipitat, auch das zum Auswaschen des Kuchens gebrauchte Wasser, welches im Bodensatz kleine rothe Körperchen zeigte (?), zeigte eine Reaction dieser Materie auf phosphorsaures Eisen. Auch das Serum des Chylus reagirte auf Eisen selbst dann noch, wenn es von Eiweiss befreit worden; Reil's *Arch.* 8. *p.* 167. Das Eisen scheint im Chylus lockerer gebunden als im Blute, weil es sich schon durch Salpetersäure ausziehen lässt, und mit Galläpfeltinctur einen schwarzen, mit blausaurem Kali einen blauen Niederschlag giebt. Dagegen vermuthet Emmert, dass das Eisen, welches sich in den Nahrungsstoffen des Dünndarms vorfindet, einen höheren Grad von Oxydation besitze, weil die Flüssigkeit aus dem Dünndarm der Pferde sauer ist, weil die filtrirte Flüssigkeit aus dem Darm des Pferdes, der mit verdauten Speisen angefüllt war, mit Galläpfeltinctur und blausaurem Kali gleich nach der Vermischung einen schwarzen und blauen Niederschlag gab, während der Chylus nur sehr langsam die Farbeveränderung zeigte.

Nach der Unterbindung des Ductus thoracicus folgt der Tod in der Regel unvermeidlich, nach Duverney in 15, nach A. Cooper in 9—10 Tagen, nach Dupuytren's Versuchen an Pferden in 5—6 Tagen; zuweilen unterliegen die Thiere nicht, wenn noch mehrere Verbindungen des untern Theils des Ductus thoracicus mit dem obern Theil desselben stattfinden, auch wohl wenn, wie Panizza bei Schweinen, und Wutzer mit mir einmal beim Menschen sah, Verbindungen mit der Vena azygos stattfinden, oder wenn 2 Ductus thoracici vorhanden sind (Vögel, Schildkröten).

Schriften über den Chylus: Werner *de modo quo chymus in chylum mutatur. Tübingae*, 1800. Horkel's *Archiv für die thierische Chemie. T.* 1. *Heft* 2. Emmert und Reuss, Scherer's *Journal* 5. *p.* 154. 691. Emmert, Reil's *Archiv* 8. p. 145. Marcet *medico-chirurg. transact.* 1815. 6. 618. Meck. *Arch.* 2. 268. Brande *philos. transact.* 1812. Meck. *Arch.* 2. 278. Prout *Annals of philos.* 13. *p.* 12. 263. Meck. *Arch.* 6. 78. Ant. Mueller *dissert. exp. circa chylum. Heidelb.* 1819. Tiedemann und Gmelin a. a. O. 2. 66.

VII. Capitel. Von der Function der Milz, der Nebennieren, der Schilddrüse und der Thymusdrüse.

Die hier genannten *Drüsen ohne Ausführungsgänge* (p. 433.) haben mit einander gemein, dass sie dem durch sie strömenden Blute irgend eine materielle Veränderung mittheilen, oder dass die von ihnen abstammende Lymphe eine besondere Rolle in der Chylification und Blutbildung spielt. Denn das Venenblut, das von ihnen

Digitized by Google

kommt, und die von ihnen kommende Lymphe sind die einzigen von ihnen ausgeführten und in die allgemeine Oekonomie zurückfliessenden Stoffe.

A. Von der Milz.

1. *Bau der Milz.* (Mueller *im Archiv der Anat. und Physiol.* 1834. 1.)

Die Milz kömmt nur bei den Wirbelthieren vor, sie ist hier fast durchaus beständig. Nach Rathke und Meckel sollte sie bei den Cyclostomen (Petromyzon, Ammocoetes) fehlen. Mayer (Froriep's *Notizen* 737.) hält ein drüsiges Organ an der Cardia von Petromyzon marinus für die Milz. Bei Myxine fehlt die Milz nach Retzius wirklich, was ich von diesem Thiere wie von dem verwandten Bdellostoma bestätigen kann. Sonst ist die Milz allgemein. Sie fehlt weder beim Chamäleon, wo sie Treviranus vermisst hat, noch bei den Schlangen, wo sie meist Meckel übersah, bei den letzteren liegt sie, nach Retzius und Mayer in der Nähe des Pankreas. Bei den Cetaceen ist die Milz in mehrere Milzen zerfallen. Die Milz liegt beim Menschen und den Säugethieren in demjenigen, doppeltblättrigen Theile des Peritoneums, der von der vordern und hintern Fläche des Magens zur grossen Curvatur desselben hingehend zwischen der grossen Curvatur, dem Zwerchfell und dem Colon transversum ausgedehnt ist; vom Magen ab bis zum Colon transversum Netz, Netzbeutel genannt wird. Da dieser Theil des Peritoneums beim Embryo vor dem 4. Monat mit dem Colon noch nicht verwachsen ist, sondern in der hintern Wand der Bauchhöhle in das Peritoneum sich inserirt, oder darin fortsetzt, so ist dieser, anfangs von der grossen Curvatur zur hintern Wand der Bauchhöhle sich erstreckende, und anfangs noch nicht herabhängende Theil des Bauchfells frühzeitig ein wahres Magengekröse (Mesogastrium). Siehe oben p. 492. Die Milz, welche zwischen den zwei Blättern dieses Theils liegt, ist also ursprünglich im Magengekröse enthalten, gleich wie die Lymphdrüsen im Mesenterium enthalten sind. Betrachtet man nun das ganze Gekröse als von der hinteren Mittellinie ausgehend, wie denn auch das Magengekröse anfangs von der hintern Mittellinie zur grossen Curvatur gelangt, so ist also, genau genommen, die Milz nicht ein Organ der linken Hälfte des Körpers, sondern der Mittellinie zwischen den beiden Blättern des Mesogastriums, in der Gefässschicht sich erzeugend. Erst allmählig, da die Insertion des Mesogastriums in die hintere Bauchwand sich nach links wendet, kömmt auch die Milz nach links. Die Milz ist also kein Organ der linken Seite, der das Paarige der rechten Seite fehlt, eben so wie auch die Leber ursprünglich nicht vorzugsweise der rechten Seite, sondern mit gleichen Hälften der Mittellinie angehört.

Die Milz ist von einer festen fibrösen Haut überzogen, welche viele balkenartige Fortsätze durch das Innere der Milz ausschickt, durch welche das zarte, pulpöse, rothe Gewebe der Milz suspendirt ist. Innerhalb dieses rothen Gewebes kommen bei

Digitized by Google

mehreren Thieren weissliche, runde, mit blossen Augen sichtbare Körperchen vor, welche von Malpighi zuerst entdeckt worden. Beim Menschen hat man sie bald angenommen, bald geläugnet (Rudolphi).

Diese Körperchen sind nach Dupuytren und Assolant in der Milz des Menschen graulich, sehr weich und nicht hohl, und haben einen Durchmesser von $\frac{1}{3}$ bis 1 Par. Linie. Sie sollen so weich seyn, dass sie beim Aufheben mit dem Messer zerfliessen. Nach Meckel sind es rundliche, weissliche, höchst wahrscheinlich hohle, oder wenigstens sehr weiche Körperchen von $\frac{1}{6}$ bis 1 Linie Durchmesser, sehr gefässreich. Dergleichen weiche, beim Druck leicht zerfliessende Körperchen sieht man allerdings zuweilen bei dem Hunde, der Katze und in sehr seltenen Fällen deutlich beim Menschen. Sie sind es, welche nach Home, Heusinger und Meckel, bei Thieren, nach eingenommenem Getränk, beträchtlich anschwellen sollen, was ich bezweifle. Etwas durchaus Verschiedenes sind die von Malpighi ursprünglich gemeinten Körperchen der Milz einiger Pflanzenfresser. Ueber die Beschaffenheit der unbestimmten, weissen weichen Pünktchen in der Milz einiger Säugethiere habe ich nichts herausbringen können; aber die traubenförmigen Körperchen in der Milz des Rindes, des Schafes und des Schweins können sehr gut in Hinsicht ihres Zusammenhanges und ihrer Beschaffenheit untersucht werden. Folgendes ist dasjenige, was ich darüber gefunden habe.

In der Milz mehrerer pflanzenfressenden Thiere (des Rindes, des Schafes, des Schweins) giebt es gewisse runde, weisse Körperchen von der Grösse von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ Millimeter; diese Körperchen sind ziemlich hart, und weit entfernt, beim Druck zu zerfliessen. Rudolphi (*Grundriss der Physiologie. Band II. Abtheilung 2. p.* 175.), welcher die Malpighi'schen Körperchen nur in der Milz von Säugethieren annimmt, sagt, dass sie herausgehoben zusammenfallen oder zerfliessen. Diess kann sicherlich nicht von den weissen Körperchen, welche hier beschrieben werden, gelten, da diese bestimmt umschriebenen und fast durchgängig gleich grossen Theilchen ganz consistente und dem Druck einigermassen widerstehende, beim sanften Zerreiben der Milz meist unzerstörbare Bildungen sind. Man sieht sie bald an der Milz des Schweines, Schafes, Rindes, auf Durchschnitten der Milz, oder noch besser, wenn man die Milz zerreisst, auf den Rissflächen, oder wenn man die Milz dieser Thiere einige Zeit maceriren lässt; dann nämlich erweicht sich die pulpöse Substanz der Milz ganz und wird schwärzlich, während die weissen Körperchen viel länger ungefärbt, nämlich weissgrau und unaufgelöst sich erhalten. Sind zerrissene Stücke der Milz einige Zeit macerirt worden, so erkennt man auch deutlich den Zusammenhang der Körperchen; man sieht, dass sie unter einander durch Fäden verbunden sind, und man kann ganze Büschel derselben aus der halbmacerirten Milz des Schweines und Schafes absondern. Bei Untersuchung der frischen Milz dieser Thiere ist es viel schwerer, den Zusammenhang dieser Körperchen zu erkennen; nur mit grosser Ge-

Digitized by Google

duld lassen sich Büschel zusammenhängender Körper rein herauspräpariren, indem man unter der Loupe mit Nadel und Pincette arbeitet. Heusinger (*Ueber den Bau und die Verrichtung der Milz. Thionville*, 1817.) bemerkt, wenn man ein Stück Milz, worin sich weisse Körperchen befinden, im Wasser einige Zeit zwischen den Fingern reibe, so könne man sie in kleinen Häufchen absondern, so dass sie nun traubenartig zusammenhängen und an kleinen Stielchen befestigt scheinen. Diess ist ganz richtig, kann aber bloss von den hier gemeinten weissen Körperchen des Schweines, Schafes, Rindes gelten.

Diese Körperchen sind rundlich, zuweilen auch oval, fast durchgängig gleich gross; sie variiren beim Schwein und Schaf von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ Millimeter Durchmesser, beim Rind sind sie ein wenig grösser. Am leichtesten ist es, sie in der Milz der Schweine und Schafe zu untersuchen; ich kann mir es nur durch einen Gedächtnissfehler erklären, dass Rudolphi diese Körperchen beim Schweine ganz läugnet, da sie doch bei keinem Thiere leichter zu sehen, leichter zu untersuchen sind.

Bei näherer Untersuchung sieht man nun, dass keines dieser Körperchen isolirt ist; immer wird man jedes Körperchen nach einer oder nach beiden Seiten hin in Fortsätze auslaufen sehen. Zuweilen, aber selten, sind sie unter einander eine Strecke wie Knötchen einer Schnur verbunden, während die einzelnen Knötchen wieder feine Würzelchen ausschicken; meistens sitzen sie kurz gestielt an weniger dicken Fäden, welche Aeste von anderen Fäden sind, oder, was am häufigsten ist, sie sitzen an der Seite von ästigen Fäden mit schmälerer oder breiterer Basis ungestielt auf. Die Fäden, welche sie verbinden, werden allmählig dünner in der Richtung der Verzweigung und gehen offenbar von grösseren Strängen aus. Die stärkeren Aeste, woran sie sitzen, zeigen auf dem Durchschnitte ein Lumen, wie sich bei mikroskopischer Untersuchung erweist. Was aber am meisten Interesse erregt, ist, dass man die Aeste, woran die Körperchen sitzen, nach ihren Stämmchen hin verfolgen kann und dass man bei Verfolgung dieser Stämmchen zuletzt offenbar auf die Stämme der Blutgefässe der Milz gelangt.

Als ich so weit in der Untersuchung der Milz beim Schweine gelangt war, wünschte ich vorzüglich zu wissen, ob die Körperchen der Milz an den Venenzweigen oder den Arterienzweigen sitzen. Durch feine Injectionen überzeugt man sich, dass sie an den Arterienzweigen hängen und dass sie namentlich mit den Scheiden der Arterien, welche diesen Gefässen in der Milz eigen sind, verbunden sind. Sie erscheinen als Auswüchse dieser Scheide, obgleich ich damit nicht sagen will, dass sie in Hinsicht des Gewebes damit identisch seien. Die zartesten Zweigelchen der Arterien bleiben übrigens diesen Körperchen in so weit fremd, als sie sich grösstentheils in dem pulpösen Gewebe der Milz verbreiten; bei feinen Injectionen sieht man die arteriösen Gefässchen mehr oberflächlich durch die Wände der Körperchen durchtreten, als auf ihnen sich verbreiten.

Digitized by Google

Die Körperchen haben einen Inhalt. Die darin enthaltene flüssige, weisse, breiige Materie besteht grösstentheils aus fast lauter gleich grossen Körperchen, welche ungefähr so gross wie Blutkörperchen, aber nicht wie Blutkörperchen platt, sondern unregelmässig kugelförmig sind. Diese Körperchen sehen unter dem Mikroskop gerade so aus und sind eben so gross wie die Körnchen, welche die rothe Substanz der Milz ausmachen.

Die rothe pulpöse Substanz besteht aus lauter rothbraunen Körnchen, so gross wie Blutkörperchen, von diesen aber verschieden dadurch, dass sie nicht platt, sondern unregelmässig kugelig sind. Diese Körnchen lassen sich sehr leicht von einander ablösen. In der durch ihre Aggregation gebildeten pulpösen Masse der Milz verbreiten sich die büschelförmig verästelten feinsten Arterien, bis in die venösen, vielfach unter einander anastomosirenden Kanäle, in welche von da das Blut gelangt, ehe es von jedem Theile der Milz in das Venenstämmchen desselben übergeht. Diese ziemlich starken anastomosirenden Anfänge der Venen scheinen äusserst zarte Wandungen zu haben. Betrachtet man ein Stückchen der Pulpa der Milz genauer, so sieht man, dass diese Pulpa wie durchlöchert ist, und dass sie gleichsam ein Netz von rothen Balken bildet, deren Durchmesser stärker ist, als die zwischen ihnen sich findenden Zwischenräume und Kanäle. Diese venösen Kanäle sind es, welche beim Aufblasen der Milz von den Venen aus, jener Substanz ein zelliges Ansehn geben. Injicirt man Wachsmasse durch die Venen, so erhält die Milz das Ansehn der Corpora cavernosa penis. Zellen sind hier nicht vorhanden. Die zarte, rothe, von venösen Kanälen unter den mannigfaltigsten Richtungen durchschnittene und durchlöcherte Substanz der Milz ist so weich und zerstörbar, dass die einzelnen Theile dieser Substanz einer Suspension bedürfen, und diese wird dadurch ausgeführt, dass die weiche Substanz von dem fibrösen Balkengewebe, welches von der äusseren Haut der Milz ausgeht, in den mannichfaltigsten Richtungen durchsetzt wird. Die weissen Körnchen verhalten sich zu der rothen Substanz so, dass sie von ihr umgeben sind, und nicht so, wie Malpighi annahm, in Zellen der Milz liegen. Feine, weisse Würzelchen gehen von den weissen Körnchen in die rothe Substanz über, und enthalten zum Theil deutlich Arterienzweigelchen.

Beim Menschen sind die Malpighi'schen Körperchen sehr schwer zu beobachten. Nach der Maceration einer Milz habe ich sie neuerlich gesehen. Was man dafür aus Durchschnitten der Milz genommen, jene zuweilen sichtbaren, zuweilen unsichtbaren graulichen weichen Puncte, ist davon verschieden und viel grösser als jene Körperchen. Die Malpighi'schen Körperchen sind niemals weich und nicht beim Druck zerfliesslich, vielmehr von solcher Festigkeit, dass sie durch Maceration schwer zerstört werden.

2. *Function der Milz.*

Das Einzige, was man von der Bedeutung der Milz kennt, ist, dass sie keine grosse Bedeutung in der thierischen Oekono-

Digitized by Google

mie hat, indem sie nach übereinstimmenden Erfahrungen vieler Beobachter ohne irgend eine erhebliche Folge exstirpirt werden kann. Nach dieser Exstirpation hat Dupuytren bei Hunden grössere Gefrässigkeit bemerkt, Mayer (*med. chirurg. Zeit.* 1815. 3. *Bd.* 189.) Vergrösserung der Lymphdrüsen, was wenigstens nicht constant ist. Auch die von Einigen behauptete vermehrte Harnabsonderung nach Exstirpation der Milz ist nach Tiedemann und Gmelin keine wesentliche und constante Erscheinung. Eben so wenig beobachteten sie Erscheinungen von schlechter Verdauung, wie Mead und Mayer; sie fanden auch keine Veränderung in der Galle, und es ist also unrichtig, wenn Mehrere diese sehr bitter und dunkelgefärbt gefunden haben wollten. Siehe Tiedemann und Gmelin *über die Wege, etc. p.* 105.

Die Widerlegung der Hypothesen über die Function wird uns nicht lange beschäftigen, da sie zum Theil auf ganz unrichtigen Voraussetzungen beruhen, die anderen sich aber weder beweisen noch widerlegen lassen.

Widerlegen lassen sich alle Hypothesen, welche die Milz als in einem wesentlichen Verhältniss zur Leber stehend betrachten. Doellinger betrachtet die Milz als das Product einer symmetrischen Bildung, die Milz sey gleichsam die unausgebildete rechte Leber. Die Leber ist indess anfangs ganz symmetrisch und steht in gar keiner Beziehung zur Milz, und die Milz ist selbst symmetrisch, indem sie in der Gefässschicht der Gekrösblätter, nämlich im Magengekröse, sich bildet, wie früher bemerkt wurde. Auch auf den Umstand, dass die Milzvene zur Pfortader geht, und auf die Hypothese, dass die Milz das Blut zur Gallenabsonderung vorbereite, ist kein Werth zu legen; denn die Beziehung zur Pfortader hat sie mit dem ganzen chylopoetischen System und bei den niedern Wirbelthieren sogar mit den unteren Extremitäten, bei den Fischen mit den Genitalien und der Schwimmblase gemein. Vergl. oben p. 172. Einige sprechen ohne allen Beweis von Desoxydation des Blutes in der Milz. Andere lassen durch die Milz die Absonderung des Magensaftes gefördert werden, weil sie bei angefülltem Magen weniger Blut aufnehme (?), wieder Andere, wie Lieutaud, Moreschi, sehen die Milz als einen Blutbehälter für den Magen an, indem entweder durch den Druck des angefüllten Magens weniger Blut der Milz aus der Arterie zufliessen soll, was für die Thiere nicht passt, wo die Milz nicht am Magen liegt, oder indem der verdauende Magen mehr Blut anziehe. Aehnlich ist die Hypothese von Dobson (*Lond. med. phys. Journ. Oct.* 1820. Froriep's *Not.* 615.). Nach ihm soll die Milz zur Zeit, wo der Process der Bildung des Chymus zu Ende ist, anschwellen, nämlich 5 Stunden nach der Mahlzeit habe die Milz das Maximum ihres Volumens erreicht; 12 Stunden nach dem Füttern sey die Milz klein und enthalte wenig Blut. Da nun nach einer Mahlzeit eine grössere Quantität Blut im Organismus sich befinde als zu irgend einer andern Zeit, und da die Blutgefässe diese Vermehrung ohne Nachtheil nicht aufnehmen können, so sey die Milz ein Behälter für diesen Ueberschuss.

Digitized by Google

Nachdem aber die Absonderung dieses Maximum der Blutmasse wieder vermindert habe, nehme auch das Volumen der Milz wieder ab. Die Prämissen scheinen mir nicht erwiesen.

Dobson will ferner die Versuche von Magendie bestätigt haben, nach welchen das Volumen der Milz durch Injection von Flüssigkeiten in die Venen vermehrt werden soll. Die Annahmen von Defermon (*Nouv. biblioth. méd. Mars* 1824. Froriep's *Not.* 148.), dass das Volumen bei dem Genusse verschiedener Stoffe sich verändere, sich unter dem Einflusse des Strychnins, Kamphers, essigsauren Morphiums vermindere, scheinen mir eben so wenig erwiesen. Home glaubte einst aus der unerwiesenen Annahme, dass die Milz nach Genuss von Getränken anschwelle, die Flüssigkeiten sollten auf unbekannten Wegen aus dem Magen zur Milz, und von da zur Harnblase gebracht werden, was er später zurückgenommen. *Philos. transact.* 1811.

Die Function der Milz beruht wahrscheinlich entweder in einer unbekannten Veränderung des durch ihr Gewebe durchgehenden Blutes, wodurch sie zur Blutbildung beiträgt, oder sie sondert eine eigenthümliche Lymphe ab, welche zur Chylification beiträgt, indem die Lymphe zur übrigen Lymphe ergossen wird. Nur die Venen oder die Lymphgefässe können die durch die Milz veränderte thierische Materie ausführen; Letzteres ist die Hypothese von Tiedemann. Welche von beiden Ansichten richtig, ist unbekannt, und worin jene Veränderung der thierischen Materie besteht, noch weniger bekannt.

Das Blut der Milzvene ist nach Tiedemann und Gmelin von anderem Venenblute nicht verschieden, wenn diess gleich von älteren Beobachtern und selbst in neuerer Zeit von Autenrieth (*Physiol.* 2. 77.) behauptet worden. Tiedemann und Gmelin sahen es wie anderes Blut gerinnen. *Versuche über die Wege etc. p.* 70. Dagegen fand Schultz (Rust's *Magazin* 1835. 325.) das Blut der Pfortader schwärzer als anderes Venenblut und am dunkelsten im nüchternen Zustande der Thiere. Neutralsalze und atmosphärische Luft färbten es nicht heller roth, sein Coagulum ist weniger fest und es enthält weniger Faserstoff und Eiweiss, dagegen mehr Fett.

Hewson hatte die Ansicht aufgestellt, dass die Milz, wie die lymphatischen Drüsen und die Thymusdrüse, bestimmt sey, aus dem arteriellen Blute einen Saft abzusondern, welcher, der Lymphe beigemischt, die Blutkörperchen ausbilde. Hewson *opus posth. sive rubrarum sanguinis particularum thymi et lienis descriptio.* 1786. Diess kann wohl nicht richtig seyn, da die Blutkörperchen sich eben so gut nach Exstirpation der Milz ausbilden. Hewson, Tiedemann und Fohmann sahen die Milzlymphe röthlich; diess ist indess keine constante Erscheinung. Seiler sah wohl einige mit röthlicher Lymphe gefüllte Lymphgefässe auf der Oberfläche der Milz von Pferden, und ich sah wiederholt einige wenige der vielen grossen Lymphgefässe auf der Oberfläche der Milz des Ochsen eine blassrothe Flüssigkeit führen. Aber Seiler sah jene Färbung bei den meisten Pferden nicht, und bei den Eseln, Rin-

Digitized by Google

dern, Schafen, Schweinen und Hunden niemals. *Anat. physiol. Real-Wörterbuch.* 5. 330. Vergl. JAECKEL, MECKEL's *Archiv.* 6. 581. Mehreres über die älteren Ansichten siehe bei SEILER a. a. O. und HEUSINGER *Ueber den Bau und die Verrichtung der Milz. Thionville,* 1817. MAYER hat beobachtet, dass die Milz sich bei wiederkäuenden Thieren nach der Exstirpation wiedererzeuge, indem sich nämlich an der Stelle der Exstirpation ein Körper von der Grösse einer Lymphdrüse nach einigen Jahren wiederfinde; diess wäre ein sehr interessantes Factum, wenn es sich strict beweisen liesse; diess ist aber kaum möglich, da die Thiere zuweilen kleine Nebenmilzen besitzen, auch ein Rest der Drüse zurückgeblieben sein konnte. Zum Beweiss, dass etwas Milzsubstanz sey, würde die Darlegung der oben beschriebenen Bündelchen von weissen Körperchen, die in der Milz mehrerer Wiederkäuer vorhanden, und leicht präparirt werden können, dienen können.

Die anatomisch-physiologischen Untersuchungen über die Milz von GIESKER. Zürich 1835. 8. enthalten ausser der ausführlichen Zusammenstellung der Angaben der älteren und neueren Schriftsteller eigenthümliche Beobachtungen über den Bau der Milz beim Menschen und insbesondere auch über die Milzkörperchen desselben.

B. Von den Nebennieren.

1. *Bau der Nebennieren* (nach eigenen Untersuchungen).

Die Nebennieren kommen bei dem Menschen, den Säugethieren, Vögeln und spurweise bei den beschuppten Amphibien und den Haifischen und Rochen vor. RETZIUS hat sie bei den Schlangen und Plagiostomen beschrieben. NAGEL (MUELLER's *Arch.* 1836. *p.* 365.) beobachtete Spuren derselben bei den Crocodilen, Schildkröten, Schlangen. Derselbe hält mit RETZIUS beim Frosch nicht die Fettkörper für die Nebennieren, sondern einen Streifen körniger gelber Substanz an der vordern Fläche der Nieren. Die Nebennieren bestehen aus einer gelben Rindensubstanz, die aus senkrechten Fasern besteht, und aus einer dunklen schwammigen Marksubstanz. Wenn sich eine Art Höhle im Innern der Nebenniere vorfindet, so ist dies immer die Nebennierenvene. In der Rindensubstanz haben die kleinsten Arterien und Venen eine ganz eigenthümliche Disposition. Sie haben nämlich die Form gerader, paralleler, gleich dicker, sehr enger Röhrchen, welche alle den nämlichen Durchmesser haben, und in der schönsten Regelmässigkeit dicht neben einander von der Oberfläche senkrecht nach innen gehen, und fast so eng wie die gewöhnlichen Capillargefässnetze sind. Sowohl bei Injection der Arterie, als der Venen, erhält man dieselben senkrechten Gefässe mit sehr länglichen Maschen injicirt. An der äussern Oberfläche der Nebennieren liegt ein gewöhnliches Capillargefässnetz, dessen Röhrchen kaum merklich enger sind, als die der Corticalsubstanz. Alle senkrechten Venenzweigelchen ergiessen sich in das Venengewebe der

Digitized by Google

Marksubstanz. Die Medullarsubstanz der Nebennieren ist sehr schwammig und besteht grösstentheils aus einem Venengewebe, welches in die Zweige der Vena suprarenalis übergeht, die im Innern des Organes ziemlich weit ist. Durch die Vena suprarenalis kann man daher jenes ganze schwammige Gewebe aufblasen. Dieser Bau, den man durch feine Injectionen sehr gut darstellen kann, ist beim Ochsen, Kalb, Schaf, Schwein derselbe wie beim Menschen, indem die Nebennieren sich nur durch die äussere Form und Oberfläche unterscheiden. Siehe Nagel a. a. O. Ob das Blut während des Durchgangs durch das beschriebene Gefässgewebe der Rinde eine eigenthümliche Veränderung erleidet, und als verändertes Blut durch die Vena suprarenalis zum übrigen Venenblut gelangt? Die Vena suprarenalis müsste man beim lebenden Thiere unterbinden, was auf der linken Seite angeht, und die Feuchtigkeit im Innern der Vene und Nebenniere untersuchen. Dass die Nebennieren bei den kopflosen Missgeburten vorzugsweise vor anderen Organen fehlen sollen, ist wohl nicht begründet.

2. *Function* unbekannt.

Beim Embryo des Menschen sind sie nach Meckel's und meinen Untersuchungen anfangs grösser als die Nieren, und bedecken selbst die Nieren, wie z. B. bei einem 1 Zoll langen Embryo. Erst bei 10—12 Wochen alten Embryonen sind die Nieren den Nebennieren an Grösse gleich; dagegen sind nach meinen Beobachtungen die Nebennieren der Säugethierembryonen zu keiner Zeit grösser als die Nieren. Mit den Harnwerkzeugen stehen diese Organe wohl in keiner Beziehung. Bei der Lageveränderung der linken Niere auf die rechte Seite sah ich die Nebenniere an der gewöhnlichen Stelle; eben so bei der Atrophie der linken Niere unverändert.

C. Von der Schilddrüse.

1. *Bau der Schilddrüse.*

In der Schilddrüse scheinen sehr kleine Zellen enthalten zu seyn, deren Zusammenhang gleich wie der eigentliche Bau der Schilddrüse unbekannt ist. Im Kropf schwellen diese Zellen an und enthalten eine durchscheinende Materie, welche leicht fest wird.

2. *Function der Schilddrüse* unbekannt.

D. Von der Thymusdrüse.

1. *Bau der Thymusdrüse* (nach Astley Cooper *the anatomy of the Thymus gland. Lond.* 1832.)

Die Thymusdrüse ist verhältnissmässig beim Fötus am grössten; nach der Geburt wächst sie noch und bleibt gross im ersten Jahr, hernach vermindert sie sich allmählig, bis sie zur Zeit der Pubertät ganz geschwunden ist. Die Thymus des Kalbes besteht aus grösseren und kleineren Lappen. Jeder Lappen wird durch zahlreiche absondernde Zellen und durch grössere Höhlen

Digitized by Google

oder Behälter gebildet. Beim Menschen sind die grössten Lobuli nicht grösser als eine Erbse. Bei genauerer Untersuchung sieht man nach Cooper, dass die Lobuli, wenn sie aus einander entwickelt werden, zu Kränzen vereinigt sind, die wie Halsbänder als grössere und kleinere Perlen erscheinen. Um die innere Structur zu beobachten, muss man eine leichte, oberflächliche Schicht von einem oder von mehreren Lappen zugleich wegnehmen, man sieht dann eine Menge kleiner Höhlen, diese Höhlen enthalten zum Theil eine reichliche weisse Flüssigkeit der Drüse. Aus diesen Höhlen gelangt die Flüssigkeit in einen gemeinsamen Behälter, und der letztere bildet einen gemeinsamen und verbindenden Raum zwischen den verschiedenen Lappen, und ist von einer zarten Haut ausgekleidet. Auf der innern Fläche des Behälters bemerkt man kleine Oeffnungen, welche in taschenförmige Erweiterungen führen, und durch diese Erweiterungen führen die Höhlen der Lappen zum gemeinsamen Behälter. Diese Oeffnungen sind jedoch nicht so zahlreich als die Lappen, weil jede Tasche mit mehr als einem Lappen zusammenhängt. Das Wesentliche des Baues besteht also darin, dass die kleinen Zellen oder Höhlen in der Substanz der Läppchen zuletzt zu einer taschenförmigen Erweiterung an der Basis jedes Hauptlappens führen, und dass diese taschenförmige Erweiterung durch eine kleine Oeffnung wieder mit dem gemeinsamen Behälter in Verbindung steht. Nach Cooper sitzt beim Kalbsfötus an jedem Horn der Thymus ein grosser Lymphgang, der mit einer Injection leicht angefüllt werden kann, und an der Verbindungsstelle der beiden Jugularvenen in die Vena cava super. sich endigt. Indessen ist die Verbindung der Lymphgefässe mit den Höhlungen der Drüse nicht erwiesen. Die Flüssigkeit der Thymus ist weisslich und enthält weisse mikroskopische Partikeln, gerinnt von Alkohol, Mineralsäuren und Hitze. Liquor kali caustici verwandelt sie in einen fadenziehenden Stoff. 100 Theile enthalten 16 festen Stoff. Die Analyse auf die näheren thierischen Bestandtheile ist noch unvollkommen. Die Salze sind salzsaures und phosphorsaures Kali und phosphorsaures Natron; eine Spur von Phosphorsäure. Faserstoff scheint dieser Stoff nicht zu enthalten, und dadurch unterscheidet er sich von der Lymphe und dem Chylus.

2. *Function.*

Nach Cooper's anatomischen Resultaten zu schliessen, wird aus der Thymus ein eigenthümlicher eiweissreicher Stoff durch die Lymphgefässe in die Venen ausgeführt; über die Art, wie diess Organ zur Blutbildung des Fötus und Kindes beiträgt, scheint es ganz unfruchtbar, Hypothesen aufzustellen.

Tyson (*Lond. med. surg. Journal. Jan.* 1833. Froriep's *Not.* 807.) stellt die Hypothese auf, dass die Thymus beim Foetus das Blut von den Lungen ableite, welches nach der Geburt den Lungen zugewendet werde. Jede Hypothese ist unzureichend, welche die Function der Thymus als eines Theils des Fötus, und nicht als eines Theils auch des kindlichen Alters betrachtet.

Digitized by Google

VIII. Capitel. Von der Ausscheidung der zersetzten Stoffe.

Das Leben ist mit einer beständigen Zersetzung der organischen Materie verbunden, deren Ursachen in dem allgemeinen Theil dieses Handbuchs p. 35. und 357. untersucht worden. Zur Aeusserung des Lebens ist die Einwirkung äusserer Reize nothwendig. Diese reizen mit Veränderung der materiellen Zusammensetzung, und es entstehen bei der Erzeugung edlerer Verbindungen nothwendig immer Ausscheidungen von unbrauchbaren Bestandtheilen der zersetzten Verbindungen. Aber auch die Umwandlung der Nahrungsstoffe in Blut macht die beständige Ausscheidung von unbrauchbaren Bestandtheilen nothwendig. Die Apparate, wodurch diese Zersetzungsproducte nicht gebildet, sondern nur ausgeschieden werden, sind die äussere Haut und die Nieren. Die Natur dieser Ausscheidungen soll hier untersucht werden. Die organischen Bedingungen aller Secretionen und Excretionen sind in dem Abschnitte von der Absonderung p. 424. zergliedert worden.

John Dalton (*Edinburgh new philosophical Journal. Nov.* 1832. *Januar* 1833.) stellte an sich selbst eine Reihe von Experimenten über die Quantität der von einer gesunden Person genommenen Nahrungsmittel in Vergleich mit den verschiedenen Excretionen an. Die erste Reihe derselben dauerte 14 Tage, wobei im Durchschnitt täglich 91 Unzen oder beinahe 6 Pfund avoir du pois an festen und flüssigen Stoffen verzehrt wurden. Der Totalbetrag des in 14 Tagen ausgeleerten Harns betrug 680 Unzen, der der Faeces 68 Unzen. Auf den Tag kamen im Durchschnitt $48\frac{1}{2}$ Unzen Harn und 5 Unzen Faeces, zusammen $53\frac{1}{2}$ Unzen. Da nun täglich 91 Unzen verzehrt wurden, so musste bei gleichbleibendem Gewicht des Körpers die Ausdünstung der Haut und Lungen $37\frac{1}{2}$ Unzen betragen. Diese erste Reihe der Versuche war im März angestellt; die zweite fiel in den Juni, die dritte in den September. Im Sommer wurden 4 Unzen an festen Stoffen weniger, dagegen 3 Unzen an flüssigen Stoffen mehr ausgeleert. Durch die Ausdünstung gingen 44 Unzen, oder 6 Unzen, mehr als im Frühling, fort; im Herbst wurde die Hälfte der täglichen Consumtion durch die Ausdünstung ausgeschieden. Dalton berechnet, dass er täglich etwa $11\frac{1}{2}$ Unze Kohlenstoff in den Nahrungsmitteln zu sich nahm. Das Carbon von dem Urin rechnete er $1\frac{1}{4}$ Proc.; diess giebt auf $48\frac{1}{2}$ Unzen Urin täglich 0,5 bis 0,6 Unzen Kohlenstoff. Hundert Theile Faeces haben $\frac{3}{4}$ Wasser, der Rest enthält nicht mehr als 10 Theile Kohlenstoff. Diess beträgt in 5 Unzen Faeces $\frac{1}{2}$ Unze Carbon, also werden $10\frac{1}{2}$ Unzen Kohlenstoff durch die Perspiration fortgeschafft. Nach früheren Untersuchungen (*Manchester memoirs. New series. Vol.* 2. *p.* 27.) brachte Dalton durch das Athmen in 24 Stunden 2,8 Pfund Troy Kohlensäuregas hervor. Diess beträgt gegen 0,78 Pfund Troy Kohlenstoff oder 0,642 Pfund avoir du pois oder $10\frac{1}{4}$ Unzen avoir du pois. Die wässrige Perspiration der Lungen

Digitized by Google

beträgt höchstens 1,55 Pfund Troy = 1,275 Pfund avoir du pois = $20\frac{1}{2}$ Unzen avoir du pois. Fügt man dazu $10\frac{1}{4}$ Unzen Kohlenstoff, so hat man $30\frac{3}{4}$ Unzen für das in einem Tage aus den Lungen ausgeathmete Wasser nebst Kohlenstoff, und zieht man diese von $37\frac{1}{2}$ ab, so bleiben für die unmerkliche Ausdünstung aus der Haut $6\frac{3}{4}$ Unzen täglich, welche aus circa $6\frac{1}{2}$ Unzen Wasser und $\frac{1}{4}$ Unze Kohlenstoff bestehen werden. Daher würde man durch das Athemholen fünfmal mehr Substanz als durch die ganze Körperoberfläche verlieren.

In den 6 Pfund Nahrungsstoffen, die man täglich zu sich nimmt, rechnet Dalton gegen 1 Pfund Kohlenstoff und Stickstoff zusammengenommen; das Uebrige ist grösstentheils Wasser.

Die Ausscheidung fremdartiger, in den Kreislauf aufgenommener Stoffe geschieht nicht durch alle Oberflächen zu gleicher Zeit und gleich stark. Es zeigt sich vielmehr, dass eins oder das andere der Ausscheidungsorgane eine grössere Anziehung gegen gewisse fremdartige Stoffe äussert, und dieselben leichter ausscheidet als andere. So haben Magendie (*bulletin de la société philom.* 1811.) und Tiedemann (*Zeitschr. für Physiol. S.* 2.) gezeigt, dass Alkohol, Kampher, Terpentingeist, Moschus, Schwefelkohlenstoff, Phosphor durch die Lungen aus dem thierischen Körper ausgeschieden werden. Nach Injection einer Auflösung von Phosphor in die Venen eines Thiers, stossen die Lungen Wolken von weissen Dämpfen aus, welche im Dunkeln leuchten. Dagegen werden salinische Stoffe und manche Färbestoffe leichter durch die Harnabsonderung, verändert oder unverändert, ausgestossen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass diejenigen Stoffe, welche durch ein Ausscheidungsorgan in der Regel ausgeschieden werden, auch leicht Reize seiner Thätigkeit seyn können, und es lässt sich aus dieser Bemerkung die harntreibende Wirkung der Neutralsalze aus dem Umstande herleiten, dass diese Salze eben durch die Nieren meist unverändert wieder ausgeschieden werden.

Woehler (Tiedemann's *Zeitschrift. I. Bd.*) hat ausgedehnte Untersuchungen über den Uebergang fremdartiger, in den Organismus aufgenommener Stoffe in den Harn angestellt, welche im Artikel von dem Harn ausführlicher mitgetheilt werden.

I. Hautausdünstung und Schweiss.

Die äussere Haut ist der Sitz einer zweifachen Absonderung, von Fettabsonderung und von Ausdünstung; erstere findet in den Folliculis sebaceis der Haut statt, sie ist noch nicht untersucht. Beim Fötus bildet sie einen salbenartigen Ueberzug der Haut, Vernix caseosa, und besteht nach Frommherz und Gugert aus einem innigen Gemenge von einem dem Gallenfette ähnlichen Fett und Eiweiss, welches letztere indess vom Liquor amnii herrühren kann.

Die Quellen der wässrigen, dunstförmigen Absonderung sind die Haut und die Lungen. Bei stärkerer Bewegung und grösserer äusserer Wärme, und in verschiedenen Krankheiten, auch

Digitized by Google

wenn die Ausdünstung durch Wachstaffet oder Pflaster verhindert wird, sammelt sich das Ausgeschiedene in Tropfen, der Schweiss. Die Quellen des Schweisses sind die über die ganze Haut zerstreuten, kleinen, spiralförmigen Bälge, die Schweisskanälchen, welche Purkinje und Breschet entdeckt haben. Siehe oben p. 432.

Nach Sanctorius mühevollen Untersuchungen, wodurch er durch sinnreiche Versuche auf der Wage die Menge der ausdünstenden Materien zu bestimmen sucht, haben in neuerer Zeit besonders Lavoisier und Seguin genauere Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt. *Mém. de l'acad. des sc.* 1790. *Ann. de chim. T.* 90. Meckel's *Archiv.* 3. 599. Hiernach ist der Verlust bei einer Person durch Haut- und Lungenausdünstung in einer Minute 17—18 Gr. im Durchschnitt; 11 Gr. im Minimum, 32 Gr. im Maximum bei ruhendem Zustande. Um die Wirkung der Haut- und Lungenausdünstung abgesondert kennen zu lernen, bediente sich Seguin eines mit elastischem Harze überzogenen Taffetkleides, das keine Luft durchliess, oben offen war, und für den Mund eine von Kupfer umgebene Mündung hatte. Dieses Kleid wurde, nachdem es von Seguin angezogen worden, oben durch ein starkes Band verschlossen, dann die Kupfermündung um den Mund geklebt und befestigt. So setzte sich Seguin auf die Wage, wurde gewogen, blieb mehrere Stunden ruhig und wurde wieder gewogen. Der Unterschied zwischen beiden Wägungen gab den in dieser Zeit durch die Lungenausdünstung erlittenen Verlust. Hierauf verliess er die Hülle, liess sich sogleich wieder wägen, und nach einer bestimmten Zeit von neuem wägen. Der Unterschied der letzten Wägungen gab den durch Lungenausdünstung und Hautausdünstung zugleich erlittenen Verlust. Die Subtraction der Lungenausdünstung von der gesammten Ausdünstung gab das Quantum der Hautausdünstung. Die Resultate dieser lange Zeit mit grosser Genauigkeit fortgesetzten Versuche ergaben:

1) Wie verschieden auch die Menge der genossenen Nahrung seyn mag, in 24 Stunden kommt ein Mensch im ruhigen Zustande ohngefähr auf dasselbe Gewicht zurück, so dass 2) wenn unter sonst gleichen Umständen die Menge der Speisen variirt, oder bei gleicher Speisenmenge die der Ausdünstung abweicht, so wird die Menge der Excremente so vermehrt oder vermindert, dass doch um dieselbe Zeit dasselbe Gewicht wieder eingetreten ist, also bei gesunder Verdauung die verschiedenen Functionen sich unterstützen und vertreten. 3) Bei schlechter Verdauung wird die Ausdünstung vermindert. 4) Bei guter Verdauung hat die Menge der Speisen keinen grossen Einfluss auf die Ausdünstung. 5) Unmittelbar nach dem Essen wurde am wenigsten ausgedünstet. 6) Aber der durch die Ausdünstung verursachte Gewichtsverlust war während der Verdauung am grössten. 7) Der grösste Gewichtsverlust durch Ausdünstung ist in 24 Stunden 5 Pfund, der geringste 1 Pfund 11 Unzen 4 Drachmen. 8) Die Hautausdünstung hängt theils von der Beschaffenheit der Luft, theils des Körpers ab. 9) Das Mittel des Gewichtsverlustes durch Ausdünstung

Digitized by Google

ist 18 Gr. in der Minute, wovon 11 auf die Hautausdünstung, 7 auf die Lungenausdünstung kommen.

Die Ausdünstungsmaterie enthält verdunstbare Theile, wie Kohlensäure, Wasser und andere Theile, die sich auf der Haut absetzen und mit der Hautsalbe den Schmutz bilden. Nach Thenard enthält die Hautausdünstungsflüssigkeit, welche er in einem vorher mit destillirtem Wasser ausgewaschenen, flanellnen Hemde sammelte, Kochsalz, Essigsäure, etwas phosphorsaures Natron, Spuren von phosphorsaurem Kalk und Eisenoxyd nebst einer thierischen Materie. Schweiss, der in Tropfen von der Stirn gelaufen war, enthielt Milchsäure und im Alkohol löslichen Stoff (Osmazom) und eine kleine Menge im Alkohol unlöslichen Stoff, sehr viel Kochsalz, Chlorammonium. Anselmino sammelte die flüssige Ausdünstungsmaterie seines in einen Glascylinder eingepassten Arms, indem er die Oeffnung um den Arm mit Wachstaffet zuband, während der Arm nirgends das Glas berührte. Der Dunst sammelte sich auf den Wänden des Glases und wurde tropfbar; die Flüssigkeit enthielt essigsaures Ammoniak und Kohlensäure. Kohlensäureaushauchung hatten früher auch Abernethy und Mackenzie beobachtet, während sie in den Versuchen von Priestley, Fourcroy, Gordon nicht stattfand (Meckel's *Archiv.* 3. 608.). Collard de Martigny (Magendie's *Journal.* 10. 162.) hat gefunden, dass die von der Haut ausgehauchte Luft Kohlensäure und Stickgas in sehr variablem Verhältnisse enthält. Diese Aushauchung ist nicht beständig vorhanden, sie ist copiös nach Anstrengungen und dem Essen. Zuweilen war das Gas bloss Stickgas, was mit den Erfahrungen von Ingenhouss, Trousset und Barruel übereinstimmt. Zuweilen war es fast blosses Kohlensäuregas, was an die Beobachtungen von Milly, Cruikshank, Jurine, Abernethy, Mackenzie erinnert. Collard will nach reichlicher Fleischnahrung mehr Stickstoff-, nach vegetabilischer Nahrung mehr Kohlensäureaushauchung bemerkt haben. Collard hat das sich von der Haut entwickelnde Gas unter einem oben verstopften und innerlich mit ausgekochtem Wasser gefüllten Trichter gesammelt, und schliesst hieraus, dass das Kohlensäuregas der Hautausdünstung als solches aus dem Körper ausgeschieden werde, da es auch ohne Berührung mit der atmosphärischen Luft austrete.

Die Trockenheit der Luft vermehrt die Ausdünstung, wiewohl durch diese letztere Abkühlung hervorgebracht wird; allein eine grosse Erhöhung der äussern Wärme giebt ein umgekehrtes Resultat. Edwards *de l'influence des agens physiques sur la vie. Paris* 1824. Frorief's *Not.* 150. 151. Die Transspiration ist reichlicher bei bewegter Luft und bei niederm Luftdruck. Edwards unterscheidet bei der Transspiration dasjenige, was der physicalischen Evaporation zukömmt und auch am todten Körper in denselben Umständen erfolgen würde, und das, was dem Lebensact der Haut zukömmt; letzteres soll nur $\frac{1}{6}$ der Totalsumme ausmachen, wo die Temperatur der Atmosphäre nicht über 20° ist. Das Product der physikalischen Ausdünstung ist fast reines Wasser, das der organischen führt thierische Bestandtheile. Die

Digitized by Google

physikalische Ausdünstung wird unterdrückt, wenn die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist, und die organische Ausdünstung wird aufgehoben, wenn das Individuum erkältet wird. Die Transspiration durch die Lunge soll nur durch physikalische Ausdünstung statt finden, diese Evaporation kann durch eine mit Feuchtigkeit gesättigte Luft, deren Temperatur eben so hoch oder höher ist als die des Körpers, vermindert werden. Erwärmung und Erkältung steht mit der Ausdünstung in so inniger Beziehung, dass auch hierüber das Wichtigste aus Edwards Untersuchungen angeführt werden muss. Bei gleicher Temperatur theilt tropfbares Wasser leichter Wärme mit als Wasserdunst, dieser leichter als Wassergas, dieses mehr als trockene Luft; man verträgt daher bei gleicher Temperatur die letztere länger. Feuchte, warme Luft erhitzt uns mehr, weil sie mehr Wärme mittheilt als trokkene, und weil die physikalische Ausdünstung in letzterer stärker ist. Bei gleicher, ja selbst bei geringerer Temperatur erregt warme, mit Wassergas und besonders mit Wasserdampf gesättigte Luft eine stärkere Transspiration, als trockene Luft. Ist die Temperatur der Luft geringer als die des Körpers, so entzieht die trockene Luft uns weniger Wärme, als feuchte Luft, sie hat bei gleicher Temperatur eine weniger erkältende Wirkung, weil feuchte Luft besser die Wärme leitet als trockene Luft.

Anselmino hat den Schweiss untersucht. Tiedemann's *Zeitschrift.* 2. 321. Nach dieser Analyse enthalten 100 Theile eingetrockneten Schweisses:

in Wasser und Alkohol unlöslich (meist Kalksalze)	2
in Wasser, nicht in Alkohol löslicher Thierstoff (der nach Berzelius's Ansicht ohne hinreichenden Grund von Anselmino für Speichelstoff erklärt wird) und schwefelsaure Salze	21
in wässrigem Alkohol löslich: Kochsalz und Osmazom . . .	48
in wasserfreiem Alkohol löslich: Osmazom, Milchsäure und milchsaure Salze (von Anselmino für Essigsäure und essigsaure Salze genommen)	29
	100

Berzelius vermisst in diesem Resultate den im Schweiss vorhandenen Salmiak und das milchsaure Ammonium. In der Asche des getrockneten Schweisses fand Anselmino kohlensaures, schwefelsaures, phosphorsaures Natron, und etwas Kali nebst Kochsalz, phosphorsauren und kohlensauren Kalk mit Spuren von Eisenoxyd. In dem Schweiss der Pferde, welcher bekanntlich ein weisses Pulver absetzt, fand Anselmino den Harnstoff nicht, den Fourcroy darin gefunden hatte. An mehreren Theilen des Körpers ist der Schweiss eigenthümlich, was indess auch von dem Secret der Folliculi sebacei herrühren kann. So ist der Schweiss der Achselhöhlen ammoniakalisch und der der Genitalien enthält Buttersäure; endlich riecht die Ausdünstung mancher Thiere und Menschen eigenthümlich, bei Thieren haben indess solche Gerüche häufig in besonderen Drüsen z. B. am After, ihren Grund.

Der Zweck der Hautausdünstung wird aus der Analyse nicht klar, denn die im Schweiss vorkommenden Stoffe kommen auch

Digitized by Google

in dem Harn vor. Da indess die Hautausdünstung, wie aus Seguin's Versuchen hervorgeht, in dem innigsten Wechselverhältnisse mit den Ingestis und den anderen Excretionen steht, so lässt sich wohl einigermassen begreifen, wie die plötzliche Unterbrechung derselben so grosse Störungen in der thierischen Oekonomie hervorbringt, weil sie auf den Säftezustand und das Gleichgewicht der Vertheilung der Säfte im ganzen Körper zurückwirkt. Wie die Hautausdünstung uns gegen höhere Wärmegrade schützt, ist früher auseinandergesetzt worden. Siehe p. 76. Dass bei der Hautausdünstung nicht bloss von dem Blute verdunstet, was verdunsten kann, sondern dass Ausdünstung und Schweiss wahre Secretionen sind, beweisen die Krankheiten, in denen diese Absonderungen, trotz einer hohen Temperatur der Haut, zuweilen ganz aufgehoben sind, wie in manchen fieberhaften Krankheiten, in welchen der Einfluss der Nerven auf das Hautorgan beschränkt ist. So steht auch die Hautaussonderung in dem engsten Verhältnisse mit der Harnabsonderung. Es scheint zwar vorzüglich das durch die Hautausdünstung entfernt zu werden, was bei der Temperatur des Körpers Gasgestalt annehmen kann, während durch den Urin die mehr tropfbarflüssigen Excreta entfernt werden. Aber diese Secretionen stehen auch in einer Wechselwirkung. Bei einem profusen Harnflusse, wie im Diabetes, ist die Haut trocken. In den heissen Jahreszeiten und Climaten wird weniger durch den Harn und mehr durch die Haut ausgeführt, im Winter und in kalten Gegenden ist es umgekehrt, und dasselbe Wechselverhältniss zeigt sich in den Krankheiten. Aber nicht bloss durch den Antagonismus der Secretionen (p. 470.), sondern noch durch viele andere, theils in der Haut selbst, theils in ihrer Wechselwirkung mit anderen Organen liegende Ursachen wird die Hautabsonderung verändert. In Beziehung auf den Zustand der Haut selbst ist zu bemerken, dass gelinde Hautreize, auf die Haut selbst, wie warme Bäder, applicirt oder von dem Blute aus wirkend (Diaphoretica), die Hautabsonderung vermehren. Befindet sich aber die Haut im Zustande einer zu grossen Reizung, so wird sie roth und heiss und perspirirt nicht, und im Zustande der Entzündung sondert sie, wie in der Regel entzündete Theile, gar nicht ab; daher bewirken ausgebreitete Hautentzündungen durch Störung des Gleichgewichts der Vertheilung der Säfte leicht antagonistische, krankhafte Thätigkeiten, wie Entzündung der Schleimhäute. So hat man bei ausgedehnten Verbrennungen Entzündung der Darmschleimhaut, der Lungenschleimhaut entstehen gesehen, und bei den exanthematischen Hautentzündungen von Ausscheidung einer krankhaften Materie durch die Haut wächst die Befürchtung innerer Entzündungen nicht allein in dem Maasse, als die Ausscheidung der im Blute vorhandenen krankhaften Materie durch die Haut verhindert wird, sondern auch in dem Maasse der Heftigkeit der Hautentzündung, und in dem Maasse, als dadurch die Function der Haut aufgehoben wird.

Die Thätigkeit der Haut hängt hinwieder sehr von dem Zustande des Nervensystems und des Gefässsystems ab.

Digitized by Google

In fieberhaften Affectionen wird in dem Maasse die Absonderung der Haut und der Schleimhäute vermindert, als der Einfluss des Nervensystems auf die peripherischen Theile gehemmt ist. In anderen, nicht fieberhaften Zuständen dagegen bewirkt eine plötzliche Entziehung des Nerveneinflusses, wie in der Ohnmacht, in deprimirenden Leidenschaften, eine profuse Absonderung eines kalten Schweisses. Die Bedingungen dieser grossen Veränderlichkeit der Hautabsonderung unter verschiedenen Umständen sind noch nicht gehörig physiologisch zergliedert.

II. Harnabsonderung.

Durch die Harnabsonderung werden theils zersetzte und unbrauchbare Thierstoffe, wie Harnstoff und Harnsäure, die wesentlichsten Bestandtheile des Harns und die für die thierische Oeconomie überflüssigen Salze, theils die zufällig in den Kreislauf gelangten fremdartigen Substanzen im veränderten oder unveränderten Zustande ausgeschieden.

Die Ausscheidung des Harns ist in der Thierwelt sehr verbreitet, selbst die Insecten sondern in den sogenannten Gallengefässen (besser Vasa Malpighiana) Harnsäure ab. Vergl. p. 515. Man hat zwar in ganzen Insecten schon Harnsäure gefunden, wie Robiquet in den Canthariden (*ann. de chim.* 76.), und daraus geschlossen, dass die Harnsäure allgemeiner in dem Insectenkörper verbreitet sey. Aber bei der Untersuchung ganzer Insecten musste man nothwendig die Harnsäure jener Gefässe mit erhalten. Auch bei den Mollusken kömmt die Harnabsonderung vor, bei den Schnecken in dem sogenannten Succus calcareus (*l'organe de la viscosité* Cuvier.), dessen Ausführungsgang neben dem Mastdarm hergehend, sich dicht an dem After ausmündet. Jacobson hat in jenem Organe Harnsäure gefunden. Meckel's *Archiv.* 6. 370.

Der Harn. (Nach Berzelius, Woehler und Liebig.)

Der Harn des Menschen ist klar, bernsteingelb und aromatisch riechend; er schmeckt salzig bitter und reagirt stark sauer. Der Harn der Rinder, Pferde, Kaninchen und mehrerer anderer pflanzenfressender Säugethiere ist alkalisch und bei einigen nur ganz frisch sauer. Der Harn der pflanzenfressenden Säugethiere ist trüber und oft fadenziehend, und zersetzt sich nicht so schnell wie der der Fleischfresser. Das specif. Gewicht des Harns des Menschen variirt zwischen 1,005 bis 1,030. In Krankheiten namentlich in der Harnruhr, steigt es zuweilen bis 1,050. Zuweilen trübt sich der Harn beim Erkalten und setzt dann einen grauen oder blassrothen Niederschlag ab, der sich beim Erwärmen wieder auflöst. Nach einigen Tagen riecht der Harn ammoniakalisch und reagirt alkalisch, und bedeckt sich mit einer weissen schleimigen Haut, in der sich, wie auf der innern Seite des Gefässes, kleine weisse Krystalle von phosphorsaurer Ammoniaktalkerde zeigen. Berzelius *Thierchemie. p.* 322.

I. Wesentliche Bestandtheile des Harns.

Ausser dem Schleim der Harnwege, der im Harn selten sichtbar ist, enthält der Harn wesentlich nach Berzelius Analyse:

Wasser	933,00
Harnstoff	30,10
freie Milchsäure milchsaures Ammoniak Osmazom in Alkohol löslich Extractivstoff in Wasser löslich	17,14
Harnsäure	1,00
Blasenschleim	0,32
schwefelsaures Kali	3,71
— — Natron	3,16
phosphorsaures Natron	2,94
zweifach phosphorsaures Ammoniak	1,65
Chlornatrium	4,45
Chlorammonium	1,50
phosphorsaure Kalkerde und Talkerde	1,00
Kieselerde	0,03
	1000,00

1. *Harnstoff. Urea.* Von Cruikshank im Harn entdeckt. Man erhält ihn, indem man den behutsam zur Honigdicke abgedampften Harn mit 4 Weingeist auszieht, und den Weingeist verdunstet, und reinigt ihn durch wiederholtes Auflösen in Wasser oder Weingeist und Krystallisiren. Ueber andere Methoden siehe Gmelin *Chemie.* 4. 1014. Berzelius l. c. p. 349. Die Krystalle des Harnstoffs sind feine seidenglänzende Nadeln, oder lange, schmale, vierseitige Prismen, oder, im unreinen Zustande, Blätter, rein farblos, unrein gelb und braun; er ist ohne Geruch und von kühlendem, salpeterähnlichem Geschmack; er reagirt weder sauer noch alkalisch, in feuchter und warmer Luft zerfliesst er. Bei + 15° Cent. bedarf der Harnstoff weniger als sein gleiches Gewicht Wasser zur Auflösung, von kochendem Wasser wird er in allen Verhältnissen gelöst; er löst sich in 5 kaltem Weingeist; von Gerbestoff wird er nicht gefällt. Bis zu 120° Cent. erhitzt, schmilzt er ohne Zersetzung, noch mehr erhitzt geräth er ins Kochen, und es sublimirt sich kohlensaures Ammoniak, die schmelzende Masse wird nach und nach breiartig, und bei vorsichtig geleiteter Hitze bleibt zuletzt ein grauweisses Pulver übrig, welches Cyansäure ist, die sich auch bei trockener Destillation der Harnsäure sublimirt. Der Harnstoff geht mit Säure und Basen Verbindungen ein, ohne sie zu neutralisiren. Merkwürdig ist, dass Salmiak bei Gegenwart von Harnstoff aus seiner wässrigen Auflösung statt in Octaedern in Würfeln, und Kochsalz statt in Würfeln in Octaedern krystallisirt. Salpetersäure fällt den Harnstoff aus concentrirter, wässriger Lösung, als Verbindung. Der Harnstoff enthält mehr Stickstoff als irgend ein thierisches Product; er besteht nach Prout aus:

Stickstoff	46,65
Kohlenstoff	19,97

Digitized by Google

Wasserstoff . 6,65
Sauerstoff . 26,65 ,

Woehler hat entdeckt, dass man den Harnstoff künstlich zusammensetzen kann, wenn man frisch gefälltes cyanichtsaures Silberoxyd mit einer Auflösung von Chlorammonium übergiesst. Hierbei verwandelt sich das Silbersalz in Chlorsilber, und statt des cyanichtsauren Ammoniaks, welches sich bilden sollte, entsteht Harnstoff. Auch entsteht er, wenn man cyanichtsaures Bleioxyd mit caustischem Ammoniak behandelt; die so erhaltene Auflösung enthält vor dem Abdampfen noch cyanichtsaures Ammoniak und keinen Harnstoff, und erst nach dem Verdunsten der Auflösung verwandelt sich das Salz in Harnstoff. Woehler hat ferner gefunden, dass sich Ammoniakgas und cyanichtsaurer Dampf zu einer weissen, wolligen, fein krystallinischen Materie condensiren, welche cyanichtsaures Ammoniak ist, die sich aber beim Schmelzen, Kochen oder freiwilligen Verdunsten ihrer Auflösung in Harnstoff verwandelt. So bildet sich auch zuerst cyanichtsaures Ammoniak und aus diesem Harnstoff, wenn man cyanichte Säure mit Wasser oder mit flüssigem Ammoniak behandelt. Endlich entsteht Harnstoff, wenn man Cyangas in Wasser leitet und dieses sich damit zersetzt. Woehler in Berzelius *Thierchemie. p.* 356.

Prevost und Dumas haben die wichtige Entdeckung gemacht, dass sich der Harnstoff im Blute vorfindet nach der Exstirpation beider Nieren, so dass diese Materie im gesunden Blute eben darum nicht gefunden wird, weil sie beständig daraus abgeschieden wird. Nach Exstirpation beider Nieren treten die Zufälle am 3. Tage ein, nämlich braune, reichliche und sehr flüssige Stuhlgänge und Erbrechen, Fieber mit erhöhter Temperatur bis 43° Cent., zuweilen Sinken bis 33°. Der Puls wird klein, häufig und steigt bis 200; das Athmen häufig, kurz, zuletzt schwer. Am 5—9. Tag erfolgte der Tod. Man findet Ergiessung eines hellen Serums in den Hirnhöhlen, die Bronchien voll Schleim, die Leber entzündet, die Gallenblase voll, den Darm voll flüssigen, durch Galle gefärbten Kothes, die Harnblase sehr zusammengezogen. Das Blut der operirten Thiere (Hunde, Katzen, Kaninchen) war wässriger und enthielt Harnstoff, der durch Alkohol ausgezogen wurde. 5 Unzen Blut eines Hundes, der nur 2 Tage ohne Nieren lebte, gaben über 20 Gran Harnstoff, 2 Unzen Katzenblut 10 Gran. *Bibl. univers.* 18. 208. Meckel's *Archiv.* 8. 325. Vauquelin und Segalas haben diese Entdeckung bestätigt. Magendie, *Journal der Physiol.* 2. 354. Meckel's *Archiv.* 8. 229. Das Blut wurde getrocknet, der Rückstand ausgewaschen, das Wasser abgedunstet, der Rückstand mit Alkohol versetzt und diese neue Auflösung wieder abgedunstet. Hierbei ist jedoch die Vorsicht nöthig, das Wasser in der Kälte und in dem durch die Schwefelsäure bewirkten leeren Raum verdunsten zu lassen. So erhielten sie aus dem Blute eines Hundes, dem 60 Stunden nach der Operation die Ader geöffnet wurde, $\frac{1}{400}$ Harnstoff. Diese wichtigen Thatsachen, die auch Mitscherlich mit Gmelin und Tiedemann (*dessen Zeitschr. V.* 1.) bestätigt hat, beweisen, dass die Ablagerung urinöser Flüssigkeiten in

Digitized by Google

verschiedenen Organen nach aufgehobener Funotion der Nieren nicht immer eine Folge von in den Harnwegen aufgesogenem Harn ist. Vergl. Nysten *recherches de Chimie et de physiol. pathol. Paris*, 1811. *p.* 263. Meckel's *Archiv.* 2. 678. Wo der Harnstoff gebildet wird, und von welchem Organ aus er im Blute sich verbreitet, ist unbekannt. Man kann jetzt nur die Frage aufwerfen, ob er sich vielleicht in den Lungen bei der durch das Athmen stattfindenden chemischen Veränderung des Blutes, und bei der Bildung edlerer Verbindungen erzeugt. Er kann aber auch in anderen Theilen bei Ausbildung der Säfte aus der genommenen Nahrung entstehen. Es wäre sehr wichtig, zu wissen, ob der Harnstoff nur aus zersetztem, schon vorher ausgebildetem Thierstoffe entsteht, und sich also auch bei hungernden Thieren erzeugt, oder ob er sich aus den Nahrungsstoffen als ein unbrauchbares Product des Verdauungsprocesses erzeugt. Tiedemann und Gmelin haben beobachtet, dass in einem ihrer Versuche mit dem Chylus das dem Osmazom des Chylus beigemischte Kochsalz statt in Würfeln in Octaedern anschoss, während das Kochsalz in anderen Fällen würflig war. Hierbei könnte an den Harnstoff gedacht werden, l. c. p. 2. p. 91. Um diess auszumitteln, müsste man Thiere hungern lassen, dann die Nieren exstirpiren und das Blut auf Harnstoff untersuchen. Bei Vögeln, die Tiedemann und Gmelin mit stickstofffreien Substanzen fütterten, nahm die Quantität des weissen Harns ab. a. a. O. 2. p. 233. Es scheint indess Harnstoff auch ohne alle Nahrung im Blut sich durch Zersetzung von Thierstoff zu bilden; denn Lassaigne hat im Harn eines Verrückten, der 18 Tage hungerte, die Bestandtheile des gesunden Harns gefunden. *Journ. de chim. méd.* 1. 272. Der Harnstoff fehlt im Harn in mehreren Krankheiten, wie in Nervenzufällen, wo der Harn wässrig wird. Es fehlen dann die organischen Stoffe und nur die Salze sind vorhanden. Im Diabetes mellitus enthält der Harn statt Harnstoff Traubenzucker, und jener kommt in dem Maasse wieder, als der Zuckergehalt des Harns sich vermindert. Hier wird der so stickstoffreiche Harnstoff durch eine Materie ersetzt, welche gar keinen Stickstoff enthält. Harnzucker besteht aus 39,99 Kohlenstoff, 6,66 Wasserstoff und 53,33 Sauerstoff. Prout. Beim Diabetes insipidus, wo der Harn keinen Zucker enthält, ist der Harnstoff durch eine andere Materie ersetzt, die, grösstentheils durch Alkohol ausziehbar mit Osmazom übereinkommt. In der allgemeinen Wassersucht des Zellgewebes, die man Anasarca nennt, enthält der Harn in dem Maasse Eiweissstoff und gerinnt über dem Feuer, als Harnstoff darin fehlt. Namentlich wird der Harn eiweisshaltig bei der Bauchwassersucht bei der Bright'schen Degeneration der Nieren. Dagegen hat Marchand Harnstoff schon mehrmal in hydropischen Flüssigkeiten gefunden. Muell. *Arch.* 1837. 440. Eiweissgehalt des Harns mit vermindertem Harnstoffgehalt hat man auch in der chronischen Leberentzündung mit fortdauernder Verdauungsunordnung (Rose und Henry, Meckel's *Archiv.* 2. 642.) so wie gegen das Ende aller abzehrenden Krankheiten bemerkt.

2. *Harnsäure. Acidum uricum.* Man gewinnt die Harnsäure

Digitized by Google

aus dem Bodensatz des menschlichen Harns oder dem Harn der Vögel und Schlangen durch Auflösung des abgedampften Harns in erwärmtem wässrigem Kali, und schlägt aus dem Filtrat die Harnsäure durch Salzsäure nieder. (Gmelin *Chemie.* 4. 839.) Die Harnsäure bildet weisse, wenn unrein, gelbliche oder bräunliche, perlglänzende, feine Schuppen, sie ist geschmack- und geruchlos und röthet feuchtes Lackmuspapier, sie braucht nach Prout mehr als ihr zehntausendfaches Gewicht kalten Wassers zur Auflösung, aber etwas weniger kochendes. In Alkohol und Aether ist die Harnsäure unlöslich. Bei der trocknen Destillation wird sie zersetzt, es sublimirt sich zuerst kohlensaures Ammoniak, darauf viel Cyanwasserstoffsäure und braunes Brandöl, und zuletzt sublimirt sich eine krystallinische Masse, Woehler's Cyansäure. Zugleich enthält aber auch das Sublimat eine Menge Harnstoff, wie Woehler entdeckt hat. (Poggend. *Ann.* 15. 529. Berzel. *Thierchemie.* p. 328.) Die Zusammensetzung der Harnsäure ist nach Prout's 2 Analysen:

Stickstoff . .	früher	40,25	später	31,12
Kohlenstoff .	-	34,25	-	39,87
Wasserstoff . .	-	2,75	-	2,22
Sauerstoff . .	-	22,75	-	26,77

Der warme Harn enthält weit mehr Harnsäure aufgelöst, als sich in einem gleichen Volum kochend heissen Wassers auflösen kann, was Prout bestimmt hat, die Harnsäure als harnsaures Ammoniak im Harn anzunehmen. Gleichwohl ist die aus erkaltendem Harn niederfallende Harnsäure freie Säure. Nach Duvernoy (*Untersuchungen über den mensch. Urin. Stuttg.* 1835. 8.) wird die Harnsäure durch den Färbestoff des Harns im warmen Zustande aufgelöst erhalten. Der Niederschlag der Harnsäure aus dem erkaltenden Harn ist anfangs pulverig und grau, wird aber nach und nach rosenroth und krystallisirt beim Trocknen. Die röthliche oder ziegelmehlfarbige Färbung der Harnsäure rührt von der grössern Menge des mit der Säure verbundenen Färbestoffs her, bei intermittirenden Fiebern nimmt dieser rohe Färbestoff der sich niederschlagenden Harnsäure zu. Es ist nach Berzelius noch sehr zweifelhaft, ob die rothe Farbe im Bodensatz der fieberhaften Harnarten, wie Prout meint, von eingemengtem purpursauren Ammoniak herrührt (Purpursäure, wird durch Behandlung von Harnsäure mit Salpetersäure künstlich erzeugt). Zwischen dem rohen und absetzenden kritischen Harn fand Duvernoy keinen wesentlichen Unterschied. Beide zeigen vermehrte Säurereaction, röthere Färbung und grössern Harnsäuregehalt. Der kritische Harn unterscheidet sich nur, dass er mehr Harnsäure enthält und sie leichter absetzt. Siehe über alles dies Berzelius *Thierchemie.* 335. und Duvernoy a. a. O.

Liebig und Woehler haben entdeckt, dass der Harnstoff in der Harnsäure in einer eigenen Verbindung praeexistirt, dass wenigstens Harnstoff nebst mehreren Producten aus der Harnsäure ausgeschieden werden kann. Poggend. *Ann.* 41. 561. Sie machten den Versuch, die von ihnen in der Harnsäure supponirte Verbindung durch Einwirkung einer oxydirenden Substanz zu zersetzen. Harnsäure mit Wasser zu dünnem Brei angerührt

Digitized by Google

wurde bis fast zum Sieden erhitzt, dann Bleisuperoxyd zugesetzt, worauf sich Kohlensäure entwickelt. Aus der filtrirten farblosen Flüssigkeit setzten sich beim Erkalten farblose oder gelbliche glänzendharte Crystalle ab. Es ist Allantoissäure, diese Substanz, welche man in der Allantoisflüssigkeit der Wiederkäuer findet. Wurde die abgegossene Flüssigkeit eingedampft und erkaltet, so schossen Crystalle von Harnstoff an. Das Bleisuperoxyd selbst ist in eine weisse Masse verändert worden und diese besteht aus oxalsaurem Bleioxyd. Die Producte dieser Zersetzung sind also Allantoissäure, oder richtiger, da diese keine Säure ist, Allantoin, Harnstoff, Oxalsäure und Kohlensäure. Allantoin besteht aus:

Kohlenstoff . . .	30,66	Atome 4
Stickstoff . . .	35,50	- 4
Wasserstoff . .	3,75	- 6
Sauerstoff . . .	30,08	- 3

Eine Verbindung, die sich auch als zusammengesetzt aus 4 Atomen Cyan mit 3 Atomen Wasser ansehen lässt. Um oxalsaures Ammoniak zu werden, fehlen ihr die Elemente von 3 Atomen Wasser. Alkalien und Schwefelsäure verwandeln das Allantoin in oxalsaures Ammoniak. Nimmt man mit Liebig und Woehler an, dass unter den Zersetzungsproducten der Harnsäure der Harnstoff schon vorgebildet sei und zieht man

von 1 Atom Harnsäure = C^{10} N^8 H^8 O^6 ab
1 Atom Harnstoff = C^2 N^4 H^8 O^2

so bleiben C^8 N^4 O^4

Dies sind aber die Elemente von 4 Atom Cyan und 4 Atom Kohlenoxyd. Hiernach stellen sich Liebig und Woehler die Harnsäure als eine Verbindung von Harnstoff mit einem aus Cyan und Kohlenoxyd zusammengesetzten Körper vor, der durch Bleisuperoxyd zerstört und in Oxalsäure und Allantoin umgewandelt wird.

Der Harn der Thiere ist von dem des Menschen häufig durch das Verhältniss von Harnstoff und Harnsäure verschieden. Der Harn der fleischfressenden Säugethiere enthält Harnstoff und Harnsäure. Nach Vauquelin und Boindet (Froriep's *Notizen Nr.* 272.) sollte er keine Harnsäure enthalten, allein Hieronymi hat sie im Harn von Thieren des Katzengeschlechts gefunden. In 100 Theilen Harn waren 13,220 Harnstoff mit Osmazom und freier Milchsäure und 0,022 Harnsäure enthalten. *Jahrb. der Chemie u. Phys.* 1829. 3. 322. Der Harn der pflanzenfressenden Säugethiere enthält Harnstoff, aber keine Harnsäure, an deren Stelle bei den grasfressenden Thieren Harnbenzoesäure in harnbenzoesauren Salzen vorkommt. Der Harn der Vögel enthält sehr viel Harnsäure, die als zweifach harnsaures Ammoniak vorhanden ist; der Harn der fleischfressenden Vögel enthält nach Coindet Harnstoff, allein dieser fehlt in dem Harn der pflanzenfressenden Vögel, welcher saures harnsaures Ammoniak enthält. Im Harn des Strausses beträgt die Harnsäure $\frac{1}{60}$ seines Gewichts. Bekanntlich ist der Vogelharn eine weisse, breiartige Flüssigkeit, welche Farbe von dem harnsauren Ammonium herrührt. Auch der Harn der Schlangen und Eidechsen ist weiss und der der Schlangen sogar bald nach der Ausleerung erdig-hart; er enthält harnsaure Salze, von Kali,

Digitized by Google

Natron und Ammoniak und etwas phosphorsauren Kalk, aber keine Spur von Harnstoff, den Scholz (Froriep's *Natizen* 13. 119.) auch nicht im Harn der Eidechse fand. Dagegen scheint der Harn der nackten Amphibien und Schildkröten ganz verschieden. Nach J. Davy's Untersuchung des Kröten- und Froschharns enthält dieser sehr wässrige Harn Kochsalz, Harnstoff und ein wenig phosphorsauren Kalk aufgelöst. Nach der Untersuchung einer bedeutenden Menge gelbbraunen Harns, der sich in der Blase einer grossen Testudo nigra (von den Gallopagos-Inseln lebend von Meyen mitgebracht) fand, durch Magnus und mich, enthielt dieser Schildkrötenharn keine Spur von Harnsäure, dagegen 0,1 Proc. Harnstoff und einen braunen, in Wasser und Weingeist, Kali und Salzsäure löslichen Färbestoff. Aus dieser Betrachtung ergiebt sich, dass die Bestandtheile Harnstoff und Harnsäure, wovon der erstere 46, die letztere 40 Proc. Stickstoff enthalten, nicht constant nach der Nahrung der Thiere im Harn variiren. Nur zeigt sich bei den pflanzenfressenden Säugethieren statt der Harnsäure die Harnbenzoesäure, welche nur 7 Proc. Stickstoff enthält. Auch will Chevreul bei Hunden gefunden haben, dass bei anhaltender Pflanzenkost der Harn derselben dem der Herbivoren ähnlich werde, indem er keine Spur von Harnsäure und phosphorsaurem Kalk zeigte. Huenefeld *physiol. Chemie.* 1. 150. Unter den Krankheiten des Menschen ist es besonders die Gicht, wobei der Harn, gewöhnlich saurer und mehr Sedimente bildend, mehr Harnsäure enthält, wie denn auch die in den Gelenken der Gichtkranken entstehenden Knoten harnsaures Natron mit etwas harnsaurem Kalk sind. Bei dem die Gichtparoxysmen begleitenden Fieberzustande nimmt die Säure des Harns, wie in andern Fällen, ab. Berzelius *Thierchemie.* 380. Vergl. Nysten l. c. Auch der Schweiss der Gichtischen und Steinkranken enthält vielleicht Harnsäure.

Alle diese Umstände machen es sehr wahrscheinlich, dass die Quelle der Harnsäurebildung viel tiefer als an dem Ort ihrer Ausscheidung liegt, und dass sie in dem innigsten Verhältniss mit der Art des zugeführten Nahrungsmaterials und der Blutbereitung steht, wie sie sich denn auch im Harn, bei Pflanzennahrung, vermindert.

In der zuckrigen Harnruhr enthält der Harn, nach Woehler, zwar Harnsäure (Berzel. *Jahresb.* 6. 283., nach Wittstock scheint auch Harnbenzoesäure darin zu seyn, wie bei den pflanzenfressenden Säugethieren) aber dieser Harn enthält keinen Harnstoff, sondern statt dessen im Diabetes mellitus Harnzucker (stickstofffrei) und im Diabetes insipidus eine osmazomartige Materie.

Prout hat über die elementare Zusammensetzung von Harnstoff, Harnzucker und Harnsäure folgende Verhältnisse mitgetheilt. *Ann. de chim. phys.* 10. 369. Meckel's *Archiv.* 4. 140.

Bestandtheile	Harnstoff	Harnzucker	Harnsäure
Wasserstoff . . .	6,65	6,66	2,75
Kohlenstoff . . .	19,97	39,99	34,25
Sauerstoff	26,65	53,33	22,75
Stickstoff	46,65		40,25

Digitized by Google

Nach dieser Aufstellung enthielte der Zucker bei gleicher Quantität Wasserstoff doppelt so viel Kohlenstoff und Sauerstoff, als der Harnstoff, aber keinen Stickstoff.

3. Im Harn der jungen Kinder (?) und der grasfressenden Thiere findet sich auch *Harnbenzoesäure*, *Urobenzoicum*, als harnbenzoesaures Natron. Diese Säure wird aus dem Harn jener Thiere nach dem Abdampfen durch Vermischen mit Salzsäure gefällt; sie bildet lange, durchsichtige, 4seitige Prismen, hat keinen oder nur schwach bittern Geschmack, röthet feuchtes Lackmuspapier. Nach Liebig ist diese Säure eine eigenthümliche Säure, und nicht bloss eine Verbindung von Benzoesäure und thierischer Materie. Da sie bei der Zersetzung Ammoniak entwickelt, so gehört sie unter die stickstoffhaltigen Materien, Gmelin hat sie als Modification der Benzoesäure noch unter den stickstofffreien aufgeführt. Die Harnbenzoesäure ist in kaltem Wasser schwer löslich, mehr löslich in kochend heissem Wasser; Alkohol löst weit mehr auf, weniger Aether. Sie besteht nach Liebig aus Kohlenstoff 63,032, Wasserstoff 5,000, Stickstoff 7,337, Sauerstoff 24,631.

4. *Milchsäure.* Nach Berzelius ist die Milchsäure ein allgemeines Product der freiwilligen Zerstörung thierischer Stoffe innerhalb des Körpers; sie bildet sich in grosser Menge in den Muskeln, wird vom Blut und dessen Alkali gesättigt, und in den Nieren des Menschen und der Thiere mit saurem Harn abgeschieden. Von ihr rührt hauptsächlich die saure Beschaffenheit des Harns her, obgleich derselbe auch saures phosphorsaures Ammoniak und sauren phosphorsauren Kalk enthält. Berzelius *Thierchemie*. 338.

5. *Salze.* Im menschlichen Harne kommen schwefelsaure und phosphorsaure Salze vor. Berzelius vermuthet, dass die Säuren in diesen Salzen durch die chemische Wirkung in den Nieren entstehen, weil in den übrigen Flüssigkeiten des Körpers nur Spuren von schwefelsauren und sehr wenig phosphorsaure vorkommen, während der Harn sehr viel von beiden enthält; jenes folgt jedoch nicht nothwendig aus diesem. Berzelius vermuthet, dass der im Faserstoff, Eiweiss etc. befindliche Schwefel in den Nieren in Schwefelsäure verwandelt werde, während sich die übrigen Bestandtheile zu Ammoniak, Harnstoff etc. verbinden; dasselbe vermuthet er von dem Phosphor mehrerer festen Theile. Im Harn der grasfressenden Thiere fehlen die phosphorsauren Salze, und statt ihrer sind kohlensaure. Kohlensäuregas ist nicht beständig im Menschenharn aufgelöst, wie Berzelius und Wöhler's Versuche beweisen. Die Kieselsäure des Harns scheint vom Trinkwasser herzurühren. Die in den Salzen des Harns enthaltenen Basen sind Kali, Natron, Ammoniak, Kalkerde, Talkerde. Die Salze sind Chlorkalium, Chlorammonium, phosphorsaurer Kalk (im Harn sauer, in den Knochen basisch), und eine geringe Menge Fluorcalcium. Ueber Alles diess, so wie über die zweifelhaften Bestandtheile des Harns, den in wasserfreiem Alkohol löslichen Extractivstoff des Harns siehe Berzelius *Thierchemie*, woraus hier ein kurzer Auszug gegeben ist. Ueber die Variation der Menge der festen Theile des Urins nach der Nahrung,

Digitized by Google

ohne Rücksicht auf die qualitativen Bestandtheile, hat Chossat eine sehr detaillirte Arbeit (Magendie's *Journal* 5. 65—225.) geliefert, die keines Auszuges fähig ist. Vergl. über den Harn und die Harnbildung die in Meckel's *Archiv* 2. 629—704. gesammelten Aufsätze. Prout, Meckel's *Archiv* 4. 140.

Nysten (l. c. und Meckel's *Archiv.* 2. 648.) hat den Harn nach der Verdauung, Urina chyli, mit dem wasserhellen und geschmacklosen Getränksharn Urina potus, verglichen. Letzterer enthielt 13 Mal weniger Harnstoff als der Verdauungsharn, 4 Mal weniger schwefelsaures, salzsaures, phosphorsaures Natron und Ammonium, 16 Mal weniger Harnsäure. Entzündungsharn (Peritonitis) enthielt 3mal mehr Harnstoff als Verdauungsharn, mehr auflösliche Salze und viel Eiweiss, das im gesunden Harn nicht vorkommt. Im Froststadium eines Fiebers ist die Hautausdünstung vermindert und der Harn wässriger, weniger, wie Berzelius glaubt, weil das Wasser, was mit der Hautausdünstung sonst weggeht, nun mit dem Harn weggeht, denn es wird zur Zeit des Frostes wenig Harn abgesondert. Bei der weitern Entwickelung des Fiebers im Stadium der Hitze wird der Harn dunkler, und nun fängt er an von Quecksilberchlorid gefällt zu werden, welches keinen Niederschlag bewirkt, so lange der Harn seine Säurereaction behält. Je mehr sich der Zustand verschlimmert, um so gesättigter wird der Harn, und er fängt nun an von Alaun und zuletzt auch von Salpetersäure gefällt zu werden, was einen zunehmenden Eiweissgehalt anzeigt. Berzelius *Thierchemie.* 378. Wenn das Fieber vergeht, so stellt sich auf einmal die freie Säure im Harn wieder her, und beim Erkalten setzt er Sediment ab, was man herkömmlicher Weise Crisis durch den Harn nennt. (Doch fand Duvernoy den Fieberharn immer sauer.) Berzelius bemerkt, dass das Sediment keine ausgeleerten Krankheitsstoffe enthält, es ist nur etwas mehr als gewöhnlich von dem rothen Farbestoff, und zuweilen etwas Salpetersäure in unbekannter Verbindung. Bei Fiebern mit regelmässigen Paroxysmen bietet der Harn in jedem Paroxysmus diese 3 Zustände nach einander dar.

II. Zufällige Bestandtheile des Harns.

Woehler hat eine Reihe sorgfältiger Versuche über den Uebergang von Substanzen aus dem Darmkanal in den Harn angestellt. Tiedemann's *Zeitschrift. I. Bd.* Die Resultate dieser Versuche sind folgende.

1. Materien, welche sich nicht im Harn wiederfinden lassen: Eisen, Blei, Weingeist, Schwefeläther, Kampher, Dippelsöl, Moschus und die Farbestoffe von Cochenille, Lackmus, Saftgrün und Alcanna. Auch die Kohlensäure findet sich nach dem Genuss kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten nicht reichlicher im Harn.

2. Materien, die im veränderten, zersetzten Zustande im Harn vorkommen: blausaures Eisenoxydkali in blausaures Eisenoxydulkali verwandelt, die Verbindungen des Kali und Natron mit Weingeist-, Citronen-, Aepfel- und Essigsäure in kohlensaure Alkalien verwandelt; das hydrothionsaure Kali in schwefelsaures Kali grösstentheils verwandelt; Schwefel geht als Schwefelsäure und Hydrothionssäure in den Harn über, Jod als hydriodsaures

Digitized by Google

Salz, Kleesäure, Weinsäure, Gallussäure, Bernsteinsäure, Benzoesäure mit Alkali verbunden; daher Sauren gegen Harnsteine gegeben auch fruchtlos seyn müssen.

3. Unverändert gehen in den Harn über: kohlensaures, chlorsaures, salpetersaures und schwefelblausaures Kali, hydrothionsaures Kali (grösstentheils zersetzt), blausaures Eisenoxydulkali, Borax, salzsaurer Baryt, Kieselerdekali, weinsaures Nickeloxydkali, viele Färbestoffe, wie die von löslichem (schwefelsaurem) Indigo, Gummigutt, Rhabarber, Krapp, Campechenholz, rothen Rüben, Heidelbeeren, Maulbeeren, Kirschen, viele Riechstoffe, zum Theil verändert, Terpenthinöl (nach Veilchen riechend), das Riechende von Wachholder, Baldrian, Asa foetida, Knoblauch, Bibergeil, Saffran, Opium, das betäubende Princip des Kamtschadalischen Fliegenschwamms, und im krankhaften Zustande auch fettes Oel. In den Harn kommen übrigens nur aufgelöste und keine körnige Stoffe über. Ueber die unerwiesene Annahme von metastatischem Eiter im Blut und im Harn, siehe oben p. 273.

Die Stoffe, welche nicht in den Harn übergehen, werden entweder durch andere Wege, wie die Ausdünstung, ausgeschieden, als der Kampher, oder werden schon im Darmkanal in einen unauflöslichen Zustand versetzt.

Woehler macht auch darauf aufmerksam, dass die Salze, welche durch den Urin ausgeleert werden, meist auch die Urinabsonderung befördern. In Hinsicht anderer, sogenannter harntreibender Mittel macht er die gewiss von den Aerzten zu beherzigende Bemerkung, dass manche derselben, wie die Digitalis, mit Unrecht in diesem Rufe stehen; denn diese wirkt nach Woehler, indem sie die Ursache der Wassersucht hebt, worauf das Wasser von selbst auf seinem gewöhnlichen Wege abgeschieden wird; so dass in diesem Sinne auch die China, bei Wassersuchten, die auf Wechselfieber folgen, angewandt, ein sogenanntes Diureticum wäre.

Nach den Untersuchungen von Woehler ergiebt sich, dass die Nieren nicht bloss die Bestimmung haben, Harnstoff und Harnsäure abzuscheiden, sondern dass auch alle auflöslichen, nicht flüchtigen und nicht innerhalb des thierischen Körpers zersetzten Stoffe, besonders aber auch das überflüssige Wasser, durch sie ausgeschieden werden. Ist die Wasserausscheidung in den Nieren durch Wasserabsetzung in anderen Theilen, wie in der Wassersucht, verhindert, so wird der Harn eine gesättigtere Farbe von seinem gewöhnlichen Farbestoff annehmen, ohne dass diess etwas mehr, als Ausscheidung von weniger Wasser anzeigt.

Die kohlensauren Alkalien machen den Harn alkalisch, lösen die Harnsäure; ihre Darreichung ist ein ziemlich sicheres Mittel zur Bekämpfung der harnsauren Diathese; da nun die Pflanzensäuren und pflanzensauren Alkalien bei dem Durchgang durch thierische Körper in den Harn in kohlensaure Alkalien verwandelt werden, so sind auch sie mit Erfolg bei der harnsauren Diathese des Harns anwendbar. Doch ist diese Diät nur beim Harngries und kleinen Steinchen wohl anwendbar; denn wenn grosse Steine in der Blase sind, so werden durch einen alkalischen

Digitized by Google

Harn die erdigen, phosphorsauren Salze im Harn unauflöslich gemacht, und es können sich neue Niederschläge aus diesen Salzen um den Harnstein bilden. Woehler a. a. O. p. 317.

Die Abscheidung des überflüssigen Wassers im Blute scheint ausserordentlich schnell zu geschehen und fast in dem Maass, als das Blut wässrige Flüssigkeiten an einer andern Stelle aufnimmt. Das in den Magen gekommene Getränk wird grösstentheils im Magen schon aufgesogen und gelangt nicht einmal in Masse in den Dünndarm. Eben so schnell wird das gleichmässige Verhältniss der Zusammensetzung des Blutes durch die Ausscheidung des Wassers durch den Harn wieder hergestellt.

Ueber die Zeit des Uebergangs aufgelöster Stoffe aus dem Darmkanal ins Blut und in den Harn siehe oben p. 246. Nach Westrumb geht blausaures Kali schon innerhalb 2—10 Minuten in den Harn über. Stehberger hat bei einem Knaben mit Inversio vesicae urinariae Versuche über die Zeit dieses Ueberganges mit verschiedenen Substanzen angestellt. Tiedemann's *Zeitschrift*, 2. 47.

Färberröthe zeigte sich	nach	15 Min.
Indigo	—	15 —
Rhabarber	—	20 —
Gallussäure.	—	20 —
Campeschenholzabkochung	—	25 —
färbendes Princip der Heidelbeeren	—	30 —
— — der schwarzen Kirschen . . .	—	45 —
adstringirendes Princip der Herba uvae ursi . .	—	45 —
Pulpa Cassiae fistulae	—	55 —
blausaures Eisenoxydulkali	—	60 —
Roob Sambuci	—	75 —

Bei allen aus dem Darmkanal in den Darm übergegangenen Substanzen war ein Wendepunkt in ihrer Ausscheidung mit dem Urin zu bemerken. Dieser trat ein:

mit Färberröthe	nach	1 Stunde.
— schwarzen Kirschen . . .	—	$1\frac{1}{4}$ —
— Indigotinctur	—	$1\frac{1}{4}$ —
— Campeschenholzabkochung .	—	$1\frac{1}{4}$ —
— Rhabarbertinctur	—	$1\frac{1}{2}$ —
— Herba uvae ursi	—	$1\frac{3}{4}$ —
— Heidelbeeren	—	2 —
— Gallussäure	—	$2\frac{1}{2}$ —
— Pulpa Cassiae fistulae . .	—	4 —

Das gänzliche Verschwinden der Substanzen im Harn trat ein:

bei blausaurem Eisenoxydulkali nach	$3\frac{3}{4}$	Stunden.
— Indigo	— $4\frac{1}{2}$	—
— Rhabarber	— $6\frac{1}{3}$	—
— Campeschenholzabkochung	— $6\frac{3}{4}$	—
— Herba uvae ursi	— $7\frac{1}{3}$	—
— Heidelbeeren	— $8\frac{3}{4}$	—
— Färberröthe	— 9	—
— Gallussäure	— 11	—
— Pulpa Cassiae fistulae . .	— 24	—

Der Harn sammelt sich in der Urinblase, deren Sphincter,

Digitized by Google

wie der Sphincter ani in der Regel geschlossen ist. Wenn die Quantität des Harnes grösser geworden ist, wird die Wirkung des Sphincters geschwächt; es entstehen Zusammenziehungen des Grundes der Blase. Wir können indess durch die Wirkung des Musculus pubo-urethralis, und vielleicht auch durch willkührlich verstärkte Zusammenziehung des Sphincters den Harn zurückhalten. Bei der willkührlichen Entleerung des Harnes wird dieser unter Mitwirkung des Zwerchfelles und der Bauchmuskeln, welche die Bauchhöhle verengen, ausgetrieben. Die Contraction der Urinblase ist zwar nicht beständig dem Willen unterworfen; aber bei der allmählig verstärkten Reizung der Blase, vermöge des angesammelten Harnes, scheinen wir einigen willkührlichen Einfluss auf ihre Zusammenziehung zu erhalten. — Erection und Harnlassen schliessen sich aus. Bei der Lähmung des untern Theiles des Rückenmarkes entsteht Incontinentia urinae.

Digitized by Google

Der

speciellen Physiologie

Drittes Buch.

Physik der Nerven

Digitized by Google

I. Abschnitt. Von den Eigenschaften der Nerven im Allgemeinen.
I. Vom Bau der Nerven.
II. Von der Reizbarkeit der Nerven.
III. Von dem wirksamen Princip der Nerven.

II. Abschnitt. Von den Empfindungsnerven, Bewegungsnerven und organischen Nerven.
I. Von den sensitiven und motorischen Wurzeln der Rückenmarksnerven.
II. Von den sensitiven und motorischen Eigenschaften der Gehirnnerven.
III. Von den Eigenschaften des Nervus sympathicus.

III. Abschnitt. Von der Mechanik des Nervenprincips.
I. Mechanik der motorischen Nerven.
II. Mechanik der sensibeln Nerven.
III. Von der Reflexion in den Bewegungen nach Empfindungen.
IV. Von den Gesetzen der Wirkung und Leitung in dem Nervus sympathicus.
V. Von den Sympathien.

IV. Abschnitt. Von den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Nerven.
I. Von den Sinnesnerven.
II. Vom Nervus trigeminus.
III. Vom Nervus oculomotorius, trochlearis und abducens.
IV. Vom Nervus facialis.
V. Vom Nervus glossopharyngeus.
VI. Vom Nervus vagus.
VII. Vom Nervus accessorius.
VIII. Vom Nervus hypoglossus.

V. Abschnitt. Von den Centraltheilen des Nervensystems.
I. Von den Centraltheilen des Nervensystems im Allgemeinen.
II. Vom Rückenmark.
III. Vom Gehirn.

Digitized by Google

Der speciellen Physiologie

Drittes Buch.

Physik der Nerven.

I. Abschnitt. Von den Eigenschaften der Nerven im Allgemeinen.

I. Capitel. Vom Bau der Nerven.

A. Von den Hauptformen des Nervensystems.

(Nach J. Mueller *Nov. act. nat. cur. T. XIV.* und Meckel's *Archiv.* 1828.)

In der Thierwelt zeigen sich hauptsächlich zwei Formen des Nervensystems, die der Wirbelthiere und die der Wirbellosen. Bei den ersteren ist das Gehirn undurchbohrt und läuft in das Rückenmark aus; bei den letzteren stellt das Gehirn immer einen Nervenring dar, durch welchen der Schlund durchgeht, und welcher über dem Schlunde zum Gehirne anschwillt, aber auch unter dem Schlunde eine Anschwellung zeigt, von welcher der übrige Theil des Nervensystems ausgeht, der entweder in einzelnen Nerven besteht, oder, wie bei den Ringelwürmern, Insecten, Crustaceen und Spinnen, einen am Bauche, unter dem Darm verlaufenden, von Stelle zu Stelle in Knoten anschwellenden Strang darstellt. Die Frage, in welcher Art das Nervensystem der Wirbellosen dem der Wirbelthiere zu vergleichen sey, hat schon lange die Anatomen und Physiologen beschäftigt. So haben Ackermann, Reil, Bichat in dem Gangliensystem der Wirbellosen eine Analogie mit dem Nervus sympathicus der Wirbelthiere erkennen wollen, und nach vielfachen hierüber geführten Verhandlungen haben abermals in der neuesten Zeit Serres und Desmoulins diese Analogie zwischen dem Nervus sympathicus der Wirbelthiere und dem Gangliensystem der Wirbellosen aufgestellt. Andrerseits haben Scarpa, Blumenbach, Cuvier,

Digitized by Google

Gall, J. F. Meckel, jene Analogie mit besseren Gründen verworfen, und die meisten dieser Anatomen haben das Bauchmark der Gliederthiere ohne Weiteres dem Rückenmark der Wirbelthiere gleichgestellt. Meckel und Ph. von Walther äusserten sich sofort bestimmter dahin, dass die Fortsetzung des Hirns in den Rumpf bei den Wirbellosen als Vereinigung des später getrennten Nervensystems, des Rückenmarkes und des Nervus sympathicus der Eingeweide zu betrachten sey, so dass das Nervensystem der Wirbellosen, seiner Bedeutung nach beide Functionen enthaltend, bei den Mollusken sich mehr zu dem Typus des sympathischen Nerven, bei den Gliederthieren mehr zu dem Typus des Rückenmarkes hinneige.

Treviranus und E. H. Weber endlich glaubten die Knoten der Ganglienkette der Gliederthiere nur als Knoten der Rückenmarksnerven anerkennen zu müssen, so dass diese verbunden und verwachsen seyen, die verbindenden Stränge aber lediglich als die ersten Rudimente des Rückenmarks der Wirbelthiere erscheinen.

Diese Streitfrage wird nun entschieden dadurch, dass bei den meisten Gliederthieren, namentlich bei allen Insecten, ausser dem Bauchmarke oder der Ganglienkette der Bauchseite, ein zweites Nervensystem, welches lediglich den Eingeweiden bestimmt ist, vorkommt, und dass dieses Nervensystem, ebenfalls aus einer Reihe von feinen und kleineren Ganglien bestehend, auf dem Darmkanal und besonders auf dem Magen seine grösste Entwikkelung durch feine Geflechte erreicht, mit dem Gehirn aber durch Wurzeln zusammenhängt.

Schon Meckel und Treviranus hatten gelegentlich auf eine Analogie zwischen dem von Lyonet und Swammerdam beschriebenen, auf der Speiseröhre verlaufenden, unpaarigen Nervus recurrens und dem Nervus sympathicus hingewiesen. Doch ist dieser von Lyonet beschriebene Nerve nur die einfachste und unausgebildetste Form eines eigenthümlichen Nervensystems, dessen entwickelte Formen ich fast bei allen Ordnungen der Insecten untersucht habe. In seinen ausgebildeten Formen entspringt dieses Nervensystem mit feinen Wurzeln vom Gehirn, und verläuft, auf den Rücken der Speiseröhre sich begebend, zwischen dieser und dem Herzen zum Magen, wo es ein besonderes Geflecht bildet, das von einem ziemlich starken Ganglion entspringt. Bei diesen entwickelten Formen ist der Magen- oder Centraltheil dieses Nervensystems immer stärker als sein oberer Theil, der von kleineren Anschwellungen aus mit dem Gehirne zusammenhängt. Uebrigens zeigt der über dem Darmkanal verlaufende Stamm manche Verschiedenheiten, er verläuft bald einfach und unpaarig zum Magen, wo er sein Knötchen und Geflecht bildet, wie bei Dysticus u. A.; bald sind zwei Stämmchen vorhanden, wie z. B. bei Gryllotalpa. Diese beiden Nerven schwellen hier an dem Muskelmagen zu Knötchen an. Bei dem von mir, in den *Nov. act. T. XIV.*, beschriebenen Exemplar vereinigten sich die beiden Stränge in ein Knötchen, später sah ich beide Nerven mehrmals ganz getrennt und jeden sein Knötchen bilden. Die erstere Varietät sah ich nicht wieder. Durch Brandt's Unter-

Digitized by Google

suchungen ist die Kenntniss der Eingeweidenerven der Insecten, Crustaceen, Mollusken und Ringelwürmer sehr erweitert worden. Derselbe hat gezeigt, dass es zwei Systeme von Eingeweidenerven bei den Insecten giebt, wovon das eine paarig, das andere unpaarig ist. Beide stehen mit dem Hirn in Verbindung. Das paarige bildet Knötchen auf der Speiseröhre, zuweilen auch jederseits auf dem Magen, das unpaarige ist oft wenig entwickelt, wenn es das paarige ist, und umgekehrt. Ist das unpaarige stark entwickelt, so bildet es einen unpaaren Knoten auf dem Magen. *Mem. de l'acad. de Petersb.* 3. *Ann. d. sc. nat.* 5. 81.

Spuren des Nervensystems finden sich nach Ehrenberg's Entdeckungen schon bei den Infusorien, wenigstens den Räderthieren. Vergl. oben p. 43. Unter den bekannteren Formen des Nervensystems der niederen Thiere kann man folgende Typen unterscheiden.

I. Typus der Radiarien.

Strahlig peripherische Gliederung, gleiche Theile in der Peripherie eines Centrums.

Die Urform des Nervensystems ist der Ring, dasjenige, was wir bei den wirbellosen Thieren den Schlundring nennen. In seiner einfachsten Form erscheint er bei den Radiarien; er ist noch ohne Ganglien, ohne Fortsetzung zu einem Markstrange. Gemäss der strahligen Eintheilung und Zusammensetzung des Thiers ist auch die Verbreitung seiner Nervenäste angeordnet. So wenig das Thier in einen gegliederten Leib sich fortsetzt, so wenig kann hier eine Fortsetzung des Schlundrings in einen Markstrang auftreten. Wiederholung derselben thierischen Theile in der Peripherie des Kreises ist hier die Urform des Thieres; unter diesen Bedingungen sind alle Nerven des Schlundrings gleich, keiner ist vorzugsweise Markstrang, kein Theil des Schlundrings vorzugsweise Hirn. Alle die strahligen Aeste eines Nervenkreises, wovon keiner die Priorität hat, sind zusammen dasjenige, was bei den höheren Thieren die Fortsetzung des Schlundrings in den Markstrang ist.

II. Typus der Eingeweidethiere, Mollusken.

Untergang der Gliederung in einen muskulösen Eingeweidesack.

In der Abtheilung der Weichthiere oder Eingeweidethiere erleidet diese Urbildung Veränderungen, welche nur den Veränderungen der gesammten Organisation entsprechen. Die Symmetrie des strahligen Typus hat aufgehört, und der Mangel der den übrigen Wirbellosen eigenthümlichen Gliederung ist einer ihrer wesentlichsten Charactere. Das Weichthier ist nur ein Convolut von Eingeweiden, so viel ihrer nöthig sind zum Bestehen einer thierischen Individualität, deren sensible Functionen meist auf ein unbeholfenes Tasten und Fühlen, und eine träge Ortsbewegung hinauslaufen.

Der Schlundring erscheint auch hier als Urform, seine gleichen, strahligen Nerven für gleiche, peripherische Theile hat er mit diesen abgelegt. Es giebt Sinnesnerven, Eingeweidenerven

Digitized by Google

und Muskelnerven und da die Eingeweide ohne symmetrische Lage und Folge zusammengehalten sind, auch eine successive Reihe ortsbewegender Glieder fehlt, so bedarf es keines gegliederten Nervensystems.

Alle Ausbildung des Nervensystems erscheint hier in der Entwickelung des Schlundringes und seiner Nerven zu Ganglien, welche die Centra für die Ausstrahlung des Nervenmarkes werden. Die Stufen der Ausbildung sind in dieser Sphäre folgende:

1. Obere und untere Anschwellung des Schlundringes (Gasteropoden); seitliche Ganglien am Schlundring mit zerstreuten Anschwellungen der von diesen ausgehenden Nerven (Acephalen).

2. Der Schlundring als massive Hirnmasse, Cephalopoden.

III. Typus der Gliederthiere.

Succession ähnlicher oder gleicher Glieder, mit ähnlichem oder gleichem Inhalte. Längengliederung.

In der Abtheilung der Gliederthiere ist die Wiederholung gleicher oder ähnlicher Theile in der Längenrichtung der Grundcharacter. Das Thier besteht aus einer successiven Gliederung ähnlicher oder gleicher Ringe, welche ebenfalls ähnliche oder gleiche Theile des Gefässsystems, der Eingeweide enthalten. Die Eingeweide sind nicht mehr als ein Convolut durch einen muskulösen Sack verbunden, sie erstrecken sich vorzugsweise in einer Dimension, der Länge, der muskulöse Sack ist in eine grosse Menge einzelner Muskeln für die articulirten Theile zerfallen. Unter diesen Bedingungen müssen sich der Schlundring und seine Knoten wiederholen, als Bauchstrang und Markknoten des gegliederten Leibes. Es gehören hieher die Anneliden, Insecten, Spinnen, Crustaceen.

Bei allen Insecten, Spinnen, Crustaceen und Anneliden scheint übrigens das Gehirn ohne Ausnahme über dem Schlunde zu liegen *) Bei den Insecten tritt ausserdem deutlicher schon das besondere Nervensystem der Eingeweide auf dem Rücken des Darmkanals auf, das auf dem Magen seine grösste Entwickelung erreicht, und mit dem Gehirne und Bauchmarke durch Wurzeln zusammenhängt.

In der Metamorphose der Larve zur Chrysalide und zum vollkommenen Insect schliessen sich mehrere Knoten zusammen, einzelne Knoten verschwinden, andere verschmelzen, nach den Bedürfnissen höher entwickelter Theile. S. oben p. 377.

Bei einzelnen Insecten sind alle Knoten und Schlingen des Bauchmarkes zu einem soliden Markstrange vereinigt, von dem alle Nerven des gegliederten Leibes strahlig ausgehen, und der durch den noch offenen Schlundring mit dem Hirngan-

*) Beim Scorpion tritt der Schlund auch durch den Schlundring; aber der hintere oder untere Theil des Gehirns ist grösser als der vordere, was mich früher zu der unrichtigen Ansicht leitete, dass das Gehirn unter dem Schlunde liege. Auch bei den Phasmen ist diess, wo ich es im Jahre 1826 zu sehen glaubte, nicht, sondern nach neuerer Untersuchung wie bei allen Insecten.

Digitized by Google

glion verbunden ist. So bei dem Nashornkäfer, selbst im Larvenzustande.

Hier sieht man die Strangbildung mit den Knoten in einen einfachen Strang übergehen und es scheint das Gehirn mit dem Rückenmarke in der That morphologisch nicht so sehr von dem Nervensystem der Wirbellosen verschieden. Es bleibt nur jene den Wirbellosen eigenthümliche Bildung, dass der Schlundring der Speiseröhre zum Durchgange dient. Andrerseits sehen wir, dass bei niederen Wirbelthieren an den Ursprungsstellen beträchtlicher Nervenmassen aus dem Rückenmarke die Knotenbildung an diesem wieder erscheint, wovon die mehrfachen Ganglien am Halsmarke der Triglen ein Beispiel geben, wie denn auch die Anschwellungen am Ursprunge der Arm- und Schenkelnerven bei den Schildkröten, bei den Vögeln und Säugethieren hieher gehören.

Auch auf die Gleichstellung des Nervensystems der Mollusken mit dem sympathischen Nerven der Wirbelthiere konnen wir keinen Werth legen. Der Mangel der Ganglienkette bei diesen Thieren ist eine Folge der Abwesenheit des gegliederten Rumpfes. Die Vereinigung dieser Ganglien in eine Kette ist etwas Zufälliges, d. h. nicht im Nervensystem selbst wesentlich Gelegenes, nur von der Gliederung Abhängiges. So kann in der Classe der Gliederthiere, bei dem Untergange oder dem Zurücktreten der gegliederten Bildung, die Ganglienkette durch zerstreute Ganglien der Hirnnerven, in der Art wie bei den Mollusken, ersetzt werden, wie diess bei den Phalangien der Fall ist. Die Ganglien der Mollusken sind daher zum Theil Ganglien der Eingeweidenerven, den Bildungsprocessen bestimmt, andern Theils sind die Hirnnerven und ihre Ganglien, welche in den Bewegungsorganen, wie im Mantel (Sepien), sich verbreiten und der willkührlichen Bestimmung fahig sind, durchaus dasselbe, was bei den Gliederthieren die Muskelnerven der Ganglienkette, und ganz von aller Gleichstellung mit Eingeweidenerven auszuschliessen.

b. Von dem feinern Bau der Nerven.

Primitivfasern der Nerven. Die Nerven bestehen aus kleineren und grösseren, parallel neben einander liegenden Bündeln, welche ein häutiges Neurilem besitzen, in der Länge eines Stranges zuweilen von Stelle zu Stelle zusammenhängen, während die im Innern dieser Bündel liegenden Primitivfasern der Nerven nur parallel aneinanderliegen und sich nicht mit einander verbinden, sondern selbst da, wo die Bündel zu anastomosiren scheinen, nur aus einem Bündel in das andere übergehen, um sich anderen Fasern anzulegen. Die Primitivfasern der Nerven sind sich bei verschiedenen Thieren sehr ähnlich an Form und Stärke; bei keinem Thiere bestehen sie aus aggregirten Kügelchen, sondern immer stellen sie einfache Fäden dar. Nach Krause betragen die Primitivfasern der Nerven des Menschen $\frac{1}{400}$—$\frac{1}{200}$ Par. Lin., nach R. Wagner $\frac{1}{300}$, die des Frosches nach Demselben $\frac{1}{200}$. Indess der Durchmesser dieser Fasern ist ausserordentlich ver-

Digitized by Google

schieden und oft sind sie sehr viel feiner, besonders die grauen organischen Fasern. Die Capillargefässe verbreiten sich nicht mehr auf den Primitivfasern der Nerven, denn sie sind selbst stärker als diese, und sie gehen mit ihren Netzen nur zwischen diesen Elementarfäden hin.

Fontana scheint der erste gewesen zu seyn, welcher eine ganz richtige Vorstellung von dem feinern Bau dieser Primitivfasern hatte. Fontana *über das Viperngift. Berlin* 1787. 369. Er unterschied an den Primitivfasern eine äussere Röhre und einen festen Inhalt der Röhre, die Röhre ist bei starken Vergrösserungen runzelig, der darin liegende Faden ist glatt, homogen. Es gelang ihm an einzelnen Cylindern die Rohre von dem festen Inhalte abzusondern. p. 369. heisst es: „Die Nerven oder ihre Enden waren im Wasser und ich schob die Spitze der Nadel längs dem Nerven hinunter, um die Cylinder zu zerreissen, oder sie einigermassen von den Ungleichheiten zu befreien, von denen die Rede ist; und in der That gelang es mir endlich einen zu zu sehen, welcher die Gestalt hat, die man in der Fig. 6. sieht. Ungefähr die Hälfte dieses Cylinders bestand aus einem durchsichtigen und gleichförmigen Faden und die andere Hälfte war fast doppelt so dick, nicht so durchsichtig, ungleich, höckerig. Ich vermuthete jetzt, dass der ursprüngliche Nervencylinder aus einem durchsichtigen Cylinder bestände, der kleiner, gleichförmiger und mit einer andern Substanz vielleicht von zellenhäutiger Natur bedeckt wäre. Die Beobachtungen, die ich seit der Zeit machte, bestätigten mich immer mehr in dieser Hypothese, welche endlich eine ausgemachte Wahrheit wurde. Ich habe in vielen Fällen diese beiden Theile gesehen, welche den ursprünglichen Nervencylinder ausmachen. Der eine ist ganz auswärts ungleich und höckerig; der andere ist ein Cylinder, der aus einer besondern, durchsichtigen, homogenen Haut gebildet zu seyn scheint, welche mit einer gallertartigen Feuchtigkeit, die eine gewisse Consistenz hat, angefüllt ist." Fontana stellt dann die ursprünglichen Cylinder in Abbildungen dar, wo sie stellenweise von der Röhre noch bedeckt, stellenweise von der Röhre unbedeckt sind. Mit diesen Beobachtungen von Fontana stimmen die neueren von Remak ganz überein, welcher selbst zuerst auf diese Stelle von Fontana aufmerksam macht. Er sah den Inhalt der Nervenröhren als einen wenig schmälern ganz soliden Faden oder als ein plattes blasses Band, das sich von der leicht runzelnden Röhre in grossen Strecken durch Druck isoliren lässt. Es ist ihm nicht gelungen, eine feine faserige Structur an diesem Band zu erkennen; gleichwohl zersplittert es zuweilen. Muell. *Archiv.* 1837. *p. IV.* Bei der grossen Stärke der sogenannten Primitivfasern der Nerven gegen die viel feinern Elementartheile der Muskeln, des Zellgewebes u. a. Gewebe ist es noch zweifelhaft, ob man den in der primitiven Nervenröhre enthaltenen Faden für das feinste Element der Nerven halten kann. Schwann sah in Fasern von der Dicke der Primitivfasern im Mesenterium des Frosches noch viel feinere Fasern und sie aus jenen hervorgehen. Treviranus sah in manchen Nervenröhren der Länge nach Streifen herablaufen, er sah

Digitized by Google

sogar deutlich kleinere Elementarcylinder in den sogenannten Primitivfasern, erstere von 0,0013 Mill., letztere von 0,0053 in einem Spinalnerven der Karausche. Beim Kaninchen waren die Elementarcylinder 0,0016, die sie einschliessenden stärkern Cylinder oder sogenannten Primitivfasern 0,0099.

Hirnfasern. Fontana hatte zwar Röhren im Gehirn erkannt, die mit einer gallertartigen Feuchtigkeit gefüllt seien, p. 373. aber seine Vorstellung von darmähnlichen Windungen dieser Canäle ist ganz unrichtig. Auf diese Biegungen hat er zu viel Gewicht gelegt; denn die Primitivfasern des Gehirns und Rückenmarks oder die primitiven Röhren desselben laufen mehrentheils ziemlich gerade und die Biegungen entstehen künstlich durch die Vorbereitung zur Untersuchung. Dagegen hat Ehrenberg das Verdienst, den röhrigen Bau der Hirnfasern und ihre Anordnung im Gehirn und Rückenmark sehr genau beschrieben zu haben. Die röhrigen Fasern verlaufen meist gerade und anastomosiren nicht. Nur sehr selten sah man Theilungen (wie zuweilen im Rückenmark). Doch mag es auch im Gehirn öfter vorkommen, da sich die Masse des Stammtheils der Fasern von der Medulla oblongata bis zum Stabkranz offenbar vermehrt. Ueber den Inhalt der zarthäutigen Röhren war man bisher noch nicht ganz im Klaren. Sein Ansehen erscheint mehr gallertartig als fest, einigen erschien er sogar von öliger Consistenz. Nach Remak ist der Inhalt dieser Röhren, wie in den Nerven ein Faden, aber wie die Röhre selbst von sehr viel zarterer Beschaffenheit als in den Nerven. Die primitiven Fasern oder Röhren des Gehirns und Rückenmarks und diejenigen des Sehnerven, Riechnerven und Geruchsnerven haben eine Eigenthümlichkeit vor den Primitivfasern anderer Nerven voraus, welche von Ehrenberg entdeckt wurde. Poggend. *Ann. XXVIII. Hft.* 3. *Abhandl. d. K. Akademie d. Wissensch. zu Berlin aus d. J.* 1834. *Berlin* 1836. *p.* 605. Sie erscheinen nämlich bei der leichtesten Compression stellenweise angeschwollen und die Zwischenstellen verdünnt, daher perlschnurartig. Fasern oder Röhren von dieser Beschaffenheit nennt man varicös. Ehrenberg sah solche varicöse Fasern nur im Gehirn und Rückenmark, in den höheren Sinnesnerven und zum Theil im Nervus sympathicus; die stärkeren cylindrischen Fasern, an welchen auch die Wand der Rohre deutlicher ist, sah Ehrenberg in den übrigen Nerven; der Nervus sympathicus zeigte varicöse und cylindrische Fasern zugleich. Es schien anfangs, dass sich nach dieser Verschiedenheit die Nerven würden eintheilen lassen. Allerdings zeigt die Neigung der Röhren Varicositäten zu bilden etwas Eigenthümliches an. Aber sie hängt, wie es scheint, bloss von der grössern Zartheit der Wände der Rohren ab. Auch sind die Primitivfasern im Gehirn, Rückenmark und den höheren Sinnesnerven, ohne Druck untersucht, gleichförmig und ohne Varicositäten und die Fasern der übrigen Nerven zeigen hinwieder zuweilen beim Druck Varicositäten. Treviranus fand im frischen Zustande überall, im Gehirn wie in den Nerven meist gerade, nicht angeschwollene Fasern. *Beiträge zur Aufklärung des organischen Le-*

Digitized by Google

bens. Bremen II. Volkmann sah die varicösen Fasern in den Sinnesnerven nicht constant. *Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipz.* 1836. Auch Beobachtungen von Lauth und Remak (Muell. *Arch.* 1836. 145.) liessen erkennen, dass eine Ordnung der Nerven nach der varicösen oder cylindrischen Beschaffenheit der Fasern nicht wohl möglich sei, indem einzelne varicöse Fasern bald häufiger, bald seltener in den verschiedensten Nerven wahrgenommen wurden. Eine und dieselbe Faser zeigte zuweilen stellenweise das varicöse Ansehen und die Nervenfasern junger Thiere sind im Allgemeinen mehr zu dieser Erscheinung geneigt. Zufolge der Beobachtungen von Treviranus, Valentin, Weber sind die Fasern des Gehirns, Rückenmarks, der Sinnesnerven und aller Nerven im ganz frischen Zustande ganz gleichförmig und ohne Anschwellungen, aber man erzeugt sie durch Druck. So leicht man varicöse Fasern im Gehirn und Rückenmark sieht, so ist es mir doch auch oft gelungen, Lamellen mit so geringer Quetschung abzuschneiden, dass die Fasern noch ganz gleichförmig und nicht varicös waren und so sah ich sie auch gleich Anderen im Sehnerven und in der Nervenhaut. Mir schien die Quetschung gerade dann am grössten und nachtheiligsten zu seyn, wenn man zu feine Blättchen von der weichen Substanz des Gehirns abzuschneiden sucht. In der Valvula cerebelli hat man die schöne Gelegenheit ohne Schnitt in einer natürlichen dünnen Platte von Gehirnsubstanz die Fasern zu untersuchen. So untersuchte sie Weber. Indessen bleibt es ein charakteristisches Merkmal der Hirnfasern und Fasern der Sinnesnerven, dass sie so leicht diese Form annehmen. Denn diese Eigenschaft theilen sie mit keinem andern Gewebe und sie kann bei ihrer Definition nicht ausser Acht gelassen werden. Wovon diese von Ehrenberg erkannte Eigenschaft abhange, ist noch nicht ganz klar. Das sehr dehnbare und elastische Rückenmark von Petromyzon fand ich in der Structur sehr abweichend. Es lässt sich leicht in Fäden reissen. Es besteht grossentheils aus bandartig ganz platten dünnen Fäden, deren Breite der Breite der Primitivfasern der Nerven des Ochsen gleicht. Ausser diesen sind noch feinere und andere viel feinere Fasern vorhanden.

Weisse und graue Bündel in den Nerven. Est ist bekannt, dass die Bündel der Nervenfasern im Nervus sympathicus meist ein graues Ansehen haben, während diejenigen der Cerebrospinalnerven weiss sind. Aber auch die Cerebrospinalnerven enthalten einzelne graue Bündelchen unter den übrigen weissen Bündelchen, wie man am Nervus Trigeminus der grossen Thiere, z. B. des Ochsen und des Pferdes sehr gut sieht. Diese grauen Bündelchen kommen vom N. sympathicus her und gehen in peripherischer Richtung auf den Cerebrospinalnerven fort, wie auf dem zweiten Ast des Trigeminus vom Nervus vidianus her, auf dem dritten Ast des Trigeminus vom Ganglion oticum her. Man kann es ebenso leicht an den Sacralnerven sehen, welche vom Sympathicus ein feines Bündelchen erhalten. Die Cerebrospinalnerven enthalten also weisse ihnen eigenthümliche Fasern, welche von den vordern und hintern Wurzeln der Hirn- und Rücken-

Digitized by Google

marksnerven kommen und der Bewegung und Empfindung vorstehen, und ausser den weissen Fasern auch wenigere graue, welche vom Sympathicus oder organischen Nervensystem herrühren und wahrscheinlich den organischen Wirkungen der Nerven vorstehen. Diese Zusammensetzung, welche bereits in der vorigen Auflage dieses Werks aus den Beobachtungen von Retzius und mir für die Cerebrospinalnerven p. 651. erwiesen war, wurde ebendaselbst auch für den Nervus sympathicus wahrscheinlich gemacht, welcher mit beiden Wurzeln der Rückenmarksnerven zusammenhängt und von dort motorische und sensorielle Fasern empfängt, während die Ganglienbildung und das überwiegend graue Ansehen diesem Nerven eigenthümlich ist. Doch ist der Sympathicus an verschiedenen Stellen je nach seiner Zusammensetzung hinwieder sehr verschieden. Der Grenzstrang des Sympathicus und mehrere von ihm abgegebene Nerven sind noch etwas weisslich, gegen die von den grossen Ganglien kommenden Fäden, wie ich bereits in der vorigen Auflage dieses Werks p. 651. bemerkt. Dagegen ist der carotische Theil des Sympathicus vorzugsweise grau, nur aus grauen Fäden besteht zum Beispiel der an den Nervus abducens sich anschliessende Theil des Sympathicus. Auch die vom Ganglion oticum auf den Nervus buccinatorius des Kalbes übergehenden Fäden sind ganz grau; der Nervus tensoris tympani weisslich. Remak hat an vielen Stellen des Sympathicus weisse und graue Bündel neben einander beobachtet, wovon die weissen wahrscheinlich als sensoriell und motorisch von den Cerebrospinalnerven in den Sympathicus eingemischt werden, die grauen aber den organischen Functionen wahrscheinlich bestimmt sind. Die graue Farbe der organischen Nerven rührt von ihren Fasern selbst her, welche sich nach Remak's Beobachtungen durch ihre Structur von den weissen unterscheiden. Die weissen Fasern sind nicht allein viel stärker, bei ihnen ist auch immer der Gegensatz der Röhre und des Inhaltes deutlich, die grauen Fasern sind viel feiner, auffallend durchsichtig und man unterscheidet einen Gegensatz von Röhre und Inhalt nicht, vielmehr ist ihr Ansehen homogen. Ihre Oberfläche ist hier und da mit ganz kleinen zerstreuten Körnchen besetzt. Diese haben Aehnlichkeit mit den Körnchen, womit die Zweigelchen der feinsten Gefässe (z. B. im Gehirn) besetzt sind. Die hinteren sensoriellen und vorderen motorischen Wurzeln der Rückenmarksnerven zeigen nach einer gemeinschaftlichen Beobachtung von Ehrenberg und mir keine Unterschiede der Structur.

Verlauf und Mischung der Fasern in den Nerven. Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist die Kenntniss des Verlaufs der Primitivfasern in den Nerven; denn so unentbehrlich auch die genaue Kenntniss der Verzweigung der Nerven ist, so handelt es sich zuletzt in der Physik der Nerven nur um die Frage, wo die Primitivfasern, die in einem Bündel enthalten sind, entspringen, und wo sich ihre Enden befinden, und es ist wenigstens für viele Fragen der Physik der Nerven gleichgültig, in welches Bündel diese Fasern hineintreten oder wie bald sie daraus hervortreten,

Digitized by Google

da sie, wie man bald sehen wird, von Anfang an darin selbstständig und isolirt sind.

Die erste und wichtigste Frage ist, ob, da die Nerven sich vielfach unter sich, und selbst die Bündel eines Nerven von Stelle zu Stelle zusammenhängen, dasselbe von den in diesen Fasern enthaltenen Primitivfasern gilt. Verbinden sich die Primitivfasern unter sich niemals, so steht das Hirnende einer Primitivfaser immer auch nur mit einem einzigen peripherischen Ende im Zusammenhang, und dem peripherischen Ende entspricht nur eine einzige Stelle im Gehirn oder Rückenmark, und so viele Millionen Primitivfasern zu peripherischen Theilen hingehen, so viele peripherische Punkte des Körpers sind im Gehirn repräsentirt. Wenn aber die Primitivfasern theils in den Bündeln der Nerven, theils in den Anastomosen und Plexus zusammenhängen, und nicht bloss juxtaponirt sind: so repräsentirt das Hirnende einer Primitivfaser sehr viele peripherische Punkte, und zwar alle Punkte, deren Fasern unterwegs in einander fliessen. Da nun die Nerven überall sich scheinbar verbinden, so würde, wenn sich auch die Primitivfasern verbänden, fast so gut wie kein einziger Punkt des Körpers im Gehirn isolirt und einzeln repräsentirt werden, und die Reizung einer Primitivfaser in einem Punkte der Haut würde sich auf alle Verbindungen fortpflanzen müssen, d. h. es würde nicht die Empfindung eines Punktes im Gehirn entstehen können. Denn die Empfindung eines Punktes im Gehirn hängt offenbar davon ab, dass da, wo das Bewusstseyn statt findet, auch nur durch Eine Faser und an Einem Ort ein Eindruck geschieht. Man sieht leicht ein, dass, wenn die Anastomosen der Nerven für die Leitung des Nervenprincips dieselbe Bedeutung hätten, als die Anastomosen der Gefässe, gar keine örtliche Nervenwirkung vom Gehirn auf die peripherischen Theile, und von den peripherischen Theilen nach dem Gehirn stattfinden könnte. Die ganze Möglichkeit einer exacten Physik der Nerven hängt davon ab, ob die Primitivfasern der Nerven in den Anastomosen der Bündel oder Scheiden sich wirklich oder nicht verbinden. Schon Fontana und später Prevost und Dumas haben die Beobachtung gemacht, dass die Primitivfasern der Nerven sich in dem Bündel nicht mit einander verbinden, sondern nur neben einander fortgehen. Zu dieser Zeit hat man schwerlich schon eine Ahnung von der Wichtigkeit dieser Beobachtung für die Physik der Nerven gehabt. Vor einigen Jahren, zur selben Zeit, als ich meine Versuche über die motorischen und sensiblen Wurzeln der Nerven bekannt machte, beschäftigte ich mich mit der Untersuchung jener Frage. Natürlich lässt sich immer nur eine Strecke unter dem Mikroskop untersuchen. Durch Fortrücken von Stelle zu Stelle kann man aber eine grössere Gewissheit erhalten, ob solche Verbindungen statthaben oder nicht. Nun ist es mir nie gelungen, bei Beobachtung der auseinandergespreizten Primitivfasern eines Nervenbündelchens auf einem schwarzen Blättchen unter dem einfachen Mikroskop solche Verbindungen zu sehen; immer liefen diese Fasern nebeneinander, übereinander weg, und auch da, wo sich zwei Bündelchen ver-

Digitized by Google

banden, habe ich keine wirkliche Vereinigung der Fasern, sondern ganz deutlich eine ganz einfache Juxtaposition derselben sehen können. Man kann dieses Verhalten eigentlich schon aus der äussern Beschaffenheit der Nerven vor und nach einer solchen Vereinigung erkennen. Wenn sich die Primitivfasern bei solchen Vereinigungen verbänden, also verschmölzen und also an Zahl geringer würden, so müsste das Bündel, welches aus der Vereinigung zweier hervorgeht, halb so dünn seyn wie beide zusammen; es ist aber in diesen Fällen immer grade so dick wie beide Bündel zusammen (mit einziger Ausnahme des N. sympathicus.) Bilden Nerven einen Plexus, so geht aus dem Plexus, trotz aller Kreuzung der Fasern, doch wieder so viel Nervenmasse hervor, als hereingetreten ist. Eben so verhält es sich bei der Verzweigung der Nerven. Ein Nerve, der einen Zweig abgiebt, wird gerade so viel nach der Abgabe des Zweiges dünner, als Nervenfasern von dem Stamm in den Zweig abgewichen sind; und man kann mit Hülfe der feineren Zergliederung leicht sehen, dass bei der Abgabe eines Zweiges nicht etwa jede Faser selbst sich in 2 Theile theile, wovon der eine in dem Nerven bleibt, der andere in den Zweig übergeht, sondern dass durch die Verzweigung nur die Vertheilung der im Stamm schon vorhandenen Nervenfasern abgeändert wird; deswegen können auch in einem Stamm gar verschiedene Fasern zusammenliegen, empfindliche und motorische, und oft liegen Nervenäste in dem ganzen Stamm schon vorgebildet da, welche mit den übrigen Theilen des Stamms weder eine Verbindung eingehen, noch Aehnlichkeit der Eigenschaften damit besitzen. So z. B. betrachtet man den N. mylohyoideus, einen Muskelnerven, nur ganz roh als einen Ast des N. alveolaris inferior, eines Gefühlsnerven, denn diese beiden Nerven haben gar nichts mit einander gemein, als dass sie beisammen liegen; und so ist es sehr oft. Man sieht hieraus auch ein, dass Identität der Eigenschaften der Bündel in der Natur eines Nervenstammes gar nicht liegt, sondern dass er eher, namentlich in einiger Enfernung von seinem Ursprung vom Gehirn, eine sehr mannichfaltige Juxtaposition von ganz verschiedenen Bündeln seyn kann, je nachdem sich verschiedene Bündel, die zugleich einem Gliede bestimmt sind, an ihn gelegentlich anschliessen.

Mit der eben hier erörterten Ansicht von dem Verlauf der Primitivfasern vom Gehirn bis zu den peripherischen Theilen steht eine Vorstellung im Widerspruch, dass nämlich die Nerven bei ihrem Verlauf an Masse zunehmen sollen; diess ist aber ein Missverständniss, welches von Soemmering herrührt. Allerdings ist ein Nerve dünner, so lange er noch innerhalb der Dura mater liegt, so lange er noch kein Neurilem besitzt. Nachher bleibt er sich gleich, so lange er keine Aeste abgiebt. Die Aeste zusammengenommen sind jedesmal gleich dem Stamm; wenn sich etwa ein kleiner Unterschied zeigt, so kömmt er davon her, dass an den Zweigen zusammen mehr Neurilem vorhanden ist, als an dem Stamme.

Was eben von den Nerven bei ihrer Verzweigung be-

Digitized by Google

merkt ist, gilt auch von dem Plexus zweier verschiedener Nerven. Ich habe mit aller Mühe vor einigen Jahren die Verbindungen des N. facialis mit dem N. infraorbitalis im Gesicht des Kaninchens und Schafes zergliedert, und mich durch genaue graphische Aufnahme des Verlaufs der Primitivfasern beider Nerven überzeugt, dass sich die Fasern bloss aneinander legen, in neuen Bündeln sich vertheilen. Von diesen Principien betrachtet, muss man sich also die Primitivfasern aller Cerebro-Spinalnerven vom Ursprung bis zum Ende isolirt denken, und als Strahlen von der Achse des Nervensystems ansehen. Genau genommen gehen auch diese Strahlen beinahe in einer Linie jederseits vom Rückenmark aus, nur von Stelle zu Stelle wird bloss eine Summe dieser in einer fast zusammenhängenden Linie entspringenden Fasern in ein Bündel zusammengefasst, wie es nämlich für die Vertheilung derselben an ihre peripherischen Stellen am bequemsten ist.

Diese Ergebnisse eigener Beobachtung habe ich seit Jahren in meinen Vorlesungen vorgetragen; im Jahre 1830 hatte ich Gelegenheit, sie Herrn Professor Schroeder van der Kolk in Utrecht mündlich mitzutheilen, indem ich denselben aufforderte, diese Beobachtungen zu prüfen, jetzt haben diese Ansichten, die mit denen von Fontana und Prevost und Dumas übereinstimmen, durch das Gewicht derselben Beobachtungen von Seiten meines berühmten Collegen Ehrenberg in mir noch mehr sich befestigt. Ausführlich hat über diesen Gegenstand gehandelt Kronenberg *plexuum nervorum structura et virtutes. Berol.* 1836. Das hier Erwähnte gilt übrigens bloss von den weissen Fasern der Cerebrospinalnerven und des Sympathicus. Denn von den grauen Fasern ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sie (wenigstens durch die Ganglien) untereinander zusammenhängen.

Endigung der Nerven. Ueber die Endigungen der Nerven haben Treviranus, Gottsche, Valentin, Emmert, Burdach d. jüngere und Schwann gearbeitet. Die Hauptfrage ist hier, ob die Nervenfasern sich unter einander verbinden oder isolirt endigen. Entweder biegt eine Nervenfaser regelmässig in eine zweite rücklaufende um, so dass immer zwei schlingenförmig verbunden sind, oder die Fasern verbinden sich zuletzt zu einem Netzwerk nach Art der Blutgefässe, oder die Fasern endigen sämmtlich isolirt und ohne Verbindungen. Das erste Verhalten fanden Prevost, Dumas, Valentin, Emmert an den Muskelnerven, Breschet, Valentin, Burdach an den sensoriellen Nerven; das zweite Verhalten beobachtete Schwann im Mesenterium des Frosches und der Feuerkröte und im Schwanze der Krötenlarven, das dritte Verhalten entdeckte Treviranus, im Auge und Ohr und dasselbe ist von Gottsche bestätigt.

Es scheint, dass Prevost und Dumas die Primitivfasern selbst in den Muskeln nicht untersucht haben. Dagegen beobachteten Valentin und Emmert das schlingenförmige Umbiegen einer Faser in eine zweite rücklaufende in den Muskeln. Valentin *Nov. act. nat. cur. XVIII. p.* 1. 51. Emmert *über die Endigungsweise der Nerven in den Muskeln. Bern* 1836. 4. Dasselbe Verhalten

Digitized by Google

ist von Valentin auch in der Iris und im Ciliarbande, in der Flasche der Schnecke der Vögel, in den Gehörblättern oder Runzeln der Vogelschnecke, in den Ampullen, im Zahnsäckchen, in der Haut des Frosches beobachtet worden. Breschet sah dies Verhalten in der Schnecke und in den Ampullen und bei seinen früheren Beobachtungen über die Hauptpapillen. Die schlingenförmigen Umbiegungen zweier Fasern in einander sah auch Burdach d. jüngere in der Haut des Frosches und er sah die Schlingen auch zwischen den Fasern verschiedener Zweige gebildet. *Beitrag zur mikroskop. Anatomie der Nerven. Königsb.* 1837.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die starken sogenannten Primitivfasern der Nerven selbst entweder umbiegend oder isolirt die letzten Endigungen in Theilen bilden, deren Primitivfasern selbst viel feiner sind als die sogenannten Primitivfasern der Nerven. Schwann sah viel feinere Elemente an der peripherischen Endigung der Nerven zum Vorschein kommen. Schon im Mesenterium der Frösche hatte derselbe aus den sogenannten Primitivfasern der Nerven sehr viel feinere Fasern hervorgehen gesehen, welche hie und da kleine Knötchen bildeten, von welchen mehrere Aestchen abgingen. Bei weiteren Untersuchungen über die Endigung der Nerven im Schwanze der Krötenlarven hat sich diess Verhalten ganz so bestätigt. Die Nervenfasern, welche hier durch Spaltung von Fasern von der Dicke der gewöhnlichen Primitivfasern zum Vorschein kommen, sind ganz ausserordentlich fein, und besitzen nicht mehr die dunkle röhrige Hülle, welche die gewöhnlichen Primitivfasern umgiebt. Die kleinen Knötchen zeigen sich als ziemlich constante Erscheinung. Die feinern Fasern, welche aus den sogenannten Primitivfasern hervorgehen, geben hier und da wieder noch feinere Fasern ab, die schon vorgebildet waren und es scheint, dass die feinsten Fäserchen, welche theils von andern Fasern, theils von den mikroskopischen Knötchen nach mehreren Seiten abgegeben werden, zuletzt ein zusammenhängendes Netzwerk bilden.

In der Nervenhaut des Auges und im Ohr endigen die Nervenfasern isolirt und ohne Verbindungen. Fontana kannte bereits die Nervenfaserschicht der retina und die darauf liegende innere sogenannte Körnerschicht. Diese Haut besitzt auch eine äussere Körnerschicht, welche aus pflasterartig zusammengesetzten Körnern besteht. Die Nervenfasern liegen also in der mittlern Schicht. Treviranus (a. a. O.) hat entdeckt, dass die Fasern dieser Schicht an einer gewissen Stelle ihres Verlaufs von der horizontalen Richtung abbiegen und sich nach der inwendigen Seite der Netzhaut wenden. Gleich nach der Umbiegung geht der Cylinder durch die Oeffnungen eines Gefässnetzes, welches von den Centralvenen des Sehnerven entspringt. Bevor er zur inwendigen Seite der retina gelangt, dringt er durch ein zweites Gefässnetz, das von den Zweigen der Centralarterie gebildet wird. Nach dem Durchgang durch das letztere wird er von einem scheidenförmigen Fortsatze des Gefässblattes der Netzhaut aufgenommen und von diesem bedeckt, endigt er sich hinter dem Glaskörper in der Form einer Papille. Der Querdurchmesser des Ner-

Digitized by Google

vencylinders der retina war beim Igel 0,001 Mill., bei Kaninchen die Papillen 0,003, bei Vögeln 0,002—0,004, beim Frosch hatten die Cylinder 0,0044, die Papillen 0,0066, letztere bei der Karausche 0,0039—0,004. Die Körperchen, welche Treviranus für Umbiegungen der Nervenfasern hält, sind kurze Cylinder, welche sehr leicht von der darunter liegenden Schicht abbrechen. Sie sind an ganz frischen Augen von Thieren leicht zu beobachten und von Gottsche, Ehrenberg, Volkmann, Weber sowohl, als auch von mir selbst wiedergesehen. Ob aber jeder Körper das Ende nur einer Faser ist, oder ob mehrere auf einer Faser aufsitzen, ist noch nicht hinreichend klar. Einige Stunden nach dem Tode lassen sich diese Körperchen schon nicht mehr untersuchen; man sieht an ihrer Stelle nur Körner, welche die frühere unrichtige Ansicht von einer innern Körnerschicht der retina erzeugt haben. Die Papillen der stabförmigen Körper scheinen nur bei den Fischen deutlich zu seyn und sind hier von Gottsche beschrieben. Gottsche in Pfaff's *Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie.* 1836. *Heft* 3. 4. *Heft* 5. 6. Vergl. *über die Beobachtungen von Anderen den Jahresbericht. Archiv* 1837.

Treviranus fand die Papillarendigung der Nervenfaden nicht bloss in der Netzhaut, sondern auch an dem Hörnerven und Riechnerven. Die Papillen sind hier mehr fadenförmig. Die Papillen des Hörnerven sah er auf dem Spiralblatte der Schnecke bei jungen Mausen. Der knöcherne Theil ist mit gedrängt an einander liegenden fadenförmigen Papillen ganz bedeckt. Zum häutigen Saum der Platte gehen die Nervencylinder unter der Oberfläche der Haut mehr vereinzelt und dringen, nachdem sie in den Kanälen, worin sie enthalten sind, spiralförmige Windungen gemacht haben, äusserlich aus kleinen Oeffnungen als Kügelchen von 0,0016—0,0033 Mill. hervor. Die Cylinder des Hörnerven selbst hatten dieselbe Dicke. Beim Fuchs fand Treviranus, dass die Nerven der Bogengänge bei ihrem Eintritt in die Ampullen dieser Canäle sich auf beiden Seiten der Ampulle in eine Platte ausdehnen, worin ihre Cylinder sich in feinere Cylinder auflösen und woraus diese zu neuen stärkeren Cylindern vereinigt wieder hervortreten. Gottsche fand die letzten Enden der Nerven der Schnecke beim Hasen und Kaninchen und die Endigungen des Hörnerven bei den Fischen auch kolbig. Ich sehe auf der Spiralplatte der Vogelschnecke, die Windischmann beschrieben auch isolirte Fasern ohne Verbindung. Die Hauptmasse des Schneckennerven trifft hier auf den einen Rand des Schneckenknorpels und spreitzt sich hier sehr regelmässig an der Substanz des Knorpels aus. So weit dieses geschieht, kommen sehr viel feinere Fasern vom Knorpel her, und setzen dicht und parallel nebeneinander durch den grössern Theil der Breite des höchst zarten Spiralblättchens.

Die Endigung der Hirnfasern ist von Valentin untersucht worden. Die ins Rückenmark eintretenden Primitivfasern der Nerven endigen nicht im Rückenmark, sondern setzen sich nach dem Hirn hin fort. Die am Ende des Rückenmarkes eintretenden Fasern verlaufen nach vorn, die seitlich von den höheren

Digitized by Google

Nerven kommenden Fasern dagegen gehen zuerst transversal nach innen bis zur grauen Substanz oder bis in deren Nähe, dann setzen sie sich ebenfalls in longitudineller Richtung gegen das Gehirn fort. In der rein weissen Substanz liegen diese Fasern nebeneinander, wo aber die graue und weisse Substanz einander berühren, nehmen sie die hernach zu erwähnenden Kugeln der grauen Substanz zwischen sich und strahlen zuletzt in die Rindensubstanz. Hier bilden sie bogenförmige Umbiegungen einer Faser in eine andere. Man sieht diese am deutlichsten, wo die weisse und grauröthliche Substanz sich mit einander verbinden oder in der gelben Substanz an der Peripherie der Hemisphären des grossen und kleinen Gehirns.

Graue Substanz des Gehirns, Rückenmarks und der Ganglien. Im Innern der Ganglien der Wirbellosen (Blutegel, Wegschnecke) beobachtete Ehrenberg Keulenkörper. Im Innern der Ganglien des Blutegels bilden diese Keulen 8 Bündel, von denen je zwei in die vier Schenkel des Ganglions durch lange cylindrische Röhren austreten. Diese Keulen enthalten in ihrem angeschwollenen Theile einen Kern, beim Blutegel ausser diesem noch mehrere kleine Kügelchen (nach der Abbildung). Aehnliche Körper hat Valentin in den Ganglien des Bauchstranges des Blutegels beschrieben. Er sah Kugeln, die wie die Ganglienkugeln der höheren Thiere, einen Kern besitzen. In diesem Kern liegt an einer Stelle dicht an der Oberfläche ein röthliches grösseres und bisweilen mehrere kleinere Körperchen. Purkinje beobachtete ähnliche geschwänzte Körper in der gelben Masse zwischen Rinden- und Marksubstanz des kleinen Gehirns. Diese Körper haben einen hellen Kern und einen diesem entsprechenden kleinen nucleus auf der Oberfläche. Sie stehen reihenweise nebeneinander, ihre abgerundeten Enden nach innen gegen die weisse Substanz, ihre schwanzförmigen Verlängerungen dagegen nach aussen gegen die Rindensubstanz hin richtend. Ich vergleiche damit gewisse keulenförmige, einen Kern enthaltende Körper, die ich in der medulla oblongata der Cyclostomen (Petromyzon in Weingeist) gefunden. Sie waren aber hier eigenthümlich gebildet. Denn ihr dickeres Ende war selten rundlich, meist zackig; es lief an den meisten in mehrere, bald 2, bald 3 oder 4 Zacken aus, deren Stellung zu einander und Form sehr variirte. Muell. *Arch.* 1837. *XVII.*

Die Elemente der Ganglien in den Nerven der höheren Thiere und des Menschen bestehen nach Valentin's Beobachtungen aus ziemlich grossen Kugeln, welche sich von den genannten Keulenkörpern nur durch ihre mehr rundliche Gestalt unterscheiden, sonst aber auch einen Kern und in der Circumferenz desselben einen zweiten kleineren Kern, oft auch Pigmentflecke auf ihrer Oberfläche enthalten. Ein oder mehrere Faserbündel, welche in das Ganglion eintreten, bilden innerhalb desselben Plexus durch Vertheilung der Fasern in anderer Ordnung und treten wieder aus, ausserdem umspinnen einzelne Primitivfasern oder Bündel von Fasern von allen Seiten die Ganglienkugeln in darmähnlichen Windungen. Die umspinnenden Fasern gehen von den Fasern

Digitized by Google

des Stammes ab und kehren dahin zurück. So verhalten sich in der That die Ganglienkugeln im Allgemeinen, wie man leicht constatiren kann.

Im Gehirn und Rückenmark ist die graue Substanz nach Valentin ganz aus denselben Kugeln, wie die Ganglien der Wirbelthiere gebildet. Die feinkörnige Beschaffenheit entsteht erst durch die Zertrümmerung der weichen Kugeln. Der einzige Unterschied zwischen den Kugeln der grauen Substanz des Gehirns und den Ganglienkugeln ist, dass das sie umkleidende Zellgewebe viel zarter ist. Die weisse Substanz des Gehirns enthält nach Valentin keinerlei Kugeln oder Kügelchen. Diese entstehen nur durch die Zerstörung der Fasern. Von der Einlagerung der grauen Kugelmasse hängt es ab, in wie weit Theile des Gehirns von der Farbe der weissen oder faserigen Substanz abweichen; wo die Zahl der Primitivfasern überwiegt, wird die Masse mehr weisslich grau, wo diess weniger der Fall ist, grauröthlich; die dunklern Hirnfarben entstehen durch Pigment deposita auf den Kugeln.

Im Rückenmark giebt es zweierlei graue Substanzen, wie Rolando entdeckt hat. Die gewöhnlich so genannte graue Substanz im Rückenmark nennt Rolando substantia cinerea spongiosa vascularis. An der hintern Seite der hintern Hörner dieser Substanz liegt eine Leiste ganz grauer Substanz, substantia cinerea gelatinosa von Rolando. *Saggio sopra la vera struttura del cervello. Edit.* 2. *T.* 2. *Torino* 1828. *Tab.* 3. *Fig.* 2. 3. *sp.* Die erstere enthält nach Remak die grossen oben beschriebenen Ganglienkugeln und viele Fasern, die letztere dagegen enthält Körperchen, welche den Blutkörperchen des Frosches ähnlich sind. Dieselbe Structur hat die Fortsetzung der substantia cinerea gelatinosa in der medulla oblongata, wo sie zu Tage kömmt. Auch an einigen Stellen des grossen Gehirns beobachte Remak diese Structur.

Eine wichtige Frage ist, ob die grossen Kugeln der grauen Substanz im Gehirn und in den Ganglien ohne weitere Verbindungen sind. Gewisse Zacken, die man hie und da von diesen Kugeln unter glücklichen Umständen ausgehen sieht, machen eine Verbindung der Kugeln unter sich oder mit Fasern wahrscheinlich. Ich habe zuerst solche Zacken an den keulenförmigen Körpern in der medulla oblongata der Petromyzon gesehen. Remak sah sie bald darauf auch an den Kugeln der grauen Substanz des Gehirns und an den Ganglienkugeln. Er sah nicht nur Fäden, welche von der Oberfläche einer Ganglienkugel abgehen; es gelang ihm, sie zuweilen auf eine Länge zu isoliren, welche diejenige der Kugel mehrfach oder vielfach übertrifft. Dergleichen Fäden der Ganglienkugeln haben einige Aehnlichkeit mit den feinen grauen Fäden, welche Remak im Gangliennerven beobachtet hat, und wenn letztere, welche die grauen Bündel des Sympathicus bilden, organische Fasern sind, so wird es einigermassen wahrscheinlich oder wenigstens vermuthlich, dass die grauen Fasern der organischen Nerven daraus entspringen.

Vertheilung der weissen und grauen Fasersysteme in den Cerebrospinalnerven und im Nervus sympathicus. Vorher schon wur-

Digitized by Google

den die Thatsachen erwähnt, aus welchen hervorgeht, dass in den Cerebrospinalnerven ausser der Hauptmasse der sensoriellen und motorischen weissen Fasern, welche von den hintern und vordern Wurzeln des gemischten Nerven entspringen, auch sparsamere graue organische Bündel enthalten sind. Auch wurde angeführt, dass der Nervus sympathicus nicht bloss graue organische, sondern auch einzelne weisse Bündel enthält, und zuletzt wurde als wahrscheinlich hervorgehoben, dass die grauen Fasern von besonderer Structur von den Ganglienkugeln entspringen, welche im Nervus sympathicus so häufig in dessen Ganglien sind, in den Cerebrospinalnerven aber seltener vorkommen, wo der Nervus sympathicus sich stärker einmischt, wie am Knie des Facialis, am zweiten und dritten Ast des Trigeminus. Man sieht jetzt, dass der Sympathicus sich nur relativ von den anderen Nerven unterscheidet. Die gemischten Hirn- und Rückenmarksnerven enthalsen viel sensorielle und motorische Faserbündel und wenig graue Bündelchen, welche letztere zur Bildung von Ganglien geneigt sind, der Sympathicus enthält weniger sensorielle und motorische Elemente, die er von den hinteren und vorderen Wurzeln der Nerven hat, dagegen enthält er viele graue organische Fasern, gemäss seiner Verbreitung in Theilen, welche vorzugsweise der chemischen Veränderung der Säfte dienen. Daher sind die Ganglien in diesem Nerven so häufig, während sie an den Cerebrospinalnerven (ausser den regelmässigen Ganglien der hintern Wurzeln) selten und eben nur da vorkommen, wo eine lebhafte Einmischung der grauen organischen Bündel vom Sympathicus in die Cerebrospinalnerven geschieht.

Eintheilung der Ganglien. Die Ganglien der Nerven lassen sich in 3 Classen bringen.

I. Ganglien der hinteren Wurzeln der Rückenmarks- und Gehirnnerven, Ganglion der grossen Portion des Nervus trigeminus, Ganglion Nervi vagi, Ganglion jugulare superius Nervi glossopharyngei.

Die hier aufgeführten Ganglien haben mit einander gemein, dass sie einem Gefühlsnerven gehören; es wird aus den späteren Untersuchungen sich ergeben, dass die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven nur sensibel, nicht motorisch sind. Unter den Ganglien der Rückenmarksnerven zeigt das Ganglion des ersten Rückenmarksnerven zuweilen, das der beiden letztern immer Anomalien in Hinsicht seiner Lage. Das erstere liegt zuweilen noch innerhalb der Dura mater. Mayer *Nov. act. nat. cur. V. XVI.* Die beiden letzten, sehr zarten Rückenmarksnerven haben ihre Ganglien nach Schlemm's Entdeckung immer noch innerhalb der Dura mater. Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie.* 1834. *I.* In dem Verhältniss, wie die hintere Wurzel zur vorderen Wurzel der Rückenmarksnerven, steht aber auch die Portio major nervi trigemini, die in das Ganglion Gasseri anschwillt, zur Portio minor, die an dem Ganglion vorbeigeht. Goerres (*Exposition der Physiologie. Coblenz* 1805. 328.) verglich zuerst den N. vagus und accessorius der hintern und vordern Wurzel eines Rückenmarksnerven. Jedenfalls muss das Ganglion nervi vagi im Foramen jugulare als Ganglion ei-

Digitized by Google

nes Empfindungsnerven angesehen werden, wenn auch bei einigen Thieren mehrere Fasern des Vagus an diesem Knoten vorbeigehen. Santorini beobachtete in einigen Fällen eine hintere Wurzel des Nervus hypoglossus (ohne Ganglion) und Mayer (a. a. O.) hat die Entdeckung gemacht, dass bei mehreren Säugethieren (Ochse, Hund, Schwein) eine überaus feine hintere Wurzel des N. hypoglossus vorhanden ist, welche von der hintern Fläche der Medulla oblongata entspringt, über den N. accessorius weggeht und ein deutliches Ganglion über dieser Stelle bildet, ohne mit dem N. accessorius zusammenzuhängen. Aus diesem Ganglion geht ein dickerer Nervenfaden hervor, welcher durch eine Oeffnung in dem ersten Zahn des Ligamentum denticulatum hindurchgeht (oder, wie wir es neulich sahen, über dem ersten Zahn des Lig. denticulatum weggeht), um sich zur bekannten Wurzel des N. hypoglossus zu begeben. Diese hintere Wurzel und das Ganglion hat Mayer bis jetzt nur einmal beim Menschen gefunden.

An diese Beobachtung schliesst sich eine von mir beim Menschen gemachte Beobachtung an. (*Medizin. (Vereins-) Zeitung. Berlin*, 1833. *Nr.* 52.) Ich habe nämlich an der Wurzel des N. glossopharyngeus des Menschen (ausser dem Ganglion petrosum am untern Ende des Foramen lacerum), ein ganz kleines Ganglion beobachtet, welches an der hintern äussern Seite der Wurzel dieses Nerven, am obern, der Cavitas cranii zugewandten Anfang des Foramen lacerum liegt. Man sieht dieses Knötchen von 1 Millimeter Länge erst, wenn man die Dura mater an der Durchgangsöffnung weggenommen und den hintern Rand des Felsenbeins abgemeisselt hat. Es gehört nicht der ganzen Wurzel an, sondern einem Bündelchen von einigen Fäden derselben, welches, nachdem es durch das Ganglion gegangen, stärker geworden scheint, übrigens aber keinen, von den übrigen Wurzelfäden des N. glossopharyngeus verschiedenen Ursprung hat. Ehrenritter hatte dieses Knötchen zuerst entdeckt. (*Salzb. med. Zeit.* 1790. *B.* 4. *p.* 319.); aber er hat das nähere Verhältniss zu den Wurzelfäden des Glossopharyngeus nicht gekannt, und ich zeigte, dass die Wurzelfäden des Nerven, die einen mit Ganglion, die andern ohne Ganglion sich wie die Wurzeln des N. trigeminus verhalten, und dass der Nerve wie der trigeminus ein gemischter nach Analogie der Rückenmarksnerven ist.

Das seit älterer Zeit schon bekannte Ganglion petrosum N. glossopharyngei scheint die Bedeutung der Ganglien der Empfindungsnerven nicht zu haben und mehr mit denjenigen Anschwellungen überein zu stimmen, welche zuweilen entstehen, wenn Aeste des N. sympathicus sich mit anderen Nerven verbinden, wie z. B. die geringe Anschwellung des N. facialis am Knie desselben hierher gehört, wo er den Ramus petrosus superficialis N. vidiani aufnimmt. In der That verbindet sich das Ganglion petrosum mit einem aufsteigenden Aste des Ganglion cervicale supremum, und durch den Ramus tympanicus Ganglii petrosi mit dem Ramus carotico-tympanicus N. sympathici.

Die Structur dieser Ganglien ist von derjenigen der Gan-

Digitized by Google

glien des Nervus sympathicus nicht wesentlich verschieden; aber man sieht hier deutlicher den unveränderten Durchgang der pinselförmig zwischen die Kugeln der Ganglienmasse eintretenden Fasern. Die eigentliche Bedeutung der Ganglien der Empfindungswurzeln ist noch nicht bekannt. Vielleicht sind von dort die organischen Fasern des Sympathicus abzuleiten, welche diese Knoten dann mit den hinteren Strängen des Rückenmarks in Verbindung setzen würden. Die sensoriellen und motorischen weissen Fasern des Sympathicus stehen mit der vordern und hintern Wurzel der Rückenmarksnerven in Verbindung. Es fragt sich demnach, ob die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven sowohl die sensoriellen als die organischen Fasern mit dem Rückenmark verbinden. Eine Hauptquelle der organischen Fasern scheint übrigens in den Ganglien des Sympathicus selbst zu liegen. Der Grenzstrang des Sympathicus ist verhältnissmässig viel weisser als die von den grossen Unterleibsganglien ausgehenden Bündel. Die Frage, ob sich in den Ganglien der hinteren Wurzeln und im Ganglion Gasseri die Zahl der Fibern vermehre, lässt sich mit den bisherigen Gründen nicht beantworten. Allerdings gehen die weissen Fasern nur in anderer Ordnung durch. Aber von den Ganglienkugeln können graue Fasern entspringen, wie man in der That weiss, dass vom Ganglion Gasseri graue Bündel auf die Aeste des trigeminus mit fortgehen. Vergl. Wutzer's treffliche Schrift *de gangliorum fabrica. Berol.* 1817.

II. Ganglien des Nervus sympathicus.

Das Verhalten der Nervenfasern in diesen Knoten ist so schwer zu enthüllen, dass wir davon noch gar keine sichere Kenntniss haben. Hier wie überall kömmt es in letzter Instanz auf die Hauptfrage an, ob die Primitivfasern sich wirklich verschmelzen, oder auch bloss juxtaponiren, und theilweise kreuzen mit andern, oder ob die Primitivfasern nur in der peripherischen Richtung sich theilen, um sich darin zu multipliciren. Wenn irgendwo eine Multiplication der Fasern in den Ganglien anzunehmen ist, so ist es gewiss am ehesten in den Ganglien des N. sympathicus, wenigstens scheinen die in den Unterleibsgeflechten sich entwickelnden Primitivfasern, die nun sich peripherisch verbreiten, schwer auf die Wurzeln des N. sympathicus von den Rückenmarksnerven sich zu reduciren. Aber diese Multiplication wird, wenn sie stattfindet, nur auf die feinen organischen grauen Fasern zu beziehen seyn. Denn man weiss, dass sich die gewöhnlichen Primitivfasern in den Ganglien des Sympathicus wie in den Ganglien der hinteren Wurzeln verhalten. Die Ganglien des N. sympathicus bilden wieder zwei Reihen. Die erste umfasst die Grenzknoten, welche da liegen, wo die Wurzeln des N. sympathicus von den Cerebral- und Spinalnerven kommen, sich zum Grenzstrang verbinden. In diese Reihe gehören alle Ganglia cervicalia, intercostalia, lumbalia, sacralia des Nervus sympathicus. In die zweite Reihe der Ganglien des Nervus sympathicus gehören die Centralknoten oder Geflechtknoten, plexusartigen Knoten in den Geflechten des Unterleibes.

Digitized by Google

III. Ganglien an den Cerebrospinalnerven, wo sich dieselben mit Zweigen des Nervus sympathicus verbinden.

Hierher gehören das Ganglion petrosum N. glossopharyngei die Intumescentia gangliiformis am Knie des N. facialis, das Ganglion sphenopalatinum am zweiten Aste des N. trigeminus, das Ganglion ciliare, vielleicht auch oticum und noch einige andere. Nicht überall, wo Fäden des N. sympathicus mit Fäden der Cerebralnerven zusammenstossen, entstehen Ganglien an den letztern; diess ist vielmehr nur ein seltener Fall, denn bei der grossen Anzahl der Ursprünge des N. sympathicus von Cerebral- und Spinalnerven befinden sich doch an der Abgangsstelle dieser Fäden von den Cerebral- und Spinalnerven in der Regel keine Knoten. Wie kömmt es aber, dass in den oben erwähnten Fällen bei dem Zusammenkommen von Fäden des N. sympathicus mit Cerebralnerven gangliöse Anschwellungen an den letzteren entstehen? Diess scheint mir daher zu rühren, dass in jenen Fällen an der Stelle, wo die gangliöse Anschwellung liegt, nicht Zweige der Cerebralnerven vom Gehirn ab zum N. sympathicus, sondern vom N. sympathicus an die Cerebralnerven stossen, welche Fäden nicht bloss der Richtung zum Gehirn am Cerebralnerven, sondern in peripherischer Richtung an diesem fortgehen. Wäre diese Bemerkung durchgreifend, so hätte man, wenn ein Cerebralnerve nicht an seiner Wurzel, sondern in seinem weitern Verlaufe bei Verbindung mit dem N. sympathicus eine Anschwellung zeigte, an dieser Anschwellung ein Kennzeichen, dass die an die Cerebralnerven tretenden Fäden des N. sympathicus keine Wurzeln des letztern, sondern Beimengungen des N. sympathicus zum Cerebralnerven sind. So ist das Ganglion ciliare eine Vermengung von Fäden des N. trigeminus (Radix longa a N. nasali), des N. oculomotorius (Radix brevis a N. oculomotorio), und des N. sympathicus, eine Vermengung, welche zum Zweck hat, nicht neue Wurzeln des N. sympathicus zu geben, sondern Fäden des N. sympathicus mit den sensibeln Fäden vom 1. Act des N. trigeminus und den motorischen Fäden vom N. oculomotorius in die Ciliarnerven zu bringen. Eben so verhält es sich mit dem Ganglion sphenopalatinum am zweiten Aste des N. trigeminus, welches, da der N. sympathicus durch Fäden vom Ganglion oticum aus nach Bendz schon mit dem Stamm des N. trigeminus im Ganglion Gasseri Verbindungen eingeht, nicht bloss Wurzeln des N. sympathicus abzugeben, sondern Fäden vom N. sympathicus zur peripherischen Verbreitung mit dem zweiten Aste des N. trigeminus aufzunehmen scheint. In der That hat Retzius diese Fäden des N. sympathicus, welche vom Ganglion sphenopalatinum aus in den zweiten Ast des N. trigeminus peripherisch fortlaufen, beim Pferde deutlich gesehen und beschrieben. *Isis.* 1827. Dasselbe sah ich beim Ochsen. Das Ganglion petrosum N. glossopharyngei ist, wie ich oben zu zeigen gesucht habe, nicht das gewöhnliche Ganglion eines Empfindungsnerven, da das höher am N. glossopharyngeus liegende, von mir beobachtete Ganglion jugulare die Bedeutung eines solchen hat, sondern entsteht durch die Verbindungen von mehreren Zweigen des N. sympathicus mit dem N. glosso-

Digitized by Google

pharyngeus. Bis jetzt lässt sich die fragliche Ansicht noch nicht ganz durchführen, sondern nur als einen Anhaltpunkt zu einer künftigen Entscheidung der Frage gebrauchen, welche von den vielen Verbindungen des N. sympathicus als Wurzeln desselben, und welche als peripherische Zweige desselben, als Abgabe an die Cerebralnerven zu betrachten sind.

Sollte es sich bestätigen, dass die bei den Verbindungen von Zweigen des N. sympathicus mit Zweigen der Cerebralnerven zuweilen vorkommenden Ganglien an blossen Verbindungsstellen und nicht an Ursprungsstellen des N. sympathicus liegen, so würde diese dritte Art von Knoten noch keine besondere Classe bilden, sondern nur in den Bereich des N. sympathicus gehören, und unter die zweite Art der Knoten zu subsumiren seyn; dann würde man dreierlei Knoten des N. sympathicus besitzen.

1. Die Centralknoten, Geflechtknoten oder plexusartigen Knoten in den Geflechten des Unterleibes.
2. Die Knoten des Grenzstranges, welche jedesmal an den Verbindungsstellen der verschiedenen Wurzeln des N. sympathicus liegen.
3. Die Verbindungsknoten des N. sympathicus an Verbindungsstellen desselben mit Zweigen von Cerebralnerven, welche die letzteren und nicht den N. sympathicus modificiren.

II. Capitel. Von der Reizbarkeit der Nerven.

Im Anfange dieser Schrift sind die Gesetze der thierischen Reizbarkeit im Allgemeinen untersucht worden. Siehe oben p. 51.

Diese Eigenthümlichkeit der organischen Körper ist auch den Nerven eigen, und die allgemeinen und verschiedenen Kräfte der Nerven kommen überall durch Reize zur Erscheinung. Die Aufgabe des Physiologen ist aber, nicht allein die Gesetze dieser allgemeinen Eigenschaft zu ergründen, womit sich Brown und seine Nachfolger leider allein beschäftigt haben; sondern die eigenthümlichen Kräfte, welche gereizt werden können, selbst zu untersuchen, und hier hat sich der Physiologie ein ganz grosses und neues Feld der Empirie eröffnet. Um die Kräfte der Nerven kennen zu lernen, müssen die Wirkungen aller möglichen Reize auf dieselben studirt werden. Auf diese Art erwirbt die Physiologie eine ähnliche empirische Zuverlässigkeit, als die Physik und Chemie der unorganischen Körper. Die Reagentien erzeugen in den chemischen Wirkungen nur Producte, Combinationen, Trennungen; in den organischen Körpern und insbesondere auf die Nerven angewandt, bringen sie, so verschieden sie auch seyn mögen, nur Erscheinungen der vorhandenen Kräfte und Veränderungen dieser Kräfte hervor, und es wird sich zeigen, dass alle Einflüsse, welche auf die Nerven wirken, entweder reizen oder die Reizbarkeit selbst verändern; im ersten Falle wirken alle Reize, so verschieden sie sind, auf dieselbe Art, und die verschiedensten Ursachen haben gleiche Wirkung, weil das, worauf sie wirken, nur einerlei reizbare Kraft besitzt, und weil die

Digitized by Google

verschiedensten Dinge nur in der gleichen Eigenschaft als Reize einwirken.

I. Ueber die Wirkung der Reize auf die Nerven.

Alle Reize, sowohl die inneren organischen als die unorganischen, wie die chemischen, mechanischen, caustischen, elektrisch-galvanischen, bewirken, auf empfindliche Theile und empfindliche Nerven angewandt, Empfindungen, so lange die Nerven mit dem Rückenmarke und Gehirn in unversehrter Verbindung stehen. Alle diese verschiedenen Reize verhalten sich darin gleich; in einem gewissen Grade angewandt, bewirken sie nur Erscheinungen der Empfindung, im höhern Grade angewandt, bewirken sie Veränderungen der Empfindungskraft selbst. Alle Reize, sowohl die inneren organischen als die unorganischen, wie die chemischen, mechanischen, caustischen, elektrisch-galvanischen, bewirken, auf Muskelnerven oder Muskeln selbst applicirt, Zusammenziehung der Muskeln, in welche sich der gereizte Nerve verbreitet, und diese erfolgt, wenn der Reiz auf einen Nerven applicirt wird, der mit dem Gehirn zusammenhängt, sowohl, als wenn derselbe schon vom Gehirne oder Rückenmark getrennt ist. Die Nerven haben daher durch ihre Reizbarkeit die Eigenschaft, Zuckungen zu erregen in den Muskeln, worin sie sich verbreiten; sie thun diess, so lange jene leben und nach dem Tode ihre eigene Reizbarkeit dauert. Zu den Zusammenziehungen der Muskeln von Application der Reize auf die Nerven selbst ist es nöthig, dass das gereizte Nervenstück bis zum Muskel unversehrt ist, wenn auch die Verbindung dieses Nerven mit dem Gehirn oder Rückenmarke aufgehoben ist. Anderseits bewirken alle Reize in einem ganzen oder verstümmelten Nerven Empfindung, so lange noch das gereizte Stück des Nerven eine unversehrte Verbindung mit dem Rückenmarke oder Gehirn hat.

1. *Mechanische Reize.*

Jede Art mechanischen Reizes, Zerrung, Druck, Stechen, bewirkt in den Empfindungsnerven unter den schon erwähnten Bedingungen Empfindungen, so lange die Nervenkraft nicht durch die Heftigkeit der Einflüsse (Druck) selbst aufgehoben wird. Die Empfindung erfolgt, wenn man die Nervenenden oder die Aeste, oder den verkürzten Stamm mechanisch irritirt, so lange die Verbindung mit dem Rückenmarke und Gehirn stattfindet. In den Gefühlsnerven des Rumpfes und ihren Theilen bewirken mechanische Reize nur Empfindungen des Gefühls, nämlich Schmerz, Tastgefühl, in dem Gesichtsnerven und der Markhaut dagegen nach Magendie's Beobachtung kein Schmerzgefühl, sondern wie Jeder weiss Lichtempfindung, wie beim Druck und Schlag auf das Auge. In den Gehörnerven bewirkt der mechanische Eindruck, wie das Zittern der schallleitenden Medien und die mechanische Erschütterung des Kopfes und Ohrs beim langen Fahren Tonempfindung; dagegen scheint dieser Nerve kein Schmerzgefühl zu haben.

Digitized by Google

Eben so wenn man einen Muskelnerven mit der Nadel zerrt, sticht, quetscht, anzieht und dehnt, erfolgt jedesmal Zusammenziehung des Muskels, und zwar so heftig, als irgend ein galvanischer oder elektrischer Reiz Muskularcontraction bewirken kann. Der mit den Muskeln zusammenhängende Theil des Nerven behält diese Kraft, so sehr man ihn auch verkürzt; dagegen erfolgen niemals Zuckungen, wenn man das andere Ende der durchschnittenen Nerven, welches mit dem Rückenmarke und Gehirn zusammenhängt, mechanisch irritirt.

Die Bewegungen, welche von den mit Cerebral- und Spinalnerven versehenen Muskeln abhängen, sind auf den mechanischen Reiz dieser Muskeln oder ihrer Nerven bloss Zuckungen, die so lange dauern, als der Reiz dauert; in den Muskeln dagegen, welche vom Nervus sympathicus abhängen, wie am Magen, Darm, Uterus, Ductus choledochus, Ureter, Harnblase, sind die Bewegungen, die auf mechanischen Reiz der Muskelfasern erfolgen, keine Zuckungen, sondern anhaltend, und dauern sehr viel länger als der Reiz dauert. Das Herz reagirt auch viel länger als der Reiz dauert, und der Rythmus der Schläge verändert sich auf lange Zeit, wenn man das Herz nur vorübergehend mechanisch reizt. Es ist daher eine empirisch festgestellte Eigenschaft der dem N. sympathicus unterworfenen Muskeln, dass die Reaction viel länger als der Reiz dauert, während in den animalischen Muskeln die Reaction grade so lange als der Reiz dauert, und oft schon aufhört, wenn der Reiz noch anhält.

Wenn mechanische Reize sehr heftig wirken, so dass die zarte Substanz der Primitivfasern leidet, so wird die Fähigkeit der Nerven, Empfindungen zu erregen, dadurch aufgehoben, sobald die leidende Stelle zwischen dem Gehirn und dem Reiz ist; auch wird ein Muskelnerve unfähig durch jede Art von Reizung Bewegungen zu veranlassen, sobald der Nerve zwischen der Stelle der Reizung und dem Muskel gedrückt, gequetscht wird, und es ist eben so gut, als ob der Nerve durchschnitten würde. Die Empfindungskraft des Nerven wird daher durch jede mechanische Zerstörung des Nerven zwischen Gehirn und Reizung, die motorische durch jede mechanische Zerstörung zwischen Reizung und Muskel unterbrochen. Allein die mechanische Zerstörung durch Druck lähmt nur örtlich die Kraft der Nerven, und ein Nerve hat Empfindung noch an jeder andern Stelle zwischen der Quetschung und Gehirn, und erregt Bewegungen bei Reizung jeder andern Stelle des Nerven zwischen der Quetschung und dem Muskel. Wenn man aber einen Muskelnerven in seiner ganzen Länge ausdehnt, so verliert dieser Nerve oft seine Reizbarkeit in seiner ganzen Länge, und selbst der Muskel hat zuweilen seine Contractionskraft auf jede Art der Reize verloren.

2. *Temperatur.*

Die Wärme und die Kälte erregen auch Empfindungen und Muscularcontractionen.

Wenn man einen Muskelnerven oder den Muskel selbst brennt, so erfolgen Contractionen desselben; diese sind ausserordentlich heftig, wenn man den Nerven durch die Flamme eines

Digitized by Google

Lichtes brennt, diess habe ich sowohl bei Fröschen als Kaninchen gesehen; kleine Wärmegrade, wie z. B. ein erwärmtes Stück Eisen, wirken auf die Muskelnerven nicht so heftig, dass Muscularcontraction erfolgt.

Dass die Kälte eben so wirkt, zeigt bereits die ältere Beobachtung, dass sogleich heftige Contractionen in einem Muskel erfolgen, wenn man kaltes Wasser in die Arterie des Muskels einspritzt; auch kaltes Wasser auf die Oberfläche eines Muskels gegossen, erregt Contraction. Von dieser Wirkung hat man auch bereits Anwendung in der practischen Medizin gemacht, indem man bei Atonie des Uterus und Gebärmutterblutflüssen nach der Geburt kaltes Wasser in die Gefässe der noch anhängenden Placenta einspritzt. So erfolgen auch consensuelle Zusammenziehungen der Iris, wenn man kaltes Wasser in die Nase schlürft. Grosse Kälte- und Wärmegrade zerstören übrigens, mögen sie schnell oder allmählig wirken, die Nervenkraft, und es erfolgt Tod oder Scheintod. Sehr allmählige Zunahme der Wärme und Kälte kann die Reizbarkeit latent machen, so dass Winterschlaf und Sommerschlaf bei gewissen Thieren erfolgt. Siehe oben p. 90.

Die rein örtliche Zerstörung der Nervenkraft durch Kälte und Wärme wirkt, wie die rein örtliche Zerstörung derselben, durch mechanische Ursachen. Ein überaus heftiger Grad von künstlicher Kälte zerstört, eben so wie die Hitze, die Empfindungs- und Bewegungskraft in den entsprechenden Theilen. Allein alle andere Stellen der Nerven behalten ihre Reizbarkeit, und der am Ende verbrannte Muskelnerve bewirkt Zuckungen, wenn er zwischen der verbrannten Stelle und dem Muskel gereizt wird, wie ich mich an Fröschen und Kaninchen überzeugte.

3. *Chemische Reize.*

Alle chemischen Reize wirken auf die Empfindungskraft der Nerven, so lange diese noch mit dem Gehirn und Rückenmarke unversehrt in Verbindung stehen. Die Alkalien bewirken auch Zuckungen, wenn sie auf die Nerven applicirt werden; viele andere Reagentien, besonders die Säuren und die Metallsalze, bewirken dagegen, auf die Nerven applicirt, keine Spur einer Zukkung, sondern nur dann, wenn sie auf die Muskeln selbst angewandt wdrden, so z. B. die mineralischen Säuren, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Sublimat, salzsaures Antimonium, auch Alkohol. Alle diese Mittel zerstören sogleich im concentrirten Zustande die Kräfte der Nerven, und machen sie unfahig von anderen Reizen irritirt zu werden, hinter der Stelle, wo die Berührung mit den Reagentien stattfindet; dagegen behalten die Nerven ihre motorische Kraft zwischen der chemischen Zerstörung und dem Muskel. Alle die genannten Mittel zerstören auch das Muskelfleisch, bewirken aber im Moment des Contactes Zuckungen, die beim Alkohol am schwächsten sind, die ich aber doch einigemal bei Kaninchen beobachtet habe. Dagegen bewirken Alkalien oft die heftigsten Zuckungen, sobald sie auf die Nerven applicirt werden, oft viel heftigere als der

Digitized by Google

Galvanismus eines einfachen Plattenpaars. Bei der Application von Kali causticum auf einen Nerven sah ich wie v. Humboldt die heftigsten, anhaltenden Zuckungen in allen Muskeln entstehen, die von diesem Nerven Aeste erhalten. A. v. Humboldt hat das Zittern 40—50 Secunden beobachtet. Derselbe beobachtete auch, dass die Zuckungen erfolgen, wenn vorher um den Nerven eine oder mehrere Ligaturen gelegt worden. A. von Humboldt *Versuche über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. Posen,* 1797. *II. Bd. p.* 363. Hier geschah die Fortleitung des Alkali's durch die Ligaturen. Durch die Säuren sah Humboldt keine Zuckungen entstehen; die einzigen Substanzen, welche auf die Nerven applicirt nach Humboldt Zuckungen erregen, sind Kali, Natron, Ammonium, (Opium?), salzsaure Schwererde, oxydirter Arsenik, Brechweinstein, (Alkohol, oxygenirte Salzsäure?) Von beiden letzteren habe ich keine Zuckungen gesehen, wenn sie auf den Nieren allein applicirt wurden, auch nicht von Opium, wenn es rein, als wässrige Auflösung, applicirt wird. A. v. Humboldt hat die Tinctur angewandt, bei welcher vielleicht der Weingeist wirkte, obgleich auch in einem Versuche von mir Opiumtinctur unwirksam war. Auch durch das Blut bewirken reizende Mittel Nervenreizung. Man weiss, dass Brechmittel, ins Blut eingespritzt, eben so wirken, wie wenn sie in den Darmkanal gelangen, so erregen Brechweinstein und salzsaure Schwererde, bloss in Wunden gestrichen, Erbrechen. Scheel *nordisches Archiv* 2. St. 1. *p.* 137. Magendie *sur le vomissement. p.* 16. 30. Brodie *philos. transact.* 1812.

4. *Elektrische Reize* (*nach* J. Mueller *in dem encyclop. Wörterb. der medic. Wissenschaften*).

Die Elektricität bewirkt in den Nerven dieselben Reactionen, wie die mechanischen und chemischen Reize. Durch mechanische Zerrung der Nerven erhält man die Empfindung eines Schlages in dem Nerven, wie man beim Anstossen an den N. ulnaris erfährt; dasselbe fühlt man bei einer elektrischen Entladung durch einen Nerven. Man darf diese Empfindung nur als Gefühl betrachten, und nicht die Ursache, die Elektricität, mit der Reaction des Nerven verwechseln. Die Empfindung des Schlags ist nicht die Action der Elektricität, sondern die Action des Nerven, welcher bei jeder heftigen Veränderung in dem Zustand seiner kleinsten Theile diese Empfindung hat, mag diese nur durch thierische Reize oder durch mechanische Einflüsse, oder durch Elektricität erzeugt seyn. Die Entdeckung der galvanischen Elektricität im Jahre 1790 hat Gelegenheit gegeben, durch Application des elektrischen Reizes auf einzelne Nerven die Reizbarkeit derselben mehr zu prüfen, obgleich man in diesem wichtigen Agens nicht ein den Nerven ähnlich wirkendes Fluidum, sondern nur einen neuen Reiz zu der Zahl der bekannten Reize der Nerven kennen gelernt hat. Heterogene Metalle und viele andere heterogene, selbst thierische Substanzen gerathen bei der Berührung in elektrische Spannung, die, wenn eine Leitung durch einen leitungsfähigen Körper zwischen den beiden Elektromotoren stattfindet, d. h. wenn die Kette geschlossen wird, sich ausgleicht und die

Digitized by Google

gewöhnlichen, der Elektricität eigenen Erscheinungen bewirkt, wenn sich ein Reagens für die Elektricität in der kettenartigen Verbindung findet. Wird ein Froschschenkel oder irgend ein anderer muskulöser Theil eines Frosches oder frisch getödteten anderen Thieres von dem Rumpfe abgelöst, die Muskeln von den häutigen Theilen befreit und der Nerve frei herauspräparirt, so dass er durch seine Aeste mit den Muskeln noch organisch zusammenhängt, der so präparirte Schenkel auf eine isolirende Glasplatte gelegt und zwei heterogene Metallplatten, z. B. Zink und Kupfer, unter sich und zugleich mit dem Muskel und Nerven in Berührung gebracht, so erfolgt im Moment der Schliessung, oft auch bei der Trennung dieser Kette eine Zuckung des Muskels. Diese erfolgt auch, wenn beide Metalle unter sich in Contact stehend den Nerven zugleich berühren, oder wenn beide den Muskel allein berühren. Auf diese Art angestellt, gelingt der galvanische Versuch jedesmal. Viele andere Modificationen desselben unter einfacheren Bedingungen, deren Kenntniss wir den grossen Verdiensten Aldini's, Pfaff's, Ritter's, vor Allen Alex. von Humboldt's verdanken, gelingen aber nur bei grosser Reizbarkeit der Frösche vor der Begattungszeit, in der kältern Jahreszeit nach dem Winterschlaf, nicht im Sommer, wohl aber nach meinen Beobachtungen wieder im Herbst, wenn die Witterung wieder kälter zu werden beginnt. Diese einfacheren Versuche sind gerade für die Theorie der Erscheinungen die wichtigsten. Es sind folgende:

1) *Versuche ohne Ketten.* Bei einer grossen Reizbarkeit der Frösche ist es nach Alex. von Humboldt's Entdeckung hinreichend, dass zwei heterogene oder selbst zwei homogene Metallstücke sich berühren, von denen eines allein den Nerven berührt, ein Fall, wo gar keine Kette gebildet wird; ja es erfolgen in seltenen Fällen bei einer sehr grossen Reizbarkeit des Froschschenkels selbst Zuckungen, wenn bloss der Nerve mit einem einzigen homogenen Metalle berührt wird — ein Fall, der zwar ungemein selten sich ereignet, den ich aber selbst schon beobachtet habe. Pfaff (Gehler's *physikal. Wörterbuch. IV.* 2. *p.* 709.) sah bei sehr reizbaren Individuen Zuckungen, wenn er bloss mit dem abgeschnittenen Ende des Nerven die Oberfläche von Quecksilber berührte. Ich sah das Phänomen mehrmals, wenn ich mit der Spitze einer Scheere, die ich in der Hand hielt, oder mit einer Zinkplatte, die also an beiden Enden verschieden erwärmt waren, den Nerven berührte. Man kann diesen Erfolg theils durch die Annahme eines geringen chemischen Unterschiedes in dem scheinbar homogenen Metalle, theils durch die Annahme eines Wärmeunterschiedes in demselben auf den Erfolg heterogener Metalle reduciren, da es nach den neueren Entdeckungen bekannt ist, dass selbst ein homogenes Metall durch die geringsten chemischen Unterschiede, oder durch verschiedene Erwärmung an seinen Enden in elektrische Spannung geräth. Lässt man den Nerven auf ein Metall herabfallen, so erleichtert diess die elektrische Erregung, vielleicht mehr durch die Schnelligkeit der Mittheilung als durch die Erschütterung. Die letztere ist

Digitized by Google

ohnehin nicht die Ursache der Erscheinung, da das Herabfallen des Nerven auf Glas und Stein ohne Erfolg ist, wie die Versuche von Humboldt, Ritter und Pfaff lehren.

2) *Versuche mit kettenartiger Verbindung.* Auch die Versuche mit der Kette sind bei sehr grosser Reizbarkeit bedeutender Vereinfachung fähig, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass diese einfachen Versuche nur in kälterer Jahreszeit, Winter, Frühling und Herbst, gelingen. So erfolgen in seltenen Fällen, wie von Humboldt entdeckt hat, Zuckungen, wenn die Glieder der Kette bloss thierische Theile sind, oder wenn sie thierische Theile und ein einfaches Metall sind, indem die heterogenen Metalle durch heterogene thierische Theile ersetzt werden.

a. Indem ein einziges Metall und Nerve und Muskel des Froschschenkels die Kette bilden. Dieser Fall ist mir im Frühling vor der Begattungszeit der Frösche und im Spätherbst sehr oft und leicht gelungen. Legte ich den Nerven des Schenkels auf eine Zinkplatte und verband Nerven und Schenkelmuskeln durch eben diese Zinkplatte, indem ich die Zinkplatte den Schenkelmuskeln näherte, so entstand oft eine Zuckung. Noch leichter gelang dieser Versuch, wenn die Zinkplatte, worauf der Nerve des Schenkels lag und der Muskel durch ein Stück von einem Frosche verbunden wurden; oder man nimmt in eine Hand eine Zinkplatte, berührt mit dieser den Nerven und, indem man mit seinem eigenen Körper die Kette schliesst, mit der andern Hand den Froschschenkel.

b. Indem der Schenkelnerve und seine Schenkelmuskeln mittelst feuchter thierischer Theile verbunden werden. Bei sehr reizbaren Froschschenkeln kann man Zuckungen erregen, wenn man zwischen dem herauspräparirten Nerven und seinem Muskel ein getrenntes Stück Muskelfleisch, das an einem isolirenden Griff von Siegellack befestigt ist, einschiebt und beide berührt, wie Alex. von Humboldt entdeckte und ich mehrmals wieder sah. Complicirter ist der von mir angestellte Versuch, dass man zwischen dem Nerven des präparirten Froschschenkels und dem Unterschenkel die Kette schliesst mittelst beider Hände durch seinen eigenen Körper, oder durch einen oder zwei lebende Frösche, oder durch einen oder zwei todte Frösche, oder durch Stücke eines Frosches. Stücke von einem todten faulenden Frosche sind selbst zur Schliessung der Kette bei hinreichender Reizbarkeit hinreichend; man erlangt denselben Erfolg, wenn man, wie ich that, den Schenkelnerven, der am Unterschenkel heraushängt, in ein Schälchen mit Blut oder Wasser (gleichviel) legt, und das Wasser und die Oberschenkelmuskeln mit einem Stück frischen oder faulen Muskelfleisches verbindet.

c. Auch wenn nicht die Muskeln des Froschschenkels, sondern nur ihr Nerve sich in der Kette befindet, kann durch einen blossen thierischen Bogen Zuckung bewirkt werden, wie von Humboldt zeigte. Er berührte den Cruralnerven (N. ischiadicus) mit seiner einen Hand und mit einem Stückchen Muskelfleisch, welches er in der andern Hand hielt, denselben Nerven, worauf

Digitized by Google

Zuckung entstand. Wurde statt des Muskelfleisches ein Stück Elfenbein genommen, so blieben die Zuckungen aus.

d. In den seltensten Fällen erfolgen selbst kleine Zuckungen, wenn der Nerve gegen den organisch mit ihm verbundenen Muskel umgebogen und der letzte mit dem Nerven berührt wird.

Die ersten Phänomene dieser Art hat von Humboldt gesehen. A. von Humboldt zog einem Frosch die Haut ab und präparirte ihn so, dass der Rumpf mit den Schenkeln nur durch die entblössten ischiadischen Nerven zusammenhing. Es entstanden heftige Zuckungen, als er das Muskelfleisch der Lende leise gegen den ischiadischen Nerven zurückbeugte. (*Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser. I.* 32.) Um diesen Versuch richtig zu verstehen, muss man wissen, dass von Humboldt unter Froschlenden immer das Schenkelfleisch, unter Ischiadnerv die Stämme der Nerven für die unteren Extremitäten über dem Becken, unter Cruralnerven dagegen den Hauptnerven für die untern Extremitäten (N. ischiadicus) am Schenkel selbst versteht. (Am angeführten Ort p. 35. Note.) A. von Humboldt's Versuch bestand also darin, dass er zwischen dem Becken und dem Ende des Rückenmarks alle Theile ausser den Nerven wegnahm, so dass der Rumpf mit den untern Extremitäten nur durch die Stämme der Nerven für dieselben zusammenhing, und dass von Humboldt nun das Muskelfleisch des Schenkels gegen jene Stämme der Nerven nach vorwärts umbeugte. Schon Volta hatte bei einem ähnlichen Versuche von Galvani eingeworfen, dass die erfolgende Zuckung bloss von der Zerrung des Nerven abhänge, also nicht unter die galvanischen Phänomene gehöre. Nach meiner Beobachtung ist diess auch in diesem Humboldt'schen Versuche der Fall: die Zuckung erfolgte öfters schon lange, ehe der entblösste Schenkel die Stämme der Spinalnerven berührte. Diese Zerrung des Nerven ist auch nicht wohl zu vermeiden, da der N. ischiadicus sich um den hintern Theil des untern Beckenendes herumschlägt, um zum Schenkel zu gelangen. Der Nerve wird, beim Umbeugen des Schenkels nach vorn gegen den Rumpf, an dieser Stelle gezerrt oder gedehnt; bei der Zerrung oder Dehnung eines Nerven erfolgen aber immer Zuckungen. Derselbe Einwurf trifft den von Galvani angestellten Versuch, wo, wenn ein Frosch abgezogen, ausgeweidet und so präparirt wurde, dass bei fast ganz weggeschnittenem untern Theile des Rückgrats (Steissbein) die Schenkel nur durch die genannten Nervenstämme mit dem Rumpfe zusammenhingen, heftige Zuckungen am ganzen Frosch entstanden, sobald die Wadenmuskeln des Frosches gegen die Schultern zurückgebogen wurden. In diesem Falle wurde das ganze Rückenmark gezerrt; indessen lässt sich der Versuch doch auch so anstellen, dass diese Einwürfe wegfallen. Nie wollte es zwar von Humboldt gelingen, Zuckungen zu erhalten, wenn er nach Abtrennung des Nerven vom Rumpfe den Schenkel gegen den Nerven und diesen gegen jenen bog; auch sah er keine Zuckungen, wenn er ohne die Muskeln zu berühren, mit einem abgeschnittenen Nervenstück einen Bogen bildend, den Nerven des Muskels an zwei Punkten berührte. Dagegen ist dieser vor-

Digitized by Google

letzte Versuch Pfaff sehr häufig gelungen, besonders wenn der Schenkelnerve in einer etwas grössern Strecke mit der Haut des Schenkels, nicht aber, wenn er mit den Muskeln unmittelbar in Berührung gebracht wurde. Gerade auf diese Art ist der Versuch auch mir gelungen. Ich bewirkte (im Frühling, vor der Begattung der Frösche) an einem blossen Unterschenkel mit heraushängendem Stamm der Schenkelnerven Zuckungen, indem ich den Nerven mit einem isolirenden Stäbchen dem Unterschenkel näherte und mit dem Nerven die nasse Oberhaut des Unterschenkels berührte; auch erfolgte eine Zuckung, als ich den Nerven vom Unterschenkel wieder abzog (*Physiologie I. p.* 68.). In diesem Falle bestand die Kette aus heterogenen Substanzen, nämlich aus Nerve, Muskel und Haut. Zwei von diesen kann man als Elektromotoren, den dritten als Leiter betrachten. Es entsteht ein elektrischer Strom und die Nervenkraft des Nerven ist das Reagens oder das Elektrometer, indem sie in Folge des elektrischen Stromes gereizt Zuckung erregt. Wird dagegen der Nerve des Schenkels einfach gegen den von der Haut entblössten Muskel umgebogen, so sind nur zwei Substanzen vorhanden, wovon die eine die andere an zwei Stellen berührt, aber die kettenartige Verbindung zwischen beiden Substanzen durch einen dritten Körper fehlt. Als allgemeine Bedingung zur Entstehung von Zuckungen aus galvanischen Ursachen kann man folgende ansehen: Zur Erregung von Zuckungen bei der Kette sind drei Substanzen nöthig, zwei Elektromotoren und ein Leiter, der sie kettenartig verbindet. Diese Elektromotoren können auch belebte und unbelebte thierische heterogene Theile seyn, Nerve und Muskel, Muskel und Haut u. s. w. Leiter kann auch ein dritter thierischer Theil seyn, der mit einem der thierischen Elektromotoren homogen seyn kann; ein Stück eines Nerven und die organisch verbundenen Muskeln und Nerven bilden schon eine Kette, aber die organisch verbundenen Muskeln und Nerven allein sind ohne einen dritten ihnen homogenen oder heterogenen Körper nicht zur Kette hinreichend. Ein Nerve gegen den Muskel umgebogen, giebt keine Zuckung, wohl aber, wenn er über die noch vorhandene äussere Haut umgebogen wird; steht aber der dritte Körper mit dem Muskel und Nerven, wenn gleich einem von beiden homogen, nicht in organischer Verbindung, ist er vielmehr ein getrenntes Stück, so kann er als Glied der Kette wirken, wie z. B. Zuckungen entstehen, wenn man durch den Bogen von einem abgetrennten Nervenstücke, oder durch einen Bogen von einem Stück Muskelfleisch, die organisch verbundenen Muskel und Nerven zugleich berührt.

Sind die Elektromotoren blosse Metalle, so sind die organisch verbundenen Nerve und Muskel Leiter und Elektrometer zugleich; Leiter, weil Nerve und Muskel nass sind, Elektrometer, weil die Nervenkraft in Folge des Reizes des elektrischen Fluidums Zuckung erregt. Sie sind hier auf gleiche Art das Elektrometer, wie unter ähnlichen Umständen ein nicht thierisches Elektrometer, z. B. ein magnetischer Multiplikator. Es können aber die Elektromotoren auch thierische Theile selbst seyn. So können

Digitized by Google

die organisch verbundenen Nerve und Muskel als heterogene Substanzen so gut wie zwei heterogene todte thierische Theile Elektromotoren seyn; insofern sie aber lebend sind, sind sie auch zugleich das Elektrometer durch die Reizung der Nervenkraft in Folge der elektromotorischen Erregung.

Bei den Zuckungen, die ohne Kette durch blosse Application von einem zweier heterogener sich berührender Metalle, oder durch Application eines einzigen Metalles auf den Nerven entstehen, muss man den Nerven als blosses Elektrometer betrachten, das die in den heterogenen Metallen oder selbst in einem homogenen Metalle (durch Thermoelektricität) entstandene elektrische Spannung anzeigt.

Nachdem nun die allgemeinen und einfachsten Bedingungen, unter welchen durch Galvanismus Muskelcontractionen entstehen, auseinandergesetzt worden, muss jetzt von dem Verhalten der thierischen Theile bei der Schliessung, Oeffnung und während des Geschlossenseyns der Kette gehandelt werden. Wird das positive Metall als Nervenarmatur, das negative als Muskelarmatur benutzt, so erfolgen die Zuckungen meist im Augenblicke der Schliessung der Kette, aber keine oder wenigstens weit schwächere bei der Trennung derselben. So verhält es sich auch, wenn das positive Metall mit dem Centralende des Nerven, das negative Metall mit einem den Muskeln nähern Theile des Nerven verbunden wird. Indessen giebt es mannichfache Zustände der Erregung, in welchen diese Erscheinungen Abänderungen erleiden; im ersten, wenn die thierischen Theile noch den höchsten Grad der Erregbarkeit besitzen, erfolgt die Schliessungszuckung bei der negativen Bewaffnung des Nerven, und nur diese allein, die Trennungszuckung dagegen bei der positiven Bewaffnung des Nerven; im zweiten Zustande der Erregbarkeit, der allmählig aus dem ersten sich entwickelt und im Verlust der Erregbarkeit zuletzt endigt, erregt die negative Bewaffnung des Nerven oder des Centralendes des Nerven die Trennungszuckung, die positive Bewaffnung die Schliessungszuckung, die Mittelstufe sey die, wo Trennungs- und Schliessungszuckung bei jeder Bewaffnung des Nerven gleich ist. Nach Pfaff's Untersuchungen hängt das Verhalten indess sehr von den vorher schon angestellten Versuchen ab; bleibt z. B. die Kette bei negativer Bewaffnung des Nerven eine Zeitlang geschlossen, so kehrt sich das Verhältniss nicht um. Gehler's *Physik. Wörterb. IV. P. II. p.* 721. Ueber diesen Gegenstand haben in neuerer Zeit wieder Marianini und Nobili Untersuchungen angestellt. Der von Ritter angenommene Gegensatz der Flexoren und Extensoren in Hinsicht der Empfänglichkeit für den galvanischen Reiz hat sich nicht bestätigt.

In der geschlossenen Kette halten sich die Muskeln ruhig, und es wird nur ihre Erregbarkeit verändert. Nach Pfaff's Erfahrung wirken die geschlossenen Ketten nach Verschiedenheit der Vertheilung der Metalle an die Muskeln und Nerven entweder deprimirend oder exaltirend. Befindet sich ein Froschpräparat in einer Kette, worin das positive Metall (Zink) die Nerven-

Digitized by Google

armatur bildet, so vermindert sich die Reizbarkeit schneller als an einem andern Froschschenkel ausser der Kette, und nach Pfaff kann man meist selbst die kräftigste Reizbarkeit durch Verweilen des Froschschenkels binnen einer Viertelstunde in einer solchen Kette so weit vermindern, dass er auf die stärksten Reize nicht mehr reagirt. Ganz anders soll die Kette wirken, wenn das negative Metall, Kupfer, an dem Nerven applicirt war; nach einiger Zeit soll nun der höchste Grad der Reizbarkeit eingetreten seyn, so dass im Augenblick der Oeffnung die Muskeln zuweilen in den stärksten Tetanus gerathen.

Dass die Nerven bei der Erregung durch galvanisches Fluidum keine blossen Leiter der Elektricität sind, geht daraus hervor, dass, wenn man die beiden Armaturen an dem Nerven selbst applicirt, und also einen queren galvanischen Strom durch die Dicke des Nerven verursacht, der Nerve zwar die Zuckung bewirkt, dass aber ein gequetschter oder unterbundener Nerve, über der verletzten Stelle armirt, nicht mehr durch die verletzte Stelle hindurch wirkt. Man sieht also, dass ein gequetschter oder durch einen nassen Faden unterbundener Nerve kein Leiter des wirksamen Princips der Nerven mehr ist. Dennoch ist er aber noch ein eben so guter Elektricitätsleiter, wie vorher; denn wird der Nerve über und unter der Ligatur armirt, so geht der elektrische Strom durch die Unterbindungsstelle durch, und das Nervenprincip in dem zwischen Ligatur und Muskel befindlichen Nervenstück bewirkt nun die Zuckung, weil es von dem elektrischen Strome angeregt wird, oder sich in der Kette befindet. Ein merkwürdiger Umstand ist der von Humboldt beobachtete, dass, wenn man durch Armirung eines Muskels und seines vorher unterbundenen Nervens über der Unterbindungsstelle Zuckungen erregen will, von der Unterbindungsstelle des Nerven bis zu seinem Eintritt in den Muskel durchaus noch ein Stück freiliegenden Nervens seyn muss. Denn unterbindet man den Nerven gleich bei seinem Eintritt in den Muskel, und armirt den Muskel und Nerven über der Unterbindung, so erfolgt keine Zuckung. Diese letztere erfolgt aber, wenn man den Nerven jetzt eine Strecke aus dem Muskel herauspräparirt; auch hört die Zuckung auf, wenn zwischen Unterbindung und Muskel zwar ein Stück Nerve frei liegt, dieses Stück aber mit Muskelfleisch, nassem Schwamm oder Metall umgeben wird. Es scheint also, dass in diesem Falle der Nerve zwischen der Unterbindung und dem Muskel isolirt seyn muss.

Die Zuckungen sind bei allen Froschschenkelversuchen um so stärker, je länger das zu einem Muskel hingehende Nervenstück ist. Pfaff. Die Wirkungen erfolgen ferner immer in der Richtung der Verzweigungen der Nerven, und man kann durch einen Nerven, welcher allein armirt wird, mit der einfachen Kette keine Zuckungen in Muskeln erregen, welche höher vom Stamme des Nerven ab Aeste erhalten. Dagegen zucken bei der Armirung eines Nervenstammes immer alle Muskeln, welche von dem Stamme aus nach abwärts Zweige erhalten. Bei der Armirung eines Stammes armirt man nothwendig alle schon in ihm vorge-

Digitized by Google

bildeten Fasern, die in die Zweige übergehen. Da die in dem Stamm enthaltenen Primitivfasern seiner Zweige in dem Stamme nicht anastomosiren, so kann die Reizung eines Zweiges auch nicht auf die höher abgehenden Muskelzweige zurückwirken. Vielleicht hängt indess die Wirkung der Nerven in der Richtung ihrer Verzweigung auch davon ab, dass die Muskelnerven das Nervenprincip oder die Bewegung desselben bloss in der centrifugalen Richtung fortpflanzen. Die Stärke der Zuckung eines Muskels hängt übrigens immer davon ab, wie viele Nervenfasern desselben in der Kette liegen; daher ist die Zuckung am geringsten, wenn bloss der Muskel in der Kette liegt, und es zuckt dann auch nur derjenige Theil des Muskels, dessen Nervenzweige dem Strome ausgesetzt sind.

Jede Veränderung in der Statik des elektrischen Fluidums scheint übrigens Ursache zur Erregung des Princips der Nerven zu werden. Denn nach Marianini lässt sich nicht allein durch Oeffnung und Schliessung der Kette Zuckung erregen, sondern auch durch partielle Ablenkung des Stromes aus dem Froschschenkel, und nach Erman entstehen bei geschlossener Kette neue Contractionen, wenn der Nerve so gegen sich zurückgebogen wird, dass er sich in neuen Punkten seiner continuirlichen Strecke berührt.

Bei dem Absterben der Erregbarkeit in den vom Ganzen getrennten Theilen haben Ritter u. A. beobachtet, dass dieses Absterben nicht an allen Stellen der Nerven zugleich, sondern vom Hirnende nach dem peripherischen Ende erfolgt.

Einige von mir im Jahre 1831 gemachte Beobachtungen haben den galvanischen Versuchen an Fröschen ein neues Feld eröffnet (Froriep's *Not.* 646. 647.). Es hat sich nämlich hierdurch gezeigt, dass es gewisse zu Muskeln hingehende Nerven giebt, durch welche man vermittelst Armatur der Nerven selbst keine Zuckungen in den Muskeln erregen kann. Hierher gehören die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven, welche für einen mässigen galvanischen Reiz ganz unempfindlich sind, während die vorderen Wurzeln derselben für den galvanischen Reiz eine ausserordentliche Empfindlichkeit besitzen, und bei unmittelbarer Armatur derselben die heftigsten Zuckungen der Muskeln, zu welchen diese Nerven hingehen, bewirken. Bei diesen Versuchen öffnet man das Rückgrat der Frösche in seiner unteren Hälfte, legt das Rückenmark bloss, hebt eine der hinteren Wurzeln der Nerven für die unteren Extremitäten mit einer Nadel sanft auf, und schneidet sie mit einer feinen Scheere dicht am Rückenmark ab. Man legt dann die abgetrennte Wurzel auf ein ganz kleines Glasplättchen zur Isolation, und armirt das Ende dieser Wurzel mit einer Zink- und Kupferplatte, die man kettenartig verbindet; es entstehen dann niemals Zuckungen, wohl aber, wenn man denselben Versuch mit den vorderen Wurzeln macht. Man kann sogar eine kleine galvanische Säule auf das Ende der hintern Wurzel wirken lassen, ohne dass Zuckungen entstehen. Natürlicher Weise darf diese nicht zu stark seyn, wie in den ziemlich ungeschickt angestellten Versuchen von Seubert, sonst springt

Digitized by Google

das galvanische Fluidum auf die vordere Wurzel, als einen feuchten Leiter, über, mit welchem die hintere verbunden ist, und es können Zuckungen erfolgen. Ich habe auch gezeigt, dass unter den 3 Zungennerven der Nervus lingualis bei der blossen Armatur des Nerven keine Zuckungen der Zunge bewirkt, während dieser Versuch, an dem N. hypoglossus angestellt, jedesmal Zuckungen bewirkt. Diese letzteren Versuche sind an Säugethieren angestellt. Aus anderen Versuchen weiss man, dass diejenigen Nerven, die bei der blossen Armatur derselben keine Zuckungen der Muskeln verursachen, Empfindungsnerven sind. Sonst können diese Nerven natürlich auch als Leiter des galvanischen Fluidums wirken, wie jeder andere feuchte thierische Theil. So zum Beispiel erfolgen Zuckungen, wenn man einerseits den N. lingualis und andrerseits die Zunge armirt, oder wenn man die Armatur auf die hintere Wurzel eines Rückenmarksnerven und auf die Muskeln anwendet, wobei der Nerve bloss Conductor ist, und nicht als lebendiger Theil wirkt. Es geht aus diesen Versuchen das merkwürdige Resultat hervor, dass gewisse, mit Muskelnerven zusammenhängende Nerven bei der galvanischen Erregung doch nicht durch das Nervenprincip auf die Muskeln wirken, was man auf zweierlei Art erklären kann, weil entweder bloss die motorischen Nerven die lebendige Fähigkeit haben, die Muskeln zu erregen, oder weil vielleicht die motorischen Nerven nur centrifugale Wirkungen des Nervenprincips nach den Muskeln, die sensibeln Nerven nur centripetale Wirkungen gegen Gehirn und Rückenmark zulassen.

Was die Wirkung des Galvanismus auf die Sinnesorgane betrifft, so hat sich gezeigt, dass das elektrische Fluidum in allen Sinnesorganen verschiedene Empfindungen hervorruft, und zwar in jedem Sinnesorgane die diesem eigenthümliche specifische Empfindung. Bekannt ist der eigenthümliche Geschmack bei der Bewaffnung der Zunge. So entsteht, wenn Zink an die Spitze der Zunge, Silber an den hintern Theil derselben applicirt wird, ein säuerlicher Geschmack, welcher bei der Umkehrung der Metalle scharf oder laugenhaft erscheint. Diese Erscheinung lässt sich selbst bei der Anwendung nur eines Metalles und eines feuchten Erregers bewirken, wie in folgendem von Volta angegebenen Versuche.

Man fülle einen zinnernen Becher mit Seifenwasser, Kalkmilch oder besser mit mässig starker Lauge, fasse den Becher mit einer oder beiden Händen, die man mit blossem Wasser feucht gemacht hat, und bringe die Spitze der Zunge mit der Flüssigkeit in Berührung, so entsteht im Augenblicke des Contacts die Empfindung von einem sauern Geschmack (Gehler's *Physik. Wörterb. IV.* 2. *p.* 736.).

Pfaff bemerkt hierbei, dass dieser Versuch zu beweisen scheine, dass nicht die durch Zersetzung des Kochsalzes des Speichels an dem positiven Metalle entbundene Säure, und das an dem negativen Pole freigewordene Alkali den Geschmack bei den galvanischen Versuchen verursache. In der That hätte er in gegenwärtigem Versuche bei Berührung der Zunge durch eine lau-

Digitized by Google

genhafte Flüssigkeit unmöglich sauer seyn können. Ueberhaupt wird dieser Geschmack vom Galvanismus wohl richtiger, wie aller Geschmack, von der specifischen Reaction der Geschmacksnerven abgeleitet, so dass ein Geschmack nur ein subjectiver Zustand des Geschmacksnerven, nicht aber etwas Aeusseres ist.

Eigenthümliche Gerüche von Anwendung des Galvanismus auf das Geruchsorgan sind bis jetzt noch wenig bemerkt worden; doch hat Ritter Gerüche beobachtet; auch weiss man, dass die Reibungselektricität den Geruch von Phosphor hervorruft. Ritter *Beiträge zur nähern Kenntniss des Galvanismus. p.* 160.

In dem Auge erregt dagegen der Galvanismus die specifische Empfindung des Sehnerven, die Lichtempfindung, wenn man nämlich einen leichten galvanischen Strom durch das Auge leitet, vermittelst Application der beiden Metalle auf feuchte Theile, welche das Auge begrenzen. Wie die Empfindungen von Farben im Auge hervorgerufen werden, haben Ritter und Purkinje gezeigt. Es sind heutzutage die Zeiten nicht mehr, in welchen man diese Lichterscheinung im Auge als eine Entwickelung von Lichtmaterie ansah. In diesem Fall müsste das hierbei entwickelte Licht die Fähigkeit zu beleuchten haben, und man müsste im Dunkeln dabei sehen können; diess ist aber nicht der Fall. Die Lichtempfindung ist hier vielmehr die gewöhnliche Reaction des Sehnervens, welcher gegen alle Reize, mechanische sowohl als elektrische, Licht als einen Zustand seiner selbst empfindet, der bloss subjectiv und die Qualität der Empfindung ist, gleichwie Wollust und Schmerz Qualitäten oder Zustände anderer Nerven, nämlich der Gefühlsnerven sind, während der Sehnerve bloss der Empfindung von Licht und Farben, nach Magendie aber nicht der Empfindung des Schmerzes fähig ist. Diese Ansicht von der Natur jener Lichterscheinungen, welche nach den einflussreichen Versuchen von Purkinje über das subjective Sehen, und nach unseren eigenen zahlreichen Erfahrungen in diesem Felde unausweichlich ist, sehen wir auch von Physikern des ersten Ranges vorgetragen. So erklärt nämlich Pfaff die erwähnte Erscheinung, indem: „überhaupt Reize von der verschiedensten Art, namentlich mancherlei mechanische, die auf das Auge einwirken, in dem Sehnerven die specifische Empfindung, durch welche er reagirt, Lichterscheinungen unter mancherlei Gestalten, als Blitze u. s. w., hervorbringen.“ Gleichwie die Elektricität im Auge einen Zustand des Sehnerven als Lichtempfindung bewirkt, so bewirkt sie in dem Gehörnerven einen Zustand als Tonempfindung. Volta empfand, als sich seine Ohren in der Kette einer Säule von 40 Plattenpaaren befanden, im Augenblick der Schliessung eine Erschütterung im Kopfe, und einige Augenblicke nachher ein Zischen und stossweises Geräusch, wie wenn eine zähe Materie kochte, welches die ganze Zeit der Schliessung der Kette fortdauerte. *Philos. transact.* 1800. *p.* 427. Ritter empfand bei der Schliessung der Kette, wenn beide Ohren sich darin befanden, einen Ton wie G der eingestrichenen Octave oder $\bar{g}$; befand sich nur ein Ohr in der Kette, so war vom positiven Pol aus der Ton tiefer als $\bar{g}$, am negativen aber hö-

Digitized by Google

her. Ueber die Wirkungen der Elektricität auf die Absonderungen siehe oben p. 466.

II. Ueber die Veränderung der Reizbarkeit durch die Reize.

Bisher haben wir bloss die Erscheinungen der Kräfte untersucht, welche durch die Anwendung der Reize entstehen. Jetzt werden wir die Veränderungen der Kräfte selbst betrachten. Alle reizenden Einflüsse, welche in den Nerven durch Veränderung der Materie Erscheinungen ihrer Kräfte hervorrufen, können auch die Reizbarkeit selbst verändern. Bei jeder Reaction findet ein Aufwand der vorhandenen Kräfte statt, insofern sie durch Veränderung der Materie bewirkt wird, je länger die Reizung dauert, um so grösser ist diese Veränderung. In dem gesunden Leben ist die Erregung nie so gross, dass durch gewaltsame Veränderung der Materie die Fähigkeit zu Lebensäusserungen auf eine empfindliche Art verletzt wird. Die beständige Wiedererzeugung, die Ausgleichung der materiellen Veränderungen durch die während der Ernährung fortgesetzte Wiedererzeugung, gleicht die täglichen Veränderungen aus. Wenn aber die Reizung stärker wird, so reicht die Wiedererzeugung nicht so bald hin, um diesen Verlust zu ersetzen, und die Reizung kann so stark seyn, dass sie die Summe der vorhandenen Kräfte erschöpft. Diese Verhältnisse, welche wir in der Ausübung der Muskelbewegung, des Geschlechtstriebs, der Geistesfunctionen täglich kennen lernen, finden auch bei der unmittelbaren Anwendung der Reize auf die Nerven statt. Wenn man einen Nerven lange galvanisirt, so werden die Reactionen immer schwächer und zuletzt Null, und es bedarf einiger Zeit, ehe wieder Reaction erfolgt, wenn sich nämlich die Nervenkraft (durch den Contact mit dem Blut) wieder erholt hat. Es ist eben so mit den Empfindungen. Je länger man ein farbiges Bild ansieht, um so schmutziger wird es und es verschwindet zuletzt in Grau, je mehr die vom Licht gereizte Stelle an Reactionskraft verliert; diese Stelle sieht zuletzt gar nicht mehr. In allen diesen Fällen wird die Reizbarkeit durch die Reizung erschöpft, und nicht durch die eigenthümliche Wirkung der Einflüsse. Die Reizbarkeit kann aber auch, was Brown nicht glaubte, was aber von der Theorie des Contrastimulo besonders anerkannt worden ist, durch Einflüsse unmittelbar ohne Reizung sogleich erschöpft werden, wenn eine fremdartige Potenz sich unmittelbar auf Kosten der organischen Combinationen geltend macht und den Nerven mit der Nervenkraft vernichtet. So wirkt die Elektricität im höchsten Grade des Effects im Blitz, eben so der Druck, die Zerquetschung des Nerven und seiner Primitivfasern, ferner die Behandlung der Nerven mit chemischen Agentien, welche die organische Combination des Nerven aufheben, und zersetzen, wie die mineralischen Säuren, die Metallsalze, Alkohol im concentrirten Zustande.

Wirkt diese fremdartige Gewalt auf alle Nerven zugleich, wie die Elektricität in dem Blitze, oder eine sehr starke Batterie, oder wird ein Nerve in seiner ganzen Länge ausgedehnt, so wird

Digitized by Google

die Reizbarkeit in dem ganzen Nerven oder im ganzen Organismus aufgehoben; wirkt sie nur auf einer Stelle des Nerven, wie Caustica, Druck, Quetschung, so wird auch nur diese Stelle gelähmt, und die zwischen der Quetschung und dem Muskel befindlichen Theile des Nerven haben ihre motorischen Kräfte behalten.

Die Wärme und die Kälte, welche in einer gewissen Stärke und einer gewissen Zeit Stimulantien sind, werden deprimirend, sobald sie sehr lange im stärkern Grad angewandt werden.

Die Kälte, welche so gut wie die Wärme Entzündung und Brand erregen kann, macht die Glieder taub oder empfindungs- und bewegungslos; diese Wirkung kann örtlich und allgemein seyn: die Wärme scheint örtlich ohne Entzündung und Brand zu erregen, nicht die Glieder taub zu machen; allein die allgemeine anhaltende Wirkung der Wärme ist auch Schwäche der Nervenfunctionen.

Bei einigen Einflüssen geht vor der Zerstörung noch eine kurze Irritation vorher, wie beim Quetschen der Nerven, bei der Behandlung derselben mit Alkali. Dieselben Reizungserscheinungen beobachtet man noch deutlicher bei einem grossen Theil der Narcotica, deren Hauptwirkung scheint, die Mischung der Nerven zu verändern und in höherem Grad der Wirkung, die Nervenkraft aufzuheben.

Eine ganze Abtheilung von Stoffen besitzt im aufgelösten Zustande einen gewissen Einfluss auf die Kräfte der Nerven und zerstört dieselben, ohne dass diese Stoffe sich auf sehr eigenthümliche Art gegen andere chemische Reagentien verhalten, ohne dass sie caustisch sind, und die organischen Verbindungen im Allgemeinen auflösen. Diess sind die Alterantia nervina, die man Narcotica nennt. Alle diese Mittel alteriren die materielle Zusammensetzung der Nerven. Einige sind in kleinen Gaben reizend und weniger deprimirend, wie Opium, Nux vomica, alle in grossen Gaben sogleich deprimirend durch Alteration. Dass diess durch eine unseren Sinnen und der chemischen Probe entgehende Umwandlung der Nervenmaterie geschieht, ist wahrscheinlich und anzunehmen nothwendig; allein diese Umwandlung zeigt sich uns nur an dem Verluste der Nervenkräfte, und der durch Narcotica getödtete Nerve verhält sich dem äussern Anschein nach ganz so wie der gesunde Nerve, wenigstens wenn man reine Narcotica in wässrigen Auflösungen, zum Beispiel wässrige Auflösung von Opium, anwendet.

Ehe wir nun aber die Wirkung der narcotischen Stoffe auf die Nerven näher untersuchen, wollen wir erwägen, ob es nicht auch Stoffe giebt, welche die Reizbarkeit der Nerven erhöhen.

I. Integrirende Reize.

Nach früheren Versuchen war es sehr wahrscheinlich, dass es viele Stoffe giebt, welche die Reizbarkeit der Nerven erhöhen, und die Heilkunde erwartete von diesen Versuchen einen grossen Erfolg. A. v. Humboldt *über die gereizte Muskel- und Nervenfaser.* Allein die stärkere Wirkung der galvanischen Action nach Befeuchtung der Nerven mit Aqua oxymuriatica und alkalischen Solutionen beweist noch nicht, dass die Reizbarkeit der Nerven durch jene Flüssigkeit erhöht werde, sondern be-

Digitized by Google

weist nur, dass die galvanische Action stärker ist. Auch hat Pfaff, *nord. Archiv. Bd.* 1. *p.* 17. durch Versuche erwiesen, dass die mehrsten jener Stoffe nicht durch Erhöhung der Reizbarkeit wirken, sondern insofern sie als Glieder der galvanischen Kette den galvanischen Reiz selbst vermehren, und die galvanische Action bei derselben Stärke der Reizbarkeit erhöhen; jene Flüssigkeiten wirken daher nur immer stärker als das Wasser, welches zur galvanischen Action als Leiter nöthig ist. Die Heilkunde hat auch ihre Hoffnungen auf Mittel, welche die Kraft der Nerven verstärken, ganz aufgegeben, und diese Mittel leisten das, was sie sollen, nur in den Lehrbüchern der Materia medica.

Mittel, welche reizen giebt es allerdings genug, wie Kampher, die Ammoniakalien, die Elektricität, und diese Mittel sind vortrefflich, wo die nicht erschöpften, sondern bloss geschwächten Nervenkräfte des Reizes bedürfen. Sie reizen, sie verursachen eine Nervenaufregung, aber sie vermehren nicht die Stärke der Reizbarkeit. Die Nervenkraft nimmt nur zu durch dieselben Processe, wodurch sie beständig wiedererzeugt wird, nämlich die beständige Reproduction aller Theile aus dem Ganzen, und des Ganzen durch die Assimilation. Für einen geschwächten Theil des Nervensystems sind gelinde Reize daher nicht darum nützlich, weil sie die Reizbarkeit erhöhen, denn das thun sie nicht, sondern weil ein gereizter Theil mehr die Ergänzung des Ganzen anspricht, und daher vorzugsweise wiedererzeugt und ergänzt wird. So stelle ich mir die nützliche Wirkung der Reize in den Nervenkrankheiten vor, und hier ist wieder am meisten auf die Wärme oder das Feuer zu halten, denn die Wärme ist die Ursache, dass zuerst die Erzeugung der Theile aus der vorhandenen Kraft des Ganzen beginnt; daher ist auch das Feuer oder eine recht anhaltende, langsam abbrennende Moxa, oder besser das lange andauernde Nähern einer brennenden Kerze an den leidenden Theil ohne Branderzeugung das allein bewährteste und wirklich hülfreiche Mittel in den anfangenden Lähmungen, Neuralgien, Tabes dorsalis u. s. w.

II. Alterirende Reize.

Hieher gehören die Narcotica, welche, indem sie reizen, zugleich die Nervenmaterie zu zersetzen scheinen. Insofern diese Mittel die materielle Zusammensetzung der Nerven alteriren, bedient sich die Arzneikunde derselben in kleinen Gaben zuweilen mit Erfolg in Lähmungen, um feinere materielle Veränderungen der Nerven auszugleichen, oder nach einer solchen Umstimmung der Natur selbst Gelegenheit zur Einleitung der Heilung zu geben. In stärkerem Grade angewandt, wirken die Alterantia nervina seu Narcotica sogleich zersetzend.

Die Veränderung der Nerven bei unmittelbarer Application des Giftes auf dieselben tritt ohne Zeichen von Reizung, ohne Zuckung allmählig bis zur Paralyse ein. A. v. Humboldt beobachtete, dass auch das Opium, nämlich Opiumtinctur, Zuckungen errege. Ich selbst habe nie, weder bei der Anwendung des Opiums in wässriger Auflösung, noch des Strychnins, noch des spirituösen Extractes von Nux vomica auf

Digitized by Google

die entblössten Nerven eines Kaninchens, der Frösche und der Kröten Zuckungen entstehen sehen, und glaube nicht, dass jemals ein Narcoticum, unmittelbar auf einen Nerven angewandt, eine Zuckung errege, wenn es nicht durch das Rückenmark und Gehirn auf die Nerven wirkt. Strychnin erregt nicht einmal Zuckungen, wenn es gepulvert auf das nasse Rückenmark eines Frosches angewandt wird, sondern nur wenn es in die Blutmasse gelangt, und durch das veränderte Blut auf das Rückenmark, und letzteres wieder auf die Nerven wirkt. Ist daher ein Thier durch Opium, Strychnin vergiftet, so hören die Zuckungen einer Extremität auf, sobald ihre Nerven durchschnitten werden, und vernichtet man einen Theil von dem Rückenmark eines Thiers, ehe man es durch Upas tieute oder Angustura vergiftet, so werden alle diejenigen Theile, die von dem vernichteten Theile des Rückenmarks ihre Nerven empfangen, von Zuckungen befreit. Hieraus geht wohl unwiderleglich hervor, dass die Narcotica nicht durch sich selbst und auf die Nerven selbst wirkend Zuckungen erregen, sondern durch Vermittelung des Rückenmarks und Gehirns.

Eine ganz andere Frage ist, ob narkotische Gifte nicht durch sich selbst und auf die Nerven wirkend die Reizbarkeit der Nerven erschöpfen können, auf analoge Art wie chemische Reizmittel die Reizbarkeit der Nerven zerstören. Diese Frage haben die Schriftsteller nicht von der vorhergehenden getrennt, und man hat Unrecht gethan, wenn man beide gleich beantwortete. Die gewöhnlichste Wirkungsart der narkotischen Gifte, wenn sie die Empfindungskraft und Bewegkraft der Nerven lähmen, ist, dass sie ins Blut aufgenommen werden, vom Blut aus in den Capillargefässen auf das Gehirn, Rückenmark und die Nerven wirken. Die zweite Wirkungsart, welche langsamer geschieht und vielmehr isolirt wirkt, ist, dass sie die Nervenkraft örtlich zerstören.

1. *Wirkungsart der narkotischen Gifte durch das Blut.*

Es wurde sonst häufig angenommen, dass die allgemeinen Erscheinungen bei örtlichen narcotischen Vergiftungen durch Fortpflanzung des Zustandes durch die Nerven entstehen. In diesem Sinne haben selbst neuerlich, wo man hierüber besser belehrt war, Dupuy und Brachet behauptet, dass man Thiere durch in den Magen gebrachte Gifte nicht vergiften könne, wenn man vorher den N. vagus auf beiden Seiten durchschnitten habe. Diess ist jedoch eine grundlose Behauptung, denn wir haben in den vielen Versuchen, welche Herr Wernscheidt unter meiner Leitung über diesen Gegenstand anstellte, durchaus keinen Unterschied der Zeit in dem Eintreten der Vergiftungszufalle gesehen, mochten die Nerven vorher durchschnitten seyn oder nicht. Es ist jetzt erwiesen, dass die Vergiftungszufälle durch Aufnahme des Giftes in das Blut durch Imbibition entstehen. Ueber die Schnelligkeit dieses Ueberganges siehe oben p. 244. Die ersten Beweise für diese Theorie der Vergiftungen hat Fontana geliefert. Fontana hat Versuche mit Vipern-, Tikunas-, Kirschlorbeergift und Opium angestellt. Das Resultat aller seiner Versuche ist, dass diese und ähnliche Gifte nur indem sie in die Blutmasse

Digitized by Google

gelangen, ihre allgemeinen Wirkungen hervorbringen, dass sie aber auf die Nerven nur einen örtlichen Einfluss haben. Fontana, *Abhandl. über das Viperngift etc. aus d. Französ. Berlin*, 1787. Brodie durchschnitt in der Achselhöhle eines Kaninchens alle Nerven der Vorderbeine, und streute Woraragift in eine Wunde am Fusse; die Wirkung des Giftes erfolgte dennoch. Er unterband das Hinterbein eines Kaninchens, die Hauptnerven ausgenommen, mit einer starken Ligatur, und streute Worara in eine Wunde am Bein; die Wirkung blieb aber ganz aus, bis er die Ligatur löste, und sogleich erfolgte die Vergiftung. *Philos. trans.* 1811. *p.* 178. 1812. *p.* 107. Wedemeyer fand durch Versuche mit Blausäure, die so heftig wirkte, dass sie in's Auge und mehrere Stellen des Körpers gebracht, innerhalb einer Secunde tödtete, dass sie unmittelbar auf die Nerven angewendet, gar keine plötzliche Wirkung hervorbrachte. *Physiol. Untersuchungen über das Nervensystem u. die Respiration. Hannover*, 1817. *p.* 234. Vrgl. Emmert, *Tübing. Blätter.* 1811. 2. *Bd. p.* 88. *Salzb. medic. Zeitung.* 1813. 3. *Bd. p.* 62. Meckel's *Archiv* 1. 176. Schnell *Diss. sist. historiam veneni upas antiar. Tubing.* 1815. Emmert amputirte an Thieren die Extremitäten, so dass sie nur mit dem übrigen Körper durch die Nerven in Verbindung standen, das in den Fuss eingebrachte Gift äusserte keine Wirkung. Ebenso wendete er das Gift unmittelbar auf die Nervenstämme an, auch hier blieb die Wirkung aus. C. Viborg (*Act. reg. soc. med. Hafn.* 1821. *p.* 240.) hat fast eine Drachme concentrirter Blausäure unmittelbar auf das durch Trepanation entblösste Gehirn eines Pferdes gebracht, ohne irgend eine Wirkung des Giftes zu spüren. Siehe Lund *Vivisectionen p.* 103. 104. Hubbard (*Philadelph. Journal. Aug.* 1822.) hat zwar bei Anwendung der Blausäure auf die Nerven sehr schnelle Wirkung gesehen, gesteht aber selbst, dass wenn er den Nerven isolirte durch eine untergelegte Karte, durchaus keine Wirkung erfolgt sey. Die oben p. 238. angeführten Versuche von Magendie, Delille und Emmert beweisen auch, dass die Aufnahme des Giftes in die Blutmasse durch Resorption und Tränkung ausserordentlich schnell ist, und Emmert hat gezeigt, dass die Unterbindung der Aorta die Wirkung des in die Venen eingebrachten Giftes hemmt. Emmert fand die schnellste Wirkung der Angustura, der Upas antiar, der Blausäure 2—5 Secunden. Ueber die Schwierigkeiten der Erklärung einer so schnellen Wirkung, siehe oben p. 245.

Vor Kurzem habe ich selbst einige Versuche über die Wirkung der Gifte auf die Nerven angestellt; ich habe bei Kröten den Schenkelnerven blossgelegt, und alles Schenkelfleisch abpräparirt, so dass der Unterschenkel mit dem Oberschenkel nur durch den Nerven und den Knochen mit dem Rumpf in Verbindung stand. Bei diesen Kröten habe ich die präparirten Schenkel in eine Auflösung von essigsaurem Morphium und in concentrirte Auflösung von Opium getaucht, und lange in dieser Stellung erhalten. Bei diesen Thieren fand durchaus keine Narcotisation am Rumpfe statt, selbst viele Stunden nachher waren sie noch von ganz unverschrter Empfindung und Bewegung.

Digitized by Google

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, dass die schnelle allgemeine Wirkung der örtlichen Vergiftung nicht durch die Nerven, sondern durch das Blut geschieht, und vom Blute wieder auf alle Theile wirkt. Allein es lässt sich auch beweisen, dass die allgemeine Wirkung der Gifte erst wieder vorzugsweise durch die Centralorgane des Nervensystems bedingt ist, welche das vergiftete Blut narkotisirt. Denn

1. nach einem durch Vergiftung herbeigeführten Tod äussern die Nerven und Muskeln noch eine geraume Zeit hindurch Reizbarkeit.

2. Wird einem Thiere, nachdem man die nach einer Extremität führende Arterie unterbunden hat, ein Gift beigebracht, welches Zuckungen erregt, so bemerkt man, dass diese Operation jenen Theil vor Theilnahme an der allgemeinen Wirkung des Giftes nicht sichert. Lund *Vivis. p.* 109. Dass das Herz nicht durch Lähmung desselben, die Wilson bei Behandlung mit Tabacksinfusion und Tinct. Opii bei Fröschen sah, die Ursache der allgemeinen Wirkung des Giftes ist, beweist, wie Lund bemerkt, der Umstand, dass Frösche die Ausschneidung des Herzens viele Stunden überleben. Auch die Lungen sind nicht die Ursache, denn künstliche Respiration vermag die Thiere nicht zu retten. Man muss daher annehmen, dass das Gehirn und Rükkenmark auf dem Wege der Circulation durch das Schlangengift und alle starke Narcotica zuerst und also die Hauptquellen des Nervenlebens angegriffen werden. Durchschneidet man bei einem Thiere, das durch Opium, Strychnin, Upas, Angustura vergiftet ist, die Nerven einer Extremität, so hören die Zuckungen derselben auf; eben so nach Vernichtung eines Theils vom Rückenmark die Zuckungen derjenigen Theile, deren Nerven von der vernichteten Stelle abgehen. Das Opium und das Schlangengift scheinen Gehirn und Rückenmark in gleichem Grade zu afficiren; Strychnin und die verwandten Gifte, Angustura, wirken in noch höherem Grade auf das Rückenmark; denn Starrkrampf und Lähmung sind die Hauptsymptome, und diese dauern noch fort nach der Durchschneidung des Rückenmarks, in den unter dem Schnitte gelegenen Theilen, wie Backer gezeigt hat, während doch die Krämpfe sonst durch Zerschneidung der Nerven aufhören. Auch bleiben die Zuckungen im ganzen Körper bei der Vergiftung mit Angustura, wenn das Gehirn abgeschnitten wird; am Kopfe äussern sich die Zuckungen in den Ohren. Ich habe einen Versuch bei Fröschen angestellt, der wiederholt dieselben Resultate giebt und sehr instructiv ist. An einem Beine durchschnitt ich alle Gefässe und Muskeln des Oberschenkels, präparirte sie am Oberschenkel ab, liess aber den Nerven unversehrt. Nun vergiftete ich den Frosch mit Nux vomica. In dem gesunden Bein war die Reizbarkeit viel schneller erloschen, bald trat die gewöhnliche Folge der narkotischen Vergiftung bei Fröschen ein, dass, wenn man sie auch nur leise berührt, doch der ganze Frosch zuckt. Nachdem alle diese Zuckungen am ganzen Frosch aufgehört, zuckten immer noch die Wadenmuskeln des präparirten Beins, sobald ich den Frosch an irgend einer Stelle des Kör-

Digitized by Google

pers berührte; dasjenige Bein, welches kein Blut mehr erhielt, behielt also seine Reizbarkeit für die vom Rückenmark ausgehenden Reize viel länger als das andere Bein, dessen Nerven und Muskeln durch das Blut dem Gifte selbst ausgesetzt wurden. Man geht also zu weit, wenn man behauptet, die Gifte wirken nur auf die Centraltheile; sie wirken auch durch den Kreislauf auf die Nerven selbst. Die Vergiftungszufälle vom Rückenmark aus sind erst Zuckungen, dann Lähmung; die Vergiftungszufälle der Nerven selbst sind keine Zuckungen, sondern Vernichtung der Reizbarkeit. Ein Bein vom Frosche, das vor der Vergiftung so präparirt worden, erhält auch seine Reizbarkeit länger als das andere, dem das Gift durch den Kreislauf zugeführt werden kann. Vergl. Lund *Vivis.* 112. Backer *commentatio ad quaest. physiol. Traject. ad Rhen.* 1830. Vergl. Stannius in Muell. *Arch.* 1837. 223.

2. *Oertliche Wirkung der narkotischen Gifte auf die Nerven.*

So gewiss es ist, dass die allgemeinen Wirkungen der örtlichen Vergiftung durch das Blut bedingt sind, so wenig lässt sich die örtliche Vergiftung der Nerven selbst läugnen, und diess ist gerade der Punkt, über den fast alle neuere Experimentatoren hinweggegangen sind.

Al. v. Humboldt, Wilson, Brodie haben gezeigt, dass Opiumtinctur und Tabacksinfusum die Kraft des Herzens lähmen. Humboldt sah die Herzschläge zuerst sehr schnell werden und dann ganz aufhören, wobei die Vermehrung der Schläge vielleicht auf Rechnung der Tinctur kommt.

Die offenbarste örtliche Nervenlähmung durch ein narkotisches Gift ist die Erweiterung der Pupille und Lähmung der Iris durch Application eines Tropfens einer Auflösung des Belladonnaextractes. Hier dringt das narkotische Gift durch Tränkung bis zu den Ciliarnerven, die sich in der Iris verbreiten und zur Iris selbst. Dass die Wirkung rein örtlich ist, dass die Aufnahme ins Blut auch nicht den geringsten Antheil hat, sieht man daran, dass die Iris des gesunden Auges nicht zugleich erweitert wird. Bekannt sind aber auch die örtlichen narkotischen Wirkungen des Opiums, des Morphiums bei Einreibungen, wo man starke Localwirkung ohne auffallend allgemeine Wirkung erzeugen will. Eben so die örtlichen Lähmungen von Bleivergiftung an den Händen. Um diese örtliche Wirkung ausser Zweifel zu setzen, präparirte ich bei einem Frosche den Schenkelnerven weit heraus, und legte ihn in eine Auflösung von essigsaurem Morphium, nach einiger Zeit hat das Ende des Nerven ganz seine Irritationsfähigkeit verloren. Dasselbe erfolgte, wenn ich Muskeln in Opiumauflösung tauchte, wie auch A. v. Humboldt bereits gezeigt hatte. Bei Kröten, an denen die Nerven so präparirt waren, dass die Unterschenkel nur durch den Schenkelnerven mit dem Rumpfe zusammenhingen, tauchte ich diesen Unterschenkel mit dem Schenkelnerven in eine starke wässrige Auflösung von Opium; nach kurzer Zeit war alle Irritationsfähigkeit an Nerven und Muskeln für den galvanischen und mechanischen Reiz verloren.

Aus allen diesen Beobachtungen ist die örtliche Wirkung der narkotischen Gifte auf die Nerven unzweifelhaft. Wir müs-

Digitized by Google

sen jetzt zu bestimmen suchen, ob sich diese Art der Vergiftung weiter verbreitet als über die unmittelbar, afficirten Nerven und Muskeln. Ich habe directe Versuche angestellt, welche beweisen, dass die örtliche Narcotisation der ganz entblössten und frei präparirten Nerven nicht schnell sich verbreitet, sondern auf den Ort der Narcotisation beschränkt bleibt.

1. Fürs Erste werden die Unterschenkelmuskeln und ihre Nerven nicht mit narkotisirt, wenn der Hauptschenkelnerve selbst durch Eintauchen in essigsaures Morphin oder Opiumauflösung narkotisirt war. Der mechanische und galvanische Reiz bewirkt dann an dem obern Ende des Nerven keine Zuckungen der Muskeln mehr, wohl aber, wenn sie auf die unteren Theile des Nerven und die Unterschenkelmuskeln applicirt wurden. *Die narkotische Wirkung wirkt also vom Nervenstamm nicht auf die Aeste.*

2. Die narkotische Wirkung auf einer Stelle des Nerven wirkt auch nicht rückwärts auf das Gehirn. Ich habe schon die hieher gehörigen Versuche von Kröten erwähnt, deren Schenkelnerven ich durch Narcotisation alle Reizbarkeit genommen hatte, ohne dass diess auf die übrigen Theile des Rumpfes zurückwirkte. Dass aber allmählig eine Rückwirkung erfolge, machen andere Beobachtungen wahrscheinlich; denn durch jede örtliche Erschöpfung der Nervenkraft durch Entzündung, Brand entsteht allmählig Erschöpfung der allgemeinen Nervenkräfte. Hier lernen wir nun einen wichtigen Unterschied in der Wirkung der Einflüsse auf das Nervensystem kennen. Denn

a. die Reize, welche Nervenerscheinungen bewirken durch Reizen der Nervenkraft, wirken augenblicklich in der ganzen Länge der Nerven durch alle Fasern, die irgendwo gereizt worden sind. Die Zuckung erfolgt auf der Stelle in der Entfernung an den entsprechenden Muskeln, wenn die Nervenfaser irgendwo in ihrer Länge vom Stamme bis zum Muskel gereizt wird, und eben so schnell erfolgt die Empfindung.

b. Die Einflüsse, welche die Summe der vorhandenen Kraft verändern, nämlich erschöpfen, wirken nicht von dem örtlichen Theile schnell und unmittelbar auch in der Richtung der Nervenfasern, sondern allmählig, indem sich die Kräfte der gesunden und kranken Theile der Nerven in Gleichgewicht setzen, und der örtliche Zustand allgemeine Symptome erregt.

So bewirkt die Erblindung eines Auges zuletzt allmählig Atrophie des Sehnerven, welche eben so nach Atrophie eines Thalamus n. optici erfolgt. So schreitet die Tabes dorsalis von unten nach oben fort. So entsteht nach heftiger Verletzung einzelner Nerven Veränderung des ganzen Rückenmarkes, Tetanus.

III. Ueber die Abhängigkeit der Nerven vom Gehirn und Rückenmarke.

In wiefern zur Erhaltung der Reizbarkeit der Nerven ihre dauernde Communication mit dem Gehirn und Rückenmarke nothwendig sey, und ob die Muskeln ohne die Communication ihrer

Digitized by Google

Nerven mit den Centraltheilen des Nervensystems ihre Reizbarkeit zu erhalten vermögen, diese Frage konnte man sich bisher nicht mit Sicherheit beantworten, ja sie ist kaum einige Mal berührt worden. Man weiss zwar, dass die Nerven nach der Durchschneidung noch eine Zeitlang in dem dem Gehirneinfluss entzogenen Stücke ihre Reizbarkeit behalten, d. h. fähig sind, auf Reize, die auf sie angewandt werden, Zuckungen der Muskeln zu bewirken; allein eine ganz andere Frage ist, ob die Nerven fähig sind, die Reizbarkeit für immer unabhängig vom Gehirn zu behalten. Nysten hatte behauptet, dass die Muskeln von kurze Zeit nach einem apoplektischen Anfalle Verstorbenen trotz der Hirnlähmung auf galvanischen Reiz sich zusammenzögen. Nysten *recherches de physiol. et de chim. pathol.* Ich hatte jedoch gute Gründe, zu glauben, dass die Nerven nur kurz nachher noch ihre Kraft besässen, diese aber nach einem längeren Zeitraume vollkommen untergehe, so dass es scheinen sollte, als kämen den Nerven nur unter dem steten und unversehrten Einflusse des Gehirns eigenthümliche Kräfte zu. Denn einmal hatte ich bei Versuchen über Wiedererzeugung des Nervengewebes an einem Kaninchen die Beobachtung gemacht, dass der untere Theil des N. ischiadicus, den ich einige Monate vorher durchschnitten hatte, fast alle Kraft, auf Reize zu reagiren, verloren hatte und Fowler hatte schon eine ähnliche Beobachtung gemacht. Ueber diesen Gegenstand habe ich hernach mit Dr. Sticker neue Versuche angestellt, welche jene Vermuthung vollkommen bestätigt haben. Siehe Sticker in Muellèr's *Archiv für Anat. und Physiol. B.* 1. Um die Regeneration der Nerven zu verhüten, und das untere Nervenstück sicherer dem Einflusse der Centraltheile des Nervensystems zu entziehen, wurde den Thieren ein ganzes Stück aus dem N. ischiadicus ausgeschnitten. Obgleich die Versuche nur an mehreren Thieren, nämlich zwei Kaninchen und einem Hund angestellt worden, so haben sie doch so übereinstimmende Resultate geliefert, dass man auf diese Versuche bauen konnte.

Zwei Monate und drei Wochen nach der Durchschneidung des N. ischiadicus geschah der Versuch an dem ersten Kaninchen. Sobald der Nerve in seinem Verlaufe zwischen dem Musc. biceps und semitendinosus blossgelegt war, zeigte sich wider Erwarten und zu grossem Leidwesen, dass die Continuität der Nerven sich wieder hergestellt hatte. Der Nerve wurde sofort von neuem unterhalb der Narbe durchschnitten (wobei, was merkwürdig ist, zwar nicht die mindesten Zuckungen wahrgenommen wurden, das Thier aber laut aufschrie), und der untere Theil desselben durch Galvanismus in der Form eines einfachen Plattenpaares, dann auch durch Einschneiden und gewaltsame Zerrung auf die verschiedenartigste Weise gereizt; allein es trat keine Spur von Zuckung ein.

Vergleichungsweise wurden darauf die Versuche auf der andern Seite wiederholt. Bei der Durchschneidung des Nerven äusserte das Thier den lebhaftesten Schmerz und es entstanden sehr heftige Zuckungen, und nach der Durchschneidung erregten selbst ganz geringe Irritationen, sey es, dass sie auf den Ner-

Digitized by Google

ven allein — es ist hier immer der untere Theil des durchschnittenen Nerven gemeint — oder bloss auf die Muskeln angewendet wurden, die kräftigsten Zuckungen, und selbst nach dem Tode boten sich dieselben Erscheinungen noch dar.

Bei dem Hunde waren zwei Monate und vierzehn Tage nach der Durchschneidung des Nerven verflossen; auch hier hatten sich die Enden wieder verbunden. Die Untersuchung geschah ganz auf dieselbe Weise wie bei dem Kaninchen, und ergab auch für den Nerven ganz dasselbe Resultat, d. i. alle Reactionsfähigkeit desselben war erloschen; indessen zeigten die Muskeln immer noch eine leise Spur von Zusammenziehung, wenn man die Reize auf sie selbst applicirte; allein gleich nach dem Tode war auch diese völlig verschwunden, während in dem Unterschenkel der andern Seite noch die kräftigsten Zuckungen hervorgerufen werden konnten.

Fünf Wochen nach Durchschneidung des Nerven wurde das zweite Kaninchen vorgenommen, und nach einem so kurzen Zeitraume musste man auf diese Untersuchung sehr gespannt seyn. Hier fehlte die Zwischensubstanz zwischen den Enden des durchschnittenen Nerven; beide waren etwas angeschwollen und hingen mit dem anliegenden Zellgewebe zusammen. Es war jedoch hier ein Stück von etwa 8 Linien ausgeschnitten worden, während bei den anderen Versuchen dasselbe nur ungefähr 4 Linien betragen hätte. Auf keine Weise, weder auf mechanische, noch chemische — durch Kali causticum — noch auch durch Galvanismus war es möglich, durch die Nerven Zusammenziehung der Muskeln zu erzeugen; eben so wenig gelang es bei diesem sonst sehr lebenskräftigen Kaninchen, auch durch directe Insultation der Muskeln Zuckungen hervorzubringen. Auf der linken Seite ergaben sich, wie diess natürlich, sowohl vor als nach dem Tode die schon oben angeführten Erscheinungen.

Die gegenwärtigen Versuche erweisen jedenfalls, dass die Kräfte der Nerven, die Muskeln zu Bewegungen zu veranlassen, so wie die Reizbarkeit der Muskeln selbst, nach gänzlicher Aufhebung der Communication der Nerven mit den Centraltheilen allmählig verloren gehen. Sie würden indess noch ein entscheidenderes Resultat geliefert haben, wenn man zur Prüfung der Reizbarkeit der Nerven und Muskeln nicht bloss ein einfaches Plattenpaar, sondern eine kleine galvanische Säule angewendet hätte. Nur dadurch hätte sich mit Bestimmtheit unterscheiden lassen, ob alle Kraft in den Muskeln in zweien der Fälle erloschen war. Indessen beweisen die Versuche schon deutlich genug, dass die Reizbarkeit der genannten Theile sich nach unterbrochener Communication der Nerven mit den Centraltheilen nicht erhält. Man kann aus diesen Versuchen auch schliessen, dass, wenn nach Durchschneidung eines Nerven sich hierauf wieder die Reizbarkeit des untern Nervenstücks und der Muskeln hergestellt hat, der Nerve auch mit Herstellung der Leitungskraft in der Narbe vollkommen verheilt war, und dass, wenn die Reizbarkeit sich nicht erhält, auch keine vollkommene Verheilung und Reproduction des Nerven stattgefunden haben kann.

Digitized by Google

III. Capitel. Von dem wirksamen Princip der Nerven.

(Nach J. Mueller im *Encyclop. Wörterbuch der med. Wissenschaften.*)

Die Alten hatten weder von der Natur noch von den Gesetzen der Wirkung des Nervenprincips bestimmte Vorstellungen. Das wirksame Princip in den Nerven nannten sie Nervengeister; sie liessen sie von dem Gehirn ausgehen und die anatomische Verbreitung verfolgend, die organisirten Theile beseelen. Nachdem man die Wirkungen und Leitungsgesetze der Elektricität durch Reibung näher untersucht, fanden sich viele Aerzte in ihren Vorstellungen von der Action der Nerven durch Vergleichung der Nerven mit elektrischen Apparaten erleichtert. Aber erst durch die Entdeckung des Galvanismus ist man auf eine exacte Untersuchung dieser und ähnlicher Hypothesen geführt worden.

Nach der Entdeckung des Galvanismus waren viele Naturforscher geneigt, die Ursache der galvanischen Erscheinungen in einer bisher unbekannten thierischen Kraft zu suchen, wie z. B. Aldini, Galvani, von Humboldt, Fowler und Andere. Pfaff, Volta, A. Monro dagegen erklärten sich für eine von der Mitwirkung der thierischen Organe ganz unabhängige, nur durch die Wechselwirkung der Metalle und Feuchtigkeit erregte Electricität. Volta aber bewies die elektrische Natur des hierbei wirkenden Agens zur Evidenz, und als endlich die galvanischen Erscheinungen an anderen Körpern ausser Mitwirkung thierischer Theile bekannt wurden, war an der Richtigkeit der Volta'schen Ansicht kein Zweifel mehr. Auch A. Monro war schon frühe durch seine Versuche zu der richtigen Ansicht gekommen, dass das galvanische Fluidum, welches die Nerven erregt, elektrisch sey, dass dasselbe von der Nervenkraft ganz verschieden sey, und dass es als ein blosser Reiz für die Nervenkraft wirke, so dass die Nervenkraft die Zuckungen hervorbringe. (A. Monro's und R. Fowler's *Abhandlungen über thierische Elektricität. Lpzg.* 1796.) A. v. Humboldt hatte aus mehreren Versuchen den Schluss gezogen, dass die Nerven eine sensible Atmosphäre um sich besitzen, weil nämlich das galvanische Agens den Zwischenraum zweier durch einen Schnitt getrennter Nervenstücke, die sich nicht berühren, überspringt. Jetzt weiss man, dass dieser Zwischenraum bloss durch einen Leiter von Wasserdampf ausgefüllt wird, und was man damals für die sensible Atmosphäre der Nerven halten konnte, kann heutzutage nur als Leitungsfähigkeit der Elektricität vermittelst gasförmiger Ausdünstungen betrachtet werden. Gerade hier zeigen sich Electricität und Nervenkraft als durchaus verschieden; denn die Nervenkraft wirkt durch einen unterbundenen oder durchschnittenen Nervenast nicht mehr hindurch, wohl aber sind durchschnittene oder unterbundene Nerven, wenn die Stelle zwischen zwei Armaturen liegt, der Leitung des elektrischen Fluidums so gut fähig, wie vorher.

So gewiss es nun ist, dass der Galvanismus nicht thierische

Digitized by Google

Elektricität ist, so haben doch manche Aerzte und selbst grosse Physiker nicht aufgehört, an eine gewisse Aehnlichkeit der Elektricität und Nervenkraft zu glauben, die sich bei näherer Untersuchung als die grösste Verschiedenheit zeigt. Unter andern haben einige Versuche von Ure und Wilson Missverständnisse erzeugt. Ure machte galvanische Versuche an dem Körper eines Gehenkten eine Stunde nach dem Tode. Die Medulla oblongata wurde blossgelegt und ein metallischer Leiter damit in Berührung gesetzt, während ein anderer Leiter mit dem N. ischiadicus in Berührung gebracht wurde. Diese Leiter wurden mit einer Säule von 270 Plattenpaaren verbunden, worauf alle Muskeln des Rumpfes wie bei einem heftigen Schauder in Bewegung geriethen. Als die Kette zwischen dem N. phrenicus und dem Zwerchfell geschlossen wurde, zog sich das Zwerchfell bei jeder Schliessung zusammen, und als man mit dem Leiter auf dem Polstück hin und her strich, entstanden eine Menge Stösse, wie bei einem schweren Athmen; durch die Zusammenziehung des Zwerchfells und die Remission in dieser Bewegung hob und senkte sich der Bauch abwechselnd, wie wenn das Leben zurückkehrte. Als nun ferner die Gesichtsmuskeln in den Kreis der Kette gezogen wurden, entstanden fast leidenschaftlich aussehende und schaudererregende Bewegungen der Gesichtsmuskeln. Diese Versuche haben nichts Ausgezeichnetes vor dem gewöhnlichsten galvanischen Experiment, ausser dass sie an einem Menschen gemacht wurden; da die Ursache der bewegten Gesichtszüge die Zusammenziehung der Gesichtsmuskeln ist, so muss die künstliche Erregung dieser Muskeln, die man eben so gut durch mechanische Reizung ihrer Nerven in Bewegung setzen kann, eine Art von Grimassen hervorbringen. Eben so wenig ist das scheinbare Athmen bei periodischer Schliessung der Kette, wenn der Zwerchfellnerve in der Kette liegt, auffallend. Man hat ferner viel zu viel aus Wilson Philip's Versuchen geschlossen. Dieser hat behauptet, ein durch die Enden des durchschnittenen N. vagus zum Magen eines lebenden Säugethiers geleiteter galvanischer Strom könne auf ähnliche Weise die Verdauung befördern, als die Magennerven selbst. Wenn diess richtig wäre, so wäre es kein Beweis für die Aehnlichkeit des Nervenprincips und der Elektricität; denn das vom Gehirn abgewendete Stück eines durchschnittenen Nerven behält noch einige Zeit die Fähigkeit, auf Reizung in einigem Grade seine gewöhnlichen Functionen auszuüben. Ferner haben Wiederholungen der Versuche von Philip nicht durchaus dasselbe Resultat gehabt; wir haben sie mit Dr. Dieckhoff an einer ganzen Reihe von Thieren wiederholt und gar keinen Unterschied bei Thieren mit durchschnittenem Vagus. mit und ohne Anwendung der Elektricität, bemerkt. Siehe das Weitere oben p. 549.

Wenn in den Nerven Elektricität wirkte, so könnte sie, da das Neurilem feucht ist und die umliegenden Theile auch feucht sind, nicht auf die Nerven beschränkt bleiben. Man hat auch hypothetisch eine isolirende Eigenschaft der Nerven angenommen. Fechner vergleicht die Nervenfäden mit von Seide über-

Digitized by Google

sponnenen Leitungsdrähten. (Biot *Experimental-Physik. Bd. III.*) Allein eben das Neurilem ist ein vortrefflicher Leiter des Galvanismus, und die Nerven sind, wie später gezeigt werden wird, nicht einmal bessere Leiter der Elektricität als andere nasse thierische Theile; denn der galvanische Strom folgt nicht nothwendig der Verzweigung der Nerven, sondern nur das Nervenprincip folgt dieser Verzweigung. Der galvanische Strom springt aber eben so leicht auf nahe thierische Theile über, wenn diese ihm einen kürzern Weg von Nerven zum andern Pol darbieten. Auch lässt sich die Leitung des Nervenprincips durch eine Ligatur in dem Nerven aufheben, welche für den galvanischen Strom ein trefflicher Leiter bleibt.

Man erkennt die Elektricität an den Körpern, welche sie isoliren und welche sie leiten; diess sind die einzigen und sicheren Merkmale derselben. Gerade in dieser Hinsicht zeigt sich das Nervenprincip verschieden, und es kann daher keine Elektricität seyn. Es lassen sich aber auch noch andere Beweise aus den schon berührten Eigenschaften der Nervenkraft aufführen:

1) Wenn man einen Nerven mit beiden Polen armirt, oder einen galvanischen Strom durch die Dicke des Nerven gehen lässt, so zuckt sein Muskel, nicht weil der Galvanismus bis zum Muskel wirkt, sondern weil durch den queren Strom durch die Dicke des Nerven die motorische Kraft des Nerven erregt wird, welche nur nach der Richtung der Verzweigung wirkt, gerade so, wie wenn man durch Brennen, mechanische Zerrung oder durch Kali causticum auf den Nerven wirkt und dadurch Zukkung erregt.

2) Wenn man aber nicht den Nerven selbst durch beide Pole, sondern mit dem einen Pol den Muskel, mit dem andern den Nerven armirt, so entsteht nicht bloss ein galvanischer Strom durch die Dicke des Nerven, sondern zwischen beiden Polen von dem Nerven bis zum Muskel, und es ist gerade so gut, als wenn der Muskel selbst galvanisirt würde. In diesem Falle reizt man die Nervenkraft in jedem Punkte des Nerven bis zum Muskel.

3) Daher entstehen auch keine Zuckungen, wenn ein gequetschter oder unterbundener Nerve über der gequetschten oder unterbundenen Stelle mit beiden Polen armirt wird. Hier geht zwar der Galvanismus durch die Dicke des Nerven, wie im ersten Falle, aber die Nervenkraft wirkt nicht mehr durch die gequetschte oder unterbundene Stelle hindurch.

4) Dennoch ist der gequetschte und unterbundene Nerve vollkommen leitungsfähig für den Galvanismus, und sobald nur die Armaturen über und unter der verletzten Stelle angebracht werden, geht der galvanische Strom durch diese Stelle hindurch und es erfolgt eine Zuckung, weil der noch gesunde Nerve zwischen Muskel und der verletzten Stelle erregt wird.

5) Die Nerven bleiben auch im gänzlich mortificirten Zustande, wie alle nassen thierischen Theile, Leiter des Galvanismus, während sie die Fähigkeit, Contractionen der Muskeln zu verursachen, verloren haben.

6) Endlich zeigen meine eigenen und Sticker's Versuche,

Digitized by Google

dass, wenn der lebendige Einfluss der Nerven auf die Muskeln lange Zeit aufgehoben ist, der galvanische Reiz der einfachen Kette selbst nicht mehr auf die Muskeln wirkt und keine Zukkungen mehr in ihnen erregt, wie wir bei Säugethieren gesehen haben, denen mehrere Monate vorher die Nerven so durchschnitten waren, dass sie nicht vollständig an einander heilen konnten. (Sticker in Mueller's *Archiv für Anat. u. Physiol.* 1834.)

Durch die Entdeckung des Elektro-Magnetismus hat man die feinsten galvanometrischen Instrumente kennen gelernt. Vavasseur und Beraudi (*Annali universali di med. Maggio* 1829. Froriep's *Not. Nr.* 538.) wollen die Beobachtung gemacht haben, dass Nadeln, welche man in die Nerven eines lebenden Thieres sticht, magnetisch werden und Eisenfeile anziehen. Nach Durchschneidung des Rückenmarks sollte sich die magnetische Kraft der in die Nerven eingestochenen Nadeln nicht entwickeln, wohl aber nach Einathmen von Sauerstoffgas. Die Sehnerven sollen die eingestochenen Nadeln nicht magnetisch machen, auch nicht nach dem Einathmen von Sauerstoffgas. Nach Durchschneidung und Unterbindung der Nerven sollen die eingestochenen Nadeln auch nicht magnetisch werden; jedoch soll sich bei einer Entfernung von 4 Linien zwischen den Stücken des durchschnittenen Nerven eine schwache Wirkung auf die Nadeln gezeigt haben. Ich habe es mich nicht verdriessen lassen, diese Versuche an einem Kaninchen zu wiederholen, und habe auch nicht eine Spur von magnetischer Eigenschaft an den eingestochenen Nadeln bemerken können.

David machte in einer Inauguralthese, Paris 1830, Versuche bekannt, nach welchen Leitungsdrähte, in einen entblössten Nerven eingestochen, auf das Galvanometer wirken sollen, nämlich in dem Moment, wenn sich das Thier gerade bewege. Werde die Nadel in einen von dem Rückenmarke abgeschnittenen Nerven eingestochen, so zeige das Galvanometer, wenn die Conductoren mit der Nadel in Verbindung gebracht werden, keine Bewegung, während in allen mit dem Nervencentrum zusammenhängenden Nerven der Versuch gelinge. Diese Versuche sind mir nicht gelungen, und ich halte sie für Täuschung. Eben so wenig hat Person mit einem sehr empfindlichen Galvanometer Elektricität in den Nerven entdecken können. Prevost und Dumas (*Journal de Physiol. Tom. III.*) haben eine Theorie der Muskelbewegung aus elektrischen Ursachen aufgestellt. Die Erklärung, welche sie von der Zusammenziehung der Muskeln geben, gründet sich auf die Voraussetzung, dass die quer über die Muskelbündel verlaufenden Nervenfasern sich anziehen und dadurch die Muskelbündel verkürzen — eine Hypothese, welche dadurch sehr unwahrscheinlich wird, dass die unzähligen Muskelfasern dabei als ganz gleichgültig angenommen werden. Dass die Elektricität die gegenseitige Anziehung der Nerven in den Muskeln bewirken soll, ist eine zweite Hypothese. Um elektrische Strömungen in den Nerven durch das Galvanometer nachzuweisen, ist es nicht zulässig, dass man die Drähte des Galvanometers auf Nerven und Muskeln zugleich anwende; denn da eine Kette von heterogenen

Digitized by Google

thierischen Substanzen, wie Nerv und Muskel, und von Metall schon Elektricität erzeugt, so würde man bei jenem Versuch mit dem Galvanometer nicht die in dem Nerven wirkende, sondern die durch die Kette erst erzeugte Elektricität prüfen. Damit man also bei Verbindung des Galvanometer mit Nerv und Muskel nicht erst Elektricität erzeuge, muss man die Leitungsdrähte des Galvanometers auf einen Nerven allein anwenden und beobachten, ob ein Nerv, der mit dem Gehirn in Verbindung steht, bei den willkührlichen Bewegungen Schwankungen der Magnetnadel bewirke, dann könnte man überzeugt seyn, dass die vom Gehirn aus erfolgende Innervation eine elektrische Strömung sey. Allein Prevost und Dumas gestehen hier, dass man unter diesen Umständen nie eine Ablenkung der Nadel beobachte. Die Verfasser haben bei gesunden Thieren den N. vagus, und den Plexus ischiadicus bei einem Thiere in tetanischem Zustande galvanometrisch untersucht, allein sie haben weder beim Verbinden der Drähte mit verschiedenen Theilen des unverletzten Nerven, noch beim Verbinden mit beiden Stücken eines durchschnittenen Nerven eine Spur von Elektricität durch Schwankung der Nadel des Galvanometers beobachtet. Eben so wenig zeigte eine, an einem Seidenwurm-Spinnfaden aufgehängte Nadel eine Spur von Declination, wenn man sie in die Nähe des in Action begriffenen Muskels und Nervens brachte; dass diess sich so verhält, kann ich nach meinen eigenen Versuchen bestätigen. Um diese Unempfindlichkeit des Galvanometers gegen die Nerven zu erklären, und diesen Haupteinwurf gegen ihre Hypothese zu beseitigen, nehmen Prevost und Dumas wieder an, dass der galvanische Strom in den Nerven doppelt sey, dass sich beide Ströme neutralisiren, so dass alle Wirkung auf die Magnetnadel aufgehoben werde. Prevost und Dumas vergleichen diese beiden hypothetischen Ströme mit den elektrischen Strömen, welche in entgegengesetzter Richtung die Arme des Galvanometers durchlaufen, und sich im Multiplikator des Galvanometers oder in den Windungen der Leitungsdrähte begegnen. Die Magnetnadel soll hierbei dem Muskel gleichen, welcher eben so wie die Magnetnadel die Wirkung der entgegengesetzten Ströme erfährt. Allein bei den Wirkungen der entgegengesetzten Ströme reagirt das Galvanometer, warum reagirt es nicht bei den hypothetisch vorausgesetzten doppelten Strömungen in den Nerven? Ein merkwürdiger Versuch ist derjenige dieser berühmten Gelehrten, die mechanische, chemische, caustische Reizung der Nerven auf eine elektriche zurückzuführen. Da nun gerade ein Hauptbeweis gegen das elektrische Agens in den Nerven in dem Umstande liegt, dass alle Reize, nicht bloss elektrische, auf die Nerven wirken, so müssen wir diesem Theil der Arbeit jener Gelehrten eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Prevost und Dumas wollen zeigen, dass das Feuer, indem es, auf die Nerven wirkend, Zuckungen erregt, diess durch Elektricität thue. Sie bringen zwei gleiche Platindrähte an die Enden der Conductoren des Galvanometers, und stecken den einen der Platindrähte in die Muskeln des Frosches, mit dem andern, welcher rothglühend gemacht worden, berüh-

Digitized by Google

ren sie die Nerven; es entstehen Zuckungen, aber auch eine Ablenkung der Nadel des Galvanometers. Der Versuch beweist durchaus nicht, was er soll; denn homogene Metallstücke, wovon das eine erhitzt ist, erzeugen für sich schon, so wie heterogene Metalle, Elektricität, es müssen also Zuckungen und zugleich eine Abweichung der Magnetnadel stattfinden.

Die Verfasser wollen ferner zeigen, dass chemische Reize, welche auf die Nerven wirken, diess durch Elektricitätsentwickelung thun. Sie bringen an dem einen der Drähte des Galvanometers ein mit salzsaurem Antimon oder mit Salpetersäure befeuchtetes Stück Platina an, und befestigen an den andern Draht ein Fragment von Nerve, oder Muskel, oder Gehirn. Bei jeder Schliessung der Kette lenkt die Nadel ab; diess beweist noch weniger, denn hier sind die allgemeinen Bedingungen der Elektricitätserregung durch Heterogenität vorhanden. Von derselben Art ist der folgende Versuch: sie befestigen an beide Conductoren des Galvanometers gleiche Platten von Platina, an eine derselben ein Stück frisches Muskelfleisch von einigen Unzen von einem lebenden Thiere, und tauchen beide Conductoren in Blut oder in eine leichte Salzlösung, worauf eine Ablenkung der Nadel erfolgt.

Die neuesten Versuche mit Anwendung des Galvanometers sind die von Person. (*Sur l'hypothèse des courans electrics dans les nerfs. Journal de Physiol. Tom. X.* 1830.) Alle Versuche von Person, mit einem äusserst empfindlichen Galvanometer elektrische Strömungen in den Nerven zu entdecken, waren, eben so wie bei Prevost und Dumas, vergeblich. Person brachte bei Kaninchen und jungen Katzen die Conductoren des Galvanometers in Verbindung mit dem vordern und hintern Theile des Rückenmarks; er brachte sie ins Innere mehrerer dicker Nerven. Er wiederholte diese Versuche, nachdem er in den Unterleib Tinctura nucis vomicae eingespritzt, um die dadurch entstehenden Zuckungen galvanometrisch zu beobachten. Aehnliche Versuche wurden bei Aalen und Fröschen gemacht; nie hat Person eine sichere Spur von Elektricität entdeckt. Der Verfasser erzählt hierbei eine Beobachtung, welche beweist, wie viel Misstrauen man gegen zufällige Umstände bei solcher Art der Untersuchungen hegen muss. Eines Tages brachte Person einen Tropfen Wasser auf Zink, um sich zu überzeugen, dass das Galvanometer empfindlich sey, er berührte nun mit den Armen des Galvanometers das Wasser und das Zink, und beobachtete Diviationen der Magnetnadel, darauf brachte er bei einem jungen Hunde die Platindrähte des Galvanometers in Contact mit dem Rückenmark, und sah auch eine Deviation von 30 bis 40 Centimetern; allein diese Abweichung kehrte sich um, als der Contact umgekehrt stattfand, was den Verdacht einer elektrochemischen Action an einem der Drähte erregte. Diess war auch der Fall, denn als Person die Drähte in Blut brachte, oder in Wasser, indem er mit einem der Drähte Zink berührte, entstand ein galvanischer Strom, bis das Stückchen Zink oxydirt war. Man könnte den Beobachtungen mit dem Galvanometer den Vorwurf

Digitized by Google

machen, dass diess Instrument nur andauernde Strömungen anzeige, die Muskelcontractionen dagegen abwechselnde Zusammenziehungen seyen. In der That, wenn Person einen der Drähte des Galvanometers mit dem Conductor einer elektrischen Maschine, den andern mit dem Boden in Verbindung brachte, entstand eine regelmässige Ablenkung (à chaque tour du plateau), nicht aber, wenn der Strom in eine Reihe von Funken verwandelt wurde. Hiernach wiederholte Person mehrere seiner Beobachtungen mit einem Instrument, welches für successive Strömungen (courans instantanés) empfindlich war; allein Person konnte auch mit diesem Instrument bei Muskelcontractionen keine Ablenkung entdecken.

Endlich bemerkt Person, dass, um Muskelcontractionen zu erzeugen, es gar nicht nöthig sey, dass ein galvanischer Strom die ganze Länge der Nerven durchlaufe. Derselbe Erfolg tritt ein, so klein auch die Stelle am Nerven ist, durch welche der Strom von einem zum andern Pol geht. Wenn man einen Nerven zerrt, quetscht, brennt, so zuckt sein Muskel; eine Ligatur unter der Stelle hebt alle Wirkung auf. Es ist gerade so, wenn man einen Nerven mit beiden Polen armirt und den Strom durch die Dicke des Nerven gehen lässt. Man nimmt hier zwar an, dass der galvanische Strom eine Ablenkung nach der ganzen Länge des Nerven erleide, weil die Nerven so vorzügliche Leiter der Elektricität seyn sollen. Indessen zeigt Person sehr gut, was ich selbst auch sehr oft beobachtet habe, dass die Nerven nicht besser das galvanische Fluidum leiten als die Muskeln und andere nasse thierische Theile; dass ihre Leitungskraft sich nicht ändert, wenn man sie mechanisch zerstört, und dass das Neurilem unfähig ist, die galvanischen Ströme zu isoliren. In der That geht ein galvanischer Strom, der in einen Nerven geleitet wird, sogleich in Muskeln und fibröse Theile über, sobald diese ihm einen kürzern Weg darbieten. Man muss hieraus mit Person, so wie aus dem ganzen Gange der bisherigen Verhandlung, schliessen, dass ein Bewegungsnerve während des Lebens und der Dauer seiner Reizbarkeit in einem solchen Zustande ist, dass Alles, was plötzlich den relativen Zustand seiner Moleküle verändert, eine Contraction des Muskels am entfernten Ende erregt, und dass elektrische, chemische und mechanische Reize hierbei sich gleich verhalten.

Die mit dem Galvanometer angestellten Versuche zur Prüfung der Elektricität der Nerven, so gewiss sie keinen Beweis für die Elektricität derselben liefern, können eben so wenig streng beweisen, dass keine Elektricität in den Nerven entwickelt werde; denn diese Instrumente sind zu unvollkommen. Sie wirken meist nicht mehr, wenn wirkliche Elektricität durch ein Metallplattenpaar entwickelt wird, sobald einer der Conductoren des Galvanometers nicht das Metall selbst berührt, sondern nur durch Vermittelung eines Wassertropfens oder Stückchen Muskelfleisches damit in Verbindung steht. Hieraus sieht man deutlich genug, dass, wenn auch Elektricität in den Nerven wirkte, sie durch das Galvanometer nicht leicht angezeigt würde. Dagegen ist der Nerve

Digitized by Google

eines Froschschenkels ein viel feineres Elektrometer, welches indess keine Wirkung zeigt, wenn der Nerve eines abgeschnittenen Froschschenkels mit einem andern gereizten Nerven im Contact steht.

Einige haben sich bei der Hypothese von der Wirkung der Elektricität in den Nerven auf die elektrischen Fische gestützt, aber gerade die Existenz dieser einer galvanischen Säule ähnlich gebauten Organe, welche bei Torpedo aus Säulchen von über einander geschichteten dünnen Platten und einer dazwischen befindlichen verschiedenen Materie bestehen, ist der Hypothese von der Elektricität in den Nerven durchaus nicht günstig. Denn nur da findet bei Thieren eine elektrische Wirkung statt, wo besondere Organe dafür vorhanden sind; wäre aber Elektricität das Agens der Nerven, so brauchte es bei den Fischen keiner besondern thierisch-galvanischen Apparate, sondern blosser Conductoren. Man erzählt zwar häufig wieder, dass Cotugno beim Seciren einer lebendigen Maus, als der Schwanz der Maus gegen seine Hand schlug, einen heftigen Stoss empfand; diess gehört aber nicht hierher. Denn wenn man Thiere, wie Mäuse, Frösche, Spinnen, gegen welche man eine Aversion leicht hat, schon mit einiger Aufregung in den Händen hält, so können durch eine leichte Veranlassung, durch Erschrecken, auch Nervensymptome entstehen; diess hat nichts mit einer elektrischen Nervenwirkung gemein. Die Empfindung eines Schlags wie bei Anwendung der Elektricität ist ein Phänomen, welches in den Nerven auch bei jeder heftigen Reizung entsteht, z. B. wenn man erschrickt, oder wenn man den N. ulnaris zerrt. Der Schlag von der Elektricität ist auch kein elektrischer Schlag, sondern eine Empfindung durch Elektricität veranlasst, wie sie auch durch mechanische Einwirkung verursacht werden kann. Kastner berichtet, dass er beim Schreiben öfter kleine Stösse in den Fingern empfinde. Vor Jahren, als ich von einer nervösen Reizbarkeit befallen war, hatte ich diess Symptom sehr oft, sobald ich die Hand und die Finger zu sehr anstrengte.

Fasst man nun alles bisher Verhandelte zusammen, so ergiebt sich als Resultat:

1) Dass in den Nerven bei den Lebensactionen keine nachweisbaren elektrischen Strömungen stattfinden. 2) Dass die elektrische Kraft von der Innervation ganz verschieden ist. 3) Elektrische Strömung in den Nerven ist also eben sowohl ein symbolischer Ausdruck, als wenn man die Wirkung der Nervenkraft mit dem Lichte, dem Magnetismus vergleicht. Ueber die Natur des Nervenprincips ist man eben so ungewiss, wie über das Licht und die Elektricität; die Eigenschaften des Nervenprincips kennt man fast eben so gut, wie die Eigenschaften des Lichtes und anderer imponderabler Agentien. So verschieden diese Kräfte sind, so wiederholt sich doch hier die Frage, ob ihre Wirkungen durch ortsverändernde Strömungen einer imponderablen Materie entstehen, oder ob sie durch mechanischen Impuls, nämlich durch Undulationen eines Fluidums, wie nach der Undulationstheorie bei dem Licht angenommen wird, erfolgen; welche Annahme in

Digitized by Google

Hinsicht des Nervenprincips hier die richtige sey, ist vor der Hand für das Studium der Mechanik des Nervensystems gleichgültig, gleichwie die Gesetze der Mechanik des Lichtes durch die Annahme der einen oder der andern dieser Theorien nicht abgeändert werden können.

II. Abschnitt. Von den Empfindungsnerven, Bewegungsnerven und organischen Nerven.

I. Capitel. Von den sensitiven und motorischen Wurzeln der Rückenmarksnerven.

(Nach J. Mueller, Froriep's *Not. No.* 646. 647. *Annales des sciences naturelles.* 1831.)

Die Thatsache, dass dieselben Nerven am Rumpfe der Empfindung und der Bewegung zugleich vorstehen, und dass die eine dieser Functionen in einem Nerven zuweilen durch Lähmung aufgehoben wird, während die andere fortdauert, ist eines der wichtigsten Probleme der Physiologie. Charles Bell hatte zuerst den ingeniösen Gedanken, dass die hinteren, mit einem Ganglion versehenen Wurzeln der Spinalnerven der Empfindung allein, die vorderen Wurzeln der Bewegung vorstehen, und dass die Primitivfäden dieser Wurzeln nach der Vereinigung zu einem Nervenstamm für das Bedürfniss der Haut und der Muskeln gemischt werden. Diese Idee hatte er in einer nur für den Kreis seiner Freunde bestimmten Abhandlung, *an idea of a new anatomy of the brain submitted for the observation of the authors friends*, 1811 entwickelt. Eilf Jahre später trat Herr Magendie mit derselben Theorie auf. Allein Herr Magendie hat das Verdienst, diesen Gegenstand hinsichts der Rückenmarksnerven in die Experimentalphysiologie eingeführt zu haben. Magendie behauptete aus seinen Versuchen, dass nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln nur die Empfindung, nach Durchschneidung der vorderen Wurzeln die Bewegung in den entsprechenden Theilen aufhöre. Magendie's Resultate waren nur approximativ. Nach ihm sollten die hinteren Stränge des Rückenmarks und die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven vorzugsweise der Empfindung, die vorderen vorzugsweise der Bewegung vorstehen, obgleich nicht ganz ohne Empfindung seyn. So fand er auch, dass die Application des Galvanismus auf die vom Rückenmark abgeschnittenen hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven auch noch, aber nur schwache, Contractionen der Muskeln errege, während dieser Reiz auf die vorderen Wurzeln angewandt, heftige Zusammenziehungen bewirke. *J. de physiol.* 2. 276. Vergl. Desmoulins et Magendie *Anatomie et physiologie des systèmes nerveux. Paris*, 1825. *p.* 777. Diese Versuche sind bei höheren Thieren die

Digitized by Google

grausamsten, welche man erdenken kann. Die ungeheure Verwundung zur Eröffnung des Rückgraths in einer so grossen Strecke, um die Wurzeln aller Nerven, die zu den hinteren Extremitäten gehen, zu durchschneiden, ist an sich schon schnell lebensgefährlich, mit enormer Blutung verbunden, und der Tod des Thieres erfolgt unausbleiblich in kurzer Zeit, ehe man zu überzeugenden Resultaten gelangt ist. Welch grosses Erstaunen daher auch Bell's Theorem wiederum in den Versuchen von Magendie billig erregte, so blieb doch die gehörige Bestätigung dieser Versuche aus. Nur Béclard hat, aber auf eine zu oberflächliche und ungenügende Art, diese wichtige Frage bejahend entschieden, indem er sagt: *Les experiences de Mr.* Ch. Bell, *celles de Mr.* Magendie *et les miennes propres ont clairement démontré, que la racine postérieure des nerfs spinaux est sensoriale et la racine antérieure motrice. Elém. d'anat. gener. Paris* 1823. *p.* 668. Fodéra's Versuche waren mit so widersprechenden Symptomen begleitet, dass es unbegreiflich ist, wie er seine Versuche für eine Bestätigung von Magendie's Beobachtungen ausgeben konnte. Bellingeri erhielt ganz verschiedene Resultate, und schloss aus seinen Versuchen, dass die innere graue Substanz des Rückenmarks der Empfindung, die weisse faserige der Bewegung vorstehe, dass die vorderen Stränge des Rückenmarks und die vorderen Wurzeln der Flexion, die hinteren der Extension der Muskeln bestimmt seyen. In Deutschland sind diese Versuche mit Sorgfalt an vielen Thieren von Schoeps wiederholt worden. S. Meckel's *Archiv für Anat. und Physiol.* 1827. Allein die Resultate sind ganz zweifelhaft und schwankend ausgefallen. Auch ich hatte schon im Jahre 1824 diesen Versuch ohne Resultat bei meinem Aufenthalte zu Berlin vorgenommen. Neuerdings beschäftigt mit Untersuchungen über das Nervensystem, trieb mich die Begierde nach Wahrheit an, eine Reihe neuer Versuche nach einem veränderten Plane an Kaninchen anzustellen. Denn dass die bisherige Art der Versuche trügerisch ist, beweist der Umstand, dass viele Thiere, vorzüglich Kaninchen, durch die ersten Handgriffe des Experiments erschreckt und eingeschüchtert, ohne dass man bedeutende Verletzungen irgend einer Art vorgenommen hat, selbst bei den heftigsten Hautreizen, nicht einmal beim Zerquetschen und Zerschneiden der Haut irgend eine Schmerzensäusserung von sich geben. Wie kann man daher in der kurzen Zeit, wo ein Thier nach der Oeffnung des Rückgrats noch lebt, zuverlässig entscheiden, ob das Thier noch Empfindung hat oder nicht?

Ich wusste, das die geringste Zerrung eines angespannten Muskelnerven mit einer Nadel Zuckungen in den entsprechenden Muskeln erregt. Sind nun die hinteren Wurzeln der Spinalnerven bloss empfindend und nicht bewegend, so müssen sie beim Zerren mit der Nadel keine Zuckungen, die vorderen Wurzeln aber beim Zerren wirkliches Zucken bewirken; um die kleinsten Zuckungen zu bemerken, legte ich die Muskeln der hinteren Extremitäten bloss. Diese mehrfach wiederholten Experimente blieben, wenn man gewissenhaft seyn wollte, ohne Resultat, weil

Digitized by Google

durch die mit der Oeffnung des Rückgrats verbundenen Erschütterungen schon kleine Erzitterungen in den Muskeln eingetreten waren, welche alles fernere Experimentiren unzuverlässig machten. Nach so vielen vergeblichen Bemühungen, um das absolute Resultat zu erhalten, von welchem Herr Magendie spricht, fing ich an zu zweifeln. Ich verzweifelte an einem entscheidenden und zuverlässigen Resultate aller solcher Versuche. Haben doch Desmoulins und Magendie selbst nur gesagt, dass in dem einen Falle *fast alle Empfindung*, in dem andern Fall *fast alle Bewegung* aufhöre. In einem absoluten Resultate kann von einem halben Erfolge, von keinem *fast* keine Rede seyn. Ich sagte zu mir selbst: Das Theorem von Bell ist überaus ingeniös, allein es ist nicht bewiesen, Magendie hat es auch nicht genügend bewiesen, und es kann vielleicht bei höheren Thieren nie genügend bewiesen werden. Dieser Meinung, dass der gehörige Beweis fehle, war auch E. H. Weber (erster Band seiner vortrefflichen Ausgabe von Hildebrandt's *Anatomie. Braunschweig* 1830. *S.* 283.). Zu einem guten physiologischen Experiment gehört, dass es gleich einem guten physikalischen Versuche an jedem Ort, zu jeder Zeit, unter denselben Bedingungen dieselben sicheren und unzweideutigen Phänomene darbiete, dass es sich immer bestätige. Diess kann man von den bisherigen Versuchen zum Beweis des Bell'schen Lehrsatzes nicht sagen. Denn die Verletzung, die Entkräftung ist so gross, dass die Wahrscheinlichkeit des Irrthums grösser ist als die Wahrscheinlichkeit des Resultats. Ein Fehler, an dem so viele physiologische Experimente leiden.

Sollten aber nicht Experimente für oder gegen den Bell'schen Lehrsatz gefunden werden können, welche eben so zuverlässig sind, als die physiologischen Experimente von Haller, Fontana, Galvani, A. v. Humboldt?

Ich kam endlich auf den glücklichen Gedanken, Frösche zu den fraglichen Versuchen nach meiner eben erwähnten Methode anzuwenden, Thiere, welche ein sehr zähes Leben haben, die Oeffnung des Rückgrats lange überleben, deren Nerven die längste Zeit sensibel bleiben, und bei denen die dicken Wurzeln der Nerven für die hinteren Extremitäten eine sehr grosse Strecke im Kanale des Rückgrats getrennt verlaufen, ehe sie sich vereinigen. Diese Versuche sind mit dem glänzendsten Erfolge gekrönt worden; sie sind so leicht, so sicher, so entscheidend, dass sich jeder nunmehr schnell von einer der allerwichtigsten Wahrheiten der Physiologie überzeugen kann. Die Phänomene sind so constant und überraschend, dass diese Versuche an Einfachheit und Gewissheit des Erfolgs dem besten physikalischen Experimentum crucis an die Seite treten dürfen.

Zur Oeffnung des Rückgrats bediene ich mich einer an der Seite und an der Spitze scharf schneidenden Knochenzange. Diese Operation ist in einigen Minuten ohne alle Verletzung des Rückenmarks vollbracht. Die Frösche sind darauf ganz munter und hüpfen wie vorher herum. Man sieht nach Oeffnung des Rückgrats und der Häute sogleich die dicken hinteren Wur-

Digitized by Google

zeln der Nerven für die unteren Extremitäten. Man hebe die Wurzeln vorsichtig mit einer Staarnadel auf, ohne etwas von den vorderen Wurzeln mit zu fassen, und schneide sie an der Insertion am Rückenmarke ab. Nun fasst man das abgeschnittene Ende mit der Pincette und zerrt die Wurzel selbst wiederholt mit der Spitze der Staarnadel. Man wird sich bei jedem Versuch dieser Art, auch wenn man ihn unzählige Mal an einer Menge von Fröschen wiederholt, überzeugen, dass *auf die mechanische Reizung der hinteren Wurzeln niemals auch nur die entfernteste Spur einer Zuckung in den hinteren Extremitäten erfolgt.* Dasselbe kann man an den sehr dicken hinteren Wurzeln der Nerven für die vorderen Extremitäten mit demselben Erfolge wiederholen.

Nun hebe man eine der vorderen eben so dicken Wurzeln der Nerven für die Hinterbeine mit der Nadel aus dem Kanal des Rückgrats hervor. Schon bei der leisesten Berührung dieser Wurzeln erfolgen sogleich die allerlebhaftesten Zuckungen in der ganzen hintern Extremität. Man schneide auch diese Wurzeln vom Rückenmark dicht ab, fasse das abgeschnittene Ende mit der Pincette und zerre die angespannte Wurzel mit der Nadelspitze. Bei jeder Reizung erfolgen die lebhaftesten Zuckungen.

Durch Wiederholung dieser Versuche an einer grossen Zahl von Fröschen kann man sich überzeugen, dass es durchaus unmöglich ist, durch die hinteren Wurzeln der Spinalnerven bei Fröschen Zuckungen zu bewirken, dass dagegen die geringsten Reize auf die vorderen Wurzeln sogleich das Spiel der heftigsten Zuckungen bewirken.

So lange beiderlei Wurzeln noch mit dem Rückenmark verbunden sind, kann man durch zerrendes Aufheben der hinteren Wurzeln und die dadurch bewirkte Zerrung am Rückenmark selbst auch Zuckungen in den Hinterbeinen bewirken. Diese entstehen aber nicht durch die hinteren Wurzeln selbst, sondern durch das zugleich gezerrte Rückenmark, dessen Reizung durch die vorderen oder motorischen Wurzeln auf die Muskeln wirkt. Wenn daher vorher die vorderen Wurzeln durchschnitten worden, so kann die Zerrung des Rückenmarks oder der hinteren, noch mit dem Rückenmark zusammenhängenden Wurzeln auf keine Art die geringste Spur einer Zuckung erregen.

Eben so entscheidend sind die Versuche mit Anwendung des Galvanismus durch einfache Zink- und Kupferplatten.

Die Reizung der abgeschnittenen vorderen Wurzeln durch den Galvanismus bewirkt sogleich die heftigsten Zuckungen; die galvanische Reizung der hinteren Wurzeln bewirkt niemals eine Spur von Zuckung. Dieses Resultat ist äusserst merkwürdig und war mir ganz unerwartet: denn ich hatte mir gedacht, dass, wenn auch die hinteren Wurzeln bloss empfindend sind, sie doch fähig wären, das galvanische Fluidum bis zu den Muskeln zu leiten, und es ist sogar unvermeidlich, dass bei heftigem galvanischen Reize einer sehr starken Säule das galvanische Fluidum durch die hinteren Wurzeln so gut, wie durch jede thierische Substanz geleitet wird (so wie es in Magendie's Versuchen erging). Allein es ist ganz gewiss, dass der galvanische Reiz eines Plattenpaares

Digitized by Google

durch die hinteren Wurzeln nicht auf die Muskeln wirkt, durch die vorderen Wurzeln sogleich Zuckungen erregt, dass der mechanische Reiz einer Nadel bei den stärksten Zerrungen niemals eine Spur von Zuckungen durch die hinteren Wurzeln hervorruft, während die geringste Zerrung an den vorderen Wurzeln sogleich lebhafte Zuckungen bedingt. Bei der Anwendung des Galvanismus auf die hinteren Wurzeln muss man sich sehr hüten, dass die Platten irgendwo andere Theile berühren.

Die Art, wie Bell und Magendie den Bell'schen Lehrsatz zu beweisen suchten, lässt sich auch mit dem sichersten Erfolge bei Fröschen anwenden. Durchschneidet man bei demselben Frosch auf der linken Seite alle 3 hinteren Wurzeln, auf der rechten Seite alle 3 vorderen Wurzeln der Nerven für die Hinterbeine, so ist an dem linken Bein die Empfindung, an dem rechten Bein die Bewegung gelähmt. Schneidet man dann am rechten Bein, welches noch Empfindung, aber keine Bewegung hat, den Fuss ab, so zeigt der Frosch den grössten Schmerz in allen Theilen des Körpers durch Bewegungen, aber das rechte Bein selbst, an dem er doch den Schmerz fühlt, kann er nicht im geringsten bewegen. Schneidet man dagegen am linken Bein, welches keine Empfindung aber noch Bewegung hat, den Fuss ab, so fühlt es der Frosch gar nicht. Dieser Versuch ist wohl der überraschendste von allen, und giebt entscheidende Resultate, nicht halben Erfolg, weil man beim Frosch gewiss ist, die Wurzeln der Nerven des Hinterbeins sämmtlich zu durchschneiden, indem es nur sehr wenige, aber dicke Wurzeln sind.

Diess sind die Versuche, welche keinen Zweifel mehr an der Wahrheit des Bell'schen Lehrsatzes übrig lassen.

Ich bemerke noch, dass das Abschneiden der hinteren Wurzeln vom Rückenmark oft ganz deutlich mit Schmerzensäusserungen am Vordertheil des Rumpfs verbunden ist.

Bei den Versuchen, wovon bisher die Rede gewesen, wird der galvanische Reiz nur auf die Wurzeln, die vorher dicht am Rückenmark abgeschnitten worden, angebracht, indem man beide Pole auf das Wurzelende wirken lässt, und also einen galvanischen Strom durch die *Dicke* der Nervenwurzel erregt. Nun ist es bekannt, dass die Rumpfnerven, die aus der Verbindung der beiden Wurzeln entstehen, Zuckungen erregen, sowohl wenn sie selbst galvanisch irritirt werden, als wenn der eine Pol auf den Nerven, der andere Pol auf den Muskel wirkt, indem im ersteren Falle der galvanische Strom nur quer durch die Dicke der Nerven, im letzten Falle vom Nerven bis zum Muskel in der ganzen Länge des Nerven durchgeht.

Ich wünschte jetzt zu wissen, und jeder wird die Frage stellen, ob die hintere Wurzel, indem sie unfähig ist, bei der unmittelbaren Reizung Zuckungen zu erregen, zugleich unfähig ist, das galvanische Fluidum zu den Muskeln zu leiten, wenn die hinteren Wurzeln mit dem einen Pol, die Muskeln mit dem andern Pol in Verbindung gebracht werden. Hierdurch entstand eine Reihe interessanter Experimente, welche eben so constante Resultate gaben, wie die früher mitgetheilten Beobachtungen und

Digitized by Google

welche seitdem sehr oft wiederholt worden sind. Sämmtliche Versuche wurden an Fröschen angestellt. Die Wurzeln wurden immer nach der schon beschriebenen Weise vorsichtig und sanft mit der Nadel aufgehoben, und dicht am Rückenmark abgeschnitten, so dass sie nur mit ihren Rumpfnerven in Verbindung standen. Zur Isolation wurde immer eine Glasplatte untergeschoben und der ganze Frosch auf ein Stück Glas gelegt. Folgendes sind die constanten Resultate:

1) Wenn man die hinteren Wurzeln der Spinalnerven allein mit beiden Polen eines einfachen Plattenpaares in Verbindung bringt, so entsteht niemals die geringste Spur einer Zuckung.

2) Wenn man dagegen die hinteren Wurzeln mit dem einen Pol, einen Muskel der unteren Extremitäten mit dem andern Pol armirt, und also einen galvanischen Strom von der Wurzel bis zu dem Muskel leitet, so entstehen Zuckungen, und zwar bloss in den innerhalb des galvanischen Wirkungskreises gelegenen Muskeln.

3) Die vorderen Wurzeln bewirken, sowohl unmittelbar mit beiden Polen vereinigt, als mittelbar, indem der andere Pol auf die Muskeln wirkt, Zuckungen in allen Muskeln der Extremität, nicht bloss in dem galvanischen Wirkungskreise, sondern bis zu den Zehen herab.

4) Dasselbe erfolgt, wenn man die hinteren Wurzeln mit dem einen Pol, die vorderen Wurzeln mit dem andern Pol in Verbindung bringt.

Diese Versuche beweisen so bündig, als ein Schluss seyn kann, unumstösslich:

a. Dass die hinteren Wurzeln der Spinalnerven zwar nicht isoliren, sondern wie alle thierische Theile im nassen Zustande den galvanischen Strom passiv von einem zum andern Pole leiten.

b. Dass sie aber keine *motorischen* Kräfte oder Bewegungskräfte haben, und durch sich selbst keinen Muskel zur Bewegung bestimmen können.

c. Dass dagegen die vorderen Wurzeln nicht allein den galvanischen Strom wie alle thierischen Theile leiten, sondern dass sie auch, ohne dass ein galvanischer Strom durch sie auf die Muskeln geleitet wird, bei jeder unmittelbaren Reizung durch mechanische oder galvanische Reize eine *motorische*, nicht galvanische Kraft in der Richtung der Nervenverzweigung ausüben.

Ich werde nun zeigen, dass ein Nerv die eigene *motorische* Kraft verlieren kann, wenn er die Fähigkeit, den galvanischen Strom auf die Muskeln zu leiten, noch behält. Man quetsche einen Muskelnerven mit der Pincette, mechanischer und galvanischer Reiz über der gequetschten Stelle wirken nicht mehr; wohl aber, wenn der mechanische und galvanische Reiz unter der gequetschten Stelle zwischen dieser und dem Muskel applicirt wird. Dennoch ist ein gequetschter Nerv fähig, den galvanischen Strom zu den Muskeln zu leiten, und es entstehen Zuckungen, wenn der eine Pol auf das Ende des gequetschten Nerven, der andere Pol auf den Muskel wirkt. Die gequetschte Stelle ist also leitungsfähig.

Digitized by Google

Da nun endlich der geringste mechanische Reiz mit der Nadel oder einem nicht metallischen Körper, einem zugespitzten Federkiel, dieselben Wirkungen auf die Muskelnerven und die vorderen Wurzeln der Spinalnerven hervorbringt, wie der unmittelbare galvanische Reiz in einem transversalen Strom durch die Dicke des Nerven, nämlich Zuckungen in dem ganzen Gliede, so folgt:

a. Dass der unmittelbare galvanische Reiz beider Pole auf die vorderen Wurzeln nicht anders als der mechanische Reiz wirkt; dass der Galvanismus hierbei nicht als Galvanismus die nächste Ursache der Muskelcontraction ist, sondern dass der galvanische Reiz, eben so wie der mechanische, nur die *motorischen* oder *tonischen* Kräfte der tonischen Nerven zur Aeusserung erregt.

b. Dass die galvanische Kraft von der *motorischen* oder *tonischen* Kraft oder Spannkraft der Nerven verschieden ist, und sich zu dieser nur als heftiger Reiz verhält.

c. Es folgt ferner, dass es Nerven giebt, welche keine *motorischen* oder *tonischen* Kräfte besitzen, welche durch sich selbst niemals Zuckungen erregen können, mögen sie mechanisch oder galvanisch gereizt seyn, und welche den galvanischen Strom nur passiv leiten; dass es dagegen *motorische* oder *tonische* Nerven giebt, welche bei jeder unmittelbaren Reizung ihre tonische Kraft in der Spannung der Muskeln äussern, eine Spannkraft, welche immer in der Richtung der Verzweigung, niemals rückwärts wirkt. Denn es gehört nicht hieher, wenn galvanische Ströme auf andere Aeste durch nasse Theile übergeleitet werden.

d. Dass endlich die vorderen Wurzeln der Spinalnerven *tonisch*, die hinteren *nicht tonisch* sind.

Um den mitgetheilten neuen Erfahrungen noch ein grösseres Interesse zu geben, beschloss ich die galvanische Säule statt des einfachen Plattenpaares anzuwenden. Ich errichtete eine voltaische Säule von 34 Plattenpaaren, die Platten von etwas mehr als 4 Quadratzoll. Auch diese Versuche wurden an mehreren Fröschen wiederholt, und folgende constante Resultate gefunden.

1) Die hinteren Wurzeln der Spinalnerven für die unteren Extremitäten wurden vom Rückenmark abgeschnitten, das Ende dieser Wurzeln auf ein Glastäfelchen aufgelegt, und mit beiden Polen der voltaischen Säule in Verbindung gebracht. *Nie zeigte sich auch nur eine Spur einer Zuckung.* Ich wiederhole hier die Vorsichtsmaassregel, ja keine Fasern der vorderen Wurzeln mit zu fassen.

2) Die vorderen Wurzeln erregten unter denselben Umständen die heftigsten Zuckungen in der ganzen Extremität.

3) Brachten wir die hintere Wurzel mit dem einen Pol, die Muskeln des Oberschenkels mit dem andern Pol in Verbindung, so entstanden Zuckungen am ganzen Beine, vorzüglich aber innerhalb des galvanischen Wirkungskreises.

4) Die vorderen Wurzeln mit dem einen Pol, die Muskeln mit dem andern Pol armirt, bewirkten noch viel stärkere Zuckungen.

Digitized by Google

Ich wünschte nun zu wissen, ob die Wurzeln der letzten Spinalnerven, wenn sie in einiger Entfernung vom Rückenmark abgeschnitten werden, und wenn die noch am Rückenmark ansitzenden Anfänge der Wurzeln armirt werden, Zuckungen in den *vorderen* Theilen durch Vermittelung des Rückenmarks zu erregen im Stande sind. Die Resultate waren constant, aber unerwartet.

Weder die vorderen noch die hinteren Wurzeln bewirken, wenn sie allein einfach armirt werden, in rückwärts gehender Bewegung, Zuckungen an den vorderen Theilen des Rumpfs, z. B. am Kopf. Es scheint also, dass die Fasern der Nerven im Rückenmark nicht communiciren. Es entstanden aber Zuckungen, wenn die Wurzeln mit dem einen Pol, die entblössten vorderen Theile des Körpers mit dem andern Pole armirt wurden, was wieder durch die Leitung des galvanischen Stroms auf ferne motorische Nerven geschieht.

Endlich löste ich bei einem Frosch alle Wurzeln der Nerven am grössten Theile des Rückenmarks von hinten bis in die Gegend der Arme dicht am Rückenmark ab, so dass der hintere Theil des Rückenmarks frei emporgehoben und ein Glastäfelchen untergeschoben werden konnte. Das Rückenmarksende, mit beiden Polen verbunden, erregte Zuckungen in allen Theilen, welche noch mit dem Rückenmark in Verbindung standen. Aus diesen letzten Versuchen folgt, dass das Rückenmark nicht bloss das *Ensemble* der Rumpfnerven ist, wie ich vermuthet hatte, sondern dass es zwar einige Dinge mit den Nerven gemein hat, in einigen aber noch von ihnen verschieden ist. Denn die Wurzeln der Spinalnerven bewirken, unmittelbar gereizt, in rückwärts gehender Bewegung in den vorderen Theilen keine Zuckungen, wohl aber das Rückenmarksende.

Die vorzüglichsten der hier beschriebenen Versuche, nämlich die mit dem mechanischen Reiz und mit dem einfachen Plattenpaar, habe ich nun schon alle Jahre wiederholt, und sie haben mir immer dieselben unzweideutigen Resultate gegeben. So mache ich sie nicht allein regelmässig in den Vorlesungen über die Physiologie, sondern habe sie auch in Paris vor den Herren A. v. Humboldt, Dutrochet, Valenciennes, Laurillard, und ein andermal vor Herrn Cuvier, eben so in Heidelberg bei Herrn Tiedemann, in Bonn mit den Herren Weber und Wutzer, ebendaselbst mit Herrn Professor Retzius aus Stockholm wiederholt, der sie wieder mit gleichem Erfolg dort wiederholte. Gleichen Erfolg hatte die Wiederholung der Versuche durch Herrn Thomson in Edinburg, durch Herrn Stannius in Berlin (Heckr's *Ann. Dec.* 1832.). Die Versuche mit dem mechanischen Reiz haben Seubert (*de funct. rad. ant. et post. nerv. spin. Carlsruhae* 1833), und van Deen (*de differentia et nexu inter nervos vitae animalis et organicae. Lugd. Bat.* 1834.) mit Erfolg wiederholt. Die galvanischen Versuche mit der Säule sind Seubert nicht vollkommen gelungen. Statt zuerst mit einem Plattenpaare zu experimentiren, hat Seubert, gleichsam um es recht gut zu machen, mit 50 Plattenpaaren operirt. Nun ist es aber bekannt, dass man, um

Digitized by Google

locale Wirkungen zu erzeugen, bei Thieren nur mit ganz schwachen Apparaten experimentiren darf, indem man bei einiger Stärke des Apparats nicht mehr sicher ist, ob man bloss den durch die Pole berührten Theil galvanisirt, oder ob das durch alle nassen Theile leitungsfähige galvanische Fluidum auf andere Theile überspringt. Es ist daher kein Wunder, wenn Seubert in einigen Fällen beim Galvanisiren der hinteren Wurzeln der Frösche durch eine Säule von 50 Plattenpaaren doch Zuckungen entstehen sah; hätte er noch mehr Plattenpaare angewandt, so hätte er eben so gut Convulsionen des ganzen Frosches erzeugen können. Diese Betrachtung drängt sich sogleich bei einiger Kenntniss der Wirkungsart und Leitung des galvanischen Fluidums auf. Hätte derselbe mit einem einfachen Plattenpaare operirt, so würde er den unabänderlichen Erfolg gesehen haben, wie ich ihn jetzt schon so ausserordentlich häufig und nie mit irgend einer Aenderung gesehen habe. Nachdem nun Dr. Seubert mit dem einfachen Plattenpaare diesen Erfolg gesehen, hätte er zwei, dann drei, dann vier, dann fünf u. s. w. Plattenpaare nehmen müssen, bis er eine Höhe von 10—20—30 Paaren erreicht hätte; er würde dann die Grenze kennen gelernt haben, bis zu welcher er bei seiner Säule gehen durfte. Panizza's Versuche an Fröschen und Böcken mittelst Durchschneidung der Wurzeln bestätigen ebenfalls die Richtigkeit der Bell'schen Entdeckung. *Ricerche sperimentali sopra i nervi Pavia.* 4.

So definitiv nun die Verschiedenheit der vorderen und hinteren Wurzeln in Hinsicht der sensibeln und motorischen Eigenschaften erwiesen ist, so wenig ist dieser Unterschied in Hinsicht der vorderen und hinteren Stränge des Rückenmarks erwiesen. Ich habe diess schon in meinem französischen Memoire in den *Annales des scienc. natur.* 1831. bemerkt. Nach Seubert's Versuchen scheint die vordere Gegend des Rückenmarks vorzüglich, aber nicht allein, der Bewegung vorzustehen; die hintere vorzugsweise, aber nicht allein, der Empfindung. Die pathologischen Fälle, die man in Seubert's Schrift zusammengestellt findet, enthalten auch keine vollen Beweise jener Behauptung. Uebrigens ist es kaum möglich, über diese Frage genaue Versuche an Thieren anzustellen, indem man bei der Intention, auf die hinteren Stränge durch Schnitt zu wirken, ohne es zu wollen, durch Druck auf die vorderen wirkt.

II. Capitel. Von den sensitiven und motorischen Eigenschaften der Gehirnnerven.

Ohne hier schon in das Detail der Physiologie der einzelnen Gehirnnerven einzugehen, untersuchen wir dieselben hier in Hinsicht ihrer Uebereinstimmung oder Verschiedenheit im Vergleich mit den Rückenmarksnerven. Die Gehirnnerven können in folgende Classen gebracht werden.

1) Reine Sinnesnerven, die Nerven der höheren Sinne, Nervus olfactorius, opticus, acusticus.

Digitized by Google

2) Gemischte Nerven mit doppelten Wurzeln. Nervus trigeminus, Nervus glossopharyngeus (siehe oben p. 614.), Nervus vagus cum accessorio, bei mehreren Säugethieren auch Nervus hypoplossus (siehe oben p. 614.)

3) Vorzugsweise motorische Nerven mit einfacher Wurzel, welche entweder an sich motorisch, durch Verbindung mit sensitiven Nerven Empfindungsfasern erhalten, oder wenn sie schon sensorielle Fasern in ihren Wurzeln enthalten, sich nicht auf die doppelwurzeligen Rückenmarksnerven reduciren lassen. Nervus oculomotorius, trochlearis, abducens, facialis.

Unter diesen Nerven verdienen vorzüglich die beiden letzten Classen eine besondere Betrachtung.

Gemischte Hirnnerven mit doppelten Wurzeln.

Nervus trigeminus.

Dieser Nerve hat bekanntlich zwei Wurzeln, Portio major, welche in das Ganglion Gasseri anschwillt, und Portio minor ohne Ganglion; letztere geht an dem Ganglion vorbei zum dritten Ast. Die aus der gangliösen Portio major oder dem Ganglion Gasseri hervorgehenden Aeste des N. trigeminus, Ramus primus et secundus, sind wahrscheinlich bloss sensibel. Der dritte Ast des N. trigeminus, welcher zum Theil aus der nicht gangliösen Portio minor entspringt, und aus dem Ganglion Gasseri oder der Portio major sich verstärkt, ist motorisch und sensibel. Betrachten wir zuerst die Eigenschaften des ersten Astes, Ramus ophthalmicus. Von seinen Zweigen beurkundet sich der N. nasociliaris durch seine vorzugsweise Verbreitung in der Nase und am innern Augenwinkel, in der Conjunctiva und dem Saccus lacrymalis als sensibler Nerv. Der N. frontalis könnte dagegen für motorisch gehalten werden, weil er sich nicht allein in der Stirnhaut und der Haut des obern Augenliedes, sondern auch mit kleinen Zweigen in dem Musculus orbicularis palpebrarum, frontalis und corrugator supercilii verbreiten soll. Allein in denselben Muskeln verbreiten sich auch Zweige des N. facialis, und Ch. Bell hat wahrscheinlich gemacht, dass der N. frontalis nur sensibel ist, und der N. facialis die motorischen Zweige für jene Theile abgiebt. Bell durchschnitt bei einem Mann, der an Gesichtsschmerz litt, den N. frontalis. Diese Durchschneidung war sehr schmerzhaft. Dagegen wurde bei einem anderen Kranken der Musculus corrugator supercilii gelähmt durch eiterige Zerstörung des obern Astes vom N. facialis bei einem Geschwür vor dem äussern Ohr. Neuerlich berichtet Bell, dass er zwei oder drei Fälle von Krankheit des N. ophthalmicus beobachtet habe, wobei gänzliche Unempfindlichkeit des Auges, der Augenlieder ohne Verlust des Gesichts stattfand. Magendie's *Journal. T. X. p.* 9.

Der zweite Ast des N. trigeminus ist auch ganz sensibel, und enthält, wie sich sicher beweisen lässt, durchaus keine motorischen Fasern. Mehrere Zweige desselben zeigen sich als sensibel durch ihre Verbreitung in nicht muskulöse Theile, wie der

Digitized by Google

N. dentalis anterior (Ast des N. infraorbitalis) und posterior, N. vidianus, N. nasales, palatini, nasopalatinus Scarpae. Dass der N. subcutaneus malae und infraorbitalis auch sensibel sind, geht aus ihrer vorzugsweisen Verbreitung in der Haut hervor; und dass der N. infraorbitalis, der sich vielfach mit dem N. facialis verflechtet und selbst mehr durch als in die Gesichtsmuskeln verbreitet, keine motorischen Fasern enthält, kann sicher bewiesen werden. C. Bell *exposition du syst. nat. des nerfs.* 1825. Bell in Meckel's *Archiv. Bd. VIII. p.* 401. Magendie *Journal. Tom. II. p.* 66. C. Bell *physiol. und pathol. Untersuchungen des Nervensystems, übers. von* Romberg. *Berl.* 1832. Eschricht *de functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Hafn.* 1825. Ger. Backer *commentatio ad quaestionem physiologicam a facultate medica. acad. Rhenotraject. a.* 1828 *proposita. Traject. ad Rhenum* 1830.

Bell durchschnitt bei Thieren den N. infraorbitalis auf der linken Seite, den N. facialis auf der rechten Seite des Gesichts; hierauf folgte complete Unempfindlichkeit der linken Seite, Lähmung der Bewegung auf der rechten Seite. Die Durchschneidung des N. facialis erregte Zuckungen der Gesichtsmuskeln, die des N. infraorbitalis nicht. Bell durchschnitt bei einem Esel den N. infraorbitalis, bei einem andern Esel den Nervus facialis. Hier blieb die Sensibilität und verschwand die Muskelkraft; dort umgekehrt. Beim Esel brachte die mechanische Reizung des N. infraorbitalis heftige Schmerzen, aber keine Zuckungen hervor. Diese Versuche sind von Schoeps (Meckel's *Archiv* 1827. *p.* 409.) und mir (Froriep's *Not. Nr.* 647.) bestätigt worden. Bell hat einen pathologischen Fall beobachtet, wo ein Mann nach einer Verletzung des N. infraorbitalis die Empfindung in der Oberlippe verlor, ohne Verlust der Bewegung (Magendie *Journal de Physiol. Tom. X. p.* 8.). Bell hat sich indessen darin geirrt, wenn er glaubte, dass der N. infraorbitalis doch noch zur Bewegung der Oberlippe beim Ergreifen des Futters diene. Nach der Durchschneidung des N. infraorbitalis auf beiden Seiten wollte Bell bemerkt haben, dass der Esel das Futter nicht mehr mit den Lippen fasste, sondern bloss die Lippen auf den Boden drückte, um mit der Zunge das Futter zu fassen. Auch bemerkten Bell und Schoeps, dass nach der Durchschneidung des N. facialis auf einer Seite die Lippen doch noch auf beiden Seiten ihre Beweglichkeit beim Ergreifen des Futters geäussert haben. Diess hat zuerst Mayo berichtigt. *Anatom. and physiolog. comment. Lond.* 1822. *p.* 107. Mayo durchschnitt den Ramus infraorbitalis, worauf das Thier das Futter nicht mehr mit der Lippe ergriff, und sich der Lippe nur beschwerlich beim Kauen bediente; aber es konnte die Lippe öffnen, was Bell geläugnet hatte. Diese Phänomene glaubt Mayo mit Recht aus dem Verlust des Gefühls in den Lippen zu erklären, denn das Thier fühlte das Futter nicht mehr, wenn es auch dasselbe ergreifen konnte. Dass aber die Bewegung der Lippen von dem N. facialis abhängt, hat Mayo ausser Zweifel gesetzt. Denn nach dem Durchschneiden des N. facialis auf beiden Seiten erfolgte zugleich Lähmung aller Gesichtsmuskeln, auch der Lippen. Die Bewegung der Lippen auf

Digitized by Google

beiden Seiten, wenn die Durchschneidung des N. facialis bloss einerseits stattgefunden hat, erklärt Backer mit Recht aus dem passiven Mitbewegen der gelähmten Seite bei dem Zusammenziehen des Musc. orbicularis oris.

Meine eigenen Versuche über den N. infraorbitalis an Kaninchen sind folgende: Der N. infraorbitalis erregt, wenn man ihn auch noch so sehr mit einer Nadel reizt und zerrt, oder mit der Pincette quetscht, niemals eine Spur von Zuckung in den Muskeln der Schnauze. Ich schnitt den Nerven dicht an der Austrittsstelle durch, wobei das Thier ein sehr klägliches Geschrei und ungeheure Schmerzensäusserungen erhob. Das Ende des Nerven wurde mit beiden Metallplatten in Verbindung gebracht, nachdem der Nerv auf eine Glasplatte aufgelegt worden. Wir sahen keine Spur von Zuckungen in den entblössten Muskeln der Schnauze. Wohl aber entstanden Zuckungen, als der N. infraorbitalis mit der einen Platte, die Muskeln mit der andern Platte armirt wurden, weil in diesem Falle ein galvanischer Strom bis zu den Muskeln der Schnauze entstand und dort Zukkung erregte, an der der Nerv durch seine Kräfte keinen Antheil hatte. Als wir darauf auf das isolirte Ende des Nervus infraorbitalis beide Pole einer galvanischen Säule von 65 Plattenpaaren wirken liessen, zeigten sich bei Berührung an einzelnen Stellen des sehr breiten Nerven keine Zuckungen in den Muskeln der Schnauze, wohl aber bei der Berührung an anderen Stellen kleine Zuckungen, was uns unerwartet war und was man nur aus zwei Gründen erklären kann: 1. daraus, dass sich Aeste des Nervus facialis sogleich an den Nervus infraorbitalis an der Austrittsstelle anschliessen, und 2. daraus, dass bei einer starken galvanischen Säule das galvanische Fluidum nicht allein wie gewöhnlich den kürzesten Weg von einem zum andern Pol nimmt, sondern durch alle Leiter auch in Abwegen sich verbreitet. So erregt ein gequetschter Muskelnerv, über der gequetschten Stelle galvanisirt, keine Zuckungen mehr, weil die motorische Kraft unterbrochen ist; allein der Galvanismus wirkt hindurch auf das untere noch gesunde Stück, wenn man eine sehr kräftige Säule von 80—100 Plattenpaaren, und beide Pole über der gequetschten Stelle anwendet.

Es ist also aus den Versuchen von Bell, Schoeps, Mayo und meinen eigenen Beobachtungen bewiesen, dass alle Zweige des Ramus primus und secundus nervi trigemini, welche von der gangliösen Wurzel ausgehen, sensibel und nicht motorisch sind.

Der dritte Ast des N. trigeminus, welcher aus der Portio minor oder kleinen Wurzel und aus einem Theil der Portio major zusammengesetzt wird, ist offenbar motorisch und sensibel wie die Spinalnerven, nachdem sie aus einer gangliösen sensibeln, und einer nicht gangliösen motorischen Wurzel zusammengesetzt sind. Diess geht aus dessen Verbreitung hervor. Vergleicht man nun den N. trigeminus mit den Spinalnerven, so gleicht er ihnen auffallend in den beiden Wurzeln, beide haben eine gangliöse sensible und eine einfache motorische Wurzel; allein sie gleichen sich nicht mehr, sobald die Wurzeln zusammengetre-

Digitized by Google

ten sind. Denn in den Spinalnerven vermischen sich die Primitivfäden der sensiblen und der motorischen Wurzeln zu neuen Ordnungen von Nerven, welche motorische und sensible Fasern enthalten. Beim N. trigeminus dagegen bleibt der grösste Theil der sensiblen Portio major selbstständig, und der Ramus primus et secundus trigemini sind nur sensibel; nur der dritte Ast gleicht den Spinalnerven, indem er aus der Verbindung der motorischen Portio minor und eines Theils der sensiblen Portio major entsteht.

Der N. massetericus, temporalis profundus, buccinatorius, die Rami pterygoidei, N. mylohyoideus die Nerven des levator und tensor veli palatini und der Nerve des tensor tympani, welche unmittelbar oder mittelbar aus dem dritten Ast entspringen, sind offenbar motorische Nerven. Dass sie aber auch sensible Fasern enthalten, sieht man an den Zweigen, welche der N. massetericus dem Kinnbackengelenk giebt. Der untere hintere Theil des dritten Astes vom Nervus trigeminus enthält dagegen nur sensible Fasern. Der Nervus auricularis seu temporalis superficialis ist kein Muskelnerve, er verbindet sich mit dem Nervus facialis, sowohl mit dem Stamme als seinen Zweigen, und ertheilt diesem Nerven zum Theil die Sensibilität, die er ausser seiner motorischen Kraft besitzt. Der Ramus auricularis verbreitet sich bloss in empfindlichen Theilen, im äussern Gehörgang, äussern Ohr, in der Haut des Kopfes.

Der N. alveolaris inferior giebt den N. mylohyoideus nicht ab, sondern wie Bell bemerkt, haben der N. alveolaris und mylohyoideus gar keine Gemeinschaft, indem sie auf eine Strecke bloss parallel neben einander liegen bis zum Foramen alveolare. Der Stamm des Nerven ist aber offenbar nur sensibel durch die Zahnnerven und den Ramus mentalis. Dass letzterer Empfindungsnerve ist, beweist ein von Bell beobachteter Fall. Bei dem Ausreissen eines Zahnes wurde der N. mentalis mit verletzt und die Unterlippe empfindungslos (Magendie *Journal. T. X. p.* 8.). Dass der N. lingualis keine motorische Kraft besitzt, sondern Empfindungsnerve der Zunge ist, obgleich er sich auch in dem Zungenfleisch verbreitet, lässt sich ganz evident beweisen.

Schon Desmoulins bemerkt, dass, wenn man an einem Hunde den N. lingualis zerrt, das Thier schreit, aber die Zunge unbeweglich bleibt, dass, wenn man diesen Nerven nach dem Tode galvanisirt, die Zunge sich nicht bewegt. Ich habe diese Versuche bei Kaninchen während des Lebens angestellt. Der (vorher durchschnittene) N. lingualis bewirkt keine Spur einer Zukkung, wenn sein peripherisches Ende mit der Nadel gezerrt wird, und selbst dann nicht, wenn die beiden Pole einer galvanischen Säule von 65 Plattenpaaren auf ihn wirken. Wenn man aber einen Pol auf die Zunge, den andern auf den N. lingualis applicirt, so entstehen Zuckungen, weil der Nerve hier bloss ein feuchter thierischer Leiter des galvanischen Fluidums bis zu den Muskeln der Zunge ist. Frorief's *Not.* 647. Auch Magendie hat nach Durchschneidung des N. lingualis Empfindungslosigkeit der Zunge ohne Verlust der Bewegung bemerkt. Ich habe mich auch überzeugt, dass der N. lingualis Schmerz empfindet; dass

Digitized by Google

er auch Nerv des Geschmackes ist, wird später erwiesen. Aus allem bisher Angeführten geht hervor, dass der N. trigeminus durch seine grosse Wurzel der Empfindungsnerve des ganzen Vorder- und vordern Seitentheils des Kopfes (mit Ausschluss der eigentlichen Sinnesfunctionen des Geruchs, Gesichts, Gehörs), und dass er durch die Portio minor der motorische Nerve für alle Masticationsmuskeln ist. Daher hören nach der Durchschneidung des Stammes dieses Nerven in den Versuchen von Magendie alle diese Bewegungen und alle Gefühlsempfindungen am ganzen Kopf, Auge, Nase, Zunge auf, wie denn auch in Krankheiten des Stammes vom N. trigeminus oder seiner Wurzeln, derselbe Erfolg von Bell, Magendie, Serres beobachtet wurde. Nach der Durchschneidung dieses Nerven innerhalb des Schädels, die Magendie bei Kaninchen machte, und die Eschricht wiederholte, war die Empfindung an der ganzen Seite des Kopfes gelähmt. Die Nasenschleimhaut wie die Conjunctiva war unempfindlich, und Stiche und chemische Reize, wie Ammoniakflüssigkeit, brachten keine Schmerzen mehr hervor. Das Auge war trocken, die Iris zusammengezogen, das Nicken des Augenliedes hatte auf der kranken Seite aufgehört. Am folgenden Tage war das unverletzte Auge vom Reiz des Ammoniak entzündet, das gelähmte Auge nicht, und die Unempfindlichkeit hatte also die Ausbildung der Entzündung verhütet. In anderen Versuchen bewirkte die Durchschneidung des N. trigeminus nach mehreren Tagen Entzündung der Conjunctiva, Absonderung eiteriger Materie von den Augenliedern, im Auge selbst Iritis und Pseudomembranen, zuletzt zeigte sich Vereiterung des Auges. Das Zahnfleisch verdirbt und lockert sich auf, die Zunge wird auf der Seite der Verletzung weiss, und ihr Epithelium verdickt sich.

Die Gefühlsempfindung am Auge, z. B. in der Conjunctiva, ist wohl zu unterscheiden von den Gesichtsempfindungen, eben so wie die Gefühlsempfindung in der Nase, die sich durch Gefühl von Wärme, Kälte, Trockenheit, Kitzel, Jucken, Schmerz äussert, wohl von dem Geruch zu unterscheiden ist. Die Gesichtsempfindung hat in dem Auge nur durch den N. opticus statt, die Gefühlsempfindungen nur durch die Zweige des N. trigeminus; die Geruchsempfindung in der Nase hat eben so nur durch den Nerv. olfactorius, die Gefühlsempfindung nur durch die N. nasales vom N. trigeminus statt.

Nervus glossopharyngeus.

Aus den oben p. 614. angeführten Beobachtungen über ein an einem Theil der Wurzelfäden des N. glossopharyngeus befindliches Knötchen über dem Ganglion petrosum, geht hervor, dass auch dieser Nerve unter die gemischten gehört. Ich zeigte, dass sich die Wurzel dieses Nerven ganz wie die des trigeminus verhält, indem ein Theil davon in das Ganglion jugulare superius N. glossopharyngei anschwillt, während ein anderer Theil der Wurzel an dem Ganglion vorbeigeht. Damit stimmt auch seine Verbreitung überein. Denn er versieht theils den hintern Theil der Zungenschleimhaut, theils die Schlundmuskeln (namentlich den Musc. stylopharyngeus), und dass er motorische Kraft be-

Digitized by Google

sitzt, hat schon Mayo beobachtet, und ich sah bei einem Kaninchen noch nach dem Tode durch Galvanisiren dieses Nerven Zuckungen am Schlunde entstehen. Vergl. Mayo, Magendie *J. d. physiol.* 3. 355.

Nervus vagus cum accessorio Willisii.

Der N. vagus schwillt in seinem ganzen Stamme innerhalb des Foramen lacerum in ein Ganglion an; er verhält sich also hier wie eine blosse Empfindungswurzel; da er nun gleich nach dem Durchtritt durch das Foramen lacerum einen Theil des Nervus accessorius in sich aufnimmt, so liegt es bei dem jetzigen Zustande der Wissenschaft sehr nahe, anzunehmen, dass der N. vagus durch die Aufnahme eines Theils des N. accessorius seine motorischen Fasern für den Ramus pharyngeus und die N. laryngei erhält. Aber schon vor der Entdeckung von den Eigenschaften der Wurzeln der Spinalnerven, nämlich 1805 stellte Goerres den Vergleich der Wurzeln des vagus und accessorius mit den beiden Wurzeln eines Spinalnerven auf. Goerres *Exposition der Physiologie. Coblenz* 1805. *p.* 328. Diese Idee wurde auch in neuerer Zeit von Arnold und Scarpa ausgesprochen, der vagus einer hintern, der accessorius einer vordern Wurzel verglichen und Bischoff hat sie in seiner schätzbaren Schrift (*nervi accessorii Willisii anatomia et physiologia. Heidelb.* 1832.) weiter ausgeführt und mit neuen und wichtigen Gründen unterstützt. Die Gründe, die man dafür anführen kann, sind folgende: Der N. accessorius theilt sich unterhalb des Ganglion nervi vagi in einen äussern, dem Musc. sternocleido-mastoideus und cucullaris bestimmten Ast, und in einen innern, mit dem N. vagus zusammenfliessenden Ast. Aus dem Zusammenfluss des N. vagus und accessorius entsteht der Ramus pharyngeus nervi vagi, aber ein Theil des N. accessorius setzt sich tiefer im N. vagus verflochten fort, und Bischoff vermuthet, dass von diesem Antheil auch die N. laryngei, namentlich der Laryngeus inferior, ihre motorischen Fasern haben. (Bendz hat Fasern des accessorius bis in beide Nervi laryngei verfolgt.) Bei den Vögeln und Amphibien ist der N. accessorius auch noch vorhanden. Bojanus hatte ihn von der Schildkröte, Serres von den Vögeln beschrieben; Bischoff hat ihn bei mehreren Vögeln und Amphibien ausführlicher als einer seiner Vorgänger untersucht. Er entspringt bei den Vögeln nicht zwischen den hinteren und vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven, sondern über den hinteren Wurzeln aus den hinteren Rückenmarkssträngen, und reicht bis zum dritten Cervicalnerven. Aufwärts schliesst sich der Nerve dem N. vagus an, und schwillt mit den Wurzeln des N. vagus in das Ganglion nervi vagi an, so dass hier der Nerve ganz in den N. vagus übergeht, der dann wieder einen Zweig für die Halsmuskeln abgiebt, welcher dem äussern Ast des N. accessorius des Menschen entspricht; auch bei den Amphibien geht der N. accessorius ganz in den N. vagus über. Zu diesen anatomischen Gründen von Bischoff könnte man noch hinzufügen, dass der grösste Theil des N. vagus offenbar sensoriell ist, und die auf dem Magen sich verbreitenden Aeste bloss empfindlich seyn kön-

Digitized by Google

nen, indem es nicht möglich ist, durch Reizung des N. vagus am Halse der Thiere Bewegungen des Magens hervorzurufen. Unter den directen Experimenten von Bischoff für seine Ansicht ist nur eines von der Art, dass sich einigermassen zuverlässige Schlüsse daraus ziehen lassen. Er nahm bei einer Ziege einen Theil des Hinterhauptbeines weg, und durchschnitt alle Wurzeln des N. accessorius innerhalb der Schädelhöhle auf beiden Seiten. Schon beim Durchschneiden der Wurzeln auf einer Seite bemerkte er, dass die Stimme des beständig heulenden Thieres heiser wurde, und dass die Rauhigkeit der Stimme immer mehr zunahm, je mehr Wurzeln er auch auf der linken Seite durchschnitt. Nach Durchschneidung aller Wurzeln hörte die Stimme ganz auf; hircus omnem vocem amisit et summissum quendam ac raucissimum tantummodo emisit sonum, qui neutiquam vox appellari potuit. Diese letzte Bemerkung ist aber kein absoluter Beweis für die Hypothese. Diese Experimente müssen leider wiederholt werden, um über den interessanten Gegenstand ins Klare zu kommen. Ausserdem muss ebenfalls die von mir bei den Rückenmarksnerven angewandte Methode des mechanischen und galvanischen Reizes auf die Wurzeln hier versucht werden, um zu sehen, ob bei einem frisch getödteten Thier der mechanische und galvanische Reiz, auf den N. accessorius in der Schädelhöhle noch applicirt, Zuckung des Schlundes verursacht, und ob der N. vagus unter denselben Umständen nicht auch Zuckungen des Schlundes verursacht. Ich habe selbst einmal den Versuch auf diese Art angestellt. Um so schnell wie möglich zu diesen Wurzeln zu kommen, wurde an einem grossen lebenden Hunde, dem man vorher den Schlund blossgelegt hatte, der Schädel aufgesägt, auch der Bogen des ersten Halswirbels mit einer Knochenzange weggebrochen, darauf das kleine Gehirn abgetragen, bis man die Wurzeln des N. vagus und accessorius vor sich hatte; diese wurden von der Medulla oblongata abgeschnitten, und nun wurde die Wurzel des N. vagus sowohl mechanisch, als mit einem einfachen galvanischen Plattenpaar gereizt. Bei der mechanischen und galvanischen Reizung des N. vagus entstand ganz deutlich eine Zusammenziehung im Schlunde. Dieser Versuch spricht gegen die Theorie, indess bin ich selbst wieder misstrauisch dagegen geworden. Denn es kömmt darauf an, dass man bei dem Reizen der Wurzel des N. vagus mit der grössten Vorsicht alle Wurzelfaden des N. glossopharyngeus ausschliesst. Indessen lässt sich bei Wiederholung dieser Versuche nach der von mir angegebenen Methode bald die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Hypothese entscheiden. So Vieles für diese Ansicht aus den vorher angeführten schätzbaren Beobachtungen von Bischoff auch spricht, so darf man doch einige anatomische Gründe dagegen sich nicht verschweigen. Der erste ist der Ursprung des N. accessorius mehr aus dem hintern als vordern Theile des Rückenmarks, namentlich ganz bei Vogeln und Amphibien. Doch würde diess kein vollgültiger Einwurf seyn, da, was von den Wurzeln der Rückenmarksnerven gilt, von den Rückenmarkssträngen durchaus nicht ausgemacht ist, überdiess der N. accessorius deut-

Digitized by Google

licher Muskelnerve ist. Ein anderer wichtigerer Einwurf gegen jene Theorie liegt in der öfter stattfindenden Beziehung des N. accessorius zu den hinteren Wurzeln der Halsnerven. Mayer sah einmal ein kleines Ganglion an einem Faden der hinteren Wurzel des zweiten und des dritten Halsnerven, welches sich durch einen Faden mit dem N. accessorius verband. Mayer sah auch zuweilen die hintere Wurzel des ersten Halsnerven mit dem N. accessorius in Verbindung. *Act. nat. cur. Vol. XVI. p.* 2. Interessant ist besonders der von mir beobachtete Fall, wo der N. accessorius ganz allein die hintere Wurzel des ersten Halsnerven abgab, und sich an der Abgangsstelle dieser Wurzel an der letztern ein Knötchen zeigte. Mueller's *Archiv für Anat. und Physiol.* 1834. *p.* 12. und 1837. *p.* 279. Am N. accessorius sah Hyrtl auch öfter dann ein Knötchen, wenn dieser Nerve die hintere Wurzel des ersten Halsnerven nicht aufnimmt; es lag dann immer am Eintritt der art. vertebralis in die Schädelhöhle; auch hat Remak neulich in einem einzigen Fall ein Knötchen am N. accessorius bei seinem Durchtritt durch das Foramen lacerum beobachtet und mir gezeigt. Derselbe sah einen Theil der Fasern des Vagus an seinem Ganglion beim Kaninchen vorbeigehen. Dass der N. accessorius immer sensorielle Elemente enthalte, behaupte ich nicht, sondern lasse es ungewiss. In jedem Fall aber, wo der accessorius ein näheres Verhältniss zur hintern Wurzel des ersten oder irgend eines andern Spinalnerven eingeht, muss man eine solche Einmischung vermuthen, wie ich sie in dem oben erwähnten Fall speciell anatomisch nachgewiesen habe, und es wird in demselben Grade die Idee von Monro wahrscheinlich, dass die Verbindung des N. accessorius mit der hintern Wurzel des ersten und zweiten Halsnerven diesem Nerven ein Aequivalent für eine hintere Wurzel sei. Monro *Bemerkungen über die Structur und die Verrichtungen des Nervensystems. Leipz.* 1787. Unsere Ansicht von beiden Nerven ist diese: Der Nervus vagus entspricht grösstentheils der hintern Wurzel eines Spinalnerven; dass er ihr in allen Fällen ganz entspreche, lässt sich nicht sicher behaupten, da ein schon angeführter Versuch dafür spricht, dass die Wurzel des vagus auch motorische Elemente enthalten kann und bei einigen Thieren ziemlich starke Fascikel von Fasern seiner Wurzel am Wurzelganglion des vagus vorbeigehen. Leicht kann das Verhältniss umgekehrt wie beim hypoglossus seyn, der nur grösstentheils ein motorischer Nerve ist. Der Nervus accessorius ist wahrscheinlich grösstentheils motorischer Nerve und entspricht anatomisch mehr einer ganglienlosen vordern Wurzel eines Spinalnerven, enthält aber offenbar in vielen Fällen sensorielle Fasern (vielleicht immer) durch sich selbst oder durch die Verbindung mit der hintern Wurzel des 1. und 2. Halsnerven. Vergl. Bendz *de connexu inter vagum et accessorium. Havniae.* 4. Mueller's *Arch.* 1837. *Jahresb. XXIII.*

Nervus hypoglossus.

Beim Ochsen und einigen anderen Säugethieren, wo die von Mayer entdeckte kleine hintere gangliöse Wurzel des N. hypoglossus vorkömmt, gehört auch dieser unter die gemischten

Digitized by Google

Nerven mit doppelten Wurzeln, obgleich er beim Menschen seinen Wurzeln nach meist nur motorisch ist, und erst auf dem Wege seiner Verbreitung durch Verbindungen sensible Fäden aufnimmt. Bedenkt man nun, dass die gewöhnlichen Wurzeln dieses Nerven in einer Reihe mit den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven entspringen, dass er bei einigen Säugethieren eine hintere Wurzel hat, dass die hintere Wurzel des auf ihn folgenden ersten Halsnerven zuweilen fehlt, und dieser dann ausnahmsweise dem N. hypoglossus gleicht, während sich der N. hypoglossus des Ochsen dem gewöhnlichen Verhalten des ersten Halsnerven ausnahmsweise nähert, so ist es unzweifelhaft, dass der N. hypoglossus trotz seinem Durchgang durch eine im Schädel selbst gelegene Oeffnung doch gleichsam als der erste Spinalnerve zu betrachten ist, der nur noch mehr als der erste Halsnerve und die untersten Spinalnerven von den übrigen Spinalnerven abweicht.

Hauptsächlich ist dieser Nerve motorisch, wie aus Magendie's, Mayo's und meinen Versuchen an Kaninchen hervorgeht. Froriep's *Not.* 647. Wenn man nämlich den N. hypoglossus zerrt, quetscht oder mit einem einfachen Plattenpaar galvanisirt, entstehen die heftigsten Zuckungen in der ganzen Zunge bis an die Spitze. Die Section des N. hypoglossus an einem lebenden Thiere paralysirt die Bewegungen der Zunge. Dieser Nerve ist also die Ursache der Schlingbewegungen der Zunge und der articulirten Sprachbewegungen, so weit sie von der Zunge abhängen. Seine Wirksamkeit dehnt sich aber nicht bloss auf die Zunge aus, er ist auch der Nerve der grossen Kehlkopfmuskeln.

Dass der N. hypoglossus auch Sensibilität besitzt, behaupten Desmoulins, Magendie und Mayo, indem er gezerrt bei Hunden und Katzen Schmerz verursache. Bei Hunden kann diess von der hier vorhandenen kleinen hintern Wurzel desselben herrühren. Bei der Katze hat Mayer diese hintere Wurzel nicht gefunden; hier kann die Sensibilität desselben von Empfindungsfasern herrühren, die er von anderen Nerven auf seinem Verlaufe aufnimmt, wohin die Verbindungen desselben mit dem Ganglion im Stamme des Nervus vagus und mit den ersten Halsnerven zu rechnen sind.

Vorzugsweise motorische Nerven, welche auf ihrem Wege Empfindungsfasern durch Verbindungen mit anderen Nerven aufnehmen, oder zugleich Empfindungsfasern in ihrer nicht gangliösen Wurzel enthalten.

Augenmuskelnerven. N. oculomotorius, trochlearis, abducens.

Die Augenmuskelnerven haben zugleich einige Empfindung, wie sie den Muskeln überhaupt eigen ist. In anderen Muskeln kann die Empfindung von dem Antheil sensorieller Fasern der hintern Wurzeln abgeleitet werden, welche zugleich zu den Muskeln hingehen. Bei den Augenmuskeln fällt indess diese Erklärung weg. Jedermann ist bekannt, dass heftige Bewegungen in den Augenmuskeln mit dem Gefühl einer unangenehmen Span-

Digitized by Google

nung in denselben begleitet sind. Rühren diese Empfindungen von einigen sensoriellen Fasern her, welche die motorischen einfachen und ganglienlosen Wurzeln der Augenmuskeln zugleich enthalten, oder werden ihnen diese Empfindungsfasern auf ihrem Wege erst zugemischt? Schon öfter und auch von mir wurde eine Verbindung des Nervus trochlearis mit dem ersten Ast des trigeminus beobachtet. Ich sah beim Kalb ein Zweigelchen vom 1. Ast des Trigeminus auf den Stamm des Oculomotorius übergehen. Ungewiss ist, ob aus der sensoriellen langen Wurzel des ganglion ciliare a nervo nasali Empfindungsfasern nicht bloss auf die Ciliarnerven, sondern auch auf die kurze Wurzel und auch so auf den oculomotorius übergehen. Zum Nervus abducens würde man jedenfalls keine Empfindungsfasern, aus anderen Nerven ableiten können. Unter diesen Umständen muss es unentschieden bleiben, woher diese Nerven diejenigen Fasern haben, wodurch sie zugleich empfindlich sind.

Nervus facialis.

Der N. facialis ist der eigentliche Bewegungsnerve aller Gesichtsmuskeln (mit Ausnahme der Kaumuskeln), des Musc. occipitalis, der Ohrmuskeln, des Musc. stylohoideus, des hinteren Bauches vom Musc. digastricus maxillae inf. (der vordere Bauch wird vom N. mylohoideus aus dem dritten Ast des N. trigeminus versehen), und des platysma myoides. Bei den Vögeln scheint er sich bloss im Musc. styloglossus und Hautmuskel des Halses zu verbreiten. Nach der Durchschneidung des N. facialis bei Thieren sind die Gesichtsmuskeln sammt und sonders gelähmt. Die Augenbraunen werden nicht mehr erhoben, die Augen nicht mehr geschlossen, die Ohrmuskeln sind gelähmt, die Schnauze hängt unbeweglich etc. Diese Versuche sind von Bell, Mayo, Schoeps, Backer, von mir und Andern angestellt worden. Backer bemerkte nach Vergiftung mit Nux vomica, dass nach Durchschneidung des N. facialis sogleich die Gesichtsmuskeln ruhig wurden, während die übrigen Muskeln ihre Krämpfe fortsetzten. Die Versuche, welche ich über die Kräfte dieses Nerven angestellt habe, sind in Fronier's *Notizen*, 648. erzählt. Wenn ich den Nervus facialis mit der Nadel reizte oder mit der Pincette quetschte, so entstanden die lebhaftesten Zuckungen in den Muskeln des Gesichts, je nach den verschiedenen Aesten, welche gereizt wurden, in der Schnauze, in den Augenliedern. Dasselbe erfolgt, wenn man mit einem einfachen Plattenpaar den Nerv. facialis galvanisirt. Der Nerv. facialis ist also motorischer Nerv aller Gesichtsmuskeln; pathologische, von Bell beobachtete Fälle bestätigen diess. Ein Mann erhielt einen Pistolenschuss, die Kugel drang in das Ohr und verletzte den N. facialis an seinem Ursprunge. Es erfolgte Verlust der Bewegung des Gesichts derselben Seite, ohne Verlust der Empfindung. Der zweite Fall betrifft einen Mann, der durch das Horn eines Ochsen an dem Austritte des N. facialis verletzt wurde. Die ganze Seite des Gesichts ist unbeweglich, die Augenlieder dieser Seite bleiben offen, der Mundwinkel verzogen, der Nasenflügel beim tiefen Ath-

Digitized by Google

men unbeweglich, die Gesichtsmuskeln sind auf dieser Seite endlich atrophisch geworden. Die Sensibilität fehlt bei diesem Manne in den gelähmten Theilen nicht. Der N. facialis wurde bei der Exstirpation einer Geschwulst vor dem Ohre getheilt. Derselbe Erfolg. Bell in Magendie's *Journal. T. X. p.* 7.

Bell hatte geglaubt, verschiedene Muskeln des Gesichts, z. B. der Lippen, der Schnauze, könnten in Hinsicht der physiognomischen Bewegungen gelähmt seyn, während die Kaubewegungen dieser Muskeln fortdauern, und umgekehrt, und leitete diess davon ab, dass diese Muskeln Aeste vom N. infraorbitalis und vom facialis erhielten. Der N. infraorbitalis hat indess keine Spur von motorischer Kraft, und die Muskeln sind nach Lähmung des N. facialis für jede Art der Bewegung gelähmt, ausser den eigentlichen Kaumuskeln, die aber dem N. facialis überhaupt nicht unterworfen sind, sondern von der motorischen Portio minor des N. trigeminus abhängen.

Bisher haben wir den N. facialis als motorischen Nerven betrachtet, als welchen ihn Bell ansah, so dass er diesen Nerven für allein motorisch und nicht für sensibel hielt. Er ist aber bei seiner Bewegungskraft zugleich sehr sensibel.

Schoeps sah die Section des N. facialis beim Kaninchen schmerzlos, bei der Katze aber sehr schmerzhaft. Allein hier muss sich Schoeps geirrt haben, denn die Durchschneidung des N. facialis ist nach meinen Versuchen an Kaninchen überaus schmerzhaft, so dass die Thiere sehr schreien, wenn der Nerve durchschnitten wird. Auch Magendie fand die Section des N. facialis mehr oder minder schmerzhaft. Mayo bemerkte eine geringe Sensibilität am N. facialis des Esels, eine sehr ausgezeichnete dagegen beim Pferd, Hund, Katze. Auch Backer fand die Section bei Katzen durchaus schmerzhaft. l. c. p. 64. Eben so Eschricht. Ob nun aber die sensiblen Fasern des N. facialis ihm selbst von seinem Ursprung an eigenthümlich, oder ob er sie von seinen zahlreichen Verbindungen mit dem N. trigeminus (nämlich mit dem N. temporalis superficialis, subcutaneus malae, infraorbitalis, mentalis) her hat, ist eine andere Frage. Diese Frage hatte Eschricht zum Vortheil der letztern Ansicht entschieden. Eschricht durchschnitt den N. trigeminus in der Schädelhöhle; der N. facialis war hierauf noch schmerzhaft. In einem zweiten Versuche durchschnitt er den linken N. trigeminus; der N. facialis hatte keine Empfindung mehr, während er auf der gesunden Seite noch Empfindung hatte. In einem dritten Versuche durchschnitt Eschricht den N. trigeminus sinister, und bemerkte am vorderen Theil des N. facialis sinister keine Empfindung, wohl aber am hinteren Theil des N. facialis unter dem aussern Gehörgange. Hieraus und aus einem ähnlichen Versuch schloss Eschricht, dass der N. facialis nach Durchschneidung des N. trigeminus in seinem vordern Theile unempfindlich werde, in seinem hintern Theile aber die Empfindung behalte. Dass die Verbindung mehrerer Zweige des N. facialis mit Zweigen des N. infraorbitalis nicht dem N. facialis die Empfindung nach rückwärts mittheile, beweist ein ganz guter einfacher Versuch beim

Digitized by Google

Hunde von Gaedechens, der nach Durchschneidung der Aeste des N. facialis, die sich mit dem N. infraorbitalis verbinden, diesen noch ganz empfindlich fand. Derselbe durchschnitt ferner beim Hunde einen ansehnlichen Ast des N. facialis, der sich mit dem N. infraorbitalis verband; dieser Ast war an dem Stück, welches vom N. facialis getrennt war, unempfindlich, hatte also seine Empfindung nicht vom N. infraorbitalis, mit dem er noch zusammenhing, sondern vom N. facialis selbst, oder von Verbindungen des N. facialis mit Aesten des N. trigeminus, die viel weiter nach hinten liegen, wie z. B. vom N. temporalis superficialis, der sich mit dem N. facialis schon vor und unter dem äussern Ohr verbindet.

So viel ist aus den Versuchen von Eschricht gewiss, dass der N. facialis nicht alle Empfindungsfasern vom N. trigeminus hat. Diess haben Einige dadurch zu erklären gesucht, dass der N. facialis selbst durch verschiedene Wurzeln zweierlei Fasern enthalte und unter die gemischten Nerven gehöre. Man hat die Portio intermedia Wrisbergi an der Wurzel des N. facialis in diesem Sinne betrachtet, und die Anschwellung am Knie des N. facialis für ein Ganglion eines Empfindungsnerven angesehen. Gaedechens *nervi facialis physiologia et pathologia. Heidelb.* 1832. Indessen die Anschwellung des Nervus facialis am Knie desselben wird an der Zutrittsstelle von Zweigen, die mit dem N. sympathicus zusammenhängen, auf ähnliche Weise wie das Ganglion sphenopalatinum am zweiten Ast des trigeminus gebildet. Zum Knie des Facialis treten der N. petrosus superficialis major, minor und der von Bidder entdeckte petrosus superficialis tertius. Siehe Mueller's *Archiv.* 1837. *Jahresbericht XXVI.* Die blosse Existenz der portio intermedia Wrisbergi beweist noch nicht eine sensorielle besondere Wurzel, dazu gehört nothwendig ein Knoten an diesem Theile der Wurzel; denn wollte man jedes Wurzelbündel eines Nerven für eine Wurzel eigener Art halten, so würde man dem N. accessorius mehrere, sogar viele Functionen, dem N. hypoglossus in vielen Fällen zwei, dem N. olfactorius drei Functionen zutheilen müssen.

Wir werden daher darauf angewiesen, anzunehmen, dass der N. facialis entweder an seinem Ursprunge noch durchaus einfach und bloss motorisch ist, oder dass er sensible Fäden schon vom Gehirn an enthält, ohne eine besondere sensible Wurzel zu haben. Die letztere Annahme ist nicht nothwendig. Es lässt sich sogar mit Bestimmtheit die Quelle anzeigen, woher der Rest von Empfindlichkeit kommt, welchen der N. facialis unter dem äussern Gehörgang noch hat, selbst dann, wenn der N. trigeminus im Stamme durchschnitten worden ist. Diess ist nämlich eine Verbindung eines Zweiges des N. vagus mit dem Stamme des N. facialis im Fallopischen Kanal, eine Verbindung, die beim Menschen sowohl als bei Thieren vorkömmt. Diese merkwürdige Zusammensetzung des N. facialis, welche Alles vollkommen erklärt, ist zuerst beim Menschen von Comparetti (*de aure interna. Patavii* 1789. *p.* 109. 133.) entdeckt und auch von Cuvier beim Kalb beschrieben worden. *Vergl. Anat., übers. von* Meckel. 2. *p.* 227.

Digitized by Google

Der N. vagus giebt nämlich unter spitzem Winkel einen starken Ast durch einen besonderen Knochenkanal zum N. facialis; dieser Ast geht mit einem Zweig geradezu in den N. facialis über; mit der Fortsetzung des Astes verbreitet er sich am äussern Ohr. Dieser Nerve, den wir beim Kalb sowohl als beim Menschen gesehen haben, ist offenbar die Hauptursache der Empfindlichkeit des N. facialis.

III. Capitel. Von den sensitiven und motorischen Eigenschaften des Gangliennerven.

1) *Der Gangliennerve hat Empfindung.* Einige Beobachter haben diesem Nerven die Fähigkeit, Empfindungseindrücke zu leiten, abgesprochen. Bichat hat das Ganglion coeliacum des Hundes mechanisch und chemisch gereizt, ohne Schmerz zu erregen. Dupuy schnitt den Thieren das Ganglion cervicale inferius, ohne dass sie Schmerz empfanden, aus. Auch Wutzer konnte an den Lendenknoten eines Hundes keinen Schmerz erregen. *De gangl. fabrica. Berol.* 1817. Damit stimmen auch die Beobachtungen von Magendie und Lobstein überein. Dagegen hat Flourens bei solchen Versuchen immer mehr oder weniger deutliche Zeichen des Schmerzes beobachtet. *Versuche über das Nervensystem. p.* 181. Brachet sah bei seinen Versuchen bald Schmerzensäusserungen, bald nicht. *Recherches sur les fonctions du syst. nerveux ganglionaire. Paris* 1830. *p.* 307. Auch Mayer hat beobachtet, dass beim Durchschneiden des Ganglion cervicale supremum, so wie bei Reizung des Plexus solaris, die Thiere deutliche Schmerzensäusserungen von sich gaben. *Act. nat. cur. XVI. p.* 2. Diesen letzteren Naturforschern muss ich nach meinen Beobachtungen durchaus beistimmen. Ich sah nicht allein mehrmals bei mechanischer und chemischer Reizung des Ganglion coeliacum bei Kaninchen deutliche Zeichen des Schmerzes, sondern habe auch bei den mit Dr. Peipers angestellten, p. 468. erwähnten Versuchen beim Unterbinden der Nierennerven immer ganz deutliche Zeichen eines lebhaften Schmerzes beobachtet. Deutlicher noch als Versuche beweisen die krankhaften schmerzhaften Empfindungen in den allein vom Gangliennerven versehenen für die Empfindlichkeit dieses Nerven. Ich muss E. H. Weber vollkommen beistimmen, wenn er sagt: ich meines Theils halte die alltäglichen Beobachtungen über die Schmerzen in diesen Theilen, welche unempfindlich seyn sollen, für beachtenswerther als jene Experimente. Hildebrandt's *Anatomie.* 3. 355. Gleichwohl sind die Empfindungen in den vom Gangliennerven versehenen Theilen ungleich schwächer und dunkler als in allen anderen Theilen; denn wir empfinden selten die sehr kalt oder heiss genossenen Speisen im Magen, oder eben so wenig bringen heftige Reize der äussern Haut, wie Senf, Meerrettig etc., in diesen Theilen Empfindungen hervor, und nur sehr heftige Eindrücke können die ganze Empfindungskraft dieser Theile so stark, wie in anderen Organen aufregen, was man durch die Reil'sche

Digitized by Google

Hypothese erklärt hat, dass die Ganglien die Natur eines Halbleiters haben, gewöhnlich die Leitung schwächerer Eindrücke verhindern, und nur bei grosser Intensität der Reizung die Leitung zulassen. Obgleich diese Ansicht sich nicht streng beweisen lässt, so scheint doch eine Beobachtung von Brachet (a. a. O. p. 307.) dafür zu sprechen. Brachet will nämlich an einem lebenden Schaf die Ganglia thoracica des Ganglionnerven gereizt haben. Er durchschnitt die Rippenknorpel der rechten Seite, ziemlich nahe am Brustbein, hielt die Lunge gegen das Sternum und erkannte nun die Ganglia thoracica des Ganglionnerven zu den Seiten der Wirbelsäule. Brachet beobachtete keine Schmerzenszeichen, wenn er die Ganglien oder den Grenzstrang zwischen diesen Ganglien stach; als er aber einen Ramus communicans des Ganglionnerven mit einem Spinalnerven reizte, entstanden deutliche Schmerzenszeichen, was er in wiederholten Versuchen wiedersah. Auch beobachtete derselbe, dass Ganglien, welche anfangs unempfindlich schienen, durch öftere Reizung empfindlich wurden.

2) *Der Ganglionnerve besitzt motorischen, aber unwillkührlichen Einfluss auf die von ihm versehenen Theile.* Da die Zusammenziehungskraft der Muskeln, wie aus meinen und Sticker's Versuchen hervorgeht, von ihrer Wechselwirkung mit den Nerven abhängt, einige Zeit nach der Durchschneidung ihrer Nerven, wenn diese unverheilt sind, so gut wie die Nervenreizbarkeit vergeht, so folgt, dass auch die Zusammenziehungen der unwillkührlichen Muskeln unter der Herrschaft der Nerven stehen müssen, und nicht wie Haller glaubte, ihnen als Muskel selbst eigen sind. Wir besitzen auch einige directe Beweise vom motorischen Einfluss des Ganglionnerven auf die Muskeln. A. v. Humboldt hat durch Galvanisiren der N. cardiaci bei Säugethieren Bewegungen des Herzens hervorgerufen. Da diese Versuche noch mit dem einfachen galvanischen Reize angestellt waren, so haben dieselben allerdings einen hohen Werth. Auch Burdach sah Verstärkung des Herzschlages eines getödteten Kaninchens, als er das Halsstück des Ganglionnerven oder das untere Halsganglion armirte. *Physiol.* 4. 464. Ebenderselbe hat bei einem getödteten Kaninchen durch Betupfen des Ganglionnerven mit caustischem Kali oder ätzendem Ammonium den Herzschlag wieder beschleunigt, was mir nicht gelingen wollte. Wutzer sah, als er das zweite Ganglion lumbare, das durch untergelegtes Glas isolirt war, durch die Pole einer Säule armirte, alle Theile des Unterleibes und selbst die Schenkelmuskeln dieser Seite in Zittern gerathen (a. a. O. p. 127.), und ich selbst sah, als ich den N. splanchnicus eines Kaninchens durchschnitt, das peripherische, mit dem Darmkanal verbundene Stück auf einer Glasplatte isolirte, und mit einer Säule von 65 Plattenpaaren armirte, die peristaltischen Bewegungen des ganzen Darms lebhafter werden, und als sie schon aufgehört hatten, sich wieder erneuern. Die letzten Versuche von Wutzer und mir beweisen eigentlich nicht viel und sind fehlerhaft, weil die galvanische Action zu stark war; in diesem Falle kann das galvanische Fluidum durch einen Ner-

Digitized by Google

ven als durch einen blossen nassen Leiter bis zu dem beweglichen Theile, dem Darm, fortgepflanzt werden, und es ist eben so gut, als wenn man den Darm selbst galvanisirt hätte. In Wutzer's Fall sprang sogar das galvanische Fluidum, nicht das Nervenprincip, auf die Schenkelnerven oder den Plexus lumbalis und sacralis über. Einen sicheren Beweis für den motorischen Einfluss des Ganglliennerven liefert ein von mir öfter mit gleichem Erfolg angestellter Versuch am Ganglion coeliacum des Kaninchens. Wurde die Bauchhöhle eines Kaninchens geöffnet, worauf die Bewegungen des Darms an der Luft sehr lebhaft werden, so wartete man so lange, bis diese Bewegungen wieder ganz nachgelassen oder aufgehört haben. Dann wurde das Ganglion coeliacum mit Kali causticum betupft, und sogleich wurden die peristaltischen Bewegungen des Darms wieder ausserordentlich lebhaft.

Es entsteht nun die Frage, ob in dem Gangliennerven nur einerlei Art Fäden enthalten sind, und ob diese zur Ernährung, Empfindung und Bewegung gleich tauglich sind, indem sie Empfindungsactionen erregen, insofern sie auf das Gehirn wirken, Ernährungsactionen und Bewegungsactionen, insofern sie in peripherischer Richtung thätig sind. Diess ist an sich schon unwahrscheinlich. Es würde dann nämlich jede Reizung der Absonderung im Darmkanal auch mit vermehrter Bewegung, jede vermehrte Bewegung mit vermehrter Absonderung verbunden seyn. Es wird daraus schon vorläufig wahrscheinlich, dass auch im Gangliennerven Empfindungs- und Bewegungsfasern enthalten sind, ja dass er sogar noch eine dritte Art, nämlich organische Fasern zur Regulirung der chemischen Processe enthält. Um diese Frage genauer zu beantworten, müssen wir den Zusammenhang des Gangliennerven mit den Empfindungs- und Bewegungsnerven genauer erwägen.

Es ist eine alte Streitfrage, ob die Verbindungen des Gangliennerven mit den Stämmen der Cerebral- und Spinalnerven als Wurzeln als Verbindungsäste des Gangliennerven zu betrachten sind. Die mikroskopische Analyse dieser Verbindungen entscheidet, dass viele derselben Wurzeln aus den Cerebrospinalnerven in den Gangliennerven leiten, dass andere hingegen Elemente des Gangliennerven in die Cerebrospinalnerven leiten. So wird sich hernach zeigen, dass der carotische Theil des Ganglien grossentheils nicht bloss Wurzel des Gangliennerven ist, vielmehr grossentheils Elemente des Gangliennerven in Hirnnerven zu peripherischer Verbreitung einmischt. Der an den 1. und 2. Ast des trigeminus und an den Nervus abducens sich anschliessende Theil der carotischen Stränge giebt diesen Nerven graue Bündel zu peripherischer Verbreitung ab, und diese grauen Bündel sind keine Wurzeln. Dagegen empfängt der Gangliennerve von einem Theil der Hirnnerven und namentlich von den gemischten Hirnnerven und von allen Spinalnerven wahre Wurzeln, welche aus den Wurzelfäden dieser Nerven abgehen und zu peripherischer Verbreitung im Gangliennerven weiter gehen. Das Verhältniss zu den Hirnnerven ist sehr verwickelt, einfach

Digitized by Google

und leicht zu ermitteln bei den Spinalnerven. Aus der Untersuchung der letztern erhält man die Principien für die Untersuchung der Verbindungen mit dem Hirnnerven. Leicht also sieht man an jedem Thier, dass von den Wurzeln jedes Spinalnerven sich ein Theil ablöst um in die Gangliennerven einzutreten. Diess ist der ramus communicans. Seine Fasern gehen grösstentheils vom Spinalnerven ab und zu dem Gangliennerven.

Nun fragt sich, ob der Gangliennerve durch seine Wurzeln zugleich motorische und sensible Fäden vom Rückenmark und Gehirn erhalte. Nach Scarpa's und Wutzer's früheren Untersuchungen hängt der Gangliennerve mit jeder der beiden Wurzeln der Rückenmarksnerven zusammen, und erhielte also sowohl motorische als sensible Fasern, wie er nach den von ihm beherrschten Functionen der Eingeweide haben muss. Die Empfindlichkeit ist zwar in den vom Gangliennerven versehenen Organen nicht sehr stark, aber entschieden vorhanden, nur dunkel und in Hinsicht des Ortes nicht deutlich und umschrieben, kann aber in Krankheiten eben so lebhaft und bestimmt werden, als in allen anderen Theilen. Die vom Gangliennerven versehenen Eingeweide sind übrigens nur unwillkührlich beweglich. Dieser letztere Umstand hat Scarpa in der neuern Zeit verleitet, dem Gangliennerven allen motorischen Einfluss abzusprechen, und die Ursache der Bewegungen der unwillkührlich beweglichen Theile, allein in diesen Theilen selbst zu suchen. Diese Ansicht gründete sich besonders auch auf neue Beobachtungen von ihm über den Ursprung des Gangliennerven, welchen er bloss von den hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven ableitet. Scarpa *de ganglüs nervorum deque essentia nervi sympathici, ann. univ. de medicina.* 1831. Dieser grosse Anatom hat ein Beispiel gegeben, wie man im Alter nicht gegen die Fortschritte der Wissenschaft eingenommen seyn sollte (Einige antiquiren sich schon vor dem Alter); Scarpa hat gerade in seiner letzten Schrift den lebendigsten Antheil an der grossen Umgestaltung der Nervenphysiologie gezeigt; aber in Hinsicht jener Behauptung von dem Ursprung der Rückenmarksnerven hatte ihn die Schärfe seiner Sinne verlassen. Untersuchungen von mir (Meckel's *Archiv.* 1832. *p.* 85.), Retzius (ebend. p. 260.), Mayer (*Nov. act. XVI. p.* 2.) und Wutzer (Muellers *Archiv*, 1834. *p.* 305.) haben nämlich erwiesen, dass die frühere Darstellung von Wutzer über den Ursprung des Gangliennerven von beiderlei Wurzeln der Rückenmarksnerven die ganz richtige war. Mayer hat sogar die dem Gangliennerven angehörenden Fasern an den Wurzeln der Rückenmarksnerven bis zum Rückenmark selbst verfolgt. Dieser Nerve enthält also motorische und sensible Fasern. Die mikroskopische Untersuchung dieser Wurzelfäden des Gangliennerven von den Spinalnerven zeigt, dass sie ähnliche röhrige Fasern, wie die Spinalnerven selbst enthalten. Diese Röhrenfasern sind zwar feiner und bleiben es in ihrem ganzen Verlauf im Gangliennerven; aber Röhre und Inhalt der Fasern ist hier so deutlich als in den Spinalnerven selbst. Sie sind zarter und deswegen bilden sich durch Druck und Dehnung leichter als an

Digitized by Google

den Röhren der Spinalnerven die Varicositäten aus. Im unversehrten Zustande sind sie niemals varicös. In diesen Puncten unterscheidet sich daher der Gangliennerve nicht wesentlich von andern Nerven, auch bleiben die röhrigen Fasern im Verlauf des Gangliennerven eben so getrennt und ohne Anastomosen wie in den übrigen Nerven. Das Eigenthümliche am Gangliennerven erscheint nur in der Art, wie er seine Wurzelfaden sammelt und wieder zu peripherischer Verbreitung abgiebt. Die von den Wurzeln kommenden Fäden laufen nämlich eine Strecke im Grenzstrang des Gangliennerven fort und gehen dann erst von ihm ab. Dadurch entsteht ein scheinbar zusammenhängender Strang vom Ganglion cervicale supremum bis zum Ganglion coccygeum. Ich sage scheinbar zusammenhängender Strang; denn dass die vom Ganglion cervicale supremum kommenden Fasern bis zum Ende des Grenzstranges fortlaufen sollten, ist eine durch keinerlei Thatsachen gerechtfertigte Vorstellung. Die Fasern, welche zuerst in den Grenzstrang treten, gehen auch zuerst wieder von ihm ab, dann die folgenden und so weiter, zuerst die Nervi cardiaci, dann die Nervi splanchnici, dann die renales, dann die aortici, u. s. w. Diess Entspringen und Abgeben lässt sich mit dem Verhalten des Musculus sacrolumbaris an den Rippen vergleichen, welcher an der inneren Seite Ursprünge sammelt, welche in den Muskel sich einweben, während auf der anderen Seite Fascikel abgegeben werden. Aber diese Eigenthümlichkeit des Gangliennerven ist auch nur scheinbar. Denn viele andere Nerven verhalten sich eben so, die Spinalnerven bilden scheinbare Verbindungsbogen und grosse Strecken hinab zusammenhängende Stränge durch diese Bogen, welche bald abgeben, was sie vorher erhalten. Eben so ist es mit dem ramus descendens hypoglossi, zu dem die oberen Spinalnerven beitragen. Gleichen hierin die Spinalnerven dem Gangliennerven annäherungsweise, so kömmt es hinwieder vor, dass der Gangliennerve keinen ganz zusammenhängenden Grenzstrang bildet, dass nämlich die Verbindungen zwischen den Wurzelsträngen hier und da fehlen oder ausserordentlich dünn sind, wie es bei den Schlangen vorkömmt.

Da der Gangliennerve regelmässig Fascikel motorischer und sensorieller Fäden von den Spinalnerven als seine Wurzeln motorischen und sensoriellen Antheils aufnimmt, so wird ein ähnliches Verhalten zu denjenigen Hirnnerven auch wahrscheinlich, welche den Spinalnerven analog, d. h. doppeltwurzelig sind. In der That, der N. hypoglossus, vagus, glossopharyngeus geben Wurzeln in das Ganglion cervicale supremum und sofort in den Strang des Gangliennerven ab. Indessen wird hier nicht behauptet, dass alle Fasern dieser Stränge motorisch und sensoriell sind, was sich vielmehr nicht so verhält. Der Gangliennerve nimmt also auch Wurzeln sensorieller und motorischer Art aus jenen Hirnnerven auf. Eben so ist es mit dem grossen spinalartigen Nerven des Kopfes, dem trigeminus. Der ramus vidianus profundus ist wenigstens zum Theil Wurzel des Gan-

Digitized by Google

gliennerven, wie sich im folgenden Capitel deutlicher zeigen wird.

IV. Capitel. Vom grauen oder organischen Fasersystem und den Eigenschaften dieser Fasern.

Die Ansichten der älteren physiologischen Schulen über die Eigenschaften des Gangliennerven sind bei dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft wenig belehrend. Dass dieser Nerve dem vegetativen System der Eingeweide bestimmt sey, während die Cerebrospinalnerven das animalische System versehen, dass er die Bestimmung habe, die Nerven unter einander zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden, dass er die Ursache der Sympathieen sey, ist Alles wenig befriedigend. Die wichtigen Arbeiten von Ch. Bell über die sensoriellen und motorischen Nervenwurzeln haben uns in Hinsicht des Gangliennerven im Dunkeln gelassen, liessen aber den Einsichtigen wohl erkennen, dass die Ansichten über den Gangliennerven einer gänzlichen Reform bedürfen. Die Thatsachen und Ideen dazu sind erst in der neuesten Zeit an die Hand gegeben worden. Als den ersten Schritt von thatsächlicher Seite betrachte ich Retzius im Jahre 1827 bekannt gemachte Beobachtungen über das Fortlaufen grauer Nervenfäden unter den weissen im Nervus trigeminus, grauer Fäden, welche von gewissen Ganglien sowohl in peripherischer Richtung in die Aeste, als in centraler Richtung gegen das Ganglion Gasseri fortschreiten. Retzius zog selbst aus diesen wichtigen Thatsachen keine physiologischen Schlussfolgen, und sie blieben auch anderweitig bis zum Jahre 1834 unbenutzt. Unterdess erschienen die Untersuchungen über die Reflexion von Marshall Hall und mir; obgleich diese Phänomene hauptsächlich nur an den Cerebrospinalnerven erläutert wurden, so sprach ich doch sogleich mich in der ersten Auflage der ersten Abtheilung dieses Werkes. 1833. 335. darüber aus, dass die Sympathieen grossentheils durch die Reflexion und nicht durch den Sympathicus zu erklären seien, und dass die sympathischen Nerven nicht anders wie die Cerebrospinalnerven, dabei Empfindungsreize auf das Rückenmark leiten, von wo die Reflexion ausgeht. Im Jahre 1834 erschien eine bestimmtere Darlegung der Principien, nach welchen der Gangliennerve und seine Verbindungen mit anderen Nerven zu betrachten sind, sowohl von van Deen (*diss. de differentia et nexu inter nervos vitae animalis et organicae. Lugd. Bat.* 1834.) als von mir (*in der zweiten Abtheilung der Physiologie p.* 646—652. *u.* 780.). van Deen läugnete auch die Erklärung der Sympathieen durch den sogenannten Sympathicus, wie es schon früher oft geschehen, und suchte es wahrscheinlich zu machen, dass die Verbindungen des Gangliennerven mit den Cerebrospinalnerven bestimmt seien, diesen ausser ihren sensitiv motorischen Eigenschaften vegetativen Einfluss vom Gangliennerven aus zu ertheilen, dass hinwieder der Gangliennerve durch die Ver-

Digitized by Google

bindung mit den Cerebrospinalnerven motorischen Einfluss erhalte und dass ihm hierdurch auch die Fähigkeit ertheilt werde, unter gewissen Umständen selbst zu empfinden. VAN DEEN kannte die von RETZIUS beobachteten Thatsachen nicht; auch spricht sich derselbe nicht darüber aus, wie sich der Gangliennerve bei diesen Verbindungen verhalte, ob er bloss durch seine Ganglien in ein näheres Verhältniss zu den Cerebrospinalnerven tritt oder sich isolirt in den Cerebrospinalnerven fortsetzt. Gestützt auf die Beobachtungen von RETZIUS und meine eigenen über das Fortlaufen von grauen organischen Fäden in den Cerebralnerven in peripherischer Richtung, auf die Thatsache des isolirten Fortlaufens der Primitivfasern in den Nerven, auf den Ursprung des Gangliennerven von den motorischen und sensoriellen Wurzeln der Spinalnerven und auf die Thatsachen in Hinsicht der Reflexion sprach ich mich a. a. O. bestimmter dahin aus, dass die gewöhnlichen Ansichten über den Zweck jener Verbindungen nicht bloss unrichtig sind, sondern dass der Gangliennerve so gut wie Cerebrospinalnerven zusammengesetzt sey, dass er motorische, sensorielle und organische Fasern enthalte, wovon nur die letzteren den vegetativen Processen bestimmt seyen und ein näheres Verhältniss zu den Ganglien haben, dass dieselbe Zusammensetzung aus isolirten motorischen, sensoriellen und organischen Fasern den Cerebrospinalnerven zukomme, welche jede zu ihrer Bestimmung isolirt und ohne Verschmelzung fortlaufen, so dass der Gangliennerve sich nur durch die grössere Menge der organischen Fasern, und deswegen durch seine graue Farbe auszeichnet, während sie in den Cerebrospinalnerven seltener als graue Bündel zwischen der Hauptmasse der weissen Bündel erscheinen. Indessen sey auch der Gangliennerve nicht überall gleich grau, sondern im Grenzstrange noch etwas weisslich, in den zu den vegetativen Eingeweiden gehenden Zweigen der Abdominalganglien aber vorzugsweise grau. A. a. O. p. 651. So viel zur Geschichte dieses Gegenstandes bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt. Durch REMAK ist dieser Gegenstand jetzt zu einem viel grössern Grad von Sicherheit gelangt.

1. *Graue oder organische Fäden in dem Cerebrospinalnerven.*

Die hieher gehörigen Thatsachen, welche bereits in der ersten Auflage dieses Werkes angeführt wurden, sind folgende.

Man wird unwillkührlich zu jener Ansicht hingetrieben, wenn man die merkwürdigen und nicht genug zu beachtenden Beobachtungen von RETZIUS (*Isis* 1827. 997.) über die im N. trigeminus des Pferdes, namentlich im zweiten Ast vom Ganglion sphenopalatinum aus enthaltenen grauen sympathischen Fasern kennt, graue Fasern, welche sich ganz deutlich unterscheiden lassen, graue Knötchen innerhalb des Nervenstammes bilden, und sich sowohl über den zweiten Ast hin und in demselben bis in die Nervi nasales und die Nasenschleimhaut, als auch nach aufwärts bis in die Orbita und zum Ganglion ciliare verfolgen lassen. Ich habe die von RETZIUS beobachteten gangliösen Nerven beim Ochsen aufgesucht, wo sie leicht zu finden sind und auf der innern

Digitized by Google

Seite des zweiten Astes mehrere kleine Ganglien bilden, die mit dem Ganglion sphenopalatinum und dem N. vidianus zusammenhängen, und zu den zur Nase und zum Gaumen gehenden Nerven vorzüglich gehören. Beim Ochsen giebt der Ramus profundus nervi vidiani, deutlich vom N. sympathicus kommend, sowohl Fasern zum Ganglion sphenopalatinum, als viele fortlaufende Zweige in die Nasen- und Gaumennerven selbst, und hier kann man deutlich sehen, dass dieser Nerve mit einem Theil seiner Fasern nicht vom N. trigeminus entspringt, sondern zum Theil vom Gangliennerven kömmt und sich mit seinen Fasern in peripherischer Verbreitung den Zweigen des zweiten Astes anschliesst. Beim Ochsen sieht man auch leicht, dass sich auch organische Fasern in den ersten Ast des N. trigeminus einmischen, nämlich von demjenigen Theile des Gangliennerven, der sich mit dem N. abducens verbindet. Auch finden sich kleine Ganglien am Anfange des ersten Astes des trigeminus, die zu dem Geflecht gehören, welches sich dem abducens und ersten Ast des trigeminus mitgetheilt hat. Graue Fäden gehen auch rückwärts zum Ganglion Gasseri. Varrentrapp (*obs. anat. de parte cephalica n. sympathici. Francof.* 1831.) sah ebenfalls beim Menschen Fädchen aus dem plexus cavernosus zum ersten Aste des trigeminus treten. Ferner schickt der Gangliennerve beim Kalb, wie ich sah, schon in der Schädelhöhle ein ganz dickes Fascikel organischer Fasern unterhalb des Ganglion Gasseri in den zweiten Ast. Der Ramus buccinatorius vom dritten Ast des N. trigeminus erhält beim Ochsen ein ganzes Fascikel grauer organischer Fasern vom Ganglion oticum und diese grauen Bündel gehen zu peripherischer Verbreitung weit über den Nerven hin. An den Ciliarnerven vom Ganglion ciliare hat man weiter ein Beispiel von Association von sensitiven Fasern des N. trigeminus (radix longa a nervo nasali), von motorischen Fasern (radix brevis a nervo oculomotorio) und von organischen Fasern des Gangliennerven. Zu dem Zweck der Einmischung scheint sich ferner der Gangliennerve mit dem Glossopharyngeus am Ganglion petrosum, mit dem Facialis an der intumescentia N. facialis zu verbinden. Vom Knie des Facialis und von seiner Anschwellung wird dieser Nerve stärker durch Bündelchen, welche er von den Nervi petrosi superficiales erhalten, und dieser Zuwachs geht zum Theil deutlich in peripherischer Richtung am Facialis fort. Ferner hat Giltay (*de nervo sympathico diss. Lugd.* 1834.) mehrere Thatsachen bekannt gemacht, in welchen sich die organischen Fäden neben den Cerebral- und Spinalnerven, getrennt hingehend in die Organe beobachten liessen. Giltay hat bei mehreren Fischen von der Pars cephalica nervi sympathici, welche von dem N. trigeminus ausser dem Cranium entspringt, und rückwärts unter dem N. glossopharyngeus und vagus hingeht, sympathische, deutlich zu unterscheidende Fäden zu dem N. glossopharyngeus, und mit diesem zur ersten Kieme, und eben so einen besondern Faden mit dem N. vagus in die Kiemen treten gesehen, wo dieselben von den Aesten der Cerebrospinalnerven getrennt, bloss neben diesen liegend sie begleiten. Diess hat er deutlich an Fischen der Gattungen Acanthurus, Platyce-

Digitized by Google

phalus, Holocentrus, undeutlich auch bei Pleuronectes Platessa gesehen und abgebildet. Diese Aeste sind wohl von denjenigen Aesten des Gangliennerven zu unterscheiden, welche sich mit dem N. glossopharyngeus und mit dem Ganglion n. vagi, gleichsam als Wurzeln des Gangliennerven verbinden.

Ein ähnliches Verhalten zu Rückenmarksnerven hat Giltay ebenfalls in einigen Fällen beobachtet. Bei Bufo asper sah er den Gangliennerven in der Mitte des Körpers des zweiten Wirbels unter der Anhangsplatte der Schulter einen Ast in die Muskeln (?) abgegeben, der sich in zwei Aeste spaltete, wovon der eine rücklaufend an den N. spinalis (1. dorsi) gegen den Wirbel hingeht, sich also wie eine Wurzel verhält, während der andere mit dem N. spinalis fortgeht, um sich in der vordern Extremität zu verzweigen. Bei Calotes gutturosa sah Giltay einen Zweig des Gangliennerven, der sich mit der Arteria subclavia und den Nerven der vorderen Extremitäten in diesen verbreitete. Eben so sah er bei Iguana delicatissima einen Ast des Gangliennerven den ersten Nerven der vorderen Extremitäten begleiten. Aus allen diesen Thatsachen schloss ich, dass in den Cerebrospinalnerven dreierlei Fasern unterschieden werden müssen, sensitive und motorische, welche beide weiss sind und von den Wurzeln des Cerebrospinalnerven kommen, und graue organische, welche von den Ganglien des Gangliennerven kommen.

Durch die Beobachtungen von Remak haben wir jetzt das eigenthümliche mikroskopische Verhalten der grauen Nervenfasern kennen gelernt. Sie sind durchaus von den röhrigen loder sensitiven und motorischen Fasern verschieden. Erstens sind sie viel feiner; dann lässt sich an ihnen durchaus kein Unterschied von Röhre und Inhalt erkennen; ferner sind sie so blass und durchsichtig, dass man ihre Begrenzung nur bei starker Beschattung sieht; endlich sind sie ganz charakteristisch seitlich hier und da mit rundlichen oder ovalen kleinen Körperchen besetzt. Remak hat diese Fasern an vielen Stellen in den grauen Bündelchen des Sympathicus gefunden und eben solche Fasern seltener in vielen Cerebrospinalnerven gesehen. Man muss zu diesen Beobachtungen starke Vergrösserung und starke Beschattung anwenden. Um sich von der Existenz dieses eigenthümlichen Fasersystems zu überzeugen, ist es nöthig, diese Fasern zuerst in einem durch und durch grauen Nerven zu studiren. Hier sind sie entweder gar nicht oder nur mit äusserst wenigen röhrigen Fasern vermengt. Ich überzeugte mich von der Richtigkeit der Beobachtung an dem carotischen Theile des Gangliennerven, welcher vorzugsweise und ganz grau ist. Man suche den zum Nervus abducens und ersten Ast des trigeminus gehenden dicken grauen Nerven beim Kalbe auf. Er liegt dicht unter dem N. abducens im rete mirabile, nahe der innern Seite des Ganglion Gasseri. Hier steigt er herauf und schliesst sich mit einem starken Bündel an den ersten Ast des trigeminus an, so wie dieser aus dem Ganglion Gasseri herauskommt, mit einem kleineren Fascikel läuft er mit dem abducens fort, ein starkes Fascikel geht auf den zweiten Ast des trigeminus. Der graue

Digitized by Google

Stamm, aus welchem diese starken Bündel kommen, ist gegen eine Linie dick. Da diess nun offenbar durch und durch graue Nervenmasse ist, so lernt man hier am besten den Typus der grauen organischen Fasern mikroskopisch kennen. Er ist ganz so wie oben beschrieben worden. Ich fand fast nur organische Fasern darin. Man sieht aber auch einige, aber ganz ausserordentlich seltene röhrige Fasern darin; nur zuweilen sieht man über ein ganzes Fascikel von organischen Fasern unter dem Mikroskop eine vereinzelte röhrige Faser hinlaufen, und man erkennt noch mehr den deutlichen Unterschied.

Aus solchen Fasern bestehen nun alle vorher beschriebenen grauen Bündel, welche sich peripherisch über den ersten und zweiten Ast des trigeminus und auf den Nervus abducens ausbreiten. Sie finden sich ebenfalls in dem vom Ganglion oticum oder plexus ganglioformis Santorini auf den dritten Ast, namentlich den N. buccinatorius übergehenden grauen Bündeln. An anderen Stellen des Cerebrospinalsystems hat man nicht solche schöne Gelegenheit, sich in der ersten Beobachtung der organischen Fasern zu üben, und es gehört eine grosse Uebung dazu, sie wiederzuerkennen, wo sie in geringerer Menge zwischen vorwiegenden röhrigen Fasern vorkommen. Remak fand einzelne Bündelchen in den meisten Cerebrospinalnerven, die er untersuchte. An der Verbindung des Grenzstranges des Ganglliennerven mit den Spinalnerven, durch den Ramus communicans fand er sie wieder, sie gehen vom Ganglion des Ganglliennerven auf den Intercostalnerven, während der grössere Theil des Ramus communicans aus röhrigen Fasern besteht, welche aus den Wurzeln des Spinalnerven in den Ganglliennerven treten. Es findet also ein gegenseitiger Austausch statt.

In dem Unterschied der sensitiv-motorischen und der organischen Fasern hat man nun ein treffliches Mittel in jedem Nerven, der den Ganglliennerven mit einem Cerebrospinalnerven verbindet, mittelst des Mikroskops zu erkennen, was beiden Systemen angehört. Manches, was man für bloss sympathisch gehalten, giebt sich nun sicher als theilweise cerebro-spinal zu erkennen.

So wie die vom Ganglion oticum des Kalbes auf den N. buccinatorius übergehenden Fasern grau sind, so sind die von diesem Knoten nach hinten abgehenden Nerven, der N. tensoris tympani und der N. petrosus superficialis minor (zur Jacobson'schen Anastomose) mehr weisslich als grau und der erstere sogar ganz weiss. Schlemm hatte schon gezeigt, dass der N. tensoris tympani vom dritten Ast des trigeminus, nämlich vom Ramus pterygoideus entspringt, und ich hatte es wahrscheinlich gemacht, dass er Fasern vom Ganglion mitnehme. Damit stimmt die mikroskopische Untersuchung, die ich beim Kalbe anstellte, ganz überein. Fast die ganze Masse dieses weissen Nerven besteht aus Röhrenfasern, und kaum gelang es mir, auch einige organische zu erkennen. Der Nervus petrosus superficialis minor bestand aus einem grössern weissen und einem davon leicht zu trennenden grauen Bündel, welches letztere in der Trommelhöhle angelangt, ein ganz kleines spindelförmiges Knötchen bildete, von

Digitized by Google

der Art, wie man sie sonst bei feineren Untersuchungen organischer Nerven findet. Hierauf lief der graue Faden mit dem weissen weiter. Der weisse Theil des N. petrosus superficialis minor bestand grösstentheils aus Röhrenfasern, der graue Theil ganz aus organischen Fasern.

Der Nervus petrosus superficialis major, zwischen Ganglion sphenopalatinum und facialis, enthält viele Röhrenfasern, auch einzelne graue organische Fasern. Die von den Nervi petrosi an den Facialis gehenden grauen Fasern bilden dort am Knie desselben ein Knötchen, von welchem aus graue Fasern auf den peripherischen Theil des facialis fortgehen. Von diesem Theil des facialis erhält bekanntlich auch der acusticus einen Faden.

Die Jacobson'sche Anastomose in der Trommelhöhle beim Menschen mikroskopisch untersucht, enthält Röhrenfasern und sehr viele organische Fasern.

Der Ramus petrosus profundus ist ganz grau und enthält grösstentheils die eigenthümlichen grauen Fasern. Diese herrschen überhaupt im ganzen carotischen Theil des Gangliennerven vor, obgleich auch weniger zahlreiche röhrige Fasern darin vorkommen.

2. *Graue oder organische Fäden in dem Ganglienneven.*

Dass es auch in dem Ganglienneven zweierlei Fasersysteme, sensitiv-motorische und graue gebe, konnte in der ersten Auflage dieses Werkes nur wahrscheinlich gemacht, aber nicht sicher bewiesen werden. Vorläufig wurde darauf hingewiesen, dass der Grenzstrang des Ganglienneven noch etwas weisslich sey und jedenfalls nicht so grau sey als die grauen Fäden der Abdominalganglien. Auch wurde vorläufig als wahrscheinlich ausgesprochen, dass die Knoten dem organischen Theil des Ganglienneven vorzugsweise angehören. a. a. O. p. 651. 652. Remak konnte an vielen Stellen des Ganglienneven bei feinerer Untersuchung schon äusserlich graue und weisse Bündel unterscheiden; die mikroskopische Untersuchung zeigte dann jedesmal röhrige Fasern in den einen und die von ihm als eigenthümlich erkannten organischen Fasern in den andern. Derselbe hat es auch durch lange und mit grosser Ausdauer fortgesetzte Untersuchung sehr wahrscheinlich gemacht, dass die organischen Fasern von den Ganglienkugeln und ihren Schwänzen entspringen und spricht es als von ihm beobachtete Thatsache aus, indem sehr oft von ihm die von dort entspringenden Fäden auch mit solchen Körnchen besetzt gefunden wurden, wie sie den organischen Fasern eigen sind. Die röhrigen Fasern des Ganglienneven haben kein näheres Verhältniss zu den Ganglienkugeln und gehen nur zwischen ihnen durch. Diese Art von Fasern können keine Multiplication in den Ganglien erfahren und verhalten sich im ganzen Gangliensystem wie in den Cerebrospinalnerven. Die organischen Fasern hingegen können sich in den Centralmassen der Ganglien, wenn sie von den Schwänzen der Ganglienkugeln entspringen, vermehren; und damit stimmt der in peripherischer Richtung zunehmende Antheil der grauen Masse im Ganglionsystem, während der Grenzstrang noch mehr weisslich ist. Die Ganglien müssen

Digitized by Google

daher in der That als Centralorgane, Hirne, für das organische Fasersystem betrachtet werden, während der sensitiv-motorische Theil des Gangliennerven aus dem Gehirn und Rückenmark abgeleitet ist. Von ihnen aus gehen auch die organischen Bündel für die Cerebrospinalnerven ab, so ist das Ganglion cervicale supremum der Ausstrahlungspunkt für organische Bündel auf die Hirnnerven, welche hie und da wieder secundäre Ganglien bilden.

Dass übrigens die organischen Fasern, wenn sie auch nicht im Gehirn und Rückenmark entspringen, doch mit ihm zugleich von den Wurzeln des Grenzstrangs aus zusammenhängen, um ihren Einfluss zu erfahren, wird aus Remak's Beobachtungen wahrscheinlich, dem es mehrmals gelang, organische Fasern sowohl in den Wurzeln der Spinalnerven überhaupt, als auch in dem Ramus communicans derselben mit den Ganglien des Grenzstranges neben den röhrigen Fasern zu beobachten. Das Verhältniss der Ganglien der hintern Wurzeln zum organischen Fasersystem ist noch nicht klar. Nach ihrer Aehnlichkeit im Bau mit den übrigen Ganglien kann vermuthet werden, dass sie auch organischen Fasern zum Ursprung dienen. Indess wird daraus ihr regelmässiges Erscheinen an den hintern Wurzeln nicht einleuchtend. Wenn die Ganglien einen isolirenden Einfluss auf die durch sie durchgehenden Fasern als Conductoren hätten, wie öfter vermuthet wurde, so könnten die Ganglien der hinteren Wurzeln die Heftigkeit der Impression von Empfindungen auf das Rückenmark mildern und dadurch verhüten, dass vom Rückenmark aus Reflexbewegungen entstehen, welche nur dann stattfinden, wenn die Empfindung einen gewissen Grad der Heftigkeit erhält. Diess würde mit der Dunkelheit der Empfindung im Gangliennerven stimmen, dessen Ganglien häufiger sind. Allein diese ganze Ansicht beruht auf einer unerwiesenen Hypothese.

3. *Wirkungen des organischen Fasersystems.*

In Hinsicht der Wirkungen und Kräfte der grauen organischen Fasern lassen sich zwei Meinungen aufstellen, die wir hier prüfen wollen. Entweder bestimmen sie und die Ganglienkugeln die unwillkührlichen Bewegungen, oder sie beherrschen die Ernährung, Absonderung und überhaupt die chemischen Processe. Für erstere Meinung liesse sich anführen, dass das Ganglion coeliacum nach meinen Versuchen offenbar Einfluss auf die Bewegung des Darms hat, indem es mit Kali causticum betupft, die Bewegungen des Darms sogleich verstärkt und beschleunigt. Indess erhielt ich eine ähnliche Verstärkung durch Galvanisiren des N. splanchnicus vor dem Eintritt in das Ganglion. Dann aber ist es wohl möglich, dass die Ganglien Einfluss auf die durch sie durchgehenden motorischen Fasern haben, während die Ganglienkugeln zugleich in näherem Zusammenhange mit einer andern Classe, den organischen Fasern stehen. Das nähere Verhaltniss der Ganglien zu den grauen Fasern wird aber schon daraus wahrscheinlich, dass an Bündelchen, welche ganz grau sind, kleine Ganglien am leichtesten vorkommen, wie man sie so leicht an den grauen Bündelchen wahrnimmt, welche sich in den ersten und zweiten Ast des trigeminus beim Kalb begeben. Die Wir-

Digitized by Google

kung der Ganglienkugeln und organischen Fasern wird also wahrscheinlich homolog seien. Dass es eigene Fasern für die vegetativen Processe giebt, die von den sensitiven und motorischen Fasern der Eingeweide verschieden sind, wird schon a priori zu Folge der Existenz von sensitiven und motorischen Fasern wahrscheinlich. Die Nerven haben den grössten Einfluss auf die Secretionen, wären nun nur einerlei Nerven für die Bewegungen und vegetativen Processe bestimmt, so müsste eine von den Nerven aus vermehrte Secretion immer auch mit Spasmus, dieser immer auch mit vermehrter Secretion verbunden seyn. Beide Erscheinungen sind aber oft so isolirt, als es Lähmungen der Empfindung ohne Lähmung der Bewegung, letztere ohne erstere giebt. Bedenkt man nun ferner, dass die grauen Fasern so häufig dem N. trigeminus, abducens, facialis sich mittheilen, dass sie sich am trigeminus deutlich in peripherischer Richtung gegen die Mundschleimhaut und Nasenschleimhaut verfolgen lassen, dass die Trommelhöhle ein zum grossen Theil organisches Geflecht für die Schleimhaut besitzt, und dass in den Schleimhäuten keine unwillkührlichen Bewegungen vorkommen, dass die dem zweiten Ast des trigeminus und dem abducens eingemischten Bündel zu keinen unwillkührlichen Bewegungen dienen, so wird die zweite Voraussetzung viel wahrscheinlicher, dass die organischen Fasern in den Cerebrospinalnerven und im Gangliennerven zu der Beherrschung der organischen Processe der Ernährung und Absonderung dienen. Diese Ansicht erhält dadurch eine grosse Stütze, dass die motorischen Wurzeln der Spinalnerven selbst schon motorische Fäden röhriger Art in den sympathicus abgeben, von welchen die unwillkührlichen Bewegungen abhängen müssen. Wenn diess richtig ist, so müssen die motorischen Fasern des Herzens hauptsächlich röhrige seyn und nicht vorzugsweise die von Remak beobachteten Eigenschaften der grauen Fäden besitzen. So ist es aber auch. Man untersuche die Herznerven des Kalbes und man wird darin eine grosse Menge röhriger Fasern finden, die sich von den Fasern der willkührlichen Muskeln nur durch einen feinern Durchmesser unterscheiden. Vergleicht man ferner die Herznerven mit den splanchnischen Nerven, von welchen die Eingeweide mit absondernder Thätigkeit abhängig sind, so fällt es auf, wie vorwaltend bei den letztern die Ganglienbildung ist. Die Herznerven bilden keine Centralknoten, die splanchnischen Nerven schwellen in das grosse Ganglion coeliacum an. Eben so auffallend ist der Unterschied zwischen dem Herzen und den von Plexus hypogastricus abhängigen Geschlechtstheilen.

Mit dieser Ansicht stimmt überein, dass die Nierennerven, welche die Nierengefässe begleiten, im bei weitem grössten Theil aus organischen Fasern bestehen. Grau sind auch die von mir beschriebenen organischen Nerven, welche an der Wurzel der Corpora cavernosa ins Innere derselben eintreten und der Erection bestimmt sind. Siehe J. Mueller *über die organischen Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Abh. d. Akad. d. Wissensch. zu Berlin aus d. Jahr* 1835.

In manchen Fällen scheinen die organischen Fasern nur in

Digitized by Google

die Cerebrospinalnerven eingewebt zu seyn. Hieraus würde sich begreifen lassen, warum die Cyclostomen (Petromyzon sowohl als die Myxinoiden) keinen eigenen Ganglliennerven besitzen. Dagegen geht der aus beiden vagi gebildete Nervus intestinalis der Myxinoiden an der Insertionsstelle des Mesenteriums bis zum After. Hieher gehört auch das Factum, dass die Milchdrüse des Menschen keine besondern organischen Nerven erhält, welche ich vergebens aufsuchte. Die Nerven der Drüsensubstanz der mamma kommen in der That nur vom 3. und 4. Intercostalnerven. *Jahresbericht. Archiv.* 1837. *XXVII.*

V. Capitel. Vom Nervensystem der Wirbellosen.

Die Entdeckungen über die Verschiedenheit der sensitiven und motorischen Wurzeln der Rückenmarksnerven und Gehirnnerven führten in neuerer Zeit, auch zu lichtvollen Ideen über die Zusammensetzung des Nervensystems bei den Wirbellosen. Hatten gleich Treviranus und meine Arbeiten über den Scorpion einen dritten Strang am Nervensystem bei dieser Arachnide kennen gelehrt, so war ich doch weit entfernt, die Wichtigkeit dieser Thatsache einzusehen. Grant und Newport haben in dieses Gebiet der vergleichenden Anatomie das Licht physiologischer Ideen gebracht. Prof. Grant erklärte den obern Strang des Nervensystems der Arachniden, welcher keinen Antheil an der Ganglienbildung nimmt, für den motorischen, die unteren oder ganglosen Stränge für die sensoriellen, die von den untern Strängen entspringenden Nerven für sensoriell, die vom obern Strang entspringenden für motorisch und dehnte diese Ansicht überhaupt auf die Articulata aus. *The Lancet. London* 1834. *July.* Ueber diesen Gegenstand hat ferner eine ausgezeichnete Arbeit von Newport viel Licht verbreitet. *Philosoph. Transact.* 1834. *p.* 2. Der Bauchstrang der Insecten und Crustaceen ist aus einem vordern und hintern Paar von Strängen zusammengesetzt. Das obere Paar nimmt keinen Antheil an den Ganglien des Bauchstranges, die dem untern Paar allein angehören. Der Analogie nach sind die ganglienlosen Stränge die motorischen, die gangliösen die sensoriellen; aber das Verhältniss der Lage ist umgekehrt, als bei den Wirbelthieren, wo die gangliösen oder sensoriellen Wurzeln die hintern sind. Treviranus und E. H. Weber hatten die Vermuthung aufgestellt, dass die Ganglien des Bauchstranges der Articulaten den Ganglien der Spinalnerven (den Ganglien der sensitiven Wurzeln) entsprechen. Die gemischten Nerven des Bauchstranges entstehen nach Newport's Untersuchungen bei Astacus marinus durch Wurzeln, die theils den Ganglien, theils den oberen ganglienlosen Strängen angehören. Bei diesen Thieren sah Newport auch Nerven, welche bloss von den oberen Strängen und nicht von den Ganglien entspringen und bloss zu Muskeln hingehen, also jedenfalls motorisch sind.

Nach einer gefälligen Mittheilung von Prof. Sharpey, die ich wegen ihrer Wichtigkeit hier benutze, haben die Armnerven der

Digitized by Google

Cephalopoden (Octopus) eine ganz ähnliche Structur wie der Bauchstrang der Articulaten. Sie bestehen aus 2 Paar Strängen, wovon das eine Paar von Stelle zu Stelle gangliöse Anschwellungen bildet, das andere Paar an der Ganglienbildung keinen Antheil nimmt. Die Lage der Anschwellungen entspricht den Saugnäpfen der Arme.

Ueber das Eingeweidenervensystem der Insecten und über Brandt's Untersuchungen über diesen Gegenstand siehe Muell. *Archiv.* 1836. *Jahresbericht C.* Zu ihm gehören 3 Stränge, welche Knötchen auf der Speiseröhre und dem Magen bilden und wovon oft die seitlichen, oft der mittlere weniger entwickelt sind. Sie verbreiten ihre Aeste am Mund, Schlund und Magen, und vorzugsweise an unwillkührlich beweglichen Theilen. Der untere Theil des Darms erhält seine Nerven nicht daher. Aus der peripherischen Ganglienbildung und der Verbreitung an unwillkührlich beweglichen Theilen folgt, dass diess System mehr dem Gangliennerven der Wirbelthiere als dem Vagus gleicht; die dem Vagus entsprechenden Fasern mögen indess auch darin enthalten seyn. Aus den über die Zusammensetzung des Gangliennerven der Wirbelthiere gegebenen Principien stellt sich übrigens die Vergleichung der Nerven zu den Eingeweiden jetzt ganz anders. Organische Fasern können vielen und verschiedenen Nerven eingemischt seyn. Als Nerven von gemischter Bedeutung, wahrscheinlich auch organische Elemente enthaltend, betrachte ich das von Newport sehr genau beschriebene System der Nervi transversi der Insecten. Der ihnen zum Ursprung dienende Strang vereinigt sie zu einem besondern System und setzt sich über die Ganglien und den Bauchstrang in der Mittellinie fort. Diese Nerven sind den Athemmuskeln und Tracheen vorzüglich bestimmt. Da diess System mit den animalischen Nerven zusammenhängt, so bleibt es ungewiss, woher die Nerven zu den Muskeln kommen. Wenn die von den Wirbelthieren gewonnenen Principien hier auch Anwendung finden können, so lässt sich vermuthen, dass die Verbindungen dieses Systems mit den animalischen Nerven zugleich bestimmt sind, jenen organische Fasern oder wenigstens Fasern seiner Art einzumischen. Siehe Newport a. a. O. und *Archiv.* 1835. 82.

Digitized by Google

III. Abschnitt. Von der Mechanik des Nervenprincips *).

(Nach eigenen Untersuchungen.)

Unter *Mechanik* des Nervenprincips versteht man hier dasselbe, was unter Mechanik des Lichts in der Physik verstanden wird, nämlich die Gesetze, nach welchen die Leitung der Wirkung in den Nerven erfolgt, oder die Lehre von der Bewegung des Nervenprincips. Ob bei der Wirkung der Nerven von einer Stelle zur andern mit unmessbarer Geschwindigkeit eine imponderable Materie den Nerven durchströme, und in dem abgeschnittenen Nerven selbst durch Reiz entladen den Nerven durchströme, oder ob die Wirkung des Nervenprincips bloss eine vom Gehirn oder durch einen Reiz im Nerven erregte Oscillation, Schwingung des schon darin vorhandenen imponderabeln Nervenprincips ist, ist jetzt noch ungewiss, und eben so wenig ganz bestimmt zu beantworten als dieselbe Frage von dem Lichte, ob nämlich die Emanations- oder Undulationstheorie richtig sey. Die Gewissheit darüber ist vor der Hand für das Studium der Mechanik des Nervenprincips eben so wenig nöthig, als die Erkenntniss der Mechanik des Lichtes bei der Reflexion, Refraction u. s. w. von der Entscheidung der Richtigkeit einer jener beiden Theorien abhängig war. Wir werden übrigens diese Frage im vierten Capitel dieses Abschnittes untersuchen.

Bei der Vergleichung der verschiedenen Theile des Nervensystems zeigen sich Conductoren und Motoren des Nervenprincips. Die Conductoren sind die Nerven, die Motoren die Centralorgane. Die Nerven zeigen sich indess nicht als blosse Conductoren, sie sind vom Gehirn getrennt, in der ersten Zeit immer noch Motoren und Conductoren zugleich, indem Reize auf sie angewandt sie zur Bewegung der Muskeln anregen; allmählig aber verlieren sie, vom Gehirn getrennt, die Fähigkeit, Motoren sowohl als Conductoren des Nervenprincips zu seyn. Stellt man sich den Nerven als Conductor vor, so kann man sich die Leitung auch wieder wie die Wirkung des Nervenprincips doppelt denken. Entweder wird das imponderable Fluidum der Nerven in einer gewissen Richtung durch den Conductor als ein Strom geleitet, oder es wird die Oscillation dieses Fluidums nur in den Nervenfasern angeregt. Die Schnelligkeit der Nervenwirkung ist entweder die Schnelligkeit der Leitung des imponderabeln Nervenfluidums vom Gehirn zu den peripherischen Theilen und umgekehrt, oder die Schnelligkeit, mit der eine vom Gehirn oder einer beliebigen Stelle des Nerven ausgehende Schwingung bis zu seinem peripherischen Ende und umgekehrt sich verbreitet. Welche von beiden Vorstellungen die richtige ist, ist für die Frage von Schnelligkeit der Nervenwirkung auch wieder gleichgültig.

*) Dieser Abschnitt erscheint mit wenigen Veränderungen wie in der ersten Auflage von 1834.

Digitized by Google

Alle Versuche, die Schnelligkeit dieser Wirkung zu messen, beruhen auf keiner erfahrungsmässigen sichern Basis. Haller schrieb dem Nervensafte eine Geschwindigkeit von 9000 Fuss in der Minute; Sauvages von 32400, ein Anderer von 57600 Millionen Fuss in der Secunde zu. (Haller *Elem. IV. p.* 372.) Zur Zeit, als das galvanische Agens noch mit dem Agens der Nerven für identisch gehalten wurde, berechnete man aus der Schnelligkeit der elektrischen Leitung die Schnelligkeit des Nervenprincips. Wir werden wohl auch nie die Mittel gewinnen, die Geschwindigkeit der Nervenwirkung zu ermitteln, da uns die Vergleichung ungeheurer Entfernungen fehlt, aus der die Schnelligkeit einer dem Nerven in dieser Hinsicht analogen Wirkung des Lichtes berechnet werden kann. Neuerdings ist man auf eine Verschiedenheit der Beobachtung kleinster Zeittheile durch den Gehörsinn und Raumtheile durch den Gesichtssinn von Seiten der Astronomen aufmerksam geworden, welche Einigen wahrscheinlich machen könnte, dass die Schnelligkeit der Nervenwirkung zwischen verschiedenen Theilen des Nervensystems und selbst bei verschiedenen Individuen verschieden ist. Das Detail dieser Beobachtung ist von Herrn Nicolai, Director der Mannheimer Sternwarte, und durch Herrn Professor Treviranus bei der Versammlung der Naturforscher zu Heidelberg mitgetheilt worden. Es ist zu wichtig, als dass ich es nicht ganz erwähnen sollte.

„Ein sehr grosser Theil der astronomischen Beobachtungen besteht darin, dass man an einer Secundenuhr die Momente beobachtet, wenn ein Stern, vermöge der scheinbaren täglichen Umdrehung der Himmelskugel um ihre Achse, vor den Mikrometerfäden eines feststehenden Fernrohrs vorübergeht. Der Raum, den ein Stern während einer ganzen Secunde im Fernrohr durchläuft, ist, zumal wenn dasselbe stark vergrössert, so bedeutend, dass man das Moment des Vorüberganges des Sterns vor dem Mikrometerfaden nicht etwa auf eine halbe oder drittel Secunde, sondern bei einiger Uebung und bei günstigem Zustande der Luft selbst bis auf $\frac{1}{10}$ Secunde anzugeben vermag. Zu diesen Beobachtungen werden mithin zu gleicher Zeit zwei Sinne in Requisition gesetzt, das Gesicht und das Gehör. Während man mit dem Auge das stetige Fortrücken des Sterns im Fernrohr verfolgt, bemerkt das Ohr die einzelnen Secundenschläge der nebenstehenden Pendeluhr. Zum Behuf der oben angezeigten genauen Taxation des wirklichen Vorüberganges des Sterns vor dem Mikrometerfaden bemerkt man sich, wenn der Stern bereits nahe an den Faden gerückt ist, diejenige Entfernung, die er bei einem gewissen Secundenschlag noch diesseits vom Faden hat, und eben so diejenige, die bei dem nächst folgenden Secundenschlag bereits jenseits des Fadens stattfindet. Aus der Vergleichung der Grösse dieser beiderseitigen Abstände lässt sich sodann mit grosser Schärfe das wahre Moment des Vorüberganges des Sterns vor dem Faden, oder der jedesmalige Bruchtheil der Secunde, in welchem der Sternübergang erfolgt ist, angeben. Bereits vor einigen Jahren bemerkte der berühmte Director der Kö-

Digitized by Google

nigsberger Sternwarte, Herr Professor Bessel, dass er das Moment des Appulses eines Sterns an die Fäden des Fernrohrs merklich anders angab, als seine Mitbeobachter. Die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand verdoppelte sich also, und es wurde zum Zweck einer nähern Untersuchung desselben eine eigene Reihe von Beobachtungen angestellt. Der Erfolg war aber, dass Bessel immer andere Momente angab, als seine Mitbeobachter, und diese wieder unter sich mehr oder weniger von einander differirten, während die Resultate eines jeden einzelnen Beobachters ganz vortrefflich harmonirten. Auch ich, sagt Nicolai, habe bis jetzt zwei Mal Gelegenheit gehabt, hierüber Untersuchungen anzustellen. Im Frühling 1827 hatte ich das Vergnügen eines Besuchs von Herrn Professor Knorre, Director der Kaiserlichen Sternwarte zu Nicolajef. Sein Aufenthalt in Mannheim wurde sogleich benutzt, um gemeinschaftliche Beobachtungen anzustellen. Es ergab sich aus der Vergleichung unserer Resultate mit grosser Schärfe, dass Herr Knorre, um die beträchtliche Grösse einer halben Secunde die wahren Beobachtungsmomente später angab als ich. Vor wenigen Wochen habe ich diesen interessanten Versuch mit einem andern geschickten Beobachter, dem durch mehrere astronomische und mathematische Arbeiten bereits auf das rühmlichste bekannten Herrn Thomas Clausen aus Dänemark wiederholt. Es fand sich, dass dieser um $\frac{1}{3}$ Secunde die Beobachtungsmomente später angab als ich. Bei anderen Beobachtern sind diese Unterschiede noch viel grösser so steigt z. B. die Differenz der Angaben zwischen den Professoren Bessel und Knorre bis auf die enorme Grösse von einer ganzen Secunde, um welche dieser die Momente später angiebt als jener. Ueberhaupt sind bisher über diese Merkwürdigkeit von mehreren Beobachtern so viele sichere Proben angestellt worden, dass das Factum selbst über allen etwanigen Zweifel weit erhaben ist." *Isis* 1830. *p.* 678.

Nicolai behauptet, dass diese merkwürdige Erscheinung nicht anders als durch eine Verschiedenheit in der Schnelligkeit der Wirkung vom Auge zum Bewusstseyn und vom Ohr zum Bewusstseyn erklärt werden könne. Nimmt man nämlich an, dass bei vereinigter und auf denselben Gegenstand gerichteter Thätigkeit dieser beiden Sinne ein solches Individuum früher sieht als es hört, dass dagegen bei einem andern Individuum beide Reflexe in einem minderen Grade verschieden, oder zu gleicher Zeit, oder selbst in umgekehrtem Sinne, d. h. das Sehen später als das Hören erfolgen, so erklärt sich die Erscheinung vollkommen und ungezwungen. Es würde aber daraus die wichtige Folgerung hervorgehen, dass die Wechselwirkung zwischen Sinnesorganen und dem Bewusstseyn nicht völlig momentan ist. Aus diesen Erscheinungen liesse sich hoffen, dem Problem von der Schnelligkeit der Nervenwirkung näher zu kommen, wenn nicht noch eine ganz andere Erklärung derselben möglich und sogar wahrscheinlicher wäre. Es ist bekannt, dass das Bewusstseyn nicht leicht zweierlei Empfindungen mit gleicher Intensität der Aufmerksamkeit haben kann, und dass das Bewusstseyn, wenn

Digitized by Google

mehrere Empfindungen zu gleicher Zeit stattfinden, entweder nur einer oder abwechselnd verschiedenen die Aufmerksamkeit zuwendet. Wenn daher zu gleicher Zeit etwas gehört und mit dem Gesicht observirt werden soll, so ist es unvermeidlich, dass nicht zuerst gehört und dann gesehen wird. Der Zeitunterschied zwischen zweierlei bewussten Empfindungen ist aber bei verschiedenen Menschen verschieden, wie denn Manche viel zu gleicher Zeit empfinden und merken, Andere aber hierzu eine merkliche Zeit nöthig haben.

Die Zeit, in welcher eine Empfindung von den äusseren Theilen auf Gehirn und Rückenmark, und die Rückwirkung auf die äusseren Theile durch Zuckungen erfolgt, ist auch unendlich klein und unmessbar. Wenn man Frösche mit Opium oder Nux vomica vergiftet, so werden sie zuerst so ungeheuer sensibel, dass die geringste Berührung der Haut eine Zuckung am ganzen Rumpfe erregt. Hier erfolgt die Wirkung von der Haut zuerst auf das Rückenmark, und vom Rückenmark auf alle Muskeln. Dennoch ist es mir unmöglich gewesen, den geringsten Zeitunterschied zwischen der Berührung und den Zuckungen zu bemerken.

I. Capitel. Mechanik der motorischen Nerven.

I. Von den Gesetzen der Leitung des Nervenprincips in den Bewegungsnerven.

I. Die motorische Kraft wirkt in den Nerven nur in der Richtung der zu den Muskeln hingehenden Primitivfasern, oder in der Richtung der Verzweigung des Nerven und niemals rückwärts. Es ist eine allgemein bekannte Erfahrung, dass, wenn man einen Muskelnerven reizt, die Zuckung in keinem andern Muskel eintritt, als in welchem sich der Nerve verzweigt. Reizt man einen Nervenstamm caustisch, mechanisch, elektrisch oder durch unmittelbare Anwendung beider galvanischen Pole auf den Nerven, so zucken die Muskeln aller Nervenzweige des gereizten Stammes, und niemals ein anderer Muskel. Man kann daher auch niemals durch unmittelbare caustische, mechanische oder galvanische Reizung eines Nerven durch beide Pole Zuckungen in Muskeln erregen, welche von Nervenzweigen abhängig sind, die über der gereizten Stelle vom Stamme abgehen. Nie erfolgt eine Spur einer Zuckung in den Muskeln des Oberschenkels, wenn man den untern Theil des N. ischiadicus reizt, wo er die Aeste für die Oberschenkel schon abgegeben hat. Es ist daher eine sichere Thatsache, *dass die motorische Kraft der Nerven nur in der Richtung der Nervenzweige, niemals rückwärts wirkt.* Man kann zwar auch Zuckungen in allen Muskeln erregen, die in dem galvanischen Strome, oder deren Nerven in dem galvanischen Strome liegen, wenn man den einen galvanischen Pol auf den Nerven am untern Theile des Körpers, den andern Pol auf Muskeln der obern Theile applicirt, und dann zucken auch die Muskeln der obern Theile; allein diese Anwendungsart des Galvanismus ist,

Digitized by Google

wie ich schon öfters bemerkte, durchaus verschieden von der unmittelbaren Reizung der Nerven durch beide Pole. Im letzten Falle wird nur der Nerve und seine motorische Kraft gereizt durch Anwendung eines galvanischen Stromes durch die Dicke des Nerven, und der Erfolg ist durchaus eben so, als wenn man den Nerven mechanisch reizt; im ersten Falle dagegen, wo viele andere Theile, Nerven und Muskeln in dem galvanischen Strome zwischen beiden Polen liegen, wird jeder Muskel und jeder Nervenzweig an seinem Orte von dem galvanischen Strome gereizt, und alle Muskeln zucken, die in dem galvanischen Strome liegen; auch müssen die Muskeln zucken, die zwar nicht im galvanischen Strome liegen, deren Nervenstämme aber dem galvanischen Strome ausgesetzt sind. Es wiederholt sich also auch nur wieder diese constante Erfahrungsthatsache, dass ein unmittelbar auf jede Art gereizter Muskelnerve mit motorischer Kraft nur auf die Muskeln seiner Nervenäste wirkt, niemals aber auf die Nervenzweige zurückwirkt, die oberhalb der gereizten Stelle vom Nervenstamm abgehen.

II. Die zweite Thatsache ist, *dass die mechanische oder galvanische Reizung eines Theiles eines Nervenstammes nicht die motorische Kraft des ganzen Stammes, sondern nur die des isolirt gereizten Theils in Anspruch nimmt*, so dass nicht alle Muskeln zucken, welche von dem Stamme Zweige erhalten, sondern nur diejenigen, welche von dem gereizten Theile eines Nervenstammes aus Zweige erhalten. Diese Versuche kann man, um an grösseren Nervenstämmen zu operiren, an Kaninchen machen. Man legt den N. ischiadicus gerade an seinem Austritte aus dem Becken bloss. Man kann dort leicht verschiedene Abtheilungen desselben mit der Nadel isolirt reizen, Abtheilungen, welche später erst aus dem Stamme sich als Aeste entwickeln. Man wird sich überzeugen, dass immer nur diejenigen Muskeln zucken, in welche sich der gereizte Theil des Nervenstammes verzweigt, nicht aber andere Muskeln des Ober- oder Unterschenkels. Um die kleinsten Zuckungen der Muskeln zu sehen, muss man vorher die Haut vom ganzen Bein bis zum Fuss an dem lebenden Thiere abziehen. Als ich den Nerv. ischiadicus, ehe er sich in den Nervus peronaeus und tibialis theilte, in mehrere Bündel trennte und jedes dieser Bündel isolirt reizte, sah ich bei dem einen Bündel eine Zuckung in anderen Muskeln am Unterschenkel, als beim Reizen anderer Bündel, und so bewegten sich denn bald die Wadenmuskeln, bald streckten, bald beugten sich die Zehen. Ja ich konnte Zuckungen in verschiedenen Stellen der Wadenmuskeln bemerken, wenn ich den N. peronaeus in verschiedene Bündel abtheilte, und jedes dieser Bündel mit der Nadel reizte. Dasselbe sieht man bei galvanischen Versuchen mit unmittelbarer Reizung einzelner künstlich abgesonderter Bündel des Nervus ischiadicus beim Frosch.

Man präparire sorgfältig ohne Zerrung eines Nerven beim Frosch ein Faserbündelchen des ganzen Schenkelnerven ab, und galvanisire es durch Anwendung beider Pole und der Kette auf dieses Bündelchen. Obgleich diess gegen die Schenkelmuskeln

Digitized by Google

zu noch in den ganzen Stamm zu den übrigen Nervenfasern des ganzen Stammes tritt, so zucken doch nicht alle Muskeln des Schenkels, sondern es entsteht eine ganz geringe Zuckung an einer einzelnen Stelle der Wadenmuskeln, Zehenbeuger, Zehenstrecker, Fussmuskeln, welche wahrscheinlich von der Fortsetzung jener Fasern im Stamme versehen wird.

Wird hingegen in dem vorher beschriebenen Versuche die Armatur nicht allein an dem Nervenfäserchen selbst, sondern die eine Platte an dem Fäserchen, die andere an dem dickern Theil des Nerven angelegt, so zuckt allerdings die ganze Extremität (A. v. Humboldt *a. a. O. I. p.* 212.); da indess in diesem Falle das galvanische Fluidum nicht auf das Fäserchen isolirt bleibt, sondern auf den Stamm des Nerven geleitet wird, so ist es gerade so gut, als ob der ganze Stamm des Nerven unmittelbar mit beiden Platten armirt worden wäre.

III. Ein Rückenmarksnerve, der in einen Plexus tritt und zur Bildung eines grossen Nervenstammes mit anderen Rückenmarksnerven beiträgt, theilt seine motorische Kraft nicht dem ganzen Stamme mit, sondern den Fasern, in welche er sich vom Stamme bis in die Zweige fortsetzt. Versuche von van Deen, von mir und von Kronenberg zeigen diess.

Beim Frosch kann man die Spinalnerven einzeln reizen, welche zur Bildung des N. ischiadicus zusammentreten, ehe sie sich vereinigt haben. Der Nervus inguinalis hängt durch ein sehr kurzes Verbindungsstück mit dem zweiten Nerven zusammen, so dass das Verbindungsstück meist vom zweiten kommend sich an den ersten anschliesst, sodann von diesem an den zweiten geht. Ferner verbindet sich der ganze zweite Nerve der Extremität mit dem ganzen dritten Nerven; aus dieser Verbindung entsteht der N. ischiadicus, der sich sowohl an der Haut des Oberschenkels, Unterschenkels und Fusses, wie in den Muskeln dieser Theile verzweigt. Man reizt die Nerven einzeln entweder mechanisch mit der Nadel, oder galvanisch, indem man beide Pole auf den Nerven wirken und einen galvanischen Strom durch die Dicke des Nerven gehen lässt, wobei man jeden Nerven, der zum Plexus beiträgt, von den übrigen auf einer Glasplatte isolirt. Man wird hierbei finden, dass beim Reizen der einzelnen Nerven, die zum N. ischiadicus zusammentreten, nicht gleiche Zuckungen in den Hinterbeinen erfolgen, sondern verschiedene, bei dem einen Nerven am Oberschenkel, bei dem andern am Unterschenkel oder am Fuss. Unter den drei Nerven, welche den Plexus der hinteren Extremität bilden, bewirkt der erste, gereizt, Zuckungen an der innern Seite des Oberschenkels, der zweite, der mit dem dritten den N. ischiadicus bildet, allein gereizt, Zuckungen der Muskeln des Oberschenkels und Unterschenkels, aber nicht des Fusses (die indess in mässigem Grade von Kronenberg beobachtet wurde); der dritte Bewegungen des Oberschenkels, Unterschenkels und Fusses. Van Deen's Versuche sind auf andere Weise angestellt. Er durchschnitt jeden der in den Plexus tretenden Nerven einzeln, und fand, dass trotz der Verbindung dieser Nerven untereinander, doch verschiedene Muskeln gelähmt

Digitized by Google

wurden. Nach Durchschneidung des N. inguinalis führte der Frosch noch alle Bewegungen mit den Beinen aus, mit Ausnahme der Anziehung des Oberschenkels zu dem Bauche. Nach Durchschneidung des zweiten Nerven vor dem Plexus hörte alle Bewegung der Muskeln des Oberschenkels und Unterschenkels auf, während die Bewegung am Fusse noch unversehrt blieb. Wurde der Verbindungszweig des N. inguinalis mit dem zweiten Nerven durchschnitten, so konnte der Frosch nicht mehr das Bein zum Unterleib anziehen; nach der Durchschneidung des N. inguinalis unter dieser Verbindung wurde dasselbe beobachtet. Wurde der N. ischiadicus von seinen beiden Wurzeln aus eingeschnitten oder der Länge nach getheilt, so war die Folge dieselbe, als wäre der ganze Stamm des N. ischiadicus durchschnitten worden, woraus VAN DEEN schliesst, dass innerhalb der Verbindung beider Nerven eine Kreuzung der Nervenfasern beider Nerven stattfinde; denn es waren sowohl der Oberschenkel als Unterschenkel und Fuss gelähmt. Nach Durchschneidung des dritten Nerven, der die zweite Wurzel des N. ischiadicus bildet, war der Fuss (und Unterschenkel grossentheils) gelähmt. Durch Durchschneidung des zweiten Nerven oder der ersten Wurzel des N. ischiadicus hörte die Flexion und Extension des Oberschenkels auf, während die Bewegung am Fusse und untern Theile des Unterschenkels fortdauerte. Die Versuche von KRONENBERG weichen im Einzelnen etwas ab, führen aber zu demselben Resultate. Eben so dessen Versuche an den Nerven, welche den plexus brachialis zusammensetzen. *Plexuum nervorum structura et virtutes. Berol.* 1836. Dass im Verlauf eines Nerven keine Mittheilung aus einer Faser in die andere stattfinde und dass die im Verlauf eines Nerven beständige Plexusbildung keine Ursache zur Mittheilung wird, beweist der Verf. durch einen sehr guten Versuch. Er schnitt den Nerven eines Frosches auf einer Seite bis fast zum Rande durch. Etwas davon entfernt schnitt er den Nerven noch einmal, aber auf der entgegengesetzten Seite bis fast zum Rande durch. Durch Reizung des Raumes über dem ersten Schnitt war es nun nicht möglich, das unter dem zweiten Schnitte liegende Stück der Muskeln und Nerven in Thätigkeit zu setzen. Der Zweck des Plexus der Nerven scheint in Beziehung auf die motorischen Nerven zu seyn, jedem Muskel Fasern von verschiedenen Stellen des Gehirns und Rückenmarks zuzuführen. Diess wird z. B. durch den plexus brachialis erreicht, wie die genauere Zergliederung desselben zeigt. Dann mögen die Plexus auch zur Mischung sensorieller und motorischer Fasern je nach dem Bedürfniss der Theile bestimmt seyn.

In den vorhergehenden Erfahrungsgesetzen ist bewiesen, dass die Bündel der Primitivfasern, die in einen Stamm treten, in den Stämmen isolirt ihre Kräfte äussern, ohne die übrigen Primitivfasern zu erregen. Aber selbst einzelne Theile eines Muskels können sich isolirt zusammenziehen, wie die einzelnen Portionen der Flexores communes und des Extensor communis digitorum für die einzelnen Finger. Der Musculus medius hat ganz verschiedene Wirkungen, je nachdem sich sein vorderer oder hin-

Digitized by Google

terer Theil zusammenzieht. Ersterer rollt den Oberschenkel nach einwärts, letzterer nach auswärts. Die einzelnen Theile des Sphincter palpebrarum und des Sphincter oris können isolirt wirken. Diess muss von der Wirkung verschiedener Nervenfasern abhängen.

Uebereinstimmende alltägliche Erfahrungen sind, dass obgleich dieselben Nerven oft Aeste an vielerlei Muskeln geben, der Hirneinfluss sich doch auf die Aeste oder einzelnen Bündel eines Stammes, die zu den Muskeln gehen, isoliren kann. Oft isolirt sich der Nerveneinfluss vom Gehirn aus, z. B. in Krankheiten desselben auf die kleinsten Muskelparthien, welche dann beben. Da aber alle Primitivfasern anatomisch geschieden sind, so folgt aus der Verbindung dieser anatomischen und physiologischen Thatsachen, dass alle Primitivfasern in den Stämmen und Aesten in ihren motorischen Kräften isolirt sind. Zur Zeit, als man das bei den galvanischen Versuchen an Thieren beobachtete Princip, damals thierische Elektricität genannt, noch für die Ursache der Nervenkraft hielt, musste man annehmen, dass diese in Distanz wirke. Alex. v. Humboldt und Reil haben die galvanischen Erscheinungen, wie sie durch Metallreiz an Thieren hervorgerufen werden, zu der Idee von der sensibeln Atmosphäre der Nerven benutzt. A. v. Humboldt hat zuerst die Entdeckung gemacht, dass heterogene Metalle schon galvanisch reizen, wenn eins derselben in einer Entfernung von $\frac{5}{4}$ Linien dem Muskel oder dem Nerven nahe kommt. Derselbe hat aber auch gefunden, dass die Leitung des galvanischen Stromes unter diesen Umständen von einem unmerklichen Verdampfen von Flüssigkeiten abhängt, dass sie sogleich aufhört, sobald keine unmerkliche Verdunstung stattfinden kann, und dass der Stimulus um so heftiger wirkt, je leichter und schneller das angewandte Fluidum verdampft, dass mit dem Anhauchen trockner Metallplatten, welche keine Reaction mehr hervorbringen, die galvanische Reizung sogleich erfolgt.

II. Ueber die associirten Bewegungen oder Mitbewegungen.

Unter Mitbewegungen verstehe ich diejenigen Bewegungen der Muskeln, welche mit intendirten willkührlichen Bewegungen gegen den Willen zugleich erfolgen. In früheren Zeiten wurden mehrere dieser Erscheinungen mit vielen anderen nicht hieher gehörenden associirte Bewegungen genannt. Wir meinen hier nur diejenigen Bewegungen, die durch Bewegungen hervorgerufen werden. Im gesunden Zustande sind diese Bewegungen schon sehr häufig, wir wollen die Muskeln des äussern Ohres bewegen, aber wir bewegen bei dieser Intention auch den Musculus epicranius und mehrere Gesichtsmuskeln mit. Wir wollen die Nasenflügel heben und senken, aber wir runzeln zugleich, ohne dass wir es wollen, die Augenbraunen. Ueberhaupt können die wenigsten Menschen die Bewegungen einzelner Gesichtsmuskeln isoliren; sie können vielmehr die einzelnen Gesichtsmuskeln nur bewegen, wenn sie in einer Gruppe von anderen Gesichtsmus-

Digitized by Google

keln mitspielen. Die Dammmuskeln, Musc. sphincter ani, levator ani, transversus perinaei, bulbo-cavernosus, ischio-cavernosus, pubo-urethralis werden fast immer zusammen bewegt, wenn der Wille auch nur einen einzigen intendirt. Am auffallendsten zeigt sich diese Association bei der Bewegung der Iris. Wir sind nämlich nicht im Stande, die Augen durch den Musc. rect. int. nach innen zu kehren, ohne zugleich die Iris mitzubewegen und zusammenzuziehen. Auch kann das Auge nicht nach Innen und aufwärts gewandt werden (Musc. obliq. inf.), ohne dass die Iris enge wird. Die Bewegung dieser Muskeln und der Iris hängt von Aesten desselben Nerven ab, nämlich des N. oculomotorius, welcher die kurze oder motorische Wurzel des Ganglion ciliare abgiebt. Es springt daher bei der Intention des Willens auf den N. oculomotorius, und zwar auf die jene Muskeln versehenden Primitivfasern, das Nervenprincip immer auch etwas auf einen andern Theil der Primitivfasern des N. oculomotorius, denjenigen, welcher sich in die kurze Wurzel des Ganglion ciliare fortsetzt, über. In allen übrigen Muskeln zeigt sich ganz etwas Aehnliches. Den meisten Menschen ist es schwer, die einzelnen Bäuche des Musc. extensor communis digitorum willkührlich in Thätigkeit zu setzen und die einzelnen Finger z. B., den 3. und 4., die keine besonderen Strecker haben, allein zu erheben; bei Anstrengungen gar wirken viele Muskeln durch Association mit, ohne dass diese Bewegungen irgend einen Zweck haben; der Angestrengte bewegt seine Gesichtsmuskeln, als wenn er mit denselben zum Heben der Last beitragen könnte; bei jedem angestrengten Athmen und bei geschwächten Menschen wirken die Gesichtsmuskeln zum Athmen unwillkührlich mit, ohne dass die Zusammenziehung dieser Muskeln, ausser dem Heben der Nasenflügel irgend etwas zum Athmen beitragen könnte. Es sind dieser Erscheinungen so viele, und sie treten so häufig und alltäglich ein, dass diese wenigen Beispiele eines immer in derselben Weise sich wiederholenden Phänomens genügen können. Doch muss ich eine Thatsache noch besonders hervorheben, weil sie uns die ausgebildetste Tendenz zur Mitbewegung zwischen gleichen Theilen der rechten und linken Seite zeigt. Diess ist die willkührliche Bewegung der Iris. Die Bewegung der Iris ist immer gleichzeitig in beiden Augen, sowohl die durch den äussern Reiz hervorgerufene als die von innen intendirte, und die Bewegung erfolgt immer auf durchaus gleiche Art, mag der Reiz von innen oder aussen auch nur auf ein Auge wirken. Ist nur ein Auge geöffnet, so ist die Weite der Pupille bei dem auf Ein Auge stattfindenden Lichteindrucke grösser, als wenn beide Augen bei gleichem Lichteindruck offen sind. Ist der Lichteindrucke auf beide Augen verschieden, so ist gleichwohl die Grösse der Pupille auf beiden Augen gleich, und entspricht dem Mittel aus beiden Lichteindrücken. So verhält es sich aber auch bei von innen intendirten Bewegungen der Iris. Wir können die Iris immer willkührlich bewegen durch Association, wie ich schon anführte, nämlich durch Bewegung des Auges nach innen, oder nach innen und oben; aber das Merkwürdigste hierbei ist, dass die Iris

Digitized by Google

beider Augen sich verengt, wenn nur Ein Auge ganz nach innen gestellt wird, das andere aber seine gerade Stellung behält. Ich besitze das Vermögen, die Iris durch Einwärtswenden der Augen zu verengern, was jeder Mensch hat; in einem ganz ausserordentlichen Grade. Schliesse ich Ein Auge *A* und sehe mit dem andern *B* gerade aus und unverwandt, so bewege ich die Iris des unverwandten Auges *B* ganz nach Willkühr, je nachdem ich das bedeckte Auge *A* einwärts oder auswärts drehe. Hier ist die Ursache der wunderbaren Bewegung verdeckt, und die Bewegung erscheint um so auffallender, als das Auge, worauf die verborgene Ursache mitwirkt, ganz unverwandt ist. Sogleich wird aber dem Beschauer die Ursache offenbar, sobald ich das Auge *B* öffne, wo man dann sieht, dass ich, sobald ich die Iris in dem unverwandten Auge *B* verengern will, das Auge *A* nach innen stelle. Offenbar muss nun im Gehirn eine durch die Lagerung der Fasern bedingte Intention seyn zur Association der Wirkungen in den Primitivfasern der N. oculomotorii, welche in die kurze Wurzel des Ganglion ciliare gehen. Ein interessantes, nach unseren Principien leicht erklärbares Factum ist die Verengerung der Iris beider Augen im Schlafe. Diess ist auch eine Mitbewegung, deren Ursache die Stellung der Augen nach innen und oben im Schlafe ist, wo mit der Thätigkeit des entsprechenden Zweigs des Oculomotorius auch die Mitreizung der zum Ganglion ciliare gehenden Fasern des Oculomotorius vom Gehirn aus erfolgt. Ausser der Iris haben noch viele andere Muskeln beider Seiten die Tendenz zur Association ihrer Bewegungen vom Gehirn aus. So sind die Augenmuskeln zur Mitbewegung geneigt, denn es ist unmöglich, das eine Auge abwärts, das andere aufwärts, oder beide zugleich nach auswärts zu stellen. Immer bewegt sich das eine Auge unwillkührlich nach einwärts, wenn das andere nach auswärts gedreht wird. Ausführlicher werden wir davon im zweiten Bande dieses Werkes in der Lehre von den Bewegungen handeln. Es gehört Uebung dazu, ein Auge allein offen zu halten, also bloss den Musculus levator palpebrae superioris einer Seite durch den Nervus oculomotorius zu bewegen. Wenige Menschen können die Gesichtsmuskeln der einen Seite durch den N. facialis anders wirken lassen als auf der andern Seite. Ich vermag die Ohrmuskeln zu bewegen, selbst die kleineren, wenigstens ganz deutlich den Musc. antitragicus; aber wenn ich diess an einem Ohre thun will, geschieht es immer zugleich an dem andern Ohre. Ich weiss nicht, ob ein Mensch den Musc. stylohyoideus einer Seite allein bewegen kann. Selbst am Rumpfe zeigt sich eine ähnliche Tendenz zur gleichzeitigen Bewegung derselben Muskeln, aber viel geringer; die Bauchmuskeln und Dammmuskeln, das Zwerchfell wirken fast immer von beiden Seiten zugleich, und selbst die Nerven und Muskeln der Extremitäten, wenn sie auch in dieser Hinsicht freier sind, entziehen sich doch dem allgemeinen Gesetze nicht ganz; wenigstens ist es bekanntlich schwer, entgegengesetzte rotirende Bewegungen einer gewissen Richtung z. B. um eine gemeinschaftliche Querachse, mit beiden oberen oder beiden unte-

Digitized by Google

ren Extremitäten zu vollziehen, während gleichartige Bewegungen mit beiden Extremitäten zugleich sehr erleichtert sind.

Die Theorie aller dieser Erscheinungen ist offenbar. Da die Primitivfasern aller willkührlichen Nerven im Gehirn zuletzt sammt und sonders explicirt werden, um dem Einfluss des Willens unterworfen zu werden, so kann man sich die neben einander im Gehirn zum Vorschein kommenden Anfänge aller Nervenfasern willkührlicher Nerven gleichsam wie die Tasten eines Claviers vorstellen, welche der Gedanke spielt oder anschlägt, indem er die Strömung oder Schwingung des Nervenprincips in einer gewissen Anzahl Primitivfasern, und dadurch Bewegung veranlasst. Am Ursprung dieser Fasern muss aber die Leitung der Hirnsubstanz die gleichzeitige Affektion nahe liegender Primitivfasern erleichtern, so dass es der Intention des Willens schwer wird, sich auf einzelne Primitivfasern zu beschränken. Diese Fähigkeit der Isolation wird aber durch Uebung erlangt, das heisst, je öfter eine gewisse Zahl Primitivfasern der Intention des Willens ausgesetzt wird, um so mehr erhalten sie die Neigung, der Intention allein, ohne die nebenliegenden Primitivfasern, zu gehorchen, um so mehr bilden sich gewisse Wege der leichtern Leitung aus. Wir sehen in gewissen Künsten diese Fähigkeit der Isolation auf den höchsten Grad der Ausbildung gebracht, wie beim Spielen musikalischer Instrumente, besonders beim Clavierspielen.

Alle Mitbewegungen haben ihren Ursprung im Gehirn selbst, durch eine Communication der Primitivfasern in einem motorischen Nerven können sie nicht erklärt werden, weil die Primitivfasern nicht communiciren, und weil die Reizung eines Theiles von einem grossen Nervenstamm niemals auf die übrigen Theile des Nervenstammes, sondern nur auf die Fortsetzung der Fasern des gereizten Theiles vom Stamme wirkt. Siehe oben p. 689.

Durch den N. sympathicus können die Mitbewegungen auch nicht erklärt werden, weil dieser auch keine Verbindungen der einzelnen Theile eines motorischen Nerven unterhält, auch nicht die symmetrischen Nerven beider Seiten, sondern nur das Gehirn und Rückenmark diese verbindet.

II. Capitel. Mechanik der Empfindungsnerven.

I. Von den Gesetzen der Leitung in den sensibeln Nerven.

Um Empfindung zu haben, muss ein Nerve noch mit dem Organe des Bewusstseyns, mit dem Gehirn unmittelbar oder mittelbar durch das Rückenmark zusammenhängen. Betrachten wir jetzt auch hier das Verhältniss der Nervenäste zu den Nervenstämmen.

I. Wenn ein Nervenstamm gereizt ist, so haben alle Theile, welche Zweige von dem Stamme erhalten, Empfindung der Reizung, und es ist eben so gut, als wenn alle letzten Aeste desselben gereizt

Digitized by Google

werden. Reizt man einen Zweig eines Nervenstammes, so ist die Empfindung des Reizes auf den Theil beschränkt, zu welchem dieser Zweig hingeht. Reizt man den Stamm aller Zweige, so ist die Empfindung auf alle Theile ausgedehnt, zu welchen Zweige dieses Stammes hingehen. Diese Versuche kann man begreiflich nur an sich selbst anstellen, sie liefern aber eben so sichere Resultate, wie die Versuche über Bewegung bei Thieren. Wenn man den N. cubitalis absichtlich über der innern Seite des Ellbogens oder über dem Condylus internus zerrt oder quetscht, indem man mit den Fingern den N. cubitalis hin und her schiebt und drückt, so hat man die Empfindung von Prickeln und Nadelstichen, oder von einem Stoss in allen Theilen, in welchen sich der N. cubitalis endlich verzweigt, namentlich in der Fläche und auf dem Rücken der Hand, in dem 4. und 5. Finger. Drückt man stärker, so hat man auch Empfindungen im Vorderarme. Durch starkes Auf- und Abwärtsstreichen mit dem Daumen an der innern Fläche des Oberarms und durch Druck in die Tiefe am obersten innern Theile des Arms trifft man leicht den Nervus radialis, medianus, und man hat ähnliche Empfindungen in den Theilen, wo sie sich verbreiten. Drückt man einen grossen Nervenstamm für ein ganzes Glied, z. B. den Nervus ischiadicus, so hat man die bekannte Empfindung von Prickeln, Nadelstichen und Einschlafen im ganzen Beine, und leicht kann man es durch eine besondere Lage des Oberschenkels beim Sitzen so einrichten, dass der N. ischiadicus bei seinem Austritt schon gedrückt wird. Auf diese Art kann man nach und nach die Stellen finden, wo man durch mechanische, ganz unschädliche Reize an vielen auch kleinen Nerven ähnliche Versuche an seinem eigenen Körper anstellen kann, wie sonst über Bewegungen an Thieren angestellt werden. Man wird sich dabei immer überzeugen, dass bei Reizung eines Stammes jedesmal die Empfindung in den äusseren Theilen aller seiner Aeste stattfindet, gerade so wie bei Reizung eines Muskelnervenstammes die Bewegungen in den Muskeln aller seiner Aeste stattfinden. Es ist also hier gerade so wie bei der motorischen Kraft, nur dass diese noch auf die Muskeln durch Reizung des Nerven wirken kann, wenn der Nerve schon nicht mehr mit dem Gehirn zusammenhängt, die Empfindung aber nur stattfindet, wenn die Reizung der Nerven noch zu dem Gehirn gelangt.

II. Die Reizung eines Nervenzweiges ist mit Empfindung begleitet, die auf die Verbreitung dieses Zweiges beschränkt ist, und (wenigstens in der Regel) nicht mit Empfindung in den Nervenzweigen, die höher vom Nervenstamme oder von demselben Plexus abgehen. Die Thatsachen, welche hierher gehören, sind zu bekannt, als dass ich sie einzeln aufführen müsste. Die Reizung der Haut wird in der Regel nur da empfunden, wo sie stattfindet. Niemals wirkt diese Reizung auf den Plexus brachialis und die übrigen Nerven desselben zurück. Dass ein Empfindungsnerve, der mit einem andern empfindlichen Cerebrospinalnerven anastomosirt, nicht die Empfindungen auf den Stamm des zweiten Nerven überträgt, dass die Anastomose vielmehr nur ein Apparat zur

Digitized by Google

weitern peripherischen Vertheilung der Primitivfasern ist, geht aus den p. 669. angeführten Versuchen von Gaedechens am N. facialis und infraorbitalis hervor; denn bei den Anastomosen zwischen Aesten beider Nerven geht nichts vom N. infraorbitalis auf den Stamm des N. facialis, oder von N. facialis auf den N. infraorbitalis zurück, sondern von beiden Nerven gehen die Fasern aus der scheinbaren Anastomose nur peripherisch weiter. Als Gaedechens einen Zweig des N. facialis zum N. infraorbitalis durchschnitt und das dahingehende Stück des N. facialis reizte, entstanden keine Empfindungen, es ging also vom N. facialis von dort aus nichts durch den N. infraorbitalis zum Gehirn zurück. Eben so wenig wird man an einem vom Stamme des N. infraorbitalis abgetrennten, noch mit dem N. facialis zusammenhängenden Stück des N. infraorbitalis Schmerzen erregen können. Es ist also gerade so wie mit der motorischen Kraft, welche nach Reizung eines Nervenzweigs niemals Zuckungen durch Nervenzweige, die höher aus dem Stamme entspringen, zurückwirkend erzeugt. Unter gewissen Bedingungen können indess auch von einem einzelnen Nerven aus sehr ausgebreitete Empfindungserscheinungen entstehen. Diese Phänomene sind indess nur durch Mitwirkung der Centralorgane, des Gehirns und Rückenmarks und nicht durch Wechselwirkung der Nerven selbst zu erklären, wie später gezeigt werden wird.

III. Erhält ein Theil durch eine Nervenanastomose verschiedene Nerven gleicher Art, so kann nach der Lähmung des einen der andere Nerve nicht die Empfindung des ganzen Theiles unterhalten, vielmehr entspricht der Umfang der noch empfindlichen Stellen der Zahl der noch unversehrten Primitivfasern. Anastomosiren zwei Nerven mit einander, so kann die eine Wurzel der Anastomose nicht die andere ersetzen, so wie die Arterien durch Anastomose einander ersetzen, sondern überall, wo zwei Cerebrospinalnerven sich aneinander legen, um einen dickern Stamm zu bilden, werden durch die Lähmung der einen Wurzel dieses Stammes auch alle Primitivfasern gelähmt, die von diesem Würzelchen in den Stamm treten, und es bleiben nur diejenigen Fasern des Stammes übrig, die von der noch nicht gelähmten Wurzel kommen. Auf diese Art kann nach der Durchschneidung des N. ulnaris, welcher den 5. und 4. Finger, zum Theil auch 3. Finger versieht, dieser nicht durch die Communication dieses Nerven mit dem N. medianus und radialis ersetzt werden, sondern die Durchschneidung des N. ulnaris lähmt die Empfindung in diesen beiden Fingern, wie bekannt ist. Bleibt noch eine geringe Spur von Empfindlichkeit an der Aussenseite des 4. Fingers zurück, so muss sie von den Primitivfasern herrühren, die vom N. medianus sich zum Ramus volaris des N. ulnaris gesellen. Die geringe Empfindlichkeit, die im Gliede von einem der Nerven zurückbleibt, kann also immer aus nicht communicirenden und nur scheinbar anastomotischen Fasern anderer Nerven erklärt werden. Diese Facta werden vollkommen durch die Geschichte der örtlichen Lähmungen erläutert. In einem Falle, in welchem Earle (*Med. chirurg. transact. Vol. VII.*) einen Theil des Ulnarnerven hinter dem Condylus int. ossis humeri ausschnitt, konnte der kleine Finger noch fünf Jahre nach

Digitized by Google

der Operation nicht gebraucht werden, und hatte nur unvollkommene Empfindungen. Swan bemerkt hierbei mit Recht, wenn die vermeinte Communication auch nur in einem geringen Grade vorhanden wäre, würden dann nicht die Anastomosen, welche zwischen dem Theil des Ulnarnerven, der unterhalb der Trennung liegt, und dem Nervus medianus und radialis stattfinden, eine hinlängliche Verbindung jenes Theiles mit dem Gehirn unterhalten haben, wenn jenes Fortleiten des Nerveneinflusses so leicht wäre? a. a. O. p. 68. Swan erzählt p. 69. einen andern Fall, wo nach einer Schnittwunde am Vorderarm, drei Zoll vom Handgelenk, wobei der N. radialis und medianus durchschnitten worden zu seyn schienen, im Daumen und den beiden nächsten Fingern, so wie in den Theilen der Hand, welche diesen entsprechen, auf dem Rücken und in der Fläche das Gefühl verloren war, dagegen in dem 4. und 5. Finger und in den Theilen der Hand, in welchen sich der N. ulnaris vertheilt, das Gefühl erhalten war.

Wenn daher Nerven vielfache Anastomosen zu bilden scheinen, und in den Bündeln desselben Stammes oft von Zoll zu Zoll Anastomosen ihrer Scheiden eingehen, während die Primitivfasern parallel fortgehen, so hat die Natur nichts den Anastomosen der Gefässe Gleiches gebildet, sondern vorgesehen, dass dieselben Theile Primitivfasern von verschiedenen Nerven aus erhalten. Diese Anordnung war darum um so nützlicher, als sonst durch Verletzung eines Nerven die Verbindung eines Theiles mit dem Gehirn ganz aufgehoben wäre.

IV. Verschiedene Theile, in der Dicke eines Empfindungsnerven gereizt, bewirken dieselben Empfindungen, wie wenn verschiedene Endzweige dieser Theile des Stammes gereizt werden. Beweis. Wenn man den N. cubitalis auf die schon beschriebene Art an sich selbst mechanisch reizt, besonders indem man ihn mit den Fingern drückend hin und her schiebt, so hat man die Empfindung von Prickeln, Nadelstechen in der Hohlhand, im Rücken der Hand und am 4. und 5. Finger. Aber je nachdem man gerade drückt, tritt das Prickeln bald am 4., bald am 5. Finger, bald in der Hohlhand, bald auf dem Rücken der Hand ein, und in der Hohlhand wie auf dem Rücken derselben wechselt auch der Ort des prickelnden Punktes, je nachdem sich der Druck am N. cubitalis ändert, also verschiedene Fasern dieses Nerven oder Faserbündel mehr gedrückt werden als andere. So wird man es auch finden bei Reizung der Nervenstämme am Oberarm; allein beim N. cubitalis lässt sich gerade am besten der Druck auf verschiedene Theile in der Dicke des Nerven isoliren, je nachdem man bald drückt, bald den Nerven in der Furche am Condylus internus humeri am Ellbogen mit dem Finger der andern Hand hin und her schiebt. So habe ich auch durch heftigen Druck auf den N. infraorbitalis an der Austrittsstelle aus dem Foramen infraorbitale das Prickeln an der Wange und der Oberlippe an verschiedenen Stellen empfunden, je nachdem der Druck und das drückende Hin- und Herschieben wechselte. Die Application des Druckes auf den N. infraorbitalis ist übrigens

Digitized by Google

viel schwerer, weil man die Austrittsstelle des Nerven durch Druck und die erfolgenden Gefühle erst bestimmt ausmitteln muss.

V. Die Empfindungen der feinsten Nervenfasern, wie die der Nervenstämme, sind isolirt und vermischen sich nicht mit einander von den äusseren Theilen bis zum Gehirn. Beweis. Dieser Schluss ergiebt sich aus den vorher mitgetheilten Thatsachen und Gesetzen. Früher wurde bewiesen, dass alle Primitivfasern eines Nerven sich niemals verzweigen oder verbinden, weder im Stamme noch in den Anastomosen der Nerven, wo die Primitivfasern bloss aus einer Scheide in die andere Scheide übergehen und neue Ordnungen bilden, indem sie sich nur parallel an andere Primitivfasern anlegen. Es wurde gezeigt, dass der Nervenstamm auf diese Art das Ensemble aller Primitivfasern ist, die sich aus seinen Aesten entwickeln, und dass also eine prästabilirte Harmonie der Fasern des Stammes mit den Elementen der feinsten Zweige existirt. Es wurde ferner bewiesen, dass die Stämme der Nerven dieselbe Empfindung haben als alle Zweige zusammen, dass ein Ast des Stammes bei dem Reiz keine Empfindung in anderen Aesten desselben Stammes erregt, dass ein Theil eines Stammes eben solche Empfindungen hat, als wenn einzelne Theile von den Zweigen des Stammes oder der Theile, wo sie hingehen, gereizt werden. Fasst man diess Alles zusammen, so wird man den vorher aufgestellten Schlusssatz zugeben müssen, obgleich er nur approximativ und nicht von jeder feinsten Primitivfaser erwiesen ist. E. H. Weber's schöne Versuche, nach welchen die Unterscheidungskraft für die Distanz zweier die Haut berührender Körper in verschiedenen Theilen sehr verschieden ist, und nach welchen mehrere Theile des Körpers, wie die Zungenspitze, die Distanz zweier Körper schon auf $\frac{2}{3}$ Linie Entfernung, andere, wie die Mittellinie des Rückens, nur auf 30 Linien Entfernung unterscheiden, ist kein Einwurf wider jenen Satz; denn jene Unterscheidungskraft hängt wohl davon ab, wie viel oder wie wenig Primitivfasern sensibler Nerven zu einem gewissen Felde des Hautorganes hingehen.

Es fragt sich nun, wenn die Primitivfasern der Nerven, die im Stamme vereinigt zusammenliegen, in den Aesten ausgebreitet werden, an verschiedenen Stellen ihrer Länge gereizt sind, was für eine Empfindung sie haben, ob die Empfindung auch dann in Hinsicht des Orts immer eine ist, oder ob die Empfindungen an verschiedenen Stellen in der Länge der Primitivfasern als verschiedene unterschieden werden. Kann ich es aus der Empfindung wissen, ob ein und dasselbe Bündel Primitivfasern an seinem Stamme, in den Aesten oder in der Haut, wo sie sich entwickelt haben, gereizt wird? Die Antwort ist zum Theil in den vorher mitgetheilten Beobachtungen enthalten.

1) Wenn der Stamm eines Nerven gereizt wird, so ist die Empfindung, als wenn alle die Primitivfasern gereizt würden, welche sich in die äusseren Theile begeben, und die Empfindung hat eben so gut scheinbar in den äusseren Theilen statt, als wenn diese selbst gereizt werden.

Digitized by Google

2) Wenn verschiedene Primitivfasern in einem Nervenstamme gereizt werden, so ist die Empfindung, als wenn verschiedene Punkte an den äusseren Theilen gereizt werden.

3) Die Reizung jedes Astes ist mit Empfindung begleitet an den Theilen, zu welchen der Ast hingeht.

Es scheint also gleich, wo die Primitivfasern gereizt werden: in den Stämmen selbst, wo sie noch neben einander liegen, in den Aesten, wo sie sich in Bündel abgetheilt haben, oder in den äussersten Theilen, wo sie sich ganz vereinzeln. Wird die Haut gereizt durch Nadelstiche oder indem Mücken darüber laufen, sind also die Enden der Primitivfasern irritirt, so haben wir dort die Empfindung von Nadelstichen und Mückenlaufen; werden dagegen die Massen der Primitivfasern in einem kleinen Zweig am Finger gedrückt, so entsteht die Empfindung von Nadelstichen und Mückenlaufen in der Haut der Finger; wird ein ganzer Stamm gedrückt, so entsteht dieselbe Empfindung von Nadelstichen und Mückenlaufen in der Haut, wo die letzten Enden der Primitivfasern des Stammes hingehen. Ist der Druck auf den Stamm z. B. des Nervus cubitalis oder eines anderen an der innern Seite des Oberarms plötzlich und stark, so ist die Empfindung wie von einem elektrischen Schlage in allen Fasern, in welchen sich der Stamm verbreitet; aber dieser Schlag fühlt sich scheinbar nicht da, wo der Nerve gedrückt wird, sondern da, wo die Primitivfasern des Nervenstammes in der Haut der Finger, der Hand, in den Muskeln des Vorderarms sich enden. Es gehören hieher auch die Phänomene bei der Durchschneidung der Nerven beim Menschen in Amputationen. Im Momente der Durchschneidung der Nerven werden die heftigsten Schmerzen scheinbar in dem zu amputirenden Theile, worin sich die durchschnittenen Nerven verbreiten, empfunden. Diess ist etwas ganz Constantes, wie mir auf meine Frage der erfahrungsreiche Dirigent der chirurgischen Abtheilung des Krankenhauses zu Hamburg Herr Dr. Fricke versichert hat. Da jede Primitivfaser eines Nerven bei ihrer Länge vom Gehirn, durch den Stamm des Nerven in die Aeste, bis in die Haut nur in einem Punkte nämlich am Ende mit dem Gehirn zusammenhängt, so scheint es ganz consequent, dass diese Primitivfasern unten in der Haut, in der Mitte oder im Stamme afficirt, dieselben Empfindungen haben sollen; denn alle Empfindungen, die in ihrer ganzen Länge stattfinden, können sie doch nur in einem einzigen Punkte mit dem Gehirn oder dem Organe des Bewusstseyns in Verbindung bringen. Es scheinen daher alle Primitivfasern eines Nerven, mögen sie lang oder kurz seyn, immer nur einen Punkt im Gehirn zu repräsentiren, der immer dieselbe Empfindung zum Bewusstseyn bringt, mag die Faser in der Haut afficirt seyn oder im Stamme. Wir scheinen bei Reizung der Nervenfasern an verschiedenen Orten ihrer Länge die Empfindungen immer in der Haut zu haben, weil sie in der Regel immer dann entsteht, wenn die Haut oder die Hautenden der Primitivfasern afficirt werden. So richtig diese Schlüsse aus den bisher angeführten Beobachtungen sind, so ist diese Theorie der Empfindungen doch noch ziem-

Digitized by Google

lich weit von einem vollkommenen Beweise entfernt, wie sich aus Folgendem ergiebt.

VI. Obgleich beim Druck auf einen Nervenstamm, die Empfindungen in den äusseren Theilen zu seyn scheinen, wird doch auch ein heftiger Druck des Stammes zugleich an der Druckstelle des Stammes empfunden. Diese Erfahrung macht man sonst nur selten, indem man sich an den Nervus ulnaris anstösst. Man kann aber ohne gewaltsame Eingriffe auch Versuche darüber an sich anstellen. Drückt man nämlich den Nervus ulnaris über dem Condylus internus humeri allmählig verstärkt an den Knochen an, indem man ihn bei dem Druck zugleich fixirt und nicht verschiebt, so wird zwar der ganze Arm unter der Druckstelle, und zwar so weit sich der Nervus ulnaris verzweigt, schmerzhaft, allein ein lebhafter, nicht bloss von der Empfindlichkeit der umliegenden Theile herrührender Schmerz, der seinen Sitz im Stamme des Nervus ulnaris hat, fühlt sich auch an der Druckstelle. Diess dürfte nach Analogie der vorhergehenden und noch später zu beschreibenden Erscheinungen nicht seyn, und es scheint, dass uns hier noch etwas Räthselhaftes, für die Theorie der Empfindungen Wichtiges verborgen ist. Man beobachtet etwas Aehnliches bei den Neuromen. Die characteristischen Symptome dieser Geschwülste der Nerven sind zwar, dass die Schmerzen in allen Theilen, zu welchen der Nerve hingeht, z. B. bei einer Geschwulst des Nervus ulnaris am Oberarm, die Schmerzen in der Hand und am 4. und 5. Finger furchtbar heftig auftreten, wie denn auch im Moment der Durchschneidung des kranken Nerven über der Geschwulst in jenen Theilen die furchtbarsten Schmerzen eintreten (von mir selbst bei einer vom Professor Wutzer im chirurgischen Clinico gemachten Durchschneidung des Nervus ulnaris am Oberarm über einem Neuroma desselben beobachtet). Vergl. Aronssohn *observ. sur les tumeurs developpées dans les nerfs. Strasb.* 1822. *p.* 9. Allein auch das Neuroma selbst pflegt sehr schmerzhaft und empfindlich zu seyn. An diese Erfahrungen, dass ein Nervenstamm afficirt sowohl an den Theilen, zu welchen seine Zweige hingehen, als an sich selbst Empfindungen verursacht, schliesst sich eine ähnliche Erscheinung vom Rückenmark an, bei dessen Krankheiten die Schmerzen in der Regel in allen unter der afficirten Stelle liegenden peripherischen Theilen, allein zuweilen, obgleich selten, wie bei der Neuralgia dorsalis, auch in der Mittellinie des Rückens vorgefunden werden.

Leider hat die ausübende Chirurgie die herrliche Gelegenheit, Beobachtungen über die Erscheinungen bei der Durchschneidung der Nerven anzustellen, bis jetzt so wenig benutzt. Bei einem so gewaltsamen Eingriff in die Organisation eines Menschen, wie die Amputation oder die Durchschneidung eines Nerven, müssten sich die wichtigsten physiologischen Fragen aufdrängen.

Auch die Verbreitung der Schmerzen in den Neuralgien nach dem Verlauf der Nerven scheint der früher angeführten Theorie der Empfindungen zu widersprechen. Doch muss bemerkt wer-

Digitized by Google

den, dass die Verbreitung der Schmerzen in den Neuralgien keineswegs immer nach dem Verlauf der Nerven erfolgt. In mehreren Fällen von reinen Neuralgien, die ich in Berlin untersuchte, verliefen die Schmerzen durchaus nicht nach der anatomischen Verbreitung des Nerven; ich sah z. B. eine Neuralgie des Gesichts, die vom Scheitel anfangend durch die Orbita auf die Wange ging und dort endete. Bei einer andern Neuralgie konnte man den N. ulnaris, so gut als den N. radialis im Verdacht haben, und doch passte Beides nicht recht. Eben so sah ich eine Neuralgie am Schenkel, die der Arzt wohl gewöhnlich für Ischiadik, aber ein Anatom nicht dafür halten würde. Dagegen sah ich auch wieder eine Neuralgie der N. facialis und lingualis, wo die Schmerzen, wenn auch nicht constant, doch öfter unter dem Ohr hervorzukommen und sich strahlenförmig im Gesicht zu verbreiten schienen. Bei demselben Manne ging der Schmerz oft gegen die anatomische Verbreitung, und warf sich oft vom Gesicht auf die Zunge. In diesem Falle bilden die Neuralgien aber einen Einwurf gegen die früher erwähnte Theorie der Empfindungen. Wenn die oben erwähnten Thatsachen gegen jene Theorie von der Mechanik der Empfindungen sprechen, so sind ihr die folgenden wieder günstig; hier fehlt uns ein Aufschluss, der diese Widersprüche aufhellt.

VII. Wenn die Empfindung in den äusseren Theilen durch Druck oder Durchschneiden vollkommen gelähmt ist, so kann der gereizte Stamm des Nerven noch Empfindungen haben, welche in den analogen äusseren Theilen zu seyn scheinen. Beweis. Es giebt bekanntlich Lähmungen, bei welchen die Glieder durchaus keine Empfindlichkeit für äussere Reize haben, und wobei gleichwohl die heftigsten Schmerzen in dem für äussere Reize unempfindlichen Theile stattfinden. Solche Glieder kann man stechen, anschneiden, stossen, ohne die geringste Empfindung, und dennoch sind die Schmerzen aus inneren Ursachen zuweilen stark. Bei dem bisherigen rohen Zustande der Nervenphysiologie waren diese Fälle ein Widerspruch, ein unauflösliches Räthsel. In Bonn habe ich einen solchen Fall bei einem gewissen Heidenreich gesehen, der an den unteren Extremitäten vollständig, sowohl in Hinsicht der Empfindung als der Bewegung, gelähmt ist. Von Zeit zu Zeit werden die Glieder von Zuckungen ergriffen, wobei heftige Schmerzen im ganzen Beine eintreten, aber die Empfindung für äussere Reize nicht wiederkehrt. Wenn die äusseren Theile der Nerven gelähmt sind, so kann die Irritation der Stämme noch die heftigsten Schmerzen verursachen, welche in den äusseren Theilen zu seyn scheinen (Anaesthesia dolorosa). Man sieht leicht ein, dass die schmerzhaften Lähmungen der Empfindung vorzüglich solche seyn müssen, wo die äusseren Theile der Nerven gelähmt sind, die Stämme und Ursprünge aber noch unversehrt, also in den rein örtlichen Lähmungen der Nerven bei vollkommener Integrität des Gehirns und Rückenmarks, wie in den örtlichen rheumatisch-gichtischen Lähmungen, in örtlichen Lähmungen, die durch Druck auf die Nerven, durch ganglióse Anschwellungen der Nerven verursacht sind. Earle

Digitized by Google

erzählt einen Fall (*med. chirurg. transact.* 7. 173. MECKEL's *Archiv* 3. 419.) von Lähmung des Armes durch einen Schlüsselbeinbruch. Die Finger und der ganze Arm waren empfindungslos gegen äussere Eindrücke, dennoch empfand der Kranke bei jedem Versuch das Glied zu bewegen, bisweilen sogar bei voller Ruhe, heftige Schmerzen in den Fingerspitzen.

Hierher gehört auch die durch unzählige Erfahrungen bestätigte Thatsache, dass die Durchschneidung der Nerven bei Neuralgien in der Regel nichts fruchtet, und dass die Schmerzen oft wiederkehren, obgleich die Nerven durchschnitten, ja stückweise ausgeschnitten waren, so dass die Schmerzen in der Wange eben so heftig wurden als zuvor. In der That, wenn der Nervenstamm die Ursache der Neuralgie ist, kann die Durchschneidung des Stammes z. B. des Nervus facialis, infraorbitalis, durchaus nichts fruchten, denn der Stumpf des Stammes, der noch mit dem Gehirn in Verbindung steht und noch alle Primitivfasern enthält, die sich in der Haut entwickelten, hat, wie wir wissen, bei seinen Reizungen dieselben Empfindungen scheinbar in den äusseren Theilen, als wenn diese selbst afficirt sind. Nur selten fruchtet die Durchschneidung des Nerven und die Ausschneidung eines Stückes, und natürlich nur dann, wenn die Ursache der Neuralgie in den Aesten, nicht im Stamme war.

Mit der Durchschneidung eines Nerven hört daher nur die Möglichkeit auf, mit dem Hautende der Nervenfasern äussere Eindrücke zu empfinden, weil der Eindruck nicht mehr zum Gehirn geleitet werden kann. Aber dieselben Empfindungen, die sonst aus äusseren Eindrücken entstehen, werden aus innerer Ursache erscheinen, wenn nur die Primitivfasern des Stammes mit dem Hirn- oder Rückenmark in Verbindung stehen.

Wenn ein Nerve zufällig z. B. am Finger durchschnitten wird, so tritt im Zeitraume der Wundentzündung Schmerz in dem gelähmten Theile des Fingers ein, während derselbe Theil gar kein Gefühl gegen äussere Reize hat. Die Empfindung des Schmerzes vergeht wieder nach der Wundentzündung, und nun ist der Theil wieder ganz empfindungslos. Von besonderem Interesse ist in dieser Hinsicht eine Beobachtung von GRUITHUISEN an sich; die ich schon p. 411. berührt habe. Nach einer Verwundung am Daumen, welche den N. dorsalis radialis pollicis durchschnitt, wurde die Seite des Daumenrückens bis unter den Nagel ganz unempfindlich. Zur Zeit der Entzündung wurde diese Hautstelle sehr schmerzhaft; diese Schmerzen verschwanden nach acht Tagen mit der Heilung, worauf der für äussere Eindrücke unempfindliche Zustand allein übrig blieb. Wenn GRUITHUISEN später auf die Narbe klopfte, hatte er die Empfindung von Prikkeln unter dem Nagel. *Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie.*

EVERARD HOME erzählt in den *Phil. transact.* einen Fall von Gesichtsschmerz. In einem Falle, wo man die Durchschneidung des Nerven verrichtet, gelang die Vereinigung per primam intentionem nicht, und während der Zeit, dass die Wunde offen war, verursachte der entzündliche Zustand des getrennten Nervenen-

Digitized by Google

des dem Kranken Anfälle, die denen glichen, welche er vor der Operation erlitten hatte. Als aber die Wunde vollständig geheilt war, trat kein solcher Anfall wieder ein. J. Swan *über die Localkrankheiten der Nerven, übers. von* Francke. *Leipzig* 1824. *p.* 78.

Die Phänomene beim sogenannten Einschlafen der Glieder von Druck auf die Nerven sind auch Erläuterungen davon. Der Druck auf die Nerven hebt die Leitung von den peripherischen Enden der Nerven auf; aber derselbe Druck afficirt auch den centralen Theil des Nerven, daher die Empfindung von Formicatio, Prikkeln, Stechen in dem Beine, welches gleichwohl seine Empfindlichkeit für äussere Eindrücke verliert.

Häufig entsteht auch das Gefühl der Formicatio scheinbar in äusseren Theilen, wenn doch die Nervenursprünge vom Rükkenmark oder Gehirn, oder diese Theile selbst afficirt sind. Bei dem Gefühl von Formicatio in einem Gliede kann man noch gar nicht wissen, ob die Ursache in der Haut, im Nervenstamme oder am Ursprunge der Fasern im Rückenmark ist. Oft ist die Ursache im Rückenmark. Das Rückenmark hat fast in allen seinen Krankheiten Formicatio, scheinbar in der Haut, zum Symptom, bei der Rückenmarkslähmung ist die Formicatio oft in allen Theilen, welche unterhalb der Verletzung Nerven erhalten; bei der Tabes dorsalis ist die Formicatio nicht etwa in der Mittellinie, sondern am ganzen Körper in der Haut, oder in dem untern Theile des Körpers *).

Man sieht aus dem eben Vorgetragenen, dass die Aura epileptica (auch eine Art Formicatio) vor dem Anfalle in den äusseren Theilen, nur in den äusseren Theilen vorzukommen scheint, während ihre Ursache und ihr Sitz doch im Rückenmark oder Gehirn ist. Sie ist der erste Anklang der weiteren Rückenmarksaffectionen und Gehirnaffectionen, die im Verfolg des Anfalls auftreten. Wenn der epileptische Anfall zuweilen durch Zusammenschnüren des Gliedes über der Aura epileptica aufgehoben wird, so geschieht diess wohl nicht, weil etwas Krankhaftes fortzuschreiten gehindert würde, sondern weil durch das Zusammenbinden ein heftiger Eindruck auf das Sensorium erfolgt. Doch muss bemerkt werden, dass bei derjenigen Form der Epilepsie, welche durch Geschwülste von Nerven entsteht, durch die Ligatur eines Gliedes wirklich die Fortleitung der Reizung zum Rückenmark aufgehoben wird.

Legt man sich um den Oberarm über dem Ellbogengelenke ein Tourniquet an, so kann man alle Theile der Hand zum Gefühl des Einschlafens, zuletzt zu Empfindungslosigkeit bringen. Zuerst entsteht Prickeln und Nadelstechen, dann allmählig Taubseyn und das Gefühl von Kälte, zuletzt anfangende Empfindungslosigkeit für äussere Reize. Wenn man nun die Nervenstämme in der Achselhöhle und am Oberarm durch einen zerrenden Griff reizt,

*) Ich weiss von keiner Beobachtung, dass Formicatio in Schleimhäuten aufträte.

Digitized by Google

so hat man eben so deutliche Empfindungen eines elektrischen Schlages in der Hand, als wenn die Nerven des Vorderarms und der Hand nicht eingeschlafen sind.

VIII. Wenn das Glied, in welchem sich ein Nervenstamm verbreitet, durch Amputation entfernt ist, so kann der Stamm der Nerven, weil er das Ensemble der verkürzten Primitivfasern noch enthält, Empfindungen haben, als wäre das amputirte Glied noch vorhanden. Diess dauert durchs ganze Leben. Die Erfahrung, dass die Amputirten noch Empfindungen haben, als wäre das amputirte Glied noch vorhanden, ist allen Chirurgen bekannt; es ist niemals anders. Gewöhnlich sagt man, diese Sinnestäuschungen dauern einige Zeit fort, so lange als Amputirte im Gesicht des Chirurgen bis zur Heilung bleiben. Die Wahrheit ist aber, dass diese Sinnestäuschung in den meisten Fällen immer bleibt, dass sie sich durchs ganze Leben mit gleicher Lebhaftigkeit erhält, wie man sich überzeugen kann, wenn man irgend Amputirte lange Zeit nach der Amputation befragt. Zur Zeit der Entzündung des Amputationsstumpfes und der Nervenstämme, sind die Empfindungen am lebhaftesten, und die Kranken klagen dann über sehr heftige Schmerzen in dem ganzen Gliede, welches sie verloren haben. Nach der Heilung bleiben die Empfindungen zurück, die man überhaupt von einem gesunden Gliede hat, und häufig bleibt durchs ganze Leben hindurch ein Gefühl von Formicatio, öfter von Schmerzen scheinbar in den äusseren Theilen, welche nicht mehr da sind. Diese Empfindungen sind nicht unbestimmt, sondern der Kranke fühlt deutlich die Schmerzen, die Formicatio in den einzelnen Zehen, in der Fusssohle, am Fussrücken, in der Haut, etc. Lächerlich sind die idealistischen Erklärungen dieses wichtigen Phänomens aus der Imagination, etc. Die Physiologen haben es lange Zeit als eine Curiosität behandelt. Allein die Untersuchungen derjenigen Amputirten, die mir zugeschickt wurden und die ich auffinden konnte, haben mir erwiesen, dass das Gefühl sich in diesen Fällen nie ganz verlor. Die Amputirten werden zuletzt so sehr daran gewöhnt, dass sie gar nicht mehr darauf achten; allein sobald sie wieder darauf aufmerksam sind, ist das Gefühl sogleich vorhanden, und sie fühlen oft Zehen, Finger, Fusssohle, Hand ganz deutlich. Noch viel stärker wird das Gefühl, wenn man ein Band oder Tourniquet um den Amputationsstumpf legt, oder wenn man ihn so drückt, wie sonst geschieht, wenn das Einschlafen eines Gliedes erfolgt. Dann tritt sogleich Formicatio ein, das Gefühl von Ameisenlaufen erscheint in der Hand, im Fuss, in der ganzen Extremität, durchaus mit derselben Deutlichkeit, als wenn sie noch vorhanden wären. Die Amputirten haben daher nach der Operation auch dann am lebhaftesten wieder das Gefühl ihres verlornen Gliedes, wenn der Chirurg wegen anderweitiger Ursachen wieder das Tourniquet anlegt.

Haben die Kranken auch vor der Amputation an einem örtlichen schmerzhaften Schaden gelitten, so wird doch nach der Amputation das ganze Bein schmerzhaft gefühlt, und das

Digitized by Google

ganze Bein schmerzt scheinbar, wenn der Nerve durchschnitten ist und der Amputationsstumpf sich entzündet.

Ich rede nicht von den Träumen der Amputirten, von den lebhaften Empfindungen des ganzen scheinbaren Beins, wenn der Stumpf desselben durch die Lage gedrückt wird, da die Empfindung gewöhnlich bei den Amputirten durchs ganze Leben bleibt.

Beispiele.

1) N. N. eine Frau, welche eine Lähmung der Empfindung am Arme hatte, bekam einen Bruch des kranken Arms, der darauf in Brand überging und amputirt werden musste im Clin. chirurg. zu Bonn. Die Amputation war ohne Empfindung. Allein die Durchschneidung des Nerven musste die Ursache gewesen seyn, dass das Gefühl in dem Nervenstamme wieder erregt wurde. Schon in der Nacht klagte die Frau über Schmerzen in den Fingern.

2) Joh. Wolff, ein Schneidergeselle in Bonn, ist vor 12 Jahren am ersten Drittheil des Oberschenkels wegen Caries im Clin. chirurg. amputirt worden. Er hatte sogleich noch das Gefühl, als wäre das Bein vorhanden, und klagte die folgenden Tage sehr über Schmerzen im Beine bis in die Zehen. In denselben Tagen wurde ein Anderer am Arm amputirt, der auch darauf über Schmerzen in der Hand und am ganzen Arme klagte. Diesen Joh. Wolff habe ich nach 12 Jahren untersucht. Er hat immer noch das Gefühl, als wären die Zehen und die Fussohle vorhanden, und zuweilen heftige Schmerzen in der Fusssohle, die er nicht mehr hat. Zuweilen schläft der Stumpf beim Liegen ein, und es tritt dann Formicatio in den Zehen ein, die auch sonst öfter vorhanden ist. Ich legte an den Amputationsstumpf des Oberschenkels ein Tourniquet an, so dass der Stumpf des N. ischiadicus gedrückt wurde; sogleich sagte Wolff, dass ihm das Bein wie einschlafe, und er konnte ganz deutlich die Formicatio in den Zehen unterscheiden.

3) N. N., Stud. chirurg., ein Jude, wurde wegen eines Gelenkübels am Ellbogen im Oberarme amputirt. Er hatte, so lange er beobachtet wurde, nicht die Empfindung des verlornen Armes verloren.

4) Herr Stud. Schmidts aus Aachen ist seit 13 Jahren am Oberarm amputirt; die Empfindungen in den Fingern haben nie aufgehört. Herr Schmidts glaubt die Hand immer in einer gekrümmten Stellung zu fühlen. Das scheinbare Prickeln der Finger ist vorhanden, vorzüglich wenn der Stumpf aufliegt und die Stämme der Armnerven gedrückt werden. Ich legte einen Druck gegen die Nervenstämme des Amputationsstumpfes an, sogleich trat die Empfindung von Einschlafen scheinbar im ganzen Arme bis in die Finger ein.

5) N. N., mein Commissionär zur Zeit meines Aufenhalts in Leyden, ist vor 12 Jahren am Oberarm amputirt worden. Er hat zuweilen Gefühle von Formicatio, wie in den Fingern, besonders wenn der Arm aufliegt.

6) Vir quidam in nosocomio judaico berolinensi, cui pes si-

Digitized by Google

nister, et alter, cui brachium sinistrum amputatum erat, dicebant ambo, alter post hebd. 14., alter 17.: se per operationum nihil commodi nactos esse; alter querebatur de dolore vehementi pedis et alter brachii, cum tamen non tam male eos habuisset quam in primis hebdomadibus post factam operationem et uterque non per hebdomades, sed per menses hosce, sensus hujus fallacis diminutionem habere fatebatur. Lemos *dissert. inaug. quae dolorem membri amputati remanentem explicat. Hal.* 1798. *p.* 33.

7) Nunc temporis etiam ibi versatur juvenis, cui ante novem menses brachium sinistrum demtum est. In hoc eadem sensatio sub quinto et sexto mense post operationem decessit, sed mense octavo aliquot dies, ubi vehementior esse coepit, habuit, ut interdiu tantum ope oculi et nocte ope manus alterius jacturae hujus se convincere posset. Ibid. p. 33. Der Verfasser dieser Dissertation erklärt das Factum ungenügend aus der Association der beiden Extremitäten, welche selbst erklärt werden sollte.

8) Ein Chausseegeldeinnehmer in der Nähe von Halle, dem in den Freiheitskriegen der rechte Oberarm durch eine Kanonenkugel zerschmettert und dann amputirt wurde, hat noch jetzt (1833) bei Aenderungen in der Atmosphäre deutliche rheumatische Schmerzen im ganzen Arme, und fühlt dann das an 20 Jahre lang entfernte Stück desselben empfindlich gegen Luftzug. Dass nie die subjective physiologische Empfindung des abgesetzten Gliedtheils verloren wird, bestätigte auch er vollkommen.

9) Ein Mann, dem die Hand amputirt worden, hatte 7 Jahre nachher, bis zu seinem Tode noch Schmerzen in der Hand. Klein in Graefe u. Walther *J. f. Chirurgie.* 3. 408.

Man vergl. über die Empfindungen der Amputirten Valentin in Hecker's *Annalen.* 1836. *B.* 3. *p.* 291. *Repert. f. Anat. u. Phys.* 1836. *p.* 328.

IX. Gleichwie sich die relative Lage der Primitivfasern an ihren Ursprüngen und in den Stämmen nicht ändert, wenn die relative Lage derselben an ihren peripherischen Enden sich verändert, so richten sich auch die Ortsempfindungen der Primitivfasern nach der Ordnung ihres Stammtheils oder Ursprungs und nicht nach der veränderten relativen Lage ihres peripherischen Endes. Der Beweis davon liegt in den Erscheinungen, welche bei künstlicher Lageveränderung der peripherischen Enden eintreten, wie z. B. bei der Transplantation von Hautlappen. Wird bei dem künstlichen Nasenersatz ein Hautlappen der Stirn an der Nasenwurzel umgekehrt und mit dem Nasenstumpf zusammengeheilt, so hat die angeheilte Nase, so lange die Brücke an der Nasenwurzel noch nicht durchschnitten ist, dieselben Empfindungen, wie wenn die Stirnhaut sonst gereizt worden wäre, d. h. man empfindet die Berührung der neuen Nase an der Stirn. Diess ist eine bekannte chirurgische Erfahrung, welche zuerst Lisfranc machte. Diess dauert aber natürlich nur so lange, als die Communication der Nervenfasern an der Nasenwurzel zwischen der Stirn und der neuen Nase noch besteht. Nach dem Durchschneiden jener Stelle hört diese Versetzung der Empfindung auf; die neue Nase ist anfangs

Digitized by Google

empfindungslos; später bildet sich die Empfindung wieder in derselben aus.

Eine zweite ganz ähnliche und auf dieselbe Art zu erklärende Erscheinung ist, dass, wenn man den Zeigefinger und Mittelfinger einer Hand kreuzweise übereinander legt, und zwischen den zugewandten Seiten der gekreuzten Finger, die sonst die entgegengesetzten Seiten derselben waren, eine kleine Kugel, z. B. eine Erbse, hin und her rollt, man zwei Kugeln zu fühlen scheint. Bei dem Berühren einer kleinen Kugel mit zwei natürlich nebeneinanderliegenden Fingern fühlt man eigentlich keine Kugel, sondern zwei Convexitäten, welche die Vorstellung oder der Schluss zur Kugel ergänzt, indem die Phantasie sich vorstellt, dass zwei nebeneinander liegende, mit ihren Convexitäten von einander abgewandte Kugelsegmente zu einer Kugel gehören. Kreuzt man nun die Finger, und macht die beiden äusseren entgegengesetzten Seiten der zwei Finger zu inneren, einander zugewandten Seiten, so behalten die Empfindungen der Fasern ihre relative Lage, wie die Fasern zuletzt zum Gehirn kommen, und als wenn keine Kreuzung stattgefunden hätte, d. h. die Empfindung eines nach aussen wirklich convexen Kugelsegmentes bei x, wird nach y auf die entgegengesetzte Seite transponirt, eben so x' nach y'. Der Inhalt der Empfindungen bei x und y bleibt ganz unverändert, eben so der Inhalt der Empfindungen bei x' und y', aber die Eindrücke sind nach der Transposition nicht mehr zwei von einander abgewandte, sondern zwei einander zugewandte Convexitäten; diese muss die Vorstellung zu zwei Kugeln ergänzen, da zwei einander zugewandte Convexitäten nicht einer und derselben Kugel, wohl aber zwei Kugeln angehören können. Diese Erklärung des Phänomens habe ich schon 1826 in meiner Schrift: *Physiologie des Gesichtssinnes. Lpzg.* 1826. *p.* 84. gegeben, wo überhaupt schon die ersten Elemente des mechanischen Theiles der Nervenphysik angedeutet wurden. Den Versuch finde ich schon bei Aristoteles. Aristoteles *über den Traum.* 2. *cap.*



II. Ueber die Irradiation der Empfindungen oder die Mitempfindungen.

Zuweilen erregt eine Empfindung eine andere, oder die Empfindungen breiten sich krankhafter Weise weiter als die afficirten Theile aus. Diese Erscheinungen, die ich *Mitempfindungen* nenne, sind im gesunden Leben nicht selten. Man kann die Erregung des Kitzels in der Nase durch Sehen in helles Licht, auch die ausgedehnten Empfindungen von einer beschränkten, durch Kitzeln erregten Stelle, und die ausgedehnten Empfindungen von Reizung der äusseren Geschlechtstheile beim Coitus, die Empfindungen, welche ein in unserer Nähe gefallener, erschreckender Schuss erregt, die rieselnden Empfindungen und Schauergefühle beim Hö-

Digitized by Google

ren gewisser Töne, z. B. des gekratzten Glases, dieselben Empfindungen beim Beissen auf sandige Substanzen hieher rechnen. Dagegen gehören noch viel mehr pathologische Phänomene hieher, wie z. B. die Ausbreitung des Zahnwehes über den Ort des Reizes auf das ganze Gesicht, die Ausbreitung der Schmerzen von einem afficirten Finger auf die Hand, den Arm, die anderen Finger, ohne dass man immer eine materielle Mittheilung der krankmachenden Ursache annehmen darf. Besonders ausgedehnt sind diese Irradiationen, wenn eine Nervengeschwulst heftige Empfindungen verursacht, und nun auch die umherliegenden Theile, ja selbst entfernte Theile zu schmerzen anfangen, wie man einen hieher gehörenden Fall in *London med. Gazette* 1834, Froriep's *Not.* 888., erzählt findet, wo nach einer Amputation, durch eine am Knochen und der Narbe festgewachsene Geschwulst des N. ischiadicus die Haut des ganzen Amputationsstumpfes, zuweilen auch entfernte Theile, wie die Bauchdecken, sehr schmerzhaft wurden, ohne alle entzündliche Symptome, Empfindungen, welche nach der zweiten Amputation ganz aufhörten. Man braucht sich nur an einer Stelle der Haut heftig und etwas anhaltend zu verbrennen, um sich zu überzeugen, dass hier Mitempfindungen in benachbarten Nervenfasern entstehen, auf welche sich die Krankheitsursache selbst nicht ausdehnt. Für das gesunde Leben würden dergleichen Mitempfindungen sehr hinderlich seyn, daher sie die Natur durch Isolirung der einzelnen Fasern der Nerven verhütet hat; denn wenn die Fasern von zehn verschiedenen Stellen der Haut in eine irgendwo zusammenflössen, ehe sie zum Gehirn kommen, so konnte das Gehirn auch nur eine einzige Empfindung von zehn verschiedenen Stellen der Haut und an einem Orte haben; und wenn die Primitivfasern der Nerven von einer Stelle mit den Primitivfasern von neun anderen Stellen zusammenflössen, die getrennt zum Gehirn gelangen, so würden im Zustande der Gesundheit von der Erregung einer einzigen Stelle der Haut, zugleich noch neun andere Empfindungen von anderen Theilen mit zum Gehirn kommen müssen. Diess geschieht nun im Zustande der Gesundheit in der Regel nicht, und es kann auch nicht geschehen, weil die Primitivfasern der Nerven auf ihrem Wege zum Gehirn isolirt bleiben. Wie ist nun aber jene ausnahmsweise stattfindende Mitempfindung zu erklären? Da sich an jeder Stelle der Haut bloss durch die Heftigkeit einer Empfindung Mitempfindungen erregen lassen, so kann man jene Erscheinung nicht durch eine, in einigen Nerven ausnahmsweise stattfindende Verbindung der Primitivfasern erklären. Die Erklärung muss vielmehr auf alle Empfindungsnerven passen. Eben so wenig lässt sich die Irradiation der Empfindung bloss durch netzförmige Verbindung der Primitivfasern an ihren peripherischen Enden in der Haut erklären. Denn die Irradiation kömmt auch in der retina vor, wo jedenfalls eine solche Verbindung der Fasern nicht existirt. Man kann zwei Erklärungen der Erscheinung aufstellen.

1) Man erklärt solche Mittheilung der Empfindung aus vor-

Digitized by Google

ausgesetzten Eigenschaften der Ganglien der Empfindungsnerven. Bekanntlich haben alle eigentlichen Gefuhlsnerven ein Ganglion an ihrer Wurzel. Reil (*Archiv für Physiol. Bd.* 7.) verglich die Ganglien des Nervus sympathicus mit Halbleitern, welche die zu schwachen Eindrücke im Nervus sympathicus nicht zum Gehirn leiteten, während sie, wie ein Halbleiter der Elektricität grössere Mengen angehäufter Elektricität durchlasst, auch sehr heftige Reizungen leiten sollten, und welche auch den Einfluss des Gehirns und Rückenmarks auf den N. sympathicus nur beschränkt zulassen sollten. Diese Hypothese könnte man nun auch auf die Ganglien der Empfindungsnerven anwenden; man könnte sagen, diese graue Masse, durch welche die Primitivfasern ohne Neurilem durchgehen, ist als Halbleiter nicht im Stande, eine schwache Reizung der einzelnen Primitivfasern in sich selbst fortzupflanzen und den anderen, durch das Ganglion durchgehenden Fasern mitzutheilen, daher geschieht bei schwachen Empfindungen die Leitung von einer Empfindungsfaser nicht durch die graue Masse nach den Seiten, sondern nur durch die Primitivfaser, welche das Ganglion durchzieht, durch. Werden aber Empfindungen sehr heftig, so wird der Halbleiter des Nervenfluidums zum Leiter, und lässt einen Theil jenes Princips auf die anderen, das Ganglion durchziehenden Primitivfasern überspringen, wodurch eine Irradiation der Empfindung, eine Mitempfindung entsteht.

2) Die zweite Erklärung der Mitempfindungen nimmt auf diese bloss vorausgesetzte und unerwiesene Eigenschaft der Ganglien der Empfindungsnerven keine Rücksicht; sie leitet die Mitempfindung von Irradiation der Reizung im Rückenmark oder Gehirn selbst ab, auf ähnliche Art, wie bei den reflectirten Bewegungen von dem Empfindungseindruck im Rückenmark sich eine Irradiation bis zu den motorischen Nerven bildet (Cap. III.). Hier wäre nur der Unterschied, dass die Irradiation des ursprünglichen Empfindungseindruckes im Rückenmark nicht zu motorischen Nerven, sondern zu den in der Nähe entspringenden anderen Empfindungsfasern, oder wenigstens ausser den motorischen Nerven auch zu Empfindungsnerven gelangte. Für die Richtigkeit dieser letztern Erklärung spricht die Analogie der Irradiation der Empfindungseindrücke im Rückenmark bis zu motorischen Nerven, und zugleich der Umstand, dass auch Empfindungsnerven ohne Ganglien, wie die Markhaut des N. opticus bei der Lichtempfindung, der Irradiation fähig sind, also die erste Erklärung nicht ausreicht.

Wie soll man sich nun die secundäre Erregung der anderen Empfindungsfasern oder Empfindungsnerven vom Gehirn und Rückenmark aus denken? Durch Reflexion vom Gehirn und Rückenmark aus? Geht in diesen Nerven ein Strom vom Gehirnende oder Rückenmarksende des Nerven bis zum peripherischen Ende des Nerven und wieder rückwärts, oder wird durch Reflexion, wenn kein Strömen, sondern Oscillation des Nervenprincips stattfindet, vom Gehirn aus ein zweiter Nerve in Oscillation gesetzt? Höchstwahrscheinlich findet jedenfalls eine Reflexion vom Rückenmark oder Gehirn auf einen Empfindungsnerven statt. Doch muss man bemerken, dass zu

Digitized by Google

dieser Erklärung die Voraussetzung gehört, dass in den Empfindungsfasern die Strömungen oder Schwingungen eben so gut rückwärts als vorwärts stattfinden können. Ob diess möglich ist, oder ob in den Empfindungsnerven bloss centripetale Bewegungen stattfinden können, ist noch unbekannt. Daher es interessant ist, auch eine Erklärung für den Fall zu kennen, wenn keine centrifugale Bewegung in den Empfindungsnerven, sondern nur in den motorischen möglich seyn sollte. Da es für eine Empfindung gleich scheint, ob das Ende oder die Mitte, oder der Ursprung einer Faser im Gehirn und Rückenmark afficirt wird, vielmehr in allen diesen Fällen die Empfindung nur eine und dieselbe ist, und in den äusseren Theilen, zu welchen der Nerve hingeht, angenommen wird, so kann durch blosse Irradiation eines Eindrucks von einem Empfindungsnerven in der Substanz des Rückenmarks und Gehirns selbst bis auf die Ursprungsstellen anderer Fasern, Ausbreitung der Empfindung entstehen. Wir wissen ja, dass bei Affectionen des Rückenmarks die Empfindungen auch in den äusseren Theilen zu seyn scheinen, wie z. B. die Entzündung des Rückenmarks mit den heftigsten Schmerzen in den Gliedern verbunden ist, während doch die Nerven dieser Theile vom Rückenmark aus nach aussen hin keine Empfindungen erregen können. Auch die Empfindung der Formicatio in der äussern Haut ist oft nur eine im Rückenmark selbst ihre Ursache habende Empfindung; ja diese Empfindung, wenn sie nicht durch Druck auf die Nerven selbst verursacht wird, ist sogar ein fast constantes Symptom aller Rückenmarksaffectionen, mögen sie vorübergehend seyn, wie in der Epilepsie, oder dauernd wie bei Neuralgia dorsalis und Tabes dorsalis. Dieser Empfindungen im Rückenmark wird man sich auch nicht dort bewusst, wo man sich die Lage desselben vorstellt. Das Ameisenlaufen findet bei Rückenmarkskrankheiten nicht im Laufe des Rückgrats statt, sondern eben in allen Theilen, zu welchen der verletzte Theil des Rückenmarks Nerven schickt. Eben so mag es auch wohl mit der Irradiation der Empfindungen seyn.

III. Ueber die Vermischung oder Coincidenz mehrerer Empfindungen.

Die Schärfe und Deutlichkeit der Empfindungen scheint von der Zahl der Primitivfasern abzuhängen, welche sich in einem Theile verbreiten; je sparsamer diese Fasern aber einem Organe zugetheilt sind, um so eher wirken die Eindrücke auf mehrere naheliegende Theile nur auf eine einzige Primitivfaser, und um so leichter müssen diese Eindrücke auf verschiedene Theile der Haut mit einander verwechselt werden. E. H. Weber hat sehr interessante Beobachtungen über den Grad der Schärfe der Empfindungen, in Hinsicht der Unterscheidung der Distancen an den verschiedensten Theilen des Körpers angestellt. *Annotat. anat. et physiol. p.* 44—81. Diese Versuche wurden so angestellt, dass die Haut bei verschlossenen Augen mit den Schenkeln eines Stangencirkels, dessen Enden mit Korkstöpseln versehen waren, berührt wurde. Weber suchte dann, bei welcher Entfernung

Digitized by Google

der beiden Schenkel diese Entfernung bemerkt werden konnte. Bei diesen zahlreichen Versuchen haben sich folgende Resultate ergeben: Vor allen Theilen zeichnen sich die Enden des dritten Fingergliedes und die Zungenspitze durch die Deutlichkeit der Empfindungen aus; hier wurde nämlich schon eine Entfernung der beiden Schenkel von $\frac{1}{2}$ Linie bemerkt. Auf dem Rücken der Zunge war schon eine Entfernung von 2 Linien nöthig, wenn zwei und nicht eine Empfindung entstehen sollten. Mit den Fingerenden und der Zungenspitze bemerkte Weber leichter die Distanz in longitudinaler Richtung; auf dem Rücken der Zunge, im Gesicht, am behaarten Theile des Kopfes, am Halse, am ganzen Arme und Fuss dagegen leichter bei transverseller Stellung der beiden Schenkel. Die folgende Tafel giebt die Feinheit des Gefühls in den verschiedenen Theilen nach den Distanzen der Schenkel an, welche nöthig waren, dass zwei und nicht eine Empfindung entstanden.

	$\frac{1}{2}'''$
Zungenspitze	
Volarfläche des 3. Fingergliedes	1
rothe Oberfläche der Lippen	2
Volarfläche des 2. Fingergliedes	2
Dorsalfläche des 3. Fingergliedes	3
Nasenspitze	3
Volarfläche über den Capitula oss. metacarpi	3
Zungenrücken 1″ von der Spitze	4
nicht rother Theil der Lippen	4
Rand der Zunge 1″ von der Spitze	4
Mittelhand des Daumens	4
Spitze des grossen Zehen	5
Dorsalfläche des 2. Fingergliedes	5
Volarfläche der Hand	5
Wangenhaut	5
äussere Oberfläche der Augenlieder	5
Schleimhaut des harten Gaumens	6
Haut über dem vordern Theile des Jochbeins	7
Plantarfläche des Mittelfusses des grossen Zehen	7
Dorsalfläche des 1. Fingergliedes	7
Dorsalfläche über den Capitula oss. metacarpi	8
Schleimhaut am Zahnfleisch	9
Haut hinten über dem Jochbein	10
unterer Theil der Stirn	10
unterer Theil des Hinterhauptes	12
Handrücken	14
Hals unter dem Unterkiefer	15
Scheitel	15
an der Kniescheibe	16
Haut über dem Heiligenbein	18
am Acromion	18
am Gesäss	18
am Vorderarm	18
am Unterschenkel beim Knie und Fuss	18
am Fussrücken bei den Zehen	18

Digitized by Google

auf dem Brustbein	20‴
am Rückgrat an den 5 obersten Rückenwirbeln	24
am Rückgrat beim Hinterhaupt	24
am Rückgrat in der Lendengegend	24
am Rückgrat in der Mitte des Halses	30
am Rückgrat in der Mitte des Rückens	30
in der Mitte des Arms	30
in der Mitte des Schenkels	30

An den Theilen von schärferer Empfindung wurde die Distanz der Schenkel des Cirkels scheinbar grösser empfunden als an den Theilen mit unbestimmterem Gefühl. Wurde eine horizontale Linie um den Thorax gezogen, und die Schenkel des Cirkels in dieser Linie aufgesetzt, so wurde die Distanz an zwei Stellen vorn und hinten, in der Mitte deutlicher empfunden. Wurde der Cirkel in der Gegend jener Linie parallel mit der Längenachse des Körpers aufgesetzt, so zeigten sich vier Stellen von deutlicherer Empfindung, zwei in der vordern und hintern Mittellinie, zwei an den Seiten. Wurden in einer Langenlinie vom Kinn bis zur Schaam die transversell oder longitudinell gestellten Schenkel des Cirkels aufgesetzt, so war die Deutlichkeit der Empfindung am Kinn am stärksten, am Halse schwächer, am Brustbein wieder stärker, am obern Theil des Bauches wieder schwächer, am Nabel wieder stärker, in der Gegend der Symphyse der Schaambeine wieder schwächer. In der hintern Mittellinie war die deutlichste Empfindung unter dem Hinterhaupt und am Steiss. In der Seitenlängslinie des Rumpfes war die Empfindung deutlicher unter der Achsel und in den Weichen.

Die Deutlichkeit der Empfindung hängt nicht gerade von der Gegenwart und Zahl der Papillen ab. Denn die Brustwarzen hatten eine undeutliche Empfindung, und die Empfindung auf der Zunge war nur an der Spitze am deutlichsten; deshalb nimmt Weber an, dass der Unterschied von der Zahl, dem Laufe und der Endigung der Nervenfäden abhänge. Ich theile ganz diese Ansicht und bemerke bloss, dass vielleicht auch die leichtere oder schwierigere Irradiation an verschiedenen Stellen des Gehirns und Rückenmarks einigen Antheil an diesem Phänomen haben kann.

Die feinste Empfindung der Distanzen findet auf der Markhaut des Auges statt. Für die Mechanik der Empfindungen ist es interessant, dass die Grösse der Kügelchen in der Markhaut mit der Grösse eines kleinsten empfindlichen Punktes auf derselben übereinstimmt. E. H. Weber *Anatomie. I. p.* 165. Weber fand die Kügelchen der Netzhaut $= \frac{1}{8000}$ bis $\frac{1}{8400}$ p. Zoll im Durchmesser; der kleinste Gesichtswinkel, unter welchem zwei Punkte unterschieden werden können, ist 40″. Daraus berechnet Smith, dass ein kleinster empfindlicher Punkt der Markhaut des Auges $\frac{1}{8000}$ Zoll beträgt. Weber bemerkt hierbei, dass, wenn zweierlei Eindrücke auf einem solchen Punkte stattfinden, sie als ein einziger empfunden werden müssen. Baumgaertner erklärt das Undeutlichwerden von Gegenständen, deren Ausdehnung unter 13 Secunden erscheint, aus der physiologischen Irradiation.

Digitized by Google

Zeitschrift für Physik und verwandte Wissenschaften. II. Bd. 3. Hft. p. 236.

Eine sehr merkwürdige Vermischung oder Identification der Empfindungen findet in einem einzigen Falle bei den Empfindungen der gleichnamigen Nerven der rechten und linken Seite, nämlich der beiden N. optici statt. Diess ist eine, im ganzen Organismus sonst nicht vorkommende Erscheinung, welche auch nur in besonderen Verhältnissen der Structur ihre Ursache haben kann. Die Empfindungen der gleichnamigen Gefühlsnerven der rechten und linken Seite werden im Bewusstseyn sonst nie an einem Ort empfunden. Was die rechte Hand empfindet; wird nicht an demselben Orte empfunden, wie die Empfindungen der linken Hand, sondern es werden die Eindrücke beiderlei Nerven im Bewusstseyn nebeneinander, nicht ineinander gesetzt. Bei den Augen oder den Sehnerven tritt aber die Anomalie ein, dass gewisse Fasern des einen Sehnerven, mit gewissen Fasern des andern Sehnerven nur eine einzige gemeinsame Empfindung haben, wodurch das einfache Sehen mit zwei Augen bedingt wird. Es haben zwar Einige behauptet, dass wir wechselsweise immer nur mit einem Auge sähen. Wer aber an der gleichzeitigen Thätigkeit beider Augen zweifeln kann, hat nie die so häufig in demselben Gesichtsfelde vorkommenden Doppelbilder der Gegenstände beobachtet, wovon das eine dem einen, das andere dem andern Auge angehört. Um sich davon zu überzeugen, betrachte man zwei in einer geraden Linie in einiger Entfernung hintereinander stehende Körper, z. B. Stecknadeln oder die hintereinander gehaltenen Finger. Fixirt man nun den nähern Finger, indem beide Augenachsen darin zusammenkommen, so sieht man den fernern Finger doppelt, fixirt man den fernern Finger, so sieht man den nähern doppelt; durch Schliessen des einen Auges kann man sich bald überzeugen, dass eines der Doppelbilder dem einen, das andere dem andern Auge angehört.

Dass es in beiden Augen gewisse Theile der Markhäute oder des Sehnerven giebt, welche identische Empfindungen haben, und andere, welche nicht identische Empfindungen haben, kann man auch durch einen sogenannten subjectiven Versuch beweisen; nämlich durch Druck auf gewisse seitliche Stellen des geschlossenen Auges im Dunkeln, und die durch Druck der Markhaut entstehenden Lichtbilder. Diese Druckbilder erscheinen immer umgekehrt. Drückt man das Auge unten, so erscheint das Druckbild oben im Sehfelde des Auges, drückt man oben, so erscheint es unten; drückt man an der rechten Seite, so erscheint es links, und umgekehrt. Wenn man nun die linke Seite beider Augen drückt, so entsteht statt zwei Druckbilder nur eins, dagegen man beim Druck des einen Auges auf der linken, des andern auf der rechten Seite zwei einander entgegengesetzte Figuren sieht. Drückt man beide Augen oben, so erscheint nur ein Druckbild unten, drückt man beide unten, so erscheint nur ein Druckbild oben. Drückt man aber das eine Auge oben, das andere unten, so erscheinen zwei Bilder, das eine oben, das andere unten. Bei diesen Versuchen muss man nicht an dem vor-

Digitized by Google

dern Umfange des Auges drücken, weil dort keine Markhaut sich befindet, sondern man muss das Auge in der Tiefe drücken. Diese Versuche beweisen schon die Identität der Empfindungen in gewissen Stellen der Netzhäute beider Augen, die Differenz der Empfindungen an anderen Stellen; beide Markhäute müssen in der Empfindung gleichsam als ineinander liegend gedacht werden, so dass alle Punkte der Markhäute der beiden Augen, welche (das Auge als Kugel gedacht) in gleichen Länge- und Breitegraden liegen, für die Empfindung identisch sind, alle anderen Punkte der beiden Markhäute sich gegeneinander als different verhalten, gerade so wie verschiedene Punkte der Markhaut eines einzigen Auges. Noch viel bestimmter lässt sich diess durch sogenannte objective Versuche zeigen.



In beistehender Figur sollen die Augen mit ihren Achsen den Punkt *a* fixiren; die Netzhäute seyen in 10 Maasstheile getheilt, dann wird der Punkt *a* in dem Auge *A* bei 5, und eben so in dem Auge *B* erscheinen; der Punkt *b* erscheint in beiden Augen gleichweit von 5 nach links entfernt bei 4. Also nimmt das Bild in beiden Augen die Maasstheile 4—5 ein; es wird einfach gesehen; diese Stellen sind identisch; denn 1 ist mit 1, 2 mit 2, 3 mit 3, 4 mit 4, 5 mit 5 identisch. Fällt aber das Bild nicht auf solche identische Stellen, so erscheint es doppelt, z. B.



In der zweiten Figur sollen die beiden Augen so gestellt seyn, dass sie den Punkt *a* fixiren; ist diess ein Object, so wird es einfach gesehen. Alles, was vor oder hinter *a* liegt, erscheint dagegen in Doppelbildern. Z. B. *b* hinter dem Fixationspunkt *a*, wirft das Bild in dem Auge *A* auf 6, in dem Auge *B* auf 4, erscheint doppelt; von zwei hinter einander gehaltenen Fingern erscheint der hintere doppelt, wenn der vordere fixirt wird. Die Entfernung der Doppelbilder beträgt die Distanz von 6—4 im Verhältniss zum ganzen Sehfeld 1—10, und der Ort ist 6 und 4. Der Punkt *c* in beistehender Figur, welcher vor dem Fixationspunkt *a* liegt, wirft dagegen sein Bild in *A* auf 4, in *B* auf 6; er wird doppelt gesehen, denn 4 ist nicht mit 6, sondern 4 mit 4, und 6 mit 6 identisch. So erscheint von zwei hinter einander gehaltenen Fingern der vordere doppelt, sobald der hintere fixirt wird. Man sieht also deutlich, dass beide Sphären der Augen, auf das feinste in Breiten- und Längengrade, Minuten, Secunden eingetheilt, in allen

Digitized by Google

gleichnamigen Punkten identisch, in allen verschiedenen different sind, und dass sich die Entfernung der Doppelbilder jedesmal nach der Entfernung der afficirten Theile beider Netzhäute, diese als auf einander liegend gedacht, bestimmen lässt.

Da die Sehnerven beider Seiten durch Einheit der Empfindung bei der Affection gewisser Theile von allen anderen Nerven abweichen, alle anderen Nerven aber durch den getrennten Verlauf der Primitivfasern übereinstimmen, so muss man auf den Gedanken kommen, dass in den Sehnerven auch die Organisation der Primitivfasern verschieden seyn müsse, und dass die Fasern beider Sehnerven, welche einfach sehen, auch nur in einem, statt in zweien Punkten mit dem Gehirn zusammenhängen. Diess lässt sich im Allgemeinen zwar von den einzelnen Fasern noch nicht, aber doch von den Faserbündeln erweisen. Denn bekanntlich geht jede Sehnervenwurzel vom Chiasma nervorum opticorum nicht zu einem, sondern zu beiden Augen, indem die äusseren Fasern einer Sehnervenwurzel am Chiasma zur äussern Seite des Sehnerven ihrer Seite fortgehen, während die inneren Fasern kreuzend zur innern Seite des Sehnervens der andern Seite, und so zum Auge fortgehen, so dass der äussere Theil der Netzhaut des einen Auges, und der innere Theil der Netzhaut des andern Auges von der einen der beiden Sehnervenwurzeln gebildet werden, oder mit andern Worten, dass die linken Theile der beiden Netzhäute von den zwei Branchen der linken Sehnervenwurzel, die rechten Theile der beiden Netzhäute von den zwei Branchen der rechten Sehnervenwurzel gebildet werden, was ganz mit den Facten über das einfache Sehen übereinstimmt. In Hinsicht des Baues des Chiasma nervorum opticorum siehe J. Muellèr *vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes. p.* 96. 117—134. Diese Theorie des einfachen Sehens ist schon von Newton in den optischen Quästionen, neulich aber von Wollaston (*ann. de chim. et phys.* 1824. *Sept.*) vorgetragen worden. Allein die blosse Theilung einer Sehnervenwurzel in zwei Branchen für die identischen Theile beider Markhäute erklärt die Erscheinung nicht vollständig; denn der linke Theil der Netzhaut *A* von 1—5 ist nicht durchweg identisch mit dem linken Theil der Netzhaut *B* von 1—5, sondern gewisse Punckte des linken Theils beider Netzhäute sind nur identisch, nämlich die gleiche Längen- und Breitengrade in beiden Sphären einnehmen; 1 ist mit 1, 2 mit 2, 3 mit 3, 4 mit 4 u. s. w. identisch; 1 des einen Auges aber nicht identisch mit 5 des andern Auges. Daher fordert die Theorie zur Erklärung des einfachen Sehens, dass nicht bloss eine Sehnervenwurzel sich in zwei Branchen theilt, sondern dass sich jede Primitivfaser einer Sehnervenwurzel im Chiasma in zwei Branchen für die beiden Sehnerven theilt, so dass die identischen Fasern beider Sehnerven nur in einem Punkt, nämlich durch eine Wurzelfaser, mit dem Gehirn zusammenhängen, und daher nur einen Eindruck trotz zwei Recipienten bilden. Siehe die Figur. Aber eine solche Theilung der Fasern findet im Chiasma nicht statt, und auch noch mehrere Data stimmen mit dieser Supposition nicht

Digitized by Google

überein. Erstens müsste die Sehnervenwurzel noch einmal so dünn als der Sehnerve seyn, und dann müsste jeder Punkt der Netzhaut das Ende einer Faser des Sehnerven seyn. Wenn diess wäre, so müssten im hintern Theil der Netzhaut noch alle Fasern zusammen liegen, die sich weiter vorn ausbreiten; und es müsste die Netzhaut von hinten nach vorn an Dicke abnehmen. Auch müsste bei einer Verletzung der einen Seite des Gehirns immer die Hälfte beider Augen gelähmt seyn, dagegen darauf entweder Blindheit des einen oder des andern folgt und bei Thieren sogar jedesmal Blindheit des entgegengesetzten Auges eintritt.

III. Capitel. Von der Reflexion in den Bewegungen nach Empfindungen.

Die Bewegungen nach Empfindungen sind nicht bloss den älteren Physiologen, sondern den Aerzten überhaupt, zu allen Zeiten bekannt gewesen. Die meisten Physiologen leiteten sie nach Willis Vorgang von den Nervenverbindungen des Ganglien-nerven ab, welcher daher sogar den Namen Sympathicus behielt. Comparetti schrieb ein ganzes Werk zur Erklärung der krankhaften consensuellen Erscheinungen aus der Verbindung der Nerven. A. Comparetti *occursus medici. Venetüs* 1780. Diese Erklärungen nahmen die meisten Physiologen an und auch in der neuesten Zeit wandte man die in der Anatomie der Nerven erweiterten Beobachtungen auf diese Weise an. Siehe Tiedemann *Zeitschrift für Physiologie, I.* 1825. Einige Physiologen waren dieser Erklärung schon in der ältern Zeit abhold, wie Haller, Cullen, Whytt, Monro u. A. Cullen *institutions of medecine. p.* 1. Whytt *über die Sympathie und die Krankheiten der Nerven (in der deutschen Uebersetzung von* Whytt's *sämmtlichen zur praktischen Arzneikunst gehörigen Schriften p.* 241.) Whytt *an essay on the vital an other involuntary motions of animals. Edinb.* 1751. *p.* 248. Monro *Bemerkungen über die Structur und Verrichtungen des Nervensystems. Leipz.* 1787. Whytt und Cullen erklärten die Erscheinungen durch Mitwirkung des Sensoriums und als durch Empfindungen bedingt. Auf eine exactere Weise und empirisch sind die Bewegungen auf Empfindungen erst in der neuesten Zeit untersucht worden. Mehrere wichtige Beobachtungen, welche der Erklärung der Bewegungen nach Empfindungen durch den Sympathicus ungünstig sind, lieferte Mayo *anatomical and physiological commentaries. London* 1823. Man weiss, dass das Licht nur von der Retina aus die Iris bewegt. Diess hatte man zwar durch Verbindungen, welche zwischen dem N. opticus und sympathicus statt finden sollten, zu erklären gesucht. Mayo's Versuche über die Augennerven, nämlich über Bewegungen der Iris, die vom Nervus oculomotorius ausgeführt werden, aber vom N. opticus (durch Zerrung desselben) erregt werden, lassen aber keine andere Erklärung als durch Vermittelung des Gehirns zu. Nach Durchschneidung des N. opticus in der Schädelhöhle einer Taube, konnte

Digitized by Google

Mayo durch Zerrung des Hirnendes des N. opticus noch eine Verengung der Pupille hervorbringen. Allgemeiner wurde das Princip der Reflexion von den sensoriellen Nerven auf motorische durch Vermittelung der Centraltheile zur Erklärung aller Bewegungen, welche auf Empfindungen folgen, erst in der neuesten Zeit durch die Untersuchungen von Marshall Hall und mir, welche beide im Jahre 1833 veröffentlicht wurden, aufgefasst und durch neue Thatsachen als Erklärungsgrund für eine grosse Anzahl von bekannten, aber falsch erklärten Erscheinungen bewiesen *). Eine neuere Schrift von Marshall Hall enthält die Fortsetzung seiner Untersuchungen. *Memoirs on the nervous system. London* 1837. Die von uns Beiden beobachteten Thatsachen, auf welche wir fussen, haben sehr viel Uebereinstimmendes, aber in der Erklärung der Erscheinungen weichen wir sehr ab. Mein Antheil an dieser Angelegenheit liefert Beweise für die ältere Ansicht von der Vermittelung der Empfindungen und Bewegungen durch die Centralorgane und theilt diese Erklärung. Marshall Hall bringt hingegen in der letzten Schrift ein neues eigenthümliches Princip in die Erklärung, die dadurch ganz abweichend wird. Volkmann (Muell. *Arch.* 1838. 1.) theilt mehrere wichtige neue Beobachtungen zur Lehre von der Reflexion mit, welche die Ansichten von Marshall Hall und mir im Allgemeinen bestätigen. Das Folgende enthält meine Ansicht des Gegenstandes nach der vorigen Auflage, auf welche ein Auszug der Arbeiten von Marshall Hall und eine Vergleichung der abweichenden Ansichten folgt.

Wenn Empfindungen, welche durch äussere Reize auf Empfindungsnerven hervorgebracht werden, Bewegungen in anderen Theilen hervorbringen, so geschieht diess niemals durch eine Wechselwirkung der sensibeln und motorischen Fasern eines Nerven selbst, sondern, indem die sensorielle Erregung auf das Gehirn und Rükkenmark, und von diesen zurück auf motorische Fasern wirkt. Dieser für die Physiologie und Pathologie äusserst wichtige Satz bedarf eines strengen Beweises, der sehr gut empirisch geführt werden kann, und erklärt dann eine Menge physiologischer und pathologischer Erscheinungeu.

Ich werde zuerst beweisen, dass die motorischen und sensibeln Fasern eines Nerven nach der Verbindung beider Wurzeln keine Verbindung mit einander eingehen, sondern getrennt bis

---

*) Die Abhandlung von Marshall Hall erschien im zweiten Theil der Philosoph. transact. von 1833. Ich hatte meine Ansicht gelegentlich in der ersten Auflage der ersten Abtheilung der Physiologie, welche im Frühlinge 1833 erschien, in der Lehre von den Athembewegungen p. 333. erläutert und 1834 in der zweiten Abtheilung der Physiologie ausführlich vorgetragen, nachdem die Abhandlung von Marshall Hall erschienen war. Marshall Hall hatte indess bereits im Jahre 1832 in der Zoological Society über den Gegenstand einen Vortrag gehalten und ist daher in der Priorität. Eine Mittheilung über meine Ansicht der Sache und die Abweichung der seinigen gab mein verehrter College im *Lond. u. Edinb. philos. Mag.*, *Vol.* 10. *No.* 58.

Digitized by Google

zu ihren respectiven Theilen verlaufen, und dass daher auch in den Fällen, wo die Nervensympathie nicht im Spiele ist, die sensorielle und motorische Faser eines Nerven selbst durchaus keine Wechselwirkung haben.

Der Beweis dieses Satzes lässt sich leicht auf folgende Art führen: Reizt man einen gemischten Nerven, den man durchgeschnitten, an seinem centralen Stücke, wodurch heftige Schmerzen entstehen, so kann das Thier zwar diese Schmerzen durch Bewegungen zur Flucht, Schreien u. s. w. ausdrücken, allein die mit dem gereizten Nervenstumpf zusammenhängenden Muskelnerven werden nicht zu Actionen veranlasst. Es entstehen keine Zuckungen in den Muskeln, die von dem Nervenstumpfe Aeste erhalten.

Man kann diesen Satz auch folgendermaassen beweisen: Da die drei Nerven für die hintere Extremität beim Frosch einen Plexus bilden, der wieder zwei Nerven abgiebt (siehe oben p. 690.), so durchschneide man einen der letzten Nerven und isolire ihn von allen seinen Verbindungen mit Muskeln, und reize dann mechanisch das centrale Stück. Diese Zerrung bewirkt eine centripetale Erregung der sensoriellen Fasern dieses Nerven, allein die anderen Muskelnerven, die aus demselben Plexus hervorgehen, erregen bei der Quetschung des isolirten Nerven keine Zuckung ihrer Muskeln. Dass ferner die bei narkotisirten Fröschen und anderen Thieren auf jede Berührung eintretenden allgemeinen Zuckungen nur durch das Rückenmark und Gehirn selbst vermittelt werden, lässt sich definitiv beweisen. Denn schneidet man ein Glied des narkotisirten Frosches ab, so bewirkt die Berührung derselben keine Zuckungen dieses Gliedes mehr. Noch instructiver sind diese Versuche beim Erdsalamander.

Der gefleckte Erdsalamander behält nach Durchschneidung des Rückenmarks überaus lange die sogenannte Empfindungskraft in allen Theilen unter dem Schnitte, oder wenn man diess nicht Empfindungskraft nennen will, die Fähigkeit, Empfindungseindrücke auf das Rückenmark zu verpflanzen und durch Zuckung zu reagiren. Selbst das Schwanzende ist noch empfindlich, ja diese Empfindlichkeit ist durch die Durchschneidung des Rückenmarks eben so erhöht, als bei Fröschen, welche vorher narkotisirt waren. Berührt man einen abgeschnittenen Theil des Rumpfes vom Erdsalamander nur ganz leise, so zieht er sich jedesmal zusammen; diess dauert noch Stunden lang. Allein diess interessante Phänomen zeigt sich nur dann, wenn in dem abgeschnittenen Theile noch Rükkenmark enthalten ist, nicht aber in den abgeschnittenen ganzen Gliedern, welche nichts vom Rückenmark enthalten. Diese interessanten Thatsachen beobachtete ich bereits vor mehreren Jahren, 1830, als ich mit Herrn Jordan Versuche über das Gift der Hautdrüsen beim gefleckten Salamander anstellen wollte.

Es geht hieraus hervor, dass die bei den Thieren auf Berührung einzelner Theile erfolgenden allgemeinen Zuckungen nicht durch Communication sensorieller und motorischer Fasern der Nerven geschehen, sondern dass das Rückenmark das Binde-

Digitized by Google

glied zwischen der sensoriellen-centripetalen, und der allgemeinen motorischen-centrifugalen Erregung ist.

Das Phänomen allgemeiner Zuckungen nach örtlichen Empfindungen ist daher auch vom N. sympathicus unabhängig, und ist durch eine Irritation des Rückenmarks bedingt, wodurch jede ganz örtliche, sensorielle-centripetale Erregung sich auf das ganze Rückenmark und Gehirn verpflanzt, und von dort aus nothwendig alle motorischen Fasern anregt. Jene Irritation wird aber durch folgende Ursachen erregt:

1) Bei manchen Thieren durch blosse Zerschneidung und Quetschung des Rückenmarks. So zucken die Schildkröten noch nach abgeschnittenem Kopf, so oft sie berührt werden; so zucken ganz junge Vögel bei der Berührung im Moment nach der Decapitation. So zucken alle Theile des zerschnittenen Rumpfes beim Erdsalamander nach der Berührung.

2) Ferner wird das Rückenmark in diesem Grade irritirt durch das erste Stadium narkotischer Vergiftung bei den Fröschen, auch bei den Säugethieren, die nach Vergiftung mit Nux vomica sogleich zucken, wo und wie man sie anfasst. Diess Stadium der reizbaren Schwäche geht bei der Narcotisation fast immer dem Stadium der paralytischen Schwäche voraus.

3) Auch andere Ursachen, welche das Gehirn und Rückenmark durch Reizung schwächen, bewirken dasselbe Phänomen. Bei Menschen mit reizbarer Schwäche des Nervensystems bewirkt jede unvorhergesehene Empfindung, Schall, Berührung, mechanische Erschütterung, ein allgemeines Zusammenfahren. So bei Menschen, die durch Reizung der Genitalien und dadurch des Rückenmarks oder durch andere Ursachen sich eine reizbare Schwäche des Rückenmarks zugezogen haben. Man kann hiebei einen Blick auf das Wesen der Nervenirritation thun. Alle Nervenreizung kann hintereinander drei Zustände bedingen. Zuerst Reizung, wobei die Kräfte noch unversehrt scheinen; 2. in dem Maasse, als die Reizung wiederholt wird, reizbare Schwäche; 3. atonische Schwäche.

4) Eine örtliche heftige Erregung eines Empfindungsnerven kann durch die Heftigkeit der centripetalen Erregung des Gehirns und Rückenmarks auch Zuckungen und Zittern veranlassen, wie nach einem heftigen örtlichen Verbrennen, beim Zahnausreissen etc.

5) Oertliche Reizungen der Nerven durch Entzündung oder knotige Anschwellung bewirken auch öfter allgemeine Krämpfe, selbst Epilepsie.

6) Die von der örtlichen sensoriellen Erregung entstehende Irritation des Rückenmarks kann bei heftigen Verletzungen so stark seyn, dass die Zuckungen beständig sind und selbst ohne Berührung fortdauern. Diese von heftigen örtlichen Nervenverletzungen entstehende Irritation des Rückenmarks ist der Tetanus traumaticus. Jede heftige Irritation des Rückenmarks überhaupt ist Tetanus, sey sie durch narkotische Gifte oder örtlich und mittelbar veranlasst. Ich habe hier gezeigt, wie die Entstehung des Tetanus traumaticus aus einfachen, empirisch festgestellten Thatsachen zu begreifen ist.

Digitized by Google

7) Auch die heftige Irritation der sympathischen Nerven des Darmkanals erregt durch Rückwirkung auf die Centraltheile secundäre allgemeine Krämpfe, und so sind die Krämpfe in der sporadischen Cholera zu erklären; so die Zuckungen in Krankheiten der Eingeweide bei Kindern.

Die bisherigen Betrachtungen führen uns indess hier nur zunächst zur Feststellung der Thatsache, dass, wo immer durch örtliche Empfindung allgemeine Zuckungen entstehen, diess durch keine andere Verbindung sensorieller und motorischer Fasern geschieht als die des Rückenmarks. In sehr vielen Fällen entstehen aber nach örtlicher Reizung der Nerven nicht allgemeine, sondern örtliche Zuckungen, die indessen auch immer durch das Rükkenmark als Bindeglied der sensoriellen und motorischen Fasern erklärt werden müssen. Die Fälle, welche sich hierbei aufstellen lassen, sind folgende:

1) Am einfachsten ist der Fall, wenn die örtliche sensorielle Reizung, auf das Rückenmark oder Gehirn verpflanzt, bloss örtliche Zuckungen erregt, und zwar in den nahe gelegenen Theilen, deren motorische Fasern in der Nähe mit den sensoriellen vom Rückenmark abgehen. Hieher gehören die Krämpfe und das Zittern in Gliedern, welche sich heftig verbrennen etc. Gewisse, sehr reizbare Theile des Organismus, wie die Iris, ziehen sich überaus leicht zusammen, wenn auch nur schwache Reize andere sensorielle Nerven erregen, und die Reizung der letzteren zum Gehirn, und vom letztern durch den N. oculomotorius auf die kurze Wurzel des Ganglion ciliare, die Ciliarnerven und die Iris verpflanzt wird. Man weiss schon lange, dass die Iris nicht reizbar für das Licht ist, dass das Licht nur durch Vermittelung des Sehnerven und Gehirns auf die Iris wirkt; denn diess ergiebt sich aus den Versuchen von Lambert, Fontana, Caldani. Lichtstrahlen durch einen kleinen Kegel von Papier, oder durch eine kleine Oeffnung in einem Papierblatt durch die Pupille einfallend und also die Netzhaut treffend, bringen die Iris sogleich zur Bewegung, sind aber ohne Einfluss, wenn die Lichtstrahlen auf die Iris selbst einfallen. Ferner ist die Iris eines amaurotischen Auges unbeweglich, so lange das gesunde Auge geschlossen ist, zieht sich aber zusammen, wenn das Licht den Sehnerven des gesunden Auges anregt. Die Ausnahmen, in welchen die Iris der amaurotischen Augen noch Beweglichkeit besass (siehe Tiedemann in dessen *Zeitschrift* 1. *p.* 252.), mögen wohl auf einer unvollkommenen Amaurose beruhen, oder wenn nur ein Auge amaurotisch war, so war die Ursache der Bewegung der Iris im amaurotischen Auge das Offenseyn des gesunden Auges. Die Beweglichkeit oder Unbeweglichkeit der Iris eines amaurotischen Auges kann und sollte nur untersucht werden, wenn das gesunde Auge geschlossen ist. Jede Beobachtung, in welcher diese Vorsichtsmaassregel nicht beobachtet worden, kann nicht entscheiden. van Deen (*de differentia et nexu inter nervos vitae animalis et organicae. Lugd. Bat.* 1834. 58.) sah, wenn er bei einem Kaninchen, dem er ein Hemisphaerium des Gehirns abgetragen und den Sehnerven dieser Seite durchschnitten, bei Anwendung

Digitized by Google

eines Lichtes Zusammenziehung der Iris und schliesst daraus, dass der N. opticus keinen Einfluss auf die Iris habe. Da aber VAN DEEN das Licht vor beide Augen (ante oculos) brachte, so musste dasselbe erfolgen, wie wenn die Iris eines amaurotischen Auges durch den Lichteinfluss auf das gesunde Auge bewegt wird. Es kann aber auch die Empfindung im Gehirn aufgehoben seyn und ein Nerve doch noch der Reflexion fähig seyn. TIEDEMANN's interessante Entdeckung, dass die Arteria centralis retinae von einem feinen Zweigelchen vom Ciliarknoten begleitet wird, kann auch nicht wohl zur Erklärung dienen. Denn alle Gefässe werden von Nerven begleitet; diess Zweigelchen verbreitet sich aber mit der Arteria centralis retinae, und steht mit der Retina in keinem erwiesenen Zusammenhange. Diese Rückwirkung vom Gehirn auf die Iris geschieht durch den N. oculomotorius, welcher nach MAYO's Versuchen bei jeder Reizung eine Zusammenziehung der Iris erregt. MAGENDIE *J. d. physiol. T.* 3. 348. Wir wissen durch denselben Verf., dass das Hirnende des durchschnittenen Sehnerven gereizt noch Contraction der Iris bedingt. In der Zusammenziehung der Iris zeigt sich also eine Art Statik der Erregung zwischen centripetaler sensorieller und centrifugaler motorischer Wirkung durch Vermittelung des Gehirns. Auch andere Nerven können diese Statik verändern, wie die sensoriellen Aeste des N. trigeminus, so dass kaltes Wasser in die Nase geschlürft die Iris verengt. Unter diese einfacheren Fälle der reflectirten Erregung gehört auch das Blinzen der Augenlieder von längerem Lichteindruck, oder von einem starken Schall, oder von einem drohenden Gesichtseindruck.

Ferner gehören hieher die Zusammenziehungen aller Dammmuskeln, Musc. sphinct. ani, levator ani, bulbo-cavernosus, ischio-cavernosus bei der Austreibung des Saamens, in Folge der Irritation der Gefühlsnerven des Penis; in diesen Fällen ist das Rückenmark das Bindeglied zwischen den Empfindungen und Bewegungen. Entblösste Muskeln, deren motorische Nerven durch Reizung der Muskeln selbst mitgereizt werden, bedürfen zwar jener centripetalen und centrifugalen Wirkung nicht, um Zukkungen zu erregen. Allein die Muskeln, welche von empfindlichen Häuten überkleidet werden und nicht der Reizung selbst bloss liegen, müssen die Reizung zur Bewegung erst durch sensorielle Erregung ihrer empfindlichen Decke, centripetale Wirkung dieser sensoriellen Nerven und centrifugale motorische Erregung vom Gehirn aus erfahren. So können die Zusammenziehungen der Stimmritze und Luftwege von irrespirablen sauren Gasarten nicht unmittelbar durch Reizung dieser Wege erfolgen, sondern durch centripetale sensorielle und centrifugale motorische Erregung. Diess hat weitläufiger BRACHET bewiesen. Denn wenn man den N. vagus eines Thieres auf beiden Seiten durchschneidet, so wirkt eine reizende chemische Substanz, die man in die Luftröhre bringt, nicht mehr als Reiz zum Husten. Der Husten von Reizen in den Luftwegen entsteht nur durch sensorielle centripetale und centrifugale motorische Erregung. Es ist eben so mit der Zusammenziehung des Sphincter ani und Sphincter vesicae urinariae. Diese Muskeln können selbst nicht von den Reizen

Digitized by Google

der Excremente und des Harns zur Contraction gereizt werden, sondern diese Stoffe wirken auf die Empfindungsnerven der Schleimhaut, und erregen das Rückenmark, welches als beständig mit motorischer Nervenkraft geladen auf diese Muskeln zurückwirkt; daher nach Verletzung des Rückenmarks auch die Zusammenziehung dieser Muskeln aufhört.

2) Der zweite Fall ist, wo die sensorielle Erregung rein örtlich beschränkt, die rückwirkende vom Gehirn aus aber ausgebreiteter ist, wie schon aus jenen den Husten begleitenden Phänomenen hervorgeht, bei welchem nicht allein die N. vagi, sondern wegen der Brust- und Bauchmuskeln, die N. spinales mitwirken. Eben so ist es mit einer Menge krampfhafter Athembewegungen dem Niesen, Schluchzen, Erbrechen etc., welche alle von Reizen innerhalb des Schleimhautsystems der Respirationsorgane und des Darmkanals entstehen, von Reizungen der Empfindungsnerven dieser Theile, die auf das Gehirn reflectirt werden, und dort die Quelle der respiratorischen Bewegungen in der Medulla oblongata in Thätigkeit setzen. Schon oben wurde die merkwürdige Eigenthümlichkeit angeführt, dass das System der Athemnerven durch locale Reize in allen Schleimhäuten in Thätigkeit gesetzt werden kann. Vom Munde bis zum After, von der Nase bis in die Lungen sind die Schleimhäute zu dieser Reflexion fähig. Denn alle diese Bewegungen, Husten, Niesen, Erbrechen, krampfhaft, unwillkührlicher Stuhlgang, unwillkührliches, mit Zwang verbundenes Harnlassen entstehen von heftigen Reizen in den Schleimhäuten des Rachens, der Speiseröhre, des Magens, des Darms und in der Schleimhaut der Respirationswerkzeuge. Das Niesen erklärte man sonst als eine krampfhafte Affection des Zwerchfelles; indess hat das Niesen mit dem Zwerchfell offenbar gar nichts zu thun; denn das Niesen ist eine heftige Exspiration, das Zwerchfell aber ist kein Musc. exspiratorius, sondern das Gegentheil. Bei der unrichtigen Supposition, dass das Niesen durch das Zwerchfell erfolge, liess man die Reizung der Nasalnerven auf das Ganglion spheno-palatinum, den N. vidianus, sympathicus, die Halsnerven, den N. phrenicus, den Willisischen Beinerven und den N. facialis sich fortpflanzen. Hier fällt nun offenbar der N. phrenicus ohnehin aus. Man suchte auch zu beweisen, dass das Niesen nicht von einer reflectirten Reizung vom Gehirne ausgehe, und berief sich darauf, dass ein Mensch ohne Geruchsinn doch von Tabak geniest habe. Warum sollte er es nicht, da bei dem Mangel der Geruchsnerven doch die gewöhnlichen Gefühlsnerven der Nase, N. nasales hier, wie überhaupt bei dem gesunden Menschen, die Empfindungen des Kitzels haben. Man zergliedere aber doch nur die Erklärung [einer Sympathie durch den N. sympathicus durch die feinere Anatomie. Wie soll auch das Niesen durch eine Nervenverbindung erklärt werden? Erstens ist nicht entfernter Weise einzusehen, warum eine Reizung dieses Nervens von der Nase aus gerade Niesen und nicht vielmehr vieles Andere, z. B. eine verstärkte Bewegung des Darmkanals, hervorbringen soll. Dann reicht die Erklärung nicht aus, weil keine Verbindung des N. sympathicus mit ei-

Digitized by Google

nem anderen Nerven eine Verschmelzung der Fasern ist. Bei dem Niesen z. B. ist eine heftige Zusammenziehung aller Exspirationsmuskeln vorhanden; alle Primitivfasern der Intercostalnerven, welche die Zusammenziehung der Brust und des Bauches bewirken, müssen dabei irritirt seyn. Wie sollten aber alle diese Fasern vom N. sympathicus irritirt werden können, der an jeden dieser Nerven ein Faserbündelchen anschliesst, das, weit entfernt, seine Primitivfasern mit allen Primitivfasern eines Spinalnerven zu verschmelzen, sie nur mit diesen vom Rückenmark empfängt. Da nun Primitivfasern anderen Fasern, die neben ihnen liegen, zumal in einer motorischen Wurzel ohne Ganglion, nichts mittheilen können, so ist hier auch die sympathische Affection aller Primitivfasern eines Intercostalnerven durch den N. sympathicus eine reine Unmöglichkeit. Alle diese Sympathien des Niesens, Hustens, Erbrechens sind abgemacht, sobald man die reflectirende Eigenschaft des Rückenmarks und Gehirns kennt, und es liegt nichts Schwieriges mehr in der Erklärung, sobald man von der Thatsache ausgeht, dass alle respiratorischen Nerven, N. facialis, vagus, accessorius, phrenicus und die übrigen Spinal-Athemnerven des Rumpfes durch ihren Ursprung von der Medulla oblongata, oder ihre Abhängigkeit von derselben, leicht zu convulsivischen Bewegungen in Muskeln erregt werden, durch alle Reize, die von den Empfindungsnerven der Schleimhäute auf das Rückenmark oder die Medulla oblongata geleitet werden.

Bei jedem heftigen Reiz in den Gedärmen, in den Urinwerkzeugen, in dem Uterus tritt leicht Zusammenziehung des Zwerchfells und der Bauchmuskeln ein, wodurch die Bauchhöhle verkleinert und der Inhalt derselben, nach oben, wenn er im Magen enthalten ist (Erbrechen), oder nach unten durch den Mastdarm, durch die Harnwerkszeuge, durch die Genitalien, wie bei der Geburt, ausgetrieben wird. Der Stuhlzwang ist dieselbe Erscheinung für die unteren Theile des Darmkanales, was das Erbrechen für die oberen. Bei dem Harnzwang finden sich dieselben Bewegungen in Leidenschaft, die Geburt nimmt dieselben Muskeln in Anspruch, welche beim Erbrechen den Mageninhalt nach oben auswerfen; auch die nach dem Tode noch erfolgende Geburt, gleich wie das feste Anlegen des Schlundes um einen in denselben gebrachten Finger bei einem geköpften jungen Thiere, zeigen uns, von welchem wichtigen, mit dem Leben aufs innigste verknüpften Einflusse diese Fähigkeit des Rückenmarks ist, durch örtliche Erregungen seiner Empfindungsnerven zu motorischen Entladungen gereizt zu werden. Mag bei mehreren der hieher gehörigen Reizungen, beim Erbrechen etc., der N. sympathicus irgend eine Rolle spielen, so ist es keine andere als diejenige, die Reizung, wie alle anderen Empfindungsnerven, auf das Sensorium zu reflectiren. Dass er aber diese Wirkung haben kann, lässt sich durch einen Versuch zeigen: ich habe nämlich beim Kaninchen durch Zerrung des N. splanchnicus in der Bauchhöhle, an der innern Seite der Nebenniere, mehrmals Zuckungen der Bauchmuskeln beobachtet, und habe diess Phänomen, obgleich mir der

Digitized by Google

Versuch beim Hunde nicht gelingen wollte, doch wiederholt bei Kaninchen gesehen.

3) In den unter 2. erwähnten Fällen ist die reflectirte Bewegung, die auf Empfindung folgende Bewegung auf eine grosse Gruppe von Nerven ausgedehnt, auf die respiratorischen Nerven, und sie entsteht am leichtesten durch Reizung der Schleimhäute; es kann jedoch bei höherer Reizung die Ausdehnung der reflectirten Bewegungen noch grösser werden und fast alle Rumpfnerven afficiren, wenn sich die Irritation des Rückenmarks ausdehnt. Hieher sind die Fälle der sporadischen Cholera zu rechnen (die asiatische Cholera führe ich wegen der Dunkelheit der Krankheit nicht auf), wo bei grosser Heftigkeit auch Krämpfe am Rumpfe eintreten können.

4) Bei den reflectirten Bewegungen, die durch heftige Empfindungen der äusseren Hautnerven und nicht der Schleimhautnerven entstehen, wird die Gruppe der respiratorischen Bewegungen auch nicht in Mitleidenschaft gezogen, sondern es entstehen leichter Krämpfe der Muskeln des ganzen Rumpfnervensystems ohne krampfhafte Athembewegungen. Der höchste Grad ist der epileptische Krampf von örtlicher Nervenaffection und der Tetanus traumaticus von Verletzung eines Nerven.

Marshall Hall unterscheidet vier Arten von Muskelzusammenziehung: 1. die willkührliche, welche vom Gehirn, 2. die respiratorische, welche von der medulla oblongata abzuhängen scheint, 3. die unwillkührliche, welche von den Nerven und Muskeln abhängt, und die unmittelbare Anwendung des Reizes auf die mit Nerven versehenen Muskeln oder ihre Nerven erfordert, und 4. die reflectirende, welche zum Theil fortdauert, nachdem die willkührliche und respiratorische aufgehört haben, und an die Medulla spinalis gebunden ist. Sie hört nach Entfernung des Rückenmarkes auf, wenngleich die Irritabilität sich nicht vermindert. Bei dieser vierten entspringt der motorische Reiz nicht in einem Centraltheil des Nervensystems, sondern in einiger Entfernung vom Centrum; sie ist weder willkührlich, noch in ihrem Verlaufe direct, sondern vielmehr erregt durch eigenthümliche Reize, die nicht unmittelbar auf die Muskelfaser und die motorischen Nerven einwirken, sondern auf häutige Ausbreitungen, von denen der Reiz zum Rückenmark geleitet wird. Marshall Hall erläutert die Wichtigkeit dieser reflectirenden Function des verlängerten Markes und Rückenmarkes durch einige Beispiele. Das Aufnehmen des Futters ist ein willkührlicher Act und kann nach Entfernung des Gehirns nicht mehr vollzogen werden; der Uebergang des Bissens über die Glottis und durch den Pharynx hängt von der reflectirenden Function ab, und findet noch statt, wenn das Gehirn entfernt worden. Obgleich nämlich die hierbei thätigen Muskeln auch willkührlich thätig seyn können, so bewirkt doch die Gegenwart des Bissens im Schlunde eine Reihe von heftigen Bewegungen, die oben p. 495. beschrieben worden und welche dadurch entstehen, dass der Reiz des Bissens auf die empfindliche Schleimhaut wirkt, und

Digitized by Google

diese Empfindung die Medulla oblongata zur Entladung in die motorischen Nerven anregt. Den weitern Act der Deglutition in der Speiseröhre hält Marshall Hall für die Wirkung des unmittelbar auf die Muskelfiber des Oesophagus wirkenden Reizes und das Resultat der Irritabilität des letztern, welches sehr zweifelhaft erscheinen dürfte. Selbst an geköpften jungen Thieren kann man übrigens, wie schon angeführt, noch die durch mechanische Reizung des Schlundes erfolgende, reflectirte motorische Erregung beobachten. Marshall Hall zeigt nun den dauernden Einfluss dieser Function an den Sphincteren. Der Sphincter ani bleibt bei einer Schildkröte nach der Enthauptung geschlossen, so lange der untere Theil der Medulla spinalis unverletzt ist, wird aber sogleich schlaff und öffnet sich, wenn man das Rückenmark wegnimmt.

Marshall Hall durchschnitt das Rückenmark bei einer lebhaften Coluber natrix zwischen dem 2. und 3. Wirbel. Die Bewegungen hörten sogleich auf; so bleibt es auch, wenn das Thier nicht gereizt wird. Wird es aber gereizt, so bewegt sich das Thier eine Zeit lang, da bei jeder veränderten Lage neue Theile seiner Oberfläche mit dem Boden in Berührung kommen. Allmählig kömmt das Thier wieder zur Ruhe; aber die geringste Berührung erneuert dagegen die Bewegung.

Marshall Hall zeigt recht schön das Verhältniss der willkührlichen, respiratorischen und reflectirten Bewegungen, indem er zugleich zu beweisen sucht, dass die nach Verlust des Gehirns stattfindenden reflectirten Bewegungen nicht von wahrer Empfindung, sondern nur von der bei den Empfindungen stattfindenden centripetalen Nervenwirkung abhängig sind. Empfindung, Wille, Bewegung seyen die drei Glieder der Kette, wenn eine Bewegung durch Schmerz herbeigeführt wird; werde aber das mittlere dieser Glieder zerstört, so höre die Verbindung zwischen dem ersten und zweiten mit dem Bewusstseyn auf. Wir glauben auch, dass die nach Verlust des Gehirns stattfindenden reflectirten Bewegungen auf Hautreize keinen Beweis enthalten, dass die Hautreize noch wahre Empfindung im Rückenmark erregen können; es ist vielmehr die gewöhnlich auch bei den Empfindungen stattfindende centripetale Leitung des Nervenprincips, die aber hier nicht mehr Empfindung ist, weil sie nicht mehr zum Gehirn, zum Organ des Bewusstseyns geleitet wird. Auch während dem gesunden Leben erfolgen viele reflectirte Bewegungen durch Hautreize, welche nicht als wahre Empfindungen zum Bewusstseyn kommen, aber doch heftige Eindrücke auf das Rückenmark erregen können, wie z. B. die dauernde Zusammenziehung der Sphincteren vom Reiz der Excremente und des Harns. Allein Marshall Hall geht doch zu weit, wenn er annimmt, dass bei dem gesunden Leben jede Bewegung auf wahre Empfindung vom Willen bedingt werde, und alle Erregungen der empfindlichen Theile bei den reflectirten Bewegungen ohne Empfindung seyen. Denn die reflectirten Bewegungen des Niesens, Hustens und viele andere erfolgen von wirklichen Empfindungen.

Die reflectirten Bewegungen und die unwillkührlichen, nicht

Digitized by Google

reflectirten Bewegungen sind nicht mit einander zu verwechseln. Wird die Stimmritze eines Thieres berührt, sagt Marshall Hall, so folgt eine Zusammenziehung; eben so, wenn das Herz berührt wird. Durch Entfernung des Gehirns tritt keine Aenderung ein. Nimmt man aber die Medulla oblongata weg, so hören die Contractionen des Larynx auf Reize auf, während die des Herzens selbst nach Entfernung der Medulla spinalis fortdauern. Die Wirkung des Reizes auf das Herz ist eine unmittelbare (Irritabilität); ein auf den Larynx angebrachter Reiz muss dagegen zur Medulla oblongata fortgepflanzt werden und die Contraction erfolgt mittelbar von dieser aus. Bei einer Schlange trat nach Entfernung des Kopfes eine Bewegung des Larynx ein, welcher abwärts gezogen und geschlossen wurde, sobald Marshall Hall eine Stelle innerhalb der Zähne des Unterkiefers oder die Nasenlöcher berührte. Diess fand nach Entfernung der Medulla oblongata nicht mehr statt. Marshall erwähnt zuletzt, als zur reflectirenden Function gehörend, das Blinzeln der Augenlieder, wenn dieselben berührt werden, die eigenthümliche Wirkung auf die Respiration durch Kitzeln, oder wenn kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt wird, das Niesen durch Reizen der Nasenschleimhaut, Husten, Erbrechen durch Reizen des Larynx oder Pharynx, Tenesmus durch Reizung des Mastdarms, und Strangurie durch Reizung der Blase.

Man sieht, dass die Krämpfe in den Krankheiten eine sehr verschiedene Quelle haben können. Es giebt nämlich krampfhafte Affectionen, welche ihren Sitz in den motorischen Nerven selbst, oder ihre Ursache im Gehirn und Rückenmark haben; aber auch reflectirte Krämpfe, deren Ursache in Reizungen von Empfindungsnerven liegt, wie die nach Intestinalreizungen, bei der Dentition, Odontalgie, und überhaupt nach schmerzhaften Nervenleiden von organischen und nicht organischen Fehlern, oft erfolgenden Krämpfe.

Die bisher beschriebenen Phänomene haben zwar alle mit einander gemein, dass das Rückenmark das Bindeglied zwischen einer sensorischen und motorischen Bewegung des Nervenprincips ist, indess lassen sich auch noch bestimmter die Wege bezeichnen, welche bei den reflectirten Bewegungen von den Empfindungsnerven auf die motorischen Nerven im Rückenmark die Leitung bewirken. Die gewöhnlichste Art der reflectirten Bewegung ist, dass die Muskeln des Gliedes, an welchem man heftige Empfindungen erregt, bewegt werden, wie beim Verbrennen der Haut Zuckungen zunächst in dem verbrannten Gliede, und im Anfange der Narcotisation eines Thieres bei Empfindungsreizung der Haut am leichtesten auch die Muskeln des gereizten Gliedes bewegt werden, wie der Bissen die reflectirte Bewegung der Schlingwerkzeuge hervorbringt, und der Staub in der Conjunctiva blosse Empfindung erregend, das reflectirte Schliessen der Augenlieder hervorruft, und wie endlich die Reize des Urins und der Excremente mittelbar auf die Bewegung der Sphincteren wirken. Sobald daher die Empfindungsbewegung das Rückenmark erreicht hat, so geht die Bewegung nicht auf das ganze

Digitized by Google

Rückenmark über, sondern am leichtesten auf diejenigen motorischen Nerven, welche den nächsten Ursprung an den gereizten sensibeln Nerven haben; oder mit anderen Worten, der leichteste Weg der Strömung oder Schwingung ist von der hintern Wurzel eines Nerven oder seiner einzelnen Primitivfasern nach dessen vorderer Wurzel oder nach den vorderen Wurzeln mehrerer nahe gelegenen Nerven. Wir sehen daraus, dass das Princip der Nerven bei diesen Strömungen oder Schwingungen die kürzesten Wege nimmt, um von Empfindungsfasern durch das Rückenmark auf Bewegungsfasern zu wirken; gleichwie die Elektricität auch den kürzesten Weg von einem zum andern der genäherten Poldräthe nimmt. Richtiger ausgedrückt und in die Sprache der Nervenphysik übersetzt, heisst diess jedoch so, dass bei heftiger Erregung der motorischen Eigenschaft des Rückenmarkes durch einen Empfindungsnerven zunächst nur derjenige Theil des Rückenmarkes erregt wird, und wieder Zuckung erregt, welcher dem Empfindungsnerven den Ursprung giebt, und dass die Erregung anderer Theile des Rückenmarkes und der davon entspringenden motorischen Nerven in dem Maasse abnimmt, als sie sich von der durch den Empfindungsnerven erregten Stelle entfernen. Dasselbe gilt auch von den Hirnnerven. Die grossen Sinnesnerven sind vorzüglich geneigt, reflectirte Bewegungen der motorischen Gehirnnerven zu verursachen, und namentlich der N. opticus und acusticus; beide bewirken bei grellem Lichte und starkem Schall eine reflectirte Erregung des N. facialis, und dadurch Schliessen oder Blinzeln der Augenlieder. Der N. opticus bewirkt hinwieder leicht die reflectirte Erregung des N. oculomotorius durch Bewegung der Iris, und erregt beim Sehen von intensivem Licht eine reflectirte Affection des N. facialis mit anderen Nerven im Niesen. Aber auch der grosse Gefühlsnerve des Vorderhauptes und Gesichtes, die grosse Portion des N. trigeminus kann den N. oculomotorius und facialis durch Vermittelung des Gehirns erregen; so entsteht Zusammenziehung der Iris von in die Nase eingezogenem kalten Wasser, und von Kitzel in der Nase entsteht Niesen und die damit verbundene Thätigkeit des N. facialis bei Erregung der Gesichtsmuskeln. Kurzum wir sehen, dass von den motorischen Gehirnnerven die zum Ciliarknoten und also zu der Iris gehenden Theile des Nervus oculomotorius und der Nervus facialis am leichtesten durch Reflexion erregt werden, und dass sowohl Gesichts- als Gefühls- und Gehöreindrücke die erregende Ursache seyn können; daher zwischen den Ursprüngen des N. opticus, trigeminus und acusticus, und den Ursprungsstellen jener motorischen Nerven im Gehirn eine durch die erste Formation prästabilirte leichtere Leitung stattfinden muss. Diejenigen Empfindungsnerven und motorischen Nerven, deren Wechselwirkung durch das Gehirn und Rückenmark erleichtert ist, zeigen mit jenen Centraltheilen eine Art Statik, eines verändert das andere, wie das Steigen einer Waageschaale das Sinken der anderen bedingt, das Fallen des Fluidums in dem einen Schenkel einer zweischenkligen Röhre

Digitized by Google

das Steigen in dem andern bewirkt bis zur Herstellung des Gleichgewichtes. Ist auch ein Empfindungsnerve für gewöhnlich nicht im Stande, eine reflectirte Bewegung hervorzurufen, so tritt sie doch bei einiger Heftigkeit der Empfindung sogleich auf, und das Rückenmark und Gehirn reflectiren dann die von Seiten der Empfindungsnerven erhaltene Strömung oder Schwingung in diejenigen motorischen Nerven, zu welchen die Leitung von jenen Empfindungsnerven durch die Fasern des Gehirns und Rückenmarkes am leichtesten ist.

Eine andere, sehr gewöhnliche Bahn der Leitung von Empfindungsnerven zu motorischen Nerven durch Vermittelung, des Rückenmarks und der Medulla oblongata, ist die der Erregung des Schleimhautsystems und der secundären Affection der Respirationsmuskeln im Erbrechen, Stuhlzwang, Gebären, Harnzwang, Husten, Niesen, Schluchzen etc. Ausser dem eben erörterten statischen Gesetz, dass Nerven verwandten Ursprunges, oder von nicht allzu entferntem Ursprunge zu den Erscheinungen der Reflexion sich eignen, ist das am häufigsten eintretende Gesetz der Nervenstatik, der Reflexion, das eben erwähnte. Daher in der Medulla oblongata und dem Rückenmark, zwischen den Empfindungsnerven der Schleimhäute (N. trigeminus — Nase; N. vagus — Luftröhre, Lungen, Schlund, Speiseröhre, Magen; N. sympathicus — Darmkanal, Uterus. Aeste des Sacralplexus und N. sympathicus zur Urinblase und zum Mastdarm) und den motorischen Respirationsnerven (N. facialis, accessorius, N. spinales) eine leichtere Leitung präformirt seyn muss, während dagegen die zu den Extremitäten gehenden N. spinales von dieser Harmonie ausgeschlossen sind.

Tritt aber eine gewisse Irritation des Rückenmarkes und Gehirns durch Narkosis oder andere Ursachen ein, so kann jede Empfindung eine Entladung des Rückenmarkes nach allen motorischen Nerven bewirken, auch zu denjenigen, welche sonst am schwersten mit afficirt werden, zu den motorischen Nerven der Extremitäten. Ja Volkmann (Muell. *Arch.* 1838. 15.) hat gezeigt, dass Längstheilung des Rückenmarks bei enthaupteten Fröschen die Ausdehnung der Reflexbewegungen über alle Muskeln beider Körperhälften nicht hindert, so lange nur irgend ein Theil des Rückenmarkes verbunden bleibt.

Es entsteht zuletzt die Frage, in wie weit die Empfindung an den Reflexbewegungen als Empfindung Antheil hat. Volkmann neigt sich zu der Ansicht von Whytt, welcher bewusste Empfindung und spontane zweckmässige Reaction bei den Bewegungen, die auf Empfindungen folgen, annahm. Dass diess in vielen Fällen so ist, scheint mir nicht zu bezweifeln, namentlich scheint es so bei den Reflexbewegungen zu seyn, welche bei unversehrtem Gehirn und Rückenmark erfolgen. Hieher gehört z. B. das Schliessen der Augenlieder beim heftigen Lichtreiz, die Bewegung der Athemmuskeln bei Reizung der Schleimhaut des tractus respiratorius, intestinalis, urinarius. Bedenkt man aber, dass alle Stücke einer Salamandra maculata noch Reflexbewegun-

Digitized by Google

gen zeigen, welche noch etwas vom Rückenmark enthalten, so lässt sich diese Ansicht schwerlich als durchgreifend festhalten. Auch giebt es Reflexionserscheinungen an Organen, welche dem Einfluss des Willens entzogen sind, wie am Darmkanal und Herzen. Endlich haben die allgemeinen reflectirten Zuckungen nach der Narcotisation nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer spontanen Reaction. Nach meiner Meinung bewirkt eine Reizung eines sensoriellen Spinalnerven zunächst eine centripetale Action des Nervenprincips zum Rückenmark. Kann diese noch zum Sensorium commune gelangen, so ist es eine bewusste Empfindung. Gelangt sie aber wegen Durchschneidung des Rückenmarks nicht zum Sensorium commune, so behält sie doch ihre ganze Kraft als centripetale Action auf das Rückenmark. In beiden Fällen kann eine centripetale Action eines sensoriellen Nerven eine Reflexbewegung hervorbringen. Im ersten Falle wurde die centripetale Action zugleich Empfindung, im letztern Falle nicht, aber sie ist zur Reflexbewegung oder zur centrifugalen Reflexion hinreichend. Marshall Hall's Ansicht entfernt sich sowohl von derjenigen von Whytt, als von der meinigen und ist eigenthümlich. Er beschränkt zuerst die Erscheinungen der Reflexion auf die blossen Spinalnerven und schliesst die Sinnesnerven des Gehirns aus. Nach ihm wird die Reflexion niemals durch eine Empfindung und selbst nicht einmal durch die sensoriellen Nerven vermittelt. Vielmehr nimmt Marshall Hall eigene Nerven oder Nervenfasern als excito-motorische an, auch die centrifugale Action erfolgt bei der Reflexion nicht in den spontan-motorischen Nerven, sondern in eigenen Fasern, welche er reflecto-motorische nennt. Sensorielle und excito-motorische Fasern kommen von den hintern Wurzeln, spontan-motorische und reflecto-motorische von den vordern Wurzeln der Spinalnerven und Nerven der medulla oblongata; auch wird der N. vagus nicht als vorzugsweise sensorieller, sondern als excito-motorischer Nerve angesehen, weil seine Durchschneidung nach Marshall Hall und Broughton nicht schmerzhaft ist, aber die Respirationsbewegungen verändert. Diese Ansicht ist in Marshall Hall's neuestem Werk über das Nervensystem (*Memoirs on the nervous system. London* 1837. 4.) ausführlich entwickelt. Volkmann hat diese Lehre in seiner erwähnten Abhandlung bestritten und unter anderem angeführt, dass der N. vagus in der That auch schmerzhafter Empfindungen fähig sey.

Eine Thatsache, auf welche Volkmann zuletzt aufmerksam macht und welche wir selbst oft beobachtet haben, ist die, dass ein grosser Unterschied in der Fähigkeit Reflexionsbewegungen hervorzurufen, zwischen den Nervenstämmen und ihrer peripherischen Ausbreitung besteht. Kein Theil erregt gereizt so leicht Reflexbewegung als die Haut, bei narkotisirten Thieren reicht oft die blosse leiseste Berührung hin sie stark hervorzurufen, während die Reflexbewegungen, welche man bei Reizung der Nervenstämme selbst wahrnimmt, viel geringer sind.

Digitized by Google

IV. Capitel. Von der verschiedenen Action der sensibeln und motorischen Nerven.

Die Erfahrung hat uns bis jetzt gelehrt, dass, wenn ein Punkt des Nerven gereizt wird, die Wirkung sich in der ganzen Länge der Fasern äussert, und in den motorischen Nerven dort Bewegung erregt, wo die Fasern mit Muskeln zusammenhängen, in den sensibeln Fasern Empfindung, wenn die Fasern noch mit den Centraltheilen zusammenhängen. Nun könnte es scheinen, dass sich der Effect der Nervenreizung von dem gereizten Punkte auf gleiche Art nach dem peripherischen Ende des Nerven und nach dem Centralende desselben fortpflanze. Es frägt sich aber, ob diess wirklich geschieht, und ob die Fortpflanzung der Reizung nicht in einer gewissen Richtung allein geschieht, ob bei den sensibeln Fasern der Nerven die Wirkung nicht etwa bloss nach dem Gehirn, bei den motorischen Fasern bloss die umgekehrte Richtung nach den Muskeln stattfinde. Man nahm diess gewöhnlich an, so lange es nicht bekannt war, dass die sensibeln und motorischen Fasern verschieden sind. Jetzt wiederholt sich diese Frage wieder, und die Lösung dieses Problems ist von äusserster Wichtigkeit für die Physik der Nerven. Es handelt sich also darum, zu wissen: ist die Kraft der motorischen Fasern, Muskeln zur Zusammenziehung zu reizen, qualitativ von der Kraft der sensibeln Fasern verschieden, oder ist, was hier verschiedene Kräfte genannt werden, bloss verschiedene Richtung der Nervenwirkung, centrifugal in den motorischen Fasern, centripetal in den sensibeln.

Es ist bekannt, dass die Wirkung bei den Muskelnerven immer nur in der Richtung der Nervenzweige erfolgt, und dass die Muskeln nicht zucken, welche Nervenäste vom Stamme erhalten über der Stelle der Reizung, dass dagegen nach abwärts die Wirkung sich auf alle Muskelnerverven ausdehnt, die von dem Stamme unter der gereizten Stelle abgehen. Diese Thatsache scheint zu beweisen, dass die Nervenwirkung in den motorischen Nerven nur in centrifugaler Richtung erfolgt, vom Stamme nach den Aesten. Allein diess lässt sich sehr wohl aus Thatsachen ganz anders erklären. Die mikroskopische Anatomie der Nerven lehrt, dass die Primitivfasern in den Stämmen sich nicht verbinden, dass also der Nervenstamm nur das Ensemble aller unendlich vielen Primitivfasern ist, die aus dem Stamm mit den Aesten hervorgehen. Die Primitivfasern der Aeste, die in verschiedener Höhe vom Stamme abgehen, hängen daher gar nicht im Stamme zusammen, die motorischen Fasern laufen getrennt bis zum Rückenmark oder Gehirn, und die Reizung eines Astes kann daher rückwärts, wenn eine Rückwärtswirkung stattfindet, keine Theile des Stammes mit afficiren, sondern diese Rückwärtswirkung würde sich auf die Primitivfasern des gereizten Astes beschränken, welche im Stamme ohne Verbindung bis zum Gehirn oder Rückenmark fortlaufen. Wenn also auch ausser der Wirkung nach den Muskeln eine Rückenmarkswirkung des in einem Punkte

Digitized by Google

gereizten motorischen Nerven nach dem Gehirn und Rückenmark stattfände, so könnten wir sie nicht an Zuckungen anderer Theile merken, weil die Fasern eines Stammes mit keinen Fasern höherer Aeste zusammenhängen. Diese Rückwärtswirkung kann auch im Rückenmark isolirt bleiben, wenn die Fasern im Rückenmark sich nicht verbinden, sie kann auch keine Empfindung im Gehirn und Rückenmark erregen, wenn die Fasern der motorischen Nerven im Gehirn und Rückenmark isolirt sind und nicht mit sensibeln Fasern zusammenhängen. Eben so mit den an einem Punkte ihrer Länge gereizten sensibeln Fasern. Die sensibeln Fasern bewirken nur Empfindungen, wenn sie mit dem unversehrten Rückenmark und Gehirn zusammenhängen. Hieraus könnte man auf eine blosse centripetale Wirkung der sensibeln Nervenfasern schliessen, allein dieser Schluss ist eben so fehlerhaft, denn nur der centripetale Strom von jenem Punkte kann bewusst werden, weil nur er von dem Centralorgane empfunden wird, der entgegengesetzte Strom der sensibeln Fasern kann nicht bewusst werden, wenn er auch stattfindet.

Wenn es gewiss wäre, dass die Muskeln auch ohne die Nerven durch sich selbst Contractilität besitzen, und dass aller Nervenreiz nur wie andere Reize auf die Muskeln wirke, dass andere Reize nicht erst auf Nerven wirken müssen, um Bewegungen hervorzurufen; wenn diess gewiss wäre, so liesse sich weiter beweisen, dass die sensibeln Fasern nur centripetal nach dem Gehirn und nicht rückwärts wirken. Denn nach einer Beobachtung von mir sind die sensibeln Fasern in den Muskeln Zuckungen zu bewirken auch dann unfähig, wenn sie sich wirklich in Muskeln verbreiten, wie der N. lingualis, der wenigstens mit dem Muskelnerven N. hypoglossus anastomosirt. Allein obige Voraussetzung ist falsch; die Muskeln besitzen ohne die Wechselwirkung mit den Nerven keine Contractilität; sie verlieren ihre Contractionskraft auf alle Reize, wenn ihre Nerven lange Zeit vom Gehirn getrennt waren; sie verlieren ihre Reizbarkeit in gleichem Grade, als die Reizbarkeit der Nerven erlischt, wie die Versuche von mir und Sticker zeigen. Siehe oben p. 639. In diesen Versuchen hatten die Muskeln, zu welchen ein durchschnittener Nerve hingeht, nach mehreren Monaten in zwei Fällen alle Reizbarkeit, und in einem Falle fast alle Reizbarkeit für den galvanischen und mechanischen Reiz, in gleichem Grade als die Nerven selbst verloren, so dass zu den Zusammenziehungen der Muskeln durchaus ihre Wechselwirkung mit den Nerven nöthig ist. Da nun die sensibeln Nerven auch dann, wenn sie sich in Muskeln (wie der N. lingualis in der Zunge) verbreiten, keinen Einfluss auf die Muskeln haben (siehe oben p. 661.), so folgt ganz evident, dass die motorischen Nerven allein in jener Wechselwirkung mit den Muskeln stehen. Diess kann aber auch wieder eben so gut von einer eigenthümlichen, nur den motorischen Nerven eigenen Qualität herrühren, als von einer, nur den motorischen Nerven zukommenden centrifugalen Richtung der Nervenwirkung.

Getrieben von dem Eifer, über diesen äusserst wichtigen Punkt auf empirischem Wege ins Reine zu kommen, habe ich in

Digitized by Google

den Wirkungen der narkotischen Gifte ein Mittel zur dereinstigen Lösung des Problems gefunden. Die Frösche werden nämlich nach der Vergiftung mit Opium so äusserst reizbar im Rükkenmark, dass jede auch noch so geringe Erschütterung, z. B. das leise Klopfen auf den Tisch, auf welchem der Frosch liegt, oder das Fallenlassen eines Fusses eine Zuckung am ganzen Körper bewirkt. Nicht allein die Erschütterung des Rückenmarkes selbst thut diess, sondern auch eine ganz örtliche Empfindung, die auf das Rückenmark verpflanzt wird. Wenn man den Frosch in diesem Zustande irgendwo sticht, ohne die geringste Erschütterung, so zuckt er in allen Theilen seines Körpers. Hiebei wirkt die peripherische Reizung eines Empfindungsnerven auf das ganze Rückenmark, und das Rückenmark auf alle Theile zurück. Das Rückenmark ist hier die Vermittelung, denn die abgeschnittenen Theile oder Theile, deren Nerven durchschnitten sind, zucken dann nicht mehr bei der Erschütterung. Diese Thatsache vorausgesetzt, wollte ich bei einem Frosch die hinteren oder sensibeln Wurzeln der Nerven für ein Hinterbein durchschneiden, den Frosch vergiften, und dann sehen, ob die Nerven dieses Beins, welches noch durch die vorderen oder motorischen Wurzeln mit dem Rückenmark zusammenhängt, wenn sie gereizt werden, so gut wie die Empfindungsnerven diese Reizung auf das äusserst gereizte Rückenmark fortpflanzen können in centripetaler Bewegung, und ob also die Reizung eines Bewegungsnerven in einem empfindungslosen Bein rückwärts auch noch allgemeine Zuckungen in einem vergifteten Frosch bewirkt. Der Erfolg des wiederholten Versuchs ist dagegen. Diese Zuckungen erfolgen nicht, wenn die Reizung des Bewegungsnerven ganz ohne alle Erschütterung des ganzen Frosches geschieht, z. B. durch Schneiden eines Nerven mit der Scheere; auch die mechanische Reizung des Nerven mit der Nadel und Pincette bringt dann keine allgemeinen Zuckungen am ganzen Frosch hervor, wenn nur keine Erschütterung des Frosches dabei stattfindet. Um diese Versuche gut anzustellen, muss man erst das Gift beibringen, und wenn sich die erste Wirkung zeigt, wenn nämlich der Frosch beim Klopfen auf den Tisch, worauf er liegt, zu zucken anfängt, schnell das Rückgrat öffnen, und auf einer Seite alle drei hinteren Wurzeln der Nerven des einen Hinterbeines durchschneiden, während die andere Seite unversehrt bleibt; darauf präparirt man eben so schnell den Schenkelnerven auf beiden Seiten heraus und schneidet ihn über dem Knie ab, so dass er am Oberschenkel heraushängt. So ist der Frosch zum Versuch präparirt. Bricht man aber vor dem Beibringen des Giftes das Rückgrat auf, so verliert er vor der Vergiftung so viel Blut, dass das Gift hernach nicht mehr recht resorbirt wird. Dieser Versuch ist überhaupt schwer, und man muss ihn oft anstellen, bis man zu einem reinen Experiment kommt. Auch darf die Dosis des Giftes nicht zu stark seyn, damit die Paralyse nicht zu schnell eintritt. Am besten ist Opium; Nux vomica macht zu schnell paralytisch. Ist nun der Frosch vergiftet, das Rückgrat aufgebrochen, sind die hinteren oder sensibeln Wurzeln der

Digitized by Google

Nerven des Hinterbeins auf der einen Seite durchschnitten und der Schenkelnerve herauspräparirt, so schneide man am Schenkelnerven dieser Seite, der durch die Empfindungswurzeln nichts mehr zum Rückenmark leiten kann, ein Stückchen mit der Scheere bei Vermeidung aller Erschütterung ab. Dabei wird keine Zuckung des ganzen Frosches eintreten. Schneidet man aber eben so an dem Schenkelnerven der andern Seite, dessen Empfindungswurzeln noch mit dem Rückenmark zusammenhängen, ein Stückchen mit der Scheere ab, so entsteht jedesmal eine Zuckung des ganzen Frosches, zum Beweise, dass die motorischen Nerven oder vorderen Wurzeln allein keine Reizung rückwärts zum Rückenmark, welche die allgemeine Zuckung bewirkt, fortleiten können, und dass zu dieser Rückwärtsleitung zum Rükkenmark nur die Empfindungsnerven fähig sind. Bei diesen äusserst wichtigen Versuchen muss man beim Schneiden der Nerven alle, auch die geringste Erschütterung vermeiden. Denn wenn man beim Schneiden des Schenkelnerven, dessen hintere Wurzeln resecirt sind, ungeschickt verfährt, so dass sich die Erschütterung mechanisch bis auf den Rumpf des Thieres fortpflanzt, so ruft das erschütterte Rückenmark sogleich eine Zuckung hervor. Dass hier die Erschütterung des Rückenmarks die Ursache ist, beweist der Umstand, dass selbst nach Durchschneidung des Nerven noch eine zerrende Erschütterung am Bein, die dem Rumpfe mitgetheilt wird, allgemeine Zuckungen erregt. Ich habe noch folgenden zweiten Versuch zur Lösung des Problems ausgedacht, aber noch nicht angestellt.

Es ist bekannt, dass die Iris in beiden Augen sich immer gleichzeitig bewegt, und dass der Reiz eines Auges hinreicht, um eine gleiche Veränderung in beiden Pupillen hervorzubringen. Es ist auch bekannt, dass das Licht nicht unmittelbar auf die Iris wirkt, sondern dass die gereizte Netzhaut auf das Gehirn wirkt, und die Zusammenziehung der Iris erst Folge der Rückwirkung vom Gehirn ist. Denn die für das Licht sonst unbewegliche Iris eines amaurotischen Auges wird noch bewegt, wenn das Licht auf das gesunde Auge wirkt. Es ist auch bekannt, dass der N. oculomotorius Bewegungsnerve für die Iris ist, wie Mayo gezeigt hat. Es fragt sich nun: wenn man den N. oculomotorius eines Auges reizt, wirkt diese Reizung rückwärts, wie im Sehnerven, auf das Gehirn, und erfolgt eine Verengung der Iris im Auge der anderen Seite? Dieser Versuch beruht übrigens auf der keineswegs wahrscheinlichen Voraussetzung, dass der N. oculomotorius keine Empfindungsfasern enthält.

Der zweite Theil der Frage, ob die Nervenwirkung in den Empfindungsnerven nur centripetal, nicht auch rückwirkend vom Gehirn und Rückenmark ist, liesse sich insofern auch für die blosse centripetale Wirkung entscheiden, als alle Empfindungen mit centripetalen Wirkungen verbunden sind. Es giebt aber auch Empfindungen, die sich vom Rückenmark bei Leidenschaften, Vorstellungen in der ganzen Länge der Nerven bis zu den Zehen fortzupflanzen scheinen. Allein diese liessen sich auch anders erklären. Es wurde gezeigt, dass die Empfindungsfasern aller Theile

Digitized by Google

eines Nerven im Stamme und in den Wurzeln enthalten sind, und dieser Stamm beim Druck dieselben Empfindungen hat, als die Aeste zusammen. Wenn also die Wurzeln der Nervenstämme eines Gliedes durch centripetale Nervenwirkung Eindruck auf das Rückenmark machen, so müssen die Empfindungen in dem Gliede zu seyn scheinen. Wenn ferner durch eine Ursache plötzlich die Empfindungskraft im Rückenmark verändert wird, durch Schreck, so machen die Fasern der Empfindungswurzeln einen anderen Eindruck als vorher, was als Empfindungen in den Gliedern gefühlt werden muss.

Eine vom Gehirn aus centrifugal in einem entschiedenen Empfindungsnerven erfolgende Erregung ist scheinbar die des Nervus lacrymalis in gewissen Leidenschaften und Vorstellungen. Wäre es gewiss, dass vom Nervus sympathicus keine Zweige mit dem Nervus lacrymalis, wie mit anderen Zweigen des Nervus trigeminus fortgehen, so wäre diess ein Beweis, dass auch die Empfindungsnerven Erregungen in jeder Richtung verbreiten. Es ist aber zu vermuthen, dass auch der N. lacrymalis graue Fasern erhält, da sie der ganze erste Ast bekömmt, wie früher gezeigt worden.

Eben so dürfte die Thatsache zu erklären seyn, dass noch andere Nerven, welche hauptsächlich der Empfindung dienen, einen offenbaren organischen Einfluss auf die Ernährung und Absonderung und selbst auf Bewegung haben, wie der N. vagus. Der N. vagus wird, wie E. H. Weber (*anat. nervi sympathici*) gezeigt hat, bei einigen Thieren zum grossen Theil selbst Vertreter des N. sympathicus, wie bei den Schlangen, wo er einen grossen Theil des Darmkanals versieht. Bei den Myxinoiden geht der vagus nach meinen Beobachtungen bis zum After und der sympathicus fehlt. Indem daher der N. sympathicus und der N. vagus sich gleichsam gegenseitig vertreten und beschränken können, scheint der Beweis geliefert zu seyn, dass in einem Empfindungsnerven nicht bloss retrograde Strömungen oder Schwingungen stattfinden können. Indess hat dieser Einwurf keinen grossen Werth; denn die organischen Wirkungen des N. vagus rühren doch höchst wahrscheinlich aus beigemischten organischen Fasern des N. sympathicus her, mit dem er sich so vielfach verbindet. Ueberhaupt enthält ein Nerve, der eine Strecke sich verbreitet, ganz andere Elemente, als bei seinem Ursprunge; die Natur kann auf seinem Wege noch viele andere Fasern ganz anderer Ordnung zu ihm gesellen. Ein lebhaftes Beispiel, wie ein motorischer Nerve von organischen Fasern begleitet wird, und wie die organische Wirkung von der motorischen verschieden seyn muss, haben wir an dem N. buccinatorius des Ochsen, der ein Büschel grauer organischer Fasern vom Ganglion oticum aufnimmt, die mit ihm hingehen, um sich wahrscheinlich in der Mundschleimhaut und den Wangendrüsen zu verbreiten. Hier sehen wir, dass für die motorische Strömung wie für die organische, verschiedene Leiter nöthig sind; denselben Beweis können wir aber auch von den Empfindungsnerven führen.

Die Thatsache, dass die verschiedenen Sinnesnerven von demselben Reize qualitativ verschiedene Empfindungen haben, in-

Digitized by Google

dem mechanischer und galvanischer Reiz im Sehnerven Licht, im Gehörnerven Schall, im Gefühlsnerven Schmerz erregt, lässt sich weder zum Vortheil der einen, noch der andern Hypothese anwenden. Denn sie ist erklärbar, sowohl dadurch, dass die Sinnesnerven sich durch ihre Kräfte unterscheiden, als dass sie gleich sind und der Unterschied nach den Stellen des Gehirns entsteht, zu welchen sie hingehen. Doch ist es auffallend, dass manche Reize nur auf einzelne Nerven zu wirken im Stande sind. So wirkt das Lichtagens nur auf den Sehnerven und als erwärmend auf die Gefühlsnerven, nicht auf andere, und der Geruchsnerve scheint nicht durch andere Reize als Riechstoffe und Elektricität zu Gerüchen bestimmt zu werden.

Wie dem nun sey, es ist jedenfalls nicht sicher erwiesen, dass die sensibeln Fasern nur centripetale, die motorischen Fasern nur centrifugale Wirkungen haben. Ein Umstand besonders erregt zuletzt noch grösseres Bedenken. Es ist nämlich oben p. 639. bewiesen worden, dass zur Erhaltung der Reizbarkeit der motorischen Nerven, ihre Verbindung mit den Centraltheilen nothwendig ist; diess scheint für eine gleiche Abhängigkeit aller Nerven, auch der Empfindungsnerven, vom Gehirn und Rückenmark zu sprechen. In diesem Falle würden diese aber centrifugale Ausstrahlungen auf die Empfindungsnerven haben. Spätere, nach glücklichen Ideen angestellte Versuche oder neue Entdeckungen müssen darüber entscheiden, und wir dürfen uns jetzt nur darüber freuen, dass die Erörterung dieser wichtigen Frage, von deren definitiver Entscheidung viele andere abhängen, durch die oben mitgetheilten Beobachtungen wenigstens schon in das Gebiet der empirischen Physiologie gehört.

Lässt sich die erste Frage nicht sicher lösen, so lässt es sich noch weniger beweisen, dass centripetale und centrifugale Leiter einen continuirlichen Cirkel bilden., in welchem beständig das Nervenfluidum von den Centraltheilen nach den motorischen Nerven, von den peripherischen Enden der letzteren durch die sensibeln Nerven nach den Centraltheilen zurück stattfindet. Wohl könnte man sich das Leben beständig mit einer Circulation des Nervenfluidums verbunden denken; diese würde nur so unmerklich seyn, dass davon nur das unmerkliche beständige Spiel der Muskelfibern in der scheinbaren Ruhe, und das Gleichgewicht, welches sich die verschiedenen Muskeln halten, und wiederum das undeutliche Gefühl aller Theile in einem gesunden Menschen herrühre. Diese Hypothese von der Circulation des Nervenfluidums oder seiner Schwingungen in den beiden Classen der Leiter wird aber aus mehreren Gründen sehr unwahrscheinlich. Denn da viele Nerven bloss sensibel sind, so müssten diese der Circulation entbehren, oder man müsste wieder annehmen, dass in ihnen neben Empfindungsfasern auch eben so viele andere mit centrifugalen Wirkungen enthalten seyen, die nur deswegen keine Bewegungen hervorrufen, weil sie sich nicht in Muskeln endigen. Sieht man nun gar bloss auf die motorischen und sensibeln Nerven, welche durch Anastomosen der Bündel zusammenhängen, wie z. B. N. facialis und infraorbitalis, so konnen solche Anasto-

Digitized by Google

mosen noch weniger die Wege für einen Cirkel des Nervenfluidums darbieten. Denn erstens sind diese Anastomosen keine Verbindungen der Primitivfasern, und dann springt, wie Gaedechens Versuche zeigen, eine am N. facialis erregte Reizung nicht durch eine solche Anastomose auf den Stamm des N. infraorbitalis über, indem das peripherische Stück des durchschnittenen N. facialis, das zu einer solchen Anastomose gehört, gereizt keine Schmerzen verursacht. Aus Allem diesem geht hervor, dass eine regelmässige Circulation des Nervenfluidums vom Gehirn und Rückenmark durch die Nerven, und zu jenen zurück, sich nicht erweisen lässt und für jetzt sehr unwahrscheinlich ist.

V. Capitel. Von den Gesetzen der Wirkung und Leitung in dem Nervus sympathicus.

Unsere Kenntniss von der Mechanik des N. sympathicus ist noch äusserst unvollkommen; kaum hat sich die Physiologie hier über die Aufstellung einiger Hypothesen erhoben, welche sich sämmtlich weder erweisen, noch entschieden widerlegen lassen. Der einzige Weg, hier ins Reine zu kommen, ist, die Thatsachen, welche wir von der Mechanik der Cerebrospinalnerven kennen, mit den Erscheinungen des N. sympathicus zu vergleichen und durch neue Beobachtungen zu untersuchen, in wie weit die Mechanik dieses Nerven von der der übrigen Nerven abweicht. Es fragt sich also: sind die Wirkungen der Fasern des N. sympathicus wie bei den Cerebrospinalnerven getrennt, oder können die einzelnen Fasern desselben durch ihre Wirkungen einander mittheilen, und ist vielleicht die Irradiation des motorischen Einflusses, und die Coincidenz der Empfindungen bei diesem Nerven das Normale? Sind die Ganglien Multiplicatoren des Nerveneinflusses und gleichsam kleine unabhängige Nervencentra, Radiationspunkte? Findet etwa in diesen Organen eine Reflexion des Nerveneinflusses in gewissen Richtungen statt? Sind die Ganglien die Ursachen, dass die Empfindungen undeutlich und vage werden, sind sie Organe der Irradiation oder der Vermischung der Empfindungen, oder sind sie Halbleiter, welche die Empfindungseindrücke in ihrer Wirkung auf das Gehirn und das Rükkenmark hemmen, und den Einfluss des Willens auf die dem N. sympathicus unterworfenen Theile abhalten? Oder sind die Ganglien des N. sympathicus vielleicht mehr dem organischen Einflusse des sympathischen Nerven bestimmt, kleine Nervencentra, von welchen der Nerveneinfluss für die Beherrschung der chemisch-organischen Vorgänge ausstrahlt? Findet in den organischen Nerven eine centripetale oder centrifugale, oder allseitige Wirkung von den gereizten Stellen aus statt? Alle diese Fragen lassen sich leider jetzt noch durchaus nicht bestimmt beantworten. Das einzige Sichere, was wir von den Wirkungen des N. sympathicus wissen, liegt zum Theil ausser der Beantwortung dieser Fragen, und namentlich können wir keine einzige der oben

Digitized by Google

berührten Hypothesen von den Ganglien des N. sympathicus weder bestimmt widerlegen noch beweisen.

Der Grenzstrang des N. sympathicus ist ohnstreitig für das ganze System des N. sympathicus wichtig, insofern in diesem die Wurzelfaden von Gehirn- und Rückenmarksnerven zur weitern Ausstrahlung gesammelt werden, indessen scheinen die einzelnen Verbindungsfäden zwischen den Knoten nicht absolut zur Thätigkeit des N. sympathicus nöthig zu seyn; wenigstens hat sich in v. Pommer's Versuchen an Thieren gezeigt, dass der N. sympathicus zwischen dem ersten und zweiten Halsganglion auf beiden Seiten durchschnitten seyn kann, ohne dass innerhalb 7—8 Wochen, wie lange die Thiere beobachtet wurden, irgend eine erhebliche Folge eingetreten wäre. v. Pommer, *Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Heilbronn* 1831. Hieraus geht zugleich hervor dass der Kopftheil des N. sympathicus von dem Brusttheil ohne Nachtheil für das Leben isolirt seyn kann, indem der untere Halsknoten und der Brusttheil des N. sympathicus das ihnen von den Centraltheilen des Nervensystems zuströmende Nervenprincip mehr von den Spinalnerven, mit welchen sie in Verbindung stehen, als von den Cerebralnerven erhalten.

I. Von den Wirkungen des N. sympathicus bei den unwillkührlichen Bewegungen.

I. Alle dem N. sympathicus unterworfenen Theile sind keiner willkührlichen Bewegung fähig. Das Herz, der Darmkanal, die Ausführungsgänge der Drüsen, der Uterus, die Samenbläschen liefern hierzu die Beispiele. Es scheint sogar auf den ersten Blick, dass wenn ein Cerebrospinalnerve sich vielfach mit dem N. sympathicus verbindet, er seinen willkührlichen Einfluss verliert, wie diess z. B. von dem untern Theile des Nervus vagus angeführt werden könnte. Die Speiseröhre ist nur unwillkührlich beweglich, obgleich der Schlund willkührlich bewegt werden kann. Indess ist es zweifelhaft, ob die motorischen Nerven der Speiseröhre vom N. vagus selbst kommen. Die Urinblase erhält zweierlei Nerven, Zweige von den Sacralnerven und vom Plexus hypogastricus. Diess stimmt mit ihren Lebenseigenschaften. Der Einfluss der Willkühr auf dieses Organ ist sehr gering.

Auf der andern Seite sind alle Muskeln, welche von Cerebrospinalnerven allein versehen werden, auch der willkührlichen Bewegung fähig. Die kleinen Muskeln des Ohres können wenigstens von einzelnen Menschen, wie von mir, willkührlich bewegt werden. Der Musculus cremaster, ein Fortsatz des Musculus obliquus internus und transversus, kann auch von Einigen willkührlich bewegt werden, obgleich sehr Viele darauf keinen Einfluss haben.

II. Die von dem N. sympathicus versehenen Theile bewegen sich in schwächerem Grade noch fort, wenn sie aus ihren natürlichen Verbindungen mit dem übrigen sympathischen System und aus dem ganzen Organismus entfernt sind. Das Herz schlägt, aus dem Organismus entfernt, noch lange Zeit fort, bei Amphibien stunden-

Digitized by Google

lang; der Darmkanal setzt ausgeschnitten seine peristaltischen Bewegungen fort. Man sah den ausgeschnittenen Eierleiter einer Schildkröte seinen Inhalt noch austreiben.

III. Daher haben alle vom N. sympathicus versehenen beweglichen Theile eine gewisse Unabhängigkeit von dem Gehirn und Rükkenmark. Wie weit diese geht, ist schon im I. Buch p. 193. untersucht worden. Als Hauptresultat können wir hier erwähnen, dass nicht allein das Herz nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarkes noch lange schwach schlägt, sondern dass es auch constatirte Fälle von Embryonen giebt, bei welchen sowohl das Gehirn als das Rückenmark während des Lebens im Ei langsam zerstört worden sind. Siehe Eschricht *über Gesichtsverdoppelung mit Mangel von Gehirn und Rückenmark.* Mueller's *Archiv.* 1834. *p.* 268. Vergl. oben p. 196.

IV. Gleichwohl sind die Centralorgane des Nervensystems eines activen Einflusses auf die sympathischen Nerven, und ihre motorische Kraft fähig. Aus den Versuchen von Wilson und anderen, welche p. 195. angeführt sind, ergiebt sich, dass die Bewegungen der vom N. sympathicus versehenen Theile zwar nach plötzlicher Zerstörung des Gehirns und Rückenmarkes nicht sogleich aufhören, dass man aber doch bei unversehrtem Gehirn und Rückenmark durch Verletzung und Reizung derselben auf die Art und Schnelligkeit des Herzschlages einwirken kann; wie denn Wilson Philip durch Auftröpfeln von Weingeist und Tabaksinfusum auf das Gehirn der Thiere die Bewegungen des Herzens beschleunigt haben will. S. oben p. 194. Viel augenscheinlicher ist die Wirkung der Leidenschaften.

V. Nach den Versuchen von Philip *haben auch nicht einzelne Theile des Gehirns und Rückenmarkes allein auf einzelne Theile des sympathischen Systems und der von ihm abhängigen Bewegungen, wie des Herzens, Einfluss, sondern das Gehirn und das ganze Rückenmark oder jede Strecke desselben können die Bewegungen des Herzens verändern.* Die Reizung gewisser Theile des Rückenmarkes bedingt zunächst nur die Bewegungen gewisser willkührlicher Muskeln, welche gerade dorther ihre Nerven erhalten; bei den unwillkührlichen Bewegungen scheint aber jeder Theil des Rückenmarkes auf den Gangliennerven wirken zu können. Die Erklärung dieses Unterschiedes, der übrigens noch nicht hinlänglich festgestellt ist, könnte eine doppelte seyn. Man kann nämlich entweder das Rückenmark oder den Gangliennerven selbst als Ursache der Irradiation ansehen. Im ersten Falle bleiben die Fasern des Gangliennerven, welche zum Herzen gelangen, ohne Wechselwirkung mit den Nervenfasern anderer Theile und die Verbreitung der Irradiation findet im Rückenmark selbst statt, so dass von da aus die Nervenfasern verschiedener Theile in Mitaffection gesetzt werden. Im zweiten Falle werden die Ganglien als Ursache der Wechselwirkung angesehen. Wir müssen uns gestehen, dass wir über diese wichtigen Fragen noch gar keine sicheren directen Versuche haben.

Ich galvanisirte den N. splanchnicus eines Kaninchens, den ich durchschnitten, an dem peripherischen Ende, welches ich auf

Digitized by Google

einer Glasplatte isolirt hatte, mit einer Säule von 65 Plattenpaaren. Hierbei entstanden vermehrte peristaltische Bewegungen des Darms, woraus sich schliessen liesse, dass dieser Nerve auf den ganzen Darmkanal und nicht auf einen einzelnen Theil desselben influirt. Derselbe Erfolg trat ein, als ich bei Kaninchen, deren Darmkanal blossgelegt war, und bei denen die peristaltischen Bewegungen des Darms, die sich anfangs an der Luft verstärken, schon sehr matt geworden waren, das Ganglion coeliacum mit Kali causticum betupfte. Die Bewegung des Darms wurde sogleich sehr lebhaft.

VI. Die Zusammenziehungen der Organe, welche von dem N. sympathicus abhängen, sind auf die Reizung ihrer selbst oder ihrer Nerven keine vorübergehende und momentane Zusammenziehungen, sondern entweder länger dauernde Contractionen, oder länger dauernde Modificationen der gewöhnlichen rhythmischen Zusammenziehungen, daher die Reaction gegen den Reiz hier entschieden länger dauert, als die kurze Einwirkung des Reizes selbst. Die Bewegung des Nervenprincips ist also im N. sympathicus langsamer und messbar. Reizt man den Darm bei einem geöffneten Thiere an einer Stelle chemisch, mechanisch, galvanisch, so tritt die Zusammenziehung ganz allmählig ein, und oft in ihrer ganzen Stärke, wenn die Ursache längst zu wirken aufgehört hat. Bei dem Herzen geschieht dasselbe, was am Darm, auf andere Art: statt einer anhaltenden, nicht periodischen Zusammenziehung bewirkt ein vorübergehender Reiz eine anhaltende Reihe periodischer Schläge. Das Herz ist gegen mechanischen wie galvanischen Reiz reizbar. A. v. Humboldt und auch ich haben am Herzen der Frösche auf den galvanischen Reiz Zuckung eintreten gesehen, dagegen wirkt der Galvanismus nicht immer augenblicklich auf Zusammenziehung des Herzens, sondern verändert oft nur die Zahl der folgenden Schläge im Allgemeinen. Auch der mechanische Reiz bewirkt an einem langsam schlagenden Herzen nicht immer sogleich eine Zusammenziehung, sondern oft erst nach einigen Secunden; er wirkt aber offenbar, wie man sieht, wenn das ausgeschnittene Herz eines Frosches lange nicht geschlagen hat. Es ist also hier derselbe Fall, wie im Darmkanal, die Zusammenziehung beginnt oft erst einige Zeit nach der Reizung und dauert länger als die Reizung. Was aber das Herz auszeichnet ist, dass ein vorübergehender Reiz nicht eine anhaltende Zusammenziehung des Herzens wie des Darmes hervorbringt, sondern die ganze Reihe der folgenden Pulsationen verändert. Wenn das Herz eines Thieres lange Zeit alle 4—5 Secunden geschlagen hat, so schlagt es nach Anwendung eines vorübergehenden Reizes lange Zeit nach einer andern Periode, z. B. alle Secunden oder alle zwei Secunden, und wenn es ganz zu schlagen aufgehört hat, so bewirkt ein vorübergehender Reiz, dass es nicht Ein Mal, sondern viele Mal in einer gewissen Periode sich zusammenzieht. Es ist also hier durchaus wie bei anderen musculösen Theilen, die vom N. sympathicus abhängig sind, z. B. dem Darm, mit dem Unterschied, dass die anhaltende Reaction auf vorübergehende Reize beim Darm, Ductus choledochus, Sphincter vesicae sich nicht in

Digitized by Google

periodische Zuckungen theilt, sondern zusammenhängend ist, beim Herzen dagegen sich auf periodische Zuckungen vertheilt, und darin die Perioden verändert. Dasselbe hat statt, wenn man die Reize nicht auf die Muskeln selbst, sondern auf den N. sympathicus anwendet. Als man bei einem geöffneten Thiere, nachdem die Pulsationen des Herzens langsamer geworden, den N. cardiacus magnus galvanisirte, so wurden die Pulsationen schneller, aber dieser neue Typus der Pulsationen dauerte über die Reizung fort. Diess haben A. v. Humboldt und Burdach beobachtet. Als ich den N. splanchnicus in dem erwähnten Versuche beim Kaninchen reizte, dauerte die schnelle und stärkere Bewegung aller Gedärme sehr lange Zeit fort, nachdem die Reizung nur vorübergehend war.

VII. Die letzte Ursache der unwillkührlichen Bewegungen und die Ursache ihres Typus liegt weder in dem Gehirn noch Rückenmark, sondern in dem N. sympathicus selbst; aber diese Bewegungen behalten ihren Character, auch ohne den Einfluss der Ganglien, selbst wenn der N. sympathicus an einem Organe bis auf die in dem Organe selbst sich verbreitenden Zweige entfernt ist, deren Wechselwirkung mit den Muskelfasern allein zur Unterhaltung jener Bewegungen hinzureichen scheint. Bekanntlich zieht sich das Herz eines Thieres auch ausgeschnitten und blutleer immer noch rhythmisch zusammen; diese Bewegungen dauern am ausgeschnittenen Froschherzen noch Stundenlang; woraus allein hervorgeht, dass die Ursache dieses Rhythmus nicht in dem abwechselnden Ein- und Ausströmen des Blutes gelegen seyn kann, sondern dass sie in dem Organe selbst liegt. Da nun in allen anderen beweglichen Theilen die Bewegung des Muskels immer von der Innervation desselben abhängt, auch die Bewegkraft der Muskeln nach meinen und Sticker's Versuchen mit der Reizbarkeit der Nerven verloren geht (p. 639.), so folgt, dass die letzte Ursache des Rhythmus, der rhythmischen Bewegungen der Herzkammern und Vorhöfe, und der abwechselnden peristaltischen Bewegungen der Gedärme, von der Wechselwirkung der sympathischen Nerven und der musculösen Theile, und von einer periodisch wirkenden Ausströmung des Nervenprincips in dem N. sympathicus abhängt. Man könnte sich auch die Wirkung der Nerven hierbei perennirend, die Reaction der Muskeln aber periodisch vorstellen, insofern die Reizbarkeit der Muskeln für den Strom des Nervenprincips durch ihre Zusammenziehung verändert würde (vergl. p. 52.); allein diese Erklärung würde gewiss unrichtig seyn; denn man sieht nicht ein, warum das Herz seine Empfänglichkeit für einen perennirenden Strom des Nervenprincips jeden Augenblick verlieren und wieder gewinnen soll, da doch die willkührlichen Muskeln diese Reizbarkeit bei einer sehr lange dauernden Bewegung so lange für den continuirlichen Strom behalten.

Daraus, dass abgeschnittene, unwillkührlich bewegliche Theile, wie Herz, Darmkanal, den Typus ihrer rhythmischen oder peristaltischen Bewegung fortsetzen, sieht man deutlich, dass dieser Typus vom Gehirn und Rückenmark unabhängig ist, und wir haben so eben bewiesen, dass er in dem N. sympathicus selbst

Digitized by Google

liegt. Nun liegt uns ob, den zweiten Theil des oben aufgestellten Satzes zu beweisen, dass die Stammtheile des N. sympathicus und die Ganglien zur Erhaltung dieses Typus auch nicht nöthig sind, sondern dass auch die letzten Verzweigungen des N. sympathicus noch die Fähigkeit haben, diesen Typus der unwillkührlichen Bewegungen zu reguliren. Es ist gar nicht nöthig, dass die Stämme der N. cardiaci zur Unterhaltung der Bewegungen des Herzens vorhanden seyen; das Herz des Frosches schlägt noch periodisch fort, selbst wenn man die ganze Basis, die Vorhöfe bis auf die Kammer abgeschnitten hat. Eben so dauern die peristaltischen Bewegungen des Darmkanals nicht allein fort, wenn man den Darm mit sammt dem Mesenterium und den gangliösen Nervenplexus von dem Rumpfe trennt, sondern auch, wenn man den Darm selbst von diesem Plexus isolirt, indem man ihn dicht an der Insertion des Mesenteriums abschneidet. In diesem Falle sind nur die peripherischen inneren Verzweigungen des N. sympathicus an dem Herzen und Darm noch übrig, und dennoch bewegen sich diese Organe mit ihrem gewöhnlichen Typus geraume Zeit fort.

VIII. So gewiss indess nach diesen Beobachtungen die äussersten und kleinsten Theile des N. sympathicus die Bewegungen der unwillkührlichen Theile noch regulirex können, so haben doch sowohl das Gehirn und Rückenmark, als die Ganglien selbst im gereizten Zustande den grössten Einfluss auf den Modus dieser Bewegungen; so lange die Organe noch durch Nervenverbindung mit jenen zusammenhängen. Gehirn und Rückenmark sind aber als die letzten Quellen auch der Thätigkeit des N. sympathicus anzusehen, wenn diese sich nicht erschöpfen soll. Denn bekanntlich verändert sich der Herzschlag bei jeder Leidenschaft, und die Bewegungen des Darmkanals werden bei Irritation des Rückenmarks ebenfalls verändert; auch sind die Centralorgane des Nervensystems für die unwillkührlich beweglichen Theile als für die Dauer nothwendige Quellen des Nervenprincips anzusehen; indem bei Lähmungen des Rückenmarkes auch die Beweglichkeit des Darmkanals abnimmt, und Trägheit desselben eintritt. Aber auch die Reizung der Ganglien selbst wirkt auf alle von ihnen aus zu den unwillkührlich beweglichen Theilen hingehenden Nerven, wie folgende Versuche beweisen. Ich habe schon oben erwähnt, dass ich durch Galvanisiren des durchschnittenen N. splanchnicus eines Kaninchens an dem zum Ganglion coeliacum gehenden Stück, welches auf einer Glasplatte lag, vermehrte Bewegung des ganzen Darmkanals hervorbrachte. Diesem Versuch könnte man den Vorwurf machen, dass das galvanische Fluidum von 65 Plattenpaaren viel zu stark war, und dass er deswegen durch die thierischen Theile als durch blosse nasse Leiter bis auf den Darm selbst überspringen konnte, so dass man nicht viel mehr gethan, als wenn man den Darm selbst galvanisirt hätte. Indessen habe ich andere Versuche angestellt, welche ganz entscheidende Resultate gaben. Ich legte bei einem Kaninchen den ganzen Darmkanal bloss, und zu gleicher Zeit das Ganglion coeliacum. Sobald der Darmkanal eines Thieres der atmosphärischen

Digitized by Google

Luft ausgesetzt ist, werden seine Bewegungen sehr lebhaft; diess dauert eine ganze Zeit, allmählig nehmen sie wieder ab, bis sie ganz schwach werden. Diesen Moment wartete ich ab. Ich betupfte dann das Ganglion coeliacum mit einem Stückchen Kali causticum, worauf sogleich die peristaltischen Bewegungen des Darmkanals wieder lebhaft wurden. Dieser Versuch gab mir bei Wiederholung dasselbe ganz unzweideutige Resultat. Also sind die Ganglien fähig, im Zustande der Reizung das Nervenprincip bis zu den feinsten Verbreitungen des N. sympathicus in beweglichen Theilen in Thätigkeit zu setzen; obgleich die Thätigkeit dieser Theile im Allgemeinen fortdauert, wenn die Ganglien entfernt sind.

IX. Aus den bisherigen Thatsachen geht hervor, dass der N. sympathicus durch die Centraltheile des Nervensystems, Gehirn und Rückenmark, als Quellen des Nervenprincips gleichsam geladen werden kann, dass er aber, einmal geladen, seine Ladung mit dem Nervenprincip behält, und fortführt, dasselbe nach seiner gewöhnlichen Thätigkeit auszuströmen, auch wenn die fernere Ladung vermindert würde, und erst von einer gewissen Zeit an sich kräftiger erneuerte. Woraus ein Theil der Phänomene des Schlafs erklärlich wird. Während das Sensorium commune im Schlafe grossentheils unthätig wird, fährt die Bewegung des Herzens, Darmkanals wenig oder gar nicht verändert fort. Denn die von dem N. sympathicus abhängigen Theile sind von einer theilweisen und vorübergehenden Ruhe des Sensoriums nicht abhängig, so lange sie noch gleichsam mit Nervenprincip geladen sind. Im Gegentheil scheint sich die Ausstrahlung des Nervenprincips von den Centraltheilen her dem sympathischen Theile des Nervensystems um so mehr zuzuwenden, als die Verwendung desselben für die Thätigkeit der Sinne und der Seelenoperationen während des Schlafes aufhört. Auch in der Ohnmacht wird zwar die Thätigkeit des Herzens geschwächt, aber sie erhält sich in viel höherem Grade, als die aller von Cerebrospinalnerven versehenen Theile. Hier zeigt sich also etwas, was sich noch an dem ausgeschnittenen Herzen und Darm, nur geringer, eine Zeit lang offenbart. Verliert aber das Gehirn und Rückenmark zu sehr die Fähigkeit, Quelle des Nervenprincips zu seyn, ist keine Erholung in grösseren Zwischenräumen mehr möglich, so kömmt auch das sympathische System in den Fall, in welchen das System der Cerebrospinalnerven täglich einmal, nämlich im Schlafe, verfällt; dann entsteht eine Erschöpfung, welche gleichsam nicht durch fernere Ladung mehr ausgeglichen werden kann; so entsteht jener, den Tod verkündende, häufige, schwache, kaum fühlbare Puls, am Ende der acuten Krankheiten. Vergl. Wilson Philip *Philos. transact.* 1833. 1. Muellers *Archiv für Anat. und Physiol.* 1834. 137.

X. Die örtliche Application der Narcotica auf den N. sympathicus wirkt nicht narcotisirend in die Ferne auf die unwillkührlich beweglichen Organe; aber die letzteren können durch die Narcotisation der feinsten, in ihnen selbst sich verbreitenden Fasern des N. sympathicus paralysirt werden. Diess Verhältniss ist ganz wie bei den übrigen oder Cerebrospinalnerven, indem die örtliche Appli-

Digitized by Google

cation eines Narcoticums hier gerade so weit, und nicht weiter wirkt, als es den Nerven berührt, wo es die Reizbarkeit desselben aufhebt. Indessen zeigt sich doch hier, und zwar bei dem Herzen, noch ein ganz merkwürdiges und bis jetzt nicht erklärliches Verhältniss zwischen der äussern und innern Oberfläche des Organes. Applicirt man nämlich ein Narcoticum, wie Opium purum oder Extractum nucis vomicae, auf die äussere Oberfläche des Herzens, so scheint diess sehr wenig oder gar nicht, wenigstens erst sehr allmählig zu wirken; die rhythmischen Bewegungen des ausgeschnittenen Froschherzens dauern darauf sehr lange fort; bringt man aber ein wenig Opium oder Extractum nucis vomicae mit der innern Wand der Herzkammer in Berührung, so steht das Herz sogleich für immer still, öfter schon nach einigen Secunden. Diess ist eine von Henry (*Edinb. med. and surg. Journal.* 1832.) entdeckte Thatsache, welche ich öfter am Froschherzen bestätigt habe. Diese Thatsache ist auch ein neuer Beweis, dass die Bewegungskraft der Muskeln von ihrer Wechselwirkung mit den Nerven abhängt, und ihnen ohne die Nerven nicht eigen ist. Wir haben hier den Fall, dass wir die Muskelkraft der oberflächlichen Schichten des Herzens durch Narcotica nicht leicht paralysiren können, während wir durch Application des Giftes von innen mit den inneren Muskelschichten auch die äusseren tödten; eine Wechselwirkung, welche nicht von den Muskelfasern selbst, sondern von den Nervenfasern ableitbar ist. Diese schnelle Wirkung des narcotischen Giftes ist auch nicht davon erklärbar, dass das Gift von innen schnell durch die Wände des Herzens durchdringe. Denn wenn man die Vorhöfe des Froschherzens ganz abgeschnitten, wie ich that, und nun in die offene Kammer ein wenig Gift bringt, so muss dasselbe bei der nächsten Zusammenziehung eher ausgetrieben werden als tiefer eindringen, was ohnehin nicht durch Gefässe geschehen kann. Uebrigens erklärt jene merkwürdige Beobachtung wohl auch die Schnelligkeit der narkotischen Vergiftung, wenn ein Gift einmal mit dem Blute bis zum Herzen gekommen ist.

XI. Die Gesetze der Reflexion, welche im III. Capitel von den Cerebrospinalnerven aufgestellt wurden, gelten auch von den sympathischen Nerven, d. h. heftige Empfindungseindrücke in den, vom N. sympathicus versehenen Theilen können, auf das Rückenmark verpflanzt, Bewegungen in den von Cerebrospinalnerven versehenen Theilen hervorbringen. So entstehen die Zuckungen bei Reizungen im Darmkanal der Kinder, indem die Reizung von dem N. sympathicus auf das Rückenmark, und von diesem auf die Cerebrospinalnerven reflectirt wird. Es gehören ebenfalls hieher die das Erbrechen begleitenden Krämpfe der Athemmuskeln, sofern das Erbrechen von Reizen im Darmkanal in den Nieren, im Uterus u. s. w. erregt wird. Dieselbe Entstehung haben alle krampfhaften Zufälle, welche ihre Ursache in örtlichen Fehlern der Organe des Unterleibes haben. Es lässt sich aber auch diese Reflexion durch Versuche erweisen. Ich habe nämlich beim Kaninchen schon mehrmals beobachtet, dass man durch Zerrung des mit der Pincette aufgehobenen N. splanchnicus mit der Na-

Digitized by Google

del, reflectirte Zuckungen der Bauchmuskeln derselben Seite bewirken kann. Ein Versuch, der mir wiederholt beim Kaninchen, nicht aber beim Hunde gelang. Volkmann beobachtete an geköpften Fröschen ausgebreitete Reflexbewegungen am Rumpfe, nach Reizung der Eingeweide.

XII. Die Reflexion von Empfindungseindrücken in den vom N. sympathicus versehenen Theilen auf Rückenmark und Gehirn, und von dort auf die motorische Thätigkeit des N. sympathicus, findet auch statt, allein in einem geringeren Grade, als bei den Cerebrospinalnerven. Ein Beispiel davon ist der Harndrang, die Nothwendigkeit, öfter Harn zu lassen, oder die Zusammenziehungen der Harnblase von scharfen Eigenschaften des Harns; denn hier wirkt die Schärfe nicht auf die Muskelfasern der Harnblase, sondern zunächst nur auf die Empfindungsnerven der Schleimhaut. Es gehört ferner hieher die Veränderung der Weite der Pupille bei verschiedenen Krankheitszuständen des Darmkanals, die Veränderung des Herzschlages bei Krankheiten der Unterleibsorgane. Man hat alle diese Phänomene auch aus einer sympathischen Wirkung des N. sympathicus selbst, ohne Antheil des Gehirns und Rückenmarks erklärt; da jedoch alle ähnlichen Erscheinungen an dem Cerebrospinal-Nervensystem zur Vermittelung der sensoriellen und reflectirten motorischen Wirkung die Centralorgane, Gehirn und Rückenmark, nöthig haben, so ist es vor der Hand wahrscheinlicher, dass das Gehirn und Rückenmark auch bei den Reflexionserscheinungen in den vom N. sympathicus versehenen Theilen die Vermittelung zwischen der sensoriellen-centripetalen und motorischen-centrifugalen Wirkung bilden. Vergleicht man die Reflexionserscheinungen in den Cerebrospinalnerven mit denen, bei welchen die ursprüngliche und reflectirte Erregung in den vom N. sympathicus versehenen Theilen stattfindet, so zeigt sich, dass sie in den ersteren viel lebhafter und leichter eintreten, als in den letzteren. Denn wie häufig, schnell und leicht sind diese Erfolge beim Husten, Niesen, Erbrechen u. s. w., wie gross die Zahl der hieher gehörigen, oben erläuterten Erscheinungen gegen die Reflexionserscheinungen im N. sympathicus. Auch der Umstand, dass Darmentzündungen nicht so leicht und stark, als Entzündungen anderer mit Cerebrospinalnerven versehener Theile den Puls, d. h. Herzschlag verändern, scheint dafür zu sprechen, dass die Reflexion vom sympathischen Nerven zum Rückenmark, und wieder zum sympathischen Nerven schwerer ist, als die ähnliche Reflexion beim Cerebrospinal-Nervensystem, oder die erstere Thatsache wird durch die letztere erläutert. Versuche über diesen Gegenstand lassen sich schwer anstellen, und diejenigen, welche ich angestellt habe, zeigen wenigstens keine besondere Neigung der vom N. sympathicus versehenen Theile zur sensoriell motorischen Reflexion im N. sympathicus selbst. Ich legte den Darmkanal eines lebenden Kaninchens bloss, und erregte, indem ich um eine Stelle des Dünndarms eine feste Ligatur anlegte, eine heftige sensorielle Erregung, worauf ich den Darm wieder in die Unterleibshöhle zurückbrachte. Ich wollte nun sehen, ob diess Ur-

Digitized by Google

sache würde, dass durch Reflexion vom Rückenmark nach der Umgegend jener Stelle hin, eine enge Zusammenziehung des Darms zu beiden Seiten der Ligatur bis in einige Entfernung hin erfolge. Diess geschah aber nicht, auch nicht, als ich diesen Versuch wiederholte. Volkmann's Versuche zeigen aber, dass wenn ein geköpfter Frosch sich in der allgemeinen Disposition zur Reflexion befindet, auch in der genannten Weise eine Reaction eintritt. Reizung des Darmkanals durch Kneipen bewirkte in diesem Falle Zusammenziehung des Darms nicht bloss an der gereizten Stelle, sondern die Contraction verbreitete sich von der gereizten Stelle aus weiter, bald aufwärts, bald abwärts am Damm, über eine mehr oder weniger lange Strecke. Ist das Rückenmark zerstört, so erregt Kneipen der Därme allerdings nur locale Zusammenziehungen.

XIII. Auch die Reflexion von Wirkungen, die von den Cerebrospinalnerven ausgehen, auf das Rückenmark verpflanzt, von dort auf das sympathische Nervensystem reflectirt werden, ist eine ziemlich häufige Erscheinung. Als Beispiele solcher Wirkungen kann man hier anführen, die bei heftigen wollüstigen oder schmerzhaften Empfindungen der Haut entstehende Veränderung des Herzschlages; die Bewegung der Iris von Empfindungseindrücken durch den Sehnerven, Gehörnerven, N. trigeminus, wovon das Nähere p. 728. angeführt worden; die Zusammenziehung der Samenbläschen von Reizung der Gefühlsnerven der Ruthe.

XIV. Es entsteht nun die Frage: *Ob in dem N. sympathicus, vermöge der Ganglien, nicht auch unabhängig vom Gehirn und Rückenmark Reflexionserscheinungen möglich sind.* Diese interessante Frage lässt sich jetzt noch nicht bestimmt beantworten. Wäre diese Art von Reflexion möglich, so würden die sympathischen Nerven von den Cerebrospinalnerven eine merkwürdige Ausnahme machen, und durch die gangliöse Natur jener Nerven wäre eine Wechselwirkung der sensoriellen und motorischen Fasern möglich, die bei den Cerebrospinalnerven ohne Vermittelung des Gehirns und Rückenmarks niemals stattfindet. Bei den von Cerebrospinalnerven versehenen Muskeln eines vom Rumpfe getrennten Gliedes, zuckt von dem gereizten Muskel jedesmal nur der eben gereizte Theil desselben, und nicht der ganze Muskel und nicht eine Muskelfaser in ihrer ganzen Länge. Die Frage ist also die, ob man z. B. an einem, mit dem Mesenterium und den gangliösen Plexus ausgeschnittenen Darmkanal eines lebenden Thieres durch Reizung einer einzelnen Stelle Zusammenziehungen in einigem Umfange, Zusammenziehung eines ganzen Darmstückes hervorbringen kann. Diess ist aber nicht möglich. Jedesmal zieht sich nur der gereizte Theil des Darms zusammen; ja es verbreitet sich eine, durch Quetschung mit der Pincette an einem Punhte des Darms angebrachte Reizung, nicht einmal cirkelförmig, wie ein Ring um das ganze Rohr, sondern es entsteht eine ganz beschränkte Einziehung der Darmwand an jenem Punkte, während die entgegengesetzte Stelle der Darmwand ganz platt und ruhig bleibt. Diess habe ich nicht allein am Darmkanal wiederholt gesehen, sondern auch am Uterus eines trächtigen

Digitized by Google

Kaninchens in gleicher Art beobachtet. Jedesmal entstand an der gereizten Stelle des Uterus eine kleine harte Zusammenziehung der nächsten Muskelfasern gegen den einen Punkt hin, aber der ganze übrige Uterus blieb ruhig. Volkmann hat diese Versuche an Fröschen wiederholt und dasselbe Resultat erhalten. Daher spricht er den Ganglien die Fähigkeit zur Vermittelung der Reflexionserscheinungen ebenfalls ab. Er stützt sich besonders auf die an geköpften Fröschen, die in der Disposition zur Reflexion waren, angestellten Versuche. War das Rückenmark noch vorhanden, so bewirkte das Kneipen des Darms an einer Stelle ausgebreitete Zusammenziehungen des Darms; war hingegen das Rückenmark zerstört, so war die Reaction auf die Stelle der Reizung beschränkt.

Beim Herzen ist die Sache weniger klar und es scheint, als wenn am ausgeschnittenen Herzen die Reizung einer einzigen Stelle sich auf das ganze Herz verbreiten könnte. Wenn man das Herz eines Frosches ausschneidet und auf dem Tische so lange liegen lässt, bis sich die Häufigkeit der Schläge sehr vermindert hat, und nur von Zeit zu Zeit eine Zusammenziehung eintritt, ist der Zeitpunkt gekommen, wo man Untersuchungen über die Reizbarkeit des Herzens anstellen kann. Reizt man dann das Herz mechanisch mit einer Nadel, so erregt man eine Zusammenziehung, die man nun nicht mehr mit den zum gewöhnlichen Rhythmus gehörenden Zusammenziehungen verwechselt. Es ist nun sehr merkwürdig, dass, wo man auch den mechanischen Reiz auf das Herz anbringe, die Reaction doch immer so ist, als ob man das ganze Herz gereizt hätte. Es erfolgt nämlich nicht eine Zuckung der gereizten Stelle des Herzens, sondern des ganzen Herzens. Es scheint daraus hervorzugehen, dass sich im Herzen die örtliche Veränderung der Reizbarkeit durch den Reiz mit dem Zustande der Reizbarkeit des ganzen Herzens ins Gleichgewicht setzt, so dass man von jedem Punkte des Herzens gleichsam die Statik in der Vertheilung der Kräfte des Herzens verändern kann. Wie man diese Erscheinung zu betrachten habe, ist noch nicht ganz klar. Ganglien konnen daran jedenfalls keinen Antheil haben, da das Phänomen auch an dem ganz isolirten Herzen eintritt. Vielleicht wirkt die Erschütterung zur Mittheilung der Bewegung mit.

XV. Es ist noch ganz unbekannt, ob der N. sympathicus sympathische Bewegungen von der Reizung eines Organes aus in einem andern hervorrufen kann; weil sich nämlich alle hieher gehörigen Erscheinungen auch durch die Vermittelung des Gehirns und Rückenmarkes, oder durch das im 3. Capitel erläuterte Phänomen der Reflexion erklären lassen.

XVI. Es ist nicht erwiesen, und mehrere Beobachtungen sprechen dagegen, dass die Ganglien als Isolatoren im Stande sind, den vom Gehirn und Rückenmark ausgehenden motorischen Einfluss zu hemmen. Ich bemerke, dass hier nicht von willkührlichem, sondern von motorischem Einfluss im Allgemeinen die Rede ist. Jeder weiss, wie leicht und schnell eine Veränderung in den Centralorganen des Nervensystems auf das ganze sympathische System

Digitized by Google

wirkt, wie schnell eine leidenschaftliche Aufregung den Schlag des Herzens umändert, Bewegungen des Darmkanals mit Kollern hervorruft; wie ein Nervenanfall, bei dem die Centralorgane des Nervensystems afficirt waren, mit Kollern im Darmkanal endigt. Wir werden später sehen, dass die Ganglien auch keine Isolatoren für retrograde oder centripetale Wirkungen im N. sympathicus sind. Nur diess zeigt sich überall, dass der motorische Einfluss der Centralorgane des Nervensystems auf den sympathischen Nerven wirkend, nicht jene schnellen, der Dauer des Reizes entsprechenden Zuckungen hervorbringen kann, wie bei den Wirkungen auf die Cerebrospinalnerven, sondern, dass durch den motorischen Einfluss des Gehirns und Rückenmarkes mehr nur der Zustand, der Modus einer anhaltenden Reihe von Bewegungen verändert wird. Indessen besitzen doch nicht bloss die Ganglien, sondern der ganze N. sympathicus, auch die feineren Nervenzweige desselben die Fähigkeit, schnelle Einwirkungen auf die dem N. sympathicus unterworfenen Theile so zu modificiren, dass nicht Zuckungen, sondern länger dauernde Veränderungen des Modus der Bewegung eintreten, wie oben bewiesen worden. Denn an dem abgeschnittenen ermatteten Herzen kann man durch einen momentanen Reiz auf eine geraume Zeit die Art des Herzschlages verändern, und der abgeschnittene Darm zieht sich auf angebrachten Reiz viel länger, als dieser dauert, zusammen, und erreicht den höchsten Grad der Contraction erst lange nachdem ein momentan wirkender Reiz aufgehört hat.

XVII. Es ist nicht entschieden, dass die Hemmung des Willeneinflusses auf die vom N. sympathicus versehenen Theile, von der Natur der Ganglien abhängt. Dieser Satz bedarf keines weitern Beweises, da uns keine hinreichenden Gründe für die erste Ansicht bekannt sind. Ich muss jedoch bemerken, dass es im Allgemeinen viel wahrscheinlicher ist, dass die Ganglien nicht die Ursache der Isolation des Willenseinflusses sind. Denn da sie, wie vorher bewiesen wurde, den motorischen Einfluss auf das sympathische System nicht isoliren, sondern das ganze sympathische System (nicht bloss die Ganglien) diesen Einfluss allmähliger und dauernder wirkend macht, so könnte ein vom Willen ausgehender motorischer Einfluss der Centralorgane auf den N. sympathicus so gut, wie aller motorischer Einfluss kein absolutes Hinderniss in den Ganglien des N. sympathicus finden. Es scheint daher, dass die Unfähigkeit zu willkührlichen Bewegungen in allen vom N. sympathicus versehenen Theilen nicht von dem N. sympathicus und den Ganglien abhängt, sondern dadurch bedingt ist, dass die Fasern des N. sympathicus im Rückenmark und Gehirn nicht, wie die Fasern anderer Nerven, bis zu der Quelle des Willenseinflusses gelangen. Die dem N. sympathicus unterworfenen Theile gleichen daher in Hinsicht des Mangels der Willensbestimmung einigermassen den für den Willen gelähmten, willkührlich beweglichen Theilen. Hier kann die Leitung des durch den Willen bewirkten motorischen Stromes zu dem Nerven an einer Stelle im Laufe des Rückenmarkes gehemmt seyn, gleichwohl bleibt dieser Nerve noch für unwillkühr-

Digitized by Google

liche motorische Einflüsse von dem unter der Verletzung liegenden Theile des Rückenmarkes empfänglich.

XVIII. In gewissen, von dem N. sympathicus und den Spinalnerven zugleich abhängigen Theilen scheint ein willkührlicher Einfluss erst nach einer lange dauernden centripetalen oder sensoriellen Einwirkung stattzufinden. So ist es mit der Harnblase; diess ist ein in Hinsicht seines Verhältnisses zum Gehirn und Rückenmark noch sehr räthselhaftes Organ. Es ist von rein sympathischen Zweigen des Plexus hypogastricus und von nicht sympathischen Nerven, nämlich Zweigen der Sacralnerven versehen. Es scheint in der Regel dem Einfluss des Willens ganz entzogen zu seyn; und doch können wir bei voller Urinblase durch eine blosse intendirte Zusammenziehung der Harnblase, ohne die Mitwirkung des Zwerchfelles und der Bauchmuskeln, den Harn austreiben. Auch E. H. Weber (*Anatamie* 3. *p.* 354.) nimmt einigen Einfluss des Willens auf die Urinblase an. Wenn diess nun so sich verhält, so tritt jene Fähigkeit doch erst nach einer langen Ansammlung des Urins in der Harnblase ein; also nachdem diese Flüssigkeit einen dauernden Empfindungseindruck auf die Empfindungsnerven der Blase, und so auf das Rückenmark gemacht hat.

XIX. Manche dem N. sympathicus unterworfene Theile sind zwar nur unwillkührlich beweglich, gerathen aber in Mitbewegung (*p.* 692.)*, wenn willkührlich bewegliche Theile bewegt werden, so dass von dem willkührlich motorischen Einfluss etwas auf sie gegen den Willen überspringt, gerade so, wie wenn dem Willen unterworfene Theile gegen unsern Willen mit andern mitbewegt werden.* Ein Beispiel dieser Art liefert die Iris. Von diesem Theile ist es schwer zu sagen, ob er wirklich zu den von dem N. sympathicus oder von den Cerebralnerven abhängigen Theilen gehöre. Seine Bewegung ist unwillkührlich, gleicht aber doch den Bewegungen mehrerer schwachen willkührlichen Muskeln, die in der Regel allein nicht willkührlich bewegt werden können, wohl aber durch Mitbewegung mit anderen willkührlichen Muskeln sich zusammenziehen können, wie die Ohrmuskeln bei mehreren Menschen, wie bei mir, mit dem Musc. epicranius bewegt werden können, und manche Menschen den sonst dem Willen entzogenen Cremaster mit Anziehung der Bauchmuskeln bewegen können. Nun ist es äusserst merkwürdig, dass man die Iris willkührlich mitbewegen kann, wenn man gewisse Aeste des N. oculomotorius willkührlich in Thätigkeit setzt, wie z. B. jedesmal, wenn man das Auge nach innen oder nach oben und innen dreht; denn dann wird die Iris bei allen Menschen zusammengezogen oder die Pupille enge. Man hat also hier das merkwürdige Beispiel, dass mit der willkührlichen Intention in einem Cerebrospinalnerven zugleich scheinbar willkührlich etwas auf einen dem N. sympathicus unterworfenen, sonst unwillkührlichen Theil überspringt. Vielleicht gehört es auch hieher, dass man bei einem grossen Bedürfniss zum Harnlassen durch Thätigkeit der Muskeln der unteren Extremitäten beim Gehen oder Laufen den Harn länger zurückbehalten, also die Thätigkeit des Musculus sphincter vesicae verstärken kann. Endlich scheint ein solches Uebergehen des Nervenein-

Digitized by Google

flusses selbst auf das Herz bei starken Muskelanstrengungen stattzufinden.

Das merkwürdige Phänomen der beschleunigten Herzbewegung bei willkührlichen Anstrengungen hat noch gar keine hinreichende Erklärung gefunden. Man hat gesagt, bei Anstrengungen wird eine grössere Menge arteriellen Blutes gebraucht, deswegen muss das Herz das Blut schneller durch die Lungen treiben; aber aus einem grössern Athembedürfniss folgt deswegen nicht, dass das Herz diesem Zwecke gemäss bewegt werde. Man hat jenes Phänomen ferner aus der Störung des Blutlaufes durch die Lungen und durch das Herz, vermöge der Hemmungen des Kreislaufes erklärt; indessen tritt die beschleunigte Herzbewegung auch bei Anstrengungen der blossen unteren Extremitäten, beim Bergsteigen, Laufen, ein. In diesem Falle sieht man nicht ein, wie der Lauf des Blutes durch die Lungen und das Herz verhindert seyn sollte. Denn wenn auch wegen der beständigen Zusammenziehungen der Muskeln der unteren Extremitäten der Lauf des Blutes durch die unteren Extremitäten gehemmt wird, so wird er deswegen nicht in den Lungen und dem Herzen gehemmt; sondern das Blut, welches nun nicht die kleinen Gefässe der unteren Extremitäten durchgehen kann, kömmt auch nicht zum Herzen zurück, und wird sich also nicht in den Lungen und im Herzen anhäufen. Der Erfolg muss vielmehr derselbe seyn, wie wenn man sich in aller Ruhe um beide Oberschenkel ein Tourniquet legt und die Blutbewegung in den unteren Extremität hemmt, worauf keine beschleunigte Herzbewegung eintritt. Es wäre daher wohl möglich, dass diese so gewöhnliche beschleunigte Herzbewegung bei Anstrengungen, die bei nervenschwachen Menschen so stark wird, eine zwar unmerkliche, aber zuletzt immer stärker hervortretende Mitbewegung wäre, ein Ueberspringen des Nervenprincips von dem in so grosser Kraftanstrengung begriffenen Rückenmark auf die sympathischen Nerven, gleichwie die Iris sich unwillkührlich bei willkührlicher Anstrengung des N. oculomotorius mitbewegt. Da diese Erklärung indess nicht direct als richtig erwiesen werden kann, und nur an analoge wirkliche Facta sich anschliesst, so kann sie vor der Hand nur als eine Andeutung für fernere Untersuchungen in diesem dunkeln Felde hingestellt werden.

Viel deutlicher ist die Mitbewegung eines andern unwillkührlich beweglichen Organes bei willkührlichen Bewegungen, nämlich der Samenbläschen. Es ist schon mehrseitig bemerkt worden, dass wenn reizbare Knaben sehr grosse Muskelanstrengungen beim Klettern oder Heraufziehen an einem Seile machen, zuweilen eine spontane Irritation in den Genitalien bis zur Contraction der Samenbläschen eintritt.

XX. *Die von dem Nervus sympathicus versehenen Bewegungsorgane haben einen peristaltischen Typus ihrer Bewegung. Diese schreitet nämlich in einer gewissen Richtung fort, und die Ursachen dieser Bahn liegen nicht bloss im Gehirn und Rückenmark, sondern auch in den Nerven dieser Organe selbst.* Die Ursachen der regelmässigen Succession in den Wirkungen der sympathischen Nerven

Digitized by Google

sind völlig unbekannt. Die peristaltischen Bewegungen des Darms von vorn nach hinten sind bekannt. Sie folgen sich wie Wellen von vorn nach hinten, ehe eine Welle im ganzen Darme abgelaufen ist, hat schon wieder eine begonnen, die ihr in einiger Entfernung folgt. Diese Erscheinung ist nicht auf den Darm isolirt, auch der Ductus choledochus zieht sich wurmförmig successiv zusammen, und selbst am Herzen ist die Succession offenbar. Am Herzen des bebrüteten Hühnchens läuft die Bewegung wie eine Welle von hinten nach vorn über das Herz hin, oder ist peristaltisch. Selbst das Herz des Erwachsenen zeigt noch die Succession der Bewegung als Andeutung des Peristaltischen. Am Herz des Frosches folgen die Bewegungen des contractilen Theils der Venenstämme der Vorhöfe, der Kammern, des Bulbus aortae in der Reihe, wie sie hier genannt sind.

Die Succession der Bewegung in diesen Theilen ist eines der schwierigsten Probleme der Physiologie, an welches man bisher nicht einmal gedacht hat.

Am nächsten liegt anzunehmen, dass die Ursache der Succession im Rückenmark selbst liege. Laufen hier Wellen oder Schwingungen von oben nach unten ab, so können die vom Rükkenmark entspringenden Fasern nach der Reihe die Wellen oder Schwingungen aufnehmen und eine Folge davon würde eine peristaltische Bewegung des Darms von vorn nach hinten seyn. Allein diese Erklärung ist gewiss nicht genügend, denn die Succession der Bewegung bleibt am ausgeschnittenen Herzen und Darm. Die Ursache der Succession muss daher in den Nerven dieser Theile selbst liegen. Die Fasern dieser Nerven liegen nebeneinander, wie kann es kommen, dass sie in einer gewissen Succession wirken. Hier könnte man sich zwar auf ungekannte spontane Wirkungen der Ganglien berufen; allein jene Organe zeigen die Succession der Bewegung auch, wenn sie von den Ganglien isolirt sind. Es ist gegenwärtig völlig unmöglich, eine nur einigermassen wahrscheinliche mechanische Erklärung jener merkwürdigen Erscheinungen aufzustellen. Nur wie eine der Mechanik genügende Erklärung aussehen würde, lässt sich im Allgemeinen andeuten. Eine Succession der Bewegung, die von Nervenfasern ausgeht, würde begreiflich seyn, wenn diese Fasern in der Länge des Darms entweder von vorn nach hinten lange fortlaufen, Wirkungen successive abgebend, oder peripherisch successiv Aestchen abschickend. In diesem Falle würden langsam fortschreitende Wellen von den Fasern aus successive Bewegung des Darms hervorbringen. Eine Succession der Ankunft von Wellen wird auch erlangt, wenn eine Bahn, die anfangs einfach ist, successiv Aeste abgiebt, die an Länge in einer bestimmten Richtung zunehmen, so dass z. B. die vorderen kurz sind und die hinteren immer länger werden. Nichts dieser Art ist von der Verbreitung der Nerven in den fraglichen Organen bekannt, und es kann die Sache auch nur in sofern hier berührt werden, dass die Wichtigkeit des Problems die Beschaffenheit einer genügenden Erklärung und die Unmöglichkeit sie beizubringen einleuchtet. Was die Schwierigkeit der Sache noch vermehrt, ist, dass in manchen

Digitized by Google

Fällen die Succession wechselt, wie bei den von mir bei Hirudo vulgaris (Meckel's *Archiv.* 1828.) und Lister (*Philos. transact.* 1834. *p.* 2.) an den Ascidien beschriebenen Phänomenen. Aehnliches kömmt schon am Magen bei dessen wechselnden Bewegungen im gesunden Zustande vor und krankhaft wird die peristaltische Bewegung sowohl am Darm, als am Herzen umgekehrt.

2. Von den sensoriellen Wirkungen des N. sympathicus.

I. Die Empfindungen in den vom N. sympathicus versehenen Theilen sind schwach, undeutlich und nicht umschrieben, und nur bei heftigen Reizungen deutlicher und bestimmter. Die hieher gehörigen Thatsachen sind schon oben p. 670. angeführt worden. Durch stärkere wiederholte Reizung wurde in Bragnet's Versuchen die Empfindung in den Ganglien, die anfangs fehlte, deutlicher. Vielleicht rührt die geringe und unbestimmte Empfindung von der geringen Zahl der sensoriellen Primitivfasern in den vom N. sympathicus versehenen Theilen her.

II. Die im N. sympathicus stattfindenden Empfindungseindrücke können unbewusst seyn, und kommen gleichwohl zum Rückenmark. Eine centripetale Wirkung eines Empfindungsnerven, zum Rükkenmark gelangend, kann bewusst oder unbewusst seyn; im ersten Falle muss sie mit Lebhaftigkeit bis zum Organe der Seele fortgepflanzt werden; im zweiten Falle bleibt die Wirkung auf das Rückenmark isolirt, sie wird nicht empfunden, kann sich aber durch andere Zeichen als bis zum Rückenmark gelangt erweisen, z. B. durch reflectirte Bewegungen. Ein Theil vom Rumpfe eines gefleckten Erdsalamanders ohne Kopf zeigt uns ein Beispiel von centripetaler Empfindungserregung, ohne wirkliche Empfindung; denn wenn wir die Haut dieses Rumpfstückes berühren, erfolgt eine Krümmung des Stückes durch Zusammenziehung der Muskeln, die durch eine Reflexion vom Rückenmarke entsteht, und nicht entstehen kann, wenn in dem Rumpfstücke kein Rückenmark enthalten ist. Solche Erscheinungen von centripetalen Wirkungen in Empfindungsfasern bis zum Rückenmark ohne wahre Empfindung, aber mit Reflexion der Wirkung auf die Muskeln sind nun auch in dem gesunden Leben häufig, und gerade im N. sympathicus die gewöhnlichen. Man kann deutlich beweisen, dass solche nicht bewusste Empfindungswirkungen im N. sympathicus dennoch zum Rückenmark gelangen. Durch jeden Reiz im Mastdarm kann die Bewegung des Sphincter ani verstärkt seyn, durch unempfundene Reize im Magen entsteht gleichwohl die beim Erbrechen stattfindende Mitaffection der Athemmuskeln. Diese Action der von Cerebrospinalnerven versehenen Athemmuskeln kann im Erbrechen durch einen unbewussten Empfindungsreiz in jedem Organe des Unterleibes, durch den Darmkanal, Leber, Nieren, Uterus angeregt werden. Hier liegt der Ausgang der Wirkung im N. sympathicus. Die Reflexion geschieht motorisch nach Cerebrospinalnerven, nicht nach dem N. sympathicus. Und nun lässt sich wieder beweisen,

Digitized by Google

dass das Bindeglied zwischen der centripetalen Wirkung des N. sympathicus und der motorischen in den Cerebrospinalnerven wirklich das Rückenmark, und nicht der N. sympathicus durch seine Nervenverbindungen ist. Denn der N. sympathicus verbindet sich zwar mit allen Spinalnerven, die beim Erbrechen thätig seyn können, aber diese Verbindung ist ein einfaches Anschliessen der Fasern des Ramus communicans nervi sympathici an die beiden Wurzeln des Spinalnerven; da nun die motorische Wurzel des Spinalnerven nicht einmal ein Ganglion hat, so fällt hier auch die Erklärung weg, dass die Wirkung des N. sympathicus vom Ramus communicans sich hier in einer gangliösen Masse vertheilen und alle durchgehenden Fasern der motorischen Wurzel mit afficiren könne. Die centripetale Wirkung im N. sympathicus, welche unbewusst und unempfunden eine reflectirte motorische in einem Cerebrospinalnerven hervorbringt, wirkt also offenbar auf diese Nerven nicht durch sympathische Verbindungen, sondern durch das Bindeglied des Rückenmarks.

III. Bei den Reflexionsbewegungen, die von Empfindungseindrücken des N. sympathicus angeregt werden, ist der Empfindungseindruck in der Regel unbewusst, während er bei den Reflexionsbewegungen, die durch Empfindungseindrücke der Cerebrospinalnerven angeregt werden, immer bewusst ist. So ist es wenigstens in der Mehrzahl der Fälle. Bei den von dem Magen, Darmkanal, Nieren, Leber, Uterus erregten Erbrechungsbewegungen der Rumpfathemmuskeln, wird die Ursache im Magen, Darm, Nieren, Uterus, Leber sehr häufig und in der Regel nicht empfunden; d. h. die nach dem Rückenmark und Gehirn gelangende centripetale Erregung kömmt nicht zum Bewusstseyn. Bei allen Reflexionsbewegungen von Cerebrospinalnerven aus wird dagegen die erregende Reizung deutlich empfunden. Auf eine Reizung der Schleimhaut des Kehlkopfes, der Luftröhre, der Lungen entsteht durch Reflexion eine Action in vielen Spinalnerven bei den das Husten begleitenden Bewegungen der Rumpfmuskeln; aber jener Reiz in der Schleimhaut bringt eine deutliche Empfindung hervor. Bei dem Erbrechen von Kitzel im Schlunde wird dieser deutlich empfunden. Bei den krampfhaften Athembewegungen mit Action der Spinalnerven im Niesen wird die erste Ursache der Reflexion in der Nase deutlich empfunden. Bei der Verengerung der Iris von Lichtreiz wird das Licht als Licht deutlich empfunden; eben so bei dem Niesen, welches durch Lichtreiz auf das Auge entsteht.

IV. Die Ganglien des N. sympathicus hemmen nicht die Fortleitung der centripetalen Wirkungen des N. sympathicus zum Rückenmark; sie sind keine Isolatoren für diese Wirkungen. Diess ergiebt sich aus den Thatsachen, welche in den vorherigen Sätzen angeführt worden sind; denn wenn, wie gezeigt wurde, bei den Reflexionen, wie beim Erbrechen von Reizen im N. sympathicus, eine Fortleitung zum Rückenmark, obgleich ohne Bewusstseyn, geschieht, so können die Ganglien nicht Isolatoren für diese Fortleitung seyn. Es lässt sich dieser Satz aber auch direct aus dem schon öfter angeführten Versuch beweisen, dass es mir mehrmal

Digitized by Google

gelungen ist, bei einem Kaninchen, dem die Bauchwandungen ganz durchschnitten waren, durch Zerrung des N. splanchnicus mit der Nadel eine in demselben Augenblicke erfolgende Zuckung der Bauchmuskeln hervorzubringen. Daraus geht hervor, dass die am Grenzstrange des N. sympathicus befindlichen Knoten, von welchen der N. splanchnicus entspringt, keine Isolatoren für centripetale Wirkungen im N. sympathicus nach dem Rückenmark seyn können. Und dasselbe beweisen die Versuche von Volkmann an geköpften Fröschen in Hinsicht der Unterleibsganglien. Denn durch Reizung des Darms und anderer vom Sympathicus versehener Theile wurden sehr ausgebreitete Reflexbewegungen am Rumpfe bewirkt.

V. Aus den vorher angeführten Thatsachen geht aber auch hervor, *dass die Ganglien nicht die Ursache der Bewusstlosigkeit der Reizungen in dem N. sympathicus seyn können.* Nach Brachet soll zwar die Empfindung in den Ganglia thoracica und ihren Verbindungsfäden schwach seyn oder fehlen, dagegen in den Rami communicantes der Ganglia mit den Spinalnerven deutlich seyn, und die Verletzung deutliche Schmerzensempfindung hervorbringen; diess lässt sich aber vor der Hand mit den vorher zergliederten Thatsachen nicht gut vereinigen. Denn es wurde unter II. bewiesen, dass die Reizungen des N. sympathicus eben so wie die der Cerebrospinalnerven, aber unbewusst, zum Rückenmark verpflanzt werden. Sollten daher die Ganglien bloss die Qualität, den Inhalt des Eindrucks bei einer centripetalen Leitung verändern, dass die Wirkung zwar fortgeleitet wird, aber das Qualitative des Schmerzes daran aufgehoben wird? Diese Fragen werden so abstract, dass man darauf nicht antworten kann. Auf das Bewusstwerden selbst können die Ganglien nicht influiren. In den Ganglien selbst kann die Ursache nicht liegen, dass bei den centripetalen Wirkungen im N. sympathicus durch die Ganglien hindurch das Bewusstseyn ausfällt; indem das Bewusste an einer Empfindungswirkung erst dadurch entsteht, dass diese Empfindungswirkung zum Organe der Seele gelangt. Es muss daher die Ursache, dass die Empfindungswirkungen des N. sympathicus, obgleich sie zum Rückenmark gelangen, doch nicht zum Bewusstseyn kommen, nicht in den Ganglien, sondern darin liegen, dass diese Wirkungen im Rückenmark selbst sich ausgleichen, und nicht bis zu der Quelle des Bewusstwerdens der Empfindungen fortgepflanzt werden. Bei den Cerebrospinalnerven gelangen die Empfindungswirkungen immer zur Quelle des Bewusstwerdens im Gehirn; wenn sie zuweilen nicht empfunden werden, so liegt die Ursache darin, dass die Seele ihre Intention auf Anderes gerichtet hat.

VI. In manchen Fällen erregen heftige Reizungen in den vom N. sympathicus versehenen Theilen, Empfindungen in diesen Theilen selbst; in anderen Fällen sind die Empfindungen von schwächeren Reizen in den afficirten Theilen, undeutliche, und deutliche Empfindungen in anderen, von Cerebrospinalnerven versehenen Theilen vorhanden. Beispiele der ersten Art zeigen uns die Entzündungen des Darmkanals, der Leber, Beispiele der zweiten Art die lebhaf-

Digitized by Google

ten juckenden Empfindungen, welche in Krankheiten des Darmkanals, wie in der Wurmsucht, an der Nase und am After, in chronischen Krankheiten der Nieren und Blase an der Eichel beobachtet worden sind, während der Sitz der Reizung oft gar nicht durch deutliche Empfindungen an dem Orte selbst sich kundgiebt. Es gehören eben so hieher die Schmerzen, die man bei Herzkrankheiten zuweilen in den oberen Extremitäten, bei Leberkrankheiten in der Schulter beobachtet hat. Diess sind Irradiationen, ganz ähnlich den früher p. 708. bei der Irradiation der Cerebrospinalnerven aufgeführten Erscheinungen.

VII. Diese secundären Empfindungen in Cerebrospinalnerven, nach Reizungen des N. sympathicus zeigen sich besonders an den Endtheilen der afficirten Apparate; so entsteht Jucken in der Nase bei Wurmreizen im Darmkanal, Afterjucken bei Wurmreizen im Dickdarm, Jucken und Schmerzen der Eichel bei Krankheiten der Nieren und Harnwege.

VIII. Eine Reflexionsfähigkeit der Ganglien bei sympathischen Empfindungen ist nicht bewiesen und mehrere Thatsachen sprechen dagegen. Diess zeigen theils schon die angeführten Versuche über den Antheil des Rückenmarks an den Reflexionserscheinungen theils noch besonders mehrere Versuche von Volkmann. Bei geköpften Fröschen, die in der Disposition zur Reflexion waren, konnte vom Darmkanal aus die Reflexion nach den Rumpfmuskeln bewirkt werden, und am Darm selbst traten ausgebreitete Wirkungen hervor; war aber das Rückenmark zerstört, so hörten alle jene Erscheinungen auf, und die Reaction war auch am Darm ganz local. Die Ganglien waren also nicht zur Verbreitung der Reizung fähig. Und daraus wird wahrscheinlich, dass sie es auch nicht bei der Irradiation der Empfindungen seyn werden.

Man erklärte die secundären Empfindungen in Cerebrospinalnerven gewöhnlich durch die Verbindungen des N. sympathicus mit Cerebrospinalnerven, und rechnete vorzugsweise auf die Ganglien der Empfindungswurzeln der Spinalnerven, durch welche die Primitivfasern der Wurzeln des N. sympathicus eben so gut, wie der Cerebrospinalnerven, durchgehen. Diese Erklärung verliert noch mehr an Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, dass diese Ganglien der Empfindungsnerven schon nicht die Mitempfindungen der Cerebrospinalnerven erklären können, indem oft Nerven in einander Mitempfindung erregen, die in keiner Verbindung stehen und selbst der Ganglien entbehren, wie z. B. die Mitempfindung des Kitzels in der Nase vom Sehen in die Sonne von keiner Nervenverbindung erklärt werden kann. Denn wenn auch Zweige des N. sympathicus vom Ganglion sphenopalatinum zum Ganglion ciliare, und Zweigelchen vom sympathischen Nerven an den Gefässen der Retina beobachtet worden sind, wie sie eigentlich an allen Gefässen vorkommen, so kennt man doch keine bestatigte Verbindung des N. opticus und des N. nasalis selbst. Eben so wenig lässt sich die Veränderung des Sehens, des Hörens bei Krankheiten der Unterleibsorgane durch eine solche Verbindung erklären, da sie hier eben so wenig existirt. Man denke

Digitized by Google

sich, dass der N. sympathicus wirklich einige Zweigelchen in die Retina selbst schicke, so liesse sich selbst daraus nicht einmal die Verbreitung einer Affection vom Darmkanal bis zur Retina mit Veränderung des Sehens erklären. Denn dazu müssten alle Fasern des Sehnerven durch eine gangliöse Masse durchgehen. Wir wissen aber, dass eine Reizung eines einzelnen Punktes in der Retina beschränkt bleibt; die Verbindung des N. sympathicus mit der Retina in einem einzigen Punkte würde also auch bloss möglicherweise eine Mitempfindung in diesem einzigen Punkte, und nicht eine allgemeine Veränderung des Sehens hervorbringen können. Wir stossen daher bei der Erklärung der secundären Empfindungen von dem N. sympathicus auf dieselben Schwierigkeiten, wie bei der Erklärung der Irradiation bei den Cerebrospinalnerven, und es ist wahrscheinlicher, dass alle Mitempfindungen in Cerebrospinalnerven, die vom N. sympathicus angeregt werden, auch erst durch Vermittelung des Rückenmarkes und Gehirnes entstehen. Dagegen scheint zwar auf den ersten Blick zu sprechen, dass in den vom N. sympathicus versehenen Theilen, da wo die Reizung ist, oft gar nichts, aber wohl in einem Rückenmarksnerven etwas empfunden wird; allein die centripetale Erregung in dem N. sympathicus kann sehr wohl zum Rückenmark gelangen, ohne dass sie als solche zum Bewusstseyn kömmt, und doch vom Rückenmark weiter Wirkungen hervorbringen, z. B. bewusste Empfindungen in andern Nerven erregen. Dass diess möglich ist, ist unter II. bewiesen worden.

Man sieht aus allem diesem, dass die Theorie dieser reflectirten Empfindungen vom N. sympathicus aus noch ganz im Dunkel und wenigstens sehr zweifelhaft ist.

3. Von den organischen Wirkungen des Nervus sympathicus.

Die Gesetze dieser Wirkungen sind uns am meisten unbekannt. Denn kaum erst sind wir zu dem Puncte gelangt anzuerkennen, dass eigene graue Nervenbündel oder organische Fasern überall, auch in den Cerebrospinalnerven selbst die Ursache der organischen Wirkungen der Nerven bei der Absonderung und Ernährung sind. Ist nun eine Bewegung oder Oscillation des Nervenfluidums in diesen Nerven nur in der Richtung von den Stämmen und Ganglien nach den Aesten (centrifugale Wirkung), oder auch umgekehrt möglich, oder wirkt das Nervenprincip in diesen Nerven nach allen Richtungen, so dass eine Nervenfaser eben so gut den belebenden Einfluss nach einer Drüse hin ausströmen kann, als eine reflectirende Wirkung nach anderen organischen Nerven von einer gereizten Drüse aus ausüben kann! Stehen die organischen Nerven durch ihre Communicationen so in Wechselwirkung, dass man von einer Stelle aus die Absonderung einer ganzen Fläche vermehren kann; oder ist bei allen solchen Reflexionen das Rückenmark als aufnehmendes und ausschickendes Bindeglied thätig? Die Thatsachen lassen sich auf beide Arten erklären; und es lässt sich jetzt nicht mit Ge-

Digitized by Google

wissheit bestimmen, welche Erklärung die richtige ist. Doch giebt es gewisse Fälle, in welchen die eine oder die andere Art der Wirkung wahrscheinlicher ist.

I. Wenn nach Empfindungen durch Reflexion Absonderungen in entfernten Theilen erfolgen, ist wahrscheinlich das Gehirn und Rükkenmark das Bindeglied. Die Empfindungsreizung könnte entweder von den Ganglien der Wurzeln der Empfindungsnerven, durch welche auch Fasern des N. sympathicus durchgehen, ohne zum Rückenmark zu kommen, zu den organischen Fasern gelangen, oder vom Rückenmark aus auf diese reflectirt werden. Das Letztere ist offenbar das wahrscheinlichere, da die Reflexion durch das Rückenmark in den motorischen Reflexionen eine Thatsache, die Mittheilung der Wirkungen der Fasern in den Ganglien der Empfindungsnerven eine unerwiesene Hypothese ist. Die Thatsachen, welche hieher gehören, sind sehr häufig. Nach Einwirkungen auf die inneren Schleimhäute, z. B. nach Getränken, bricht oft sogleich ein allgemeiner Schweiss aus. Nach heftigen Empfindungen entsteht zuweilen mit Zufällen der Ohnmacht ein kalter Schweiss. Bei den letzteren Erscheinungen ist die Reflexion durch das Rückenmark ganz offenbar, da die Erscheinungen bei der Ohnmacht eine Breite haben können, dass sie nur durch das Rückenmark erklärt werden. Zweifelhafter ist diese Erklärung bei einigen andern Phänomenen dieser Art. Nach einer mit Empfindungen verbundenen Reizung der Conjunctiva oculi et palpebrarum entsteht ein Thränenfluss; nach heftigen Empfindungen in der Schleimhaut der Nase durch fixe Reizmittel, die auf die Schleimhaut der Nase, oder flüchtige, die in den Mund gebracht werden, entsteht ebenfalls Thränenfluss. Senf und Meerrettig erregen zuweilen schon vom Munde aus diese Erscheinung. Man pflegt diese Erscheinungen so zu erklären, dass man die Empfindungsreizung von dem N. ethmoidalis auf den Stamm des ersten Astes vom N. trigeminus, und von dort aus wieder auf den N. lacrymalis reflectiren lässt; so erklärt man auch den Thränenfluss von Reizung der Conjunctiva, indem man die Empfindungsreizung der Conjuctiva auf den Stamm des ersten Astes, und dort wieder auf den Ramus lacrymalis sich reflectiren lässt. Indessen ist diese Erklärung für beide Fälle fehlerhaft. Denn ein Cerebrospinalnerve kann, da keine Communication der Primitivfasern in ihm stattfindet, auch keine Empfindungsreizung eines Theiles seiner Fasern auf andere reflectiren. Andere erklären jene Erscheinungen von Sympathie der Nasenschleimhaut mit der Thränendrüse durch das Ganglion sphenopalatinum, welches nach Einigen durch sympathische Fäden mit dem Ciliarknoten verbunden seyn soll. Da nun dieser durch die lange Wurzel des Ganglion ciliare mit dem N. nasalis, und also mit dem Stamme des ersten Astes, der den N. lacrymalis abgiebt, verbunden ist, so sey der N. lacrymalis mit dem Ganglion sphenopalatinum in unmittelbarem Zusammenhang. Gegen diese Erklärung lässt sich dasselbe einwenden, wie gegen die vorige, indem eine Reizung, die zum Ganglion ciliare auf den N. nasalis bis in den Stamm des ersten Astes des N. trigeminus gelangt,

Digitized by Google

ohne Communication der Fasern nicht auf den Ramus lacrymalis reflectirt werden kann. Andere endlich lassen die Empfindungsreizung von der Nase auf das Ganglion Gasseri am Stamme des N. trigeminus, und von dort auf den ersten Ast des N. trigeminus und den Ramus lacrymalis reflectiren. Gegen diese Erklärung liesse sich nichts einwenden, wenn man wüsste, dass das Ganglion Gasseri, als Ganglion eines Empfindungsnerven, Ursache einer Sympathie und Reflexion seyn könnte, wenn es bewiesen wäre, dass in einem Empfindungsnerven, wie der N. lacrymalis, centrifugale Strömungen stattfinden könnten, und wenn es erwiesen wäre, dass der N. lacrymalis wirklich der Thränendrüse Fasern abgäbe, welche der Absonderung verstehen. Da die Absonderung der Thränen, wie überall, wahrscheinlich von bloss organischen Fasern des N. sympathicus bestimmt wird, so würde immer die Erklärung noch am einfachsten seyn, welche die Empfindungsreizung von der Nase auf das Ganglion sphenopalatinum, und bei dem Zusammenhange aller organischen Nerven auf irgend einem Wege auf die Thränendrüse durch organische Fasern reflectiren lässt. Ob diese Art von Reflexion von Empfindungsnerven auf organische unmittelbar ohne Mitwirkung des Gehirns und Rückenmarkes möglich ist, ist aber gerade der Gegenstand der Frage, und ich weiss keine andern Gründe, als die Möglichkeit einer solchen Erklärung, und die Unmöglichkeit, sie geradezu zu widerlegen, für diese Annahme. Eine sehr häufige Reflexion von Empfindungsreizung auf Absonderung ist auch die oft schnell vermehrte Absonderung des Speichels bei der Aufnahme der Speisen in den Mund. Es ist hier eben so ungewiss, wie man eine solche Reflexion erklären soll. Die Erklärung dieser Reflexionen durch Mitwirkung des Gehirns und Rückenmarkes als Vermittler der sensoriellen und vegetativen Wirkung hat wenigstens die Analogie ähnlicher Reflexionen von sensoriellen Wirkungen auf motorische, durch Vermittelung des Gehirns und Rückenmarkes, für sich.

II. Die verschiedenen Theile einer absondernden Haut stehen unter einander in Consensus; so dass der Zustand einer Stelle auf die Beschaffenheit der ganzen Ausbreitung einer Schleimhaut Einfluss hat. Es ist in diesen Fällen einfacher, die Erscheinungen durch Communication der organischen Fasern zu erklären. Schon die tägliche Erfahrung, dass es allgemeine Affectionen einer Schleimhaut, einer serösen Haut giebt, zeigt uns eine Sympathie in der Ausbreitung der Membranen, welche wohl durch Communication organischer Fasern erklärt werden könnte. Hier ist diese Erklärung wahrscheinlicher; aber auch sie lässt sich nicht direct beweisen.

III. Zuweilen wirkt der vegetative Zustand eines Organes, die Entzündung, die Absonderung desselben auf die Hervorrufung von Entzündung, Absondenung in anderen Theilen. In diesem Falle haben wir ein Beispiel der Reflexion von organischen Fasern eines Theils auf organische Fasern eines andern, ohne Mitwirkung der Cerebrospinalnerven. Eine Entzündung des Hodens kann sich auf die Parotis, eine rothlaufartige Entzündung der Haut auf die Hirn-

Digitized by Google

häute versetzen; die Unterdrückung einer Absonderung kann eine andere in einem andern Theile verstärken. Wahrscheinlich sind alle diese Erscheinungen von Veränderungen in den die Blutgefässe begleitenden organischen, zum N. sympathicus gehörigen Fasern verbunden. Hier fragt es sich nun wieder, ob solche Reflexionen bloss durch Veränderung der Statik des N. sympathicus stattfinden, oder ob das Gehirn und Rückenmark wieder zwischen einer centripetalen und centrifugalen Wirkung den Ausschlag giebt. Wir haben noch keine Thatsachen, diese Frage zu entscheiden, indess ist das erste in mehreren Fällen wahrscheinlicher. In Mayer's Versuchen entstand zuweilen nach Unterbindung des N. sympathicus am Halse, also des Verbindungstheiles zwischen dem ersten und zweiten Halsknoten, eine Affection von Theilen, die erst wieder von dem ersten Halsknoten influencirt scheinen, nämlich des Auges, Augenentzündung. Das eigenthümliche Verhalten der organischen Nerven, dass man weder Anfang noch Ende leicht unterscheiden kann, dass sie sich nicht wie Stamm und Aeste zu einander verhalten, sondern auf ihren Wegen sich vermehren können, spricht allerdings für die Möglichkeit einer allseitigen Wirkung in diesen Nerven, so dass sie keiner centripetalen und centrifugalen Strömung allein, sondern einer nach allen Richtungen ausgehenden Vertheilung ihrer Wirkungen von den Centralpunkten der Ganglien fähig sind; für diese Ansicht spricht auch der Umstand, dass ein Weg, einen Theil mit organischen Nerven zu versehen, durch einen andern ersetzt werden kann. Nach der Unterbindung eines Arterienstammes werden die Nerven der Arterien ohne Zweifel mit verletzt; dennoch erfolgt kein Absterben, keine Atrophie, kein Aufhören der Absonderung, so dass es scheint, dass die Gefässnerven der Collateralgefässe diesen Einfluss ersetzen können, oder dass organische Fasern in den Spinalnerven diesen Mangel ersetzen. Auf der andern Seite kann wieder der Einfluss der Spinalnerven aufhören, ohne dass Atrophie erfolgt. Es gehört auch hieher, dass nach Durchschneidung des N. sympathicus auf beiden Seiten in v. Pommer's Versuchen gar keine merkliche nachtheilige Wirkung eintritt, so dass vielleicht andere Wege, wie der die Arteriae vertebrales begleitenden Fäden, jene Theile des Nervus sympathicus ersetzt haben. Jedenfalls entsteht eine Versetzung eines pathologischen Processes immer dahin, wo die Disposition zu dem Sitz desselben ist, bei dem Lungenkranken von der Haut nach den Lungen, bei dem Leberkranken von der Haut nach der Leber, bei dem Menschen mit reizbarem Darmkanal nach diesem u. s. w. Bei der Statik der Absonderungen kömmt übrigens nicht bloss das Nervensystem, sondern die Natur der verschiedenen Absonderungsmaterien und ihr Verhältniss zu den Bestandtheilen des Blutes und zu einander in Betracht. Unter diesem letzten Gesichtspunkte ist die Statik der Absonderungen indess schon oben p. 470. betrachtet worden.

IV. Die Ganglien scheinen die Centraltheile zu seyn, von welchen der vegetative Einfluss auf die verschiedenen Theile ausströmt. Nach Verletzung des obersten Halsknotens hat man eine Augen-

Digitized by Google

entzündung, ja selbst allgemeine Erscheinungen der veränderten Ernährung beobachtet.

V. Dieser ausstrahlende Einfluss der Ganglien scheint eine gewisse Unabhängigkeit von dem Gehirn und Rückenmark zu behaupten, insofern die Ausbildung des Embryo mit Zerstörung des Gehirns und Rückenmarkes möglich ist. Siehe oben p. 197. Vergl. Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie* 1834. *p.* 268.

VI. Indessen scheint doch auch das Gehirn und Rückenmark die Hauptquelle zu seyn, wodurch auch das organische Nervensystem sich allmählig integrirt, indem gewisse Gehirn- und Rückenmarkslähmungen auch mit Atrophie verbunden sind. Vergl. die Bemerkungen über den Schlaf oben p. 743.

Indem wir die Untersuchungen über den N. sympathicus schliessen, müssen wir bedauern, wie Vieles noch hier dunkel ist; indessen glauben wir gezeigt zu haben, wie man in den Untersuchungen über diesen Nerven verfahren müsse, und Manches wurde durch Anwendung der Mechanik der Cerebrospinalnerven auf den N. sympathicus klar, dessen Eigenschaften Herrn Magendie so unbekannt schienen, dass er Anstand nahm, ihn für einen Nerven zu halten.

VI. Capitel. Von den Sympathieen.

In den vorhergehenden Capiteln sind so viele Formen sympathischer Erscheinungen durch die Mechanik und Statik der Nerven, ohne Antheil des N. sympathicus erklärt worden, dass dieser Nerve nunmehr noch eine geringe Rolle in der Erklärung der Sympathien spielt. Die Phänomene der Irradiation, der Coincidenz der Empfindungen, der Mitbewegungen, der Reflexion geschehen nicht durch den N. sympathicus, und umfassen den bei weitem grössten Theil der sympathischen Erscheinungen, welche man ehemals durch diesen Nerven verrichten liess. An der Wahrheit dieser letzteren Erklärungen haben schon viele namhafte Forscher gezweifelt; denn die alltäglichen sympathischen Erscheinungen zwischen allen Theilen, gerade die Erscheinungen des gesunden Consensus zwischen Uterus und Brüsten, so wie mehrere der merkwürdigsten pathologischen Sympathien, waren niemals durch den N. sympathicus erklärbar. Nur in einigen pathologischen Sympathien zwischen den Sinnesorganen und dem N. sympathicus hat man diesen Nerven in der neuern Zeit wieder scheinbar mit mehr Erfolg zur Erklärung der Sympathien angewandt, wozu die trefflichen Untersuchungen von Tiedemann, Hirzel, Arnold viel beigetragen haben. Indessen werden diese Versuche durch die feinere Anatomie der Nerven wieder schwankend, indem diese uns lehrt, dass wenn auch der N. sympathicus sich mit Gehirn- und Rückenmarksnerven verbindet, diess noch durchaus kein Beweis für einen physiologischen Zusammenhang der peripherischen Theile beider Nerven ist. Denn überall, wo an solchen Verbindungen des N. sympathicus und der Gehirn- und Rückenmarksnerven keine Ganglien des Sympathicus liegen, durch

Digitized by Google

welche alle Fasern des Cerebrospinalnerven durchgehen, fällt die Erklärung eines physiologischen Zusammenhanges weg; ausserdem, dass er schon bei solchen Verbindungen mit Ganglien hypothetisch ist, und die Ganglien auch Apparate zur Einmischung organischer Fasern in die Cerebral- und Spinalnerven seyn können. Da aber ferner, wo der N. sympathicus mit motorischen Wurzeln der Spinalnerven zusammenhängt, gar keine Ganglien vorkommen, sondern diese Verbindungen eben nichts anders, als ein blosses Anschliessen von Primitivfasern sind, so ist das Bereich des N. sympathicus in allen Nervensympathien mit Bewegungen anatomisch noch mehr geschmälert. Die positive Kenntniss der Erscheinungen der Irradiation, Coincidenz, Mitbewegung und Reflexion, und die grosse Wahrscheinlichkeit, dass diese Phänomene in den Cerebrospinalnerven ganz, und in den sympathischen Nerven wenigstens zum Theil durch Mitwirkung des Gehirns und Rückenmarkes erfolgen, hat das Wirkungsfeld des N. sympathicus in den Sympathien noch viel mehr geschmälert, und ihm durch Aufstellung einer, für jetzt schon ziemlich exacten Statik der Nerven, den bei weitem grössten Theil der Sympathien ganz entzogen. In dieser Wendung zeigt sich etwas Aehnliches, wie in der Pathologie der Fieber; deren Zahl um so grösser war, je weniger man die Krankheiten, welche die Fiebersymptome erzeugen, kannte, und welche in der neuern Pathologie als Krankheiten eine beschränkte und sehr zweifelhafte Rolle spielen.

Nachdem wir in den vorhergehenden Capiteln schon die Gesetze für die Erklärung eines grossen Theiles der Sympathien kennen gelernt haben, werden wir uns jetzt kurz fassen, und die Sympathien mehr unter allgemeinen physiologischen Gesichtspunkten auffassen.

Die sympathischen Verhältnisse der verschiedenen Theile des Organismus lassen sich unter folgende Gesichtspunkte bringen.

I. Sympathieen der verschiedenen Theile eines Gewebes unter sich.

Diess ist eine der häufigsten Arten des Consensus. Die verschiedenen Ausbreitungen der Schleimhäute theilen sich ihre Zustände mit; die serösen Häute, die fibrösen Häute u. s. w. sind in demselben Falle. Bei der consensuellen Erregung verschiedener Theile eines Gewebes ist die consensuelle Affection mit der ursprünglichen in der Regel eins. Die Entzündung pflanzt sich fort, die Schmerzen dehnen sich im Umfange des Gewebes aus; die veränderte Absonderung ergreift in derselben Art die naheliegenden Theile des ursprünglich afficirten Gewebes.

a. *Zellgewebe.*

Schon das Zellgewebe besitzt eine grosse Neigung zur Mittheilung seiner Zustände über seine Verlängerungen hin. Die Krankheiten desselben, das Emphysem, das Oedem, die Zellgewebeverhärtung, die Fettsucht, die Entzündung und Vereiterung

Digitized by Google

des Zellgewebes, liefern Beispiele davon. Diese Krankheiten schreiten oft über ganze Strecken des Zellgewebes zwischen den Muskeln, Gefässen, aponeurotischen Ausbreitungen hin, indem sie bloss das interstitiäre Zellgewebe verfolgen. Deswegen wird auch die Kenntniss der natürlichen Grenzen der Zellgewebeausbreitungen, nämlich der Fascien, für die Würdigung der Zellgewebeeiterungen so wichtig.

b. *Aeussere Haut.*

So offenbar der lebhafte Verkehr der äussern Haut mit inneren Theilen ist, so zeigt uns doch dieselbe keine sehr lebhafte Wechselwirkung ihrer Zustände in verschiedenen Theilen ihres Verlaufs. Eine reine Hautentzündung kann beschränkt seyn. Indessen besitzt sie als Ausscheidungsorgan für gewisse Stoffe auch eine gewisse Affinität gegen in den Säften circulirende fehlerhafte Materien; wodurch ihr allein eigenthümliche Krankheiten, acute und chronische exanthematische Hautentzündungen, sich in ihr in einer flachenhaften Ausbreitung ausbilden. Viel häufiger sind indess die Sympathien der äussern Haut mit den inneren Theilen, für welche sie die gemeinsame Grenze nach aussen hin bildet; wovon die Beispiele später angeführt werden.

c. *Schleimhäute.*

Die Schleimhäute haben eine grosse Neigung, ihre Zustände einander nach dem Verlaufe der Membranen mitzutheilen. Der Catarrh der Lungenschleimhaut zieht leicht dieselbe Affection in der Nasenschleimhaut in Folge. Der Catarrh der letztern afficirt die Schleimhaut der Thränenwege und die Conjunctiva. Im Stadium irritationis des Schnupfens ist das Auge wie die Nasenschleimhaut röther und trockner; im zweiten Stadium werden beiderlei Theile feucht. Auch die Schleimhaut der eustachischen Trompete und Trommelhöhle kann im Catarrh afficirt seyn, was sich durch das nicht selten begleitende Symptom catarrhalischer Affectionen, Schwerhörigkeit und Ohrenbrausen, äussert. Im Catarrh der Nasenschleimhaut ist auch die Schleimhaut der Stirnhohlen, wahrscheinlich auch der anderen Nebenhöhlen der Nase afficirt; man empfindet einen dumpfen Druck in der Gegend der Stirn. In einem gleichen engen Zusammenhange stehen die verschiedenen Theile des Schleimhautsystems des Tractus intestinalis. Der Zustand des Magens wirkt auf den des ganzen Darmkanals, und verändert seine Secretionen. Die Schleimhaut des Mundes wird der Ausdruck des Zustandes der Schleimhaut des Magens und Darmkanals. Aus einer trocknen Zunge schliessen wir mit Recht auf einen ähnlichen Zustand in der Schleimhaut der Speiserohre und des Magens, aus der Röthe derselben, aus dem Beleg auf gleiche Zustände innerhalb des Magens und Darmkanals. So stehen wieder die Schleimhäute der Genitalien und Harnwerkzeuge im sympathischen Zusammenhange. Die häufige Irritation der Geschlechtstheile bewirkt leicht einen chronisch-inflammatorischen Zustand der Harnblase, der Nieren und Phthisis vesicalis, Phthisis renalis, so wie sich zur Phthisis laryngea und trachealis später Phthisis pulmonalis gesellt. Aber nicht bloss die anatomisch zusammenhängenden Schleimhäute, sondern

Digitized by Google

selbst die ganz getrennten haben eine ähnliche, obgleich geringere Tendenz zur Mittheilung ihrer Zustände. Man kann deshalb eine vermehrte Absonderung in einer Schleimhaut nicht durch eine vermehrte Absonderung in einer andern, oder durch Antogonismus heilen. Man kann eine Blennorhoe der Genitalien nicht durch künstliche Diarrhoe heilen. Zuweilen sehen wir die Schleimhaut der Athemorgane im Consensus mit derjenigen des Magens; es ist bekannt, dass manche Zustände des Magens eine Reizung auch in den Athemwerkzeugen unterhalten, Tussis gastrica. Am Ende der Phthisis pulmonalis entsteht auch ein inflammatorischer Zustand in der Muscosa des Darmkanals, wie die Darmgeschwüre der Phthisiker zeigen. Endlich zeigen uns die colliquativen Blennorhoen der Schleimhäute ein Beispiel eines gleichen Zustandes im ganzen Schleimhautsystem, der von einem einzelnen Theile desselben ausgehen kann; wie z. B. sowohl in den Lungen als im Darmkanal, oder in den Genitalien die erste Ursache einer allmähligen Veränderung aller Schleimhäute liegen kann.

d. *Seröse Häute.*

Bei einer primären Affection einer serösen Haut werden in der Folge oft alle anderen serösen Häute in dieselbe Affection gezogen. Zum Hydrops ascites gesellt sich in der Folge Hydrothorax; doch gehören nicht alle Fälle von Wassersucht in verschiedenen Theilen hieher. Die Wassersucht entsteht oft durch eine Einmischung des Blutes gleichzeitig in mehreren Theilen, oder auch, wenn die Circulation in einem wichtigen Organe unterbrochen ist. In diesen Fällen geht also die Sympathie nicht so sehr von den serosen Häuten selbst aus, als von der Verbreitung der Ursache.

Eine reine Sympathie der serösen Häute ist aber, wenn in Folge einer primären Entzündung einer serosen Haut auch die anderen serösen Häute sich entzünden. So folgt zuweilen der Entzündung des Bauchfelles Entzündung der Pleura, Entzündung der Arachnoidea, und diese letzte in dem wichtigsten Organe ist vielleicht die Ursache des Todes.

e. *Fibröses System.*

Die fibrosen Häute stehen unter einander in einer solchen engen Verbindung, dass eine örtliche Verletzung derselben sehr häufig bedeutende ausgebreitete Zufalle nach sich zieht.

Zu den fibrösen Häuten gehören die Beinhaut, die Dura mater, die Sclerotica, Albuginea des Hodens, äussere Haut der Milz, die Sehnen, Bander und sehnigen Muskelscheiden. Eine örtliche rheumatische Affection setzt sich leicht über alle fibröse Verbindungen fort, wechselt ihren Ort, indem sie aber immer gern die natürlichen Verbindungen der fibrösen Häute verfolgt. Die Verletzung der Bänder, Aponeurosen, des fibrösen Bändergewebes an Fuss und Hand ist oft mit ausgebreiteten Zufällen verbunden; die Entzündung, die Anschwellung, die Schmerzen setzen sich nämlich von der ursprünglichen Stelle der Reizung zuweilen über die Muskelscheiden, ja über die Beinhaut der Knochen fort. Die gichtische Entzündung des Auges, welche, wie die Gicht über-

Digitized by Google

haupt, das fibröse Gewebe liebt, so in dem Auge ihren Sitz in der Sclerotica hat, ist mit ihrem Schmerz nicht auf das Auge fixirt, sie zeichnet sich vor allen anderen Augenentzündungen dadurch aus, dass die ganze Seite des Gesichtes, im Verfolg der Beinhaut, die Scheide des Schläfenmuskels, die Galea aponeurotica von den lebhaftesten Schmerzen ergriffen sind.

Die innere und äussere fibröse Haut des Cranium, nämlich die Dura mater des Gehirns, die Beinhaut des Schädels und die Galea aponeurotica stehen im Consensus unter sich und mit der Sclerotica. Affectionen der Dura mater erregen Affectionen der Sclerotica; Affectionen der Galea aponeurotica und Beinhaut können sich auf die Dura mater versetzen. Umgekehrt, ist die Dura mater örtlich entzündet, so ist es auch zuweilen die Beinhaut äusserlich.

Dass bei den Sympathien des fibrösen Systemes auch die Nerven im Spiele sind, lässt sich theils aus dem Vorhandenseyn organischer, die Gefässe begleitender Nerven in allen gefässhaltigen Theilen theils aus der wirklichen Existenz von Nerven in der Dura mater schliessen. Sie sind von Comparetti, Arnold, Schlemm, Bidder und von mir selbst beobachtet und gehören zum Theil dem organischen Nervensysteme an.

f. *Knochengewebe und Knorpelgewebe.*

Sympathien des Knochengewebes unter sich sind selten. Wohl ist in manchen Krankheiten, wie in der Rhachitis und im zweiten Stadium der Venerie, das ganze Knochengewebe überall afficirt, aber diese Bildungskrankheiten kann man weniger unter die Sympathien rechnen; die Reizung ist hier allgemein mit fehlerhafter Bildung der Knochenmaterie. Indessen giebt es doch auch deutliche Beispiele von reiner Sympathie des Knochengewebes. Wenn nämlich eine Krankheitsursache auf die Oberfläche eines Röhrenknochens wirkt, so wird in der darauf folgenden Entzündung nicht leicht die blosse Oberfläche, sondern die ganze Dicke des Knochens bis zur Markhöhle afficirt; in der ganzen Dicke verändert sich das Knochengewebe; und ebenso folgt nach Zerstörung des Markes eines Röhrenknochens auch wieder Entzündung und Aufschwellung, sowohl innen als aussen bis zur äussern Oberfläche. Ueberhaupt ist das, was man Exostosen nennt, in der grössten Mehrzahl der Fälle keine Krankheit der Oberfläche des Knochens, sondern der ganzen Dicke des Knochens, wie ich mich durch Durchschneidung vieler Exostosen überzeugt habe. Daher entspricht einer äussern Exostose an einem Röhrenknochen in der Regel eine innere Exostose gegen die Markhöhle. (Man sieht, gelegentlich gesagt, hieraus allein schon deutlich, wie wenig richtig es ist, wenn man der Beinhaut einen wesentlichen Antheil an der Bildung der Exostosen zuschreibt.)

Von den Knochen kennen wir bis jetzt keine Nerven, dürfen jedoch die Existenz von Gefässnerven in ihnen so gut, wie in allen gefässhaltigen Theilen voraussetzen.

g. *Muskelgewebe.*

Man hat dem Muskelgewebe die Fähigkeit, sympathisch er-

Digitized by Google

regt zu werden, in hohem Grade zugesprochen. Man hat angeführt, dass die Reizung, welche die Contraction eines Muskels zur Folge habe, häufig von einer Menge sympathischer Convulsionen anderer Muskeln begleitet sey. Allein diese Sympathien beruhen nicht in dem Gewebe selbst, sondern in der Sympathie der Bewegungsnerven; der Muskel, dessen Bewegungsnerve von dem übrigen Nervensystem getrennt ist, ist zwar selbst noch erregbar auf einen äusseren Reiz, er pflanzt diesen aber nie fort auf andere Theile desselben Gewebes, es entstehen keine sympathische Convulsionen.

Die sympathischen Krämpfe des Muskelsystems sind daher nicht eigentlich Sympathien des Gewebes unter sich, sondern Sympathien der Nerven. Die übrigen wenigen Krankheiten, welche noch in den Muskeln vorkommen, wie die Entzündung und Eiterung sind auch immer beschränkt, sie verbreiten sich nicht wie in den anderen Geweben, sie sind auf die örtlichen Stellen der Reizung beschränkt. Ausser den sehr seltenen Muskelentzündungen, den Degenerationen und dem Krampfe kennt man aber fast gar keine Krankheit der Muskeln weiter. Alles diess überzeugt uns, dass das Muskelgewebe keiner lebhaften Sympathie in sich und mit anderen Theilen unterworfen sey.

h. *Lymphatisches System.*

Zu dem lymphatischen System gehören die Lymphgefässe und die Lymphdrüsen.

Krankheiten des lymphatischen Systems sind sehr selten örtlich; wenn sie ursprünglich entstehen und nicht sympathische Krankheiten anderer Organe sind, befallen sie in der Regel das ganze System unter der Form einer *Dyskrasie*, ja gewisse Krankheiten sind auf das Gewebe des lymphatischen Systems fast beschränkt, wie z. B. die Scrofeln. Geht aber die Reizung von einer örtlichen Stelle des Lymphsystems aus, so verbreitet sie sich schnell sympathisch über grosse Strecken. Ist eine Lymphdrüse primär durch äussere Reizung in Entzündung gesetzt, so werden bald die umliegenden Drüsen ergriffen, sie schwellen an, wenn sie auch selbst nicht in Entzündung gerathen. Manche primäre Reizungen des Lymphsystems gehen von Giften aus, die von den Lymphgefässen aufgenommen worden. Wird an einer Stelle Quecksilber eingerieben, so entsteht oft eine ausgebreitete Reizung des lymphatischen Systems, und die Lymphdrüsen der verschiedenen Stellen des Körpers können gleichzeitig in Affection gezogen werden. Die Entzündung der Lymphgefässe, die von einer örtlich giftigen Einwirkung ausgeht, verbreitet sich schnell über alle Verzweigungen in einem Gliede, und in einem solchen Falle ist die Haut überall nach dem Verlaufe der Lymphgefässe von rothen Streifen durchzogen.

Eben so häufig sind die Sympathien der Lymphgefässe mit den Lymphdrüsen. Eines der gewöhnlichsten Phänomene in den Bildungskrankheiten der grossen Eingeweide ist die Anschwellung der Lymphdrüsen in der Umgegend.

So schwellen die Lymphdrüsen des Halses an bei organischen Krankheiten der Organe des Halses, der Glandula thyreoidea;

Digitized by Google

bei den Bildungskrankheiten der Brüste, namentlich beim Krebs der Weiberbrust, die Axillardrüsen; die Lymphdrüsen des Unterleibes bei den organischen Krankheiten des Magens, des Darmkanals überhaupt, die Lymphdrüsen, welche die Gallengänge begleiten, bei den organischen Krankheiten der Leber, die Inguinaldrüsen in den organischen Krankheiten der Hoden, der Urethra, der Prostata.

Eben so häufig sind die sympathischen Anschwellungen der Lymphdrüsen bei entzündlichen Affectionen, wie nach Stichwunden, Zerreissungen, Zerquetschungen. Nach der Anwendung eines Blasenpflasters, welches Entzündung der Haut setzt, schwellen oft die Lymphdrüsen an, eben so beim Blutschwären, beim Wurm am Finger. In dem letzten Falle sind sogar oft die Lymphgefässe des ganzen Armes bis zu den Achseldrüsen im Zustande der Reizung. Bei der Entzündung der Harnröhre im Tripper, in den entzündlichen Krankheiten der Hoden schwellen oft die Inguinaldrüsen als sogenannte Bubonen, bei entzündlicher Affection der Mamma die Axillardrüsen, bei entzündlicher Affection der Parotis die Halsdrüsen an.

Diese sympathischen Anschwellungen unterscheiden sich von der ursprünglichen Affection meist dadurch, dass sie verschwinden, sobald die Krankheit des primär afficirten Organs aufhört, dass sie chronisch sind bei einer chronischen Krankheit, acut bei einer acuten, und endlich, dass in der sympathischen Affection sich das Gewebe ausser der Anschwellung von dem natürlichen Zustande in der Regel nicht entfernt.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass man von jeder Stelle der Körperfläche, die mit Lymphgefässen durchzogen ist, eine weit verbreitete lymphatische Irritation erregen kann. Diese Irritation kann sowohl durch eine materielle Einimpfung eines Krankheitsstoffes, als nach einer Verletzung erfolgen, wobei keine Materie aufgenommen und verbreitet wird, wie nach mechanischer Verletzung oder nach Verbrennung. Man sieht also daraus, dass zu dieser Sympathie die materielle Verbreitung eines Krankheitsstoffes in den Lymphgefässen wenigstens nicht nöthig ist. Die lymphatische Irritation kann, wie von Verletzung der äussern Körperoberfläche, eben so leicht von ursprünglicher Reizung der innern Körperoberfläche erfolgen. Und wir haben hier eine ganz parallele Reihe von Erscheinungen. So wie nach Entzündung der Haut durch Verbrennung eine lymphatische Irritation der Umgegend bis zu den nächsten Lymphdrüsen entsteht, eben so erfolgt auf Entzündung der Muscosa des Darmkanals, wenn sie einigermaassen andauert, eine Irritation der Lymphgefässe und Lymphdrüsen des Mesenteriums, und gerade diejenigen Lymphdrüsen und Lymphgefässe entzünden sich und schwellen an, welche den entzündeten Stellen des Darmkanals entsprechen, wie wir ein so deutliches Beispiel bei den Darmgeschwüren im Typhus abdominalis sehen.

Zuweilen enthalten die von einem eiternden Theile kommenden Lymphgefässe, gleichwie die Venen, Eiter. Siehe Cruveilhier *Anat. path. liv.* 13. Auch die entsprechenden Lymphdrüsen kön-

Digitized by Google

nen vereitern. Man würde unrichtig schliessen, dass dieser Eiter durch die Lymphgefässe aufgesogen worden. So wie er in den Venen des Amputationsstumpfes von Venenentzündung entsteht, eben so entsteht er in den Lymphgefässen, die von einem entzündeten Theile kommen, von Fortpflanzung der Entzündung. Die Entzündung und Vereiterung der Lymphdrüsen des Mesenteriums bei Darmgeschwüren im Typhus abdominalis liefert deutlich den Beweis, dass wenigstens in diesem Falle der Eiter in den Lymphgefässen und Lymphdrüsen selbst entstanden ist.

i. *Blutgefässe.*

Wenn man bedenkt, dass die Sympathien des Pulses mit den Krankheiten der Organe nicht so sehr Sympathie der Arterien selbst als des Herzens sind, und wenn man ferner in Erwägung zieht, dass die örtlichen Krankheiten der Arterien ziemlich beschränkt sind auf die Stelle der Reizung, und nicht die Tendenz haben, sich in der Breite auszudehnen, wie die Entzündung und Erweiterung der Arterien, so sind wir zu dem Schlusse berechtigt, dass die Sympathien der Arterien im Allgemeinen geringe sind, wenigstens dürfen wir diess von den Häuten der grösseren Arterien und Zweige annehmen.

Aber dem Nervensystem werden wir einen Einfluss auf den Zustand der Arterien zuschreiben müssen, welcher unabhängig von dem Herzen ist, diess beweisen die Veränderlichkeit des Hautturgors in den Leidenschaften, die örtlichen Congestionen und wieder der Collapsus, die in Folge einer bloss leidenschaftlichen Aufregung in den äusseren Theilen entstehen.

Es ist schwierig zu unterscheiden, ob bei einer allgemeinen Affection der Venen diese ursprünglich von einem Theile des Venensystems ausgegangen und sich allmählig sympathisch verbreitet, oder ob die nächste Ursache der Krankheit auf einen grossen Theil des Venensystems zugleich gewirkt hat. Indessen zeichnet es das Venensystem aus, dass seine Krankheiten in der Regel keine ganz örtlichen sind, wie die Atonie und Varicosität der Venen zeigen.

Einen directen Beweis von der ausgebreiteten Sympathie der Venen giebt die Venenentzündung, sie entsteht örtlich im Verlaufe einer Vene durch Ursachen, welche überhaupt Venenentzündung setzen, z. B. durch einen schlechten Aderlass, durch die Verletzung eines Varix, ferner in Amputationswunden, am Uterus der Wöchnerinnen, verbreitet sich aber von der örtlich entzündeten Stelle so schnell, dass sie in kurzer Zeit alle Venenstämme des Gliedes erreicht. Die Venenentzündung ist daher, wenn sie nicht auf der Stelle richtig erkannt und behandelt wird, gewöhnlich tödtlich; sie geht in Eiterung der Venen über. Eine merkwürdige Sympathie der Venen unter sich ist die Erschlaffung und Erweiterung der Venen in der Umgegend einer Geschwulst mit entartetem Gefässsystem. Diese Disposition zur Erweiterung und Erschlaffung der kleinen Venen zeigt sich zuweilen über den ganzen Körper verbreitet, bei Cachexien und Dyskrasien, und erzeugt eigenthümliche Farbenveränderung, wie z. B. die blauen Ringe um die Augen u. a.

Digitized by Google

k. *Drüsengewebe.*

Wenn auch gewisse Krankheiten, wie die Scrofelsucht und der Krebs, die Tuberkeln, als Bildungskrankheiten vorzüglich das drüsige Gewebe ergreifen, so ist doch ein allgemeines Leiden des Drüsengewebes in diesen Krankheiten nicht aus Sympathie zu erklären, sondern es liegt in der Natur dieser Krankheiten, dass sie diess Gewebe besonders ergreifen, und die Verbreitung geht nicht so sehr von einer örtlichen Reizung, sondern von einer allgemeinen Anlage des Drüsengewebes aus, die sich dann zu einer vollkommenen Krankheit ausbildet, wenn das Drüsengewebe örtlich gereizt wird. Gleichwohl ist es nicht zu bezweifeln, dass, wenn eine Krankheit in einer einzelnen Drüse beginnt, sie durch die Sympathie der verschiedenen Theile der Drüse leichter die ganze Drüse, als die fremdartige Umgebung erreichen wird. Unter die sympathische Reizung des Drüsengewebes gehört aber folgende Thatsache:

Dass alle Absonderungsorgane, wie sie ihre Reizung auf die Ausführungsgänge reflectiren, so auch in einen Zustand sympathischer Reizung gerathen, wenn ihre Ausführungsgänge ursprünglich gereizt werden; so bedingt die Gegenwart der Speisen im Munde einen grössern Zufluss des Speichels aus den Speicheldrüsen, die Gegenwart einer Sonde in der Blase die vermehrte Absonderung des Urins aus den Nieren (?), die Reizung der Glans penis eine vermehrte Absonderung des Samens, die Reizung der Schleimhaut des Auges eine vermehrte Absonderung der Thränen. So ist es ebenfalls Thatsache, dass, während die Speisen noch im Magen enthalten sind, der Ausfluss der Galle in den Dünndarm nur gering, dass sich dieser aber im zweiten Stadium der Verdauung, wenn der Chymus mit der innern Haut des Dünndarms in Berührung kommt, sehr vermehrt, und dass umgekehrt im Hunger die Ausscheidung der Galle sehr vermindert ist.

Die Materialien, welche wir in diesem Abschnitte mitgetheilt haben, hat vorzüglich Bichat, in seiner allgemeinen Anatomie, dem Lichte der physiologischen Anatomie zugänglich gemacht, ein Werk, welches mehr wahren Inhalt der allgemeinen Pathologie, als unsere mehrsten Lehrbücher der allgemeinen Pathologie enthält. Auf welche Art die Sympathien der verschiedenen Theile eines Gewebes erfolgen, ist schwer zu entscheiden. Einige leiten dieselben unabhängig von den Nerven, von der Gleichheit und dem continuirlichen Verlaufe eines Gewebes ab. Ist die Verbreitung der Entzündung z. B. durch diese Art von Ansteckung möglich? Ist die Materie eines Gewebes unabhängig von dem Einfluss der Nerven fähig, durch eine Art von Affinität der Gewebetheile gegen einander eine Reizung weiter zu leiten? Wir sind nicht im Stande, diese Frage zu lösen. Andere leiten die Sympathien im Verlaufe des Gewebes von den Nerven ab. Dass viele der hieher gehörigen Erscheinungen auf diese Art erklärt werden müssen, scheint daraus hervorzugehen, dass auch Schleimhäute, welche anatomisch nicht zusammenhängen, seröse Häute, welche untereinander keine Communication haben, doch Erscheinungen von Sympathie darbieten. Siehe oben p. 763. Gleichwohl

Digitized by Google

lassen sich diese Erscheinungen auch so erklären, dass eine in das Blut aufgenommene oder dort ausgebildete krankhafte Materie eine Affinität gegen das ganze Schleimhautsystem u. s. w. hat. Bei der Ausbreitung der Empfindungen in den verschiedenen Theilen eines Gewebes sind aber offenbar die Nerven mit thätig; und hier fragt es sich nun, ob die Irradiation z. B. in den Schleimhäuten durch einen vorauszusetzenden Zusammenhang der peripherischen Nervenzweige, oder durch Mitwirkung der Centraltheile erfolgt.

II. Sympathien verschiedener Gewebe unter sich.

Diese zweite Form von Sympathie ist viel seltener als die erste. In der Regel geht eine krankhafte Affection innerhalb eines und desselben Gewebes viel leichter von einem auf ein anderes Organ über, als dass in einem und demselben Organe ein Gewebe seinen Zustand einem andern Gewebe überträgt. Die Tunica mucosa des ganzen Darmkanals kann krankhaft absondern, ohne dass die Tunica muscularis mit afficirt ist; unter einem krankhaften serösen Ueberzuge des Herzens kann gesunde Muskelsubstanz liegen; die tunica musculosa des Darmkanals kann ohne Veränderung der Tunica mucosa und serosa desselben krampfhaft afficirt seyn. Die Tunica serosa kann Wasser absondern, ohne Mitleiden der andern Häute eines Organes. Indessen giebt es doch Sympathien dieser Art. Es ist hier zu bemerken, dass, wenn die Sympathien verschiedener Theile desselben Gewebes in der Regel gleiche Zustände bedingen, in den Sympathien verschiedener Gewebe die Affectionen der in Wechselwirkung tretenden Gewebe nach ihren Lebenseigenschaften auch verschieden sind; nur die Entzündung ist auch hier eine in gleicher Art sich mittheilende Veränderung. Die hieher gehörenden consensuellen Erscheinungen sind vorzüglich folgende:

1) *Zwischen der äussern Haut und den Schleimhäuten.* Diese sind sehr häufig. Viele Krankheiten der Schleimhäute, namentlich die Entzündungen und Blennorrhoen, entstehen oft durch Wirkung einer Krankheitsursache auf die äussere Haut, und umgekehrt. Auf Erkältung der äussern Haut erfolgt Lungenentzündung, Halsentzündung, Darmentzündung etc., oder catarrhalische Affectionen dieser Häute, und zwar jedesmal in der Schleimhaut desjenigen Organes, welches nach individuellen Eigenthümlichkeiten mehr als die äussere Haut in der Disposition zu Krankheiten ist. Nach ausgedehnten Verbrennungen der äussern Haut entsteht zuweilen Entzündung der Lungenschleimhaut, Magenschleimhaut. In den exanthematischen Affectionen der äussern Haut leiden zuweilen die Schleimhäute mit. Andrerseits verändert eine Krankheit der Schleimhäute, z. B. ein gastrischer Zustand, die Absonderung, den Turgor, die Farbe der äussern Haut. Auch wirkt man durch die äussere Haut consensuell auf die Schleimhäute, wie bei Anwendung der Kälte auf die äussere Haut bei Blutungen aus Schleimhäuten.

Digitized by Google

2) *Zwischen der äussern Haut und den serösen Häuten.* Die Wasserergiessungen der serösen Häute vermindern regelmässig die Absonderung der äussern Haut, und durch Unterdrückung der Hautabsonderung entstehen hinwieder zuweilen Wasserergiessungen in den serösen Häuten, sowohl bei vorher gesundem Zustande der Haut, als bei Störungen der Hautexantheme. Endlich verursachen Krankheitseinflüsse, welche auf die äussere Haut wirken, nicht selten Entzündungen der serösen Häute.

3) *Zwischen dem Drüsengewebe und den Schleimhäuten.* Ich habe schon oben erwähnt, dass eine Drüse, die in eine Schleimhaut ausführt, in lebhafter sympathischer Verbindung mit dieser Schleimhaut steht, wie denn das Drüsengewebe nicht allein als eine Verlängerung des Ausführungsganges, und dieser als Fortsetzung der Schleimhaut betrachtet werden kann, sondern auch die dem Darmkanal adnexen Drüsen aus dem Darmkanal selbst anfangs hervorkeimen. Siehe oben p. 392. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn die Reizung der Mundschleimhaut die Absonderung des Speichels vermehrt, die Reizung der Conjunctiva einen Thränenfluss, die Indigestion eine Salivation bewirkt.

4) *Zwischen den Schleimhäuten und den serösen Häuten* zeigt sich seltener eine solche Wechselwirkung.

5) *Zwischen den fibrösen Häuten, der Markhaut der Knochen und dem Knorpel- und Knochengewebe findet hingegen eine sehr innige Beziehung statt.* Der Zustand der Beinhaut wirkt auf den des Knochens und umgekehrt. Nach Entzündung der Beinhaut folgt häufig Aufschwellung des darunter liegenden Knochens, und bei Knochenauftreibungen wird auch die Beinhaut verdickt. Nach Entzündung der Markhaut der Knochen entsteht auch Aufschwellung der ganzen Dicke des Knochens. Nach Zerstörung der Beinhaut erfolgt die äussere, nach Zerstörung der Markhaut die innere Nekrose der Röhrenknochen. Siehe oben p. 419. Diese Wechselwirkung gründet sich vorzüglich auf den Umstand, dass sowohl von der Beinhaut als von der Markhaut aus, unzählige feine Gefässe von aussen nach innen in das Innere des Knochens eindringen.

Ein aufmerksamer Arzt wird diese Beispiele von Sympathien zwischen verschiedenen Geweben leicht vermehren können. Die Erklärung dieser Sympathien kann nicht in allen Fällen dieselbe seyn. Absondernde Häute stehen an und für sich, abgesehen von den Nerven, durch die Wirkung des Zustandes der Absonderungen auf die Saftemasse in einem antagonistischen Verhältnisse. Siehe oben p. 470. Andere Erscheinungen, bei welchen weniger allein die Absonderung als der gesammte Lebenszustand der Häute verändert wird, wie bei der lebhaften Wechselwirkung der Haut und der Schleimhäute, gehören mehr zu den Phänomenen der durch Mitwirkung der Nerven zu erklärenden Reflexion. Siehe oben p. 759. In Hinsicht der Wechselwirkung der Drüsen mit den Schleimhäuten ist es ungewiss, ob die Sympathie durch Reflexion oder durch Wechselwirkung der Nerven selbst unter Mitwirkung des N. sympathicus erfolgt. Die Wechselwirkung der äussern und innern Beinhaut der Knochen mit den Knochen

Digitized by Google

ist endlich durch ihre Gefässverbindungen und die Wechselwirkung ihres Gefässgewebes zu erklären.

III. Sympathien der einzelnen Gewebe mit ganzen Organen.

Die Krankheit eines *ganzen Organes*, an welcher ein weiter verbreitetes Gewebe Antheil hat, theilt sich den Fortsetzungen dieses Gewebes über das ursprünglich afficirte Organ hinaus mit, und umgekehrt kann der Zustand eines Gewebes auf den eines zusammengesetzten Organs wirken.

Als Beispiele dieser Art von Sympathie kann man vorzüglich das Verhältniss der Eingeweide zu der äussern Haut, zu den Schleimhäuten, serösen Häuten anführen.

Durch die äussere Haut kann eine Krankheitsursache zu jedem zur Krankheit disponirten Organe Eingang finden, und anderseits können Reizungen und Ableitungen, auf der äussern Haut angebracht, wieder auf die Krankheitszustände jedes besondern nahegelegenen Organes wirken. Auch werden Blutungen innerer Theile durch Wirkung der Kälte auf die Haut gestillt. Endlich kann sich eine exanthematische Krankheit der Haut auf alle inneren Theile versetzen.

Die serösen Häute participiren immer an den Zuständen der Organe, welchen sie einen Ueberzug geben. Bei den organischen Bildungskrankheiten der Eingeweide leiden die serösen Häute nicht allein, wo sie das Eingeweide überziehen, sondern in ihrer ganzen Ausbreitung mit. So entsteht in Folge einer organischen Krankheit der Lungen Brustwassersucht, des Herzens Herzbeutelwassersucht, der Leber Bauchwassersucht, der Gebärmutter, und der Eierstöcke Bauchwassersucht, bei organischen Krankheiten des Hodens Hydrocele. Dabei gilt das Erfahrungsgesetz, dass gewöhnlich die dem kranken Organe zunächst gelegenen serösen Häute sympathisch afficirt werden. Ferner sind in den Krankheiten der Eingeweide, an welchen Schleimhäute participiren, die Schleimhäute in grösserer Ausdehnung immer afficirt. Bei den organischen Krankheiten der Gebärmutter entsteht weisser Fluss. Bei den Krankheiten der Lungen sind die Schleimhäute der Bronchien afficirt. Bei den Bildungskrankheiten des Magens, des Darmkanals entsteht oft eine anhaltende Verstopfung aus Mangel an Absonderung in der Schleimhaut des Tractus intestinalis.

Bei dem entzündlichen Zustande einer Schleimhaut ist das ganze System ergriffen, die nahegelegenen Muskeln sind entweder in ihren Bewegungen gehemmt, wie die Schlundmuskeln in der Entzündung des Schlundes, oder sie sind krampfhaft afficirt, wie das Zwerchfell, die Intercostalmuskeln im Reizhusten, welcher von der Schleimhaut der Lungen ausgeht. Mechanische Reizung der Schleimhaut bringt dieselbe Wirkung hervor. Man kennt die Krämpfe, welche von mechanischer Irritation der Stimmritze entstehen, das Würgen nach der Reizung der Schleimhaut des Schlundes; die Reizung der Schleimhaut der Blase, der Ureteren durch Steine, durch Entzündung bewirkt Krampf des

Digitized by Google

Sphincter ani, des Sphincter vesicae urinariae, Anziehung des Hodens durch den Musculus cremaster. Wir haben schon oben gesehen, dass die Reizung der Schleimhäute durchgängig krampfhafte Athembewegungen, wie beim Erbrechen, Niesen, Schluchzen, Husten u. s. w. erzeugen könne, und verweisen in Hinsicht der Erläuterung dieser Erscheinungen auf p. 723.

Von allen Membranen haben die fibrösen die geringste Wechselwirkung mit anderen Organen, selbst mit den Organen, welche sie umkleiden. Diese zum Schutz und zur Befestigung bestimmten Theile sind in dieser Hinsicht fast Isolatoren. Nur die Entzündung der fibrösen Häute kann wegen des Blutverkehrs und der Wechselwirkung der Gefässe heftige Symptome, auch in den von ihnen umkleideten Organe hervorbringen, gleichwie die Entzündung der Dura mater mit heftigen Hirnsymptomen verbunden ist.

Die Sympathien einzelner Gewebe mit ganzen Organen finden übrigens theils in den Gesetzen der Reflexion (p. 717., 745., 754., 757.), wenn solche Theile in keiner Verbindung stehen, wie die Haut und innere Organe, theils in der Wechselwirkung der Gefässverbindungen und Gefässnerven verbundener Theile (wie des Uterus und der Schleimhaut der Genitalien) ihre Erklärung.

IV. Sympathien ganzer Organe unter sich.

Obgleich es zu den Grundbegriffen des Organismus gehört, dass ein Organ auf alle andere wirken kann: so ist doch die Leitung der Zustände vorzüglich zwischen den Organen gewisser Systeme oder Organgruppen erleichtert. Die hiehergehörenden Sympathien sind folgende:

1) Zwischen Organen, welche eine gleiche Bildung und Function haben, wie zwischen den verschiedenen Speicheldrüsen, zwischen dem Herzen und den Blutgefässen, zwischen Magen und Darmkanal, zwischen den Centralorganen des Nervensystems.

2) Zwischen Organen, welche, obgleich von verschiedener Bildung, doch zu demselben Organsystem gehören, wie die verschiedenen Organe des chylopoetischen Systems (Darmkanal, Drüsen, Milz), des uropoetischen Systems, der Genitalien, der beiden letzteren unter sich, des respiratorischen Systems (Kehlkopf, Luftröhren, Lungen).

3) Zwischen Organen, welche in anatomischem Zusammenhange durch Gefässe und ihre Nerven stehen, wie Lungen und Herz.

4) Zwischen allen wichtigeren Eingeweiden und den Centralorganen des Nervensystems. Hieher gehören die Mit-Affection des Gehirns bei Entzündung der Eingeweide, der Leber, der Lungen, des Darmkanals, die Affectionen des Magens und der Leber, Polycholie, Leberentzündung, nach Verletzungen und Reizungen des Gehirns etc.

Die sympathischen Erscheinungen dieser Art werden theils durch die Abhängigkeit verschiedener Organe eines Systems, oder anatomisch zusammenhängender Theile von gleichen Aus-

Digitized by Google

strahlungspunkten des Nerveneinflusses, theils durch den Einfluss der Centralorgane des Nervensystems auf alle Organe erklärt. Dass die Centralorgane hierbei wahrscheinlich einen grössern Einfluss als die Communication der sympathischen Nerven ausüben, sieht man an gewissen, durch Nervenzusammenhang oder anatomischen Zusammenhang ganz unerklärlichen Sympathien, wie zwischen Brust und Genitalien, zwischen Kehlkopf, Athemwerkzeugen, und Genitalien bei der Entwickelung der Pubertät, bei Ausschweifenden und Castraten. Sympathien, welche bis jetzt auch keiner andern Erklärung als derjenigen der Reflexion fähig, sind die der Parotis und des Hodens, deren entzündliche Affectionen sich zuweilen von einem auf das andere Organ versetzen.

V. Sympathien der Nerven selbst.

Obgleich die Nerven die Ursachen des grössten Theils, wenn nicht aller consensuellen Erscheinungen sind, so trennen wir doch diejenigen Sympathien, bei welchen die Wechselwirkung bloss zwischen Nerven erfolgt, oder wo wenigstens ein Nerve es ist, welcher, dem Einflusse eines andern Theiles ausgesetzt, sympathische Erscheinungen zeigt. Man kann die hieher gehörigen Facta folgendermaassen ordnen:

I. Sympathien der Nerven mit den Centraltheilen des Nervensystems. Die Nerven erfordern zu ihrer naturgemässen Thätigkeit nicht allein den beständigen Einfluss der Centralorgane, wie meine und Sticker's Versuche (p. 639.) zeigen, nach welchen ein von dem Gehirn und Rückenmark längere Zeit getrennter Nerve gänzlich seine Reizbarkeit verliert; auch die Centralorgane können durch die Nerven verändert werden. Die hieher gehörigen Phänomene sind zum Theil schon in dem Capitel von der Reflexion p. 717. angeführt worden. Wir bedienen uns dieser Wechselwirkung in einer Menge von Fällen zur Heilung von Krankheiten der Centralorgane. Wir erregen das Rückenmark selbst, indem wir die von ihm entspringenden Nerven durch Bürsten der Haut und andere Frictionen, durch Senfteige, Blasenpflaster, Moxen, Haarseile u. s. w. reizen; wir wirken auf das Gehirn und Rückenmark vermittelst der Nerven bei den kalten und warmen Bädern, bei den Sturzbädern, beim Auftröpfeln kalten Wassers auf Hautstellen. Bisher waren diese Thatsachen zwar bekannt, weniger aber diejenigen physiologischen Thatsachen, aus welchen man jene ableiten kann; jetzt aber kann man sich aus den bei der Lehre von der Reflexion erläuterten Erscheinungen einen deutlichen Begriff von dem Processe jener Wechselwirkung machen. An jedem Theile des Körpers, namentlich der Haut, kann man durch mechanische, galvanische, chemische Einwirkung in den von dort entspringenden Nerven eine heftige centripetale Wirkung erzeugen, welche, wenn sie öfter wiederholt wird, im Stande ist, den gesunkenen Lebensprocess in denjenigen Theilen des Gehirns und Rückenmarkes, von welchen jene Nerven entspringen, anzufachen und so mittelbar auch auf andere Theile der Centralorgane zu wirken. Für die Therapie ergiebt sich aus diesen Be-

Digitized by Google

trachtungen, dass wir auf die Centralorgane auf sehr verschiedene Art einzuwirken vermögen, nämlich:

1) Durch unmittelbare Einwirkung auf dieselben durch in den Darmkanal, oder durch die Haut eingeflösste und ins Blut aufgenommene Materien, eine Methode, die sich in sehr vielen Fällen wegen der Unwirksamkeit solcher Mittel erfolglos zeigt.

2) Durch Wirkung auf die von den Centralorganen entspringenden Nerven, wovon die Therapie die herrlichsten Erfolge sieht.

II. Sympathien der Empfindungs- und Bewegungsnerven. In dem vorhergehenden Falle haben wir nur die Veränderung der Centralorgane selbst durch Eindrücke auf die Empfindungsnerven ins Auge gefasst; hier erwägen wir die hierbei auch erfolgenden Rückwirkungen von den Centralorganen auf andere Empfindungsnerven oder Bewegungsnerven. Die centripetale Erregung der Empfindungsnerven wirkt nicht bloss auf die Centralorgane, sie wird auch von diesen reflectirt. Diese Reflexion findet auch zwischen verschiedenen Empfindungsnerven statt. Daher sind wir im Stande, die Thätigkeit eines Empfindungsnerven, der unserer Behandlung nicht zugänglich ist, wie des Gehörnerven, des Gesichtsnerven, durch Reizung anderer, ihm physiologisch und in Hinsicht des Ursprunges verwandter Empfindungsnerven anzuregen. Hierauf gründet sich die Behandlung der Schwerhörigkeit, der Amblyopie mit Hautreizen u. s. w. Durch die Reflexion von den Empfindungsnerven auf die Bewegungsnerven vermittelst des Gehirns und Rückenmarkes heilen wir zuweilen örtliche Lähmungen einzelner Nerven, z. B. des N. facialis, die Ptosis palpebrarum durch Reizung der Gesichtsnerven u. s. w. Bei allen diesen seit langer Zeit erprobten Heilversuchen, die unter I. und II. erwähnt worden, zeigt sich jetzt schon die innigste Durchdringung unserer physiologischen und praktischen Kenntnisse. Welcher Fortschritt liegt in der Erkenntniss, dass man und warum man durch künstlich erregte Empfindungen wohlthätig auf Bewegungen wirken kann!

III. Sympathien der paarigen Nerven. Dahin gehören vorzüglich die paarigen Sinnesnerven, wie die beiden Optici, die Acustici, die Olfactorii, und die Nerven des Ciliarsystems.

Bei einer primären Affection des einen Auges, wo die Reizung ursprünglich nur auf dieses eingewirkt hat, erfolgt zuweilen Erkranken des andern Auges an derselben Krankheit. Ist ein Auge durch Entzündung zerstört worden, so wird zuweilen auch das andere ergriffen und zerstört. Die Affectionen des innern Ohres bleiben nicht immer isolirt. Ist erst das eine Ohr taub geworden, so wird es auch oft das andere. Die Sympathien der Bewegungsnerven des Auges und namentlich der Ciliarnerven sind bekannt genug. Die gleiche Oeffnung der Pupille beider Augen bei den verschiedensten äusseren Einflüssen auf das eine und andere, ist auch in der Gesundheit von dieser Sympathie bedingt. Diese Sympathien der paarigen Nerven äussern sich sehr häufig in den sogenannten Neuralgien, in den schmerzhaften Affectionen der Nerven. In Folge des nervösen Gesichtsschmerzes auf der einen Seite wird zuweilen auch der entsprechende Nerve der andern Seite

Digitized by Google

afficirt. Der Zahnschmerz, der seinen Grund in einem cariösen Zahne hat, wird nicht allein an der Stelle der Reizung, sondern zuweilen auch in dem entgegengesetzten paarigen Nerven gefühlt.

IV. Sympathieen der Bewegungsnerven unter einander. Die hieher gehörigen, äusserst zahlreichen Phänomene der Association der Bewegungen oder Mitbewegungen, wodurch die Intention zu einer Bewegung auch andere Bewegungen unwillkührlich hervorruft, sind schon oben p. 692. erläutert und erklärt worden.

V. Sympathieen der Empfindungsnerven. Die Sympathien der Empfindungsnerven zeigen uns vorzüglich drei Formen, welche bloss durch die Ausdehnung und Entfernung der in Consensus gezogenen Theile verschieden sind.

a. Im ersten Falle breitet sich eine heftige Empfindung, die an einer einzigen Stelle erregt worden, in Nerven derselben Art, oder in anderen Nervenfasern desselben Nerven aus; wie bei der durch eine ganz örtliche heftige Verbrennung entstehenden Irradiation der Empfindungen in die benachbarten Hautstellen. Die Erklärung dieser Erscheinungen ist schon oben bei der Lehre von der Irradiation behandelt worden.

b. Im zweiten Falle zieht der eine Empfindungsnerve einen Empfindungsnerven anderer Art, aber in demselben Organe in Affection. Diese Art von Sympathie beobachten wir vorzüglich zwischen den eigentlichen Sinnesnerven und den sogenannten Hülfsnerven der Sinnesorgane. Ausser den eigenthümlichen Sinnesempfindungen eines Sinnesorganes kommen nämlich in jedem Sinnesorgane auch noch die allgemeinen Empfindungen des Gefühls für Widerstand, Wärme, Kälte, Wollust, Schmerz in ihm, aber durch andere Nerven vor. Im Auge ist der N. opticus nur der Lichtempfindung, nach Magendie nicht der Gefühlsempfindung fähig; dagegen besitzt das Auge in den Zweigen vom ersten Aste des N. trigeminus, die sich in der Conjunctiva verbreiten, und in den Ciliarnerven auch Gefühlsempfindung; diese sind also die Hülfsnerven des Auges. Das Gehörorgan besitzt ausser dem N. acusticus, die vom N. facialis, glossopharyngeus, sympathicus, Ram. secundus und tertius N. trigemini und Ganglion oticum, in der Trommelhöhle sich verbreitenden Hilfsnerven, wovon ausführlicher in der speciellen Physiologie der einzelnen Nerven. Von diesen in der Schleimhaut der Trommelhöhle sich verbreitenden Nerven, und von den zahlreichen Nerven des äussern Ohrs und äussern Gehörganges rührt offenbar die Gefühlsempfindung des Gehörorganes her. Die Nase ist nicht allein der Sitz des Geruchs durch die Geruchsnerven, welche nach Magendie keiner Gefühlsempfindung fähig sind, sondern auch lebhafter Gefühlseindrücke durch die N. nasales vom zweiten Aste des N. trigeminus fähig, wohin die Empfindungen von Widerstand, Wärme, Kälte, Kitzel, Schmerz u. s. w. in der Nase gehören. Die Zunge ist sowohl der Geschmacksempfindung als der Gefühlsempfindung fähig, wie jedem bekannt ist.

In jedem Sinnesorgane kann die eine Art dieser Empfindungen aufgehoben seyn, während die andere verharrt. Die Sinnesnerven und Gefühlsnerven der Sinnesorgane sind nun einer sehr

Digitized by Google

lebhaften sympathischen Action fähig. Hieher hat man unter anderen auch die nach Verletzung des N. frontalis zuweilen beobachtete Blindheit gerechnet, von der es jedoch noch zweifelhaft ist, ob sie hieher gehört. Man glaubt, dass die Verletzung des Nervus frontalis auf den Stamm des Nervus ophthalmicus zurückwirke, der auch den N. naso-ciliaris abgiebt, welcher letztere die lange Wurzel des Ganglion ciliare bildet. Allein die Ciliarnerven können nur die Iris lähmen, nicht die Retina, mit welcher sie in keiner Verbindung stehen. Viel naturgemässer scheint mir die consecutive Blindheit nach Contusionen der Stirngegend von der Erschütterung des Auges und Sehnervens erklärt zu werden. Der treffliche v. Walther scheint mir zu weit gegangen zu seyn, wenn er so viel Gewicht auf das Ciliarnervensystem bei den Amaurosen und Amblyopieen legte. Viele andere Erscheinungen zeigen uns aber unzweideutige Beweise von Wechwirkung der Sinnesnerven, wie die Empfindung des Kitzels in der Nase nach dem Sehen in die Sonne, die Empfindungen von Schauder, Rieseln nach gewissen Tönen u. s. w. bezeugen. Wie diese Erscheinungen zu erklären sind, ist nach den in der Mechanik der Nerven aufgestellten Grundsätzen nicht sehr zweifelhaft. Da uns zuverlässig erwiesene Verbindungen dieser Sinnesnerven mit jenen Hülfsnerven durch den N. sympathicus nicht bekannt sind, so müssen diese Phänomene auch nur durch das Gesetz der Reflexion, nämlich durch Vermittelung des Gehirns zwischen der centripetalen Erregung, z. B. des Sehnerven und der Rückwirkung auf die Nasennerven beim Niesen und Gefühl von Kitzel in der Nase nach dem Sehen in die Sonne, erklärt werden. Tiedemann hat in der von ihm gegebenen vollständigen Darstellung aller Sympathieen der Sinnesorgane (*Zeitschr. für Physiologie. I.* 237.) die Thatsache hervorgehoben, dass alle Sinneswerkzeuge Zweige von dem sympathischen Nerven erhalten. Diess ist nicht zu läugnen; zur Erklärung der Sympathieen der Sinnesnerven mit anderen Empfindungsnerven ist aber erforderlich, dass nicht das Sinnesorgan überhaupt, welches ein sehr zusammengesetzter Theil von juxtaponirten Geweben ist, sondern der Sinnesnerve selbst eine solche Verbindung eingehe. Nun hat man zwar auch solche Verbindungen beschrieben. Tiedemann selbst beobachtete Zweige der Ciliarnerven, welche die Art. centralis retinae bis auf die Netzhaut begleiten; diess ist aber noch keine Verbindung des Sehnerven, oder der Retina mit dem N. sympathicus. Hirzel (Tiedemann's *Zeitschrift I.* 229.) beobachtete mehrmal eine Verbindung zwischen dem Ganglion sphenopalatinum und dem Sehnerven. Arnold verfolgte einen solchen Faden nur bis in die Scheide des Sehnerven, und laugnet die Verbindung mit diesem selbst. Varrentrapp (*observ. anat. de parte cephalica N. sympathici. Francof.* 1831.) sah diesen Faden nicht. Wenn aber auch der N. sympathicus wirklich einen Faden an den Sehnerven abgäbe, so lässt sich daraus auch noch nicht viel erklären; denn zu einer vollständigen Wechselwirkung, wie sie bei den Sympathieen stattfinden müsste, müsste dieser Verbindungsfaden des N. sympathicus mit allen im Sehnerven enthaltenen

Digitized by Google

Fasern sich verbinden; die Verbindung mit einer oder einigen Fasern würde nicht hinreichen. Dasselbe lässt sich von dem Gehörorgane bemerken. Koellner, Swan, Arnold, Varrentrapp beobachteten eine Verbindung des Nervus facialis und acusticus im Innern des meatus auditorius internus. Nach Arnold (*der Kopftheil des vegetat. Nervensystems. Heidelb.* 1831. *p.* 83.) ist diese Verbindung eine doppelte. Die eine gehört dem N. sympathicus an. Es geht nämlich vom Knie des N. facialis ein vom N. sympathicus abgeleiteter Faden zum N. acusticus. Beim Kalbe bildet dieser Faden auf dem Grunde des Meatus auditorius ein Knötchen. Mir scheint diese Anordnung, welche beim Kalb sehr deutlich ist, bestimmte organische Fäden ins Innere des Labyrinthes zu schicken. Wie denn auch die organischen zur Trommelhöhle gehenden Fäden der Jacobson'schen Anastomose wahrscheinlich den organischen Functionen, z. B. der Schleimabsonderung dienen mögen. Die zweite Verbindung des N. facialis und acusticus führt einen Faden der kleinern Portion des N. facialis zum Hörnerven. Da beide Nerven schon am Ursprung durch mehrere Nervenfädchen zusammenhängen, so kann jener Verbindungsfaden, als zum acusticus gehörig, aber mit dem facialis verlaufend angesehen werden. Eine ähnliche Bedeutung hat der Ramus acusticus accessorius vom facialis bei den Vögeln und bei den Cyclostomen.

Dasselbe, was von dem Verhältniss der Sinnesnerven zu ihren Hülfsnerven bemerkt wurde, gilt von den entfernteren Sympathieen der Sinnesorgane mit den Abdominaleingeweiden. Man hat zuweilen in Störungen der Verrichtungen der Unterleibseingeweide Amblyopie, Ohrenbrausen u. s. w. beobachtet; auch diese Wechselwirkungen erklären Viele durch den Antheil des N. sympathicus an den Verrichtungen der Sinnesorgane, da doch diese Erscheinungen viel leichter aus der Impression, welche die Veränderungen der Unterleibsnerven auf die Centralorgane machen, und aus der Rückwirkung der letzteren auf die Sinnesorgane erklärt werden. Man kann diese Veränderungen der Sinnesorgane in Unterleibskrankheiten nicht so isolirt betrachten; oft zeigt sich das ganze Nervensystem mit alterirt; hartnäckige Cephalalgieen sind der Affection der Sinnesorgane vorausgegangen oder noch vorhanden, das Gemeingefühl der gesammten Sensationsnerven, der Rückenmarksnerven ist alterirt.

Nachdem wir die verschiedenen Formen der Sympathieen zergliedert haben, ist es nöthig, noch einen Blick auf die Anwendung zu werfen, welche die Therapie von den Sympathieen macht. Die Lehre von der Statik des Consensus belehrt uns, wie wir uns hüten müssen, den krankhaften Zustand des Organes *A* durch Wirkungen auf das Organ *B* zu verstärken; sie zeigt uns aber auch die Mittel, den Zustand des unzugänglichen Organes *A* durch angemessene Veränderung des Organes *B* mit zu verändern. Die hieher gehörigen Heilmethoden haben den Namen der Ableitung und Gegenwirkung erhalten, indem sie durch die künstliche Veränderung des einen Organs einen Zustand in

Digitized by Google

einem andern Organe zu entfernen beabsichtigen. Die hieher gehörigen Fälle sind folgende:

1) Erhöhung der Thätigkeit des krankhaften Theiles *A* durch künstliche Erhöhung der Thätigkeit des sympathischen Theiles *B*.

2) Verminderung der Irritation des Theiles *A* durch Erschlaffung des sympathischen Theiles *B*.

Dieser Erfolg darf am meisten bei den Nervensympathieen erwartet werden, besonders überall, wo die Gesetze der Reflexion von Empfindungsnerven auf das Gehirn und Rückenmark, und von dort wieder auf die motorischen Nerven in Betracht kommen. Die ganze peripherische Ausbreitung der Hautnerven giebt dem Arzt ein grosses Feld der mittelbaren Einwirkung auf das Gehirn und Rückenmark. So erhöht die Thätigkeit der peripherischen Nervenenden in der Haut durch Friction, Elektricität, Moxen, kalte Bäder, Senfteige u. s. w. erzeugt, die Thätigkeit der Centralorgane; die Erschlaffung der peripherischen Nervenenden in der Haut durch laue Bäder wirkt besänftigend auf die Irritation der Centralorgane.

3) Verminderung der krankhaften Absonderung des Theiles *A* durch Vermehrung der Absonderung des Theiles *B*, oder durch Erzeugung einer ähnlichen Absonderung in dem Theile *B*. In diesem Falle ist die Wirkung ganz die entgegengesetzte des vorhergehenden Falles. Dort erzeugte die Wirkung auf *A* die gleiche in *B*. Hier erzeugt die Wirkung auf *A* die entgegengesetzte in *B*. Dieser Widerspruch erklärt sich aus dem schon p. 470. erläuterten Antagonismus der verschiedenen Absonderungen. Jede Vermehrung der Absonderung muss als Entziehung aus der Masse der Säfte betrachtet werden, und modificirt also das Gleichgewicht der Vertheilung der Säfte. Auf diese Art ist die Wirkung der Blasenpflaster, Fontanellen bei der Disposition innerer Theile zu krankhaften Ablagerungen, die Wirkung der Diuretica bei den Wassersuchten u. a. zu betrachten. Es ist nur zu bemerken, dass eine künstliche Absonderung auf einer Schleimhaut die krankhafte einer andern Schleimhaut, also desselben Gewebes, nicht leicht vermindert, weil innerhalb desselben Gewebes ähnliche Zustände sich zu verstärken streben. Vgl. p. 761.

4) Verminderung der Congestion von Blut in dem Organe *A* durch eine künstlich erregte Congestion *B*; wie bei der Wirkung der heissen Fussbäder. Dieser Fall gleicht dem vorhergehenden und widerspricht den beiden ersten; erklärt sich aber auf dieselbe Weise.

5) Verminderung des Zustandes x in dem Theile *A* durch künstliche Erzeugung eines davon verschiedenen Zustandes y in dem Theile *B* desselben Gewebes. Eine Methode, der wir uns häufig mit dem grössten Erfolge bedienen. Absonderung und Entzündung sind besonders in einem absondernden Theile fast als entgegengesetzte Zustände zu betrachten. Die Entzündung hebt immer die natürlichen Absonderungen auf. Daher die Entzündung der Schleimhaut des Rachens mit Erfolg durch künstlich erregte Diarrhoe behandelt wird. Es lässt sich diese Methode eben so auf verschiedene Gewebe anwenden. Eine Diar-

Digitized by Google

hoe vermindert die Congestion zu dem Kopfe. Dieser Fall gehört jedoch dann schon unter das bei 4. aufgestellte Verhältniss.

6) Verminderung des Zustandes x in dem Organ A durch Erzeugung desselben Zustandes x in dem Organe B. Dieser Fall scheint den meisten vorher ausgeführten zu widersprechen, und ist die Erklärung desselben sehr schwer. Wollte man ganz in der Nähe eines entzündeten Theiles eine künstliche Entzündung bewirken, so würde die erste dadurch nicht vermindert, sondern vermehrt werden, zumal in Theilen desselben Gewebes, welche Affinität zur Mittheilung haben. Und dennoch beschränkt zuweilen eine in einer gewissen Entfernung von dem entzündeten Organe A erregte Entzündung des Organes B die erstere. Man behandelt Augenentzündungen durch künstlich erregte Hautentzündungen in einiger Entfernung vom Auge. Man erregt Hautentzündungen in Gelenkkrankheiten u. s. w. Der Erfolg dieser Methode scheint zu beweisen, dass zwischen den Reizungszuständen der Capillargefässe zweier Organe, besonders wenn sie verschiedenen Gewebes sind, nicht dasjenige Reflexionsverhältniss herrscht, welches wir so deutlich in den unter 1. und 2. erläuterten Fällen zwischen peripherischen und centralen Theilen beobachten, wo die Reizung der peripherischen Nervenzweige die Reizung der Centralorgane nicht aufhebt, sondern auch die Thätigkeit der letzteren erhöht.

IV. Abschnitt. Von den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Nerven.

I. Capitel. Von den Sinnesnerven.

Man hat die Nerven immer als Leiter für die Wechselwirkung unserer Organe mit der Aussenwelt angesehen, und so betrachteten die Aerzte die Sinnesnerven als blosse Leiter für die Qualitäten der äusseren Dinge, so dass die Nerven gleichsam passiv die Eigenschaften der Körper dem Bewusstseyn überbringen sollten, ohne etwas an den Eindrücken von diesen Qualitäten zu verändern. In der neuern Zeit haben die Physiologen angefangen, diese Vorstellungen von passiver Leitung der Eindrücke durch die Nerven zu analysiren. Sind die Nerven bloss passive Leiter für die Eindrücke des Lichtes, der Tonschwingung, der Riechstoffe: wie kömmt es, dass derjenige Nerve, welcher die Riechstoffe riecht, nur für diese Art von Eindrücken empfänglich ist, für andere nicht, und dass ein anderer Nerve hinwieder die Riechstoffe nicht riechen kann; dass der Nerve, welcher die Lichtmaterie oder die Oscillationen derselben empfindet, die Oscillationen der schallleitenden Körper nicht empfindet, und der Gehörnerve für das Licht, der Geschmacksnerve für die

Digitized by Google

Gerüche unempfindlich ist, der Gefühlsnerve die Schwingungen der Körper nicht als Ton, sondern als Gefühl von Erzitterungen empfindet. Diese Betrachtungen haben die Physiologen genöthigt, den einzelnen Sinnesnerven eine specifische Empfänglichkeit für gewisse Eindrücke zuzuschreiben, vermöge welcher sie nur Leiter für gewisse Qualitäten, nicht aber für andere seyn sollten.

Die Vergleichung der Thatsachen mit dieser Erklärung, an welcher man noch vor 10 und 20 Jahren nicht im geringsten zweifelte, zeigte aber bald, dass sie unbefriedigend ist. Denn dieselbe Ursache kann auf alle Sinnesorgane zugleich einwirken, wie die Elektricität; alle sind dafür empfänglich, und dennoch empfindet jeder Sinnesnerve diese Ursache auf eine andere Art; der eine Nerve sieht davon Licht, der andere hört davon einen Ton, der andere riecht, der andere schmeckt die Elektricität, der andere empfindet sie als Schmerz und Schlag. Ein Nerve sieht von mechanischem Reiz ein leuchtendes Bild, der andere hört davon Brausen, der andere empfindet Schmerz. Der vermehrte Reiz des Blutes erregt in dem einen Organe spontane Lichtempfindungen, in dem andern Brausen, in dem andern Kitzel, Schmerz u. s. w. Wer die Nothwendigkeit fühlte, die Consequenzen dieser Thatsachen durchzudenken, musste einsehen, dass die specifische Empfänglichkeit der Nerven für gewisse Eindrücke nicht hinreicht, da alle Sinnesnerven für dieselbe Ursache empfänglich, dieselbe Ursache anders empfinden; und so lernten Einige einsehen, dass ein Sinnesnerve kein bloss passiver Leiter ist, sondern dass jeder eigenthümliche Sinnesnerve auch gewisse unveräusserliche Kräfte oder Qualitäten hat, welche durch die Empfindungsursachen nur angeregt und zur Erscheinung gebracht werden. *Die Empfindung ist also nicht die Leitung einer Qualität oder eines Zustandes der äusseren Körper zum Bewusstseyn, sondern die Leitung einer Qualität, eines Zustandes unserer Nerven zum Bewusstseyn, veranlasst durch eine äussere Ursache.* Wir empfinden nicht das Messer, das uns Schmerz verursacht, sondern den Zustand unserer Nerven schmerzhaft; die vielleicht mechanische Oscillation des Lichtes ist an sich keine Lichtempfindung; auch wenn sie zum Bewusstseyn kommen könnte, würde sie das Bewusstseyn einer Oscillation seyn: erst dass sie auf den Sehnerven als den Vermitteler zwischen der Ursache und dem Bewusstseyn wirkt, wird sie als leuchtend empfunden; die Schwingung der Körper ist an sich kein Ton: der Ton entsteht erst bei der Empfindung durch die Qualität des Gehörnerven, und der Gefühlsnerve empfindet dieselbe Schwingung des scheinbar tönenden Körpers als Gefühl der Erzitterung. Wir stehen also bloss durch die Zustände, welche äussere Ursachen in unseren Nerven erregen, mit der Aussenwelt empfindend in Wechselwirkung.

Diese Wahrheit, welche sich aus einer einfachen und unbefangenen Zergliederung der Thatsachen ergiebt, führt uns nicht allein zur Erkenntniss der eigenthümlichen Kräfte der verschiedenen Empfindungsnerven, abgesehen von ihrem allgemeinen Unterschiede von den motorischen Nerven, sondern zeigt uns auch

Digitized by Google

den Weg, eine Menge von irrthümlichen Vorstellungen über die Fähigkeit der Nerven, einander zu ersetzen, aus der Physiologie ein- für allemal zu verbannen. Man weiss längst, dass Blinde die Farben mit den Fingern *nicht* als Farben erkennen können; aber wir sehen nun die Unmöglichkeit davon aus Thatsachen ein, welche erklärend für viele andere Thatsachen sind. Wie sehr sich auch das Gefühl der Finger bei einem Blinden durch Uebung steigern mag, es bleibt immer Qualität der Gefühlsnerven, Gefühl.

Hieraus widerlegen sich auch die oft noch gangbaren Vorstellungen von Compensation des N. opticus durch den N. trigeminus, des N. olfactorius durch denselben u. dergl.

Einigen Thieren mit Augen hat man den N. opticus abgesprochen, und die Gesichtsempfindung durch den Ram. ophthalmicus n. trigemini geschehen lassen, wie beim Maulwurf und Proteus anguinus. Diess beruht indess beim Maulwurf auf nicht hinreichend genauer Untersuchung, und wahrscheinlich ist es eben so beim Proteus. Der Maulwurf besitzt einen ungemein feinen Sehnerven und ein sehr zartes Chiasma. n. opticorum, wie mir Dr. Henle gezeigt hat. Von den Cetaceen hat man gesagt, dass der Geruchsnerve, welcher nach Blainville, Mayer, Treviranus äusserst fein und rudimentär, aber doch vorhanden ist (Treviranus *Biologie V.* 342.), durch die Nasaläste des N. trigeminus ersetzt werde. Wie wenig diese Annahme gerechtfertigt ist, geht aus der Bemerkung hervor, dass wir nicht den entferntesten Beweis haben, dass die Cetaceen riechen. Magendie glaubte zeigen zu können, dass der N. olfactorius gar nicht Geruchsnerve sey, und dass der Geruch den N. nasales des N. trigeminus zugetheilt werden müsse. *Journal de physiol. T. IV.* 169. Er bemerkte, dass die Zerstörung der Geruchsnerven die Empfindung für Essigsäure, flüssiges Ammonium, Lavendelöl, Dippelsöl, welche in die Nase gebracht worden, nicht aufhebt, indem die Thiere die Nase mit den Füssen rieben und niessten. Diess beweist, wie Eschricht (*Diss. de funct. primi et quinti paris in olfactorio organo.* Magendie *Journal de physiol. T. VI. p.* 339.) zeigt, und jeder leicht einsieht, dass die Geruchsnerven eben nur die Geruchsnerven und nicht die Gefühlsnerven der Nase sind. Denn alle die genannten Stoffe erregen auch das allgemeine Gefühl der Nasenschleimhaut, welches von den Nasalästen des N. trigeminus abhängt. Fleisch erregt nur die Geruchsempfindung, und hier gesteht Magendie selbst, dass, wenn einem Hunde ein in Papier gewickeltes Stück Fleisch hingelegt wurde, nachdem ihm die N. olfactorii zerstört worden, er diess nicht bemerkte. Dass der Geruch bei Mangel der Geruchsnerven oder nach Zerstörung derselben bei Menschen fehlte, haben die Fälle von Rudius, von Rolfink, Magnenus und Oppert, von Balonus, Loder und Serres gezeigt. Vergl. Eschricht a. a. O. Backer *comment. ad quaest. physiol. Traject.* 1830. Dagegen wollen Mery, Berard bei Verhärtung der Geruchsnerven oder der vorderen Lappen des Gehirns Geruch bemerkt haben. Mery *hist. de l'anat. et chirurg. par* Portal. *T. III. p.* 603. Magendie *Journal. T. V.* 17.

Digitized by Google

Aber wer steht uns dafür, dass diese Männer sich nicht eben so, wie Magendie getäuscht, und die Gefühlsempfindungen der Nase mit den Geruchsempfindungen verwechselt haben.

Sonst nahm man an, dass der Gehörnerve bei den Fischen von dem N. trigeminus ersetzt werde. Noch Scarpa und Cuvier glaubten diess. Diess haben Treviranus und E. H. Weber widerlegt. Bei einigen Fischen geht nach Weber (*de aure et auditu. Lips.* 1820.) ein Faden vom N. trigeminus zum N. acusticus, wie bei Silurus glanis und Muraena anguilla. Es giebt aber nach Weber einen Hülfsnerven des Gehörorganes, der bald selbstständig vom Gehirn, bald vom N. trigeminus oder vom N. vagus zu entspringen scheint, und zur Ampulla des hinteren Kanales und zum Sacke geht. Die Rochen haben einen vom Gehirn selbst entspringenden N. accessorius nervi acustici. Nach Buechner (*mém. de la soc. d'hist. nat. de Strasb. T. II. livr.* 2.) ist der N. acusticus accessorius einiger Knochenfische für den Steinsack und die hintere Ampulle auch nicht ein Ast anderer Nerven, sondern ein besonderes Bündel aus der Medulla oblongata. Bei der Petromyzon beobachteten Schlemm und D'Alton einen N. acusticus accessorius zum Labyrinth aus dem Facialis, denselben beobachtete ich bei den Myxinoiden. Man muss auf die Beobachtung, dass der Nervus acusticus accessorius zuweilen von anderen Nerven entspringt, auch nicht zu viel Werth legen. Diess ist wohl nur ein juxtaponirtes Fortgehen ganz verschiedener Fasern, so wie wir in dem N. lingualis des Menschen, welcher wirklich Geschmacks- und Gefühlsnerve der Zunge zugleich ist, das Zusammenliegen ganz verschiedener Geschmacks- und Gefühlsfasern voraussetzen müssen. Daher geht auch aus der von Treviranus (Tiedemann's *Zeitschrift. V.*) beobachteten Varietät für die Physiologie nichts hervor, dass nämlich bei einigen Vögeln der N. vestibuli ein Ast des N. facialis seyn soll. Bei der Gans ist der N. vestibuli ein Ast des eigentlichen N. acusticus, und der N. facialis geht nur dicht über ihn hin. Was könnte überhaupt eine Juxtaposition von functionell verschiedenen Fasern in einer Scheide für die Physiologie beweisen?

Der Geschmacksnerve scheint nie als besonderer Nerve aufzutreten, und seine Fasern vielmehr nur in anderen Nerven eingeschlossen zu seyn. Wahrscheinlich gehören hieher sowohl der Zungenast als die Gaumenäste des Trigeminus. Denn Gaumen und Zunge haben Geschmack. Käse, den Gaumen allein berührend, wird deutlich geschmeckt. Selbst im Schlunde finden die dem Geschmack verwandten Empfindungen des Ekels statt.

Nach Verletzung des N. trigeminus in Krankheiten hat man Verlust des Geschmacks beobachtet. Parry *Elem. of pathol. and therap. V.* 1. Mueller's *Archiv.* 1834. *p.* 132. Magendie machte dieselbe Beobachtung nach Durchschneidung des N. lingualis, damit stimmen auch die Versuche von Mayo und diejenigen, welche ich mit Prof. Gurlt und Dr. Kornfeld anstellte.

Nach Panizza (*Richerche sperimentali sopra i nervi. Pavia* 1834.) dauert hingegen der Geschmack der Thiere nach Durchschnei-

Digitized by Google

dung des N. lingualis fort, indem sie Brot, Milch, Fleisch mit Coloquinten oder Quassia zwar zu fressen versuchen, aber sie sogleich verschmähen, während sie nach Durchschneidung des N. glossopharyngeus auch Bitterkeit verschlucken. Panizzaen betrachtet daher den N. lingualis als blossen Gefühlsnerven, den N. glossopharyngeus als Geschmacksnerven.

Jedenfalls kann der N. glossopharyngeus kein blosser Empfindungsnerve seyn, denn seine Wurzel ist gemischt, zum Theil gangliös, zum Theil nicht gangliös und er verbreitet sich zum Theil in einem blossen Muskel, im M. stilopharyngeus. Dann machen auch neuere Versuche die Theorie von Panizza zweifelhaft.

War nach Durchschneidung des N. lingualis noch Geschmack vorhanden, so konnte er von den Gaumenästen des N. trigeminus abhängen. In den Versuchen von Gurlt, Kornfeld und mir war nach Durchschneidung des N. glossopharyngeus ganz deutlicher Geschmack vorhanden. Dergleichen Versuche sind sehr schwierig und es sind mancherlei Täuschungen dabei möglich. Pferde und Hunde fressen das mit den grössten Bitterkeiten impraegnirte Futter, selbst wenn alle ihre Nerven unversehrt sind, sobald sie hungrig sind. Nicht daran, dass sie Bitteres fressen, sondern daran, wie sie es fressen, kann man den Mangel oder das Vorhandenseyn des Geschmacks erkennen. Siehe Kornfeld *de functionibus nervorum linguae experimenta. Berol.* 1836. Auch die Versuche von Alcock sind der genannten Theorie nicht günstig. *Lond. med. gaz.* 1836.

Der N. lingualis ist übrigens auch der Gefühlsempfindung fähig und von ihm hängen wie zugleich vom N. glossopharyngeus die Tast- und Gefühlsempfindungen der Zunge ab. Die Durchschneidung des N. lingualis ist sehr schmerzhaft, wie Magendie, Desmoulins und ich beobachteten. Vielleicht sind besondere Fasern für die Geschmacksempfindungen und Gefühlsempfindungen im N. lingualis juxtaponirt. Zum Gefühlsantheil kann jedenfalls die Chorda tympani gerechnet werden.

Die Geschmacksfasern können sich sehr verschiedenen Nerven anschliessen. Bei den Vögeln ist der Geschmacksnerve ein Ast des Nervus glossopharyngeus, bei den Fröschen ein Ast des Nervus vagus.

Nach der Durchschneidung des Stammes des Nervus trigeminus in der Schädelhöhle will Magendie bemerkt haben, dass fast alle Sinnesfunctionen aufgehört haben. *Journ. de physiol. IV.* 302. Dass das Sehvermögen erloschen seyn sollte, schloss Magendie daraus, dass das Thier das Licht der Lampe nicht bemerkte. Allein Kaninchen reagiren hiergegen oft nicht, ohne dass man den Nervus trigeminus darum zu zerschneiden braucht. Auch gesteht Magendie selbst, dass beim Einfallen von Sonnenlicht in einen dunkeln Raum die Augenlieder des Thieres sich schlossen, und noch deutlicher bemerkte man diess, als das Licht durch eine Linse gesammelt ins Auge einfiel. Magendie beweist nun durch Experimente an Thieren, was wir leider aus so vielen Erfahrungen an Menschen wissen, dass nach der Lähmung des N. opticus der N. trigeminus nicht

Digitized by Google

das Licht empfinden kann; allein Magendie meint, die Sensibilität des N. trigeminus sey wenigstens behülflich und nöthig für die volle Sehkraft des Nervus opticus. Magendie glaubte auch, dass der N. trigeminus zum Hören nöthig sey. Wenn ein Thier nach Durchschneidung eines so ungeheuren Nerven, als der N. trigeminus ist, nicht sogleich noch für andere Reizversuche aufgelegt ist, so beweist dies nichts weiter, als eine sehr grosse vorausgegangene Verletzung. Wir wissen ja, dass nach Durchschneidung grosser Nervenstämme wie des N. opticus selbst schlimme Nervenzufälle entstanden sind. Nach meiner Ansicht hat der N. trigeminus durchaus keinen Einfluss weder auf das Sehen, noch das Hören und Riechen. Bei einem Epileptischen, der an einer Augenentzündung und Verdunkelung der Cornea rechter Seite litt, und bei dem das Sehen auf diesem Auge aufhörte, hernach auch die Augenlieder, Nase und Zunge rechts unempfindlich und das rechte Ohr taub wurden, das Zahnfleisch scorbutisch wurde, beobachtete Serres eine Entartung der Portio major N. trigemini bis zur Pons Varolii. Magendie *Journ. de physiol. V.* 232. Allein die Blindheit war eine Folge der Verdunkelung der Cornea. Alle übrigen Veränderungen der Sinne werden mit den Convulsionen der rechten Seite aus der Degeneration des Gehirns erklärbar. Die Consequenzen aus diesem Falle werden übrigens ganz durch einen andern Fall von Entartung des ganzen Stammes des N. trigeminus widerlegt, in welchem Unempfindlichkeit der ganzen linken Kopfseite, der Nase, Zunge, des Auges, bei vollem Sehvermögen stattfand. Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie.* 1834. p. 132.

II. Capitel. Von den Eigenthümlichkeiten anderer Nerven.

Augennerven.

Ob der N. oculomotorius, abducens und trochlearis ausser ihrer motorischen Kraft auch sensibel sind, ist noch unbekannt. Desmoulins behauptet, dass sie gezerrt, gequetscht keinen Schmerz verursachen. Allein die Entscheidung bei so kleinen Nerven ist schwierig unter vorausgegangenen starken Verletzungen zur Blosslegung dieser Nerven. Der N. oculomotorius versieht den Musculus levator palpebrae sup., den obern und untern graden Augenmuskel, den graden innern und den schiefen untern, und giebt durch den Nervenzweig des untern schiefen Augenmuskels die kurze Wurzel des Ganglion ciliare ab, während die lange Wurzel vom N. nasalis herkommt, welche letztere auch einen Faden vom Plexus cavernosus des N. sympathicus erhält.

Eine besondere Betrachtung verdient der Einfluss des N. oculomotorius und nasociliaris auf die Iris. Desmoulins führt an, dass nach den Erfahrungen von Fowler, Reinhold und Nysten der Galvanismus durch das dritte Paar Contraction der Iris bewirke. Dass der N. oculomotorius durch die kurze Wurzel des Ganglion ciliare die Bewegungen der Iris bestimmt, und dass die

Digitized by Google

lange Wurzel vom N. nasociliaris trigemini hieran keinen Antheil hat, ist durch Mayo's schöne Untersuchungen erwiesen. *Anatomical and physiological commentaries. London* 1823. Magendie *Journal de Phys. T.* 3. *p.* 348.

Folgendes sind die Resultate der Versuche an 13 lebenden Tauben angestellt, von denen wir aus Muck (*De ganglio ophthalmico. Landish.* 1815.) wissen, dass sie zwei Wurzeln des Ganglion ciliare, eine vom N. oculomotorius, die andere vom N. trigeminus haben.

1) Die Durchschneidung des N. opticus in der Schädelhöhle bewirkt die Erweiterung der Pupille, die sich nicht mehr zusammenzieht, ohngeachtet des heftigen Lichtreizes. Auch Magendie sah nach Durchschneidung des N. opticus bei Hunden und Katzen Erweiterung der Pupille, und Unbeweglichkeit der Iris. Dagegen bei Kaninchen und Meerschweinchen Unbeweglichkeit und Verengung.

2) Die Section des N. oculomotorius im Schädel einer lebenden Taube bewirkt denselben Erfolg; in beiden Fällen, sowohl nach der Durchschneidung des N. opticus als des N. oculomotorius, behält das Auge seine Sensibilität auf der Oberfläche.

3) Die Section des N. trigeminus in der Schädelhöhle bewirkt keine Veränderung in den Bewegungen der Iris, aber die Oberfläche des Auges verliert ihre Sensibilität (durch die Aeste des N. ophthalmicus, die sich in der Conjunctiva verbreiten).

4) Wenn man den N. opticus in der Schädelhöhle einer lebenden Taube, oder unmittelbar nach der Decapitation mechanisch reizt, zieht sich die Iris jedesmal mit Verkleinerung der Pupille zusammen. (Ist auch von Flourens gesehen.)

5) Wenn man den N. oculomotorius auf dieselbe Art zerrt, hat dasselbe statt.

6) Wenn man das fünfte Paar zerrt, erfolgt keine Veränderung der Pupille.

7) Wenn man die Sehnerven in der Schädelhöhle einer Taube unmittelbar nach der Decapitation durchschneidet, und den Theil der Sehnerven zerrt, der mit dem Auge verbunden ist, erfolgt keine Veränderung der Pupille; wenn man dagegen den Theil des Sehnerven zerrt, der mit dem Gehirn verbunden ist, so erfolgt Verengung der Pupille, eben so als wenn der Nervus opticus nicht durchschnitten wäre.

8) Die Section des fünften Paares bewirkte keine Modification in diesem Erfolge.

9) Nach der Section des dritten Paares im Gegentheil hat die Reizung des Nervus opticus, sey er noch ganz oder durchschnitten, gar keinen Einfluss auf die Pupille.

Aus diesen Versuchen kann man mit Sicherheit schliessen, dass der N. oculomotorius die motorische Kraft dem Ganglion ciliare und den Ciliarnerven ertheilt, dass der Lichtreiz nicht unmittelbar auf die Ciliarnerven wirkt, sondern dass die Irritation der Netzhaut, des Sehnervens auf das Gehirn wirkt, und vom Gehirn auf den N. oculomotorius und die kurze motorische Wurzel des Ganglion ciliare zurückwirkt. Diess geht auch aus der be-

Digitized by Google

kannten Erfahrung hervor, dass das amaurotische Auge, wo die Netzhaut gelähmt ist, die Beweglichkeit der Iris durch Lichtreiz auf das amaurotische Auge verloren hat, dass die Iris dieses Auges sich aber bewegt, wenn das Licht auf das andere gesunde Auge einfällt. Es folgt ferner aus Mayo's Versuchen, dass die allgemeine Sensibilität des Auges vom Nervus trigeminus abhängt, der durch Zweige des Nervus ophthalmicus die Sensibilität der Conjunctiva, durch die lange Wurzel des Ganglion ciliare die Sensibilität im innern Auge bewirkt. Die sympathischen Zweige beherrschen die Ernährung des Auges; wir haben schon gesehen, wie der Nervus sympathicus durch seine Verbindung mit dem Ganglion ciliare Einfluss auf die Ernährung des Auges hat, und nach der Zerstörung des Ganglion cervicale supremum Augenentzündung mit Exsudation folgt. S. oben p. 675. Die Section des Nervus trigeminus hat bei den Kaninchen, Meerschweinchen, Hunden, Katzen, nach Magendie's Versuchen Unbeweglichkeit der Iris zur Folge; und die Pupille ist bei den Hunden und Katzen weit, eng bei den Kaninchen und Meerschweinchen. Desmoulin's *Anat. des syst. nerv. T.* 2. p. 712. Hier muss eine Rückwirkung auf das Gehirn stattfinden.

Wir können uns jetzt mit der Art des Einflusses des N. oculomotorius auf die Bewegung der Iris beschäftigen, worüber ich mehrere eigenthümliche Beobachtungen gemacht habe. Der N. oculomotorius bewirkt häufig eine Contraction der Iris, sobald er willkührlich thätig oder unwillkürlich afficirt ist. Da der N. oculomotorius von den graden Augenmuskeln nur den Rectus externus nicht versieht, so kann man also bei willkührlicher Drehung des Auges nach aussen gewiss seyn, dass der N. oculomotorius nicht thätig ist; bei willkührlicher Drehung des Auges nach innen, dass der N. oculomotorius thätig ist. Man wird sich aber überzeugen, dass die Pupille bei gleicher Lichtintensität kleiner wird, sobald das eine Auge geschlossen ist und das andere ganz nach innen gedreht wird, dass die Pupille grösser wird, sobald das Auge nach Aussen gedreht wird. Hieraus geht unwiderleglich hervor, dass bei jeder willkührlichen Bewegung des Auges, wobei der Zweig des N. oculomotorius zum innern graden Augenmuskel thätig, die Iris mit thätig ist, und dass sie unthätig, die Pupille weit wird, wenn der N. abducens wirkt.

Wird das eine Augen nach aussen, das andere nach innen gedreht, so bemerkt man keine auffallende Veränderung der Pupille, wegen der entgegengesetzten Bedingungen. Convergiren beide Augen stark, so ist die Verengung der Pupille am stärksten, mag man nun einen seitlichen nahen, oder einen geraden nahen Gegenstand betrachten; je mehr die Augen dagegen parallel stehen, und die Musculi recti interni, welche vom Nervus oculomotorius abhangen, unthätig werden, um so weiter wird die Pupille.

Durch den Zusammenhang der motorischen Wurzel des Ganglion ciliare mit dem N. oculomotorius kann man daher die Iris sympathisch willkührlich verändern, d. h. die Iris zieht sich von selbst zusammen, sobald die Willkühr auf den N. oculomotorius al-

Digitized by Google

lein wirkt. Da man nun beim Sehen in der Nähe die Augenachsen convergirt, und die Augen mehr nach innen dreht, beim Sehen in die Ferne mehr von einander entfernt, so wird die Pupille beim Sehen in der Nähe viel enger, beim Sehen in die Ferne viel weiter. Die Bewegungen der Iris bei den Vögeln sind nicht gerade mehr willkührlich als die unseren; die Pupille der Vögel wird sehr eng, wenn man auf sie zugeht und sie in Leidenschaften setzt.

Ich werde nun zeigen, dass nicht allein der schon genannte Zweig des N. oculomotorius zum Musculus rectus internus diesen sympathischen Einfluss auf die Bewegung der Iris hat, sondern auch andere Zweige, namentlich der Zweig, der zum Obliquus inferior geht, dasselbe thun. Der Musculus obliquus inferior rollt das Auge so, dass die Pupille nach oben und einwärts steht. Macht man diese Bewegung willkührlich, so wird die Pupille sehr eng. Diese Bewegung des Auges wird von selbst unwillkührlich im Einschlafen, im Schlaf, in der Trunkenheit und in Nervenzufällen ausgeführt; daher findet man im Schlafe die Pupille eng.

Die im Schlafe verengerte Pupille kann sich übrigens durch die Reizung des Lichtes noch enger zusammenziehen, wie Hawkins bei Mayo aus Beobachtungen berichtet. Beim Erwachen wird die Pupille mit einigen unregelmässigen Contractionen wieder weiter.

Die vergleichende Anatomie bestätigt im Allgemeinen die physiologischen Resultate. Die Ciliarnerven bestehen constant aus Zweigen des N. oculomotorius und des N. nasalis; hiebei finden folgende Verschiedenheiten statt:

1) Zweige vom N. oculomotorius und nasalis verbinden sich als Wurzeln zum Ganglion ciliare. Die Ciliarnerven sind theils Zweige des Ganglion, theils des N. nasalis selbst. So ist es nach Muck's und Tiedemann's ausführlichen und genauen Untersuchungen beim Hund, Hasen, Ochsen, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Schwein, Eule, Taube, Papagey, Gans, Truthahn, Kiebitz, (Schildkröte Bojanus).

2) Das Ganglion gehört zunächst der Wurzel des N. oculomotorius an, und die Ciliarnerven des Ganglions gehen zum Theil zum Auge, und verbinden sich zum Theil schlingenförmig mit den Ciliarnerven des N. nasalis, die auch zum Theil allein zum Auge gehen. So ist es bei der Katze, bei Falken, Reiher, Raben, Hahn, Ente, Mergus und Sterna. Ich halte diesen Fall bloss für eine Varietät des ersten.

3) Beim Kaninchen fand Muck gar keine Verbindung der Radix N. oculomotorii und des N. nasalis, sondern beide Nerven geben einzeln für sich die Ciliarnerven ab. Nach Retzius liegt das Ganglion fast in der Scheide des N. oculomotorius.

4) Desmoulins läugnet die Ciliarnerven des N. nasalis ganz beim Kaninchen, Meerschweinchen und der Wasserratte, so dass der N. oculomotorius allein Ciliarnerven abgäbe. Diese Thiere, wie die Nager überhaupt, sollen auch kein Ganglion haben (?).

5) Es giebt kein Thier mit beweglicher Iris, welches nicht Ciliarnerven vom N. oculomotorius erhielte, und wo der N. nasa-

Digitized by Google

lis allein Ciliarnerven abgäbe. Der N. oculomotorius bleibt immer ein Hauptnerve für die Ciliarnerven, so lange die Iris beweglich ist. Zwar hatten Muck und Tiedemann behauptet, beim Pferde finde weder ein Ganglion statt, noch gebe der N. oculomotorius Ciliarnerven ab, allein Retzius hat sowohl das ausserordentlich kleine Ganglion, als die Verbindung mit den zwei Wurzeln aufgefunden. *Isis* 1827. p. 997. So ist es auch wahrscheinlich ein Irrthum, wenn nach Muck beim Eichhörnchen der N. oculomotorius nichts zu den Ciliarnerven beitragen soll.

6) Bei den Fischen ist die Iris fast durchgängig ganz unbeweglich. Muck und Tiedemann fanden bei Salmo Hucho Ciliarnerven vom N. oculomotorius und nasalis, die sich zum Theil verbinden; beim Karpfen vom N. oculomotorius. Nach Schlemm's und d'Alton's Untersuchungen und Mittheilungen an mich unterscheiden sich die Fische von den übrigen Thieren in Hinsicht der Ciliarnerven nicht. Sie fanden in der Regel die gewöhnlichen beiden Wurzeln. Mueller's *Archiv.* 1837. *LXXVIII.*

7) Bei den Säugethieren verbreitet sich der Nervus abducens auch im Musculus suspensorius und bei den Vögeln in den Muskeln der Nickhaut.

8) Bei den Cetaceen giebt der N. trigeminus nach Rapp und Bruns auch Augenmuskeläste, während die besonderen Augenmuskelnerven auch vorhanden sind. Dasselbe geschieht nach Schlemm und d'Alton bei den Petromyzon.

9) Die Petromyzon haben nach Schlemm nur zwei besondere Augenmuskelnerven, den N. oculomotorius und trochlearis, welche sich in der Augenhöhle verbinden.

10) Den Myxinoiden fehlen der 3., 4. und 6. Hirnnerve mit den Augenmuskeln ganz.

Einfluss des Gehirns auf die Augennerven. Desmoulins und Magendie berichten, dass nach Section der Pedunculi cerebelli ad pontem bei den Säugethieren das Auge der verletzten Seite vorwärts und abwärts, das Auge der andern Seite aufwärts und rückwärts gerichtet wird. Dasselbe Resultat fand sich nach der Section der Pons Varolii.

Nervus trigeminus.

Von der sensibeln und motorischen Portion dieses Nerven ist schon in dem Abschnitte von den Empfindungs- und Bewegungsnerven ausführlich gehandelt und gezeigt worden, dass der erste und zweite Ast dieses Nerven beim Menschen bloss sensorielle Zweige abgeben, der dritte Ast aus beiden Portionen des Nerven gemischt, theils sensorielle, theils motorische Aeste abgiebt, so dass unter die sensoriellen der Ramus alveolaris inferior, temporalis superficialis, lingualis, unter die motorischen der Ramus massetericus, buccinatorius, temporales profundi, pterygoideus, mylohyoideus gehören.

Dieser wichtige Nerve, welcher die Empfindung am vordern und Seitentheil des Kopfes und im Kopftheil der Schleimhäute (Conjunctiva, Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut) unterhält, und

Digitized by Google

durch die Portio minor zugleich der Bewegungsnerve der Kaumuskeln ist, steht durch jeden seiner Hauptäste mit dem N. sympathicus in Verbindung, wodurch den Zweigen dieses Nerven wahrscheinlich organische Fasern eingewebt werden.

1) Die erste dieser Verbindungen ist die des N. nasociliaris mit dem Ganglion ciliare, welches einen Zweig vom N. sympathicus erhält. Beim Ochsen sieht man leicht, dass sich auch organische Fasern in den ersten Ast des Nervus trigeminus von demjenigen Theile des N. sympathicus einmischen, der sich mit dem N. abducens verbindet.

2) Die zweite ist die des zweiten Astes mit dem N. sympathicus, vermittelst des am zweiten Aste befindlichen Ganglion sphenopalatinum, grade da, wo der dem sympathischen System angehörende Ramus petrosus profundus n. vidiani vom carotischen Theile des N. sympathicus kommend, sich mit dem zweiten Aste des N. trigeminus verbindet. Beim Ochsen giebt der Ramus profundus n. vidiani, deutlich vom N. sympathicus kommend, sowohl Fasern zum Ganglion sphenopalatinum, als viele fortlaufende Fasern zu den Zweigen des zweiten Astes. Der Ramus superficialis n. vidiani, welcher vom zweiten Ast des N. trigeminus zum N. facialis geht, scheint ganz anderer Bedeutung zu seyn, als der vom N. sympathicus zum zweiten Aste des N. trigeminus gehende sogenannte Ramus profundus n. vidiani. Arnold hält den Ramus superficialis n. vidiani für einen wirklichen Abgang vom zweiten Aste des N. trigeminus, und eine Beimischung zum N. facialis. Bidder leitet vom N. facialis durch diesen Nerven motorische Fasern für den zweiten Ast des N. trigeminus zu den Gaumenmuskeln ab. Bei den Schlangen giebt, wie ich sehe, ein dem N. facialis vergleichbarer Nerve einen Zweig durch den canalis vidianus, der sich in den Muskeln am Gaumen verbreitet. Bei den Vögeln findet eine Verbindung des N. sympathicus durch einen dem N. vidianus ähnlichen Nerven mit dem ersten Aste in der Orbita, statt mit dem zweiten Aste des N. trigeminus statt. Schlemm.

3) Die dritte Verbindung des N. sympathicus mit dem N. trigeminus ist die des dritten Astes durch das Ganglion oticum. Arnold. *Ueber den Ohrknoten. Heidelb.* 1828. Vergl. Schlemm, Froriep's *Not.* 660. Muellер, Meckel's *Archiv.* 1832. p. 67. Hagenbach *disq. circa musc. auris internae adjectis animadversionibus de ganglio otico. Basil* 1833. Bendz *de anastomosi Jacobsonii et ganglio Arnoldi. Hafn.* 1833. Ueber die ältere Geschichte dieses Knotens und seiner Nerven siehe Mueller's *Archiv.* 1837. p. 284. Es hängt mit dem Stamme des dritten Astes zusammen, und schickt organische Fasern zu den Zweigen des dritten Astes. Nach Bendz hängt dieser Knoten mit den vegetativen Nerven zusammen, welche von dem Ganglion cervicale supremum n. sympathici die Carotis facialis, sofort die Art. maxillaris interna, und dann die Art. meningea media begleiten.

Von dem Ganglion gehen zwei Nerven zur Trommelhöhle, der eine gehört ihm selbst an, der andere ist, wie Schlemm zeigte, zunächst ein Zweig von dem N. pterygoideus internus. Dieser

Digitized by Google

letztere ist der Bewegungsnerve des Musculus tensor tympani, den Comparetti entdeckte, beim Kalbe tritt er durch das Ganglion oticum durch. Der andere Nerve, N. petrosus superficialis minor, welcher vom Ganglion selbst entspringt, dringt in einen eigenen Kanal des Felsenbeines, welcher vor und an der äussern Seite des Aditus canalis Fallopiae liegt, tritt durch diesen Kanal in die Trommelhöhle ein, und verbindet sich mit der Jacobsonschen Anastomose. Er giebt auch einen kleinen Ast zu dem Knie des N. facialis. Diese Anastomose, deren Hauptbogen auf dem Promontorium der Trommelhöhle liegt, verbindet den N. tympanicus ganglii otici mit dem Ramus carotico-tympanicus n. sympathici und dem Ramus tympanicus ganglii petrosi n. glossopharyngei zu einer Schlinge. Der Zweig vom N. glossopharyngeus scheint nicht von diesem Nerven zu kommen, sondern zu ihm hinzugehen, und an der Stelle des Ganglion petrosum ihm organische Fasern einzumischen.

Dieser ganze Apparat von zum Theil organischen Nervenfasern, der vom Ganglion oticum ausgeht, scheint dazu bestimmt, dem dritten Ast des N. trigeminus, dem siebenten und neunten Nerven, organische Fasern einzumischen, und die Trommelhöhle, namentlich die Schleimhaut mit organischen Fasern zu versehen. Dagegen scheint das Ganglion oticum in keiner Beziehung zum Gehör zu stehen. Man begreift nun bei der Menge der organischen Fasern, welche dem N. trigeminus eingewebt sind, warum die Durchschneidung des N. trigeminus in Magendie's Versuchen die vegetativen Functionen des Auges, des Zahnfleisches, der Zunge veränderte (siehe oben p. 662.); auch sieht man die Neigung der Schleimhäute des Auges, der Nase und der Trommelhöhle zu gleichzeitigen catarrhalischen Affectionen ein. S. oben p. 762.

Das Ganglion maxillare am Ramus lingualis des dritten Astes des N. trigeminus gleicht darin dem Ganglion ciliare, dass es von organischen Fasern und von Fäden des animalischen Nervensystems zusammengesetzt wird. Von vegetativer Seite geht zu diesem Knoten nach Haller's, Bock's, Arnold's, Beobachtungen ein Faden vom Ganglion cervicale supr. n. sympathici, der mit der Gesichtsschlagader zum Ganglion maxillare gelangt. Von diesem Zweige und von der gangliösen Masse mögen die organischen Wirkungen des Ganglions auf die Absonderung des Speichels in der Glandula submaxillaris abhängen. Ausserdem geht zu dem Knoten nach Arnold ein Zweig der an dem N. lingualis angeschlossenen Chorda tympani, während die Fortsetzung derselben im N. lingualis bleibt. Da die Chorda tympani vom N. facialis kömmt, der ein motorischer Nerve ist, so mag von diesen Fäden die motorische Wirkung der aus dem Ganglion maxillare auf den beweglichen Ductus Whartonianus (siehe oben p. 473.) ausstrahlenden Fäden herrühren. Dann gehen nach Arnold auch noch einige Fäden vom N. lingualis selbst zum Ganglion maxillare ab, welche die Sensation in der Drüse und dem Ausführungsgange unterhalten mögen. So gleicht also dieser Knoten in Hinsicht seiner Wurzeln von dreifacher Bedeutung dem Ganglion ciliare. Das Ganglion

Digitized by Google

maxillare giebt nach Arnold graue Fäden theils an die Drüse, theils an ihren Gang, theils aber auch an den N. lingualis ab.

Die vergleichende Anatomie des N. trigeminus ist freilich noch in manches Dunkel gehüllt, doch verhält sich dieser Nerve bei den höheren Thieren fast ganz so wie beim Menschen, sowohl in Hnsicht seiner Verbreitung als seiner physiologischen Eigenschaften. Er ist der Hauptgefühlsnerve des Gesichtes. So rühren nach Rapp (*die Verrichtungen des fünften Nervenpaares. Leipz.* 1832. 4.) die Empfindungsfasern der Bälge der Tasthaare der Thiere vom N. infraorbitalis her, während die Bewegung der Bälge durch den N. facialis versehen ist.

Wo das Tastgefühl bei den Thieren in der Schnauze eine grössere Rolle spielt, ist immer der N. infraorbitalis stärker, wie bei den mit einem Rüssel versehenen Thieren.

Bei den Schlangen und Eidechsen sehe ich den ersten Ast des N. trigeminus unabhängig vom zweiten und dritten Ast sein Ganglion bilden. Bei mehreren Thieren enthält der erste Ast des trigeminus Augenmuskelzweige, so bei den Cetaceen nach Rapp und Bruns, bei den Petromyzon nach Schlemm und d'Alton, beim Frosch nach Volkmann. Muell. *Archiv.* 1837. *LVII. LXXIX.* 1838. 76.

Beim Frosch geht vom Quintus ein durch die Trommelhöhle verlaufender Ast zum Zungenschlundast des Vagus oder zum Glossopharyngeus. Volkmann.

Bei den Zitterrochen wird der vordere Theil des elektrischen Organes auch von einem Aste des N. trigeminus versehen, während die Hauptnerven dieser Organe Aeste des Nervus vagus sind. Bei den Rochen geht ein Ast des Nervus trigeminus zu der Ausstrahlung der Schleimröhren unter der Haut. Bei dem Karpfen erhält der N. vagus und der letzte Hirnnerve, welcher zu den Muskeln der Brustflosse geht, nach Weber's Untersuchungen auch einen Antheil vom N. trigeminus. Weber Meckel's *Archiv.* 1827. p. 313. Auch fand Weber bei Gadus lota einen Ast des N. trigeminus zur Kehlflosse.

E. H. Weber hat die Entdeckung gemacht, dass mehrere Fische neben dem gewöhnlichen N. lateralis, der ein Ast des N. vagus, an der Seite des Fisches oberflächlich in den Rumpfmuskeln bis zum Schwanz verläuft, auch noch einen anderen Längsnerven vom N. trigeminus haben. Dahin gehören der Wels und die Aalraupe. Weber *de aure et auditu. Lips.* 1820. Meckel's *Archiv* 1827. p. 304. Dieser N. lateralis trigemini verbindet sich auf das innigste mit den Spinalnerven, was der N. lateralis vagi nicht thut. Bei den Fischen sind der N. vagus und trigeminus gemeiniglich die stärksten Nerven des Gehirns, ihre Entwickelung entspricht der Stärke der Anschwellungen des verlängerten Markes, wo sich am Ursprunge des N. vagus oft ein eigener Hirnlappen entwickelt; der N. trigeminus entspringt beim Karpfen von einer vordern unpaaren, beim Wels von einer seitlichen Anschwellung des kleinen Gehirns, wie Weber fand; bei den Myxinoiden endigt der Lobus medullae oblongatae vorn ganz frei in den N. trigeminus.

Digitized by Google

Nervus facialis.

Wenngleich der N. facialis einen gewissen Antheil sensibler Fasern enthält (siehe oben p. 667.), so ist er doch der Hauptbewegungsnerve des Gesichtes. Sein Bereich ist der ganze Umfang der Gesichtsmuskeln, der Ohrmuskeln bis zum Musculus occipitalis, und ausserdem beherrscht er noch einige andere Muskeln, den Musculus biventer maxillae inf. (den hintern Bauch, der vordere ist vom N. mylohyoideus versehen), den Musculus stilohyoideus und den Hautmuskel des Halses. Er ist daher auch der physiognomische Nerve und zugleich der Athemnerve des Gesichtes, insofern er bei allen verstärkten oder angestrengten Athembewegungen, besonders bei geschwächten Menschen, mitafficirt ist. Siehe oben p. 342. In dem Grade, als bei den Thieren die Gesichtsmuskeln und der physiognomische leidenschaftliche Ausdruck abnehmen, wird auch dieser Nerve kleiner. Bei den Thieren mit beweglichem Rüssel ist der N. facialis sehr stark, und beim Elephanten der Ast des N. facialis zum Rüssel so stark, wie der N. ischiadicus des Menschen, während die Aeste vom fünften Paare an das tastende Endstück des Rüssels gehen. Die beweglichen Barthaare der Thiere erhalten die Nervenfäden ihrer Muskeln von dem N. facialis, während das Gefühl der Haarbälge von dem N. infraorbitalis abhängt. Bell *expos. du syst. nat. des nerfs.* p. 55. Vergl. Rapp a. a. O. Bei den Vögeln hat der N. facialis als physiognomischer Nerve aufgehört. Nur bei mehreren Vögeln mit beweglichen Ohrfedern, und zur Aufrichtung der Halsfedern durch den Halsmuskel ist er physiognomisch noch von Bedeutung, und der Weg zum Ausdrucke der Leidenschaften; sonst verbreitet er sich nur mehr in den Muskeln, die er beim Menschen ausser den Gesichtsmuskeln versieht, den Muskeln, welche die Kinnlade abziehen und das Zungenbein erheben, und im Hautmuskel des Halses. Bewegungsnerve ist er immer noch, so weit er da ist, und es ist wohl ein Missverständniss, wenn Treviranus an diesem Nerven zeigen zu können glaubt, dass ein Nerve seine Function verändern konne, indem seine Bewegungsfunction bei den Vögeln fast ganz aufhöre. Vielmehr ist er bei den Vögeln, wie bei den Menschen, immer noch eigentlicher Muskelnerve. Bei den Schildkröten gleicht seine Verbreitung derjenigen der Vögel. Bei den Schlangen und Eidechsen geht, wie ich sehe, dicht hinter dem dritten Ast des trigeminus ein besonderer Nerve, dem facialis vergleichbar nach aussen. Er giebt einen Ast an den N. vagus nach rückwärts und empfängt einen dem N. vidianus vergleichbaren Ast durch einen Knochenkanal der Basis, welcher mit dem zweiten Ast des trigeminus in Verbindung steht. Der Stamm des facialis verbreitet sich in dem Muskel zwischen Quadratbein und Unterkiefer, welcher den Unterkiefer abzieht und bei den Eidechsen im Hautmuskel.

Bei den Fröschen geht nach Volkmann ein dem N. facialis vergleichbarer Nerve zu dem Ganglion n. trigemini, setzt sich aber sofort weiter als Trommelhöhlenast des Quintus in den Kehlast des vagus fort. Der Kehlast ist ein Zweig des Zungenschlundastes (glossopharyngeus). Diese Verbindung kann man mit der

Digitized by Google

zuweilen beim Menschen vorkommenden Verbindung zwischen facialis und glossopharyngeus vergleichen.

Bei den Knochenfischen ist der N. facialis kein besonderer Nerve, sondern wahrscheinlich im Quintus enthalten, ramus opercularis n. trigemini.

Bei den Plagiostomen isolirt sich ein analoger Nerve und bei den Cyclostomen ist der N. facialis ein besonderer Hirnnerve, wie Born, Schlemm und d'Alton von den Petromyzon und ich von den Myxinoiden gezeigt haben.

Die beim Menschen und den Säugethieren vorkommende Verbindung des N. facialis und des N. lingualis vermittels der durch die Trommelhöhle durchtretenden Chorda tympani ist völlig räthselhaft. Cloquet und Hirzel behaupten, dass der N. petrosus superficialis n. vidiani, welcher vom zweiten Aste des N. trigeminus zum Knie des N. facialis geht, sich bloss an den N. facialis anlege, in dessen Scheide liegend, und als Chorda tympani von ihm wieder abtrete, um zum N. lingualis zu gelangen. Nach Arnold's Untersuchungen ist diese Behauptung indess ungegründet, indem es ohne gewaltsame Trennung nicht möglich ist, eine solche Anordnung zu erhalten. Nach Varrentrapp (*observ. anat. de parte cephalica n. symp. Francof.* 1831.), verläuft der N. petrosus superficialis, nachdem er zum N. facialis getreten, nicht neben ihm, sondern er geht zum Theil in ihn über, so zwar, dass nur ein Theil über das Knie des N. facialis weggeht, ohne sich fest zu verbinden. Dieser Fortsatz wäre nach Varrentrapp schon als Chorda tympani zu betrachten. Der Stamm der Chorda tympani lässt sich nach Varrentrapp am N. lingualis bis in die Nähe des Ganglion maxillare verfolgen, wo er sich in zwei Zweige theilt, wovon der eine in das Ganglion maxillare übergeht, der andere in dem N. lingualis weiter hingeht. Nach Arnold (*Kopftheil des vegetat. Nervensystems. Heidelb.* 1831. p. 119.) verläuft die Chorda tympani in der Scheide des N. lingualis, geht sehr häufig mit demselben sogleich Verbindungen ein, und theilt sich endlich in zwei Fäden, einen schwächern, der sich in das Ganglion maxillare einsenkt, und einen stärkern, der sich in dem N. lingualis verliert. Da die Zweige des Ganglion maxillare sich nicht bloss in der Glandula submaxillaris, sondern auch auf ihrem Ausführungsgange verbreiten, wie Arnold sah, so ist es nach meiner Meinung für jetzt am meisten gerechtfertigt, die Bewegung des Ausführungsganges (siehe oben p. 473.) von diesen von dem motorischen N. facialis kommenden Nervenfäden der Chorda tympani abzuleiten. Eine mir nicht wahrscheinliche Erklärung dieser Verbindung hat Arnold (a. a. O. p. 183.) gegeben. Im Allgemeinen hat Arnold selbst schon auf die Beziehung des Ganglion maxillare auf die Bewegungen des Ductus Whartonianus aufmerksam gemacht.

Nervus glossopharyngeus.

Ueber die Stellung des N. glossopharyngeus im System der Nerven ist schon im dritten Abschnitt p. 662. gehandelt worden.

Digitized by Google

Es gehört dieser Nerve unter die gemischten, welche sensorielle und motorische Fasern enthalten. Diess ergiebt sich theils aus dem von mir an einem Theil der Wurzel des N. glossopharyngeus beobachteten Ganglion (siehe oben p. 614.), theils aus seiner Verbreitung in empfindlichen Theilen, am hintern Theil des Zungenrückens, in den Papillae vallatae, und in den Mandeln und in beweglichen Theilen, im Schlunde. Vergl. p. 662. Ob dieser Nerve auch dem Geschmack bestimmte Fasern enthält, ist noch zweifelhaft. Der Umstand, dass der Nervus gustatorius der Vögel und einiger Amphibien ein Ast des Nervus glossopharyngeus zu seyn scheint, spricht dafür. Beim Frosch ist sogar der N. gustatorius ein Ast des N. vagus. Wir wissen überhaupt nicht, wie weit sich der Geschmack ausdehnt. Die Empfindungen des Ekels, welche im Schlunde vorzüglich ihren Sitz haben, haben viele Aehnlichkeit mit Geschmacksempfindungen; von ihnen ist es auch wieder zweifelhaft, ob sie in dem Schlundaste des N. vagus oder des N. glossopharyngeus entstehen.

Der Ramus tympanicus des N. glossopharyngeus muss wahrscheinlich als ein vom N. sympathicus zum N. glossopharyngeus gehender Ast betrachtet werden, wie oben p. 616. 790. gezeigt wurde. Von dieser Verbindung in der Trommelhöhle oder der Jacobsonschen Anastomose, und der Verbindung mit dem Ganglion oticum ist schon oben p. 790. gehandelt. Ueber analoge Nerven bei Vögeln siehe Weber *anat. comp. n. symp.* p. 26. 38. Breschet in Mueller's *Archiv für Anat. und Physiol.* 1834. p. 16. Der N. glossopharyngeus der Vögel verbindet sich durch einen Ast mit dem N. vagus, und verbreitet sich zuletzt in der Zunge, deren Geschmacksnerve er nach Weber ist, und mit einem zweiten Aste theils am obern Kehlkopf, theils herabsteigend an der Speiseröhre. Bischoff beschreibt auch bei Iguana einen zur Zunge gehenden N. glossopharyngeus. Bei den Klapperschlangen geht der N. glossopharyngeus, wie ich sehe, ganz in den N. vagus über, der auch einen Zungenast giebt. Bei den Fröschen kann man nur den Zungenschlundast des vagus dem glossopharyngeus vergleichen. Volkmann. Bei den Fischen hat man einen vordern Ast des N. vagus, der beim Karpfen, wie die übrigen Kiemenäste des N. vagus mit einem Ganglion versehen ist, aber durch ein besonderes Schädelloch durchgeht, und sich im ersten Kiemenbogen, aber auch auf der Zunge bis zur Haut in der Nähe der Mundöffnung verzweigt, Nervus glossopharyngeus genannt. Man sieht deutlich aus diesen Varietäten, wie auch aus dem Mangel des N. accessorius bei den Fischen, dass der N. vagus, glossopharyngeus und accessorius nur ein gemeinsames System bilden, dessen Zertheilung in den Thierklassen sehr variiren kann.

Nervus vagus.

Dieser gemischte Nerve, der seinen motorischen Einfluss grossentheils wahrscheinlich von seiner Verbindung mit dem innern Aste des N. accessorius erhält (siehe oben p. 663.), verbreitet sich

Digitized by Google

constant in den Stimm- und Athemwerkzeugen, dem Schlunde und dem Magen. Sein sensorieller Einfluss erstreckt sich über alle diese Theile; durch einen durch das Felsenbein gehenden Ramus auricularis dehnt sich sein sensorieller Einfluss auch selbst noch auf das äussere Ohr aus; ja durch die Verbindung des Ramus auricularis N. vagi mit dem N. facialis innerhalb des Felsenbeines ertheilt er dem N. facialis wahrscheinlich seine Empfindlichkeit. S. p. 669. Von dem N. vagus sind die Empfindungen des Hungers und der Sättigung, und die mannichfaltigen Gefühle, welche das gesunde und kranke Athmen begleiten, abhängig. Nach Bracket soll die Empfindung des Hungers nach Durchschneidung dieses Nerven aufhören. *Recherches sur les fonctions du syst. ganglionaire. Paris* 1830. *p.* 179. Bei einem Kinde mit doppeltem Kopfe und Brust und einfachem Unterleib, war der eine Theil nicht gesättigt, wenn der andere getrunken hatte, wahrscheinlich, weil der Magen doppelt war. Ebend. p. 183. Die zugleich motorischen Aeste des N. vagus sind der N. pharyngeus und die N. laryngei.

Durch die Durchschneidung des N. laryngeus inferior, oder des N. vagus am Halse auf beiden Seiten wird die Bewegung der kleinen Kehlkopfmuskeln unvollkommen gelähmt; die Stimme verschwindet, aber sie erscheint nach einigen Tagen wieder, weil der N. laryngeus superior seinen Einfluss noch ausübt. Dass der N. laryngeus superior sich bloss in den Muskeln verbreite, welche die Stimmritze verengern, der N. laryngeus inferior in denen, welche die Stimmritze erweitern, wie Magendie behauptet, hat sich nach Schlemm's Untersuchungen nicht bestätigt. Auf den Magen hat der N. vagus keinen motorischen Einfluss; und man kann durch Galvanisiren und mechanische Reizung desselben am Halse keine Bewegungen des Magens hervorbringen, wie die Versuche von Magendie, Mayo und mir beweisen. Siehe oben p. 505. Der N. vagus enthält viele organische Fäsern vom N. sympathicus, welche theils den Stamm, theils die Aeste desselben vom N. sympathicus aufnehmen. Von diesen Einmischungen rührt wahrscheinlich der organisch-chemische Einfluss dieses Nerven her.

Der chemische Process der Respiration und der Schleimabsonderung in den Lungen hängt zum Theil von diesem Nerven ab; wenigstens entstehen nach Durchschneidung des N. vagus am Halse Blutaustretungen in den Lungen, und wenn auch der chemische Process der Respiration anfangs nicht wesentlich gestört wird, so sterben doch die Thiere innerhalb einiger Tage, und Vögel leben höchstens bis zum 5.—8. Tage. Siehe oben p. 347. Auch die Absonderung des Magensaftes wird von den organischen Wirkungen des N. vagus beherrscht. Nach Durchschneidung des N. vagus am Halse wird die Absonderung des Magensaftes zwar nicht ganz aufgehoben, aber vermindert (siehe oben p. 550.), und eben so ist es mit der Verdauung, die bei länger lebenden Vögeln ganz evident, aber viel langsamer vollbracht wird. Dass die vom N. vagus abhängigen chemischen Processe in den Lungen und im Magen nach der Durchschneidung dieses Nerven am

Digitized by Google

Hälse auf beiden Seiten nicht sogleich und ganz aufhören, erklärt sich hinreichend daraus, dass der N. vagus seine organischen Fasern nicht bloss in seinem obern Stamme enthält, sondern dass auch der untere Theil desselben noch viele Verbindungen mit dem N. sympathicus eingeht, welche durch die Durchschneidung des N. vagus am Halse nicht gelähmt werden können.

Die Schleimabsonderung in den Athemorganen scheint überall unter der Einwirkung der dem N. vagus beigemischten organischen Fasern zu geschehen, und daher nimmt wahrscheinlich auch der N. laryngeus inferior bei seiner Umbiegung nach aufwärts so bedeutende Verbindungen von dem N. sympathicus auf.

Nach Durchschneidung des N. vagus auf beiden Seiten ist die Aufsaugung der Flüssigkeiten oder ihnen beigemischter fremdartiger Stoffe, Gifte etc. im Magen nicht aufgehoben. Die von Dupuy und Brachet angestellten Versuche, nach denen die Aufsaugung der Gifte im Magen nach jener Operation aufgehoben seyn soll, sind offenbar nicht richtig, und werden durch die von mir und Anderen angestellten Versuche vollkommen widerlegt, nach welchen diese Operation nicht im geringsten den Erfolg verändert. Siehe oben p. 245. Die Durchschneidung des N. vagus auf beiden Seiten des Halses tödtet zwar in den nächsten Tagen, indessen ist diese Operation nicht tödtlich, wenn sie bloss auf einer Seite vorgenommen, oder wenn sie auf der andern nach so grosser Zwischenzeit angestellt wird, dass der erst durchschnittene Nerve wieder vollständig verheilt ist. Siehe oben p. 411.

In vergleichend anatomischer und physiologischer Hinsicht bietet der N. vagus viele Merkwürdigkeiten dar.

1) Bei den Vögeln und beschuppten Amphibien, wo der N. accessorius mit dem Stamme des N. vagus verschmilzt, giebt der N. vagus auch einen Ast oder mehrere Aeste zu den Halsmuskeln. Bischoff, *n. accessorii anatomia et physiologia. Heidelb.* 1832. p. 41. 45.

2) Bei den Fröschen geht aus dem Ganglion n. vagi ein Ast zu den Kiefermuskeln, Weber *anat. comp. n. symp.* 44. Es ist der Kehlast von Volkmann, der sich theils in den Zungenbeinmuskeln, theils in den Kiefermuskeln verbreitet. Sein motorischer Einfluss kömmt, wie Volkmann zeigte, von dem Ast des facialis, der in ihn übergeht.

3) Bei den Fröschen giebt der N. vagus auch einen Ramus lingualis, welcher wahrscheinlich den sensoriellen Ramus lingualis n. trigemini ersetzt; während der gewöhnliche motorische Ast vom N. hypoglossus vorhanden ist. Weber. Dieser Ast bewirkt in der That, wie Volkmann zeigt, keine Zuckungen in der Zunge. Auch bei den Schlangen und Crocodilen ist der Ramus lingualis n. vagi vorhanden. Bischoff beschreibt auch einen Ast des N. vagus beim Crocodil zu den Muskeln des Zungenbeines, a. a. O. p. 45. Er ist auch bei den Schlangen und Eidechsen vorhanden.

4) Der N. recurrens kömmt noch bei den Säugethieren, Vögeln und Amphibien vor. Weber hat gezeigt, dass auch beim Frosch ein Ast des N. vagus einen zurücklaufenden Zweig zum

Digitized by Google

Kehlkopfe giebt. *Anat. n. sympath.* p. 46. Der Kehlkopf der Vögel erhält einen Ast vom neunten Nerven, die Luftröhre und der untere Kehlkopf der Vögel erhalten Zweige vom N. vagus, aber die langen Muskeln, welche bei vielen Vögeln die Luftröhre verkürzen, erhalten Zweige von einem besondern Ramus descendens n. hypoglossi. Siehe oben p. 340.

5) Beim Frosch giebt der N. vagus auch einen Hautast für die Gegend hinter dem Ohr. Volkmann.

6) Bei den Fischen giebt der Nervus vagus die Kiemennerven, einen Ramus intestinalis für Schlund und Magen, bei dem Zitterrochen und dem Zitterwels auch die Nerven des elektrischen Organes (siehe oben p. 66.), beim Karpfen auch den Zahnnerven für die Gaumenknochenzähne, und bei allen Fischen den N. lateralis.

Der N. vagus der Fische vermehrt seine Substanz offenbar in dem Ganglion desselben, so dass die Aeste zusammen vielmal dicker als die Wurzeln, ja sogar einzelne Aeste stärker als die Wurzeln sind. In dem Ganglion scheinen die Primitivfasern der Wurzeln durch Theilung und Multiplication die Substanzvermehrung zu bilden, so dass viele Primitivfasern der Aeste durch eine Primitivfaser der Wurzel vertreten sind. Beim Zander und beim Wels bilden alle Aeste zusammen ein Ganglion, beim Karpfen nur die Kiemennerven einzelne Ganglien, wobei sich die Substanz vermehrt. Weber *anat. comp. n. sympath.* p. 62. p. 66. Meckel's *Archiv* 1827. *Tab. IV. Fig.* 25. 26.

7) Einer der merkwürdigsten Aeste des N. vagus bei den Fischen ist der Nerve der Seitenlinie, welcher zwischen den Muskeln nicht fern von der Haut bis zum Schwanze hingeht, und Zweige den Muskeln (?) und der Haut giebt. Desmoulins behauptet, dass dieser Nerve nicht wohl sensibel sey. Allein er ist sicher nicht motorisch, wenn er sich in Muskeln auch verzweigt; denn mit einer Batterie von 40 Plattenpaaren konnte ich beim Karpfen durch Galvanisiren des Nerven selbst keine Zuckungen in den Muskeln erregen. Van Deen hat diesen Nerven auch bei den Froschlarven, und als einen bleibenden Nerven beim Proteus anguinus entdeckt. Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie* 1834. p. 477. Mayer fand den Nerven auch bei Menopoma, Krohn bei den Tritonen. Der kurze Hautast des N. vagus der Frösche scheint das Analogon oder der Rest dieses Nerven zu seyn. Man hat mit diesem Nerven den N. accessorius verglichen; allein ich glaube, dass nur der Ramus auricularis N. vagi des Menschen und der Säugethiere ihm verglichen werden kann. Siehe *Archiv* 1837. *LXXVI.* Der N. lateralis der Petromyzon wird gerade so gebildet, wie der Ramus auricularis n. vagi aus dem N. vagus und facialis. Da der N. facialis der Knochenfische im trigeminus eingeschlossen ist, so erklärt sich die Concurrenz des trigeminus zur Bildung des N. lateralis bei vielen Fischen. Bei den Cyprinen geht ein Ast des N. trigeminus schon in der Schädelhöhle in den vagus über zur Zusammensetzung des N. lateralis. Buechner. Bei Gymnotus electricus findet die Concurrenz ausser dem Schädel statt. Beim Wels und der Aalraupe fand Weber

Digitized by Google

den doppelten Seitennerven vom N. trigeminus und vagus. Interessant ist die Beobachtung von Swan, dass bei Gadus morhua ein mit einem Zweig des N. vagus verbundener Ast des Quintus 2 Rumpfnerven abgiebt, wovon der eine am Rücken über der Wirbelsäule an der Basis der Flossen, der andere an der Bauchseite des Schwanzes bis zur Schwanzflosse hingeht. Beide verbinden sich mit den Spinalnerven, der eine mit den aufsteigenden, der andere mit den absteigenden Aesten. Es findet also, wie im Knochensystem und in der Anordnung der Muskeln, so auch in der Configuration des Nervensystems eine Symmetrie zwischen der obern und untern Schwanzhälfte statt. Ausser diesen 2 Seitennerven vom N. trigeminus giebt es auch noch 2 Rumpfäste des N. vagus, welche über den Muskeln zum hintern Ende des Körpers gehen. *Illustrations of the comp. anat. of the nerv. syst. Lond.* 1835. Der Igel besitzt nach Barkow einen seitlichen Rumpfnerven für die Haut und die Muskeln, aber er entspringt aus blossen Spinalnerven, nämlich den untersten Cervical- und ersten Dorsalnerven.

8) Sehr merkwürdig sind die Aeste des N. vagus zu dem contractilen Gaumenorgan der Cyprinen. Siehe Meckel's *Archiv.* 1827. 309. Weber hat zuerst entdeckt, dass diess Organ eine höchst merkwürdige Contractilität besitzt; denn wenn man dasselbe mit einem spitzigen Körper sticht oder drückt, so erhebt sich die gereizte Stelle sogleich in Gestalt eines kegelförmigen Hügels, dessen Spitze der gereizte Punkt ist, bleibt einige Secunden erhoben und senkt sich hierauf wieder; dabei sieht man keine Veränderung der Farbe, die auf ein Zuströmen von Blut deuten könnte. Ich halte diess Organ nicht für ein Geschmacksorgan, sondern für einen eigenthümlichen contractilen Schlingapparat. Das Organ kann sich in jeder Richtung zusammenziehen, und es entstehen kegelförmige, lineare oder breite Erhebungen, je nachdem man mit einem spitzen Körper aufdrückt oder Striche macht, oder mehr auf die ganze Fläche zugleich wirkt. Wenn ich die Pole einer Säule von 40 Plattenpaaren auf das Organ anwandte, entstanden die heftigsten Zuckungen, und die Richtung der Bewegung wurde immer durch den Strom bestimmt; das Organ kann ganz zu einem Klumpen in der Mitte anschwellen (und so wirkt es wahrscheinlich beim Schlingen) oder in jeder Richtung Zusammenziehungen bewirken, die auch sogleich erfolgen, wenn man das Organ ausdehnt. Im letzten Falle erfolgt die Zuckung in der Richtung der Ausdehnung. Ob diess Organ willkührlich beweglich ist, ist nicht auszumitteln. Das Contractile an dem Organe ist nur die $1\frac{1}{2}$ Linien dicke Oberfläche, in der Tiefe liegt eine fettige Unterlage, welche nicht contractil ist.

9) Beim Wels und Karpfen giebt der N. vagus auch Zweige zur Brustflosse. Weber.

10) E. H. Weber hat darauf aufmerksam gemacht, dass der N. vagus in einem Wechselverhältniss zu dem N. sympathicus steht. Bei den Schlangen ist z. B. der N. sympathicus ausserordentlich wenig entwickelt, dagegen der Ramus intestinalis Nervi vagi um so stärker; bei den Fröschen ist es umgekehrt. Auch bei den Fischen sind die Intestinaläste des Nervus vagus sehr

Digitized by Google

stark und bei den Myxinoiden geht der Ramus intestinalis n. vagi, aus der Verbindung beider vagi entstanden, nach meinen Beobachtungen bis zum After, während der N. sympathicus fehlt.

Nervus accessorius Willisii.

Ueber das Verhältniss dieses Nerven zum N. vagus, in Beziehung auf die motorische Eigenschaft des N. vagus, ist schon oben p. 662. gehandelt worden. Dieser Nerve kömmt nur bei den Säugethieren, Vögeln und Amphibien, nicht bei den Fischen vor. Bei den Vögeln und Amphibien verhält er sich fast als eine Wurzel des N. vagus, indem er ganz in denselben übergeht, der hinwieder einen Ast in die Halsmuskeln abgiebt, welcher dem N. accessorius der Säugethiere zu entsprechen scheint. Siehe das Nähere in Bischoff *nervi accessorii Willisii anatomia et physiologia. Heidelb.* 1832. Der Bereich des N. accessorius der Säugethiere, so weit er sich nicht mit dem N. vagus verbindet, ist der Musculus sternocleidomastoideus und cucullaris. Die Ursache des sonderbaren Ursprungs und Verlaufs dieses Nerven kennt man nicht genau. Wahrscheinlich ist sie die, dass der sogleich nach dem Austritt des vagus abgehende Schlundast Fasern vom fast ganzen Halstheil des Rückenmarkes erhalte. Auch andere Nerven erhalten sehr ausgedehnte Ursprünge; der Ramus descendens hypoglossi entspringt vom hypoglossus und den oberen Halsnerven. Der Unterschied liegt also nur darin, dass beim accessorius die Zusammensetzung des Nerven schon innerhalb des Rückgrats geschieht, während bei anderen Nerven dieselbe Zusammensetzung erst ausserhalb des Rückgrats erfolgt.

Nervus hypoglossus.

Die Stelle dieses im Wesentlichen motorischen, aber zugleich mit empfindlichen Fasern begabten Nerven im System, welcher in einigen Säugethieren nach Mayer's Entdeckung selbst eine feine hintere, mit einem Ganglion versehene Wurzel hat, ist schon im dritten Abschnitt p. 665. bestimmt worden. Er ist der motorische Nerve der Zunge, bei allen Bewegungen dieses Organes zum Sprechen, Käuen, Schlingen u. s. w. Die Zerrung desselben bei Thieren bewirkt heftige Zuckungen der Zunge. Er ist aber auch der Bewegungsnerve der grossen Muskeln des Kehlkopfes und Zungenbeines, des Musculus geniohyoideus, hyothyreoideus, omohyoideus, sternothyreoideus, sternohyoideus.

Folgende, von Montault in der Academie de Médecine vorgetragene Beobachtung ist für die Physiologie des N. hypoglossus von Wichtigkeit. Nach einem Fall auf das Genick entstand Spannung und Zittern der Muskeln des Halses, heftige Schmerzen an der linken Seite des Kopfes und Halses und beschwerliches Sprechen. Die Zunge wurde allmählig verkleinert, vorzüglich an der linken Seite atrophisch, und beim Ausstrecken nach der rechten Seite hingezogen. Der Geschmack war auf beiden

Digitized by Google

Seiten der Zunge vorhanden. Später entstand eine kleine Geschwulst hinter dem Zitzenfortsatze, das Schlucken wurde beschwerlich, Schluchzen, Aphonie und Erbrechen kamen hinzu, zuletzt epileptische Anfälle. Bei der Section fand sich zwischen der linken Hinterhauptsgrube, der linken Hemisphäre des kleinen Gehirns und der Medulla oblongata eine hydatidöse Geschwulst, worin eine Menge Hyatiden. Diese Cyste hob die linke Hemisphäre des kleinen Gehirns auf, und drängte die Medulla oblongata etwas nach rechts; sie drang, innerhalb der Arachnoidea gelegen, einige Linien tief in den Rückgratskanal, und war zugleich in das Foramen condyloideum anterius eingesenkt. Von der Basis der Cyste ging eine Verlängerung durch die vordere Portion des Foramen lacerum sinistrum nach aussen unter das obere Ende des Musculus complexus und sternocleidomastoideus. Innerhalb der Schädelhöhle waren die betheiligten Nerven gesund, vom Austritt aus dem Cranium an war der linke Hypoglossus atrophisch bis zur Zunge, auch der N. glossopharyngeus, nicht aber der Vagus und Accessorius. Die Muskeln der Zunge und des Gaumensegels auf der linken Seite, und das linke Stimmband wurden atrophisch gefunden. Dieser Fall zeigt, dass der N. lingualis Geschmacksnerve der Zunge ist, und dass die Lähmung und Atrophie der Zunge von der Atrophie des N. glossopharyngeus und hypoglossus abhing. Er war von Dupuytren richtig diagnosticirt worden, welcher voraussagte, dass der N. hypoglossus, und zwar von seinem Austritt aus der Schädelhöhle an, krankhaft verändert sey, weil bei einem Leiden dieses Nerven an seinem Ursprunge, Paralyse der Gliedmassen vorhanden seyn musste. Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiol.* 1834. p. 130.

Bei den Vögeln verbreitet sich der N. hypoglossus, nachdem er sich durch einen Zweig mit dem N. vagus verbunden, hauptsächlich mit zwei Aesten, mit dem einen in den Zungenbeinmuskeln, mit dem andern an der Seite der Speiseröhre. Weber *anat. comp. n. symp.* p. 40. Wir haben auch beim Truthahn einen langen herabsteigenden Zweig an dem langen Muskel beobachtet, welcher die Luftröhre verkürzt. Siehe oben p. 340. Zu den Muskeln der Zunge haben auch Bojanus und Bischoff, jener bei der Schildkröte, dieser bei Iguana, den N. hypoglossus treten gesehen. Bei der Klapperschlange sehe ich einen feinen Hypoglossus durch eine besondere Oeffnung hinter dem Vagus austreten und nach einer Verbindung mit dem ersten Halsnerven ganz in den Vagus übergehen. Bei den Fröschen wird der dem Hypoglossus entsprechende Nerve zur Zunge vom ersten Halsnerven abgegeben. Man begreift diess Verhalten daraus, dass auch der Hypoglossus des Menschen sich mit den ersten Halsnerven verbindet. Bei den Fischen fand E. H. Weber einen letzten Hirnnerven, der mit drei Wurzeln, einer hintern gangliösen entspringt und durch ein besonderes Schädelloch durchgehend, zu den Muskeln der Brustflosse geht. Beim Karpfen verbindet sich die gangliöse Wurzel mit einer Wurzel vom N. trigeminus. Vergl. Bischoff a. a. O. p. 49. Dieser Nerve giebt nach Buechner auch Zweige zum Musculus sternohyoideus und ist der Hypo-

Digitized by Google

glossus; er scheint bei den Fischen allgemein zu seyn; aber er geht nicht immer durch das Hinterhauptsbein selbst, sondern beim Hecht und bei Perca hinter diesem aus.

Bedenkt man, dass der N. spinalis primus des Menschen zuweilen nur eine vordere Wurzel hat, dass der N. hypoglossus des Menschen nur eine vordere, bei einigen Säugethieren aber zugleich eine hintere Wurzel hat, so tritt der N. hypoglossus ganz in die Kategorie der Spinalnerven, und ist gleichsam der erste Spinalnerve, der aber meist noch durch den Schädel heraustritt. Hierdurch wird die Analogie des letzten Hirnnerven der Fische mit dem N. hypoglossus noch grösser.

Nach dieser Uebersicht der bei den Thieren vorkommenden Verschiedenheiten in der Anlage der Hirnnerven werfen wir einen Blick auf das System der Hirnnerven, in wie weit es auf einen gewissen Grundtypus gebracht werden kann. Die leitende Idee ist hier die von primitiven und von abgeleiteten Hirnnerven, welche zuerst Meckel ausgesprochen hat. Primitive Hirnnerven sind theils die 3 reinen Sinnesnerven olfactorius, opticus, acusticus, theils die gemischten oder doppelt wurzeligen Hirnnerven, welche nach dem Typus der Spinalnerven gebildet sind und welche man Vertebralnerven des Kopfes nennen kann. Abgeleitete Hirnnerven sind solche, welche durch Ablösung eines Theils der Fasern von der Wurzel eines Hirnnerven entstehen oder mit anderen Hauptwirbelnerven verschmolzen seyn können. Meckel hat die im Allgemeinen richtige Idee nicht gut ausgeführt. Besser wurde sie von Arnold angewandt, welcher 2 Vertebralnerven des Kopfes annahm, wovon der erste der Trigeminus ist, mit den Augenmuskelnerven und dem Facialis, die zur motorischen Portion jenes Nerven gehörend angesehen wurden. Zum zweiten gehören der Vagus, Accessorius, Glossopharyngeus, Hypoglossus. Vergl. Buechner *mém. de soc. d'hist. nat. de Strasb. T. II. livr.* 2. Muellers *Archiv.* 1837. *LXXIV.* Nach meiner Meinung giebt es 3 Wirbelnerven des Schädels, wie 3 Wirbel desselben. Der erste ist der Trigeminus, der zweite der Vagus cum N. glossopharyngeo et accessorio, der dritte der Hypoglossus. Die Augenmuskelnerven sind abgeleitete Nerven und sind als motorische Portion des ersten Astes des trigeminus anzusehen. Bei den Cetaceen giebt der erste Ast des Trigeminus schon Augenmuskeläste ab, während die gewöhnlichen Augenmuskelnerven auch vorhanden sind. Beim Frosch geht der N. abducens ins Ganglion Gasseri über, wie Volkmann zeigt, und der Trigeminus giebt daher Augenmuskelzweige. Bei den Petromyzon fehlt einer der 3 Augenmuskelnerven ganz, wahrscheinlich der Abducens und der Trigeminus giebt auch Augenmuskelnerven, wie Schlemm und d'Alton zeigten.

Der N. facialis ist jedenfalls abgeleiteter Nerve und hat eine grosse Verwandtschaft zur motorischen Portion des N. trigeminus, denn bei den Knochenfischen verschmilzt er mit dem Trigeminus und erscheint als Ramus opercularis desselben, wie Serres wahrscheinlich machte. Bei den Fröschen gesellt er sich, wie Volkmann zeigt auch zum Trigeminus. Allein die Verwandtschaft des Facialis ist ebenso gross zum Vagus. Denn schon

Digitized by Google

beim Menschen und den Säugethieren verbindet er sich mit Aesten von beiden. Bei den Schlangen und Eidechsen giebt er einen Ast zum Vagus. Beim Frosch setzt sich der Facialis vom Trigeminus ab in einen Ast des Vagus, nämlich in den Kehlast fort, wie Volkmann beobachtet. Der Facialis der Petromyzon bildet mit dem Vagus zusammen den N. lateralis, der bei den Knochenfischen oft vom Quintus und Vagus gebildet wird.

Zum zweiten Vertebralnerven des Kopfs gehören der N. vagus, glossopharyngeus, accessorius. Der Vagus ist nur grösstentheils sensoriell, der Accessorius nur grösstentheils motorisch, der Glossopharyngeus gleich stark sensoriell und motorisch.

Der dritte Vertebralnerve des Schädels wird allein vom Hypoglossus gebildet. Die Myxinoiden stehen dem einfachen Typus der Wirbelnerven des Schädels ohne die abgeleiteten Nerven am nächsten. Denn sie haben von den letzteren nur den N. facialis.

Nervus sympathicus.

Die Physiologie dieses Nerven ist bereits in verschiedenen Abschnitten des IV. Buches zur Sprache gekommen, und so sind (p. 670.) die sensoriellen, motorischen und organischen Eigenschaften desselben im Allgemeinen, und (p. 737.) die Mechanik seiner Wirkungen untersucht worden. Hier ist der Ort, das Eigenthümliche dieses Nerven in einzelnen Thierclassen und Thieren zu erwähnen, wobei wir uns aber nur auf diejenigen Verhältnisse beschränken müssen, welche in physiologischer Hinsicht von Wichtigkeit sind. In Hinsicht des anatomischen Details müssen wir auf die Werke von Weber (*anat. comp. n. symp. Lipz.* 1817.), Lobstein (*de n. symp. hum. fabrica, usu et morbis. Paris* 1823.), Wutzer (*de gangliorum fabrica. Berol.* 1817.), Hirzel (Tiedemann's *Zeitschr. für Physiol. I.*) Arnold (*der Kopftheil des vegetativen Nervensyst. Heidelb.* 1831.), Varrentrapp (*obs. anat. de parte cephalica n. symp. Francof.* 1831.), und Giltay (*de n. sympathico diss. Lugd. Bat.* 1834.) verweisen.

Bei den Vögeln liegt die Pars cervicalis n. sympathici in dem Canal der Querfortsätze der Halswirbel, wo bei den Säugethieren und dem Menschen nur ein verhältnissmässig sehr dünner Strang des N. sympathicus liegt.

Die constantesten Verbindungen der Hirnnerven mit dem Sympathicus sind die der Wirbelnerven des Schädels. Sie finden bei den Fischen an der Basis des Schädels gerade so statt, wie die Verbindungen des Grenzstranges des Sympathicus mit den Spinalnerven.

Bei mehreren Thieren treten entweder für einzelne Theile des Sympathicus oder für den ganzen Nerven Aequivalente ein, welche sich von dem Typus des Sympathicus ganz entfernen. Beispiele davon sind:

1) Der Sympathicus der Cyclostomen fehlt und der Vagus ihn ersetzend geht bis zum After.

2) Bei den Schlangen ist der Kopftheil vom Grenzstrang des

Digitized by Google

Rumpfes getrennt und geht ganz in den Vagus über. Der Grenzstrang fehlt auch am vordern Theile des Rumpfes. Statt der gewöhnlichen Bildung gehen Aeste der Spinalnerven zu den Lungen, zum Darm, zu den Geschlechtstheilen und Harnwerkzeugen, wie Weber bereits bemerkte. Diese Aeste hängen durch bogenförmige Schlingen unter einander zusammen, und diese Verbindungsschlingen sind das Einzige, was vom Grenzstrange übrig ist. Dergleichen Bogen kommen aber zwischen den Cerebrospinalnerven sehr gewöhnlich vor. Nur bei sehr grossen Schlangen erkannte ich eine Spur von Ganglien im Grenzstrange. Der Vagus geht bei den Schlangen am Darm bis über $\frac{2}{3}$ der Bauchhöhle.

3) Aequivalente für einzelne Theile des Sympathicus kommen zuweilen auch bei den höheren Thieren vor. Dahin gehört, dass drüsige Organe statt, wie es seyn sollte, vom Sympathicus, vielmehr von Cerebrospinalnerven ihre Aeste erhalten, wie die Thränendrüse vom Nervus lacrymalis, die Milchdrüse des Menschen vom 3. und 4. Brustnerven.

V. Abschnitt. Von den Centraltheilen des Nervensystems.

I. Capitel. Von den Centraltheilen des Nervensystems im Allgemeinen.

Zur Definition der Centralorgane gehören folgende Eigenschaften.

Die Centralorgane des Nervensystems bewirken die vereinte Thätigkeit aller Nervenfunctionen, theils ausser der Herrschaft der Seele, theils unter derselben. Durch sie werden alle Nerven oder Leiter vereinigt. Sie setzen als Erreger (Motoren) sowohl automatisch beständig oder abwechselnd, als willkührlich auf die von dem Sensorium commune der Centralorgane ausgehenden Bestimmungen, die motorischen Nerven zur Bewegung der Muskeln in Thätigkeit. Sie reflectiren die Wirkungen der sensoriellen Nerven entweder auf motorische unbewusst, oder bringen sie im Sensorium commune der Centraltheile zum Bewusstseyn. Durch sie werden auch die organischen Nerven-Wirkungen in ungestörter Kraft erhalten, das Nervenprincip beständig erzeugt und wiedererzeugt, und ohne sie kann sich die Thätigkeit und Reizbarkeit der Nerven als Leiter auf die Dauer nicht erhalten. Diess ist die allgemeine Definition des Gehirns und Rückenmarkes als selbstständiger Erreger gegen die Nerven als Conductoren des Nervenprincips. Dass sich durch die angeführten Eigenschaften die Centralorgane von den Nerven unterscheiden, ist aus den in der Nervenphysik mitgetheilten Thatsachen nicht schwierig zu beweisen.

Digitized by Google

1) Die Centralorgane vereinigen alle Nerven; diess gilt sogar von den sympathischen Nerven, die, wie am Ende des vorigen Abschnittes gezeigt worden, an so vielen Punkten durch Fasern mit den Centraltheilen zusammenhängen. Es zeigt sich nur der Unterschied der Cerebrospinalnerven von den organischen Nerven in Beziehung auf die Centralorgane, dass die ersteren viel unmittelbarer von den Centralorganen ausstrahlen, während die organischen Nerven zwar auch ihre Fasern in Begleitung der Cerebrospinalnerven mit dem Gehirn und Rückenmark in Wechselwirkung bringen, aber doch auch ihre untergeordneten Centraltheile in ihren eigenen Ganglien und Geflechten haben, von welchen der organische Einfluss zunächst ausstrahlt, wenn sich auch die Thätigkeit dieses Systems ohne die Mitwirkung des Gehirns und Rückenmarkes auf die Dauer nicht erhalten kann.

2) Die Centralorgane sind Erreger für die motorischen Nerven als Conductoren der motorischen Entladung des Nervenprincips nach den Muskeln. Diese motorische Thätigkeit äussert sich *a.* theils als beständige Ausstrahlung, wie wir das Beispiel in der beständigen Beherrschung der Sphincteren sehen, deren Zusammenziehungen nach Verletzungen der Centralorgane aufhören; *b.* theils durch abwechselnde rhythmische Bewegungen, wie in der Abhängigkeit der Bewegungen des Athmens von der Medulla oblongata (siehe oben p. 341.); *c.* theils als Entladungen, die willkührlich von dem Sensorium commune der Centralorgane ausgehen, welches den spontanen Actionen der Seele unterworfen ist.

Gegen diesen motorischen Einfluss verhalten sich die motorischen Nerven auf doppelte Art. Die Nerven einer Classe verhalten sich gegen denselben als blosse Conductoren. Sie sind zwar auch beständig motorisch geladen, und können künstlich, wie der Nerve des Froschschenkels, durch mechanische Reize zu Entladungen bestimmt werden; aber sie entladen sich im Zustande der Gesundheit nicht spontan, sondern auf den Einfluss der Centralorgane; diess sind die motorischen Cerebrospinalnerven. Die Nerven der andern Classe, dem Einflusse des Sensorium commune in Beziehung auf willkührliche Actionen ganz entzogen, können zwar auch von den Centralorganen zu beständigen oder rhythmischen Actionen bestimmt werden, haben aber das Eigenthümliche, dass sie auch selbstständige Entladungen bewirken, wenn sie gleich auf längere Dauer zur Reproduction ihres Nerveneinflusses der Centralorgane bedürfen; dahin gehören die motorischen Wirkungen des N. sympathicus. Die von ihm beherrschten Theile ziehen sich spontan, auch getrennt von dem Einfluss der Centralorgane zusammen, wie das Herz, der Darmkanal u. s. w., aber die Kraft und Dauer ihrer Zusammenziehungen hängt durchaus von dem Verkehr ihrer Nerven mit den Centralorganen ab. Vergl. oben p. 190. 742. Bei vorübergehender Ermüdung und auch in dem Schlafe nach der täglichen Action des Nervensystems, tritt ein Mal eine Relaxation in den Wirkungen der Centralorgane auf die peripherischen Theile ein; aber diese vorübergehende Veränderung in den Centralorganen ist noch nicht im Stande, die Actionen der dem sympathischen Sy-

Digitized by Google

stem unterworfenen spontanen Bewegungen wesentlich zu verändern. Nur wenn die Ermüdung in den Centraltheilen dauernder wird, wenn diese Organe wesentlich verletzt werden, erlahmen auch die dem sympathischen System unterworfenen Bewegungen, weil ihre Kraft und Dauer von den Centraltheilen auch abhängt.

Man darf sich aber nicht vorstellen, dass während der täglich einmal eintretenden Ermüdung der Centralorgane und des Schlafes die Centralorgane überhaupt unthätig würden. Diese Ermüdung ist zwar allgemein, aber nur das Sensorium commune der Centralorgane, jener Theil des Gehirns, welcher den Actionen der Seele unterworfen ist, wird vorzüglich unthätig; nur die willkührlichen Bewegungen fallen unter den motorischen Actionen der Centralorgane während des Schlafes ganz aus. Alle übrigen Theile der Centralorgane setzen ihre Thätigkeit wie während des Wachens fort. Diess sieht man an der Fortdauer der von den Centralorganen abhängigen beständigen Zusammenziehungen der Sphincteren und den rhythmischen Athembewegungen, welche beide von wahren Cerebrospinalnerven ausgeführt werden. Gewisse Muskeln sind also, obgleich von Cerebrospinalnerven versehen, auch während des Schlafes beständig thätig; immer sind die Sphincteren geschlossen, immer bewirkt der Schlaf eine fixirte Stellung des Auges nach oben und innen, immer die constant damit verbundene Contraction der Iris mit Verengung der Pupille; die Schliessung des Mundes findet auch im Schlafe gewöhnlich statt. Kurz, wir sehen, dass auch im Schlafe der ganze motorische Apparat der Centralorgane, des Gehirns sowohl als des Rückenmarkes, fortwirkt, dass nur die willkührliche Excitation dieses dauernd thätigen motorischen Apparates während der Unthätigkeit des Sensorium commune aufhört. Daher müssen wir auch eine während des Schlafes fortdauernde Wechselwirkung der Centralorgane mit der motorischen Thätigkeit des sympathischen Systems nothwendig voraussetzen, ohne welchen Einfluss die Kraft der Bewegungsactionen im sympathischen System sogleich abnehmen würde, wie wir in der Apoplexie, in den von den Centralorganen eintretenden Ohnmachten und bei der künstlichen Zerstörung des Rückenmarkes (siehe oben p. 194.) deutlich sehen.

3) Die Centralorgane erfahren die Wirkungen der sensoriellen Nerven, und pflanzen sie entweder unbewusst reflectirend auf die Ursprünge der motorischen Nerven fort, wodurch die reflectirten Bewegungen (siehe oben p. 717.) entstehen; oder sie leiten diese Wirkungen zu dem Sensorium commune der Centralorgane, wodurch sie während der Thätigkeit des letztern bewusst werden. Im ersten Falle gelangen die centripetalen Wirkungen der sensoriellen Nerven nur bis zur Excitation des motorischen Apparates der Centralorgane, der vorzüglich seinen Sitz im Rükkenmark hat, aber sich auch in das Gehirn verzweigt; im zweiten Falle gelangen diese Wirkungen zu einem besonderen Theil der Centralorgane, ohne Reflexionsbewegungen zu erregen, in dem Sensorium commune zu dem Bewusstwerden der Seele. Nicht selten geschieht Beides; die Empfindungen werden bewusst, und erregen zugleich Reflexionsbewegungen, indem die Leitung

Digitized by Google

zugleich nach dem motorischen Apparate der Centralorgane und nach dem Sensorium commune geschieht, wie bei dem Husten von dem empfundenen Reize in der Luftröhre, bei dem Schliessen der Augenlieder von heftigem Schall, bei der Zusammenziehung der Iris von Reizung der Retina durch Lichtsehen. In Hinsicht der Theorie und Gesetze dieser Wirkungen muss hier auf das dritte Cap. des III. Abschn. p. 717. und p. 744. verwiesen werden. Da die Reflexionserscheinungen nicht von dem Sensorium commune, sondern von dem motorischen Apparate der Centralorgane abhängig sind, der letztere aber im Schlafe zu wirken fortfährt, so finden sie auch im Schlafe eben so gut wie im Wachen statt; wie der Husten von Reizen in der Luftrohre, und viele andere Erscheinungen während des Schlafes beweisen.

4) Die organischen Nervenwirkungen werden durch die Centralorgane des Nervensystems in ungestörter Kraft erhalten. Hier zeigt sich dasselbe Verhalten zwischen dem N. sympathicus und den Centralorganen, wie in Hinsicht der Bewegungen der dem N. sympathicus unterworfenen Theile. Die Ernährung und Absonderung geschehen unter einer gewissen selbstständigen Action der organischen Nerven. Embryonen sind zwar bis zur Reife bei Zerstörung des Rückenmarkes und Gehirns ernährt worden. Siehe oben p. 196. Vergl. Eschricht (in Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie* 1834. p. 268.). Ja zuweilen werden Theile von Embryonen, ein einzelner Kopf, eine Extremität, ernährt, welche nicht einmal ein Herz besitzen, und wo das Blut durch das Herz eines andern Embryo zugeführt wird, indem die Gefässe des defecten Embryos von der Nabelschnur des gesunden ausgehen. Siehe Rudolphi *Abhand. der Acad. zu Berlin.* 1816. und Mueller in dessen *Archiv für Anatomie und Physiologie* 1834. p. 178. Aber beim Erwachsenen leidet die Ernährung oft, wenn auch nicht immer, bei Lähmungen des Gehirns und Rückenmarkes, die gelähmten Theile sind bei Verletzungen derselben leichter dem Brand unterworfen, und bei heftigen acuten Leiden der Centralorgane mit Unterdrückung ihrer Actionen entsteht oft spontan der Brand in einzelnen Theilen. Bei der Tabes dorsalis verschwindet zuletzt die Fähigkeit zur Erection durch Blutanhäufung in dem erectilen Gewebe des Penis und zur Zeugung.

5) Das Nervenprincip wird in den Centralorganen erzeugt und wiedererzeugt. Diess geht aus den von mir und Sticker angestellten Versuchen (siehe oben p. 412.) hervor, nach welchen die von den Centralorganen getrennten Nerven eines Gliedes in der ersten Zeit zwar noch motorische Kraft besitzen, indem sie, gereizt, Bewegungen der von ihnen versehenen Muskeln erregen, nach welchen aber diese Nerven, sofern sie nicht wieder verheilen, nach mehreren Monaten alle Reizbarkeit für mechanischen und galvanischen Reiz verloren haben, so dass also die beständige Wechselwirkung der Nerven und der Centralorgane zur Erhaltung der Kräfte der Nerven nöthig ist, während die Centralorgane ihre Kräfte auch nach dem Verlust ihrer Conductoren behalten. Die Erhaltung der Reizbarkeit der Nerven ist indess nicht bloss von dem beständigen Einfluss der Centralorgane, son-

Digitized by Google

dern auch von ihrer Thätigkeit selbst abhängig. Wenn ein Nerve sehr lange Zeit nicht in Thätigkeit gesetzt wird, so verliert er immer mehr an Kraft für fernere Thätigkeit. Die meisten Menschen haben keinen Einfluss auf kleine Muskeln durch Mangel an Uebung, und nach Erblindung des Auges atrophirt in später Zeit der Sehnerve bis gegen das Gehirn hin; ja Magendie hat sogar diese Atrophie bei Vögeln durch künstlich bewirkte Erblindung schon in einigen Monaten erzeugt.

Die Scheidung der belebten thierischen Materie in Centralorgane, und die von den Centralorganen abhängigen Theile, ist nicht bloss ein Attribut aller thierischen Wesen; der Trieb zu dieser Scheidung ist sogar der keimfähigen Materie von Anfang an eingepflanzt, und es scheint, dass mit der Aeusserung dieses Triebes die ganze Organisation beginnt. Die p. 43. angeführten Beobachtungen über die zusammengesetzte Structur der einfachsten Thiere machen es wahrscheinlich, dass es bei allen, auch den scheinbar einfachsten Thieren, Nerven und von den Nerven abhängige Theile giebt, und wo die Anatomie des Nervensystems möglich ist, sehen wir auch wieder eine Sonderung desselben in gewisse wichtigere Centraltheile und ihre Conductoren, die Nerven. Beim Embryo der höheren Thiere beginnt sogleich diese Sonderung schon in der Keimhaut, in deren Achse sich der mit den Kräften der Centralorgane begeistete Theil der thierischen Materie anhäuft, während sich um dieselbe die davon abhängigen Theile gestalten. Aber auch in dem von den Centraltheilen abhängigen peripherischen Theile des neuen Wesens schreitet eine ähnliche Sonderung fort, indem sich dieser wieder in die Conductoren des Nervenprincips, die Nerven und die von ihnen den Einfluss der Centralorgane empfangenden Gewebe histologisch und virtuell sondert. Die Entstehung der Centralorgane bedingt die Entstehung der peripherischen Theile; die Entstehung der Nerven in dem peripherischen Theile des Thieres bedingt zugleich die Entstehung der wieder von den Nerven beseelten Gewebe. Mit dieser Sonderung zwischen Centralorganen und peripherischen Theilen ist das Gehirn und Rückenmark virtuell vorhanden; weder das eine noch das andere entsteht früher; die Ausbildung der einzelnen Regionen der Centralorgane ist erst wieder die Folge fortschreitender Entwickelung und Sonderung. Eben so ist es mit der histologischen Sonderung des peripherischen Theiles; sobald sie beginnt, ist gewiss der ganze Nerve vorhanden, nicht das äussere Ende des Nerven ist das Erste, das den Centralorganen entgegenwüchse. Wenigstens hat diese Ansicht von Serres (*anat. comp. du cerveau*) durchaus keine thatsächliche Basis; und die dafür angeführten Beobachtungen haben in den classischen Untersuchungen von Baer über die Entwickelungsgeschichte des Embryo keine Bestätigung gefunden.

Vergleicht man nun die niederen Thiere mit den höheren in Hinsicht des Gegensatzes der Centraltheile und peripherischen Theile, und wieder der Centraltheile und des peripherischen Nervensystems, so zeigt sich, dass dieser Gegensatz bei den niederen Thieren, wenngleich vorhanden, doch weniger ausgebil-

Digitized by Google

det ist. Nach der von Ehrenberg entdeckten zusammengesetzten Structur der für so einfach angesehenen Wesen, der Infusorien und Medusen muss man die Existenz der Nerven in allen Thieren annehmen. Siehe oben p. 43. Vergl. über die Medusen Ehrenberg in Mueller's *Archiv für Anatomie und Physiologie* 1834. Aber das die Centraltheile belebende Princip muss hier noch mehr über das Nervensystem verbreitet seyn, als bei den höheren Thieren, weil die Theilung dieser Thiere in Stücke den Organismus nicht zerstört, vielmehr zur Entstehung mehrerer Organismen die Veranlassung giebt. Bei einigen Anneliden, die ein deutliches Nervensystem haben, die aber, in zwei Theile getheilt, in den Theilen fortleben, wie die Nereiden, Naiden, ist diess ganz offenbar. Die aus einem knotigen Nervenstrange bestehenden Centraltheile müssen also hier das wirksame Princip der Centraltheile in einer grossen Ausdehnung enthalten. Und bei den Polypen und Planarien, die man in mehrere fortlebende Stücke durch Theilung in verschiedener Richtung sondern kann, muss die Vertheilung der mit den Kräften der Centraltheile begabten Materie noch grösser seyn. Der der belebten thierischen Materie eingepflanzte Trieb, sich in Centraltheile und abhängige Theile zu sondern, zeigt sich sogleich in dem abgetrennten Stücke der Planarie wieder, gleichwie in dem Keime der höheren Thiere. Dass aus diesem Stücke ein neues, mit allen Organen begabtes Thier wird, ist eben die Aeusserung jenes, aller belebten thierischen Materie einwohnenden Triebes.

Das vorher von den Ringelwürmern angeführte Beispiel zeigt uns, dass der knotige Nervenstrang derselben das wichtigste Lebensprincip der Centralorgane nicht bloss in dem ersten oder Hirnknoten, sondern in dem ganzen knotigen Strange enthält; denn mit der individuell belebten Materie ist hier das Lebensprincip selbst theilbar. Nun frägt sich, wie weit eine solche Ausdehnung des centralen Lebensprincips in dem Nervensystem der zunächst folgenden Thiere besteht.

Die gegliederten Thiere, obgleich sie noch mit einem knotigen Nervenstrange gleich den Anneliden begabt sind, leben getheilt nicht wieder fort; indessen auch die Insecten zeigen nach Wegnahme des Kopfes noch willkührliche Bewegungen. Ein Carabus granulatus lief nach wie vor herum; eine Bremse, auf den Rücken gelegt, strengte sich an, auf die Beine zu kommen. Treviranus führt auch die interessante Beobachtung von Walckenaer über eine Cerceris ornata an, welche einer in Löchern lebenden Biene nachstellt. Walckenaer stiess einer solchen Wespe im Augenblicke, wo sie in das Loch der Biene eindringen wollte, den Kopf ab; sie setzte ihre Bewegungen fort, und suchte umgekehrt dahin zurückzukehren und einzudringen. Treviranus *Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens.* 2. 194.

Diese Thatsachen beweisen, dass das Hirnganglion der Gliederthiere nicht allein Einfluss auf spontane und zweckmässige Bewegung hat. Indessen besteht doch eine Unterordnung in der Wirkung der übrigen Ganglien unter das Hirnganglion.

Bei den Wirbelthieren hat das Rückenmark nicht mehr den

Digitized by Google

grossen Einfluss auf spontane und willkührliche Bewegung wie bei den Wirbellosen die untergeordneten Ganglien der Centraltheile. Gleichwohl zeigt sich nach dem Köpfen der Thiere noch eine gewisse Harmonie und Zweckmässigkeit der Bewegungen. Vögel flattern mit den Flügeln. Der enthauptete Frosch setzt sich, wie Volkmann bemerkt, wieder auf. Doch habe ich dergleichen Bewegungen der enthaupteten Frösche, die von Reflexbewegung ganz unabhängig waren, immer nur dann gesehen, wenn der Kopf dicht am Halse getrennt war. Fiel der Schnitt tiefer, durch das Rückenmark, so zeigte der Frosch keine Spur von Willkühr in Bewegungen. Flattern auch Vögel noch mit den Flügeln nach Durchschneidung des Rückenmarks in der Mitte des Halses, so sind diess zwar gruppenweise Bewegungen, die im Rückenmark ihre Ursache haben, aber sie sind von willkührlichen Bewegungen noch sehr verschieden.

Wir besitzen auch keine sichere Thatsache, dass das Rückenmark unabhängig vom Gehirn und dem verlängerten Marke noch empfinde. Reflexbewegungen nach Hautreizen an enthaupteten Thieren können nicht hieher gerechnet werden, und zeigen enthauptete Frösche bei Hautreizen noch etwas Zweckmässiges in der Reaction, so tritt diese Erscheinung gewiss nur ein, wenn der Schnitt durch das Rückenmark in seinem Anfang geschah.

Bei allen höheren und niederen Wirbelthieren entspricht die Masse des Rückenmarkes im Allgemeinen dem Umfange der davon beherrschten Körpertheile; das Rückenmark eines Fisches ist verhältnissmässig nicht geringer als das Rückenmark eines Menschen, aber das Gehirn nimmt bei den höheren Thieren in gleichem Verhältniss mit der Ausbildung ihrer intellectuellen Fähigkeiten zu. Bei den Fischen besteht das Gehirn nur aus mehreren vor der Medulla oblongata liegenden Anschwellungen. Das Gehirn der Amphibien ist grösser als das der Fische, das der Vögel grösser als das der Amphibien, das der Säugethiere übertrifft das Gehirn der Vögel, das menschliche übertrifft alle. Wir wollen diese Vergleichung durch Angabe von Zahlenverhältnissen später weiter ausführen. Sind gleich alle thierischen Wesen bis zum Infusorium im Allgemeinen in Bezug auf das zum thierischen Leben Nothwendige gleich vollkommen organisirt, so muss ein Unterschied der Vollkommenheit in Beziehung auf die intellectuelle Entwickelung und ihre Organe zugegeben werden und ist im Bau des Gehirns offenbar.

Man sieht aus den bisherigen Betrachtungen, dass die Vergleichung der Stärke der Nerven mit den Centraltheilen des Nervensystems (zusammengenommen) bei verschiedenen Thieren wenig geeignet ist, physiologische Aufschlüsse zu geben. Die Stärke der Nerven wird zwar im Allgemeinen im Verhältniss zu den Centraltheilen bei den niederen Wirbelthieren zunehmen; aber richtiger ausgedrückt, nimmt sie nur im Verhältniss zum Gehirn auffallend zu. Ein anderer Apparat der Centraltheile, das Rückenmark, welches ausserdem, dass es ein Leiter vom Gehirn zu den von ihm entspringenden Nerven, und umgekehrt, ist, eine den Bewegungskräften des Körpers entsprechende motorisch ge-

Digitized by Google

ladene Säule darstellt, scheint überall diesen Bewegungskräften durch seine Masse und den von ihm entspringenden Nerven durch eben dieselbe (nicht durch Länge und Kürze, die sehr variirt) zu entsprechen. Das Rückenmark von Gadus Lota verhält sich zur Masse des Körpers nach Carus, wie 1 : 181, bei Salamandra terrestris wie 1 : 190, bei der Taube wie 1 : 305, bei der Ratte wie 1 : 180, bei der Katze wie 1 : 161. Allerdings giebt es bei den Fischen Nervenstämme, wie der Nerv. trigeminus und Nerv. vagus, welche den Durchmesser des Rückenmarkes zuweilen geradezu übertreffen. Indessen kömmt es bei der Vergleichung der Nerven und des Rückenmarkes bei verschiedenen Thieren wohl auf die Dicke der Nerven, aber nicht auf die Dicke des Rückenmarkes, sondern eben so gut auf dessen Länge, oder richtiger auf Vergleichung der ganzen Masse des Rückenmarkes mit der Summe der Stärke aller daraus entspringenden Nerven an. Dann aber kann die Stärke derjenigen Hirnnerven, welche aus den Rückenmarksfortsetzungen im Gehirn entspringen, nicht fruchtbar mit der Stärke des eigentlichen Rückenmarkes hinter dem Gehirn verglichen werden.

Die bisherigen Betrachtungen sollen uns den Weg zur genaueren Untersuchung der Kräfte des Gehirns und Rückenmarkes selbst eröffnen. Die wichtigsten Schriften über die Physiologie des Gehirnes und Rückenmarkes sind: Gall et Spurzheim *Anat. et physiol. du systeme nerveux. Paris* 1810. *f.* Tiedemann *Anatomie u. Bildungsgeschichte des Gehirnes. Nürnberg* 1816. 4. Burdach *vom Bau und Leben des Gehirns.* 1—3. *Bd. Leipz.* 1819—26. 4. Carus *Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns. Leipz.* 1814. 4. Desmoulins et Magendie *anatomie des systèmes nerveux. Paris* 1825. 2 *Vol.* 8. Serres *Anatomie comparée du cerveau. Paris* 1824. 2 *Vol.* Rolando *saggio sopra la vera struttura del cervello e sopra le funzioni del sistema nervoso. ed.* 3. *Torino* 1828. 3 *Vol.* 8. Flourens *Versuche u. Untersuchungen über die Eigenschaften und Verrichtungen des Nervensystems. Leipz.* 1824. 8. *Fortsetzung. Leipz.* 1827. 8. Treviranus, in Tiedemann's *Zeitschr. für Physiol. Bd. IV.*

II. Capitel. Vom Rückenmark.

Das Rückenmark unterscheidet sich schon anatomisch von den Nerven; es enthält, wie das Gehirn, dieselben zarteren röhrigen Fasern; es enthält in seinem Innern graue Substanz, die sich beim Durchschneiden als ein liegendes Kreuz darstellt, so dass die Figur derselben in dem vorderen und hinteren Strange sich jederseits hornartig verlängert. Ueber die doppelte Art der grauen Substanz und über die substantia cinerea gelatinosa des Rolando den hinteren Hörnern entlang siehe oben in der feinern Anatomie der Nerven pag. 612. Aber auch die Anordnung der weissen Substanz ist eigenthümlich. Rachetti und Rolando haben die Beobachtung gemacht, dass die weisse Substanz in von aussen nach innen gehende Lamellen getheilt ist, die man durch

Digitized by Google

längere Aufbewahrung von Rückenmarksdurchschnitten in Kochsalz sichtbar machen kann; und Rolando behauptet, dass die Marksubstanz aus lauter aneinander liegenden Falten einer abwechselnd umgeschlagenen Markhaut bestehe, so dass dünne Fortsätze der Gefässhaut zwischen diese Falten von aussen eintreten, während von innen dünne Lagen grauer Substanz dazwischen treten. In der weissen vordern Commissur des Rückenmarkes soll die Markhaut von der einen zur andern Seite herüber gehen, während dieser Uebergang hinten fehle.

In physiologischer Hinsicht stimmt das Rückenmark mit den Nerven darin überein, dass es die Wirkungen seiner Nerven auf das Gehirn so fortpflanzt, wie die Gehirnnerven es unmittelbar auf das Sensorium commune thun, und dass es die Hirnwirkungen auch wieder zu seinen Nerven so leitet, als wenn diese unmittelbar von dem Gehirn selbst entsprängen; in anderen Punkten unterscheidet sich das Rückenmark aber wesentlich von den Nerven durch ihm selbst, als Centraltheil, und nicht den Nerven zukommende Kräfte. Wir werden beiderlei Eigenschaften genauer untersuchen.

1) *Das Rückenmark als Leiter, Conductor des Nervenprincips oder der Oscillationen desselben.* Alle Hirnnerven sind unmittelbar und alle Spinalnerven mittelbar durch das Rückenmark unter den Einfluss des Gehirns gesetzt. Sobald dieser Einfluss unterbrochen wird, gelangen die Reizungen der Empfindungsnerven nicht mehr zum Bewustseyn, und das Gehirn kann nicht mehr willkührlich die motorische Kraft derjenigen Nerven anregen, welchen sein Einfluss entzogen wird.

Die Ursachen, welche die Gemeinschaft des Gehirns und Rückenmarkes mit den Nerven unterbrechen, sind Druck auf die Nerven, Zerstörung und Zerschneidung derselben, und Lähmung ihrer motorischen Kraft durch auflösbare Stoffe, z. B. bei der Bleivergiftung.

So oft diese Ursachen auf einen Nerven wirken, sind alle unter der verletzten Stelle abgehenden Zweige der willkührlichen Erregung der motorischen Kraft entzogen, und die von diesen Zweigen versehenen Muskeln sind in Hinsicht der willkührlichen Bewegung gelähmt, und in demselben Theile hört die Empfindung gegen äussere Reize auf.

Diejenigen Nervenzweige dagegen, welche über der verletzten Stelle des Nerven entspringen, sind dem Einfluss des Gehirns und der Willensbestimmung auf ihre Muskeln nicht entzogen, weil ihre Primitivfasern noch unversehrt mit dem Gehirn zusammenhängen. Auch haben aus demselben Grunde alle sensibeln Nervenzweige noch Empfindung, welche über der verletzten Stelle von ihrem Stamme entspringen, und also noch durch ihre Primitivfasern mit dem Gehirn oder Rückenmark zusammenhängen.

Die Verletzung eines Nerven an einer Stelle hebt nur die Gemeinschaft mit dem Gehirn oder dem Organe des Bewusstseyns und der willkührlichen Excitationen auf, dagegen behalten die unter der verletzten Stelle gelegenen Theile des Nerven ihre motorische Kraft selbst eine geraume Zeit unversehrt, und es ist nur

Digitized by Google

der Hirneinfluss auf dieselben aufgehoben. Wenn man daher einen Nerven, welcher durch Entziehung des Hirneinflusses gelähmt ist, oder nicht mehr mit dem Gehirn zusammenhängt, sticht, quetscht, brennt, ätzt, elektrisirt, galvanisirt, so hat zwar keine Empfindung statt, weil die Reizung nicht mehr zum Gehirn gelangt, aber es zucken dennoch die Muskeln, zu welchen dieser Nerve Zweige schickt, weil nur der Hirneinfluss auf die motorische Kraft, nicht aber die motorische Kraft des Nerven unter der verletzten Stelle gelähmt ist. Nur wenn ein Nerve mehrere Monate dem Einflusse der Centraltheile entzogen ist, verliert er, wie meine und Sticker's Versuche (siehe oben p. 639.) gezeigt haben, seine Reizbarkeit ganz.

Beim Menschen und den höheren Thieren verhält sich daher das Rückenmark zum Gehirn gerade so, wie alle Hirnnerven zum Gehirn, und das Rückenmark ist als gemeinsamer Stamm aller Rumpfnerven zu betrachten, obgleich es auch noch eigenthümliche Kräfte vor den Nervenstämmen voraus hat. Durch das Rückenmark werden die Primitivfasern aller Rumpfnerven mit dem Gehirn verbunden, während die Hirnnerven unmittelbar zum Gehirn treten.

Hiernach sind die Folgen der Rückenmarksverletzungen zu beurtheilen. Verletzung des untersten Theiles des Rückenmarkes bewirkt Lähmung der unteren Extremitäten, des Mastdarms, der Blase, Verletzung desselben höher hinauf bewirkt Lähmung jener Theile sammt den Bauchmuskeln, noch höher hinauf Lähmung aller dieser Theile sammt den Brustmuskeln; Verletzung des Rückenmarkes am Halse unter dem 4. Halsnerven bewirkt auch Lähmung der Arme, aber nicht des Zwerchfells, wegen des Ursprunges des N. phrenicus von dem 4. Halsnerven; Verletzung des verlängerten Markes bewirkt Lähmung des ganzen Rumpfes. Wenn eine Verletzung von unten nach aufwärts vorschreitet, so schreitet auch die Lähmung von unten nach aufwärts vor, wie in der Tabes dorsalis. Das Rückenmark verhält sich also hierbei ganz als Stamm der Rumpfnerven. Reizt man den obern Theil des Rückenmarkes mechanisch oder galvanisch, so zucken alle Muskeln des ganzen Rumpfes, gerade so, wie durch Reizung eines Nervenstammes alle Muskeln seiner Zweige zucken. Durchschneidet man einen Nerven, so ist das dem Hirneinfluss entzogene Stück, wenn es gereizt wird, fähig, Zuckungen in den Muskeln dieses Nerven hervorzurufen; durchschneidet man das Rückenmark eines Thieres, so ist das dem Hirneinfluss entzogene Stück des Rückenmarkes, wenn es gereizt wird, fähig, noch alle Nerven, die von ihm entspringen, und dadurch ihre Muskeln zu excitiren.

Allein das Rückenmark vertritt nicht allein alle Rumpfnerven in genere im Gehirn, sondern auch die einzelnen Primitivfasern der Rumpfnerven; denn die Affection gewisser Theile des Rückenmarkes unterbricht nur den Hirneinfluss zu gewissen Muskeln des Rumpfes, und die Verletzung gewisser Theile des Gehirns hat auch nur die Lähmung gewisser Theile des Rumpfes zur Folge. Die halbseitige Ursache der Lähmung im Gehirn und Rücken-

Digitized by Google

mark bedingt auch nur eine halbseitige Lähmung am Rumpfe, und je kleiner die Verletzung, je weniger sie von den Strängen des Rückenmarkes umfasst, um so weniger Theile sind durch sie dem Hirneinfluss entzogen. Bedenkt man ferner, dass es vom Gehirn abhängt, wie viel Muskeln des Rumpfes jedesmal bewegt werden, so scheint daraus nothwendig hervorzugehen, dass die Primitivfasern der Nervenstämme, welche ins Rückenmark treten, auch im Rückenmark sich nicht verbinden, sondern parallel neben einander, wie im Stamme eines Nerven zum Gehirn treten, um isolirt dem Gehirn örtliche Empfindungen mitzutheilen, und isolirte Excitationen zur Bewegung zu erhalten. Denn wenn sich die Primitivfasern der Nerven im Rückenmark verbänden, so wäre eine örtliche Empfindung am Rumpfe eben so wenig möglich, als eine isolirte Zusammenziehung einzelner Muskeln am Rumpfe. Auch die Ursache der Zuckungen im Gehirn und Rückenmark wirkt auf einzelne Theile am Rumpfe, und so entstehen auch Empfindungen in einzelnen Theilen des Rumpfes, bei Verletzungen gewisser Theile des Rückenmarks und Gehirns.

Uebrigens ist die Ordnung der Primitivfasern zu Nerven beim Hervortreten aus dem Rückenmark noch nicht vorgebildet, sondern tritt erst durch das bündelweise Zusammenfassen von Wurzelfaden ein. Bekanntlich inseriren sich die vorderen und hinteren Wurzeln in den vorderen und hinteren Strängen in einer seitlichen Linie, jederseits etwas entfernt von der Mittellinie. Die Wurzelbündel der Cauda equina inseriren sich hier dicht neben einander ohne Unterbrechung, die Wurzeln der übrigen Nerven dagegen mit scheinbarer Unterbrechung, indem die Fasern zwar aus einander fahren, aber die Büschel der Nervenwurzeln sich nicht erreichen. So ist es scheinbar in den genannten seitlichen Insertionslinien, wo die Faserbündel die pia mater durchbohren. Allein von jener Insertionslinie aus fahren sie noch weiter aus einander, und wenn man sie noch tiefer verfolgt, so sieht man, dass die Wurzelanfänge aller Nerven ziemlich eine nicht unterbrochene Längslinie bilden, so dass die Wurzel eines Spinalnerven erst entsteht durch das Zusammenfassen einer gewissen Anzahl der Primitivbündel. Sieht man von dem bündelförmigen Zusammenfassen der Primitivfasern zu Nervenstämmen ab, und betrachtet man die Ursprünge der Primitivfasern im Rückenmark hinter einander, ihre Isolation in den Nervenstämmen, ihr Auseinandergehen in der letzten Verzweigung, so gleicht das Rückenmark einem aus Nervenfasern gebildeten Stamme, von welchem ununterbrochen mit Regelmässigkeit vorn und hinten viele Millionen Primitivfasern, theils von motorischer Kraft, theils von sensibler Kraft gleichsam wie Strahlen zu allen Theilen gehen, welche zwischen ihrem Ursprunge im Rückenmarke und ihren peripherischen Enden in so viel grössere und kleinere Bündel durch Nervenscheiden zusammengefasst sind, als es Rückenmarksnerven und Zweige derselben giebt. Wir haben aber schon gesehen, dass diess Zusammenfassen ohne alle wahre Verbindung der Primitivfasern, und ohne Mittheilung der Urkräfte der Primitivfasern geschieht.

Die vergleichende Anatomie giebt uns über das Verhältniss

Digitized by Google

der Nerven zum Rückenmark keine Aufschlüsse. Wir finden sehr abweichende Verhältnisse in der Länge des Rückenmarkes vor. Beim Igel, dessen Hautmuskel eines bedeutenden Nerveneinflusses bedarf, während die Haut, mit Stacheln bewaffnet, wenig der Gefühlseindrücke fähig ist, hört es so frühzeitig auf, dass die hintere Hälfte desselben fehlt; bei den meisten anderen Säugethieren nimmt es fast die ganze Länge des Canalis vertebralis ein, und bei den Kaninchen, Meerschweinchen reicht es, trotz der Kürze des Schwanzes, über die Heiligenbeinwirbel hinaus (Desmoulins, a. a. O. 2. p. 539.); zum Beweise, dass seine Verlängerung nicht allein von der Länge und Stärke des Schwanzes abhängt. Beim Känguruh, wo der sehr starke Schwanz mehr zur Stütze als zum Tasten dient, soll das Rückenmark, nach Desmoulins, nicht länger als bei den Hunden seyn; dasselbe soll bei den Affen mit Greifschwänzen sich mit einem noch bedeutenden Volum bis zu den Heiligenbeinwirbeln verlängern. Bei Tetrodon mola, einem Fisch, der fast so hoch als lang ist, ist das Rückenmark auf den ersten Blick gar nicht vorhanden. Das Gehirn endigt in einem äusserst kurzen keilförmigen Stumpfe des Rückenmarkes, von welchem die Wurzeln der Nerven wie Saiten in einer vordern und hintern Reihe neben einander abgehen. Bei den meisten Thieren ist das Rückenmark ein Strang, der in dem Grade nicht abnimmt, als Nervenwurzeln von ihm abgehen, (wie man besonders bei Fischen, Schildkröten sieht), und der tief unten noch fast eben so dick wie oben ist. Es ist also wahrscheinlich, dass die Primitivfasern des Rückenmarkes vom Gehirn kommend, zwar an den entsprechenden Stellen Wurzelfasern der Nerven abgeben, dass aber noch viele andere Fasern im Rückenmark vorkommen.

Die Entdeckung, dass die vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven bloss motorisch, die hinteren bloss sensibel sind (siehe oben p. 649.), hat auf die Geschichte der Lähmungen sehr viel Licht geworfen. Bekanntlich ist zuweilen die Empfindung eines Gliedes, oder der ganzen Seite, oder der ganzen unteren Theile des Körpers gelähmt, während die Bewegung unversehrt ist; in anderen Fällen ist die Bewegung gelähmt und die Empfindung unversehrt; in anderen Fällen sind beide zugleich gelähmt. Nun fragt sich, wiederholt sich der Unterschied der sensoriellen Nerven und motorischen Nerven auch am Rückenmark, laufen die sensoriellen Fasern von den motorischen Fasern des Rückenmarkes verschieden zum Gehirn? Die Verschiedenheit der Lähmungen scheint diess zu beweisen, denn anders ist es unmöglich, jene merkwürdigen pathologischen Thatsachen zu erklären. Aber ein Anderes ist es, bestimmt anzugeben, welches die motorischen, welches die sensibeln Theile des Rückenmarkes sind. Entweder, kann man sagen, sind die vorderen Stränge, aus welchen die motorischen Wurzeln entspringen, selbst bis zum Gehirn motorisch, die hinteren Stränge, aus welchen die sensibeln Wurzeln entspringen, bis zum Gehirn bloss sensibel; oder, könnte man fragen, ist etwa die weisse Rindensubstanz des Rückenmarkes der einen, die graue Substanz der andern Function bestimmt?

Digitized by Google

Für die erstere Annahme, welche Bell und Magendie theilen, giebt es keine ganz genügenden Beweise, weder experimenteller noch pathologischer Art. Sichere Experimente sind unmöglich zu machen; denn indem man durch Schnitt auf die hinteren Stränge des Rückenmarkes wirkt, drückt man zugleich die vorderen. So definitiv die Resultate in Hinsicht der vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven sind, so wenig sind sie es in Hinsicht der vorderen und hinteren Stränge des Rückenmarkes, die sich überdiess als getrennt nicht einmal anatomisch nachweisen lassen. Diess habe ich schon bei Bekanntmachung meiner Versuche über die Wurzeln in meinem französischen Memoire (*ann. des scienc. nat.* 1831.) erklärt. Magendie (*Journal de physiol. T.* 3. 153.) fand die hinteren Stränge sehr empfindlich, die vorderen nicht empfindlich, aber sie erregten gereizt heftige Zuckungen. Später (*Journ. de physiol.* 3. *p.* 368.) gab er zu, dass das Resultat nicht absolut sey. Backer (*comment. ad quaest. physiol. Ultraj.* 1830.) fand nach Durchschneidung der vorderen Stränge nur die Bewegung, nach Durchschneidung der hinteren nur die Empfindung gelähmt; er sah bei Thieren, denen er die vorderen Stränge des Rückenmarkes im Rückentheil durchschnitten, nach Vergiftung der Thiere mit Nux vomica bloss in den vorderen Extremitäten Krämpfe entstehen. Seubert's Versuche hatten in Hinsicht der Nervenwurzeln ein entscheidendes, in Hinsicht des Rückenmarkes ein unsicheres Resultat. Die vordere Gegend scheint nach diesen Versuchen vorzüglich, aber nicht allein, der Bewegung vorzustehen, die hintere vorzüglich, aber nicht allein, der Empfindung. Uebereinstimmend damit sind die älteren Versuche von Schoeps (Meckel's *Archiv.* 1827.), wonach die Section der vorderen Stränge des Rückenmarkes die Sensibilität schwächt, nach der Section der vorderen Stränge eine grössere Sensibilität zurückbleibt, als nach Section der hinteren Stränge, nach der Section der hinteren Stränge die Bewegung der Extremitäten aufhört, die aber wiederkehrt, nach der Section der vorderen Stränge die Bewegung ganz aufhört. Die pathologischen Fälle, die man in Seubert's Schrift (*de funct. rad. ant. et post. nerv. spin. Carlsruhae* 1833.) zusammengestellt findet, bestätigen die Hypothese nur zum Theil, mehrere Fälle sprechen geradezu dagegen, wie auch der Umstand, dass der motorische Nervus accessorius bei Vögeln und Amphibien ganz aus den hinteren Strängen entspringt. Bellingeri (*de medulla spinali. August. Taurin.* 1823.) behauptet, die hinteren Wurzeln hätten einen dreifachen Ursprung von den hinteren Hörnern der grauen Sudstanz, von der weissen der hinteren Bündel des Rückenmarkes, von den Seitenbündeln; die vorderen Wurzeln auch einen dreifachen Ursprung von den vorderen Bündeln, von den vorderen Seiteneinschnitten, von den Seitenbündeln. Wären diese Angaben richtig, was sehr zu bezweifeln ist, so würden die hinteren Wurzeln allein mit der grauen Substanz zusammenhängen. Bellingeri nimmt ohne Beweise an, dass die innere graue Substanz der Empfindung, die weisse der Bewegung vorstehe, dass die vorderen Stränge des Rückenmarkes und die vorderen Wurzeln der Bewegung der

Digitized by Google

Beugemuskeln, die hinteren der Bewegung der Streckmuskeln bestimmt seyen; diess ist wenigstens in Hinsicht der Wurzeln durchaus unrichtig. Nach E. H. Weber soll es zuweilen gelingen, die Spuren der Nervenwurzeln überhaupt bis zur grauen Substanz zu verfolgen, was dagegen Rolando bezweifelt hat. Ueber den Antheil der grauen und weissen Substanz an den beiden Functionen lassen sich leider durchaus keine Experimente anstellen, und was alle Experimente über die vorderen und hinteren Stränge unsicher macht, ist die Reflexionsfähigkeit des Rückenmarkes, eine sensorielle Affection nach dem motorischen Apparat zu verpflanzen. Wenn z. B. die vorderen Stränge wirklich allein motorisch, die hinteren bloss sensoriell sind, so müsste doch eine Verletzung der hinteren Stränge leicht schon deswegen durch Mitaffection der vorderen Stränge Zuckungen bewirken, weil das Rückenmark bei allen heftigen Verletzungen in den reflectirenden Zustand geräth, wo dann jede Reizung der sensoriellen Nerven, auf das Rückenmark verpflanzt, sich auf die motorischen Nerven reflectirt. Vgl. oben p. 717.

Die Fasern des Rückenmarkes gelangen durch die Medulla oblongata zum Sensorium commune. Ohne hier die Eigenschaften der verschiedenen Theile des Gehirns, und ohne die übrigen Eigenthümlichkeiten des Rückenmarkes schon hier zu untersuchen, wollen wir hier nur erwägen, dass das Rückenmark die Primitivfasern aller Spinalnerven einzeln durch seine Fasern im Gehirn vertritt, so wie die Hirnnerven durch ihre Primitivfasern sich im Gehirn vertreten. Das Gehirn empfängt die Eindrücke aller sensibeln Fasern des ganzen Organismus, wird ihrer bewusst, und weiss den Ort der Empfindung nach der Affection der verschiedenen Primitivfasern; das Gehirn excitirt wiederum die motorische Kraft aller motorischen Primitivfasern und des Rückenmarkes bei der willkührlichen Bewegung. Wir bewundern in dieser Thätigkeit einen unendlich complicirten und feinen Mechanismus der Anordnung der Elemente, während die Kräfte selbst durchaus ideeller Art sind. So verschieden die Thätigkeit ist, so gleicht doch die Action des Gehirns bei der Erregung eines gewissen Theils unter den unendlich vielen Primitivfasern dem Spiel eines vielbesaiteten Instrumentes, dessen Saiten erklingen, so wie die Tasten berührt sind. Der Geist ist der Spieler oder Excitator, die Primitivfasern aller Nerven, die sich im Gehirn ausbreiten, sind die Saiten, und die Anfänge derselben die Tasten. Niemeyer (*Materialien zur Erregungstheorie. Gött.* 1800.) erklärt die willkührlichen Bewegungen daraus, dass die Spannung der Antagonisten aufgehoben werde; allein einzelne Muskeln bewegen sich, wenn die Antagonisten durchschnitten sind, noch willkührlich.

Die Nervenstämme und das Rückenmark als Stamm der Rumpfnerven gleichen sich auch darin, dass bei Affectionen des letztern Empfindungen scheinbar in den äusseren Theilen entstehen, gleichsam als wären die äusseren Theile selbst der Sitz der Affection. Eben so ist es, wie wir gesehen haben, bei der Affection der Nervenstämme. Beim Druck auf die Nervenstämme ht das Gefühl von Ameisenlaufen in der Haut, beim Druck

Digitized by Google

auf das Rückenmark entsteht dieselbe Formication in allen Theilen, welche unter der verletzten Stelle ihre Nerven erhalten. Bei den Geschwülsten der Nerven sind die Theile, zu welchen die Enden der Nerven hingehen, von den heftigsten Schmerzen befallen; beim Durchschneiden der Nervenstämme schmerzen die äusseren Theile; eben so ist es mit dem Rückenmark, welches bei entzündlichen und anderen Affectionen oft die heftigsten Schmerzen scheinbar in den äusseren Theilen erregt. Selbst wenn vollkommene Empfindungslosigkeit für äussere Reize vorhanden ist, können die Verletzungen des Rückenmarkes doch noch subjective Empfindungen erregen, welche scheinbar in den äusseren Theilen sind. Hieher gehört besonders das Ameisenlaufen in den unteren Extremitäten, bei gänzlichem Verlust aller Empfindung für äussere Reize und der Bewegung. Siehe Ollivier *Krankh. des Rückenmarkes, übers. von* Radius. *Leipz.* 1824. p. 156. Allein die subjectiven Empfindungen in den Extremitäten bei vollkommener Empfindungslosigkeit und Lähmung der Bewegungen können auch die heftigsten Schmerzen in den äusseren Theilen seyn, wie in dem schon erwähnten Falle von Heydenreich zu Bonn, wo bei Lähmung der Bewegung vollkommene Empfindungslosigkeit in den unteren Extremitäten ist, und dennoch von Zeit zu Zeit die heftigsten Schmerzen in den empfindungslosen Theilen sich einstellen. Am häufigsten ist die Formication in den äusseren Theilen als Symptom von Rückenmarksaffection, wo diess Symptom fast niemals fehlt. Die Formication ist hier dasselbe als das Ohrenklingen für den Hörnerven, und die fliegenden Mücken und andere krankhafte subjective Sinneserscheinungen für das Gesichtsorgan; und so wie die subjectiven Sinneserscheinungen, welche von der Bewegung des Blutes in der Netzhaut beim gesunden Menschen entstehen, durch einander springende Pünktchen sind, welche überall zu seyn scheinen, wo man hinsieht, so ist die Formication oder das Gefühl von laufenden Punkten wahrscheinlich eine Empfindung der Blutbewegung in den Capillargefässen des kranken Theiles vom Rückenmark, scheinbar in den äusseren Theilen empfunden. In anderen Fällen hat man statt der Formication ein unaufhörliches Jucken in den Beinen bemerkt, welches beim Kratzen nicht verschwindet. Ollivier p. 309.

Unter die subjectiven Empfindungen bei Rückenmarksaffection gehört auch die Aura epileptica der Epileptischen in den Extremitäten, oft zuerst an den Fingern und Zehen, ein der Formication ähnliches Gefühl, welches immer mehr fortschreitet und den Anfall verkündet. Die Erfahrung, dass Umbinden des von der Aura epileptica befallenen Theiles den Anfall oft verhindere, begünstigt die Vorstellung, dass die Aura epileptica ihre Ursache in den Enden der Nerven und nicht im Rückenmark habe. Diess Binden mag wohl als heftiger Hautreiz wirken. Nur bei der Epilepsie von Nervengeschwülsten ist die Aura in den Nerven selbst und hemmt die Ligatur allerdings das Fortschreiten. Vergl. oben p. 704.

Da der Sitz der Empfindungen weder in den Nerven, welche

Digitized by Google

die dazu nöthigen Strömungen oder Schwingungen des Nervenprincips zum Gehirn bringen, noch in dem Rückenmarke ist, welches diese Wirkungen auch wie die Nerven zu dem Sensorium commune leitet, da die Empfindung erst durch die Wirkung der Fasern der Nerven und des Rückenmarkes auf das Sensorium commune in diesem entsteht, so ist es leicht begreiflich, warum das Sensorium commune die Erregungen der Fasern des Rückenmarkes auch wie der Nerven in gleicher Art empfindet, wenn auch die Affection dieser Fasern in verschiedenen Punkten ihrer Länge stattfindet; denn eine auch noch so lange Faser wirkt nur mit ihrem Hirnende auf das Sensorium, und die an verschiedenen Punkten dieser Fasern stattfindenden Irritationen können immer nur durch dasselbe Hirnende der Fasern auf das Sensorium wirken. Wir treffen indess hier bei dem Rückenmark auf denselben Widerspruch wie bei den Nerven. Gleichwie ein Nervenstamm gedrückt, gestossen, sowohl Empfindungen scheinbar an seinem peripherischen Ende und an dem Stamme selbst bewirkt, wie der Stoss auf den N. ulnaris sowohl Empfindungen im 4. und 5. Finger, als an dem Nervenstamme selbst erregt, so kann auch eine Verletzung des Rückenmarkes sowohl Empfindungen in allen Theilen, deren Nerven unter der verletzten Stelle entspringen, bewirken, als auch der verletzte Theil des Rückenmarkes selbst schmerzhaft empfunden wird. Vergl. oben p. 701. Viele Fälle dieser Art gehören zwar nicht hieher, indem Krankheiten des Rückgrats selbst und der häutigen Umgebungen des Rückenmarkes, ausser den Phänomenen des Drucks auf das Rückenmark nothwendig auch mit Gefühl in den verletzten Umgebungen begleitet sind. Aber es giebt auch reine Rückenmarksschmerzen, Rachialgie. Auch die Gefühle von Schauder und Rieseln im Rücken müssen im Rückenmark ihren Sitz haben. Die Ursache, warum die Empfindungen bald in den äusseren Theilen, bald im Rückenmarke selbst empfunden werden, ist uns noch unbekannt.

Wir haben bisher die Aehnlichkeiten der Nerven und des Rückenmarkes, oder dasselbe als einen Conductor der von ihm ausgehenden Nerven bis zum Gehirn und umgekehrt betrachtet; wir werden jetzt die Eigenschaften des Rückenmarkes untersuchen, welche es von den Nerven unterscheiden, und welche ihm als Theil des Centralapparates zukommen.

2) *Das Rückenmark als Theil der Centralorgane.* Schon der Bau des Rückenmarkes zeigt, dass dasselbe mehr als einen Conductor der Fasern der Nerven zum Gehirn darstellt; wäre diess der Fall, so müsste das Rückenmark in seinem obern Theile bloss die Summe aller Fasern enthalten, die sich von oben bis unten aus ihm entwickeln, gleich wie ein Nervenstamm nur alle Fasern zusammen enthält, die bei seiner Verzweigung sich von ihm ablosen. Das Rückenmark müsste also von oben bis unten, je mehr Nerven von ihm abgehen, in demselben Maasse dünner werden, oder einen unten zugespitzten Keil darstellen. Diess ist nicht der Fall, wenn sich auch sein Durchmesser im Allgemeinen von oben nach unten vermindert. Selbst an seinem Ende, wo die

Digitized by Google

letzten Nerven abgehen, enthält es noch mehr Masse, als die Mutterfäden der dort abgehenden Nerven betragen, überdiess schwillt es am Abgang der Nerven der Extremitäten an und bei mehreren Fischen schwillt es sogar an seinem Ende in einen unten zugespitzten Kolben an. (E. H. Weber in Meckel's *Archiv* 1827. p. 316.) Ausserdem enthält das Rückenmark zweierlei Substanzen, wie das Gehirn. Es lassen sich aber auch die Eigenschaften und Kräfte, wodurch sich diess Organ von den Nerven unterscheidet, deutlich nachweisen.

a) Das Rückenmark besitzt die Fähigkeit, sensorielle Reizungen seiner Empfindungsnerven auf die motorischen Nerven zu reflectiren. Es ist Reflector. Diese Eigenschaft, wodurch auf eine Empfindung Bewegungen erfolgen, ohne dass beiderlei Nerven durch ihre Primitivfasern communiciren, ist schon oben bei der Lehre von der Reflexion untersucht worden. Kein Nerve an sich, der von den Centraltheilen getrennt wäre, besitzt das Vermögen der Reflexion. Die reflectirende Thätigkeit des Rückenmarkes und der Medulla oblongata ist an sich schon ein gesundes Phänomen, doch in einer gewissen Beschränkung. Aber man versetzt das Rückenmark durch Narcotisation des Thiers oder besonders bei Amphibien durch Enthaupten in das Maximum von Disposition zur Reflexion. Wenn man der Salamandra maculata den Kopf abnimmt, so bleibt der Rumpf auf den Füssen stehen, und sobald man die Haut reizt oder auch nur berührt, windet sich der Rumpf. Dieses Vermögen der Reflexion bleibt mehrere Stunden lang in allen Stücken des Rumpfes, die noch etwas vom Rückenmark enthalten. Schneidet man das ganze Thier in der Hälfte durch, so besitzt das untere Stück dieselbe Kraft wie das obere, man kann den Schwanz in viele Stücke theilen, jedes Stück, welches noch etwas vom Rückenmark enthält, zieht sich zusammen, sobald man es nur auf das leiseste berührt; ja selbst das Schwanzende windet sich noch, sobald es berührt wird. Alle diese Theile enthalten noch etwas vom Rückenmark, wie ich mich überzeugt, und diess Thier besitzt keine eigentliche Cauda equina. Dass das Rückenmark die Ursache der auf die Berührung erfolgenden Windungen ist, lässt sich thatsächlich beweisen. Denn nur diejenigen auch kleinsten Theile des Salamanders behalten diess Vermögen, welche noch etwas vom Rückenmark enthalten; diejenigen dagegen nicht, welche nichts davon enthalten, mögen sie sonst auch noch so gross seyn. Schneidet man ein Bein des Salamanders ab, so zeigt es auf mechanische Reizung der Haut keine Spur der Bewegung, und dennoch bewegt sich das Schwanzende noch, sobald man es berührt.

Die zum Rückenmarke gelangende Sensation bewirkt beim Salamander nicht allein die Bewegung der unter dem Hautreiz gelegenen Theile, sondern der ganze Rumpf bewegt sich, wenn auch nur die Schwanzspitze gereizt wird. Das Rückenmark dieser Thiere verhält sich daher durchaus anders als ein Stamm von Nerven, denn ein Stamm von Nerven, vom Rückenmark und Gehirn getrennt, empfindet nicht, und bewirkt auch keine Bewe-

Digitized by Google

gung auf Veranlassung einer Reizung der Empfindungsnerven der Haut.

b) Das Rückenmark ist der Reflexion von Empfindungsnerven auf Bewegungsnerven fähig, ohne selbst zu empfinden. Die Behauptung, dass das Rückenmark auch zu dem Sensorium commune gehöre, stützt sich zum Theil auf die Thatsache, dass bei geköpften Thieren Reize an der Haut des Rumpfes angebracht, Bewegungen in nahen und entfernten Theilen desselben hervorbringen. Allerdings zieht der Rumpf eines Frosches, dessen Hirn vom Rückenmark getrennt ist, auf einen Hautreiz oft ein Glied an. Die Schildkröten thun es auch; diess findet aber seine volle Erklärung in der reflectirenden Function des Rückenmarkes, in dem Vermögen, die centripetale Wirkung eines Empfindungsnerven auf motorische Nerven zu reflectiren. Wir haben früher gezeigt, dass die Reflexion von einer Empfindungsreizung auf einen Bewegungsnerven durch das Rückenmark am leichtesten bei Nerven nahen Ursprunges geschieht; und es darf uns nicht wundern, wenn auf Reizung der Haut des Fusses der Fuss, auf Reizung der Haut des Armes der Arm angezogen wird. Diess geschieht eben so unwillkührlich in heftigen Verbrennungen bei Menschen, ja es geschieht auch bei jedem Menschen in den Reizungen der Schleimhaut des Schlundes, des Kehlkopfes, der Luftröhre. Immer entstehen dann unwillkührlich die Reflexionsbewegungen am leichtesten an demselben Theile, an dem Schlunde durch unwillkührliches Schlingen, an dem Kehlkopfe durch Verengerung der Stimmritze u. s. w. Das Anziehen der Extremitäten bei einem geköpften Frosche auf Reizung der Haut derselben geschieht daher eben so wenig bewusst und mit Absicht, als der allgemeine tetanische Krampf bei Berührung der Haut einer geköpften Salamandra maculata oder eines narcotisirten Frosches. Es ist hier nur noch der Beweis zu führen, dass es auch im gesunden Zustande des Menschen reflectirte Bewegungen, nach Erregung von Empfindungsnerven, ohne alles Bewusstseyn giebt. Bei den von dem kranken Magen, Darmkanal, Nieren, Leber, Uterus erregten Erbrechungsbewegungen der Rumpfmuskeln wird die Ursache in Magen, Darm, Nieren, Uterus, Leber sehr häufig und in der Regel nicht empfunden; d. h. die nach dem Rückenmark und der Medulla oblongata gelangende centripetale Erregung der Empfindungsnerven kömmt nicht zum Bewusstseyn. Und so sehen wir deutlich, dass das Rückenmark bei der Reflexion nicht nothwendig empfindet, und dass jene Beweise von dem mit Bewusstseyn verknüpften Empfindungsvermögen des Rückenmarkes ungegründet sind. Auch der vom Rumpf getrennte Kopf kann uns Reflexionserscheinungen zeigen, ohne dass eine entfernte Wahrscheinlichkeit vorhanden wäre, dass ein vom Rumpfe getrennter Kopf eines Menschen oder höhern Thieres noch bewusst empfinde. Der mit einer solchen Verletzung verbundene Blutverlust ist grösser, als irgend einer, der beim Menschen gewöhnlich schon das Bewusstseyn nimmt; abgesehen von den anderen Folgen einer solchen Verletzung, wie die Zerschneidung des obersten Theiles des Rückenmarkes. Wenn der Kopf eines Hinge-

Digitized by Google

richteten bei Reizung des Stumpfes vom Rückenmark Zuckungen in den Gesichtsmuskeln erscheinen lässt, so ist es nicht anders möglich; ja es würde uns nicht einmal wundern, wenn die Reizung der Haut des Kopfes an einem enthaupteten Thiere oder Menschen noch Reflexionsbewegungen bewirkte; denn diess wäre durchaus dasselbe Phänomen, wie die Reflexion an Stücken eines zerstückelten Salamanders; und eben so ist die Erscheinung zu beurtheilen, dass an einem vom Rumpfe getrennten Kopfe einer jungen Katze, welchem man den Finger in den Schlund bringt, der Schlund sich fest um den Finger, wie zum Schlingen anlegt.

c) Das Rückenmark ist ein motorisch geladener Apparat, welcher selbst nach der Trennung vom Gehirn, und ohne äussere Reize durch Entladung automatische Bewegungen hervorbringen kann. Diess ist bei den Nerven, wenigstens denjenigen des Cerebrospinalsystems, nicht der Fall, obgleich die motorische Thätigkeit des sympathischen Systems hierin dem Rückenmark gleicht. S. oben p. 741. Ein Gehirnnerve oder Spinalnerve, der von den Centraltheilen getrennt ist, bewirkt, ohne dass er gereizt wird, keine Bewegungen in den Muskeln mehr; das Rückenmark dagegen kann, auch von dem Gehirn getrennt, noch Entladungen nach den Muskeln bewirken. Die Salamandra maculata steht, wenn man ihr den Kopf abgeschnitten hat, noch auf ihren Füssen. Der Rumpf der enthaupteten Frösche bewegt sich zuweilen (nicht immer, und häufig gar nicht) noch, er zieht ein Bein an oder streckt es. Der Aal windet sich nach dem Abschneiden des Kopfes noch geraume Zeit. Bei den Experimenten an Amphibien muss man sehr vorsichtig seyn. Ist der Kopf zu kurz vom Rumpfe abgeschnitten, so enthält das Rumpfstück noch einen Theil des verlängerten Markes, und dann ist allerdings nicht bloss automatische, sondern selbst willkührliche Bewegung des Rumpfes möglich, so gut dem obern Theile des Rumpfes eines hinter dem Kopfe getheilten Frosches noch bewusste Empfindung und Willkühr zukömmt, wie man deutlich genug in Experimenten sieht. Noch ein anderer Umstand, auf den Marshall Hall (siehe oben p. 726.) aufmerksam gemacht hat, verdient grosse Beachtung. Eine enthauptete Schlange befindet sich in dem zu den Reflexionserscheinungen geneigtesten Zustande. Eine Berührung ihrer Haut ruft reflectirte Bewegungen hervor; durch diese Bewegungen entstehen wieder neue Berührungen an verschiedenen Theilen des Körpers, die immer wieder neue Bewegungen veranlassen. Ist das Thier endlich in Ruhe gekommen, so reicht eine kleine Erschütterung oder Berührung hin, dasselbe Spiel zu wiederholen.

d) Das Rückenmark, zu automatischen Wirkungen auf die Bewegungsnerven fähig, lässt im Zustande der Gesundheit einen grossen Theil der Bewegungsnerven, namentlich die der Ortsbewegung, ruhig, aber auf viele andere Nerven wirkt es in einem fort motorisch, indem es sie in beständigen unwillkührlichen Zusammenziehungen erhält, die erst mit der Lähmung des Rückenmarkes aufhören. Hieher gehören *a.* der Willkühr zugleich unterworfene Muskeln, wie der Sphincter ani, *b.* der Willkühr

Digitized by Google

entzogene Muskeln, der Sphincter vesicae urinariae, der Darmkanal, das Herz etc. Für diese Wirkungen des Rückenmarkes muss in demselben ein eigener, mit dem Sensorium commune weniger in Wechselwirkung stehender Apparat vorhanden seyn, den wir indess anatomisch nicht nachweisen können. Bei niederen Wirbelthieren kann selbst die Gemeinschaft des Gehirns und Rückenmarkes aufgehoben seyn, und diese motorische Ausstrahlung des Rückenmarkes dauert doch noch auf die Sphincteren fort, wie Marshall Hall bei der Schildkröte sah, deren Sphincter ani nach der Enthauptung geschlossen blieb, und erst nach der Zerstörung des Rückenmarkes sich löste.

e) Das Rückenmark besitzt eine grosse Mittheilbarkeit seiner Zustände von einem Theile desselben auf den andern; hierdurch unterscheidet es sich durchaus von den Nerven. Hierüber sind die schon p. 656. von mir mitgetheilten Versuche belehrend. Ein Nerve eines Frosches wird, sofern das Rückenmark nicht irritirt ist, wenn er galvanisirt wird, seinen Zustand nicht so leicht auf das ganze Rückenmark übertragen. Reizt man eine vordere oder hintere Wurzel der letzten Rückenmarksnerven des Frosches, die man durchgeschnitten, an dem mit dem Rückenmarke zusammenhängenden Stücke durch ein einfaches Plattenpaar, so wirkt diess nicht leicht durch das Rückenmark durch bis zu den vorderen Theilen des Körpers, und es entstehen keine Zuckungen am Kopfe. Reizt man aber das Ende des Rückenmarkes auf diese Art, so zucken auch die Muskeln der vorderen Theile des Körpers. Hieraus begreift man, wie eine Rückenmarkskrankheit, auch wenn sie anfangs ihren Sitz in dem untern Theile des Rückenmarkes hat, allmählig doch, schon durch blosse Wechselwirkung, auch die oberen Rumpftheile, die Theile des Kopfes afficirt, wie z. B. bei der durch Ausschweifungen bedingten Schwäche des untern Theiles des Rückenmarkes Amblyopie, Ohrensausen etc. vorkommen.

f) Bei einer grossen Irritation des Rückenmarkes, in der Entzündung, nach heftigen Reizungen der Nerven (Tetanus traumaticus), und in der Narcotisation geräth das ganze Rückenmark in diesen Zustand, auch nach allen willkührlichen Muskeln beständige Entladungen zu bewirken. Jene Tension, die es im Zustande der Gesundheit auf die Sphincteren ausübt, ist dann allgemein; es entstehen allgemeine Convulsionen oder tetanische Krämpfe, die sich von Zeit zu Zeit wiederholen, und in manchen Muskeln, wie den Kaumuskeln, selbst anhaltend sind. Diese Zustände sind bald acut, wie in den oben angeführten heftigen Verletzungen, bald chronisch, wie in der Epilepsie, mag die Irritation nun von Krankheiten der Centralorgane selbst (Epilepsia cerebralis, spinalis), oder von einzelnen Nerven, z. B. Nervengeschwülsten, sich ausbreiten. Eine ähnliche, aber geringere Reizbarkeit des Rückenmarkes mit leicht abwechselnden Bewegungen zeigt sich auch in den clonischen Krampfformen, Chorea St. Viti etc.

g) Bei der Narcotisation durch die Gifte, welche Krämpfe erzeugen, ist das Rückenmark und nicht die Nerven die Ursache der krampfhaften Bewegungen. Wenn man ein Thier durch

Digitized by Google

Nux vomica oder Strychnin vergiftet, und vorher die Nervenstämme der Extremitäten durchschneidet, so entstehen bei dem erfolgenden Starrkrampfe keine Krämpfe in den Theilen, deren Nerven vorher durchschnitten waren. Es geht daraus hervor, dass jene Gifte auf die Centraltheile, und durch diese auf die Nerven wirken. Wenn man das Rückenmark selbst vor der Vergiftung eines Thieres, oder nach derselben durchschneidet, so erfolgen die Krämpfe dennoch in den Theilen hinter dem Durchschnitt. Diese Gifte wirken daher auf jeden motorisch geladenen Theil des Rückenmarkes bis zum Tode. Backer *commentatio ad quaestionem physiologicam. Traject.* 1830.

h) Das Rückenmark ist aber durch seine motorische Spannung die Ursaahe der Kraft unserer Bewegungen. Die Intensität unserer Kraftanstrengungen hängt grossentheils von diesem Organe ab. Wenn auch der grösste Theil der motorischen Nerven in der Regel, ohne das Hinzukommen der Willensbestimmungen, von ihm unthätig gelassen wird, so hängt von ihm doch die Stärke und Dauer der motorischen Entladungen ab, welche das Sensorium commune willkührlich bewirkt. Beständig enthält diess Organ gleichsam einen Vorrath von motorischer Kraft, und wenn es durch die Fortleitung der Nervenfasern vom Gehirn aus als Conductor der von dem Sensorium commune ausgehenden Oscillation wirkt, so hängt die Intensität der erfolgenden Wirkung nicht bloss von der Stärke des Willens, sondern von dem Quantum des in dieser Säule angehäuften motorischen Nervenprincipes ab. Daher kann das Rückenmark auch seine Fähigkeit als Conductor behalten, während es die zweite Eigenschaft, die Kraft der Muskelbewegung, aufgegeben hat; diess geschieht bei der Tabes dorsalis. Bei dieser nur nach Ausschweifungen erfolgenden Krankheit mit Atrophie des Rückenmarkes, ist anfangs kein einziger Muskel der unteren Extremitäten gelähmt; alle gehorchen, und selbst in einem vorgerückten Stadium der Krankheit noch dem Willen, der Kranke kann alle Bewegungen ausführen, und das Rückenmark ist offenbar noch ein unversehrter Conductor für die von dem Sensorium commune ausgehende Oscillation oder Strömung. Aber die Kraft der Bewegungen ist erloschen; der Kranke kann nicht lange stehen, gehen, und die Abnahme der Kräfte nimmt immer fort bis zum gänzlichen Erlöschen zu, worauf die Lähmung vollkommen ist. Man muss diese Art der Lähmungen sehr von anderen unterscheiden, wo die Leitung in der motorischen Säule an einer Stelle unterbrochen ist, die entsprechenden Muskeln dem Willen nicht mehr gehorchen, und alle übrigen die ganze Kraft der Bewegung behalten können.

i) Das Rückenmark ist die Ursache der Potenz und der geschlechtlichen Spannung; die Ausübung des Geschlechtstriebes ist durch dasselbe bedingt. Unstreitig ist das Rückenmark bei dem Coitus am meisten in Affection; man sieht diess aus den heftigen Reflexionsbewegungen, die nach den Empfindungsreizungen der Ruthennerven folgen, aus den Reflexionsbewegungen der Samenbläschen und der Dammmuskeln. Die auf die Ausübung des Geschlechtstriebes folgende Abspannung kann nur in dem Rük-

Digitized by Google

kenmarke ihren Grund haben. Erst allmählig wird dieses Organ wieder in die zum Geschlechtstriebe nöthige Tension seiner Kräfte versetzt; es entsteht wieder jener Ueberfluss, jene Spannung des wirksamen Princips in diesem Organe, wo jede Stimmung des Sensoriums auf geschlechtliche Gegenstände Erection bewirken, wo die Vorstellung den geladenen Zustand des Rückenmarkes gleichsam entladen kann, um auf den von ihm ausstrahlenden organischen Nerveneinfluss jene Anhäufung des Blutes in der Ruthe zu bewirken. Diese Potenz des Rückenmarkes geht aber durch Affectionen des Rückenmarkes auch verloren.

k) Wie diess Organ auf die organisch-chemischen Vorgänge des Capillarsystems durch die organischen Nerven Einfluss hat, sieht man nicht allein an der veränderten Hautabsonderung bei Ohnmachten, sondern deutlicher noch an der Beschaffenheit der Haut bei Menschen, bei denen das Rückenmark durch Ausschweifungen gelitten hat. Wenn nämlich die Ausübung des Coitus zu häufig auf einander erfolgt, so tritt nicht allein Kraftlosigkeit ein, sondern auch verminderter Turgor der Haut, verminderte Perspiration, Trockenheit derselben, verminderte Wärmeerzeugung, Kaltwerden der Füsse, Hände, Genitalien.

l) Dieses Organ ist auch der Gegenstand einer krankhaften Impression bei allen fieberhaften Affectionen, und die dem Fieber eigene Veränderung der Sensationen, der Bewegungen und der organischen Wirkungen, Absonderungen, Wärmeerzeugung sind nur durch den Antheil eines solchen Organes erklärlich, wie dasjenige ist, dessen Eigenschaften wir in diesem Capitel zu zergliedern gesucht haben. Da die Affectionen der Cerebrospinalnerven nicht leicht Fieber, sondern leichter andere Nervenkrankheiten erregen, und da das Fieber durch nichts leichter, als durch Veränderung der Capillargefässactionen in irgend einem Theile, sey es nun Veränderung des Zustandes der Schleimhäute, oder Entzündung in irgend einem Organe, entsteht, so liegt es sehr nahe, anzunehmen, dass bei dem Fieber eine solche auf das Rückenmark verpflanzte und von dort auf alle Nerven reflectirte Impression stattfinde, welche von einer heftigen Affection der organischen Nerven irgend eines Theiles (bei Entzündung oder anderer Reizung) ausgeht.

Was die organischen Wirkungen des Rückenmarkes, verglichen mit denen des Gehirns, betrifft, so wissen wir aus Flourens Versuchen und den Bestätigungen von Hertwig, dass ein Vogel nach Wegnahme der Hemisphären des grossen Gehirns, wenn man ihm das Futter einstopft, doch noch geraume Zeit ernährt werden kann, ohne abzumagern. Hertwig *experimenta quaedam de effectibus laesionum in partibus encephali. Berol.* 1826.

III. Capitel. Vom Gehirn.

I. Vergleichung des Gehirns der Wirbelthiere.

In keinem Theile der Physiologie kann man grössere Anforderungen an die vergleichende Anatomie machen, als in der Phy-

Digitized by Google

siologie des Gehirns. Hier zeigen sich nach der Entwickelung der intellectuellen Fähigkeiten in den verschiedenen Classen die grössten Unterschiede, welche für die Deutung der Hirntheile von der grössten Wichtigkeit sind; aber auch die Nothwendigkeit, über die Bedeutung der Hirntheile Versuche an Thieren anzustellen, macht uns die Vergleichung der Gehirne der Thiere so unentbehrlich. Daher habe ich für nöthig gehalten, vor der Untersuchung der Eigenschaften und Kräfte des Gehirns eine Vergleichung des Gehirns der Wirbelthiere vorauszuschicken. Diese Betrachtungen müssen von dem Fötuszustande des Gehirns des Menschen und der höheren Thiere ausgehen, weil dieser, wie überhaupt bei Vergleichungen dieser Art, mehr sichere Vergleichungspunkte darbietet.

Schon bei einer oberflächlichen Vergleichung des Gehirns des Menschen mit dem der höheren Wirbelthiere zeigt sich, dass die Hemisphären des grossen Gehirns, welche mit ihrem hintern Theile beim Menschen nicht allein die Vierhügel, sondern selbst das kleine Gehirn überragen, ohne mit den Theilen, welche sie bedecken, zu verschmelzen, bei den Thieren sich mehr und mehr nach vorn zurückziehen, und die bei dem Menschen bedeckten Theile von oben frei lassen. Bei den Nagethieren sehen wir schon das kleine Gehirn frei, bei den Vögeln sind es auch die Vierhügel, und noch mehr ist diess bei den Amphibien der Fall. In demselben Grade, als sich die Hemisphären verkleinern, vergrössern sich bei den Thieren die Vierhügel, und wenn diese bei den Amphibien noch bedeutend kleiner als die Hemisphären des grossen Gehirns sind, so ist bei den Fischen das Verhältniss dieser Theile so verändert, dass man in Zweifel ist, was man für das eine und für das andere halten soll. Das Gehirn dieser Thiere zeigt uns nämlich nur eine Reihe von theils paarigen, theils unpaarigen Anschwellungen. Die hinterste unpaarige, über dem verlängerten Marke gelegene, den vierten Ventrikel deckend, ist das kleine Gehirn; vor ihm liegt ein Hügelpaar, oft das grösste, hohl in seinem Innern, von welchem grösstentheils die Sehnerven entspringen; vor diesen liegen ein Paar solide Anschwellungen, in der Mitte noch zusammenhängend, und vor diesen oft noch zwei von einander abgesonderte Anschwellungen am Ursprunge der Geruchsnerven. Nur das Fötusgehirn der höheren Theile gleicht einigermaassen dem Hirn der niederen Wirbelthiere; denn die Hemisphären sind klein, überragen anfangs weder das kleine Gehirn, noch die Vierhügel, und es giebt eine Zeit, wo die Vierhügel nicht kleiner sind als die Hemisphären des grossen Gehirns. In diesem Falle findet man eine ähnliche Reihe von Anschwellungen, wie am Gehirn der Fische, zu hinterst das unpaare kleine Gehirn; vor ihm die grossen blasigen Vierhügel, noch nicht in das vordere und hintere Paar abgetheilt, im Innern hohl (Ventriculus Sylvii, wo später der Aquaeductus Sylvii ist); vor ihnen die Hemisphären, bei den Säugethieren mit den Lobi olfactorii an ihrem vordern Ende. Siehe Tiedemann a. a. O. Das Gehirn der Säugethiere ist indess in der jüngsten Zeit des Fötuslebens nicht hinreichend genau bekannt,

Digitized by Google

um fruchtbare Vergleichungen mit dem der Fische anzustellen. Hierzu sind nur von Baer's Beobachtungen am Hühnerembryo (Burdach's *Physiologie.* 2.) geeignet. Nach von Baer's Untersuchungen zeigt das Gehirn des Vogelembryos von hinten nach vorn folgende Anschwellungen:

1) Das unpaare kleine Gehirn, den vierten Ventrikel über der Medulla oblongata überdeckend, vor ihm

2) Die Blase der Vierhügel, von welchen vorzüglich der N. opticus entspringt, hohl in ihrem Innern, mit dem Ventriculus Sylvii, der auch in den, beim Erwachsenen aus einander nach unten gedrängten Vierhügellappen oder Lobi optici enthalten ist.

3) Die Blase des dritten Ventrikels. Der dritte Ventrikel, welcher von den Sehhügeln seitlich und von dem Trichter unten begrenzt wird, ist nämlich beim Embryo noch nicht von den noch sehr kleinen Hemisphären bedeckt; aber gleichwohl ist er anfangs oben nicht offen, vielmehr besitzt er eine blasige Decke, welche erst später in der Mittellinie vorn eine Spalte erlangt, indem diese Blase in der Mittellinie von vorn nach hinten aufreisst, während sich der hintere Theil der Decke zur spätern Zirbel zusammenzieht, so dass die spätern Schenkel der Zirbel die frühere Ausdehnung der mittlern Decke andeuten. In der Blase des dritten Ventrikels sind die Sehhügel enthalten.

4) Vor der Blase des dritten Ventrikels liegt die Doppelblase der Hemisphären, hohl und auf ihrem Boden die gestreiften Körper enthaltend. Diese Blase, anfangs kleiner als die Blase der Vierhügel oder Lobi optici, vergrössert sich und wächst nach hinten allmählig über die Blase des dritten Ventrikels und seine Spalte hinüber; anfangs ist diese Blase an ihrer hintern Grenze gegen die Blase des dritten Ventrikels nicht eingerissen, d. h. die Fissura cerebri magna des grossen Gehirns, durch welche man beim Erwachsenen unter dem hintern untern Rande der Hemisphären in die Höhle der Hemisphären gelangt, ist anfangs nicht vorhanden; so dass man zu einer gewissen Zeit nur durch die Spalte der Blase des dritten Ventrikels in die Blasen der Hemispären, die mit der Blase des dritten Ventrikels zusammenhängen, kommen kann. Nachdem aber die Grenze, wo der untere hintere Rand der Hemisphärenblasen, welche die Blase des dritten Ventrikels beutelförmig hinten überragen, und der vordere Rand der letzten Blase zusammenhängen, jederseits eine Querspalte erhalten hatte, ist die Fissura cerebri magna entstanden, durch welche man bekanntlich beim Gehirn des Erwachsenen nach Wegnahme der Gefässhaut, unter den hinteren Schenkeln des Fornix in die Seitenventrikel gelangen kann.

Hierauf lassen wir eine kurze Beschreibung des Fischgehirns folgen. Am besten geht man mit Cuvier von dem Cerebellum aus, über welches kein Zweifel obwalten kann.

1) Cerebellum, es ist unpaarig, liegt quer über dem verlängerten Marke, und deckt den vierten Ventrikel, der sich unter ihm nach hinten, wie bei allen Thieren, öffnet.

2) Lobi optici. Vor dem kleinen Gehirn liegen oben ein Paar hohle Lappen, an einer Mittelfurche ihrer obern Wand verbun-

Digitized by Google

den; sie geben dem N. opticus den Ursprung, und dürfen mit dem Thalamus der höheren Thiere nicht verwechselt werden. Ihre Wände enthalten zwei Faserschichten, die äussere Lage streicht von hinten und aussen nach unten und innen, die innere Lage strahlt von unten nach aussen und oben in den Wänden der Lobi optici aus. Auf dem Boden liegen (nur bei den Knochenfischen) zwei Paar Körperchen, die aussen von einem grauen Wulst umgeben sind, von welchem die innere Ausstrahlung ausgeht; vor diesen ist eine Vertiefung, der dritte Ventrikel, der zur Hypophysis führt; vor dem dritten Ventrikel ist die vordere Commissur. Von diesen Lappen gehen die Sehnerven ab, und zwar von der äussern Faserschicht. Vor den grauen Körperchen öffnet sich die unter ihnen aus dem vierten Ventrikel kommende Wasserleitung in den dritten Ventrikel. Am vordern Ende der Lobi optici, zwischen diesen und den Lobi anteriores, befindet sich in der Mittellinie eine Oeffnung, welche schlecht zu der Ansicht derjenigen passt, welche diese Lappen mit den Hemisphären der höheren Thiere vergleichen. Der N. trochlearis entspringt hinter den Lobi optici, und hinter den grauen Körperchen vor dem kleinen Gehirn.

3) Unter den Lobi optici liegen an der Basis des Gehirns vor der Medulla oblongata zwei kleine Anschwellungen, Lobi inferiores; auch von ihnen gehen nach Cuvier Fasern zum Sehnerven ab, was Gottsche läugnet. Sie enthalten selten eine Höhle, die mit dem dritten Ventrikel communicirt.

4) Lobi anteriores; sie sind grau, liegen vor den Lobi optici, sind in der Regel kleiner als jene, ausserordentlich gross sind sie bei den Rochen und Haien; sie sind in der Mittellinie verbunden durch eine oder zwei Commissuren; ihre Oberfläche zeigt zuweilen Windungen. Sie sind nicht hohl; ausser bei den Haien und Rochen, wo sie grösser sind als die Lobi optici. Von ihnen entspringen die Geruchsnerven entweder unmittelbar oder mit einer Anschwellung; diese Anschwellungen der Geruchsnerven, Lobi olfactorii, sind dann aber von einander getrennt und ohne Commissur.

5) Bei einigen Fischen (Muraena) findet sich eine Art Glandula pinealis; sie liegt dann vor den Lobi optici, und ist durch zwei Schenkel an die hintere Basis der Lobi anteriores befestigt.

6) Die meisten Fische haben Anschwellungen des verlängerten Markes, welche dem Ursprunge des N. vagus entsprechen, Lobi posteriores. Cuvier *hist. nat. des poissons. T.* 1.

Bedenkt man, dass am Ursprunge der N. olfactorii aus den Lobi anteriores oft ein Tuberculum olfactorium sich befindet, aus den Lobi optici die Sehnerven, aus den Lobi posteriores die N. vagi entspringen, so sieht man deutlich, wie die Lappen des Gehirns der Fische grossentheils durch Centralmassen für die Hauptnerven entstehen, gleich wie selbst am Rückenmark der Triglen, wo die grossen Nerven für die freien Fortsätze unter ihren Brustflossen entspringen, eine Reihe von fünf Paar Anschwellungen, und am Ursprunge der Armnerven und Schenkel-

Digitized by Google

nerven am Rückenmark bei allen Wirbelthieren Anschwellungen des Rückenmarkes sich befinden.

Ueber die Deutung des Fischgehirns im Vergleiche mit dem Gehirne der höheren Thiere giebt es folgende Ansichten.

1) Einige, wie Cuvier, vergleichen die Lobi optici der Fische mit den Hemisphären des grossen Gehirns der höheren Thiere; diese stützen sich auf die Existenz des dritten Ventrikels auf dem Boden des mittlern Theiles der Lobi optici, auf die vor diesem Ventrikel befindliche Commissur; sie vergleichen die Anschwellungen hinter dem dritten Ventrikel auf dem Boden der hohlen Lobi optici mit den Vierhügeln; die Lobi olfactorii vor den Lobi optici vergleichen sie mit den Lobi olfactorii der Amphibien, Vögel und Säugethiere am Anfange ihrer Hemisphären. Gottsche, dessen treffliche und genaue Arbeiten *über das Gehirn der Fische*, in Mueller's *Archiv* 1835. mitgetheilt sind, neigt sich ebenfalls zu dieser Ansicht hin. Dagegen spricht die Lage der Zirbel vor den Lobi optici, die, wenn diese die Hemisphären repräsentirten, vor den Vierhügeln liegen müsste, die Kleinheit der Hügelchen auf dem Boden der hohlen Lobi optici, da hingegen die Vierhügel der Vögel und Amphibien sehr gross und hohl sind; die Commissuren der sogenannten Lobi anteriores der Fische, sprechen nicht dagegen, da auch die Lobi der Geruchsnerven bei den höheren Thieren eine Commissur haben.

2) Die Meisten, wie Arsaky, Carus (er nennt die Lobi optici Sehhügel), Tiedemann, Serres, Desmoulins halten die L. optici für Analoga der Vierhügel der höheren Thiere, die vor ihnen liegenden meist soliden Lappen für die Hemisphären; und diese stützen sich auf die Grösse der Vierhügel, und ihre Hohlheit bei den Vögeln und Amphibien, als Theile, die nach abwärts an Grösse immer zunehmen, auf den theilweisen Ursprung der Sehnerven aus den Corpora quadrigemina bei den höheren Thieren, auf die sehr bedeutende Grösse und Hohlheit der Corpora quadrigemina bei dem Fötus der höheren Thiere, welche zu einer gewissen Zeit des ersten Fötuslebens sogar alle Theile des Gehirns an Grösse übertreffen. Für diese Ansicht spricht auch die Lage der Zirbel vor den Lobi optici der Fische. Dagegen sprechen aber die Solidität der vor den Lobi optici liegenden Lappen, die man mit den Hemisphären vergleicht (sie sind nur bei den Knorpelfischen hohl), die Anschwellungen auf dem Boden der Lobi optici, die in den Corpora quadrigemina der höheren Thiere nicht vorkommen, die Lage des dritten Ventrikels auf dem Boden der Lobi optici und die Commissur vor diesem Ventrikel.

3) Treviranus vergleicht die Lobi optici der Vögel mit dem hintern Theile der Hemisphären der Säugethiere mit sammt den Vierhügeln, namentlich der Vereinigung der Corpora geniculata mit den Vierhügeln; vorzüglich gründet sich diese Ansicht darauf, dass in die hohlen Lobi optici der Vögel und Amphibien der hintere Theil der Sehhügel hineinragt. Hiernach wären nun die Lobi optici einer Vereinigung des hintern Theiles der Hemisphären mit den Wänden der beim Fötus ganz hohlen Vierhügel gleich zu achten.

Digitized by Google

4) Nach meiner Meinung entsprechen die Lobi optici der Fische den Lobi optici oder der Blase der Vierhügel und zugleich der Blase des dritten Ventrikels des Vogelfötus. Diese Ansicht wird definitiv bewiesen durch den Bau des Gehirns bei den Petromyzon, wo die Lobi optici in einen Lobus ventriculi tertii, aus dem die Sehnerven entspringen, und in die Blase der Vierhügel zerfallen sind, während bei den übrigen Fischen beide eine gemeinsame Blase darstellen, in deren Boden der Grund des dritten Ventrikels ist. Der Lobus ventriculi tertii der Petromyzon hat oben und vorn die Spalte, welche sich in der Blase des dritten Ventrikels des Vogelfötus bildet, und jene Spalte bei den Petromyzon kömmt wieder am vordern Theil der Lobi optici der übrigen Fische vor. Hieraus geht zugleich hervor, dass die Lobi optici der Fische und der übrigen Thiere noch sehr verschieden sind. Die Lobi optici der Amphibien und Vögel sind die Vierhügelblasen des Vogelfötus und Säugethierfötus. Siehe Mueller's *Archiv.* 1834. p. 62. Die Lobi inferiores der Fische werden von Desmoulins mit den Corpora mammillaria der Säugethiere, von Cuvier mit den Lobi optici der Vögel verglichen, die noch tiefer herabgestiegen wären. Indessen sind die Lobi optici der Vögel, obgleich sie ganz aus einander und nach unten und aussen gedrängt, nur durch eine Querbinde vereinigt sind, offenbar grossen Vierhügeln des Fötus der Säugethiere zu vergleichen. Gottsche läugnet die Fasern des Sehnerven von den Lobi inferiores.

Vergleicht man die Amphibien und Vögel mit den Säugethieren, so zeigt sich, dass die ersteren zwar den Fornix, aber noch nicht die grosse Commissur der Hemisphären, das eigentliche Corpus callosum besitzen, welches zuerst bei den Säugethieren vollständig auftritt; dass ihre Lobi optici noch hohl sind, während die Vierhügel der Säugethiere nur den Aquaeductus Sylvii, und nur im Fötuszustande eine Höhlung enthalten, und dass die Lobi optici noch nicht wie die Corpora quadrigemina der Säugethiere in ein vorderes und hinteres Hügelpaar zerfallen. Die Eminentiae candicantes werden noch vermisst. Auch fehlt den Vögeln und Amphibien der aussen sichtbare Theil des Pons Varolii, welcher letztere ihnen indess mit Unrecht abgesprochen wird, weil die tiefern Querfasern zwischen den Bündeln der Medulla oblongata auch bei den Säugethieren und dem Menschen doch zum Pons gehören. Die Seitentheile des kleinen Gehirns sind weniger als bei den Säugethieren ausgebildet. Die Säugethiere, mit dem Menschen verglichen, zeigen immer noch eine relativ geringere Ausbildung der Hemisphären; so dass vielen die Abtheilung des Gehirns in mehrere Lappen ganz abgeht, und erst die Wiederkäuenden, Reissenden, Dickhäutigen und die Einhufer eine deutlichere Abtheilung in zwei Lappen zeigen, die mehr dem vordern und mittlern als hintern Lappen des Gehirns des Menschen entsprechen, womit der Mangel des hintern Horns der Seitenventrikel bei den meisten (mit Ausnahme der Affen, Seehunde, Delphine) übereinstimmt. Auch die Windungen sind bei vielen Säugethieren, wie den Nagethieren, Fledermäusen, dem Maul-

Digitized by Google

wurf, dem Igel, den Gürtelthieren und Ameisenfressern noch kaum angedeutet, und nur bei den reissenden Thieren, den Wiederkäuern, Einhufern, Dickhäutigen und Affen deutlich, aber einfacher als bei dem Menschen. S. Carus *vergl. Zoot.* 1. 75. Die untere Commissur des kleinen Gehirns, Pons Varolii, erscheint zwar bei den Säugethieren schon aussen sichtbar, ist aber noch schmal; daher man die Pyramiden des verlängerten Markes in ihrem Verlaufe weiter bloss liegen sieht, wo sie beim Menschen von der untersten Lage der Querfasern des Pons viel mehr bedeckt werden. Bei vielen Säugethieren sind auch Bündel der Querfasern, welche das verlängerte Mark umfassen, hinter der eigentlichen Brücke liegend, von dieser getrennt. Treviranus *vermischte Schriften.* 3. 12.

An dem verlängerten Marke sieht man die olivenförmigen Körper weder äusserlich gut, noch die zackige Figur im Innern deutlich, die markigen Querstreifen auf dem Boden der vierten Hirnhöhle fehlen in der Regel, und das kleine Gehirn besitzt eine geringere Zahl der Blätter, wie es im Allgemeinen an Grösse dem menschlichen nachsteht; dahingegen die Flocken, wie bei den Vögeln stärker entwickelt sind, und wie dort oft eigene Vertiefungen des Felsenbeines in Anspruch nehmen. Die Lobi olfactorii am vordern Ende der Hemisphären des grossen Gehirns der Vögel sind in den Riechkolben der Säugethiere noch vorhanden, die sich aber von den Riechnerven des Menschen darin unterscheiden, dass sie hohl sind, und dass ihre Höhlen in unmittelbarer Verbindung mit den Seitenhöhlen der Hemisphären des grossen Gehirns stehen.

II. Von den Kräften des Gehirns und von den Seelenthätigkeiten im Allgemeinen.

Das Gehirn der Thiere vergrössert sich von den Fischen bis zum Menschen, nach der Entwickelung der intellectuellen Fähigkeiten, mehr und mehr. Aus den von Carus (*Lehrbuch der vergl. Zootomie*) angegebenen Verhältnissen ergiebt sich, dass es sich zur Masse des ganzen Körpers bei Gadus lota wie 1 : 720, beim Hecht wie 1 : 1305, beim Wels wie 1 : 1837, beim Salamander wie 1 : 380, bei der Landschildkröte wie 1 : 2240, bei der Taube wie 1 : 91, beim Adler wie 1 : 160, beim Zeisig wie 1 : 231, bei der Ratte wie 1 : 82, beim Schaf wie 1 : 351, beim Elephanten wie 1 : 500, beim Gibbon wie 1 : 48, beim Winselaffen wie 1 : 25 verhält. Das grösste Gehirn eines Pferdes wiegt nach Soemmerring 1 Pfund 14 Loth, das kleinste eines ausgewachsenen Menschen 2 Pfund 11 Loth; doch zeigt das Pferdegehirn auf seiner Grundfläche gegen zehnmal dickere Nerven als das des Menschen. Das Gehirn unseres Museums von einem 75 Fuss langen Wallfische wog 5 Pfund $10\frac{1}{4}$ Loth, das Gehirn des Menschen dagegen wiegt nach Soemmering 2 Pfund 11 Loth bis 3 Pfund $3\frac{3}{4}$ Loth. Bedenkt man nun, dass das Rückenmark bei weitem weniger bei den niederen Wirbelthieren abnimmt, indem es sich

Digitized by Google

z. B. bei Gadus lota zur Masse des Körpers wie 1 : 481, bei Salamandra terrestris wie 1 : 190, bei der Taube wie 1 : 305, bei der Ratte wie 1 : 180 verhält, so ergiebt sich deutlich, dass die Entwickelung der intellectuellen Fähigkeiten in der Thierwelt nicht von der Stärke des Rückenmarkes, sondern des Gehirns abhängig ist. Wir sehen aus den bedeutenden Variationen des Verhältnisses in einer und derselben Classe, dass die Grösse des Gehirns im Allgemeinen, auch hier nicht genau auf die Beherrschung der Masse des Körpers berechnet ist, dass die Stärke der motorischen Apparate für die Beherrschung der Muskelmassen nicht in ihm, sondern in dem Rückenmarke zu suchen ist.

Indessen schreiten nicht alle Theile des Gehirns in der Thierwelt mit der Entwickelung der intellectuellen Fähigkeiten gleich fort. Das Uebergewicht des Gehirns der höheren Thiere über das der niederen entsteht vorzüglich nur durch die Ausbildung der Hemisphären des grossen Gehirns. Das kleine Gehirn ist zwar bei den höheren Thieren verhältnissmässig auch grösser als bei den niederen, aber in einem weit schwächeren Verhältnisse. Die Vierhügel sind geradezu verhältnissmässig kleiner, und eben so sind das verlängerte Mark und seine Verzweigungen in das Gehirn bei dem Menschen verhältnissmässig nicht grösser als bei irgend einem Thiere. Durch diesen Theil müssen bei allen Thieren auf gleiche Art alle Nervenfasern des ganzen Rumpfes in das Gehirn eintreten. Wir sehen daraus schon vorläufig, dass das Gehirn Theile enthält, die bei allen Wirbelthieren eine gleiche Bedeutung haben und gleich wichtig für das Leben sind; wie denn in der That die Verletzung der Medulla oblongata für alle gleich tödtlich, gleichsam das Centrum des Lebens und aller willkührlichen Bewegungen angreift, während die Verletzung der Hemisphären bei den Amphibien eine weit geringere Störung in den Lebensverrichtungen erzeugt, als die Verletzung dieser Theile bei den mit höheren intellectuellen Fähigkeiten begabten Wesen.

Ohne indess jetzt schon die Kräfte der verschiedenen Hirntheile ausser den intellectuellen Fähigkeiten zu untersuchen, wollen wir zuerst das Verhältniss der Seelenthätigkeit zu dem Gehirn überhaupt betrachten. Die vergleichende Anatomie zeigt uns schon, dass wir in dem Gehirne die Quelle der intellectuellen Fähigkeiten suchen müssen, und sowohl die Versuche an den Thieren, als die Geschichte der Verletzungen desselben im Vergleich mit anderen Organen, bestätigen es. Es ist nun hier zu beweisen, dass die Seelenfunctionen in keinem andern Theile des Nervensystems, noch des Körpers überhaupt, als in dem Gehirne stattfinden.

Was zuerst die Nerven betrifft, so zeigen die Folgen ihrer Verletzung, dass sie von dem Hirneinflusse getrennt, auch dem Willenseinflusse und dem Bewusstwerden ihrer Zustände entzogen sind; das Rückenmark verhält sich in dieser Hinsicht ganz gleich den Nerven. Siehe oben p. 812. Jede Rückenmarksverletzung entzieht mit dem Hirneinflusse auch den Willenseinfluss auf alle unter der verletzten Stelle abgehenden Nerven, dahingegen alle über der verletzten Stelle des Rückenmarkes, so wie

Digitized by Google

der obere Theil durchschnittener Nerven noch Empfindungen zum Bewusstseyn bringen können, und den Willenseinfluss von dem Gehirne aus erfahren; der vordere Rumpftheil des Frosches hinter dem Kopfe von dem Stamme getrennt, empfindet noch und bewegt sich noch willkührlich. Durch diese Theilung hat also das Organ der intellectuellen Vermögen nichts von seinen Kräften, sondern nur an dem Bereich der Theile, über welche es herrscht, verloren, gerade so, wie der Amputirte durch den Verlust seiner Glieder nichts von seinen intellectuellen Fähigkeiten, sondern nur an Mitteln einbüsst, sie handelnd zu äussern.

Noch weniger als das Rückenmark kann irgend ein anderer Theil des Rumpfes der Sitz der Seelenfunctionen seyn. Die Glieder können amputirt werden; die Eingeweide können brandig, d. h. todt seyn, und die Seele kann klar seyn, so lange das Leben in diesen Fällen besteht; ja es kann nach dem Eintritt des Brandes in einer entzündlichen Krankheit sogar die ganze Klarheit des Bewusstseyns, die verloren war, wieder eintreten. Dass in entzündlichen Krankheiten wichtiger Eingeweide oft Delirien eintreten, darf uns nicht wundern; denn von jeder Stelle des Körpers, auch von solchen, die man ohne Verlust der Seelenfähigkeiten amputiren kann, wie die Extremitäten, kann eine heftige entzündliche Affection durch die auf das Sensorium commune gemachte heftige Impression Delirium erzeugen. Eine heftige Hautentzündung bewirkt Delirium: warum sollte es nicht die Entzündung eines Eingeweides thun; und doch kann jener Theil der Haut mit dem ganzen Gliede fehlen, und die Seele nichts entbehren. Hört nun dieser heftige Eindruck eines kranken Theiles auf die Centralorgane durch den Brand oder Tod dieses Theiles auf, so ist auch gleichsam der Schleier gehoben, welcher das Sensorium commune klar zu wirken hinderte, und auf kurze Zeit bis zu dem Tode tritt die ganze Klarheit des Bewusstseyns oft wieder ein. Auf diese Art lässt sich zeigen, dass alle in dem Unterleibe enthaltenen Eingeweide der Sitz von Seelenfunctionen nicht seyn können. Die entzündlichen Krankheiten der in der Brusthöhle enthaltenen wichtigen Theile, der Lungen und des Herzens können schon tödten, ehe es zu einer Störung des Sensoriums kommt. Wir können indess an ihren chronischen Krankheiten, an ihren Degenerationen auch mit Evidenz zeigen, dass sie der Sitz von Seelenverrichtungen nicht sind. Der Lungenkranke verliert nichts von seinen Seelenkräften trotz der gänzlichen Zerstörung seiner Lungen. Der Herzkranke kann im höchsten Grade geängstigt seyn, wie es jedesmal bei Störungen des Kreislaufes geschieht; aber seine Seelenfunctionen sind unverändert; und deutlich sehen wir, dass jedes Organ mit Ausnahme des Gehirns entweder langsam aus der thierischen Oeconomie heraustreten, oder kurze Zeit plötzlich ausfallen kann, ohne Störung der Seelenfunctionen.

Ganz anders verhält es sich bei dem Gehirne; jede langsame oder plötzliche Störung seiner Verrichtungen verändert auch die intellectuellen Fähigkeiten. Die Entzündung dieses Organes ist nie ohne Delirien, und später ohne Stumpfsinn; der

Digitized by Google

Druck auf das grosse Gehirn bewirkt immer Delirium oder Stumpfsinn, je nachdem es mit oder ohne Reizung stattfindet; so wirkt aller Druck, rühre er von Knocheneindrücken, fremden Körpern, Wasser, Blut, Eiter her. Dieselben Ursachen heben oft, je nach dem Sitze des Uebels, die Fähigkeit der willkührlichen Bewegung oder das Gedächtniss auf. So wie der Druck weggenommen ist, mit der Erhebung des Knocheneindruckes, tritt die Besinnung, das Gedächtniss oft wieder ein; ja man hat sogar beobachtet, dass der Kranke seinen Gedankengang sogleich da fortsetzte, wo er durch die Verletzung unterbrochen worden. Bei der Verletzung des grossen Gehirns bei den Thieren tritt Stumpfsinn, Besinnungslosigkeit ein; und so sind auch bei den meisten Geisteskranken bedeutende materielle Störungen im Gehirn vorhanden, wenn wir auch in anderen Fällen, besonders in denjenigen, wo die Geisteskrankheiten erblich sind, die feineren materiellen Veränderungen einer bei mikroskopischer Feinheit wirkenden Faserung nicht mit unseren schlechten Hülfsmitteln und Kenntnissen erkennen werden. Man hat zwar hiergegen eingeworfen, dass man sehr bedeutende Zerstörungen einer ganzen Hemisphäre ohne Störung des Geistes vorgefunden hat; indess zeigen die Versuche an Thieren, dass selbst plötzliche Verletzungen bloss einer Hemisphäre nicht sogleich vollen Stumpfsinn erzeugen, dass dieser erst dann ganz auftritt, wenn beide Hemisphären entfernt sind, so dass es scheint, dass die Hemisphären in den Seelenverrichtungen einander unterstützen, ja ersetzen können.

Mehrere ausgezeichnete Gelehrte, wie namentlich Bichat und Nasse, haben eine der unsrigen gerade entgegengesetzte Ansicht; indem sie anerkennen, dass das Gehirn der Sitz der höheren Seelenverrichtungen sey, behaupten sie gleichwohl, dass auch andere Organe, z. B. die des Unterleibes und der Brust, eine gewisse Beziehung zu den Seelenverrichtungen haben; ja sie neigen sich sogar zu der Ansicht hin, dass die Quelle der Leidenschaften in diesen Organen, die davon so leicht afficirt werden können, wohl seyn könne, und sie stützen ihre Ansicht theils auf die Affectionen dieser Organe in den Leidenschaften, theils auf ihre krankhaften Veränderungen bei manchen Irren. Bei aller Hochachtung, die ich vor diesen trefflichen Männern hege, muss ich mir alle Mühe geben, die Nothwendigkeit einer solchen Annahme zu widerlegen. Gewiss finden sich der Darmkanal, die Leber, die Milz, die Lungen, das Herz bei Irren oft krank, und selbst zuweilen, wenn man nicht gerade eine grobe materielle Veränderung im Gehirn auffinden kann. Ich will auch gerne zugeben, dass die Krankheit eines Eingeweides Veranlassung zur Entwickelung einer Geisteskrankheit geben könne, wie andere veranlassende Ursachen. Aber ich schliesse daraus nicht, dass dieses oder jenes Eingeweide die Quelle von gewissen geistigen oder leidenschaftlichen Beziehungen sey. Zur Erzeugung jeder Geisteskrankheit gehört eine Disposition im Gehirne; wenn diese erworben oder gar erblich da ist, so reicht jene anhaltende Störung der Functionen der Centralorgane durch eine Krankheit

Digitized by Google

irgend eines Eingeweides, vermöge der auf die Centralorgane stattfindenden Impression, und durch die Gesetze der Mittheilung der Zustände im Rückenmarke und Gehirne hin, diese Disposition zum Ausbruche zu bringen; gerade so, wie jeder Theil der Körperoberfläche, der ohne Verlust der Seele entbehrt, abgeschnitten werden kann, doch, so lange er lebt, durch eine heftige Mittheilung seiner krankhaften Stimmung auf das Gehirn sympathisch Delirium desselben bewirken kann. Daher kann auch bei einem Irren dieser Art bei Entfernung der materiellen Störungen in den Eingeweiden, welche entfernter oder näher auf das Gehirn influiren, die Disposition wieder zurücktreten.

Was nun aber die Beziehung der Eingeweide zu den Leidenschaften betrifft, so sind diese zwar nicht zu läugnen, jedoch bleibt in den hieher gehörigen Erfahrungen der Physiologie ausserordentlich viel zu lichten übrig. In diesem Theile unserer Wissenschaft herrschen noch ziemlich allgemein Vorstellungen, welche sich noch wenig von den Ueberlieferungen des Volkes entfernen. Dass die Leidenschaften vermöge eines im Gehirn stattfindenden veränderten Zustandes entweder excitirend oder deprimirend auf das ganze vom Gehirn abhängende Nervensystem wirken, ist bekannt. In den excitirenden Leidenschaften finden Spannungen, und selbst convulsivische Bewegungen gewisser Muskeln, nämlich vorzüglich aller von dem respiratorischen System der Nerven (Nervus facialis eingeschlossen) abhängigen Muskeln statt. Die Athembewegungen werden bis zum Weinen, Seufzen, Schluchzen verändert, die Gesichtsmuskeln verzerrt; in den deprimirenden Leidenschaften, wie in der Angst, im Schrecken, in der Furcht, sind alle Muskeln des gesammten Körpers abgespannt, indem der motorische Einfluss des Rückenmarkes und Gehirns abnimmt. Die Füsse tragen nicht, die Gesichtszüge werden hangend, das Auge starr, der Blick gebannt, ohne Ausflucht, und diess kann bis zur momentanen Lähmung des ganzen Körpers und besonders der Schliessmuskeln fortschreiten. Die Bewegungen des Herzens werden in beiderlei Leidenschaften häufiger, in den excitirenden zugleich heftig, in den deprimirenden häufig und meist schwach. Die Empfindungen werden in einigen oder vielen Theilen, besonders im Gesicht und den Athemwerkzeugen und Verdauungswerkzeugen, oft im ganzen Nervensystem verändert. Die organischen Wirkungen der Leidenschaften verändern die Absonderungen der Thränen, der Haut, die in den deprimirenden Leidenschaften kalten Schweiss absondert, der Galle, deren Ausscheidung öfter gestört wird, so dass sie in die Blutgefässwandungen eindringt und Icterus erzeugt, des Urins, der wässrig wird, wie bei allen Nervenaffectionen; sie modificiren zugleich die Actionen der kleinen Gefässe, wodurch der Turgor der Haut verändert, und diese bald roth, bald auch blass wird. Kurz, es erfolgen die Wirkungen der Leidenschaften erstens auf die Athemnerven, den N. facialis, N. vagus, die N. spinales respiratorii mit sammt dem N. phrenicus, dann aber durch das Rückenmark auf das ganze Rumpfnervensystem, sowohl der animalischen als or-

Digitized by Google

ganischen Nerven. Aber ich kenne keinen einzigen Beweis, sondern blosse Traditionen, dass eine Leidenschaft bei gesunden Menschen mehr auf ein Organ als auf ein anderes wirke. Man sagt, das Herz habe eine Beziehung zur Freude, zum Kummer, zur Angst, aber in welcher heftigen excitirenden oder in welcher deprimirirenden Leidenschaft wird es nicht verändert? Ist es nicht wie mit den Thränenwerkzeugen, welche in jeder heftigen Leidenschaft ergriffen werden können, da jede Leidenschaft, Aerger, Zorn, Freude, Bewunderung, Rührung, Traurigkeit, Schrecken, Angst, Furcht, bis zum Weinen sich steigern kann. Man hat behauptet, die Leber stehe in einer engen Beziehung zu den Leidenschaften des Zorns und des Aergers; diess ist eine uralte, in viele, auch physiologische Schriften übergegangene, aber ganz falsche Behauptung. Wohl werden manche Menschen nach diesen Leidenschaften an der Leber afficirt, sie bekommen eine gelbe Farbe, Schmerzen in der rechten Seite, oder gar Leberentzündung. Aber diess geschieht nur denen, welche leberkrank sind, oder welche eine angeborne Disposition zu Leberaffectionen haben. Den meisten geschieht nach dem heftigsten Zorne und Aerger nichts der Art, hier darf ich mich ganz auf die Erfahrungen meiner Leser berufen. Wie viele sind unter uns, welche nach Aerger und Zorn von allem dem nichts empfinden, die vielmehr sich den Magen verderben, weil es der leicht ergreifbare Theil ist, während ein anderer auf diese Leidenschaften seine Verdauungsorgane ganz ungeschwächt empfindet, aber jedesmal bei Zorn und Aerger eine heftige Affection des Herzens erleidet, weil es der bei ihm leicht angreifbare Theil ist; und so ist es mit allen Leidenschaften. Keine einzige wirkt regelmässig mehr auf die Leber, regelmässig auf den Magen, das Herz; bei dem gesunden Menschen breiten sich ihre Wirkungen radiatim vom Gehirn über das Rückenmark, über das animalische und organische Nervensystem aus. Alles Specielle ist auch individuell. Der Schamröthe scheint es eigenthümlich, dass sie die Haut des Gesichtes röthet, indem eine Anhäufung des Blutes in den kleinen Gefässen stattfindet; allein viele Menschen werden von Aerger, Zorn, Angst roth; und andere werden in der Scham, im Aerger, im Zorne so gut wie in der Angst, im Schrecken, in der Furcht blass. Nur bei dem Hepatischen, bei der hepatischen Constitution erfolgt auf eine heftige Leidenschaft Gelbsucht, Leberentzündung. Kurz, wir sehen, dass die Wirkungen der Leidenschaften auf die verschiedenen Regionen der von dem Gehirne abhängigen Theile nichts für die Hypothese beweisen können, dass die Leidenschaften, oder überhaupt gewisse Seelenverrichtungen ihren Sitz ausser dem Gehirne hätten.

Wenn wir nun theils aus vergleichend anatomischen, theils aus physiologischen und pathologischen Gründen mit Bestimmtheit anerkennen müssen, dass der Sitz der Seelenwirkungen im Gehirne und in keinem andern Theile ist, dass die Nerven diese Wirkungen anregen und vermöge ihrer Kräfte ausführen, und dass alle übrigen Theile die Wirkungen der Nerven erfahren, so ist damit nur bewiesen, dass die Seele durch die Organisation

Digitized by Google

des Gehirns wirkt und thätig ist; es ist aber nicht damit behauptet, dass ihr Wesen bloss seinen Sitz im Gehirne hat. Es könnte wohl seyn, dass die Seele nur in einem Organe von einer bestimmten Structur wirken und Wirkungen empfangen könnte, und doch vielleicht allgemeiner im Organismus verbreitet wäre.

Wir wollen hier einige Thatsachen hervorheben, welche entschieden beweisen, dass die Seele, wenn sie auch nur in dem Gehirne wirksam ist, doch nicht ganz auf dasselbe beschränkt ist. Es genügen diess zu beweisen zwei Thatsachen. Die eine ist, dass die niederen Thiere, wie Planarien, Polypen, Würmer, theilbar sind, und dass Polypen und Würmer, wie die Naiden, Nereiden (siehe oben p. 19.), selbst durch Theilung ihres Körpers zeugen. Diese Thatsache zeigt uns, dass das Lebensprincip mit der Materie theilbar ist, indem aus getrennten Stücken neue Individuen entstehen. Man kann diese Thiere zwar beseelt in dem Sinne, wie die höheren Thiere, nicht nennen; indessen hat jedes der getrennten Theile seinen besonderen Willen und seine besonderen Begehrungen, und da zum Empfinden auch Bewusstseyn und Aufmerksamkeit gehört, so haben wir den Beweis, dass das psychische Princip dieser niederen Wesen, mag es mit dem Lebensprincip eins oder nicht eins seyn, wie dieses mit der Materie theilbar ist. Die zweite Thatsache ist, dass das psychische Princip wie das Lebensprincip auch bei den höheren und höchsten Thieren, ja selbst beim Menschen, in einem beschränkten Sinne theilbar ist. Die höheren Thiere und die Menschen erzeugen zwar keine neuen beseelten Individuen durch Theilung ihrer selbst in mehrere Stücke; wohl aber durch Erzeugung des Saamens bei dem Manne, und des Keimes bei dem Weibe. Wie die Zeugung des neuen Individuums bei der Berührung des weiblichen Keimes und des männlichen Samens stattfinden mag, wir wissen, dass bei den Fischen, Fröschen, Salamandern die blosse, selbst künstlich ausgeführte Berührung von Samen und Ei, ohne allen Antheil von Seiten des Männchens und Weibchens zur Erzeugung des neuen Individuums hinreicht, wie denn nach Spallanzani Eier des Frosches mit Froschsamen befeuchtet, befruchtet sind. Es geht daraus hervor, dass der Keim des Weibchens und der Saame des Männchens Alles enthalten, was zur Aeusserung des individuellen Lebensprincipes und der psychischen Functionen der Thiere nöthig ist. Der Keim und der Samen, oder einer von beiden muss also das Lebensprincip und das psychische Princip gleichsam latent enthalten; denn sonst könnte es sich nicht bei der Entstehung des neuen Individuums äussern. Eben so müssen wir auch bei den höchsten Thieren und dem Menschen nothwendig annehmen, dass, wie der Same und das Ei alle Bedingungen zu einem neuen belebten und beseelten Wesen enthalten, sie auch selbst entweder beide, oder eines von beiden das Lebensprincip und das psychische Princip im latenten Zustande enthalten. Ob das neue Individuum ausser (wie bei den Eierlegern) oder in dem mütterlichen Körper (wie bei den Lebendiggebärenden) sich entwickelt, macht in dieser Frage gar nichts aus.

Digitized by Google

Wir sehen aus dieser Folge von Thatsachen und Vernunftschlüssen, dass, obgleich die höheren Thiere und der Mensch nicht mehr durch Zertheilung in mehrere Stücke, neue belebte und beseelte Individuen zeugen, sie doch insofern noch in Hinsicht des Lebensprincipes und psychischen Principes theilbar sind, als ein Theil ihrer Materie, die Zeugungsflüssigkeiten, mit diesen Principien, mögen sie eins oder getrennt seyn, beseelt ist. Wenn diess aber so ist, so ist das psychische Princip offenbar nicht auf das Gehirn beschränkt, sondern auch, wenngleich im latenten Zustande, in Theilen, die vom Gehirne weit entfernt von dem Ganzen abtrennbar sind, enthalten; und diess ist es, was wir beweisen wollten.

Ob das Lebensprincip und das psychische Princip von dem Gehirne aus in einem latenten Zustande auf den Wegen der Nerven zum Samen oder Keime gelange, ob es im latenten Zustande im Blute verbreitet werde, ob es im latenten Zustande im ganzen Körper verbreitet sey, während es nur frei im Gehirne als dem zu seiner Wirksamkeit organisirten Apparate wirkt und Wirkungen anderer Theile empfängt, alles diess ist nicht zu beantworten, auch wäre die Beantwortung für die gegenwärtige Untersuchung gleichgültig; es ist genug, dass wir wissen, dass der Same und Keim nicht allein die Kraft zu einem belebten Individuum enthalten, sondern auch das psychische Princip des neuen Wesens im latenten Zustande enthalten müssen. Es ist für unsern Zweck jetzt genug, zu wissen, dass andere Theile des Körpers, als das Gehirn, auch noch an dem psychischen Principe Theil haben, dass aber diess Princip nur in dem Gehirne frei und thätig erscheint, weil hier die Organisation zu allen seinen Bewegungen und Wirkungen auf die Kräfte anderer Theile, auf die motorischen Apparate, und zur Aufnahme der Wirkungen der sensibeln Leiter ist. Nur in dem Gehirne ist Bewusstseyn, Vorstellung, Gedanke, Wille, Leidenschaft möglich, und wenngleich das Princip zur Erzeugung der Vorstellungen, Gedanken u. s. w. in dem befruchteten Keime latent vorhanden ist, so muss dieser beseelte Keim doch erst die ganze Organisation des Gehirns erschaffen, dass das psychische Princip frei werde, und dass Vorstellungen, Gedanken, Wille u. s. w. erscheinen oder wirken. In der hirnlosen Missgeburt, die während des Lebens im Uterus bis zur Geburt noch ernährt wird und lebt, wurde das zur spätern Aeusserung der Seele von dem belebten Keime erzeugte Organ schon zu einer Zeit (durch Wassersucht) zerstört, ehe es zum Freiwerden des psychischen Principes, zur Aeusserung der Seelenfähigkeiten, ausgebildet war.

Ob das psychische Princip durch eine Verletzung des Gehirnbaues selbst wesentlich modificirt werde, ob in den Geisteskrankheiten die Thätigkeit der Seele durch die Verletzung des Gehirns bloss verändert werde, oder ob die Seele an sich krank seyn könne, kann nach den vorausgeschickten Betrachtungen und Thatsachen jetzt erörtert werden. Da, wie wir hier gesehen haben, die Existenz der Seele von dem unverletzten Baue des Gehirns nicht abhängt, da sich ihr Daseyn, wenn auch latent, auch in dem von dem Mut-

Digitized by Google

terstamme abgestossenen Keime erweist, so kann auch keine Veränderung des Baues des Gehirns das Wesen der Seele selbst verändern, sondern ihre Thätigkeit nur zu kranken Actionen zwingen. Nur die Thätigkeit der Seele hängt von der Integrität des Faserbaues und der Mischung des Gehirnes ab. Die Art der Thätigkeit, und die Art des Baues und Gehirnzustandes laufen immer parallel; der letztere bestimmt immer die erstere, aber das Wesen der Seele, ihre latente Kraft, so weit sie sich nicht äussern muss, scheint durch keine Hirnveränderung bestimmbar. Hält man sich hieran, so sind alle weiteren Erörterungen über die letzte Ursache der Geisteskrankheiten, über den Antheil des Gehirns und der Seele an denselben abgeschnitten, und der Arzt hat bei allen abnormen Geisteszuständen immer und zuerst nur den Zustand der materiellen Veränderung, welche die Seele zu kranken Actionen zwingt, oder ihre Thätigkeit unterdrückt, im Auge zu behalten. Wir kennen aus Berichten zwei Fälle von angebornem Blödsinn mit einem so niedrigen Schädel, dass die Abbildungen an den Zustand des Schädels bei der Hemicephalie erinnern, obgleich das Cranium vollständig vorhanden ist. Es sind die zwei in der Colonie Kiwitsblott, eine Meile von Bromberg, lebenden Söhne der Wittwe Sohn, der eine von 17, der andere von 10 Jahren. Beide sind bei dem besten Wohlseyn so stupid, dass sie sich des Weges nach Hause auch bei einer geringen Entfernung nicht erinnern, dass sie sich nicht ihre Beinkleider öffnen können, obgleich sie mit allen Bewegungskräften eines gesunden Menschen ausgerüstet sind, und auf alle Theile ihres Körpers den Einfluss des Willens besitzen, den sie, obgleich lenksam und ohne Bosheit, nur zum Essen und Trinken, und zum Zerstören von Allem, was ihnen in die Hände fällt, benutzen können. Auch in diesen denkwürdigen Fällen dürfen wir keine angeborne Krankheit der Seele, keinen ursprünglichen Mangel des psychischen Principes voraussetzen; gewiss war die Anlage zu der höchsten Vollkommenheit in dem latenten Zustande des psychischen Principes im Keime verhanden; aber keine Entwickelung der Fähigkeiten der höheren Seelenäusserungen war bei der unvollkommenen Ausbildung des Gehirns möglich, gleich wie die bei dem gesunden Menschen eintretende plötzliche Veränderung des Hirnzustandes augenblicklich auch die Aeusserungen der Seele krankhaft oder ihre Kraft sogar latent macht, die nach der Wegnahme des Druckes auf das Gehirn oft mit der ganzen Klarheit des Bewusstseyns wiederkehrt. Da die Materie durch die Thätigkeit immer zugleich verändert wird (siehe oben p. 52.), so versteht es sich von selbst, dass abnorm angestrengte Thätigkeit der Seele, und eine durch eingegangene Lebensverhältnisse bedingte einseitige Richtung der Geistesthätigkeit, oder die hervorgerufene Heftigkeit der Seelenzustände auch wieder auf die Organisation des Seelenorganes zurückwirken muss. Wie sehr auch die Entfernung dieser Ursachen in den Augen des Arztes wichtig ist; der Zustand der Organe bleibt hier wie überall das Object desselben; und die Sündhaftigkeit, womit schwärmerische Aerzte sich so viel zu schaffen machen, ist nicht das Wesen der Gei-

Digitized by Google

steskrankheit, sondern kann nur mit in den grossen Kreis ihrer veranlassenden Ursachen gehören.

Ob das Lebensprincip, von welchem im Keime die ganze Organisation ausgeht, und welches auch das Organ für das Wirken des psychischen Principes erzeugt, von dem letztern wesentlich verschieden sey, oder ob die Thätigkeit der Seele nur eine Species der Wirkungen des Lebensprincipes sey, ist eine in der empirischen Physiologie ganz unlösbare Frage. Wir wissen, dass das Lebensprincip ohne Seelenäusserungen fortwirken kann; denn das Lebensprincip erhält auch die hirn- und rückenmarklose Missgeburt noch bis zur Geburt lebend. Daraus kann man nicht schliessen, dass das psychische Princip von dem Lebensprincip dem Wesen nach verschieden sey; denn wir haben schon gesehen, dass es einen latenten Zustand des psychischen Principes in einem belebten Körper auch ausser dem Gehirne giebt. Man kann aber eben so wenig daraus schliessen, dass das psychische Leben nur eine Species der Wirkungen des Lebensprincipes sey; wir sehen nur, was auch die Schöpfung des ganzen Embryos vor der Entwickelung der Seelenfähigkeiten beweist, dass die Thätigkeit der Seele zur Aeusserung des Lebensprincipes nicht nothwendig ist; dagegen wissen wir eben so bestimmt, dass die *Thätigkeit* der Seele ohne die Mitwirkung des Lebensprincipes in einem thierischen Körper nicht möglich ist; denn das Lebensprincip erschafft und erhält die zur Thätigkeit der Seele nothwendige Organisation des Gehirns.

Für die Ansicht, dass das psychische Leben nur eine Manifestation des Lebensprincipes der thierischen Körper überhaupt sey, kann man anführen, dass das psychische Princip nicht bloss in einer Classe von thierischen Wesen, im Menschen, dass es vielmehr bis zu den niedersten Thieren erscheint. Denn alles Thierische ist beseelt, was der Sinneserscheinung auch ausser den Sinnesempfindungen bewusst ist, was vorstellt, was Begehrungen und Vorstellungen von ihrem Objecte und ihrer Befriedigung hat, was durch Vorstellungen und Begehrungen zu Willensactionen bestimmt wird. In diesem Umfange kommen psychische Erscheinungen bis zu den niedersten Thieren vor; bei den höheren Thieren treten zumal auch Leidenschaften auf. Auf der andern Seite lässt sich für die Unabhängigkeit des psychischen Principes von dem Lebensprincipe anführen, dass eine ganze Classe der organischen belebten Wesen, die Pflanzen, aller psychischen Erscheinungen entbehren. Indessen lässt sich dieser Einwurf wieder durch die Annahme eines latenten Zustandes der psychischen Seite des Lebensprincipes aufheben, und wo eine Hypothese bloss insofern Haltung hat, als sich eine grosse Anzahl der Thatsachen daraus erklären lassen, wird dieselbe durch eine andere, welche die Thatsachen eben so erklärt, neutralisirt.

Beide Principien stimmen in ihren Wirkungen darin überein, dass ihre Erscheinungen das Vernünftige seyn können; aber das Vernünftige des psychischen Lebens ist blosses Bewusstseyn des Vernünftigen, ohne alle schaffende Einwirkung auf die Organisation, auf die Materie; das Vernünftige der Thätigkeit des Le-

Digitized by Google

bensprincipes ist die Erzeugung der zweckmässsigen Organisation in der belebten Materie. Die in der Organisation des einfachsten Wesens sich ausdrückende Vernunft ist vielleicht erhabener als das Höchste, was das Bewusstseyn eines thierischen Wesens oder Menschen vorzustellen vermag. Alle Probleme der Physik sind vor dieser schaffenden Thätigkeit gelöst. Vor der Natur, welche das Auge, das Gehörorgan erzeugt, sind keine Probleme über die Physik des Sehens, des Hörens verborgen. Sie ist auch die Ursache des Instinktes, d. h. sie ist die Ursache, dass in dem Sensorium eines Thieres Träume entstehen, die es zu zweckmässigen, zu seinem Daseyn nöthigen und vernünftigen Handlungen nöthigen, ohne dass die Seele des Geschöpfes das Geringste von diesem vernünftigen Vorgange und seinem Zusammenhange einsieht.

Wenn es einen wahren Grund für die Ansicht giebt, dass das psychische Leben auch nur eine Art der Manifestation des Lebensprincipes der thierischen Wesen ist, so ist es der, dass beiderlei Wirkungen der Ausdruck der Vernunft seyn können, dass die Erzeugung der Organisation des niedersten Thieres bei der Entwickelung des Keimes der Ausdruck der höchsten Vernunft ist, und dass das darin waltende Vernünftige alle bewussten Seelenwirkungen dieses Geschöpfes weit überstrahlt. Ernst Stahl liess alle thierischen Wirkungen, weil sie zweckmässig sind, von der Seele ausgehen. Diese Seele, wenn von ihr das psychische Leben im engern Sinne abhängig ist und ausfliesst, ist in Stahl's Sinne freilich etwas ganz Anderes und Höheres, als was wir gewöhnlich Seelenleben nennen. Man sieht leicht ein, dass Stahl's Theorie die Anschauung von der vernunftgemäss wirkenden Kraft in jedem lebenden Wesen zu Grunde liegt, dass er das, was wir gewöhnlich Seelenleben nennen, als einen Ausfluss jener letzten Ursache eines Geschöpfes ansah. Aber wenn diese letztere Ansicht auch richtig seyn sollte, was sich empirisch nicht beweisen lässt, so muss man doch immer festhalten, dass in das bewusste und denkende Seelenwirken nur ein kleiner Theil von den Wirkungen jener höhern, vernunftgemäss wirkenden Lebensseele fällt, welche die letzte Ursache eines Geschöpfes ist, und welche in seiner Organisation, in seinen instinktmässigen Trieben alle Schicksale desselben im Zusammenfluss mit der äussern Welt vorsieht.

Man fragt, ob das psychische Princip eine Thätigkeit der Materie oder selbstständige Kraft sey, ob es an den Leib blossgebunden sey, oder ob es nicht anders, als der Ausdruck eines gewissen Zustandes, einer gewissen Zusammengesetztheit der Materie sey. Bewegung, Thätigkeit ist vielleicht der Urzustand der Materie, da selbst die Ruhe der Massen von der Anziehung ihrer Theilchen abhängt. Wenn es aber keinen Körper ohne Energie, ohne Kraft, ohne Thätigkeit giebt, ist nicht die Seele selbst auch der Ausdruck des Zustandes und der Zusammensetzung der Materie in den lebenden Wesen? Erscheint die Seele nach dem Tode nicht mehr an dem Leibe, weil die Materie ihren bisherigen Zustand, ihre Zusammensetzung, die vereinte Wirkung und Anziehung ihrer belebten Atome verloren hat, die nun nach

Digitized by Google

einem veränderten Zustande in andere Erscheinungsweisen übergehen; oder erscheint die Seele nicht mehr an dem Körper, weil sie nicht mehr an den Körper gebunden ist?

Allerdings sind die Erscheinungen des Seelenlebens, mag es ein Ausfluss des Lebensprincips seyn, oder von einem selbstständigen mit dem Leben verknüpften Princip abhängen, durchaus an die Organisation des Gehirns geknüpft; ohne die Unversehrtheit dieses so zusammengesetzten Faserbaues erfolgt keine Wirkung der Seele auf die belebten Werkzeuge des Körpers, oder mit anderen Worten, erscheint sie nicht an diesem, aber sie kann an ihm latent seyn, wie ihre Quelle in den Zeugungsflüssigkeiten der thierischen Wesen vorhanden, aber latent ist. Indess, hier wiederholt sich dieselbe Frage: ist auch der latente Zustand der Seele nur die Ruhe der einer gewissen Zusammensetzung der Materie eingebornen Kraft, oder kann das Princip, unabhängig von aller Materie, sich mit dieser verbinden und sie verlassen. Fliessen die nach dem Materialismus allein thätigen Atome nach der Zerlegung der mit dem latenten Zustande des Lebens beseelten Materie in die Welt zurück, um wieder zur Quelle des Lebens sich zu einen, wenn sie in einer gewissen Art wieder zusammengesetzt werden; oder ist das latente Lebensprincip und psychische Princip auch von dem Zerfallen der Atome unabhängig; ist seine Substanz immateriell, und weder die Thätigkeit der Atome der Materie, noch die Thätigkeit der in gewisser Art vereinten Atome der Materie? Obgleich man keine Lösung dieser physiologischen Fragen von der empirischen Physiologie erwarten darf, so giebt es doch Thatsachen, welche bei dem Versuche dieser Lösung zu benutzen sind. Es giebt allerdings Kräfte der Natur, oder imponderable Substanzen, welche, wenn auch nicht von der Materie unabhängig, doch ohne eine Veränderung in dem materiellen Zustande des Körpers sie verlassen und auf andere übergehen können, wie Licht, Elektricität, Magnetismus. Die Existenz dieser Principien, ihr Erscheinen an den Körpern, und ihr Ueberströmen von einem auf den andern Körper zeigt uns deutlich, dass jener Materialismus, welcher ausser den Kräften der Atome nichts anerkennt, grundlos ist; und ohne entfernter Weise das Lebensprincip und psychische Princip mit jenen imponderabeln Substanzen oder Kräften vergleichen zu wollen, sehen wir wenigstens, dass in den Thatsachen der Physik nichts ist, welches die Möglichkeit eines von der Materie unabhängigen, wenngleich in den organischen Körpern in der Materie wirkenden immateriellen Princips aufhöbe.

Wir müssen hier ein anderes Räthsel berühren, dessen schon im Anfange dieses Lehrbuches p. 38. gedacht wurde. Es ist die Frage nach der Ursache des beständigen Vergehens und der Wiedererzeugung belebter und beseelter individueller Wesen. Das Lebensprincip wächst nicht allein an Intensität während des Wachsthums der organischen Körper, es vervielfältigt sich auch durch die Theilung und Zeugung. Aus einem lebenden Wesen entstehen viele andere, eben so kräftige und productive, aus diesen wieder andere, während die organi-

Digitized by Google

sche Kraft der sterbenden vergeht oder latent wird. Diese Vervielfältigung belebter Wesen geschieht nicht bloss durch ein Uebertragen des wirksamen Principes von dem Producenten auf das Product. Denn der Producent bleibt auch nach der Vervielfältigung zu neuen Productionen fähig, bis er zuletzt vergeht. Dasselbe gilt aber von dem psychischen Princip. Der Zeugende verliert dasselbe nicht durch das Zeugen eines neuen beseelten Producenten, aber nach der fortdauernden Erzeugung neuer beseelter Wesen wird die Psyche der zeugenden Eltern mit dem Sterben für uns latent. Wie ist es nun möglich, dass das Lebensprincip und die Psyche sich in immer neuen Individuen ins Unendliche multiplicirt, während doch die Producenten nach der Production beseelt bleiben und später vergehen; wie ist diese unendliche Multiplication des psychischen Principes mit dem Lebensprincip denkbar? Darauf giebt es zwei Antworten, deren sich keine erweisen lässt. Die erste ist die, dass das Princip des Lebens und das psychische Princip in allen Materien, durch deren Aneignung die thierischen Körper wachsen und zur Multiplication fähig werden, im latenten Zustande vertheilt seyen, und durch die Organisation in den belebten und beseelten Körpern in Erscheinung treten. Diess ist die Lösung, welche der Pantheismus auf jene Frage ertheilt. Diese Lösung ist es, welche an der Unsterblichkeit der individuell beseelten Wesen zweifelt, und auf die Unsterblichkeit des Weltgeistes reducirt ist. Die zweite Antwort ist, dass das Lebensprincip und psychische Princip nicht latent in allen zur Aneignung dienenden Materien verbreitet sind, dass das Lebensprincip vielmehr nur in den belebten Wesen ist, und dass das psychische Princip. so lange sie leben, an ihre Materie gebunden ist. Bei dieser Ansicht lässt sich die Multiplication der beseelten Individuen nur durch die Annahme erklären, dass das psychische Princip, wenn es sich durch die Zeugung ins Unendliche multiplicirt, eine Substanz sey, welche durch Vertheilung nie weder vergehen noch an Intensität geschwächt werden kann. Dieses Princip würde von allen Kräften sich dadurch unterscheiden, dass es eine durch Theilung, sebst bis ins Unendliche, unveräusserliche und nicht zu schwächende Kraft wäre. Eine Supposition, die für unsern Verstand unbegreiflich ist, und wozu doch jeder gedrängt wird, der dem Pantheismus entgegenstrebt, und mit dem uns eingebornen Glauben an die Unsterblichkeit nicht des psychischen Principes überhaupt, sondern der individuell beseelten Wesen, den Abgrund, welchen keine Wissenschaft ausfüllen kann, überflügelt.

Die specielle Physiologie des Seelenlebens folgt erst später nach der Physiologie der Sinne im sechsten Buche dieses Werkes. Hier kömmt dieser Gegenstand nur in den allgemeinsten Beziehungen zum Gehirne vor.

III. Von dem verlängerten Marke.

Durch das verlängerte Mark ist das Gehirn mit dem Rücken-

Digitized by Google

mark in Wechselwirkung, die Kenntniss des Verlaufs der Stränge desselben ist daher für den Physiologen von besonderer Wichtigkeit. Burdach hat diesen Gegenstand in seinem verdienstvollen Werke über den Bau und das Leben des Gehirns mehr als Andere aufgehellt. Man unterscheidet jetzt folgende Stränge des verlängerten Markes:

1) die Pyramiden; sie bilden sich nach Burdach aus Grundfasern und Kreuzungsfasern. Die Grundfasern liegen an der vorderen Fläche des grauen Kernstranges, sie bilden die hintere Wand des vorderen Einschnittes des Rückenmarkes, steigen aber am Halse $3\frac{1}{2}$—$1\frac{1}{2}$ Zoll unter der Brücke schräg nach vorn herauf, so dass sie anfangs, die Seitenwände des vordern Einschnittes bildend, zuletzt zu beiden Seiten des Einschnittes an der vordern Fläche des Rückenmarkes hervortreten, und an der innern Seite des innern vordern Rückenmarksstranges sich hervordrängen. Die Kreuzungsfasern sind ein Arm des Seitenstranges des Rückenmarkes, welcher hinter der Olive weggeht, schräg nach innen und vorn aufsteigt, und mit den Grundfasern an der Oberfläche zur Seite des vordern Einschnittes des Rückenmarkes 1 Zoll unter der Brücke hervortritt. Nur die Kreuzungsfasern kreuzen sich, d. h. kommen von der einen Seite des Einschnittes zur andern, und legen sich an die entgegengesetzten Grundfasern an. Burdach a. a. O. 2. 31. Die Fasern der Pyramiden gehen durch die Bündel der Querfasern der Brücke in die Hirnschenkel über.

2) Die Hülsenstränge sind nach Burdach die an der innern und äussern Seite der Olive verlaufenden Faserbündel, welche an der Oberfläche des verlängerten Markes nicht blossliegen. Der vordere Hülsenstrang entsteht aus den Markfasern am vordern Einschnitte des Rückenmarkes, welche an der Stelle, wo die Pyramiden hervortreten, von der Pyramide nach aussen gedrängt werden. Der äussere Hülsenstrang ist der äussere Theil der vordern Rückenmarksstränge an der innern Seite der vordern Wurzelreihe. Beide Hülsenstränge liegen an einander bis da, wo die Olive zwischen ihnen hervortritt. Die inneren Hülsenstränge gehen durch die Brücke mit den Pyramiden in die Hirnschenkel über. Die äusseren Hülsenstränge treten nach oben und innen um den obern Theil der Processus cerebelli ad corpora quadrigemina, und sofort in die Basis der Vierhügel über.

3) Die Olive entsteht durch die Ausbreitung des vordern grauen Stranges im verlängerten Marke. An dieser Stelle geht von dem grauen Strange eine mit weisser Markmasse gefüllte, gefaltete graue Blase ab, die auch äusserlich mit Markmasse überzogen ist. Die graue gefaltete Blase und der markige Kern erscheinen auf dem Durchschnitte als Corpus dentatum der Olive.

4) Der Seitenstrang des Rückenmarkes giebt am Anfange des verlängerten Markes die Kreuzungsfasern der Pyramiden nach innen ab, der übrige Theil schlägt sich über der Olive in den Schenkel des kleinen Gehirns zum verlängerten Marke, und geht

Digitized by Google

auch zum Theil im äussern Theile der Rautengrube fort. Burdach a. a. O. p. 35.

5) Der Keilstrang entsteht aus den die hinteren grauen Stränge des Rückenmarkes bedeckenden Markfasern, welche, an der oberen Seite des Seitenstranges gelegen, mit den Fasern des Seitenstranges zusammen den Schenkel des kleinen Gehirns zum verlängerten Marke bilden; seine inneren Fasern laufen als äussere Theile der Wände der Rautengrube fort nach dem grossen Gehirne.

6) An der innern hintern Fläche des Keilstranges liegt der zarte Strang, dessen innere Seitenfläche die Seitenwand des hintern Einschnittes bildet, und zum Theil an der entsprechenden Fläche des Stranges der andern Seite dicht anliegt. An der Spitze der Rautengrube schwillt dieser Strang an und bildet einen keulenförmigen Wulst. Burdach a. a. O. p. 37.

7) Die runden Stränge kommen durch das Auseinanderweichen der zarten Stränge als Seitenwände des Rückenmarkskanales zum Vorschein, sie kommen zwischen den auseinanderweichenden zarten Strängen in die Rautengrube, und gehen durch den Einschnitt getrennt vorwärts, den Boden der Rautengrube bildend, und bis in den vordern und untern Umfang der Wasserleitung sich fortsetzend.

Auf eine ausführliche Beschreibung der Hirnfaserungen kann man sich hier nicht einlassen und verweist auf das Werk von Burdach und Langenbeck's *Icones*, und in Hinsicht der Zusammenstellung der neueren Forschungen über den Bau des Gehirns auf E. H. Weber's *Anatomie*, und eine sehr zweckmässige, klare und genaue Darstellung desselben von D'Alton im XI. Bande des *encyclopädischen Wörterbuchs der medicinischen Wissenschaften.*

Was die Kräfte des verlängerten Markes betrifft, so ist zuerst zu bemerken, dass es im Allgemeinen die Eigenschaften des Rückenmarkes theilt; es ist so gut wie das Rückenmark Reflector, ja kein Theil des ganzen Nervensystems ist so sehr zur Reflexion geneigt, als dieser Theil; denn die Reizungen der vom verlängerten Marke entspringenden Nerven bringen vor allen anderen Nerven am leichtesten Reflexionsbewegungen hervor; es gehört mit zu den motorischen Apparaten, und kein Theil des Nervensystems hat einen so grossen Einfluss auf Hervorbringung von Bewegungen, als dieser; denn bei Reizung desselben erfolgen Zuckungen am ganzen Rumpfe, und bei der Verletzung desselben ist der ganze Rumpf gelähmt. Aber wodurch sich das verlängerte Mark vor allen Theilen der Centralorgane auszeichnet, sind folgende Eigenschaften.

1) Es ist die Quelle aller Athembewegungen, wie schon oben p. 341. aus den Versuchen von Legallois gezeigt wurde. Wird das Gehirn von vorn nach hinten bei einem Thiere zerstört, so hört das Athmen erst auf bei der Verletzung der Medulla oblongata. In diesem Organe liegt also die Quelle der periodischen Inspirationen, der veränderten Athembewegungen, der krankhaften Respirationsbewegungen bei den Reizungen der Empfindungsnerven in den Schleimhäuten. Auf dasselbe wirken die Leidenschaften bei Erregung aller Respirationsnerven, den N. facialis

Digitized by Google

eingeschlossen; in ihm ist das Primum movens zu den Bewegungen, die das Weinen, Lachen, Schluchzen, Seufzen, Gähnen, Husten, Erbrechen u. s. w. begleiten oder bewirken; bei welchen Bewegungen immer das ganze System der respiratorischen Nerven und der N. facialis afficirt ist. So wie ein Theil dieser Bewegungen von dem verlängerten Marke aus in Leidenschaften bewirkt wird, so entstehen sie durch eine Wirkung des Sensoriums auf das verlängerte Mark, oft auch durch blosse Vorstellungen, wie das Lachen, Weinen, Gähnen. Die Disposition zum Gähnen scheint bei dem Zustande der Ermüdung in den Centraltheilen des Nervensystems immer vorhanden zu seyn; tritt dann die Vorstellung vom Gähnen dazu, indem wir Andere gähnen sehen, so wird die Disposition offenbar und wir gähnen wirklich. Bei dieser Bewegung ist wieder das System der respiratorischen Nerven und der Nervus facialis afficirt, sowohl die Gesichtsäste als derjenige, der sich im Musculus digastricus verbreitet.

2) Es ist der Sitz des Willenseinflusses. Denn wie die Versuche von Flourens zeigen, sind die Thiere, welche die Hemisphären des grossen Gehirns verloren haben, zwar betäubt, aber noch fähig, Bewegungen willkührlich auszuführen; andrerseits behalten die Thiere diese Fähigkeit auch nach Hinwegnahme des kleinen Gehirns, wodurch bloss die Kraft der Bewegungen und die Fähigkeit zu zusammenhängenden Ortsbewegungen aufgehoben wird. Vergl. über hirnlose Missgeburten mit willkührlicher Bewegung, oben p. 342., Mueller's *Archiv* 1834. *p.* 168.

3) In diesem Organe ist auch der Sitz des Empfindungsvermögens; nicht allein dass alle Gehirnnerven, mit Ausnahme des ersten und zweiten, mit den Fortsetzungen des verlängerten Markes, im Gehirne oder mit diesem selbst zusammenhängen; wird dieser Satz auch durch die Geschichte der Verletzungen der Hirntheile erwiesen. Aus den Versuchen von Magendie und Desmoulins geht hervor, dass ein Thier nach dem Verluste der Hemisphären des grossen Gehirns und des kleinen Gehirns das Empfindungsvermögen nicht verloren hat. Mit der Hinwegnahme der Hemisphären werden zwar die Centralorgane des Gesichtssinnes und Geruchssinnes entfernt, und es tritt Blindheit ein; dagegen scheint das Bewusstwerden der Empfindungen nicht an die Hemisphären des grossen Gehirns geknüpft zu seyn. Flourens hat zwar aus seinen Versuchen über Hinwegnahme der grossen Hemisphären geschlossen, dass diese Theile allein die Centralorgane der Empfindungen seyen, und dass ein Thier nach der Wegnahme derselben gar nicht empfinde. Indessen folgt diess nicht aus seinen sonst so interessanten Versuchen, sondern gerade das Gegentheil, wie schon Cuvier in seinem Berichte über diese Versuche bemerkt hat. Es wird zwar ein Thier nach dem Verluste der Hemisphären des grossen Gehirns stumpfsinnig, aber gleichwohl zeigt es ganz deutliche Zeichen von Empfindung, nicht von blosser Reflexion. Es bestimmt sich selbst nicht mehr zu Bewegungen, aber wenn man es stösst, zeigt es das Benehmen eines eben aufwachenden Thieres. Bringt man es in eine andere Lage,

Digitized by Google

so sucht es das Gleichgewicht; auf den Rücken gelegt, steht es auf; angestossen, hüpft es; Vögel in die Luft geworfen, machen Versuche zu fliegen; Frösche hüpfen fort. Wohl hat das Thier kein Gedächtniss mehr, es überlegt nicht, aber es empfindet dennoch, und reagirt gegen Empfindungen durch Bewegungen, welche keine blossen Reflexionsphänomene sind. Cuvier vergleicht diese Thiere ganz richtig einem schlafenden Menschen, auch dieser sucht im Schlafe noch eine bequeme Lage; er empfindet. Cuvier's Bericht etc. in Flourens *Versuche und Untersuchungen über die Eigenschaften und Verrichtungen des Nervensystems. Lpzg.* 1824. *p.* 71.

Man muss bei den Empfindungen eines gesunden beseelten Wesens wohl die Empfindungen selbst von der Aufmerksamkeit auf dieselben, und von der Fähigkeit, Vorstellungen aus den Empfindungen zu bilden, unterscheiden. Die Aufmerksamkeit scheint eine Thätigkeit der Hemisphären des grossen Gehirns zu seyn; mit ihrem Verluste tritt Stumpfsein ein, die Empfindung bleibt. Dagegen kann ein gesunder Mensch unter einer gewissen Anzahl zugleich stattfindender Empfindungen einer einzigen derselben seine Attention zuwenden, und sie zur herrschenden, zu derjenigen machen, deren er sich in ihrem ganzen Umfange, in ihrer ganzen Stärke bewusst wird, die Vorstellungen in ihm erregt, während andere Empfindungen zwar auch bewusst werden, aber undeutlich sind, wenn die Attention auf sie nicht gerichtet ist. Und so hängt also die Deutlichkeit der Empfindungen von der Mitwirkung edlerer Organe ab, welche nach dem Verluste der Hemisphären des grossen Gehirns verloren sind, während das verlängerte Mark dunkler Empfindungen fähig ist.

Einige haben geglaubt, dass das verlängerte Mark, wie es der Sitz des Willens ist, auch das Centralorgan für alle Empfindungen sey. Diess scheint uns ein Missverständniss, wenn man unter dem verlängerten Marke bloss den angeschwollenen obersten Theil des Rückenmarkes versteht, und nicht zugleich die Fortsetzungen desselben in das grosse Gehirn im Sinne hat. Allerdings ist das verlängerte Mark im engern Sinne das Centralorgan für alle Gefühlsempfindungen, und sie finden nach dem Verluste des grossen Gehirns noch statt, aber ohne Attention. Andrerseits giebt es aber auch für den Gesichtssinn und den Geruchssinn Centralapparate, die in den Hemisphären des grossen Gehirns liegen. Nach ihrer Verletzung hört das Sehen und Riechen auf, wie z. B. nach Verletzung des vordern Vierhügelpaares, des Thalamus opticus, und überhaupt der tieferen Theile der Hemisphären Blindheit eintritt. Es scheint also, dass die Centralorgane der verschiedenen Sinne für sich bestehen; mögen sie auch zum Theil zu den Verlängerungen des Systems der Stränge der Medulla oblongata gehören, so scheint doch ihre Wirkung isolirt stattfinden zu können, und erst durch Mitwirkung der Hemisphären des grossen Gehirns mit den Centralorganen der Sinne tritt die Attention, die deutliche Anschauung der durch die verschiedenen Centralorgane der Sinne dargebotenen Empfindungen ein. Diess ist vor der Hand wahrscheinlich, doch zum Beweise

Digitized by Google

fehlt noch manche Thatsache. Es scheint zwar einerseits gewiss, dass nach Wegnahme des Centralapparates für das Sehen noch durch das verlängerte Mark die Gefühlsempfindungen mit Bewusstseyn stattfinden können; aber wir wissen andrerseits nicht, ob nach dem Verluste des verlängerten Markes in den Centralorganen der übrigen Sinne noch Empfindungen stattfinden können. Mit der Verletzung des verlängerten Markes hört das Athmen auf, dadurch sinkt das Leben auf ein Minimum herab, bei welchem es unmöglich ist, Beobachtungen über die Fortdauer der Sinnesempfindungen des Gesichtssinnes, Geruchssinnes u. s. w., anzustellen. Immer bleibt es aber jetzt am wahrscheinlichsten, dass die Hemisphären des grossen Gehirnes, und nicht das verlängerte Mark es sind, in welche die Wirkungen der verschiedenen Centralapparate der Empfindungen enden, und wo die von einander unabhängigen Empfindungen zu Sinnesanschauungen umgestaltet werden.

Was den Gehörsinn betrifft, so nimmt man gewöhnlich an, dass sein Centralorgan der Boden des vierten Ventrikels sey, weil die Fasern des Gehörnerven von dort entspringen. Flourens hingegen behauptet, dass nach dem Verluste der Hemisphären des grossen Gehirns das Gehör aufhöre, obgleich Vögel nach dem Verluste noch Monate lang erhalten werden können, wie Flourens und Hertwig beobachtet haben. Mag indess auch die Gehörempfindung an die Integrität des Bodens des vierten Ventrikels geknüpft seyn, so scheinen doch die weissen queren Markfasern der Rautengrube, welche durchaus nicht constant mit dem Gehirnnerven zusammenhängen, und zuweilen deutlich über die obere Wurzel des Gehörnerven in die Schenkel des kleinen Gehirns zur Brücke übergehen, nicht die wichtige Rolle bei den Gehörempfindungen zu spielen, welche man ihnen so oft beilegt. Wir besitzen das Gehirn eines Mädchens in unserem Museum, das nach einem Falle auf den Nacken und das Hinterhaupt allmählig am ganzen Körper gelähmt wurde, und wo sich auf dem Boden der Rautengrube auf den queren Markstreifen eine Exsudation von Faserstoff befand, ohne dass das Gehör dieses Subjectes gelitten hätte. Siehe Fischer *de rariore encephalitidis casu. Berol.* 1834.

IV. Von den Vierhügeln.

Die Vierhügel der Säugethiere und die Lobi optici der Vögel, Amphibien und Fische gehören zu dem Centralapparate des Gesichtssinnes mit den Thalami optici der höheren Thiere. Nimmt man bei einer Taube einen der Lobi optici, oder bei einem Säugethiere eine Hälfte der Corpora quadrigemina weg, so erfolgt nach Flourens (bei Säugethieren nach Magendie nicht) Blindheit auf der entgegengesetzten Seite, aber die Regenbogenhaut auf diesem Auge bleibt noch lange beweglich. Die Thiere drehen sich oft um sich selbst, und zwar nach der Seite, wo der Körper weggenommen worden, was auch Magendie und Desmoulins fanden. Dieses Drehen, welches auch bei Fröschen bemerkt wird,

Digitized by Google

scheint die Folge eines Schwindels zu seyn. Wurde unversehrten Tauben das eine Auge zugebunden, so drehten sie sich auch, aber nicht so heftig, und nicht so lange, als die verstümmelte Taube. Bei der Verletzung der Vierhügel treten immer Convulsionen auf der entgegengesetzten Seite des Rumpfes ein; auch wird die entgegengesetzte Seite des Körpers von Muskelschwäche befallen.

Eine merkwürdige Erscheinung ist, dass die Contractilität der Iris nach der oberflächlichen Verletzung eines Lobus opticus nicht verloren geht, während die vollständige Wegnahme eines Lobus opticus die Contractilität der Iris aufhebt; dahingegen mit der Verletzung eines Lobus opticus jedesmal das Gesicht auf der entgegengesetzten Seite verloren geht. Flourens erklärt diess daraus, dass eine unvollkommene Exstirpation der Lobi optici die Excitabilität der Sehnerven nicht aufhebt, weil sie nicht alle Wurzeln der Sehnerven zerstört. Von der Excitation der Sehnerven durch das Licht hängt aber die Bewegung der Iris ab; denn sobald Flourens die Sehnerven selbst reizte, entstand eine Contraction der Iris, und nach Durchschneidung der blossen Sehnerven zieht sich die Iris nicht mehr gegen Lichtreiz zusammen. Diese Erklärung ist auch richtig; indess lässt sich die Fortdauer der Bewegung der Iris gegen das Licht nach der oberflächlichen Verletzung des Lobus opticus einer Seite auch noch einfacher erklären. Denn zur Bewegung der Iris ist es allein schon hinreichend, dass der Sehnerve der andern Seite von dem Lichte gereizt wird, wie auch im gesunden Zustande die Iris des einen Auges auf die Reizung der Retina des andern Auges contrahirt wird. Durch die Untersuchungen von Hertwig (*Exp. de effectibus laesionum in partibus encephali. Berol.* 1826.) sind die Versuche von Flourens fast durchgängig bestätigt worden. Dieselben zeigten nämlich, dass die theilweise Verletzung eines der Vierhügel bei Säugethieren und Vögeln Muskelschwäche und Verlust des Gesichtes auf der entgegengesetzten Seite des Körpers hervorbringt, dass das Sehen nach einer theilweisen Verletzung der Vierhügel zwar auf eine Zeitlang verschwindet, aber dann wiederkehrt; dass die Bewegung der Iris durch theilweise Verletzung eines der Vierhügel nicht aufgehoben wird, sondern zuweilen fortdauert; dass durch die tiefere oder gänzliche Exstirpation der Vierhügel sowohl das Sehvermögen als die Contraction der Iris gänzlich verloren gehen; dass die Verletzung der Vierhügel in dem Auge fasst dasselbe bewirkt, als die Verletzung der Sehnerven; dass auf die Verletzung eines der Hügel eine Muskelschwäche auf der entgegengesetzten Seite des Körpers eintritt, aber einige Zeit darauf wieder verschwindet; dass mit dieser Verletzung auf einer Seite zugleich eine schwindelartige Bewegung der Thiere im Kreise entsteht; dass durch die Verletzung der Vierhügel bloss die genannten Erscheinungen, nicht aber irgend eine andere Störung z. B. des Gedächtnisses, des Bewusstseyns bewirkt wird.

Hertwig's Beobachtungen weichen nur darin von denen von Flourens ab, dass Hertwig bei Verletzung der Vierhügel keine

Digitized by Google

Convulsionen entstehen sah, daher es wahrscheinlich ist, dass Flourens abweichende Resultate von einem zu tiefen Eindringen abhängen.

V. Vom kleinen Gehirne.

Ueber die Kräfte des kleinen Gehirns haben Rolando, Flourens, Magendie, Schoeps und Hertwig interessante Versuche angestellt. Aus den Untersuchungen von Rolando (*Journal de physiol.* 1823., *Saggio sopra la vera struttura del cervello, edit. 3. Torin.* 1828. 3 *Vol.*) ergiebt sich, dass die Abnahme der Bewegungen mit der Verletzung des kleinen Gehirns im geraden Verhältnisse steht, dass die Thiere durch diese Verletzung nicht betäubt werden, und ihre Empfindungskraft in allen Theilen behalten, dass sie aber die Kraft ihrer Muskelbewegungen verlieren. Die Thiere haben die Augen offen, sie betrachten alle Gegenstände, aber umsonst versuchen sie sich in der zur Ortsveränderung nöthigen Bewegung. Ein Thier, dem die eine Seite des kleinen Gehirns weggenommen ist, fällt auf dieselbe Seite, und kann sich auf dem Beine derselben Seite nicht mehr erhalten (?). Diese Beobachtungen bestimmten Rolando zu der unerweislichen Annahme, dass das kleine Gehirn das Erzeugungsorgan für das Nervenprincip sey, welches er mit dem elektrischen Principe vergleicht, und dass die abwechselnden Lagen von grauer und weisser Substanz, wie auch Reil glaubte, als eine galvanische Säule wirken. Die Versuche von Flourens sind in ihren Resultaten klarer und entscheidender. Er fand, dass die Thiere bei dem Abtragen des kleinen Gehirns keine Empfindungen zeigen (Versuche etc. p. 18.). Nahm er bei Vögeln Schnitt für Schnitt das kleine Gehirn weg, so trat Schwäche der Muskelbewegungen und Mangel an Uebereinstimmung derselben ein. Nach der Wegnahme der oberflächlichen und mittleren Lagen wurden die Thiere unruhig, ohne in Convulsion zu gerathen; sie machten heftige und ungeregelte Bewegungen, aber sahen und hörten. Als die letzten Lagen weggenommen wurden, verloren die Thiere die Fähigkeit zum Springen, Fliegen, Gehen, Stehen, zur Erhaltung des Gleichgewichtes. Wurde ein Vogel in diesem Zustande auf den Rücken gelegt, so konnte er nicht mehr aufstehen, er flatterte beständig und zeigte keine Betäubung; er sah den Streich, den man nach ihm führen wollte, und wollte ihn vermeiden. Es blieb also Wille, Empfindung und Besinnung, und nur die Kraft und Fähigkeit, die Bewegungen der Muskeln gruppenweise zweckmässig zu Ortsbewegungen zu verbinden, war verloren, und seine Anstrengungen zur Erhaltung des Gleichgewichtes waren wie die eines Trunkenen (a. a. O. p. 34.). Aus diesen Versuchen, die Flourens in allen Thierclassen übereinstimmende Resultate gaben, schliesst derselbe, dass das kleine Gehirn weder zu den sensoriellen, noch zu den intellectuellen Apparaten gehört, dass in ihm nicht die Quelle der willkührlichen Bewegungen liegt, dass es zwar zu den motorischen Apparaten gehört, dass es aber bei Verletzungen nicht wie andere motorische Apparate, Rückenmark

Digitized by Google

und verlängertes Mark, Convulsionen bewirkt, dass vielmehr durch seine Verletzung nur die Kraft der Bewegungen und die Fähigkeit, sie zweckmässig zu den Ortsbewegungen zu coordiniren, verloren geht. Wenn diese Ansicht richtig ist, so muss im kleinen Gehirne die Mechanik zu der gruppenweisen Erregung der Muskeln vorgebildet seyn, so dass jede Störung der Structur dieses Organes gleichsam die prästabilirte Harmonie zwischen diesem Centralapparate und den Muskelgruppen und ihren nervösen Leitern aufhebt. Bemerkenswerth ist noch, dass die Verletzungen des kleinen Gehirns immer ihre Wirkungen kreuzend auf der entgegengesetzten Seite des Rumpfes zeigen.

Diese Beobachtungen sind durch die Versuche von Hertwig bestätigt worden. Aus diesen ergiebt sich, dass das kleine Gehirn für sich nicht sensibel ist, durch seine Reizungen keine Convulsionen der Muskeln eintreten, dass seine ungestörte Wirkung zur Verbindung der Bewegungen für einen gewissen Zweck, z. B. des Fliegens, Stehens, Laufens, zur Erhaltung des Gleichgewichtes nöthig ist, dass die Verletzung desselben weder auf die Sinne, noch auf andere Functionen des Körpers Einfluss hat. Gleichwohl sah Hertwig, dass die Kraft des kleinen Gehirns nach einer theilweisen Zerstörung sich allmählig wieder herstellte. Die kreuzende Wirkung des kleinen Gehirns wird von Hertwig bestätigt.

Magendie sah, dass Igel und Meerschweinchen, denen er das grosse und auch das kleine Gehirn weggenommen hatte, sich noch die Nase mit den Vorderpfoten rieben, wenn man ihnen Essig unter die Nase hielt. Derselbe will nach der Verletzung des kleinen Gehirns beobachtet haben, dass die Thiere sich anstrengten, vorwärts zu gehen, und durch eine innere Gewalt genöthigt wurden, rückwärts zu gehen. Nach der Verletzung der Pedunculi cerebelli ad pontem und des Pons selbst auf einer Seite sah er constant, dass die Thiere sich nach derselben Seite herumwälzen. Diese Wirkung erfolgt sogar durch jeden Verticalschnitt, welcher die über dem vierten Ventrikel liegende Markmasse trifft, zeigt sich aber am stärksten nach Verletzung der Pedunculi ad pontem. Zuweilen sollen die Thiere 60 Mal in der Minute sich umdrehen, und er sah diese Bewegung acht Tage ohne Aufhören fortdauern. Diese Bewegungen sind keine Convulsionen, sondern werden willkührlich von dem Thiere ausgeführt, als wenn eine innere Gewalt es dazu nöthigte, oder als wenn es von Schwindel ergriffen wäre. Durch die Durchschneidung des Schenkels der andern Seite soll man das Gleichgewicht wieder herstellen können. Hertwig sah auch Drehungen nach rechts nach Verletzung des Pons auf der rechten Seite beim Hunde; dabei war das eine Auge nach oben, das andere nach unten gedreht. Derselbe beobachtete bei Verletzungen des Pons auf der Oberfläche mässigen Schmerz, und schreibt dem Pons eine kreuzende Wirkung zu. Convulsionen beobachtete er nach Verletzungen des Pons nicht.

Der Pedunculus cerebelli inferior (Corpus restiforme) gehört zum System des verlängerten Markes; nach seiner Verletzung treten nach Rolando's Versuch an einer Ziege Convulsionen ein,

Digitized by Google

wobei der Körper des Thieres auf die verletzte Seite sich krümmte. *Saggio ed.* 3. p. 128. Die Pedunculi cerebelli anteriores (ad Corp. quadrig.) bewirkten nach demselben Autor verletzt auch Convulsionen, die entgegengesetzten Extremitäten waren mehr bewegt; das Thier (Kaninchen) fiel nach Sprüngen immer auf die verletzte Seite.

Nach Gall soll das kleine Gehirn das Centralorgan des Geschlechtstriebes seyn. Diese Ansicht stützt sich nicht auf sichere Thatsachen. Burdach hat die hieher gehörigen Thatsachen zusammengestellt, a. a. O. 3. p. 423. Nach Burdach kömmt die Affection der Geschlechtstheile unter 17 Fällen von Fehlern des kleinen Gehirns, und unter 332 Fällen von Fehlern des grossen Gehirns einmal vor. In apoplectischen Fällen mit Erection hat man Bluterguss im kleinen Gehirne gefunden (Serres im *Journal de physiol.* 3. 114.). Dunglison beobachtete bei einer Entzündung des kleinen Gehirns mit seröser Ergiessung Priapismus. Bei Zerstörung des Rückenmarks in Thieren bewirkt man auch zuweilen Erection. Heusinger's Beobachtungen (Meckel's *Archiv.* 6. 551.), der bei zwei Vögeln, die plötzlich gestorben, einen strotzenden Zustand der Hoden und Blutergiessung im kleinen Gehirne fand, können wohl nicht als Beweise für Gall's Ansicht angeführt werden, und alle übrigen von Burdach angeführten Fälle von gleichzeitigen Krankheiten des kleinen Gehirns und der Genitalfunctionen beweisen im Grunde auch nicht viel. Die Coincidenz der Rückenmarkskrankheiten mit Affection der Genitalien ist noch häufiger. Auch steht die Entwickelung des kleinen Gehirns in keinem Verhältnisse mit der Energie des Geschlechtstriebes in der Thierwelt. Diess Organ ist bei den nackten Amphibien, wo es eine blosse Leiste über den vierten Ventrikel darstellt, ausserordentlich klein, und gleichwohl ist der Geschlechtstrieb dieser Thiere zum Sprüchworte geworden, obgleich bei den nackten Amphibien die Erection wegfällt. Gegen die Hypothese spricht ferner ein Präparat des anatomischen Museums zu Bonn von dem kleinen Gehirne eines Mannes, bei dem man bei der Section eine Atrophie der einen Hälfte des kleinen Gehirns fand. Siehe Weber in *nov. act. nat. cur.* 14. 111. Dieser Mann war an einer entzündlichen Krankheit gestorben, und hatte einen eher zu starken als zu schwachen Geschlechtstrieb; er war verheirathet und Vater von mehreren Kindern. Am merkwürdigsten sind aber die von Cruveilhier (*Anat. pathol. liv.* 15. 18.) mitgetheilten Thatsachen. In dem einen dieser Fälle, nämlich von einem 21jährigen Individuum, fanden sich zwei grosse tuberculöse Massen in der linken Hemisphäre des kleinen Gehirns, ohne paralytische Symptome, ohne Kopfschmerzen und ohne eine positive krankhafte Erscheinung in den Genitalien. Da dieses Individuum keine Neigung zu den Vergnügungen der Liebe gehabt haben soll, so könnte man diesen Fall als einen Beweis für die Gall'sche Hypothese ansehen. Indessen zeigt uns der zweite Fall eine Coincidenz des vollkommenen Mangels des kleinen Gehirns mit Neigung zur Mastupration; diess war ein elfjähriges Mädchen. Im 7. Jahre zeigte dieses Subject eine grosse Schwäche in den Ex-

Digitized by Google

tremitäten, Mangel an Intelligenz und eine undeutliche Articulation. Im elften Jahre, zur Zeit, wo das Individuum genauer beobachtet wurde, war die Schwäche in den Extremitäten so gross, dass es kaum die Beine bewegen konnte, die nichts von ihrer Sensibilität verloren hatten. Die Bewegung der Arme war gestattet; der intellectuelle Zustand war stumpfsinnig. Die Person starb an einer entzündlichen Krankheit. Die Fossae occipitales inferiores waren mit Serosität gefüllt. Statt des kleinen Gehirns fand sich nur eine kleine häutige Querbinde über dem verlängerten Marke, die jederseits in eine Haselnuss grosse Anschwellung überging. Der Pons fehlte durchaus, die Oliven waren undeutlich. Man sehe die Abbildung bei Cruveilhier *liv.* 15.

VI. Von den Hemisphären des grossen Gehirns.

Schon die stufenweise Entwickelung der Hemisphären des grossen Gehirns bis zum Menschen, die Coincidenz der Atrophie und des Mangels der Windungen derselben mit Idiotismus zeigen, dass man in diesem Organsysteme des Gehirns den Sitz der höheren Seelenthätigkeiten suchen muss. Es ist aber auch direct durch Versuche bewiesen, dass dem so ist. Besonders sind Flourens Versuche auch in diesem Punkte sehr lehrreich geworden, und Hertwig's Versuche haben sie im Wesentlichen nur bestätigen können. Die Hemisphären des grossen Gehirns zeigen beim Anstich und Anschneiden selbst keine Empfindlichkeit. Der Ort des Gehirns, wo die Empfindungen zu Vorstellungen gestaltet, die Vorstellungen aufbewahrt werden, um gleichsam als Schatten der Empfindung wieder zu erscheinen, ist selbst nicht empfindlich. Diese Erfahrung, die auch Hertwig machte, stimmt auch mit Erfahrungen am Menschen bei Kopfverletzungen überein; denn oft genug hat man schon beobachtet, wo man hervorgequollene Theile des Gehirns von den gesunden ablösen musste, dass diess auch bei einem Subjecte mit klarem Bewusstseyn ohne alle Empfindung geschehen kann. Bei der Verletzung der Hemisphären entstehen auch keine Convulsionen, sondern die einzige constante Folge jeder tiefern Verletzung der Hemisphären ist Blindheit des Auges der entgegengesetzten Seite, und Stumpfsinn. Dass die oberen Theile der Hemisphären keine Muskelzusammenziehungen bewirken können, hatten schon Haller und Zinn gefunden. Auch die Corpora striata, die Sehhügel bewirken gereizt nach Flourens keine Zuckungen, und Lorry hatte dasselbe schon von dem Corpus callosum ausgemittelt.

Die von Flourens und Hertwig über die Function der Hemisphären an verschiedenen Thieren angestellten Versuche stimmen im Allgemeinen sehr überein. Ich werde das sehr interessante Detail eines Versuches von Flourens an einer Taube mittheilen. Als Flourens der Taube die rechte Hemisphäre weggenommen hatte, war sie auf der entgegengesetzten Seite blind. Gleichwohl dauerte die Contractilität der Iris auf diesem Auge fort, aus Gründen, die schon oben p. 848. angegeben worden. In allen Theilen der entgegengesetzten Seite des Rumpfes zeigte sich eine

Digitized by Google

deutliche Schwäche. Diese Schwäche ist indess nach Flourens sowohl in Hinsicht des Grades als der Dauer eine veränderliche Erscheinung. Bei allen Thieren kommen die Kräfte bald wieder ins Gleichgewicht, und das Missverhältniss zwischen beiden Seiten stellt sich wieder her. Die Taube sah auf der verletzten Seite sehr gut, sie hörte, stand, ging, flog ohne Hinderniss. Nach Wegnahme beider Hemisphären entsteht Verlust des Gesichtes und Muskelschwäche, die jedoch weder bedeutend noch anhaltend ist. Eine solche Taube flog, wenn man sie in die Luft warf; sie ging, wenn man sie stiess. Die Iris war in beiden Augen beweglich; die Taube hörte nicht, sie bewegte sich nicht freiwillig, immer zeigte sie sich in der Art eines schlafenden Thieres, und wenn man sie reizte, so zeigte sie das Wesen eines erwachenden Thieres. In welche Lage sie nun auch gebracht wurde, so setzte sie sich ins Gleichgewicht; auf den Rücken gelegt, stand sie auf; Wasser, das man ihr in den Schnabel gab, trank sie; sie widerstrebte den Bemühungen, den Schnabel zu öffnen. Flourens vergleicht ein solches Thier mit einem Wesen, das immer zu schlafen genöthigt ist, aber selbst das Vermögen zu träumen verloren hat. Die Versuche an Säugethieren fielen fast eben so aus. Hertwig's Versuche stimmen mit denen von Flourens überein. Er fand die Hemisphären des grossen Gehirns nicht empfindlich, und nur bei der Verwundung der Basis des Gehirns zeigte ein Hund Zeichen des Schmerzes. Ein Hund, dem Hertwig beide Hemisphären weggenommen, bewegte sich nicht mehr freiwillig von dem Orte, wo er lag, sondern war ganz stumpfsinnig; angeregt, that er einige Schritte, sogleich fiel er aber wieder zu Boden und in Schlafsucht. Einen Schuss hörte er nicht. Eine Taube, welcher Hertwig den obern Theil der Hemisphäre wegnahm, hatte Gesicht und Gehör verloren, und sass wie schlafend da. Er fütterte sie; Erbsen, die ihr bloss in den Schnabel gegeben wurden, verschlang sie nicht, wohl aber, wenn sie auf die Zunge gelegt wurden (Reflexion); die Muskeln waren wenig geschwächt; sie stand fest und flog, in die Luft geworfen. Dieser Zustand dauerte bis zum 15. Tage, wo das Gehör und die Empfindlichkeit grösstentheils wiederkehrten; diese Taube lebte drei Monate. Eine Henne, der beide Hemisphären bis fast auf die Basis ausgeschnitten waren, hatte Gesicht, Gehör, Geschmack, Geruch verloren, sass immer an einem Orte und gab kein Zeichen von sich, bis sie heftig angeregt, einige Schritte that. In diesem Sopor lebte das Thier ohne Wiederherstellung der Sinnesthätigkeit drei Monate. Schoeps hat ähnliche Versuche angestellt. Meckel's *Archiv.* 1827.

Offenbar, wie aus diesen Versuchen und den Folgen des Drucks auf die Hemisphären des Menschen hervorgeht, sind diese Theile des Gehirns der Sitz der Seelenfunctionen, der Ort, wo die Empfindungen nicht bloss bewusst werden, sondern zu Anschauungen, Vorstellungen umgeschaffen, und von wo aus die Seelenthätigkeit als Aufmerksamkeit bald mehr diesem, bald jenem Theile der sensoriellen Einwirkungen sich zuwendet. Welcher Unterschied in Hinsicht der Kräfte der grauen und markigen Substanz

Digitized by Google

obwalte, ist gänzlich unbekannt. Mit der Ausdehnung der Oberfläche der Hirnwindungen nimmt offenbar die Capacität des Seelenvermögens in der Thierwelt zu; aber wir kennen nicht entfernterweise den Einfluss der grauen Rinde, in welche die unendliche Menge der Fasern des Stabkranzes zuletzt ausstrahlen. Welche Veränderung in den Markfasern oder der grauen Masse, oder dem sie beseelenden Principe vorgeht, wenn eine Vorstellung eine Impression auf die leicht veränderliche Materie des wunderbaren Baues macht, ist gänzlich unbekannt. Wir wissen nur, dass jede Vorstellung ein in dem Gehirne bleibender unveräusserlicher Eindruck ist, der in jedem Augenblicke wieder auftauchen kann, wenn die Thätigkeit der Seele sich ihm zuwendet, wenn die Aufmerksamkeit auf diesen Eindruck sich spannt, und dass nur die Unmöglichkeit, vielen Gegenständen zugleich aufmerksam zu seyn, jenes Vergessen erzeugt. Wir müssen uns alle diese Bilder im latenten Zustande als unvertilgbare Eindrücke des Gehirns denken. Eine Hirnverletzung kann einzelne oder alle verwischen. Man hat nach Hirnverletzungen das Gedächtniss für Hauptwörter, Zeitwörter und Lebensabschnitte schwinden und wiederkehren gesehen. Die Erhebung eines einzigen Bildes ins aufmerksame Bewusstseyn modificirt die Coexistenz und stört das Gleichgewicht aller übrigen; daher, wenn die jedesmalige Stärke der zugleich vorhandenen latenten Vorstellungen bekannt wäre, die durch eine Vorstellung hervorzurufende verwandte Vorstellung fast berechnet werden könnte, wenn nur die erste bekannt ist.

Dass es im Gehirne eine affective Provinz oder ein affectives Element gebe, bei dessen Anregung jede Vorstellung an affectiver Stärke schwellen kann, und welches bei seiner vorzugsweisen Thätigkeit jede auch noch so einfache Vorstellung zum affectiven leidenschaftlichen Zustande macht, und auch im Traume den Bildern affective Farben und Nüancen giebt, ist im Allgemeinen zwar wahrscheinlich, lässt sich aber weder im Allgemeinen streng beweisen, noch örtlich nachweisen. Noch viel weniger lässt sich aber beweisen, dass selbst ausser dem leidenschaftlichen Elemente der Seele auch die verschiedenen Richtungen der Geistesthätigkeiten und Leidenschaften ihren besondern Sitz in den Provinzen der Hemisphären haben. Dieser Ansicht von Gall, auf welche sich die Cranioskopie gründen soll, steht zwar aus allgemeinen Gründen keine Unmöglichkeit entgegen, aber es giebt durchaus keine Thatsachen, welche nur entfernter Weise die Richtigkeit einer solchen Ansicht im Allgemeinen und die Richtigkeit der Durchführung im Einzelnen zu erweisen im Stande wären. Es lässt sich keine Provinz des Gehirns nachweisen, worin das Gedächtniss, die Einbildungskraft u. s. w. ihren Sitz hätten. Immer kann das Gedächtniss durch Verletzung der Hemisphären an irgend einem Theile ihres Umfanges verloren gehen; und so ist es mit allen Hauptvermögen oder Richtungen der geistigen Thätigkeit. Bedenkt man auf der andern Seite die zum Theil ganz unpsychologischen, von Gall zusammengebrachten Urvermögen, so kann man diese durch nichts zu beweisenden

Digitized by Google

Willkührlichkeiten ohne Weiteres von dem Forum wissenschaftlicher Untersuchungen ausschliessen. Ganz interessant ist in dieser Hinsicht, was Napoleon über Gall's System gegen Las Cases äusserte: „er schreibt gewissen Hervorragungen Neigungen und Verbrechen zu, die nicht in der Natur vorhanden sind, die nur aus der Gesellschaft, aus der Convention hervorgehen. Was würde aus dem Organe des Diebstahls werden, wenn es kein Eigenthum gäbe; aus dem Organe der Trinksucht, wenn keine geistigen Getränke, aus dem Ehrgeiz, wenn es keine Gesellschaft gäbe." Obgleich Gall kein Organ der Trinksucht annahm, so ist doch diese Bemerkung in Beziehung auf die schlechte psychologische Grundlage der Gall'schen Organe richtig. Indessen wirft Napoleon's Bemerkung nur die Art der Durchführung, nicht das Princip des Gall'schen Systems um. Was das Princip betrifft, so ist gegen dessen Möglichkeit im Allgemeinen a priori nichts einzuwenden; aber die Erfahrung zeigt, dass jene Organologie von Gall durchaus keine erfahrungsmässige Basis hat, und die Geschichte der Kopfverletzungen spricht sogar gegen die Existenz besonderer Provinzen des Gehirns für verschiedene geistige Thätigkeiten. Nicht allein, dass die höheren und niederen intellectuellen Fähigkeiten, Denken, Vorstellen, Phantasie, Erinnern, an jeder Stelle der Oberfläche der Hemisphären durch Verletzung beeinträchtigt werden können; man hat auch oft genug gesehen, dass die verschiedenen Theile der Hemisphären die Thätigkeit der anderen bei den intellectuellen Functionen unterstützen können, und man hat bei Menschen, wo die Entfernung zerstörter Parthien der Oberfläche der Hemisphären nöthig war, öfter keine Aenderung in den moralischen und intellectuellen Eigenschaften derselben eintreten gesehen. Magendie hat vollkommen Recht, wenn er die Craniologie in eine Categorie mit der Astrologieund Alchymie stellt.

Was das Verhältniss beider Hemisphären zu einander betrifft, so scheint es, dass die Integrität einer Hemisphäre die andere bei den intellectuellen Functionen ersetzen kann. Wenigstens hat man in einigen Fällen beständige Zerstörungen in der einen Hemisphäre ohne Störung des Geistes schon vorgefunden, und Cruveilhier (*Livr.* 8.) hat den Fall einer Atrophie der ganzen linken Hemisphäre des grossen Gehirns in einem 42jährigen Manne bei ungestörtem Geistesvermögen mitgetheilt. Die atrophirte linke Hemisphäre hatte ohngefähr die Hälfte der Grösse der rechten, alle Theile der ersten sind gleichmässig atrophirt; daher sind das Crus cerebri, das Corpus mammillare, der Thalamus opticus, das Corpus striatum, der Ventrikel dieser Seite kleiner. Das kleine Gehirn war auf beiden Seiten ziemlich gleich ausgebildet; die rechte Hemisphäre ein wenig kleiner. In diesem Falle war die entgegengesetzte Seite des Rumpfes von Jugend auf unvollkommen gelähmt, so dass die Person noch an einem Stocke gehen konnte; die Glieder dieser Seite waren abgemagert.

Die Commissuren scheinen die Ursache der Einheit der Wirkungen beider Hemisphären zu seyn. Welcher Antheil dem Balken hierbei zukomme, ist noch nicht ganz gewiss;

Digitized by Google

doch scheint die Theilung desselben und des Fornix, nach einer Beobachtung von Reil (Reil's *Archiv.* 11. 341.) zur Ausübung der niederen Seelenthätigkeiten nicht nöthig. Reil fand diesen Mangel bei Erhaltung der Commissuren bei einer stumpfsinnigen Frau, die gleichwohl zu gewöhnlichen Aufträgen und Geschäften, wie Botenlaufen, fähig war. Dass man bei einer chronischen Hirnwassersucht mit Zerstörung des Balkens Blödsinn beobachtete, beweist wegen der Complication nicht viel. Indessen hat man bei Blödsinnigen schon Geschwülste und Hydatiden auf dem Balken gefunden, und La Peyronnie beobachtete bei Verletzung des Balkens Verlust des Gedächtnisses. Die hieher gehörigen Beobachtungen findet man von Treviranus (*Biol.* 6. 258.) und Burdach a. a. O. gesammelt. Directe Versuche über die Bedeutung des Balkens sind noch wenige gemacht. Saucerotte durchschnitt den Balken bei einem Hunde; es erfolgte Betäubung mit heftigem Schütteln und Schluchzen. Das Thier sah und hörte, aber roch nicht, und empfand nicht an den Ohren, an der Nase und bei Verletzungen der Muskeln. Burdach 3. 486. Rolando machte dieselbe Operation an einer Ziege, a. a. O. 2. 218. Das Thier stand einige Zeit unbeweglich, wurde darauf unruhig und lief vorwärts. Es wurde zwei Tage erhalten; allmählig wurde es schwach, konnte sich kaum erheben, und zitterte am ganzen Körper, der kalt war.

Die Bedeutung der Hypophysis und der Zirbeldrüse sind so gut wie gänzlich unbekannt. Greding fand zwar bei Seelenkrankheiten öfter Krankheiten der Hypophysis; allein man hat in Geisteskrankheiten schon in allen Theilen des Gehirns Entartungen gefunden. Wenzel fand die Hypophysis bei Epileptischen öfter krankhaft. Burdach 3. 467. Descartes Hypothese, dass der Sitz der Seele in der Zirbel sey, ist längst vergessen und aufgegeben. Diese zeigt sich nach Georget's Erfahrungen in Geisteskranken sogar selten verändert. Burdach 3. 467.

Die Anwendung der Resultate der pathologischen Anatomie auf die Physiologie des Gehirns kann übrigens immer nur sehr beschränkt seyn. Wir kennen die Gesetze der Mittheilung zwischen den verschiedenen Hirntheilen nicht, und wir können nur im Allgemeinen für gewiss annehmen, dass eine organische Krankheit in einem Theile des Gehirns auch Veränderungen der Function anderer Hirntheile nach sich zieht; ohne dass wir immer aus diesen und den pathologisch-anatomischen Resultaten sichere Schlüsse machen dürften. Degenerationen in den verschiedensten Theilen des Gehirns, welche nach den Versuchen nicht unmittelbar mit den Centralorganen des Sehsinnes zusammenhängen, bewirken gleichwohl oft Blindheit; diess darf uns um so weniger wundern, als wir selbst in Rückenmarkskrankheiten, wie bei der Tabes dorsalis, öfter Amblyopie erfolgen sehen. Dasselbe gilt von der Bedeutung der organischen Veränderungen der verschiedenen Hirntheile in Beziehung auf die Geisteskrankheiten, bei welchen sich öfter Degeneration in Hirntheilen vorgefunden hat, die nicht der wesentliche Sitz der intellectuellen Functionen sind. Die verdienstlichen Sammlungen und Berechnungen, welche Burdach über die Coincidenz der Degenerationen der Gehirntheile mit

Digitized by Google

gewissen Veränderungen der Functionen gegeben hat, liefern für das Ebengesagte eine Fülle von Beispielen. Ferner muss bemerkt werden; dass eine chronische Veränderung im Gehirne, wenn sie bloss durch Druck wirkt, und keine volle Atrophie der gedrückten Theile erzeugt, durch ihre allmählige Entwickelung die afficirten Theile vorbereiten und an ihr Daseyn gewöhnen kann. Daher der grosse Unterschied der plötzlichen und chronischen Verletzungen des Gehirns in Hinsicht der Folgen. So konnten z. B. so wichtige Theile, wie die Varolsbrücke und die Hirnschenkel, durch eine langsam sich entwickelnde perlartige Fettgeschwulst in ihren Wirkungen nicht wesentlich verändert werden, wie ein von Cruveilhier (*Anat. path. liv.* 2.) mitgetheilter Fall beweist, in welchem weder die Bewegung, noch die Empfindung alterirt waren.

VII. Mechanik des Gehirns und Rückenmarkes.

Unter Mechanik des Gehirns und Rückenmarkes versteht man hier die Gesetze, nach welchen die Verbreitung und Leitung der Wirkungen in den Faserungen des Gehirns und Rükkenmarkes erfolgt; wir reden also hier auch wieder in demselben Sinne von Mechanik, wie die Physik bei der Mechanik des Lichtes. So ausgebildet bereits die Mechanik der Nerven ist, so dunkel ist die der Centraltheile; die Primitivfasern der Nerven in derselben Scheide zusammenliegend, theilen sich ihre Zustände nicht mit, und wirken isolirt von den peripherischen Theilen zu den Centraltheilen und von diesen zurück. Wenn, wie es wahrscheinlich gemacht worden, diese Fasern Röhren sind, worin das Nervenmark enthalten ist, so scheinen die Wände dieser Röhren für ihren Inhalt isolirend zu seyn. Die Gehirn- und Rückenmarksfasern verhalten sich ganz anders; das Mark ist bei ihnen nicht in so deutlichen Schläuchen enthalten, und zwischen ihnen hat man, besonders in der grauen Substanz, noch eine ungefaserte kornige Masse beobachtet, welche die Leitung von einer zur andern Faser einigermaassen zu erleichtern scheint, auch da, wo keine Communicationen der Fasern stattfinden. Daher vielleicht die Mittheilbarkeit der Zustände des Gehirns und Rückenmarkes, die Erscheinungen der Reflexion von den Empfindungswurzeln auf die in Hinsicht des Ursprunges nahen Bewegungswurzeln. Hierauf wurde bereits in der vorigen Auflage dieser Schrift Werth gelegt. Nichts destoweniger erfolgt die Leitung in den Faserungen des Rückenmarkes in der Regel immer leichter in der Richtung der Fasern als in abweichenden Richtungen; sonst wäre die motorische Excitation der Ursprünge gewisser Nerven des Rumpfes, und die kreuzende Wirkung des Gehirns auf die Spinalnerven nicht möglich. Die Gesetze der Leitung der grauen Substanz im Innern des Gehirns und Rückenmarkes und auf der Oberfläche des grossen Gehirns sind uns gänzlich unbekannt. Auch müssen wir uns bescheiden, die Mitwirkungen der Faserungen bei allen intellectuellen Functionen des Gehirns von unseren Betrachtungen gänzlich auszuschliessen.

Digitized by Google

Ausser der Reflexion der Wirkungen von den Empfindungsfasern auf die Bewegungsfasern durch das Rückenmark, deren Thatsachen p. 717. erläutert worden, deren Erklärung aus der Structur des Rückenmarkes und Gehirns noch nicht möglich ist, hat die Mechanik des Gehirns und Rückenmarkes, die in den Centraltheilen wirkenden motorischen Apparate, vorzüglich aber die Wege der Leitung bei den Empfindungen und Bewegungen, die hierbei statt findende Kreuzung zu untersuchen.

Unter den motorischen Apparaten müssen wir diejenigen, deren Verletzung Zuckungen hervorbringt, von denjenigen unterscheiden, deren Verletzung die Kraft der Bewegung vermindert, ohne dass Zuckungen entstehen. Diess ist eine wichtige Unterscheidung, die wir Flourens verdanken, und welche einst für die Pathologie der Hirnkrankheiten von Wichtigkeit werden dürfte. In die erste Classe gehören nach Flourens und Hertwig's Versuchen nur die Vierhügel, das verlängerte Mark und das Rückenmark; in die letzte Classe alle sonst im Gehirne enthaltenen motorischen Apparate, namentlich die Sehhügel, gestreiften Körper, überhaupt das grosse Gehirn, so weit es auf Bewegung Einfluss hat, ferner Pons Varolii und kleines Gehirn. Nach der Verletzung dieser Theile nimmt die Kraft der Bewegung ab, aber es entstehen keine Zuckungen, während nach Verletzung des verlängerten Markes und Rückenmarkes unfehlbar Zuckungen erfolgen. Obgleich nun bei der Wechselwirkung der verschiedenen Theile des Gehirns wahrscheinlich auch andere Theile, als das verlängerte Mark und die Vierhügel, in Krankheiten sympathisch Zuckungen bewirken können, wie auch die Pathologie bestätigt: so geht doch aus den oben mitgetheilten Thatsachen so viel hervor, dass, wenn die Kraft beweglicher Theile aus Krankheitsursachen in den Centraltheilen abgenommen hat, diese Ursachen eben so gut in den gestreiften Körpern, Thalami optici, Hemisphären, Pons, Cerebellum, Medulla oblongata, Medulla spinalis, liegen können, dass aber, wenn Krampf oder Zuckung und Lähmung ihre Ursache in den Centraltheilen haben, diese viel eher in den Vierhügeln, im Rückenmark und verlängerten Mark, als in den übrigen der oben genannten Theile zu suchen ist.

Ein anderer für die Mechanik der Centraltheile wichtiger Umstand ist die Kreuzung der Wirkungen. Aus den über die Verwundung des Rückenmarkes und verlängerten Markes bei Thieren angestellten Versuchen und aus pathologischen Beobachtungen ergiebt sich, dass die Wirkungen dieser Theile auf die Nerven sich nicht kreuzen. Eine Verletzung des verlängerten Markes oder des Rückenmarkes bewirkt immer Zuckung oder Lähmung auf derselben Seite. Diess ist für das Rückenmark leicht erklärlich, weil es in ihm keine Kreuzung der Fasern von rechts nach links und umgekehrt giebt. In Hinsicht des verlängerten Markes ist das Ergebniss der Versuche von Flourens, Hertwig nicht ganz mit der Structur übereinstimmend; denn da von den Strängen des verlängerten Markes wenigstens die Pyramiden sich kreuzen, die anderen Stränge aber auf derselben Seite des Rük-

Digitized by Google

kenmarkes fortgehen, so sollte man erwarten, dass je nach der Art der verletzten Theile des verlängerten Markes bald eine kreuzende, bald eine gleichseitige Wirkung erfolge. Lorry hatte in der That auch beobachtet, dass bei Verwundungen des verlängerten Markes die Zuckungen stets auf der verwundeten, die Lähmungen auf der entgegengesetzten Seite seyen. Indess sind die Resultate der Versuche von Flourens und Hertwig durchaus dagegen. Aber man mus bedenken, dass die Versuche meist wohl nur an den sich nicht kreuzenden seitlichen Strängen des verlängerten Markes angestellt wurden; und es ist sehr wahrscheinlich, dass, wenn eine Verwundung die Pyramiden des verlängerten Markes über der Kreuzung trifft, auch Kreuzung der Wirkungen erfolgen wird. Die Wirkungen des kleinen Gehirns, der Vierhügel, der Hemisphären und der darin enthaltenen Theile ist fast immer kreuzend; die Verletzung des kleinen Gehirns, der Vierhügel und der Hemisphären des grossen Gehirns bewirkt immer die Schwäche auf der entgegengesetzten Seite, die Verletzung der Hemisphären, der Vierhügel bewirkt Blindheit auf der entgegengesetzten Seite. Diess ist das allgemeine Resultat der Versuche von Flourens und Hertwig. Von dem grossen Gehirne hatten diess schon theils Versuche, theils pathologische Beobachtungen von Caldani, Arnemann, Valsalva, Wenzel u. A. erwiesen. Siehe Treviranus *Biol.* 6. 117. Burdach a. a. O. 3. 365. Magendie sagt dasselbe von den Hemisphären, und er bewirkte durch Exstirpatien eines Auges bei Vögeln sogar in kurzer Zeit Atrophie des entgegengesetzten Lobus opticus. Die Vierhügel zeigen bei Verletzungen derselben die kreuzende Wirkung nach Flourens vorwärts und rückwärts, nach vorn auf die Augen, nach hinten auf die anderen Theile des Körpers. Mit diesem Resultate stimmen auch die meisten pathologischen Beobachtungen überein; und man hat nur selten Ausnahmen beobachtet, welche Treviranus (*Biol.* 6.) und Burdach zusammengestellt haben. Aus Burdach's Zusammenstellung von 268 Fällen mit einseitiger Abnormität des Gehirns ergiebt sich, dass auf diese Zahl 10 Fälle mit Lähmung beider Seiten, und 258 mit Hemiplegie kommen, und dass unter diesen nur 15 mit gleichseitiger Lähmung sind. Die Convulsionen waren in 25 Fällen gleichseitig, in 3 Fällen ungleichseitig.

Nach diesen Thatsachen lässt sich wohl die Entstehung des alten, schon von Hippocrates an geltenden Dogma erklären, dass bei Gehirnwunden die Convulsion auf der verwundeten, die Lähmung auf der entgegengesetzten Seite sey. Man kann nämlich durch eine gewisse Art der Hirnverwundung beide Erfolge zugleich erzeugen, indem man Lähmung bedingende und Zuckung bedingende, kreuzende und nicht kreuzende Theile verletzt. Niemand hat diese Verhältnisse mehr aufgeklärt als Flourens. Durch Verletzung des Rückenmarkes und des verlängerten Markes bewirkt man Lähmung und Zuckung auf derselben Seite, durch Verletzung der Vierhügel Lähmung und Zuckung auf der entgegengesetzten Seite. Durch Verletzung der Thalami, Corpora striata, Hemisphären des grossen und kleinen Gehirns bewirkt man Lähmung

Digitized by Google

auf der entgegengesetzten Seite ohne Zuckung. Wird aber das kleine Gehirn und das verlängerte Mark zugleich auf einer Seite verwundet, so hat man lähmungsartige Schwäche auf der entgegengesetzten, und Zuckung und Lähmung auf derselben Seite. Siehe Flourens a. a. O. p. 108. So viel Licht indess die Versuche von Flourens über die Kreuzung der Lähmungen und Convulsionen werfen, so scheint derselbe doch aus seinen Versuchen zu viel gegen die Möglichkeit von gleichseitigen Convulsionen bei Hirnfehlern auf einer Seite geschlossen zu haben. Es ist zu auffallend, dass in Burdach's Zusammenstellung von einseitigen Hirnfehlern die Convulsion in 25 Fällen gleichseitig, nur in 3 Fällen ungleichseitig erfolgte; unter diesen Beobachtungen sind uns gerade diejenigen von Wichtigkeit, wo bei ungleichseitiger Lähmung gleichseitige Convulsion erfolgte. Bei Fehlern in dem Corpus striatum einer Seite kommen auf 36 Fälle von ungleichseitiger Lähmung 6 Fälle mit gleichseitiger Convulsion, und keine mit ungleichseitiger Convulsion vor. Diess dürfte ziemlich deutlich für den alten Satz sprechen, dass, wenn bei einseitigen Hirnfehlern mit ungleichseitigen Lähmungen Convulsionen vorkommen, diese leichter gleichseitig als ungleichseitig sind.

Die Erklärung der kreuzenden Wirkung durch die Kreuzung der Fasciculi pyramidales des verlängerten Markes liegt zu nahe, als dass sie nicht seit der Kenntniss dieser Kreuzung als Ursache der kreuzenden Hirnwirkungen angenommen worden wäre. Es beweist auch die Kreuzung dieser Fascikel in Uebereinstimmung mit der kreuzenden Wirkung des Gehirns auf den Rumpf, dass die Pyramiden unter den Strängen des verlängerten Markes vorzüglich es sind, welche den motorischen Einfluss vom Gehirn auf den Rumpf leiten. Da indess die übrigen Fascikel des verlängerten Markes sich nicht kreuzen, so fehlt es auch nicht an einem Erklärungsgrunde für die ausnahmsweise stattfindende gleichseitige Wirkung des Gehirns auf den Rumpf.

Eine ganz besondere Schwierigkeit bietet das Verhalten der Hirnnerven in Beziehung auf Kreuzung und Nichtkreuzung der Wirkungen dar. Denn da diese grösstentheils über der Kreuzung der Pyramiden ihren Ursprung nehmen, so lässt sich die Kreuzung der Pyramiden auch nicht als Erklärung der kreuzenden Wirkung der Hirnverletzungen auf die Hirnnerven annehmen; und was die Sache noch verwickelter macht, ist der Umstand, dass die Hirnnerven beim Menschen wenigstens eben so häufig eine gleichseitige, als eine kreuzende Wirkung des Gehirns erfahren. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die von Burdach mit einem bewunderungswürdigen Fleisse zusammengestellten Thatsachen. Bei einseitigem Hirnfehler erfolgte Lähmung der Gesichtsmuskeln in 28 Fällen auf der entgegengesetzten Seite, in 10 Fällen auf derselben Seite. Lähmung des Augenliedes erfolgte gleichseitig in 6, kreuzend in 5 Fällen; Lähmung der Augenmuskeln gleichseitig in 8, kreuzend in 4 Fällen; Lähmung der Iris gleichseitig in 5, kreuzend in 5 Fällen. Burdach 3. 372. Die Zunge ist in der Regel gegen die gelähmte Seite des Gesichts hingezogen. Burdach 3. 377.

Digitized by Google

Beim Menschen beobachtet man in Hirnfehlern eben so oft eine gleichseitige als eine kreuzende Lähmung des Auges. Burdach 3. 378. Da zu der Zusammensetzung des Sehnerven jedes Auges beide Hemisphären beitragen, indem jede Sehnervenwurzel im Chiasma Fasern für beide Augen abgiebt, so ist die Gleichzahl der kreuzenden und nicht kreuzenden Wirkung leicht einsichtlich. Aber nach der Theorie sollte durch einen einseitigen Hirnfehler weder eine kreuzende noch eine gleichseitige Blindheit, sondern halbseitige Lähmung der Markhäute beider Augen, also Halbsehen erfolgen; indem die linke Sehnervenwurzel in den linken Theil der Sehnerven beider Augen, die rechte Sehnervenwurzel in den rechten Theil der Sehnerven beider Augen im Chiasma übergeht. Man hat zwar schon öfter Halbsehen als vorübergehendes Symptom beobachtet. Siehe Mueller's *Physiol. d. Gesichtsinnes.* p. 93. Aber bei einseitigen Hirnfehlern kömmt nicht Halbsehen, sondern in der Regel Blindheit des einen, oder des andern, oder beider Augen vor. Sehr merkwürdig ist der Unterschied des Menschen und der Thiere, dass bei ersterem Hirnfehler eben so leicht eine gleichseitige als eine kreuzende Blindheit hervorbringen, während bei den Thieren immer auf einseitige Hirnverletzungen kreuzende Blindheit eintritt. Diess erklärt sich indess aus der bei den Thieren verschiedenen Mischung der Fasern in dem Chiasma der Sehnerven. Bei den Thieren scheint der grösste Theil der Fasern kreuzweise zur entgegengesetzten Seite zu gehen, und diess ist wohl durch den Umstand nothwendig bedingt, dass die Thiere mit dem grössten Theile der Sehfelder ihrer divergirenden Augen ganz verschiedene Gegenstände sehen. Nur die mittlern Objecte zwischen beiden Augen werfen ihr Bild auf beide Augen; also nur ein kleiner Theil des Sehfeldes beider Augen ist identisch. Beim Menschen aber sehen die geometrisch correspondirenden Theile beider Markhäute bei der gewöhnlichen Stellung beider Augen immer dasselbe Object. Diese geometrisch übereinstimmenden Theile ihrer Sehnervenhaut haben nur eine Empfindung trotz zwei Organen. Und damit stimmt der Bau des Chiasmas beim Menschen überein, dass nämlich jede Sehnervenwurzel die äusseren Fasern des Sehnervens derselben Seite, und die inneren Fasern des entgegengesetzten Sehnervens abgiebt. Vergl. oben p. 716.

Aus den vorher entwickelten Thatsachen der Mechanik des Gehirns, und aus den schon in der Lehre vom Rückenmark aufgestellten Grundsätzen der Mechanik desselben lässt sich nun eine Classification der Lähmungen und Krämpfe in Hinsicht ihres Ursprunges geben.

A. Lähmungen. Die Lähmungen sind theils Nervenlähmungen, die ihren Sitz bloss in einem einzelnen Nerven und nicht im Gehirne und Rückenmarke haben, theils Hirn- und Rückenmarkslähmungen. Die ersteren entstehen durch alle Ursachen, welche in den Nerven örtlich die Leitung aufheben, wie rheumatische Affection, Durchschneidung, Geschwülste der Nerven etc. Bei den letzteren ist die Ursache nicht in den Nerven, sondern

Digitized by Google

in den Centraltheilen zu suchen. Die meisten Lähmungen sind Hirn- und Rückenmarkslähmungen. Von diesen ist hier zunächst die Rede. Diese Lähmungen sind theils halbseitig, Hemiplegie, theils Querlähmungen, Paraplegie; im erstern Falle ist die lähmende Ursache auf einer Seite des Gehirns oder Rückenmarkes, im letztern ist sie entweder auf beiden Seiten, oder auch auf einer von beiden, denn eine Querlähmung erfolgt auch öfters, wenn auch die Ursache nur auf einer Seite des Gehirns ist.

1) Rückenmarkslähmungen. Sie haben das Eigenthümliche, dass der Sitz der Lähmung in der Regel aus dem Umfange der gelähmten Theile berechnet werden kann. Denn bei Rückenmarksverletzungen sind in der Regel alle Theile gelähmt, welche unter der verletzten Stelle des Rückenmarkes von der Fortsetzung des verletzten Stranges Nerven erhalten. Bei einer Rückenmarkslähmung mit blosser Lähmung der unteren Extremitäten, der Schliessmuskeln ist in der Regel der untere Theil des Rükkenmarkes leidend; liegt die Ursache höher, so ist der Umfang der gelähmten Theile grösser. Eine lähmende Ursache unter dem vierten Halsnerven lähmt die oberen Extremitäten allein oder mit allen tieferen Theilen; aber nicht den N. phrenicus. Eine höhere Verletzung lähmt auch diesen Nerven. Eine lähmende Ursache an der Medulla oblongata lähmt den ganzen Rumpf und auch die von der Medulla oblongata entspringenden Kopfnerven. Ich kenne einen Fall von Krankheit der Medulla oblongata von Druck einer kleinen Geschwulst, wo eine unvollkommene Lähmung allmählig an allen Muskeln des ganzen Körpers zugleich eintrat, und sowohl die Arme als die Beine, die Zunge, wie die Augen und Gesichtsmuskeln afficirt waren. Im Allgemeinen gilt bei Rückenmarkslähmungen die Richtschnur, dass die Höhe der gelähmten Theile nach dem Ursprunge ihrer Nerven den Sitz der verletzten Stelle des Rückenmarkes andeutet. Bei einer Verletzung des Lendentheiles des Rückenmarkes sind nothwendig die unteren Extremitäten gelähmt, und niemals die oberen Extremitäten. Bei einer Lähmung der Arme von Rückenmarksleiden reicht die Ursache sicher über den Ursprung der Armnerven hinauf, deswegen brauchen aber nicht die unteren Extremitäten zugleich gelähmt zu seyn. Immer ist die Wirkung auf derselben Seite wie die Ursache. Ist die Empfindung gelähmt, so ist es wahrscheinlich, aber nicht gewiss, dass die Ursache in den hinteren Strängen des Rückenmarkes sey; ist die Bewegung gelähmt, so ist sie häufiger, aber nicht constant in den vorderen Strängen. Siehe oben p. 814.

Diese Lähmungen sind bald vollkommene, bald unvollkommene, Paresis. Bei den vollkommenen ist die Leitung des Hirneinflusses an einer Stelle des Rückenmarkes aufgehoben, bei den unvollkommenen ist die Leitung vorhanden, der Wille wirkt auf alle Muskeln, aber die Kraft erlischt, wie bei der Atrophie des Rückenmarkes, Tabes dorsalis.

2) Hirnlähmungen. Sie können sich an jedem Theile des Rumpfes, am Gesicht, wie an den oberen und unteren Extremi-

Digitized by Google

täten äussern. Eine Lähmung der Wadenmuskeln oder der Schliessmuskeln kann daher eben so gut eine Rückenmarks- als eine Hirnlähmung seyn. Dass es eine Hirnlähmung sey, kann erst daraus geschlossen werden, dass zu den gelähmten Theilen und Functionen auch solche gehören, die von Hirnnerven abhängig sind, wie die Augenmuskeln, das Sehvermögen des Auges, das Gehör, die Sprache oder Bewegung der Zunge, die Gesichtsmuskeln u. s. w.; diese Lähmungen sind auch wieder Lähmungen der Empfindung, oder der Bewegung, oder beider zugleich. Bei den Lähmungen der Bewegung kann die Ursache in den gestreiften Körpern, in den Thalami, in den Decken der Hemisphären selbst, in den Vierhügeln, im Pons, in der Medulla oblongata, im kleinen Gehirne seyn. Serres, Bouillaud, Pinel-Grand-Champ behaupten nach ihren Beobachtungen, dass die Lähmung der vorderen Extremitäten öfter von Verletzung der Thalami, die Lähmung der hinteren Extremitäten öfter von Degenerationen der Corpora striata abhänge; diess ist keineswegs festgestellt. Bei den Lähmungen der Empfindung kann die Ursache sehr verschiedene Sitze haben. Blindheit erfolgt am häufigsten von Degeneration der Hemisphären, besonders der Thalami, ferner der Corpora quadrigemina; Mangel der Gefühlsempfindung bei Krankheiten der Medulla oblongata. Die Lähmung ist bald vollkommen, bald unvollkommen; Theile, welche verletzt am leichtesten die Kraft der Bewegung rauben, sind die Corpora striata, Thalami, die Schenkel des grossen Gehirns, Pons. Unvollkommene Lähmung erfolgt am leichtesten von Krankheiten der Hemisphären des grossen Gehirns und Krankheiten des kleinen Gehirns. Theile des Gehirns, welche ausser Lähmung auch leicht Krämpfe erzeugen, sind die Vierhügel, die Medulla oblongata und die Basilartheile des grossen Gehirns. Die Wirkungen der lähmenden Ursache erfolgen an dem Rumpfe in der Regel kreuzend, an dem Kopfe eben so oft gleichseitig als kreuzend.

B. Convulsionen. Sie haben ihre Ursache theils in den Nerven, theils in dem Gehirne, theils im Rückenmarke.

1) In den Nerven. Hieher gehören die durch örtliche Nervenkrankheiten, Nervengeschwülste, Neuralgien, oder überhaupt heftige Empfindungen, und bei Kindern durch alle örtlichen Krankheiten erregten Convulsionen von Leitung der centripetalen Erregung auf das Rückenmark und Gehirn, und Reflexion auf die motorischen Nerven.

2) Im Rückenmarke. Die Gesetze, nach welchen die Lähmungen erfolgen, gelten auch hier für die Convulsionen.

3) Im Gehirne. Eben so verhält es sich mit dem Gehirne, nur ist zu bemerken, dass die Hemisphären des grossen Gehirns, des kleinen Gehirns, des Pons mehr zu den Lähmung bedingenden, die Vierhügel und die Medulla oblongata zu den Lähmung und Convulsion bedingenden Theilen des Gehirns gehören.

Nachdem wir die Gesetze der Mechanik des Gehirns und Rückenmarkes bisher bei der Fortpflanzung der Wirkungen untersucht haben, wenden wir uns zuletzt zu den aus dem aufge-

Digitized by Google

hobenen Gleichgewicht der Hirnwirkungen erfolgenden statischen Erscheinungen. Nach Verletzung gewisser Theile des Gehirns treten Erscheinungen ein, als wäre das Gleichgewicht von Kräften aufgehoben, die sich nun einseitig äussern. Diese Erscheinungen bilden eine ganz besondere Classe. Man zerstört einen Theil, und der gleichnamige der andern Seite scheint darauf in eine verstärkte Wirkung zu treten. Das Drehen der Thiere im Zirkel nach einer Seite tritt nach Magendie nach Verletzungen der Brücke auf einer Seite ein; Schnitte in den linken Theil des Pons verursachen das Drehen nach der linken Seite und umgekehrt. Hat man die drehende Bewegung des Thieres nach einer Seite durch Verletzung des Pons auf derselben Seite bewirkt, so kann man diese Bewegung dadurch aufheben, dass man die Brücke auch auf der andern Seite durchschneidet. Hertwic sah nach Durchschneidung des Pons auf einer Seite nicht allein die Zirkelbewegung, sondern auch, dass beide Augen verdreht wurden, indem das eine nach oben, das andere nach unten gewandt war. Nach querem Durchschnitt in die Brücke konnte ein Hund zwar stehen, konnte aber keinen Schritt thun, ohne zu fallen; die willkührlichen Bewegungen waren nicht aufgehoben und die Empfindungen unverändert.

Die Durchschneidung der Schenkel des kleinen Gehirns zur Brücke bewirkt nach Magendie ebenfalls ein Herumwälzen der Thiere nach der Seite. Diese Bewegung soll zuweilen so schnell erfolgen, dass das Thier mehr als 60 Umdrehungen in der Minute macht. Magendie will diese Bewegungen acht Tage lang fortdauernd gesehen haben, ohne dass sie einen Augenblick aufgehört hätten.

Nach Wegnahme der gestreiften Körper auf beiden Seiten tritt nach Magendie's Versuchen bei den Thieren ein unwiderstehlicher Trieb, vorwärts zu entfliehen, ein, der sich auch nach dem Verluste des Gesichtes zeigen soll.

Magendie hat auch nach Verletzungen des kleinen Gehirns bei Säugethieren und Vögeln eine Neigung zu Rückwärtsbewegungen bemerkt; dieselbe Erscheinung soll zuweilen nach Verletzungen des verlängerten Markes erfolgen; so sah Magendie Tauben, denen er eine Nadel in das verlängerte Mark gestochen, länger als einen Monat immer rückwärts gehen; er erzählt, dass sie sogar rückwärts flogen. Endlich will Magendie bei gewissen Verletzungen des verlängerten Markes eine Tendenz zur Kreisbewegung wie auf der Reitbahn, entweder nach rechts oder links, bemerkt haben. Diess sah er bei einem 3—4 Monate alten Kaninchen, wo er die vierte Hirnhöhle blosslegte, das kleine Gehirn aufhob, und einen senkrechten Einschnitt in die Rautengrube 3—4 Millim. von der Mittellinie machte; beim Einschnitte nach rechts drehte sich das Thier rechts herum.

Aus diesen wichtigen Thatsachen schliesst Magendie auf gewisse im Gehirne vorhandene Impulse zu Bewegungen, wovon der eine nach vorn, der andere nach hinten, der eine nach rechts, der andere nach links das Thier zu Bewegungen bestimmen, de-

Digitized by Google

ren Detail es willkührlich ausführt, und welche sich im Zustande der Gesundheit das Gleichgewicht halten. Ob diese Erklärung richtig sey, lässt sich jetzt nicht entscheiden. Man sieht leicht ein, dass ein Thier zu solchen Bewegungen auch bestimmt werden kann, wenn durch die Art der Verletzung eine gewisse einseitige Art der Bewegung des Nervenprincipes im Gehirne einträte, in den Sinnen als scheinbare Schwindelbewegung entweder der Objecte oder seines eigenen Körpers, welchen das Thier entweder zu widerstehen sucht oder welchen es schwindelnd folgt.

Die zuletzt betrachteten Erscheinungen aus der Statik der Nerven sind motorischer Art; es giebt aber auch ähnliche Erscheinungen sensorieller Art. Es giebt Einwirkungen auf das Gehirn, welche keine rotatorischen Bewegungen, sondern rotatorische Empfindungen hervorrufen. Hieher gehören die rotatorischen Schwindelempfindungen, welche am meisten vom Gesichtssinne bekannt sind. Es ist eine bekannte Thatsache, dass, wenn man sich eine Zeitlang schnell um seine Achse dreht, man nicht allein die Besinnung zu verlieren anfängt, sondern auch beim Stehenbleiben dann die Gegenstände selbst sich in derselben Richtung zu drehen scheinen. Ueber diese Erscheinungen hat Purkinje sehr merkwürdige Beobachtungen angestellt, und in den medicinischen Jahrbüchern des Oesterreichischen Staates Bd. 6. mitgetheilt. Es geht daraus hervor, dass man die Richtung der Rotation der Bilder durch die Stellung des Körpers und insbesondere des Gehirns, und die spätere Stellung desselben beim Stehenbleiben modificiren kann. Es steht in der Gewalt des Experimentators, eine horizontale oder verticale, oder schiefe Kreisbewegung, oder eine tangentiale Scheinbewegung der Gegenstände durch Drehung des Körpers zu bewirken. Nur wenn der Kopf die gewöhnliche aufrechte Stellung beim Drehen hat, erfolgt beim Stehenbleiben bei aufrechtem Kopfe die horizontale Kreisbewegung der Gegenstände; hält man aber den Kopf beim Drehen hinten über, und stellt ihn beim Stillstehen gerade, so ist die Scheinbewegung wie die eines Rades um die Achse in einem vertical gestellten Kreise, und so kann man die Scheinbewegung jedesmal nach dem Unterschiede in der Lage des Durchschnittes des Kopfes beim Drehen und beim Stillstehen ändern. Wenn aber der Körper auf einer Scheibe liegend mit dieser gedreht wird, entsteht auch eine tangentiale Scheinbewegung. Aus der Wiederholung dieser Versuche ergiebt sich, dass der Durchschnitt des Kopfes, als einer Kugel, um deren Achse die wahre Bewegung geschah, jedesmal die Scheinbewegung der Gegenstände, bei der nachmaligen Lage des Kopfes, während des Stehenbleibens bestimmt. Purkinje schliesst aus diesen merkwürdigen Versuchen, dass durch die Drehung des Kopfes und ganzen Körpers die Theilchen des Gehirns dieselben Bewegungstendenzen, wie die Theilchen einer geschwungenen Scheibe erhalten müssen, und dass diese Störung ihrer Ruhe sich durch die scheinbaren Schwindelbewegungen äussert. Man kann sich das Phänomen vielleicht besser so versinnlichen, dass man es von den Eindrücken

Digitized by Google

des Blutes auf die Hirnmasse in einer Richtung ableitet. Es wäre indess auch möglich, dass durch die Drehungen eine Aberration eines feineren Principes, als der Hirntheilchen oder des Blutes, durch Aufheben des Gleichgewichtes der Kräfte eine Aberration des Nervenprincipes selbst stattfände, welche den Sinnen als Scheinbewegung der Gegenstände vorkömmt. Wenigstens bewirken Narcotica ohne mechanische Störungen auch Schwindelbewegungen. Jedenfalls bieten diese Erscheinungen eine sehr interessante Parallele sensorieller Phänomene zu den vorher beschriebenen, durch das Aufheben des Gleichgewichtes der Kräfte in den motorischen Theilen entstehenden Zirkelbewegungen dar.

Berlin, gedruckt bei den Gebr. Unger.

Digitized by Google

Digitized by Google

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

Form 410

B D MAR 1 5 1917